

フェルマー型のカラビ・ヤウ多様体が、ゼータ関数を部品にしている。

$$x^a + y^b + z^c + u^d + v^e = 0, \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{e} = 1\right)$$

$$x^a + y^b + z^c + u^d + v^e - 5\psi xyzuv = 0$$

そのオイラー数が、ホッジ数を経て、

$$e = 2(h^{ij} - h^{ji})$$

大域的積分多様体のガンマ関数となり、

$$\int \Gamma(\gamma)' dx_m = \int \Gamma dx_m \cdot \frac{d}{d\gamma} \Gamma \leq \int \Gamma dx_m + \frac{d}{d\gamma} \Gamma$$

Jones 多項式を形成して、

$$= e^{x/\log x} + e^{-x \log x} \geq e^{x \log x} - e^{-x \log x}$$

鏡映理論となり、

$$R'_{ij} = -R_{ij}$$

ヒッグス場から、

$$\frac{d}{df} F = \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m + \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m$$

オイラーの定数の多様体積分を加群として、

$$\frac{d}{df} F + \int C dx_m = \int \left(\int \frac{1}{x^s} dx - \log x \right) d\text{vol} = e^{-x \log x} + e^{x \log x}$$

リッチテンソルを時間における流体理論として、

$$\frac{d}{dt} g_{ij}(t) = -2R_{ij}$$

周期関数となり、

$$\frac{d}{df} F + \int C dx_m = 2(\cos(ix \log x) - i \sin(ix \log x))$$

全ては、ホッジ予想となる。

$$= 2(h^{ij} - h^{ji})$$

全ては、カラビ・ヤウ多様体が、ゼータ関数を部品とする、オイラーの定数の多様体積分として、ガンマ関数における大域的積分多様体と同型となり、ホッジ数が、5次元型フェルマー方程式における、リーマン予想を基点にする D-brane を解にもっていく、共形場理論の鏡映理論となる、ヒッグス場方程式が、世界をプラトニックな空間を経て、スピリチュアルな空間と物質な空間における、情報の変換を成している、心の影を形成している。心理学から物理学、数学へと、情報が行き来している様が、上の式たちである。

その結果の式が、 AdS_5 多様体である。

$$||ds^2|| = e^{-2\pi T||\psi||} [\eta_{\mu\nu} + \bar{h}(x)] dx^\mu dx^\nu + T^2 d^2\psi$$

$$\text{それが、} \beta(p, q) = \int e^{\sin \theta \cos \theta} \int \sin \theta \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{d}{df} F + \int C dx_m$$

$$= 2(\cos(ix \log x) - i \sin(ix \log x))$$

と、周期関数へと結論が下る。それゆえに、ホッジ予想が解決される。

$$x^a + y^b + z^c + u^d + v^e = 0, (\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{e} = 1)$$

$$x^a + y^b + z^c + u^d + v^e - 5\psi xyzuv = 0$$

5次元型のフェルマーの定理は、リッチ・フロー方程式になり、ゼータ関数の値の2倍値を取る。これは、 AdS 5多様体のアーベル多様体としての $v^e = T^2 d^2\psi$ という関係式となる。これが、次元単位を多様体として、ヒッグス場方程式とオイラーの定数の多様体積分との加群が、中継ぎとしての、カラビ・ヤウ多様体とフェルマーの定理が、リッチ・フロー方程式と同型の2倍の係数としてのゼータ関数と同型となる。5次方程式以上に解の公式がないのが、ガンマ関数についての大域的部分積分多様体が、このフェルマーの定理における解の公式の代替用の方程式となっている。 $T^2 d^2\psi = \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k$ が、タイヒミュラー方程式となっている。

$$x^{a+b} = y^c, a+b \leq c, a \equiv b \pmod{c}$$

$$x^{\text{rand}(a+b)} = y^c$$

$\text{rand}(a+b)$ と a, b の加群による乱数が c となるのは、

$$e^{x \log x} + e^{-x \log x} \geq e^{x \log x} - e^{-x \log x}$$

と、Jones 多項式のよる、量子暗号と同じ仕組みの方程式となっている。

$$x^{\frac{1}{2}+iy} = e^{x \log x}$$

と、ゼータ関数ともなっている。

$$(x^a + y^b) = z^n, (z^c + u^d) = z^m, v^e = T^2 d^2\psi$$

$$z^n + z^m = \frac{d}{df} F + \int C dx_m = 2\zeta(n, m)$$

$$||ds^2|| = e^{-2\pi T||\psi||} [\eta + \bar{h}(x)] dx^\mu dx^\nu + T^2 d^2\psi$$

$$\frac{d}{df} F + \int C dx_m = 2\zeta(n, m) = \int \Gamma(\gamma)' dx_m$$

要するに、5次方程式以上に解の公式がないのを、それ以上の方程式として、ガンマ関数についての大域的部分積分多様体が、5次方程式以上における、解の公式の代替方程式となる。

$$(x^a + y^b) = x^{\text{rand}(a+b)} \leq x^c$$

$$\begin{aligned}
x^a \cdot y^b &\leq x^a + y^b = e^{x \log x} \cdot e^{-x \log x} \leq e^{x \log x} + e^{-x \log x} \\
&= \int \Gamma(\gamma)' dx_m = \int \Gamma dx_m \cdot \frac{d}{d\gamma} \Gamma \leq \int \Gamma dx_m + \frac{d}{d\gamma} \Gamma
\end{aligned}$$

と $\text{rand}(a+b)$ という乱数を発生させても、 $e^{x \log x}$ という、定義域と値域の値の範囲の Jones 多項式として、フェルマーの定理は、ゼータ関数の量子暗号として、最終的に、タイヒミュラー理論となる。