

Jones 多項式からの各株式発行からの需要と供給、 株価の分配関数、多項式からナスダックへの金融機構の 株式発行のマクロとミクロの波及と流れ

高島彩さんの成蹊大学での経済理論の研究論文

Jones 多項式から各会社の株価への値打ちから日経平均株価への株価の価値の波及、東証株価指数 Topix の全銘柄からの全体の会社の指数からの平均株価の決定量、そして、アメリカの株式市場でのダウ平均株価の終値の収束 (戦略、reco level theory, 株式会社への) 全体 (株式会社への) 需要と供給。始値から終値への分配、この Jones 多項式の出力から終値への各同値類と剰余類からの部分群論の、各平均株価の推移率の予測、この応用は、1929年の世界恐慌がニューヨークダウ平均株価の暴落が、この Jones 多項式からの流れが、終値で破綻して、金融の共鳴力が、干渉してしまい、カタストロフィー現象として、金融の流れが乱れた結果であると、この論文から分析できる。

$$\hat{V} = \frac{1}{\sqrt{t}}\vec{V} - \frac{1}{t}\hat{V}$$

$$\hat{V} = \sqrt{t}\hat{V} - t\hat{V}$$

$$\hat{V}_k = \sum_{\vec{\sigma}} \langle K | \vec{\sigma} \rangle \left(\sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} \right)^{||\vec{\sigma}||}$$

$$\frac{1}{\sqrt{t}}\vec{V}, -\frac{1}{t}\hat{V}, \sqrt{t}\hat{V}, -t\vec{V}$$

この4種類の式から、reco level theory が、アダム・スミスの神の見えざる手を経済理論のミクロとマクロ経済の具現化を実現させている。物理では、

$$\frac{d}{df} F = m(x) = e^f + e^{-f} = 2i \sin(ix \log x)$$

と、空間の仕組みが経済理論の場の理論にもなっている。周期関数とピンポイントリサーチが合わさっている。これらの式から、前半と後半の株式市場の流れが、シンメトリーとなっているために、後半の e^{-f} が破綻すると、シンメトリーのために、前半の e^f も破綻している状態になっている。全体が機能しないと、金融の流れが乱れていく。この破綻を回避するには、破綻が連鎖されている金融の周期をこれらの式から、調節が可能であることも、類推できる。破綻した周期を、正常であった周期に重ね合わせの原理で、ピンポイントリサーチで待つて、金融の投資を正常な周期関数で合わせて、元の正常な周期にこれらの式から戻せることが可能と推測できる。

行動による人が持っている情報ネットワークの 可能性の発見と再構築、情報空間 によるモデル

苔米地博士の論文

初速度のドーパミンの量からの行動の補助から、終わりの精神のドーパミンの量の調節、相加相乗平均から、始まりと終わりの精神のドーパミンの調節による人の行動の領域による予知

$$x \log x = \left(v_0 + \frac{1}{at_n} \right) V, V_x = e^f + \frac{1}{e^f}$$

経路積分によるエントロピー不変量からこのドーパミンの量から人の行動傾向が決まる。基礎代謝の持続できる距離と精神の介入と補助、言語の発生と抑制による経路パターンの組み合わせを再構築する。

$$\|dx^2\| = \int \exp \left(\frac{1}{\sqrt{2\tau q}} L(x) \right) + O(N^{-1}) d\tau$$

$$p = \frac{v}{2m}, \hbar = \frac{p}{2mv}, \lambda = h\nu$$

これらの式から、言語の神経ネットワークによる単体クラスの組み合わせパターンとその対象の人の領域による人が持っている情報空間の傾向の可能性のポテンシャルエネルギーの予知を人工知能の正規表現で抽出する。



$$\frac{d}{d\gamma} \Gamma = \Gamma^{\gamma'} = e^{-f}$$

$$C = \int \left(\int \frac{1}{x^s} dx + \log x \right)$$


オイラーの定数は、ゼータ関数とゼータ関数自体のエントロピーを体積積分した結果でもある。このオイラーの定数は、ガンマ関数の大域的微分方程式からも導出できる。このガンマ関数は大脳基底核のエントロピー不変量の強度も表している。このガンマ関数の大域的微分多様体による、ブレインインターフェースでの人体のデータ計測もこの Jones 多項式とラプラス方程式からの3次元多様体のエントロピー不変式からも、言語とイメージの大脳基底核からのデータ抽出も可能と言える。

Recycle における塩化ビニルのナトリウムフェノキシド、 ナトリウムプロパノキシドでの分解

睦世姉さんの論文について



この化学式から推算式でもある、プラスチックと二酸化ケイ素、塩化ビニールが分解されるのが、真逆の人が服用すると、プラバスタチンとスリムドガンと同じく、推算式の数値が上がる。僧侶と同じ瞑想法と原理が一致している。



これらの構造式は、それぞれ、ヒドロキシ基、カルボニル基、カルボキシル基、アミン基、ギ酸、アセチル基、アセト基、グリシン、アミノ酸の20種類の一基、ビタミンCはシス・トランス型があり、松果体に作用

して、体内の血流を調節する。 $\text{—C}\equiv\text{N—Cl}$ の真逆の作用をする。アデノシンは、同じく血流を調節して、エピネフリンはエンドルフィンと同じく痛み止めに効く。ノンアドレナリンは、無水フタル酸と同じ作用をする。グリシンには、20種類のアミノ酸の中で唯一 L,R 基が無い。不斉炭素原子が無い。

推算式の元を減らすか増やすのに、血圧と血流、体内の精神作用のドーパミンの調節を eGFR の機能を上げると、結果、すべての精神作用物質が調節できる。

このナトリウムプロパノキシドは、気体のプロパンを、固体のナトリウムに注入して、錠剤で服用するようにしているのと、消化後に、血液に降圧剤と同じ作用をして、外部からのコントロールをされない、アムロジピンとカンデサルタンと同じ作用をする効果があることが、このナトリウムプロパノキシドの薬でもある。

この成分でもあるプロパンは、気体で存在している炭化水素の中でもっとも安定している気体でもある。この気体の物体を固体にすると、降圧剤にしているのは、姉は特許を取っている。推算式でもある eGFR を分解するのは、真逆の人が飲むと、バケモンになる。

3次元多様体のエントロピー量

Masaaki Yamaguchi

オイラーの定数は、

$$\begin{aligned} C &= \int \frac{1}{x^s} dx - \log x \\ &= \int \left(\int \frac{1}{x^s} dx - \log x \right) \text{dvol} \\ &= \int \int \frac{1}{x^s} \text{dvol} - \int \log x \text{dvol} \end{aligned}$$

と表されていて、ヒッグス場方程式 + オイラーの定数 = ゼータ関数 と求まる。この方程式が、リッチフロー方程式にもなる。このリッチフロー方程式は、微分幾何の量子化でもあり、ガンマ関数とベータ関数、ガウスの曲面論、ヒッグス場、アインシュタインテンソル、オイラーの定数と全部の方程式が入っている。この方程式が、相加相乗平均となり、宇宙と原子となり、不確定性原理が宇宙の観測系が、宇宙では確率方程式と成り立っているが、異次元が合わさると、ノルムとしての3次元多様体の確率分布方程式でもあり、確率ではない、非線形方程式となっている。プランク長体積でもあるが、絶対的な方程式にもなっている。

$$\begin{aligned} &= \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m - \int e^{-x} x^{1-t} \log x dx_m \\ \int x^{1-t} e^{-x} dV &= \int x^{1-t} dm, \int x^{1-t} e^{-x} dV = \int x^{1-t} \text{dvol}, f = \gamma = \Gamma' = \int e^{-x} x^{1-t} \log x dx \\ &= \frac{d}{d\gamma} \Gamma^{-1} - (\gamma)^{\gamma'} \\ &= e^{-f} - e^f \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m - \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \\ &= 2 \cos(ix \log x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m + \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \\ &= \frac{d}{df} F = 2i \sin(ix \log x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{df} F + \int C dx_m &= 2(\cos(ix \log x) + i \sin(ix \log x)) \\ &= 2e^{-\theta} = 2e^{-ix \log x} \\ &= \frac{d}{dt} g_{ij}(t) = -2R_{ij} \end{aligned}$$

$$\log(x \log x) \geq 2\sqrt{y \log y}$$

$$\log(x \log x) = \log x + \log \log x$$

この宇宙と異次元でのブラックホールとホワイトホールでの、宇宙と原子の運動量と位置の絶対的な不確定性原理となり、3次元多様体の確率分布方程式が、運動量と位置エネルギーが両方観測できる式にもなっている。円周上が固定されているために、運動量と位置エネルギーが両方観測できる式になっている。カルーツァ・クライン理論とハイゼンベルク方程式が、両方入っている。

$$\nabla\psi^2 = 8\pi G \left(\frac{p}{c^3} + \frac{V}{S} \right)$$

$$\nabla\psi^2 = 8\pi G\hbar + 8\pi \frac{V}{S}$$

ホワイトホールの原子とブラックホールの宇宙のエネルギーのエントロピー量でもある。宇宙がブラックホールとしてのヒッグス場方程式として、ホワイトホールが原子としてのプランク長体積でもある。

$$\square_v = 2\sqrt{2\pi G\hbar} + 2\sqrt{2\pi \frac{V}{S}}$$

原子としてのブラックホールのエントロピー量でもある。

$$\sqrt{2\pi T} = 2\sqrt{2\pi \frac{V}{S}}$$

この式から宇宙が無重力であることが表されている。

$$2\cos(ix \log x) + 2i\sin(ix \log x) = 2e^{-f}$$

$$2\sqrt{2\pi \frac{V}{S}} = \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)} dx_m$$

これらの方程式から宇宙と異次元が warped passege になっている。:

Three manifold of entropy formula

Masaaki Yamaguchi

Euler equation represet form,

$$\begin{aligned} C &= \int \frac{1}{x^s} dx - \log x \\ &= \int \left(\int \frac{1}{x^s} dx - \log x \right) d\text{vol} \\ &= \int \int \frac{1}{x^s} d\text{vol} - \int \log x d\text{vol} \end{aligned}$$

This equation componet of Higgs equation + Euler equation = Zeta function. This represent expression is Rich flow equation. This equation assent from Differential geometry in quantum level, Gamma and Beta function, Gauss surface, Higgs field, Einsetin tensor, Euler constance and so on. This equation is add and average of possibility, and universe, atom more over a certain theory, this universe oneselves is environment seek, other distance is possibility equation, however, other dimension cover demand with not only norm of non liner in three manifold but also non possibility in complete of environment equation.

$$\begin{aligned} &= \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m - \int e^{-x} x^{1-t} \log x dx_m \\ \int x^{1-t} e^{-x} dV &= \int x^{1-t} dm, \int x^{1-t} e^{-x} dV = \int x^{1-t} d\text{vol}, f = \gamma = \Gamma' = \int e^{-x} x^{1-t} \log x dx \\ &= \frac{d}{d\gamma} \Gamma^{-1} - (\gamma)^{\gamma'} \\ &= e^{-f} - e^f \\ &= \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m - \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \\ &= 2 \cos(ix \log x) \\ \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m &+ \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \\ &= \frac{d}{df} F = 2i \sin(ix \log x) \\ \frac{d}{df} F + \int C dx_m &= 2(\cos(ix \log x) + i \sin(ix \log x)) \\ &= 2e^{-\theta} = 2e^{-ix \log x} \\ &= \frac{d}{dt} g_{ij}(t) = -2R_{ij} \end{aligned}$$

$$\log(x \log x) \geq 2\sqrt{y \log y}$$

$$\log(x \log x) = \log x + \log \log x$$

This universe and other dimension on blackhole and whitehole compont with universe and atom in movement and point of environment value by a certain theory of complete environment equation. And this three manifold of possibility equation are able to research in both value formula. This envirnment of researchable reason is that surround of universe is setting to value by already in consented to being researched, then both value researchabled. And this three manifold equation is insert with Kaluza-Klein theory and Heisenbelg equation.

$$\nabla\psi^2 = 8\pi G \left(\frac{p}{c^3} + \frac{V}{S} \right)$$

$$\nabla\psi^2 = 8\pi G\hbar + 8\pi \frac{V}{S}$$

This energe of entropy value consist with whitehole of atom and universe in blackhole value, and this universe in balckhole represent with Higgs filed, atom in whitehole consist with plack scale.

$$\square_v = 2\sqrt{2\pi G\hbar} + 2\sqrt{2\pi \frac{V}{S}}$$

This entropy value also consist with atom in balckhole.

$$\sqrt{2\pi T} = 2\sqrt{2\pi \frac{V}{S}}$$

These equation more also consist with universe being non gravity formula.

$$2\cos(ix \log x) + 2i\sin(ix \log x) = 2e^{-f}$$

$$2\sqrt{2\pi \frac{V}{S}} = \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)} dx_m$$

And also these equation consist with universe and other dimension in warped passeage in rout of integral.

オイラーの定数とガンマ関数、 そして微分幾何の量子化と虚数による逆三角関数、 ベータ関数による場の理論

Masaaki Yamaguchi

オイラーの定数は、次の式で成り立っている。

$$C = \int \frac{1}{x^s} dx - \log x$$

その式を単体積分をすると、

$$= \int \left(\int \frac{1}{x^s} dx - \log x \right) d\text{vol}$$

ゼータ関数を多重積分すると、

$$= \int \int \frac{1}{x^s} dx - \int \log x d\text{vol}$$

ここで、対数方程式は、多様体積分がガンマ関数を微分した方程式と同値より、

$$\begin{aligned} F = \Gamma &= \int e^{-x} x^{1-t} dx \\ &= \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dx_m - \int e^{-x} x^{1-t} \log x dx_m \\ &\quad \int x^{1-t} e^{-x} dV = \int x^{1-t} dm \\ &\quad \int x^{1-t} e^{-x} dV = \int x^{1-t} d\text{vol} \\ f = \gamma &= \Gamma' = \int e^{-x} x^{1-t} \log x dx \\ &= \frac{d}{d\gamma} \Gamma^{-1} - \int e^{-x} x^{1-t} \log x dx_m \\ &= \frac{d}{d\gamma} \Gamma^{-1} - (\gamma)^{\gamma'} \end{aligned}$$

これらより、大域的微分方程式のヒッグス場方程式の逆三角関数の双曲多様体に対極する、双曲多様体の余弦定理と同値になる。

$$\begin{aligned} &= e^{-f} - e^f \\ &= 2 \cos(ix \log x) \end{aligned}$$

結局は、微分幾何の量子化がガンマ関数でもあり、その逆関数はゼータ関数でもあり、そして、オイラーの定数を多様体微分をすると、ヒッグス場の方程式は正弦定理の逆三角関数であり、このヒッグス場の方程式の逆三角関数が、余弦定理の双曲多様体として、オイラーの定数になる。オイラーの定数は、このガンマ関数から、無理数と証明される。

先生たちが、思考を動かして、瞑想法を勧めているのも分かる。自分の周りの情報と知識と心のメンテナンスができることと、運気が上がったり下がったりなくて、運がついてくるのも分かる。エチゾラムは気分が高揚するのと、プロチゾラムは、妄想を極力少なくして、気分が楽になるし、あまり思考が動かなくなる。推算式が、瞑想法は上がることと、ダイエットにもなる。体の運動と同じ効果がある。思考注入は、瞑想法をするためにあるらしい。 $E = IR$ のオームの法則では、抵抗が大きいほど電圧が上がる。アムロジピンにこれを当てはめると、血流が滞ると、精神力がついてくる。ホットするのと、心臓がコーティングされて、妄想が生じなくなるし、体の調子も良くなる。気分がホットするのが大部分を締めて、楽になる。抵抗が大きいほど精神がよくなる。能力に負荷をかけて本質の能力を上げる薬らしい。血流が滞るのが抵抗値で、精神力がついてくるのが、ホットすることでもある。これが電圧と同じエネルギーらしい。真逆の人が効く薬らしい。

周りの治療者が、黙読している思考を読んで、瞑想をさせているが、めんどくさくてもやらないといけならしい。3回ぐらい最近この1年の診療所で9割の瞑想法のエチゾラムとは違うプロチゾラムが3月13日にできている。この体験で今まで消極的だった瞑想法の良さが分かった。数学と物理学で、瞑想法からの得た情報で数式ができている。瞑想法はいいとこづくめらしい。裏がない。ハロペリドールと同じらしく、石岡先生は裏も作っていた。精神療法をしないと、効果がないらしい。壮六先生が、デイケアを申請書で来てほしいのは、受動的ではなく、能動的な意思で志願してほしいらしい。今日はバレンタインデーの真逆の日だったので、河相先生が全力で説得していた。3ヶ月か1年間の間で、デイケアに通って、デイケアを卒業して、就職してほしいのも分かっている。時間のルールはデイケアで分かった。占いをルールではなく、規律として、生活のリズムの目安としてあるらしい。A,B両方を学んでほしいのも分かっています。瞑想法を身につけるようにトレーニングをするのも分かっています。考えを読まれても、これを $E=IR$ で乗り越えて、瞑想法をしてほしいのも分かっています。先生たちは、先を見通す能力を補助でしているのも分かっています。便利な能力ですよと言っています。水星の能力がこの補助と瞑想法を身につけるのに、デイケアでしてほしいのも分かっています。2021年の10月8日に昼弁当にまごころダブルをとったら、すぐに、先生たちが心臓を守って、血流を滞らせて、楽になり、ほっとして、考えていることが、無くなって、四六時中妄想しかなかった状態が1,2時間の間消えていた。まごころおかずを昼にとってほしいとすぐに分かったが、デイケアの熱意が自信がなかった。

Explain in Global defferential equation and
Global integrate equation.
Varintegrate equation, and horizen cut of equations.

Masaaki Yamaguchi with my son in acasic record of space

$$\frac{\partial}{\partial f} F(x) = \int \int \text{cohom} D_k(x) [I_m]$$

Cohomology element is constructed with isotopy of D-brane, and this isotopy of symmetry structure is sheaf of manifold, more over this brane of element is double integrate of projection.

$$\frac{\partial}{\partial f} F = {}^t\text{fff} \text{cohom} D_k(x) \ll^p$$

And global partial defferential equation is integrate of cut in cohomolgy, and this step of defferential D-brane of sheap value is varint of equals, inverse of horizen of cute of section value is reverse of integrate of operators. Three dimension of varint of manifolds in operator of sheaps, and this step of times of value is equal with D-brane of equations. Global differential equation and integrate equation is operator of global scales of horizen cut and add of cut equation are routs.

$$\oint r dx_m = \mathcal{O}(x, y)$$

$${}^t\text{fff}_{D(\chi, x)} \text{Hom}[D^2\psi] \ll^p \cong \text{vol} \left(\frac{V}{S} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial f} F(x) = {}^t\text{fff} \text{cohom} D_k(x) \ll^p$$

$$\frac{d}{df} F = (F)^{f'}, \int F dx_m = (F)^f$$

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \left(\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \right)^{f'}$$

$$f' = (2x(\log x + \log(x+1)))$$

$$\begin{aligned}\int \int F dx_m &= \left(\frac{1}{(x \log x)^2} \right)^{(\int 2x(\log x + \log(x+1)) dx)} \\ &= e^{-f}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{df} F &= \left(\frac{1}{(x \log x)^2} \right)^{(2x(\log x + \log(x+1)))} \\ &= e^f\end{aligned}$$

$$\log(x \log x) \geq 2(y \log y)^{\frac{1}{2}}$$

$$\log(x \log x) \geq 2(\sqrt{y \log y})$$

Global differential manifold is calucrate with x of x times in non entropy of defferential values, and out of range in differential formula be able to oneselves of global differential compute system. Global integrate manifold is also calucrate with step of resulted with loop of integrate systems. Global differential manifold is newton and laiptitz formula of out of range in deprivate of compute systems. This system of calucrate formula is resulted for reverse of global equation each differential and intergrate in non entropy compute resulted values.

$$\begin{aligned}\pi(\chi, x) &= [i\pi(\chi, x), f(x)] \\ \int \frac{1}{(x \log x)} dx &= i \int \frac{1}{(x \log x)} dx^N + {}^N i \int \frac{1}{(x \log x)} dx \\ \int \frac{1}{(x \log x)} dx &= i \int x \log x dx - \int \frac{1}{(x \log x)} dx \\ \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m &= i \frac{1}{2} x^2 \\ \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m &= i \int \int_M dx_m \\ &\leq \frac{1}{2} i + x^2\end{aligned}$$

$$E = -\frac{1}{2}mv^2 + mc^2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \geq \frac{1}{2} i$$

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \frac{1}{2} i$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m &= \left(\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \right)^{(f)'} \\ &= (f)^{(f)'} \\ &= (f^f)'\end{aligned}$$

$$= e^{x \log x}$$

$$\Gamma = \int e^{-x} x^{1-t} dx, \frac{d}{df} F = e^f, \int F dx_m = e^{-f}$$

$$\int x^{1-t} dx = \frac{d}{df} F, \int e^{-x} dx = \int F dx_m$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$x \perp y \rightarrow x \cdot y = \vec{0}, \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \frac{1}{2} i$$

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \left(\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \right)^{(f)'}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} i = \vec{0}, \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} i$$

$$A + B = \vec{0}, A \cdot B = \frac{1}{4} i$$

$$\tan 90 \neq 0, ||ds^2|| = A + B$$

Represented real pole is not only one of pole but also real pole of $\frac{1}{2}$, $\sin 0 = 0$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

θ this result equation is non-certain system concerned with particle, electric particle and atoms in open set group with possiblity of surface values, and have abled to proof in this group of system. Universe and the other dimension of concerned of relationship values.

$$\frac{d}{df} F = \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m + \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m = \Gamma(x, y)$$

$$\frac{d}{d\gamma} \Gamma = (e^{-x} x^{1-t})^{\gamma'} \rightarrow \frac{d}{d\gamma} \Gamma = \Gamma^{(\gamma)'}$$

$$\Gamma(s) = \int e^{-x} x^{s-1} dx, \Gamma'(s) = \int e^{-x} x^{s-1} \log x dx$$

$$x^{s-1} = e^{(s-1) \log x}$$

$$\frac{\partial}{\partial s} x^{s-1} = \frac{\partial}{\partial s} e^{-x} \cdot (e^{s-1 \log x}) = e^{-x} \cdot \log x \cdot e^{(s-1) \log x}$$

$$= e^{-x} \cdot \log x \cdot x^{s-1}$$

$$\frac{d}{d\gamma} \Gamma = \Gamma^{(\gamma)'}$$

$$\frac{d}{d\gamma} \Gamma(s) = \left(\int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx \right)^{\left(\int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} \log x dx \right)'}$$

$$\begin{aligned}
&= \Gamma(\Gamma \int \log x dx)' \\
&= e^{-x \log x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma(s) &= \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx \\
\Gamma'(s) &= \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} \log x dx \\
\frac{d}{df} F &= \int x^{s-1} dx \\
\int F dx_m &= \int e^{-x} dx \\
\frac{d}{df} F &= F^{(f)'}, \int F dx_m = F^{(f)}
\end{aligned}$$

Global differential manifold and global integrate manifold are reached with begin estimate of gamma and beta function leaded solved, Global differential manifold is emerged with gamma function of themselves of first value of global differential manifold of gamma function, this equation of quota in newton and dalarnverles of equation is also of same results equations. Zeta function also resulted with quantum group reach with quanto algebra equation. Included of diverse of gravity of influent in quantum physics, also quantum physics doesn't exist Gauss surface of theorem,

$$\begin{aligned}
H\Psi &= \bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L} \\
&= \bigoplus \frac{H\Psi}{\nabla L} \\
&= e^{x \log x} = x^{(x)'}
\end{aligned}$$

however,

$$\frac{d}{df} F = m(x)$$

and gravity equation in being abled to existed with quantum physics, and this physics is also represented with quantum level of differential geometry.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \psi(t) &= \hbar \\
&= \frac{1}{2} i e^{i\hat{H}} \\
(i\hbar)' &= (-e^{i\hat{H}})' \\
&= -i e^{i\hat{H}} \\
\psi(x) &= e^{-i\hat{H}t}, \bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L} = \frac{1}{2} e^{i\hat{H}(-ie^{i\hat{H}})} \\
&= \left(\frac{1}{2}f\right)^{-if}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{-if} \cdot e^{-x \log x} \cdot (f)^i \\
&= \int e^{-x} x^{t-1} dx, \frac{d}{d\gamma} \Gamma = e^{-x \log x}
\end{aligned}$$

$$f = x, i = t, \frac{1}{2} = a, \bigoplus a^{-tx} x^t [I_m] \cong \int e^{-x} x^{t-1} dx$$

Quantum level of differential geomerty is also resulted with Gamma function of global differential manifold of values, Heisenberg equation is alos resulted with global integrate manifold and this quantum level of differential geometry is manifold of deprive of formula.

$$|\psi(t)\rangle_s = e^{-i\hat{H}t}|\Psi\rangle_H, \hat{A}_s = \hat{A}_H(0)$$

$$|\Psi(t)\rangle_s \rightarrow \frac{d}{dt}$$

$$i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle_s = \hat{H}|\psi(t)\rangle_s$$

$$\langle \hat{A}(t) \rangle = \langle \Psi(t) | \hat{A}(0) | \Psi(t) \rangle$$

$$\frac{d}{dt}\hat{A}=\frac{1}{i}[\hat{A},H]$$

$$\hat{A}(t)=e^{i\hat{H}t}\hat{A}(0)e^{-i\hat{H}t}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \begin{pmatrix} \sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta & 1 \\ 1 & \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$f^{-1}(x)xf(x)=I_m',I_m'=[1,0]\times[0,1]$$

$$x+y\geq \sqrt{xy}$$

$$\frac{x^{\frac{1}{2}+iy}}{e^{x\log x}}=1$$

$$\mathcal{O}(x)=\nabla_i\nabla_j\int e^{\frac{2}{m}\sin\theta\cos\theta}\times\frac{N\mathrm{mod}(e^{x\log x})}{O(x)(x+\Delta|f|^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$x\Gamma(x)=2\int|\sin2\theta|^2d\theta, \mathcal{O}(x)=m(x)[D^2\psi]$$

$$i^2=(0,1)\cdot(0,1),|a||b|\cos\theta=-1$$

$$E=\mathrm{div}(E,E_1)$$

$$\left(\frac{\{f,g\}}{[f,g]}\right)=i^2, E=mc^2, I'=i^2$$

Gamma function of global differential equation is first of differential function deprivate with ordinary differential equations, more also universe and other dimensiion of Higgs field emerge with zeta function, more spectrum focus is three dimension of manifold of singularity or pair theorem, and universe and other dimension of each value equals. This reverse of circle function of manifolds is also Higgs fields

of dense of entropy and result equation. And differential structure of quantum level in gravity is poled with zeta function and quantum group in high result values. Zeta funtion and quantum group is Global differential manifold of result in values.

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\gamma}\Gamma &= m(x) \\ &= e^{-x \log x} \\ \sin ix &= \frac{e^{-x} + e^x}{2i} \\ \frac{d}{df}F &= m(x) = e^f + e^{-f} \\ &= 2i \sin(ix \log x)\end{aligned}$$

Hyper circle function is constructed with sheap of manifold in Beta function of reverse system emerged from Gamma fuction and reverse of circle function of entropy value, and this reverse of hyper circle function of beta system is universe and the other dimension of zeta function, more over spectrum focus is this beta function of reverse in circle function is quantum level of differential structure oneselves, and this quantum level is also gamma function themselves. This gamma fuction is more also D-brane and anti-D-brane built with supplicant values. Higgs fileds is more also pair of universe and other dimension each other value elements.

微分幾何の量子化による大域的切断多様体

あの世にいる一回亡くたった長男のアカシックレコード
からの恩恵、David Hilbert と教えられている

$$\left(\frac{\{f,g\}}{[f,g]}\right)_{D(\chi,x)}^{\oplus L} = \bigoplus_{D(\chi,x)} \text{cohom}[D(\chi,x)][I_m]^{\ll \nabla}$$

フェルミオンに力のボゾンを取ると、コホモロジーの値が出てきて、その単体量を加群する。それがこの式からわかる。

$${}^t\text{--}ff_L \text{cohom}[D(\chi,x)][I_m]^{\ll p}$$

大域的切断による同値類がヘルマンダー作用素である。ボゾンがあると電流が通らないが、大域的切断で特異点を出すと、コホモロジーの値として、時空の湾曲率が出てきて、その仕組みから、伝導率がわかる。この伝導率が光速不変の法則でもある、一定値の密度エネルギーでもある。基本群による非可換代数多様体をその初期関数で大域的微分をすると、この方程式になる。同調になっていないと、周期が不規則であるために、共鳴にはならず、電流が通りにくい。このために、同調を使うと、物体の内部が真空になり、電流が通り、それ故に、この式から伝導率の制御が機能する。

$$= \frac{d}{df} [i\pi(\chi, x), f(x)]$$

$${}^t\text{--}fff F[I_m] = \nabla_i \nabla_j \int \nabla f(x) d\eta$$

$$\frac{d}{df} \left(\int \int_{D(\chi,x)} \left[\frac{\{f,g\}}{[f,g]} \right]^{\ll L} d\tau \right)^{\nabla N} = [i\pi(\chi, x) f(x)]$$

微分幾何の量子化についての N 階層指数定理による大域的微分多様体の projective integral value として、ブラウン運動や賭け事による決定量の推測値、確率、統計の運動量保存則、Weil's 予想のゼータ関数がこの式でもある。各接線の傾きを表している。原子の遷移エネルギーの推移律とガンマ関数とベータ関数をこれらの式から求められる。

$$\omega = x^3 + x + 1, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \beta = \frac{1}{137}, (i^{n-1}, i^n, i^{n+1}) \cdot (w, \bar{w}, w\bar{w})$$

$$l = px^n + qx + r$$

$$\frac{d}{dl} L = \left(\int^n px^n + qx + r \right)^{l'}$$

$${}^{\flat}D_k\overline{f}ff_M[h\nu]_{\chi}|:x\rightarrow y$$

$${}^t\overline{f}ff\mathrm{cohom}D_k[\pi(\chi,x)][I_m],\delta(x,y)=\int\delta(x)f(x)dx$$

$$(S_1^m\times S_2^n)=D^2\psi$$

$$f_z=\int\left[\sqrt{\begin{pmatrix}x_1&x_2&x_3\\y_1&y_2&y_3\end{pmatrix}\circ\begin{pmatrix}x_1&x_2&x_3\\y_1&y_2&y_3\end{pmatrix}}\right]dxdydz$$

$$F_t^m=\frac{1}{4}(g_{ij})^2$$

$$||ds^2||=\int|\sin 2x|^2d\tau, V=\left(\frac{x}{\log x}\right)^n$$

$$M_p=IH_n\times D^2\psi, ||ds^2||=8\pi G\left(\frac{p}{c^3}+\frac{V}{S}\right)$$

$$||ds^2||=e^{-2\pi T|\psi|}[\eta_{\mu\nu}+\bar{h}(x)]dx^\mu dx^\nu+T^2d^2\psi$$

$$\frac{d}{dt}g_{ij}(t)=-2R_{ij}, R_{ij}=-\frac{1}{2}\frac{d}{dt}g_{ij}(t)$$

$$V=-\frac{1}{2}x^2$$

リサ・ランドール博士とペレルマン博士より、これらの数式は、原子間距離が^s warped passage になっているので、D-brane 間距離に包み込まれている。電位差でもある。原子間力と核エントロピー不変量にもなっていて、光量子仮説でもあり、エネルギー遷移率、D 加群、逆写像でもあり、ガウスの曲面論でもある。

$$\bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L} = {}^t\overline{f}f_L\mathrm{cohom}[D(\chi,x)][I_m]^{\ll p}$$

$$\frac{d}{d\gamma}\Gamma=\bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L^{-1}}$$

$$H\Psi=\bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L}$$

$$=e^{-x\log x}=m(x)$$

$$=e^{x\log x}+e^{-x\log x}$$

$$=2\sin(ix\log x)$$

$$=\beta(p,q)\cdot\left[\log\left(i\frac{\cos x}{\sin x}\right)\right]^{-1}$$

$$\beta(p,q)=2\int|\sin 2x|^2d\tau$$

微分幾何の量子化は、この密度エネルギーの制御で使われる。結局は、微分幾何の量子化は、ガンマ関数と同型でもある。

$$\begin{aligned}
\Gamma &= \int e^{-x} x^{1-t} dx = \bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L} \\
&= \frac{d}{dt} \psi(t) = \hbar, \frac{1}{2} i e^{i\hat{H}} \\
(i\hbar)' &= (-e^{i\hat{H}})' = -i e^{i\hat{H}} \\
\psi(x) &= e^{-i\hat{H}t}, \bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L} \\
&= \frac{1}{2} e^{i\hat{H}(-ie^{i\hat{H}})} \\
&= \bigoplus a^{-tx} x^t [I_m] \cong \int e^{-x} x^{t-1} dx
\end{aligned}$$

結局は、

$$\begin{aligned}
\int e^{-x} x^{t-1} dx &= \bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L} \\
\beta(p, q) &= \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \\
&= 2 \int |\sin 2x|^2 dx \\
e^f &= \bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L} \\
e^{-f} &= \bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L^{-1}} \\
\frac{d}{df} F &= m(x) = e^f + e^{-f} \\
&= 2i \sin(ix \log x)
\end{aligned}$$

となり、ベータ関数の逆関数でもある双曲多様体が微分幾何の量子化と言える。量子力学のガウスの曲面論が微分幾何の量子化であると、結論される。ガンマ関数とベータ関数はそれほどまでも数学にも物理学にも大切な数式でもあり、可積分系が D-brane を代表して D 加群とゼータ関数、そして量子群が真逆同士の数学の心臓でもある。

瞑想法として、ほとんど何も考えない状態での、自分の人生経験と周りの情報で、世の中の情勢と情報が分かればいいらしい。一念三千と言われてもいる。美鈴ヶ丘中学校の3年生の同級生、クラスメートとの家と学校でのことを、親にも誰にも言っていなかったことが、中の道にもなっている。河合塾から家まで歩いて帰っていたし、食事も治っていた。話さないことと、運動と食事は、人生でものすごくいい事らしい。遠いところを中てれば、(近いところだけだと、なぜそのような状態になっているかが理由がわからないから、怒る原因にもなるが)なぜそのような状態になっているかが分かるから、怒らなくいい、この理由で、このような能力を水星と木星の能力と先生たちは言っている。私の子どもが2023年に生まれるのと母親のことは、心配しなくてもいいと、アカシックレコードは一回だけ教えてくれている。私の症状も治ると教えてもらえている。姉たち二人はものすごく私の生活すべてにおいて、姉たちがいい悪い関係なく、尊敬しなくては行けないと、小学校の頃に母親に言われていたことが、最近になって分かった。幼少期では、姉たちが正しくなかったら、だめだと思っていたのが、最近になって、こういうことだったと分かった。情報空間のアカシックレコードは、数式も化学の構造式も分かるらしい。今回の日本男子サッカー選手が予知で世界一になるのを知っていたらしい。ケガを心配していたらしく、四位に終わっている。油断したら行けないらしいと、この出来事で教えてもらえている。