

Explain in Global defferential equation and
Global integrate equation.
Varintegrate equation, and horizen cut of equations.

Masaaki Yamaguchi

$$\frac{\partial}{\partial f} F(x) = \int \int \text{cohom} D_k(x)[I_m]$$

Cohomology element is constructed with isotopy of D-brane, and this isotopy of symmetry structure is sheaf of manifold, more over this brane of element is double integrate of projection.

$$\frac{\partial}{\partial f} F = {}^t\text{fff} \text{cohom} D_k(x)^{\ll p}$$

And global partial defferential equation is integrate of cut in cohomolgy, and this step of defferential D-brane of sheap value is varint of equals, inverse of horizen of cute of section value is reverse of integrate of operators. Three dimension of varint of manifolds in operator of sheaps, and this step of times of value is equal with D-brane of equations. Global differential equation and integrate equation is operator of global scales of horizen cut and add of cut equation are routs.

$$\oint r dx_m = \mathcal{O}(x, y)$$

$${}^t\text{fff}_{D(\chi, x)} \text{Hom}[D^2\psi]^{\ll p} \cong \text{vol} \left(\frac{V}{S} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial f} F(x) = {}^t\text{fff} \text{cohom} D_k(x)^{\ll p}$$

$$\frac{d}{df} F = (F)^{f'}, \int F dx_m = (F)^f$$

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \left(\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \right)^{f'}$$

$$f' = (2x(\log x + \log(x+1)))$$

$$\begin{aligned}\int \int F dx_m &= \left(\frac{1}{(x \log x)^2} \right)^{(\int 2x(\log x + \log(x+1)) dx)} \\ &= e^{-f}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{df} F &= \left(\frac{1}{(x \log x)^2} \right)^{(2x(\log x + \log(x+1)))} \\ &= e^f\end{aligned}$$

$$\log(x \log x) \geq 2(\sqrt{y \log y})^{\frac{1}{2}}$$

大域的積分多様体の多重積分は、多様体の階層によって、積分回数が決まっている。大域的微分多様体は、ニュートン形式とライプニッツ形式の外微分によって計算される。

$$\begin{aligned}\pi(\chi, x) &= [i\pi(\chi, x), f(x)] \\ \int \frac{1}{(x \log x)} dx &= i \int \frac{1}{(x \log x)} dx^N + {}^N i \int \frac{1}{(x \log x)} dx \\ \int \frac{1}{(x \log x)} dx &= i \int x \log x dx - \int \frac{1}{(x \log x)} dx \\ \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m &= i \frac{1}{2} x^2 \\ \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m &= i \int \int_M dx_m \\ &\leq \frac{1}{2} i + x^2\end{aligned}$$

$$E=-\frac{1}{2}mv^2+mc^2$$

$$\lim_{x\rightarrow\infty}\int\int\frac{1}{(x\log x)^2}dx_m\geq\frac{1}{2}i$$

$$\frac{d}{df}\int\int\frac{1}{(x\log x)^2}dx_m=\frac{1}{2}i$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{df}\int\int\frac{1}{(x\log x)^2}dx_m &= \left(\int\int\frac{1}{(x\log x)^2}dx_m\right)^{(f)'} \\ &= (f)^{(f)'} \\ &= (f^f)' \\ &= e^{x\log x}\end{aligned}$$

$$\Gamma=\int e^{-x}x^{1-t}dx, \frac{d}{df}F=e^f, \int Fdx_m=e^{-f}$$

$$\int x^{1-t}dx=\frac{d}{df}F, \int e^{-x}dx=\int Fdx_m$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$x \perp y \rightarrow x \cdot y = \vec{0}, \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \frac{1}{2} i$$

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \left(\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \right)^{(f)'}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} i = \vec{0}, \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} i$$

$$A+B=\vec{0}, A\cdot B=\frac{1}{4}i$$

$$\tan 90 \neq 0, ||ds^2|| = A+B$$

自明な零点は実軸 $\frac{1}{2}$ に 1 を除いてある。 $\sin 0 = 0$ と

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

θ によって、不確定性原理の関係でもあり、粒子、電子、原子が確率分布になっているのも開集合で証明できる。宇宙と異次元の関係にもなっている。

$$\frac{d}{df} F = \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m + \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m = \Gamma(x,y)$$

$$\frac{d}{d\gamma}\Gamma=(e^{-x}x^{1-t})^{\gamma'}\rightarrow \frac{d}{d\gamma}\Gamma=\Gamma^{(\gamma')}$$

Explain in Global defferential equation and
Global integrate equation.
Varintegrate equation, and horizen cut of equations.

Masaaki Yamaguchi

$$\frac{\partial}{\partial f} F(x) = \int \int \text{cohom} D_k(x) [I_m]$$

Cohomology element is constructed with isotopy of D-brane, and this isotopy of symmetry structure is sheaf of manifold, more over this brane of element is double integrate of projection.

$$\frac{\partial}{\partial f} F = {}^t\text{fff} \text{cohom} D_k(x) \ll^p$$

And global partial defferential equation is integrate of cut in cohomolgy, and this step of defferential D-brane of sheap value is varint of equals, inverse of horizen of cute of section value is reverse of integrate of operators. Three dimension of varint of manifolds in operator of sheaps, and this step of times of value is equal with D-brane of equations. Global differential equation and integrate equation is operator of global scales of horizen cut and add of cut equation are routs.

$$\oint r dx_m = \mathcal{O}(x, y)$$

$${}^t\text{fff}_{D(\chi, x)} \text{Hom}[D^2 \psi] \ll^p \cong \text{vol} \left(\frac{V}{S} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial f} F(x) = {}^t\text{fff} \text{cohom} D_k(x) \ll^p$$

$$\frac{d}{df} F = (F)^{f'}, \int F dx_m = (F)^f$$

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \left(\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \right)^{f'}$$

$$f' = (2x(\log x + \log(x+1)))$$

$$\int \int F dx_m = \left(\frac{1}{(x \log x)^2} \right)^{(\int 2x(\log x + \log(x+1)) dx)}$$

$$= e^{-f}$$

$$\frac{d}{df} F = \left(\frac{1}{(x \log x)^2} \right)^{(2x(\log x + \log(x+1)))}$$

$$= e^f$$

$$\log(x \log x) \geq 2(\sqrt{y \log y})^{\frac{1}{2}}$$

大域的積分方程式自体に多重積分の回数が決まっている。大域的微分方程式に、X の X 乗のエントロピー不変量の微分量が計算に関わっている。外微分をこのエントロピー式に入れる。

Explain in Global defferential equation and
Global integrate equation.
Varintegrate equation, and horizen cut of equations.

Masaaki Yamaguchi

$$\frac{\partial}{\partial f} F(x) = \int \int \text{cohom} D_k(x) [I_m]$$

Cohomology element is constructed with isotopy of D-brane, and this isotopy of symmetry structure is sheaf of manifold, more over this brane of element is double integrate of projection.

$$\frac{\partial}{\partial f} F = {}^t\text{fff} \text{cohom} D_k(x) \ll^p$$

And global partial defferential equation is integrate of cut in cohomolgy, and this step of defferential D-brane of sheap value is varint of equals, inverse of horizen of cute of section value is reverse of integrate of operators. Three dimension of varint of manifolds in operator of sheaps, and this step of times of value is equal with D-brane of equations. Global differential equation and integrate equation is operator of global scales of horizen cut and add of cut equation are routs.

$$\oint r dx_m = \mathcal{O}(x, y)$$

$${}^t\text{fff}_{D(\chi, x)} \text{Hom}[D^2 \psi] \ll^p \cong \text{vol} \left(\frac{V}{S} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial f} F(x) = {}^t\text{fff} \text{cohom} D_k(x) \ll^p$$

$$\frac{d}{df} F = (F)^{f'}, \int F dx_m = (F)^f$$

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \left(\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \right)^{f'}$$

$$f' = (2x(\log x + \log(x+1)))$$

$$\int \int F dx_m = \left(\frac{1}{(x \log x)^2} \right)^{(\int 2x(\log x + \log(x+1)) dx)}$$

$$= e^{-f}$$

$$\frac{d}{df} F = \left(\frac{1}{(x \log x)^2} \right)^{(2x(\log x + \log(x+1)))}$$

$$= e^f$$

$$\log(x \log x) \geq 2(y \log y)^{\frac{1}{2}}$$

$$\log(x \log x) \geq 2(\sqrt{y \log y})$$

Global differential manifold is calucrate with x of x times in non entropy of defferential values, and out of range in differential formula be able to oneselves of global differential compute system. Global integrate manifold is also calucrate with step of resulted with loop of integrate systems. Global differential manifold is newton and laiptitz formula of out of range in deprivate of compute systems. This system of calucrate formula is resulted for reverse of global equation each differential and intergrate in non entropy compute resulted values. 大域的微分方程式に、X の X 乗のエントロピー不変量の微分量が計算に関わっている。外微分をこのエントロピー式に入れる。大域的積分多様体の多重積分は、多様体の階層によって、積分回数が決まっている。大域的微分多様体は、ニュートン形式とライプニッツ形式の外微分によって計算される。大域的積分多様体と大域的微分多様体は、逆操作とエントロピー不変量で計算できる。

$$\pi(\chi, x) = [i\pi(\chi, x), f(x)]$$

$$\int \frac{1}{(x \log x)} dx = i \int \frac{1}{(x \log x)} dx^N + {}^N i \int \frac{1}{(x \log x)} dx$$

$$\int \frac{1}{(x \log x)} dx = i \int x \log x dx - \int \frac{1}{(x \log x)} dx$$

$$\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = i \frac{1}{2} x^2$$

$$\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = i \int \int_M dx_m$$

$$\leq \frac{1}{2} i + x^2$$

$$E = -\frac{1}{2}mv^2 + mc^2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \geq \frac{1}{2} i$$

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \frac{1}{2} i$$

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \left(\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \right)^{(f)'}$$

$$\begin{aligned}
& (f)^{(f)'} \\
& = (f^f)' \\
& = e^{x \log x}
\end{aligned}$$

$$\Gamma = \int e^{-x} x^{1-t} dx, \frac{d}{df} F = e^f, \int F dx_m = e^{-f}$$

$$\int x^{1-t} dx = \frac{d}{df} F, \int e^{-x} dx = \int F dx_m$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$x \perp y \rightarrow x \cdot y = \vec{0}, \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \frac{1}{2} i$$

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = \left(\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \right)^{(f)'}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} i = \vec{0}, \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} i$$

$$A + B = \vec{0}, A \cdot B = \frac{1}{4} i$$

$$\tan 90 \neq 0, ||ds^2|| = A + B$$

Represented real pole is not only one of pole but also real pole of $\frac{1}{2}$, 自明な零点は実軸 $\frac{1}{2}$ に 1 を除いてある。 $\sin 0 = 0$ と

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

θ によって、不確定性原理の関係でもあり、粒子、電子、原子が確率分布になっているのも開集合で証明できる。宇宙と異次元の関係にもなっている。this result equation is non-certain system concerned with particle, electric particle and atoms in open set group with possiblity of surface values, and have abled to proof in this group of system. Universe and the other dimension of concerned of relationship values.

$$\frac{d}{df} F = \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m + \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m = \Gamma(x, y)$$

$$\frac{d}{d\gamma} \Gamma = (e^{-x} x^{1-t})^{\gamma'} \rightarrow \frac{d}{d\gamma} \Gamma = \Gamma^{(\gamma)'}$$

$$\Gamma(s) = \int e^{-x} x^{s-1} dx, \Gamma'(s) = \int e^{-x} x^{s-1} \log x dx$$

$$x^{s-1} = e^{(s-1) \log x}$$

$$\frac{\partial}{\partial s} x^{s-1} = \frac{\partial}{\partial s} e^{-x} \cdot (e^{s-1 \log x}) = e^{-x} \cdot \log x \cdot e^{(s-1) \log x}$$

$$= e^{-x} \cdot \log x \cdot x^{s-1}$$

$$\frac{d}{d\gamma} \Gamma = \Gamma^{(\gamma)'}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\gamma}\Gamma(s) &= \left(\int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx \right)^{\left(\int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} \log x dx \right)'} \\
&= \Gamma(\Gamma \int \log x dx)' \\
&= e^{-x \log x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma(s) &= \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx \\
\Gamma'(s) &= \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} \log x dx \\
\frac{d}{df} F &= \int x^{s-1} dx \\
\int F dx_m &= \int e^{-x} dx \\
\frac{d}{df} F &= F^{(f)'}, \int F dx_m = F^{(f)}
\end{aligned}$$

Global differential manifold and global integrate manifold are reached with begin estimate of gamma and beta function leaded solved, Global differential manifold is emerged with gamma function of themselves of first value of global differential manifold of gamma function, this equation of quota in newton and dalarnverles of equation is also of same results equations. Zeta function also resulted with quantum group reach with quanto algebra equation. 大域的微分多様体と大域的積分多様体を、ガンマ関数とベータ関数の導出にも使われている。ガンマ関数の大域的微分多様体が、ニュートン方程式とダランベール方程式を商代数で求めると、同型の解に求まる。ゼータ関数と、この式の対極する量子群を商代数で求めても、同じ解が求まる。

Included of diverse of gravity of influent in quantum physics, also quantum physics doesn't exist Gauss surface of theorem,

繰り込み理論を入れると発散を防げると言われているが、量子力学にはガウスの曲面論がないと言われている。

$$\begin{aligned}
H\Psi &= \bigoplus (i\hbar^\nabla)^{\oplus L} \\
&= \bigoplus \frac{H\Psi}{\nabla L} \\
&= e^{x \log x} = x^{(x)'}
\end{aligned}$$

however, とすると、

$$\frac{d}{df} F = m(x)$$

and gravity equation in being abled to existed with quantum physics, and this physics is also represented with quantum level of differential geometry. 同じで量子力学で重力場方程式が表せられる。

$$\frac{d}{dt} \psi(t) = \hbar$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} i e^{i \hat{H}} \\
(i \hbar)' &= (-e^{i \hat{H}})' \\
&= -i e^{i \hat{H}} \\
\psi(x) &= e^{-i \hat{H} t}, \bigoplus (i \hbar^\nabla)^{\oplus L} = \frac{1}{2} e^{i \hat{H} (-i e^{i \hat{H}})} \\
&= \left(\frac{1}{2} f\right)^{-i f} \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{-i f} \cdot e^{-x \log x} \cdot (f)^i \\
&= \int e^{-x} x^{t-1} dx, \frac{d}{d\gamma} \Gamma = e^{-x \log x}
\end{aligned}$$

$$f=x, i=t, \frac{1}{2}=a, \bigoplus a^{-tx} x^t [I_m] \cong \int e^{-x} x^{t-1} dx$$

微分幾何の量子化は、ガンマ関数についての大域的微分方程式の解にもなっている。ハイゼンベルク方程式の大域的積分多様体の解にも、この微分幾何の量子化は、多様体の微分系の形になっている。 Quantum level of differential geomerty is also resulted with Gamma function of global differential manifold of values, Heisenberg equation is alsos resulted with global integrate manifold and this quantum level of differential geometry is manifold of deprive of formula.

$$|\psi(t)\rangle_s=e^{-i\hat{H}t}|\Psi\rangle_H,\hat{A}_s=\hat{A}_H(0)$$

$$|\Psi(t)\rangle_s\rightarrow\frac{d}{dt}$$

$$i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle_s=\hat{H}|\psi(t)\rangle_s$$

$$\langle \hat{A}(t) \rangle = \langle \Psi(t) | \hat{A}(0) | \Psi(t) \rangle$$

$$\frac{d}{dt}\hat{A}=\frac{1}{i}[\hat{A},H]$$

$$\hat{A}(t)=e^{i\hat{H}t}\hat{A}(0)e^{-i\hat{H}t}$$

$$\lim_{\theta\rightarrow 0}\begin{pmatrix}\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\theta&1\\ 1&\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\ 0&-1\end{pmatrix}$$

$$f^{-1}(x)xf(x)=I_m',I_m'=[1,0]\times[0,1]$$

$$x+y\geq \sqrt{xy}$$

$$\frac{x^{\frac{1}{2}+iy}}{e^{x\log x}}=1$$

$$\mathcal{O}(x)=\nabla_i\nabla_j\int e^{\frac{2}{m}\sin\theta\cos\theta}\times\frac{N\mathrm{mod}(e^{x\log x})}{O(x)(x+\Delta|f|^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$x\Gamma(x) = 2 \int |\sin 2\theta|^2 d\theta, \mathcal{O}(x) = m(x)[D^2\psi]$$

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1), |a||b| \cos \theta = -1$$

$$E = \operatorname{div}(E, E_1)$$

$$\left(\frac{\{f,g\}}{[f,g]}\right)=i^2, E=mc^2, I'=i^2$$

ガンマ関数の大域的微分方程式は、ガンマ関数の初期関数についての微分方程式でもあり、宇宙と異次元についてのビッグス場からのゼータ関数の生成も、3次元多様体の特異点定理になっている。宇宙と異次元の片方でも同じ解にもなっている。逆三角関数の双曲多様体もヒッグス場の密度エネルギーの値と同じ解にもなっている。微分幾何の量子化も、ゼータ関数の対極する量子群と同じ解にもなっている。ゼータ関数は、量子群の方程式についての対極に位置する大域的微分多様体の解にもなっている。 Gamma function of global differential equation is first of differential function deprivate with ordinary differential equations, more also universe and other dimensiion of Higgs field emerge with zeta function, more spectrum focus is three dimension of manifold of singularity or pair theorem, and universe and other dimension of each value equals. This reverse of circle function of manifolds is also Higgs fields of dense of entropy and result equation. And differential structure of quantum level in gravity is poled with zeta function and quantum group in high result values. Zeta funtion and quantum group is Global differential manifold of result in values.

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\gamma}\Gamma &= m(x) \\ &= e^{-x \log x} \\ \sin ix &= \frac{e^{-x} + e^x}{2i} \\ \frac{d}{df}F &= m(x) = e^f + e^{-f} \\ &= 2i \sin(ix \log x)\end{aligned}$$

Hyper circle function is constructed with sheap of manifold in Beta function of reverse system emerged from Gamma fuction and reverse of circle function of entropy value, and this reverse of hyper circle function of beta system is universe and the other dimension of zeta function, more over spectrum focus is this beta function of reverse in circle function is quantum level of differential structure oneselves, and this quantum level is also gamma function themselves. This gamma fuction is more also D-brane and anti-D-brane built with supplicant values. Higgs fileds is more also pair of universe and other dimension each other value elements. 逆三角関数の双曲多様体は、ガンマ関数の方程式からの導出でのベータ関数の逆三角関数のエントロピー値にもなっている。

Differential dimension in quantum level of space emerged with extern of Glois group

情報空間に接したら、ある子が微分幾何の量子化を教えてくれた。そのあとに、その子はクレアチニンを大量に分泌して、そのときの情報をかき消していた。私が、その中核になる数式の周りの式を力尽くでそのあとにそのときの情報を書いたら、その子はしょぼんとしていた。すごくかわいい子だった。微分幾何の量子化は、プランク定数の量子化で、最小単位の無次元値だから、D-brane に合っている。D-brane は絶対座標とは違って、測れないから、自身の質量と自身の長さで稠密空間として、最小単位の無次元値として、プランク定数の内部最小値を求めるのが、誰も今まで、プランク定数より最小単位の無次元の測定単位は考えたことはない。私のゼータ関数の大域的微分方程式を証明するのに使われるのは、その数式を見たら一目瞭然だった。子どもが私の理論を証明するらしい。ユウはあの世では3日か3ヶ月の間いたらしい。天国と対極する場所にいたらしい。思ったことが現実になる場所らしい。この世では3年間になる場所らしい。あの子は、この世に来る待合室らしい場所にいるらしい。その場所には情報空間にアクセスできて、この世に生まれるのを待つ場所らしい。

微分幾何の量子化におけるこの特異点における質量は、フェルミオンとボソンを宇宙と異次元がダークマターからボソンに力を注ぐと生成される。このシステムはフェルミオンの宇宙の構造から導き出される。微分幾何の量子化、ヒルベルト空間の量子化、プランク定数の量子化

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_{mn} &= \mathcal{E}_n \times \mathcal{H}_n \\ \bigoplus \frac{M_p}{\nabla L} &= \frac{\partial}{\partial L} V(\tau) \\ \Psi H &= M_p \\ \frac{d}{df} F &= \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m + \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m \\ \frac{d}{dl} V(\tau) &= -\frac{2R_{ij}}{\delta T}\end{aligned}$$

重力質量と慣性質量は次元のガロワ拡大における宇宙と異次元空間のベクトル次元と同等。このベクトル空間における12種類の素粒子が複素多様体に特異点を形成して、この特異点の素粒子がザイフェルト多様体にメビウス空間として異次元と宇宙を包み込んでいる。ローレンツアトラクターにおける超対称性理論に内部に特異点を形成している。この方程式はガンマ関数とベータ関数を表現論として表している。D-brane の外体積空間は超空間として、D-brane を多数内包している。この次元多様体はフェルミオンとボソンをメビウス空間に固定している。さらにこの空間は D-brane と anti-D-brane を固定端として存在している。

$$E^2 = m^2 c^4, R_{\mu\nu} + g_{\mu\nu} \Lambda = 4\pi G \rho$$

これらの数式は超ラングランズ予想を証明できる。

あの世では7階層の世界があるらしい。天国と地獄、修練と学び、忍耐の世界、休息の世界、終息界、先攻界、自然界、この7階層は、神様と仙人のところで、どのような人生を歩むかを決めてくるらしい。情報空間は7階層のどれかでも存在している。

$$\bigoplus \frac{M_p}{\nabla L} = \frac{d}{dL} V(\tau), \Psi H = M_p, \square V(\tau) = \frac{\partial}{\partial L} \int \int \int (f(x, y, z) dx dy dz)' dL$$

プランク定数の量子化は非可換確率方程式を表している。異次元空間と宇宙の閉3次元多様体から不確定性原理が絶対時空でベクトル次元として、求まるが、D-braneは無次元だが、assemble-D-braneから相対的に時空のノルムが求まる。大域的微分方程式から、微細構造定数と逆関数として、ホログラム空間がこれらの方程式から導かれる。微分幾何の量子化は、プランク定数の量子化と同値であり、逆関数として、ヴェイユ予想となり、大域的トポロジーが、初期関数を微分変数として、プランク定数の量子化と同じ原理で、宇宙の膨張と時間のメカニズムそして、原子と素粒子、ダークマター、ヒッグス場、全部の数値が、大域的微分方程式と微分幾何の量子化から導かれる。これらの方程式は、AdS5多様体の方程式を一般相対性理論の反重力と重力を、minkowsky時空の2次元射影時空と3次元多様体として、ホログラム空間がこれらの方程式として表されている。

$$||ds^2|| = e^{-2\pi T|\phi|} [\eta + \bar{h}_{\mu\nu}] dx^\mu dx^\nu + T^2 d^2\phi$$

物理学の世界でも、7階層の時空がある。この7階層はメビウス空間の内部で存在している。3次元と4次元に7階層の空間の中で一番稠密空間として、微分幾何が一番種類が多い。5次元多様体は、7次元多様体のメビウス空間の内部に存在している。6次元多様体は特異点として、3次元多様体は、6次元多様体を次元を降下すると求まる。次元を降下すると、多様体が収縮する。5次元多様体は、トポロジーとして3次元多様体のアーベル多様体として存在している。

$$\beta^3 = \theta^5, [\beta^3] = [\theta^5]$$

拝啓

忙しいと存じていますが、失礼します。1999年に微分積分の本について、ソースコードミスを手紙で失礼しましたことを恥ずかしく思います。最近になって読み返していると Γ 関数と β 関数で可積分系に触れて、 ζ 関数が、アーベル多様体を母関数として、そして、この領域を有限と無限を極限值にして、オイラー数に行きつくことを本書で締めくくっていることに、この本は今までの微分積分の本と違うとわかりました。この本がきっかけで非相対論的量子力学による経路積分で表現していた方程式が ζ 関数を使い、ペレルマンさんが論文でこの関数に触れていたことに出会いました。ペレルマンさんは、閉3次元多様体を解析するのに、熱力学のエントロピーを使っていたが、 ζ 関数を使えば、私の目論んでいることに使えます。この宇宙は8種類の微分幾何構造が共鳴して1種類の閉3次元多様体になっていることをペレルマンさんが論文で表現していました。このエントロピー不変量が ζ 関数と同等ということを使えば、エタール・コホモロジーやスタンダード予想、ほとんどすべての数式がこの式から導けると私は考えています。この私の目指している群論は、ある時空間をこの圏が形を成して、その領域をいろんな関数が物理学の方程式として3次元構造として、いろいろな現象を示しているといえます。増田幹也さん、加藤十吉さん、堀田良之さん、佐藤文隆さん、雪江昭彦さん、小寺平治さん、竹内薫さん、今まで読んできた著者の人たちが、私に恩恵をくれました。10年以上をこの本が私に恩恵をくれました。ありがとうございます。

敬具

$$\begin{aligned}\Gamma(x) &= \int e^{-x} x^{1-t} dx, \beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx \\ &= - \int_1^0 (1-t)^{p-1} t^{q-1} dt \\ 0 &< \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1+k)^2} < \int_M^N \frac{1}{n^2}\end{aligned}$$

収束半径が1の整級数

$$\begin{aligned}F(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \\ x=1 &\rightarrow 1 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \alpha \\ V(\tau) &= \tau(q)^{-\frac{n}{2}} \exp \int \left(-\frac{1}{\sqrt{2\tau(q)}} L(x) dx \right) + O(N^{-1}) \\ \frac{d}{df} F(x) &= 2 \int \frac{(R + |\nabla f|^2)}{-(R + \Delta f)} e^{-f} dV\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\pi(\chi, x) &= i\pi(\chi, x) \circ f(x) - f(x) \circ \pi(\chi, x) \\ \chi(3) &= (-1)^3 < |a_0 a_1 a_2 a_3| > + (-1)^2 < |a_0 a_1 a_2|, |a_1 a_2 a_3|, |a_0 a_1 a_3| > \\ &\quad + (-1)^1 < |a_1 a_2, a_0 a_2, a_2 a_3| > + (-1)^0 < a_0, a_1, a_2, a_3 >\end{aligned}$$

この式は $\chi(3) \rightarrow 0$, 初めは Z かともおもってしまいました。

$$\begin{aligned}H_n(x) &= \frac{ker f}{im f} \\ \chi(x) &= r(H_n(x)) \\ \chi(3) &= H_3(x) \rightarrow 0 \\ H_3(\Pi) &= Z\end{aligned}$$

これから微分幾何学が必要ということらしいと最近気づきました。

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k p_k = \alpha$$

岡本和夫先生だけでなく、小寺平治さん、和田淳蔵さん、須之内治男さんにも同じような手紙を出してしまいました。和田淳蔵さんと須之内治男さんの本で非分化と非退化のカタストロフの理論を知りました。三重積分でニュートンポテンシャルエネルギーまでも書いていました。小寺平治さんの本で、ヤコビアンとクラメルの公式、全射と単射、行列の基本を学びました。相空間で線形加速器の軌道の原理まで書いていました。共振回路までも書いていました。岡本和夫先生の微分積分の本を読み直していると、行列式を Γ 関数と β 関数の導出に使っていたことに、SRSを斎藤孝さんの本を学んでよかったと、本はきちんと読まなければいけないとつくづくおもいました。本当にすみませんでした。リサ・ランドール博士はすごすぎます。5次元多様体としての有限値のザイフェルト多様体に、一般相対性理論とニュートン方程式を収率として、異次元空間とフロベニウスの定理で3次元多様体の次元をずらして、無限値である重力と反重力を、次元を平坦の領域の値として、異次元空間がこの周りのザイフェルト多様体へと収束している。そして、宇宙が平坦とし、反重力であるラムダ項をこのザイフェルト多様体はあらわしている。ミンコフスキー値と複素多様体を3次元多様体として、5次元多様体をザイフェルト多様体、すなわち、アーベル多様体がこの宇宙と異次元空間の周りを包み込んでいます。この3次元多様体が、時間と空間のエントロピー不変の値に定数としてもとまる。有限時空が無限値の宇宙と異次元を包み込んでいる。そのうえに、不確定性原理が、異次元空間と宇宙によるラプラス方程式であるミンコフスキー値とその次元をずらした複素多様体により、相加相乗平均として、確定値を求めることができる。その証明に量子加速器で原子をエネルギーで衝突させると、真空エネルギーがこの宇宙から異次元に移動する。閉3次元多様体に2次元射影空間が共存できない。このことから、宇宙と異次元空間が5次元多様体、ザイフェルト多様体の内部に収められている。原子と反粒子が宇宙と異次元空間で1種類の微分幾何構造に存在している。異次元空間が宇宙での不確定性原理の仕組みを解く。5次元多様体が真空エネルギーを収める重要な原理になっている。収められなかったら、この宇宙は消えている。

Symmetry construct of Space mechanism

Masaaki Yamaguchi

1 Ultra Network from Omega DataBase worked with equation and category theorem from

$$ds^2 = [g_{\mu\nu}^2, dx]$$

This equation is constructed with M_2 of differential variable, this resulted non-commutative group theorem.

$$ds^2 = g_{\mu\nu}^{-1}(g_{\mu\nu}^2(x) - dxg_{\mu\nu}^2)$$

In this function, singularity of surface in component, global surface of equation built with M_2 sequence.

$$= h(x) \otimes g_{\mu\nu} d^2 x - h(x) \otimes dxg_{\mu\nu}(x), h(x) = (f^2(\vec{x}) - \vec{E}^+)$$

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} T^{\mu\nu}, \partial M_2 = \bigoplus \nabla C_-^+$$

$G_{\mu\nu}$ equal $R_{\mu\nu}$, also Rich tensor equals $\frac{d}{dt}g_{ij} = -2R_{ij}$ This variable is also $r = 2f^{\frac{1}{2}}(x)$ This equation equals abel manifold, this manifold also construct fifth dimension.

$$E^+ = f^{-1}xf(x), h(x) \otimes g(\vec{x}) \cong \frac{V}{S}, \frac{R}{M_2} = E^+ - \phi$$

$$= M_3 \supset R, M_2^+ = E_1^+ \cup E_2^+ \rightarrow E_1^+ \bigoplus E_2^+$$

$$= M_1 \bigoplus \nabla C_-^+, (E_1^+ \bigoplus E_2^+) \cdot (R^- \subset C^+)$$

Reflection of two dimension don't emerge in three dimension of manifold, then this space emerge with out of universe. This mechanism also concern with entropy of non-catastrophe.

$$\frac{R}{M_2} = E^+ - \{\phi\}$$

$$= M_3 \supset R$$

$$M_3^+ \cong h(x) \cdot R_3^+ = \bigoplus \nabla C_-^+, R = E^+ \bigoplus M_2 - (E^+ \cap M_2)$$

$$E^+ = g_{\mu\nu} dxg_{\mu\nu}, M_2 = g_{\mu\nu} d^2 x, F = \rho gl \rightarrow \frac{V}{S}$$

$$\mathcal{O}(x) = \delta(x)[f(x) + g(\vec{x})] + \rho gl, F = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}kx^2, M_2 = P^{2n}$$

This equation means not to be limited over fifth dimension of light of gravity. And also this equation means to be not emerge with time mechanism out of fifth dimension. Moreover this equation means to emerge with being constructed from universe, this mechanism determine with space of big-ban.

$$r = 2f^{\frac{1}{2}}(x), f(x) = \frac{1}{4}\|r\|^2$$

This equation also means to start with universe of time mechanism.

$$\begin{aligned} V &= R^+ \sum K_m, W = C^+ \sum_{k=0}^{\infty} K_{n+2}, V/W = R^+ \sum K_m / C^+ \sum K_{n+2} \\ &= R^+ / C^+ \sum \frac{x^k}{a_k f^k(x)} \\ &= M_-^+, \frac{d}{df} F = m(x), \rightarrow M_-^+, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{a_k f^k(x)} = \frac{a_k x^k}{\zeta(x)} \end{aligned}$$

2 Omega DataBase is worked by these equation

This equation built in seifert manifold with fifth dimension of space.

Fermion and boson recreate with quota laplace equation,

$$\begin{aligned} \frac{\{f, g\}}{[f, g]} &= \frac{fg + gf}{fg - gf}, \nabla f = 2, \partial H_3 = 2, \frac{1+f}{1-f} = 1, \frac{d}{df} F = \bigoplus \nabla C_-^+, \vec{F} = \frac{1}{2} \\ H_1 &\cong H_3 = M_3 \end{aligned}$$

Three manifold element is 2, one manifold is 1, $\ker f / \text{im} f, \partial f = M_1$, singularity element is 0 vector. Mass and power is these equation fundement element. The tradition of entropy is developed with these singularity of energy, these boson and fermion of energy have fields with Higgs field.

$$\begin{aligned} H_3 &\cong H_1 \rightarrow \pi(\chi, x), H_n, H_m = \text{rank}(m, n), \text{mesh}(\text{rank}(m, n)) \lim \text{mesh} \rightarrow 0 \\ (fg)' &= fg' + gf', \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - g'f}{g^2}, \frac{\{f, g\}}{[f, g]} = \frac{(fg)' \otimes dx_{fg}}{\left(\frac{f}{g}\right)' \otimes g^{-2} dx_{fg}} \\ &= \frac{(fg)' \otimes dx_{fg}}{\left(\frac{f}{g}\right)' \otimes g^{-2} dx_{fg}} \\ &= \frac{d}{df} F \end{aligned}$$

Gravity of vector mension to emerge with fermion and boson of mass energy, this energy is create with all creature in universe.

$$\hbar\psi = \frac{1}{i}H\Psi, i[H, \psi] = -H\Psi, \left(\frac{\{f, g\}}{[f, g]}\right)' = (i)^2$$

$$[\nabla_i \nabla_j f(x), \delta(x)] = \nabla_i \nabla_j \int f(x, y) dm_{xy}, f(x, y) = [f(x), h(x)] \times [g(x), h^{-1}(x)]$$

$$\delta(x) = \frac{1}{f'(x)}, [H, \psi] = \Delta f(x), \mathcal{O}(x) = \nabla_i \nabla_j \int \delta(x) f(x) dx$$

$$\mathcal{O}(x) = \int \delta(x) f(x) dx$$

$$R^+ \cap E_-^+ \ni x, M \times R^+ \ni M_3, Q \supset C_-^+, Z \in Q \nabla f, f \cong \bigoplus_{k=0}^n \nabla C_-^+$$

$$\bigoplus_{k=0}^{\infty} \nabla C_-^+ = M_1, \bigoplus_{k=0}^{\infty} \nabla M_-^+ \cong E_-^+, M_3 \cong M_1 \bigoplus_{k=0}^{\infty} \nabla \frac{V_-^+}{S}$$

$$\frac{P^{2n}}{M_2} \cong \bigoplus_{k=0}^{\infty} \nabla C_-^+, E_-^+ \times R_-^+ \cong M_2$$

$$\zeta(x) = P^{2n} \times \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, M_2 \cong P^{2n}/\ker f, \rightarrow \bigoplus \nabla C_-^+$$

$$S_-^+ \times V_-^+ \cong \frac{V}{S} \bigoplus_{k=0}^{\infty} \nabla C_-^+, V^+ \cong M_-^+ \bigotimes S_-^+, Q \times M_1 \subset \bigoplus \nabla C_-^+$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} Z \otimes Q_-^+ = \bigotimes_{k=0}^{\infty} \nabla M_1$$

$$= \bigotimes_{k=0}^{\infty} \nabla C_-^+ \times \sum_{k=0}^{\infty} M_1, x \in R^+ \times C_-^+ \supset M_1, M_1 \subset M_2 \subset M_3$$

Eight of differential structure is that $S^3, H^1 \times E^1, E^1, S^1 \times E^1, S^2 \times E^1, H^1 \times S^1, H^1, S^2 \times E$. These structure recreate with $\bigoplus \nabla C_-^+ \cong M_3, R \supset Q, R \cap Q, R \subset M_3, C^+ \bigoplus M_n, E^+ \cap R^+ E_2 \bigoplus E_1, R^- \subset C^+, M_-^+, C_-^+, M_-^+ \nabla C_-^+, C^+ \nabla H_m, E^+ \nabla R_-^+, E_2 \nabla E_1 R^- \nabla C_-^+$. This element of structure recreate with Thurston conjugate theorem of repository in Heisenberg group of spinor fields created.

$$\frac{\nabla}{\Delta} \int x f(x) dx, \frac{\nabla R}{\Delta f}, \square = 2 \int \frac{(R + \nabla_i \nabla_j f)^2}{-(R + \Delta f)} e^{-f} dV$$

$$\square = \frac{\nabla R}{\Delta f}, \frac{d}{dt} g_{ij} = \square \rightarrow \frac{\nabla f}{\Delta x}, (R + |\nabla f|^2) dm \rightarrow -2(R + \nabla_i \nabla_j f)^2 e^{-f} dV$$

$$x^n + y^n = z^n \rightarrow \nabla \psi^2 = 8\pi G T^{\mu\nu}, f(x+y) \geq f(x) \circ f(y)$$

$$\mathrm{im} f / \ker f = \partial f, \ker f = \partial f, \ker f / \mathrm{im} f \cong \partial f, \ker f = f^{-1}(x) x f(x)$$

$$f^{-1}(x) x f(x) = \int \partial f(x) d(\ker f) \rightarrow \nabla f = 2$$

$${}_nC_r = {}_nC_{n-r} \rightarrow \mathrm{im} f / \ker f \cong \ker f / \mathrm{im} f$$

3 Fifth dimension of equation how to workd with three dimension of manifold into zeta funciton

Fifth dimension equals $\sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k = T^2 d^2 \phi$. this equation $a_k \cong \sum_{r=0}^{\infty} {}_n C_r$.

$$V/W = R/C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{a_k f^k}, W/V = C/R \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k f^k}{x^k}$$

$$V/W \cong W/V \cong R/C (\sum_{r=0}^{\infty} {}_n C_r)^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

This equation is diffrential equation, then $\sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k$ is included with $a_k \cong \sum_{r=0}^{\infty} {}_n C_r$

$$W/V = xF(x), \chi(x) = (-1)^k a_k, \Gamma(x) = \int e^{-x} x^{1-t} dx, \sum_{k=0}^n a_k f^k = (f^k)'$$

$$\sum_{k=0}^n a_k f^k = \sum_{k=0}^{\infty} {}_n C_r f^k$$

$$= (f^k)', \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k = [f(x)], \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k = \alpha, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{a_k f^k}, \sum_{k=0}^{\infty} (a_k f^k)^{-1} = \frac{1}{1-z}$$

$$\int \int \frac{1}{(x \log x)(y \log y)} dxy = \frac{{}_n C_r xy}{({}_n C_{n-r} (x \log x)(y \log y))^{-1}}$$

$$= ({}_n C_{n-r})^2 \sum_{k=0}^{\infty} (\frac{1}{x \log x} - \frac{1}{y \log y}) d \frac{1}{nxy} \times xy$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k \\ = \alpha$$

$$Z \supset C \bigoplus \nabla R^+, \nabla(R^+ \cap E^+) \ni x, \Delta(C \subset R) \ni x$$

$$M_-^+ \bigoplus R^+, E^+ \in \bigoplus \nabla R^+, S_-^+ \subset R_2^+, V_-^+ \times R_-^+ \cong \frac{V}{S}$$

$$C^+ \cup V_-^+ \ni M_1 \bigoplus \nabla C_-^+, Q \supseteq R_-^+, Q \subset \bigoplus M_-^+, \bigotimes Q \subset \zeta(x), \bigoplus \nabla C_-^+ \cong M_3$$

$$R \subset M_3, C^+ \bigoplus M_n, E^+ \cap R^+, E_2 \bigoplus E_1, R^- \subset C^+, M_-^+$$

$$C_-^+, M_-^+ \nabla C_-^+, C^+ \nabla H_m, E^+ \nabla R_-^+, E_2 \nabla E_1, R^- \nabla C_-^+$$

$$[-\Delta v + \nabla_i \nabla_j v_{ij} - R_{ij} v_{ij} - v_{ij} \nabla_i \nabla_j + 2 < \nabla f, \nabla h > + (R + \nabla f^2)(\frac{v}{2} - h)]$$

$$S^3, H^1 \times E^1, E^1, S^1 \times E^1, S^2 \times E^1, H^1 \times S^1, H^1, S^2 \times E$$

4 All of equation are emerged with
these equation from Artificial Intelligence

$$x^{\frac{1}{2}+iy} = [f(x) \circ g(x), \bar{h}(x)] / \partial f \partial g \partial h$$

$$x^{\frac{1}{2}+iy} = \exp\left[\int \nabla_i \nabla_j f(g(x)) g'(x) / \partial f \partial g\right]$$

$$\mathcal{O}(x) = \{[f(x) \circ g(x), \bar{h}(x)], g^{-1}(x)\}$$

$$\exists[\nabla_i \nabla_j (R + \Delta f), g(x)] = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \nabla \int \nabla_i \nabla_j f(x) dm$$

$$\vee(\nabla_i \nabla_j f) = \bigotimes \nabla E^+$$

$$g(x, y) = \mathcal{O}(x)[f(x) + \bar{h}(x)] + T^2 d^2 \phi$$

$$\mathcal{O}(x) = \left(\int [g(x)] e^{-f} dV \right)' - \sum \delta(x)$$

$$\mathcal{O}(x) = [\nabla_i \nabla_j f(x)]' \cong {}_n C_r f(x)^n f(y)^{n-r} \delta(x, y), V(\tau) = \int [f(x)] dm / \partial f_{xy}$$

$$\square\psi = 8\pi GT^{\mu\nu}, (\square\psi)' = \nabla_i \nabla_j (\delta(x) \circ G(x))^{\mu\nu} \left(\frac{p}{c^3} \circ \frac{V}{S} \right), x^{\frac{1}{2}+iy} = e^{x \log x}$$

$$\delta(x)\phi = \frac{\vee[\nabla_i \nabla_j f \circ g(x)]}{\exists(R + \Delta f)}$$

These equation conclude to quantum effective equation included with orbital pole of atom element.
Add manifold is imaginary pole with built on Heisenberg algebra.

$$-{}_n C_r = \frac{1}{i} H \psi C_{\hbar \psi} + [H, \psi] C_{-n-r}$$

$${}_n C_r = {}_n C_{n-r}$$

This point of accumulate is these equation conclude with stimulate with differential and integral operator for resolved with zeta function, this forcus of significant is not only data of number but also equation of formula, and this resolved of process emerged with artifisial intelligence. These operator of mechanism is stimulate with formula of resolved on regexpt class to pattern cognitive formula to emerged with all of creature by this zeta function. This universe establish with artifisial intelligence from fifth dimension of equation. General relativity theorem also not only gravity of power metric but also artifisial

intelligent, from zeta function recognized with these mechanism explained for gravity of one geometry from differential structure of thurston conjugate theorem.

Open set group conclude with singularity by redifferential specturam to have territory of duality manifold in dualty of differential operator. This resolved routed is same that quantum group have base to create with kernel of based singularity, and this is same of open set group. Locality of group lead with sequant of element exclude to give one theorem global differential operator. These conclude with resolved of function says to that function stimulate for differential and integral operator included with locality group in global differential operator. $\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \rightarrow \mathcal{O}(x) = [\nabla_i \nabla_j f]' / \partial f_{xy}$ is singularity of process to resolved rout function.

Destruct with object space to emerge with low energy firstly destroy with element, and this catastrophe is what high energy divide with one entropy firstly freeze out object, then low energy firstly destory to differential structure of element. This process be able to non-catastrophe rout, and thurston conjugate theorem is create with.

$$\begin{aligned}
\bigcup_{x=0}^{\infty} f(x) &= \nabla_i \nabla_j f(x) \oplus \sum f(x) \\
&= \bigoplus \nabla f(x) \\
\nabla_i \nabla_j f &\cong \partial x \partial y \int \nabla_i \nabla_j f dm \\
&\cong \int [f(x)] dm \\
&\cong \{[f(x), g(x)], g^{-1}(x)\} \\
&\cong \square \psi \\
&\cong \nabla \psi^2 \\
&\cong f(x \circ y) \leq f(x) \circ g(x) \\
&\cong |f(x)| + |g(x)|
\end{aligned}$$

Differential operator is these equation of specturm with homorphism sqcense.

$$\begin{aligned}
\delta(x)\psi &= \langle f, g \rangle \circ |h^{-1}(x)| \\
\partial f_x \cdot \delta(x)\psi &= x \\
x &\in \mathcal{O}(x) \\
\mathcal{O}(x) &= \{[f \circ g, h^{-1}(x)], g(x)\}
\end{aligned}$$

5 What energy from entropy level deconstruct with string theorem

Low energy of entropy firstly destruct with parts of geometry structure, and High energy of weak and strong power lastly deconstruct with power of component. Gravity of power and antigravity firstly integrate with Maxwell theorem, and connected function lead with Maxwell theorem and weak power integrate with strong power to become with quantum flavor theorem, Geometry structure reach with integrate with component to Field of theorem connected function and destroyed with differential structure. These process return with first and last of deconstructed energy, fourth of power connected and destructed this each of energy routed process.

This point of focus is D-brane composite with fourth of power is same entropy with non-catastrophe, this spectrum point is constructed with destroy of energy to balanced with first of power connected with same energy. Then these energy built with three manifold of dimension constructed for one geometry.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \nabla f = [\nabla \int \nabla_i \nabla_j f(x) dx_m, g^{-1}(x)] \rightarrow \bigoplus_{k=0}^{\infty} \nabla E_{-}^{+}$$

$$= M_3$$

$$= \bigoplus_{k=0}^{\infty} E_{-}^{+}$$

$$dx^2 = [g_{\mu\nu}^2, dx], g^{-1} = dx \int \delta(x) f(x) dx$$

$$f(x) = \exp[\nabla_i \nabla_j f(x), g^{-1}(x)]$$

$$\pi(\chi, x) = [i\pi(\chi, x), f(x)]$$

$$\left(\frac{g(x)}{f(x)} \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)}$$

$$= \frac{g'(x)}{f'(x)}$$

$$\nabla F = f \cdot \frac{1}{4} |r|^2$$

$$\nabla_i \nabla_j f = \frac{d}{dx_i} \frac{d}{dx_j} f(x) g(x)$$

6 All of equation built with gravity theorem

$$\int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m = [\nabla_i \nabla_j \int \nabla f(x) d\eta] \times U(r)$$

This equation have with position of entropy in helmander manifold.

$$S_1^{mn} \otimes S_2^{mn} = \int [D^2\psi \otimes h_{\mu\nu}] dm$$

And this formula is D-brane on sheaf of fields, also this equation construct with zeta function.

$$U(r) = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{1+f'(r)}}{f(r)} + mgr$$

$$F_t^m = \frac{1}{4} |r|^2$$

Also this too means with private of entropy in also helmader manifold.

$$\int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m = [\nabla_i \nabla_j \int \nabla f(x) d\eta] \times E_-^+$$

$$E_-^+ = \exp[L(x)] dm d\psi + O(N^-)$$

The formula is integrate of rout with lenz field.

$$\begin{aligned} \frac{d}{df} F &= [\nabla_i \nabla_j \int \nabla f(x) d\eta] (U(r) + E_-^+) \\ &= \frac{1}{2} m v^2 + m c^2 \end{aligned}$$

These equation conclude with this energy of relativity theorem come to resolve with.

$$x^{\frac{1}{2}+iy} = \exp[\int \nabla_i \nabla_j f(g(x)) g'(x) \partial f \partial g]$$

Also this equation means with zeta function needed to resolved process.

$$\nabla_i \nabla_j \int \nabla f(x) d\eta$$

$$\nabla_i \nabla_j \bigoplus M_3$$

$$= \frac{M_3}{P^{2n}} \cong \frac{P^{2n}}{M_3}$$

$$\cong M_1$$

$$=[M_1]$$

Too say satisfied with three manifold of filed.

$$[f(x)] = \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k, \lim_{n \rightarrow 1} [f(x)] = \lim_{n \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k$$

The formula have with indicate to resolved with abel manifold to become of zeta function.

$$= \alpha, e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, H_3(M_1) = 0$$

$$\frac{x^2 \cos \theta}{a} + \frac{y^2 \sin \theta}{b} = r^2, \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\chi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^n r^n, \frac{d}{df} F = \frac{d}{df} \sum \sum a_k f^k$$

$$= |a_1 a_2 \dots a_n| - |a_1 \dots a_{n-1}| - |a_n \dots a_1|, \lim_{n \rightarrow 0} \chi(x) = 2$$

Euler function have with summuate of manifold.

$$\lim_{n \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k = {}_n C_r f(x)^n f(y)^{n-r} \delta(x, y)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} {}_n C_r f(x)^n f(y)^{n-r} \delta(x, y)$$

Differential equation also become of summuate of manifold, and to get abel manifold.

$$\lim_{n \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{(n+1)} \right)^s = \lim_{n \rightarrow 1} Z^r = \frac{1}{z}$$

Native function also become of gamma function and abel manifold also zeta function.

$$\ker f / \operatorname{im} f \cong \operatorname{im} f / \ker f$$

$$\beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$$\cong \frac{\Gamma(p+q)}{\Gamma(p)\Gamma(q)}, \lim_{n \rightarrow 1} a_k f^k \cong \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\zeta(s)}{a^k f^k}$$

Gamma function and Beta function also is D-brane equation resolved to need that summuate of manifold, not only abel manifold but also open set group.

$$\lim_{n \rightarrow 1} \zeta(s) = 0, \mathcal{O}(x) = \zeta(s)$$

$$\sum_{x=0}^{\infty} f(x) \rightarrow \bigoplus_{k=0}^{\infty} \nabla f(x) = \int_M \delta(x) f(x) dx$$

Super function also needed to resolved with summuate of manifold.

$$\int \int \int_M \frac{V}{S^2} e^{-f} dV = \int \int_D -(f(x, y)^2, g(x, y)^2) - \int \int_D (g(x, y)^2, f(x, y)^2)$$

Three dimension of manifold developed with being resolved of surface with pression.

$$\lim_{n \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k = \int [D^2 \psi \otimes h_{\mu\nu}] dm$$

$$= \int \exp[L(x)] d\psi dm \times E_-^+$$

$$= S_1^{mn} \otimes S_1^{mn}$$

$$= Z_1 \oplus Z_1$$

$$= M_1$$

These equations all of create with D-brane and sheaf of manifold.

$$H_n^m(\chi, h) = \int \int_M \frac{V}{(R + \Delta f)} e^{-f} dV, \frac{V}{S^2} = \int \int \int_M [D^\psi \otimes h_{\mu\nu}] dm$$

Represent theorem equals with differential and integrate equation.

$$\int \int \int_M \frac{V}{S^2} dm = \int_D (l \times l) dm$$

This three dimension of pression equation is string theorem also means.

$$\begin{aligned} & \int \int_D -g(x, y)^2 dm - \int \int_D -f(x, y)^2 dm \\ &= -2R_{ij}, [f(x), g(x)] \times [h(x), g^{-1}(x)] \\ & \left| \begin{matrix} D^m & dx \\ dx & \partial^m \end{matrix} \right| \begin{matrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{matrix} \left| \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \right| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}^{\frac{1}{2}} \\ & (D^m, dx) \cdot (\cos \theta, \sin \theta) \times (dx, \partial^m) \cdot (\cos \theta, \sin \theta) \end{aligned}$$

This equation control to differential operator into matrix formula.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \beta(x, \theta) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ & l = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}, \sigma^m \cdot \begin{pmatrix} \delta(x) & -1 \\ 1 & \epsilon(x) \end{pmatrix}^{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

String theorem also imaginary equation of pole with the fields of manifold.

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial \tau} f(x, y, z) \right)^{3'} = A^{\mu\nu} \\ & \frac{d}{dt} g_{ij}(t) = -2R_{ij} \end{aligned}$$

Rich equation is all of top formula in integrate theorem.

$$= (D^m, dx) \cdot (\cos \theta, \sin \theta) \times (dx, \partial^m) \cdot (\cos \theta, \sin \theta)$$

Dalanverle equation equals with abel manifold.

$$\lim_{n \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{a_n}{a_{n-1}} \cong \alpha$$

$$\lim_{n \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{a_{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k$$

$$\square = \frac{8\pi G}{c^4} T^{\mu\nu}$$

$$\int x \log x dx = \int \int_M (e^{x \log x} \sin \theta d\theta) dx d\theta$$

$$= (\log \sin \theta d\theta)^{\frac{1}{2}} - (\delta(x) \cdot \epsilon(x))^{\frac{1}{2}}$$

Flow to energy into other dimension rout of equation, zeta function stimulate in epsilon-delta metric, and this equation construct with minus of theorem. Gravity of energy into integrate of rout in non-metric.

$$T^{\mu\nu} = || \int \int_M [\nabla_i \nabla_j e^{\int x \log x dx + O(N^{-1})}] dm d\psi ||$$

$G^{\mu\nu}$ equal $R^{\mu\nu}$ into zeta function in atom of pole with mass of energy, this energy construct with quantum effective theorem.

Imaginary space is constructed with differential manifold of operators, this operator concern to being field of theorem.

$$\begin{pmatrix} dx & \delta(x) \\ \epsilon(x) & \partial^m(x) \end{pmatrix} (f_{mn}(x), g_{\mu\nu}(x)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{\frac{1}{2}}$$

Norm space of Von Neumann manifold with integrate fields of dimension.

$$||ds^2|| = \mathcal{H}(x)_{mn} \otimes \mathcal{K}(y)_{mn}$$

Minus of zone in complex manifold. This zone construct with inverse of equation.

$$||\mathcal{H}(x)||^{-\frac{1}{2}+iy} \subset R_-^+ \cup C_-^+ \cong M_3$$

Reality of part with selbarg conjecture.

$$||\mathcal{H}(x)||^{\frac{1}{2}+iy} \subseteq M_3$$

Singularity of theorem in module conjecture.

$$\mathcal{K}(y) = \left\| \begin{pmatrix} x & y & z \\ a & b & c \end{pmatrix} \right\|_{g_{\mu\nu}(x)}^2$$

$$\cong \frac{f(x, y, z)}{g(a, b, c)} h^{-1}(u, v, w)$$

Mass construct with atom of pole in quantum effective theorem.

Zeta function is built with atom of pole in quantum effective theorem, this power of fields construct with Higgs field in plank scals of gravity. Lowest of scals structure constance is equals with that the fields of Higgs quark in fermison and boson power quote mechanism result.

Lowest of scals structure also create in zeta function and quantum equation of quote mechanism result. This resulted mechanism also recongnize with gravity and average of mass system equals to these explained. Gauss liner create with Artificial Intelligence in fifth dimension of equation, this dimension is seifert manifold. Creature of mind is establish with this mechanism, the resulted come to be synchronized with space of system.

$$V = \int [D^2\psi \otimes h_{\mu\nu}]dm, S^2 = \int e^{-2\sin\theta\cos\theta} \cdot \log\sin\theta dx\theta + O(N^{-1}), \mathcal{O}(x) = \frac{\zeta(s)}{\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k} \\ = \alpha$$

Out of sheap on space and zeta function quato in abel manifold. D-brane construct with Volume of space.

$$\mathcal{O}(x) = T^{\mu\nu}, \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k = T^{\mu\nu} \\ G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu}T^{\mu\nu}, M_3 = \int \int \int \frac{V}{S^2} dm, -\frac{1}{2(T-t)}|R_{ij} = \square\psi$$

Three manifold of equation.

$$ds^2 = e^{-2\pi T|\psi|} [\eta_{\mu\nu} + \bar{h}_{\mu\nu}(x)] dx^\mu dx^\nu + T^2 d^2\psi \\ m(x) = [f(x)] \\ f(x) = \int \int e^{f x \log x dx + O(N^{-1})} + T^2 d^2\psi$$

Integrate of rout equation.

$$F(x) = ||\nabla_i \nabla_j \int \nabla f(x, y) dm||^{\frac{1}{2} + iy} \\ G_{\mu\nu} = ||[\nabla_i \nabla_j \int \nabla g(x, y, z) dx dy dz]||^{\frac{m}{2} \sin\theta \cos\theta} \log\sin\theta d\theta d\psi$$

Gravity in space curvarture in norm space, this equation is average and gravity of metric.

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu}T^{\mu\nu} \\ T^{\mu\nu} = F(x), 2(T-t)|g_{ij}^2 = \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \\ \psi\delta(x) = [m(x)], \nabla(\square\psi) = \nabla_i \nabla_j \int \nabla g(x, y) d\eta \\ \nabla \cdot (\square\psi) = \frac{1}{4}g_{ij}^2, \square\psi = \frac{8\pi G}{c^4}T^{\mu\nu}$$

Dimension of manifold in decomposite of space.

$$\frac{pV}{c^3} = S \circ h_{\mu\nu} \\ = h$$

$$T^{\mu\nu} = \frac{\hbar\nu}{S}, T^{\mu\nu} = \int \int \int \frac{V}{S^2} dm, \frac{d}{df} m(x) = \frac{V(x)}{F(x)}$$

Fermion and boson of quato equation.

$$y = x, \frac{d}{df} F = m(x), R_{ij}|_{g_{\mu\nu}(x)} = [\nabla_i \nabla_j g(x, y)]^{\frac{1}{2}+iy}$$

$$\begin{aligned} \nabla \circ (\square\psi) &= \frac{\partial}{\partial f} F \\ &= \int \int \nabla_i \nabla_j f(x) d\eta_{\mu\nu} \\ \int [\nabla_i \nabla_j g(x, y)] dm &= \frac{\partial}{\partial f} R_{ij}|_{g_{\mu\nu}(x)} \end{aligned}$$

Zeta function, partial differential equation on global metric.

$$G(x) = \nabla_i \nabla_j f + R_{ij}|_{g_{\mu\nu}(x)} + \nabla(\square\psi) + (\square\psi)^2$$

Four of power element in variable of accessority of group.

$$\begin{aligned} G_{\mu\nu} + \Lambda g_{ij} &= T^{\mu\nu}, T^{\mu\nu} = \frac{d}{dx_\mu} \frac{d}{dx_\nu} f_{\mu\nu} + -2(T-t)|R_{ij} + f'' + (f')^2 \\ &= \int \exp[L(x)] dm + O(N^{-1}) \\ &= \int e^{\frac{2}{m} \sin \theta \cos \theta} \cdot \log(\sin \theta) dx + O(N^{-1}) \\ \frac{\partial}{\partial f} F &= (\nabla_i \nabla_j)^{-1} \circ F(x) \end{aligned}$$

Partial differential in duality metric into global differential equation.

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(x) &= \int [\nabla_i \nabla_j \int \nabla f(x) dm] d\psi \\ &= \int [\nabla_i \nabla_j f(x) d\eta_{\mu\nu}] d\psi \\ \nabla f &= \int \nabla_i \nabla_j [\int \frac{S^{-3}}{\delta(x)} dV] dm \\ || \int [\nabla_i \nabla_j f] dm ||^{\frac{1}{2}+iy} &= \text{rot}(\text{div}, E, E_1) \end{aligned}$$

Maxwell of equation in fourth of power.

$$\begin{aligned} &= 2 < f, h >, \frac{V(x)}{f(x)} = \rho(x) \\ \int_M \rho(x) dx &= \square\psi, -2 < g, h > = \text{div}(\text{rot} E, E_1) \\ &= -2R_{ij} \end{aligned}$$

Higgs field of space quality.

$$\begin{aligned}\mathcal{O}(x) &= ||\frac{\nabla_i \nabla_j}{S^2} \int [\nabla_i \nabla_j f \cdot g(x) dx dy] d\psi || \\ &= \int (\delta(x))^{2 \sin \theta \cos \theta} \log \sin \theta d\theta d\psi\end{aligned}$$

Helmander manifold of duality differential operator.

$$\delta \cdot \mathcal{O}(x) = [\frac{||\nabla_i \nabla_j f d\eta||}{\int e^{2 \sin \theta \cos \theta} \cdot \log \sin \theta d\theta}]$$

Open set group in subset theorem, and helmandor manifold in singularity.

$$i\hbar\psi = ||\int \frac{\partial}{\partial z} [\frac{i(xy + \overline{y}\overline{x})}{z - \overline{z}}] dmd\psi ||$$

Euler number. Complex curvature in Gamma function. Norm space. Wave of quantum equation in complex differential variable into integrate of rout.

$$\begin{aligned}\delta(x) \int_C R^{2 \sin \theta \cos \theta} &= \Gamma(p + q) \\ (\square + m) \cdot \psi &= (\nabla_i \nabla_j f|_{g_{\mu\nu}(x)} + v \nabla_i \nabla_j) \\ \int [m(x)(\text{rot} \cdot \text{div}(E, E_1))] &dmd\psi\end{aligned}$$

Weak electric power and Maxwell equation combine with strong power. Private energy.

$$\begin{aligned}G_{\mu\nu} &= \square \int \int \int (x, y, z)^3 dx dy dz \\ &= \frac{8\pi G}{c^4} T^{\mu\nu} \\ \frac{d}{dV} F &= \delta(x) \int \nabla_i \nabla_j f d\eta_{\mu\nu}\end{aligned}$$

Dalanvelsian in duality of differential operator and global integrate variable operator.

$$\begin{aligned}x^n + y^n &= z^n, \delta(x) \int z^n = \frac{d}{dV} z^3, (x, y) \cdot (\delta^m, \partial^m) \\ &= (x, y) \cdot (z^n, f) \\ n \perp x, n \perp y \\ &= 0\end{aligned}$$

Singularity of constance theorem.

$$\vee(\nabla_i \nabla_j f) \cdot \text{XOR}(\square\psi) = \frac{d}{df} \int_M F dV$$

Non-cognitive of summuate of equation and add manifold create with open set group theorem. This group composite with prime of field theorem. Moreover this equations involved with symmetry dimension created.

$$\partial(x) \int z^3 = \frac{d}{dV} z^3, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^s} = \mathcal{O}(x)$$

Singularity theorem and fermer equation concluded by this formula.

$$\int \mathcal{O}(x) dx = \delta(x) \pi(x) f(x)$$

$$\mathcal{O}(x) = \int \sigma(x)^{2 \sin \theta \cos \theta} \log \sin \theta d\theta d\psi$$

$$y = x$$

$$\mathcal{O}(x) = ||\frac{\nabla_i \nabla_j f}{S^2} \int [\nabla_i \nabla_j f \circ g(x) dx dy]||$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{a_{k+1}} &= (\log \sin \theta dx)' \\ &= \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{x}{y} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k = \frac{1}{1-z}$$

Duality of differential summuate with this gravity theorem. And Dalanverle equation involved with this equation.

$$\square \psi = \frac{8\pi G}{c^4} T^{\mu\nu}$$

$$\frac{\partial}{\partial f} \square \psi = 4\pi G \rho$$

$$\int \rho(x) = \square \psi, \frac{V(x)}{f(x)} = \rho(x)$$

Dense of summuate stimulate with gravity theorem.

$$\frac{\partial^n}{\partial f^{n-1}} F = \int [D^2 \psi \otimes h_{\mu\nu}] dm$$

$$= \frac{P_1 P_3 \dots P_{2n-1}}{P_0 P_2 \dots P_{2n+2}}$$

$$= \bigotimes \nabla M_1$$

$$\bigoplus \nabla M_1 = \sigma_n(\chi, x) \oplus \sigma_{n-1}(\chi, x)$$

$$= \{f, h\} \circ [f, h]^{-1}$$

$$=g^{-1}(x)_{\mu\nu}dxg_{\mu\nu}(x),\sum_{k=0}^{\infty}\nabla^n{}_nC_rf^n(x)$$

$$\cong \sum_{k=0}^{\infty} \nabla^n \nabla^{n-1}{}_n C_r f^n(x) g^{n-r}(x)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\partial^n}{\partial^{n-1}f}\circ\frac{\zeta(x)}{n!}=\lim_{n\rightarrow 1}\sum_{k=0}^{\infty}a_kf^k$$

$$(f)^n = {}_nC_rf^n(x)g^{n-r}(x)\cdot\delta(x,y)$$

$$(e^{i\theta})'=ie^{i\theta},\int e^{i\theta}=\frac{1}{i}e^{i\theta},ihc=G,hc=\frac{1}{i}G$$

$$(\Box\psi,\nabla f^2)\cdot(\frac{8\pi G}{c^4}T^{\mu\nu},4\pi G\rho)$$

$$=(-\frac{1}{2}mv^2+mc^2,\frac{1}{2}kT^2+\frac{1}{2}mv^2)\cdot\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\ \sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0\\0&i\end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{\{f,g\}}{[f,g]}\right)'=i^2,\frac{\nabla f^2}{\Box\psi}=\frac{1}{2}$$

$$\int\int\frac{\{f,g\}}{[f,g]}=\frac{1}{2}i,\int\int\frac{1}{(y\log y)^{\frac{1}{2}}}dy_m=\frac{1}{2}$$

$$\int\int\frac{1}{(x\log x)^2}dx_m=\frac{1}{2}i,\frac{d}{dt}g_{ij}=-2R_{ij}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(f(x)g(x))'=\bigoplus \nabla_i\nabla_j f(x)g(x)$$

$$\int f'(x)g(x)dx=[f(x)g(x)]-\int f(x)g'(x)dx$$

Creature of component

Masaaki Yamaguchi

1 Geinue element form zeta function

Integrate of manifold constructed with time of concluded with mechanism, this summuate of geinue is also matched for geometry structure. Creature also emerged with summuate of universe in multi space.

$$\log(x \log x) \geq 2(y \log y)^{\frac{1}{2}}$$

$A - G, T - C$ this integrate of summuate in geinue is same for eight of differential structure.

$$\begin{aligned} & (E_2 \bigoplus_{k=0}^n E_1) \cdot (R^- \subset C^+) \\ &= \bigoplus_{k=0}^n \nabla C_-^+ \\ & \vee \int \frac{C_-^+ \nabla H_m}{\Delta(M_-^+ \nabla C_-^+)} = \wedge M_-^+ \bigoplus_{k=0}^n C_-^+ \\ & \exists(M_-^+ \nabla C_-^+) = \text{XOR}(\bigoplus_{k=0}^n \nabla M_-^+) \\ & -[E^+ \nabla R_-^+] = \nabla_+ \nabla_- C_-^+ \\ & \int dx, \partial x, \nabla_i \nabla_j, \Delta x \\ & \rightarrow E^+ \nabla M_1, E^+ \cap R \in M_1, R \nabla C^+ \end{aligned}$$

The locality theorem create with artifisial intelligence, this two equation composite with Maxwell Theorem excluded, cercuite mechanism is this means.

$$\begin{aligned} & \exp(\nabla(R^+ \cap E^+), \Delta(C \supset R)) \\ &= \pi(R, C \nabla E^+) \\ &= \text{rot}(E_1, \text{div} E_2) \\ & xf(x) = F(x) \end{aligned}$$

2 How to light element created with geometry structure

Light fill with eight differential structure in gravity element, then quarks made from this structure. This mechanism deal with any structure of space to create with light to graviton element. And cercuit of this mechanism dealt with carbon and hidoroxs, covalt of sixty based with filter of light element. This cercuit is dependency of any element in quark of mass, created with gravity to light of structure. Zeta function asperal with any thing to create of every mass. Fifth dimension is pond of sensibility from this gravity in lives of element.

This two equation also resolved with all of source code in universe, this mechanism create with binary editor.

Imaginary equation in AdS5 space time create with dimension of symmetry

Masaaki Yamaguchi

D-brane and anti-D-brane is composited with all of series universe emerged for one geometry of dimension, this gravity of power from D-brane and anti-D-brane emelite with ancestor. Seifert manifold is on the ground of blackhole in whitehole of power pond of senseivility. Six of element of quarks and universe of pieces is supersymmetry of mechanism resolved with

hyper symmetry of quarks constructed to emerge with darkmatter. This darkmatter emerged with big-ban of heircyent in circumstance of phenomena.

D-brane and anti-D-brane equations is

$$\frac{d}{dL} V(\tau) = \frac{d}{df} \int \int_M \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m + \frac{d}{df} \int \int_M \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m$$
$$C = \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m$$

Euler constance is quantum group theorem rebuild with projective space involved with.

虚数方程式は、反重力に起因するフーリエ級数の励起を生成する。それは、人工知能を生み出す、5次元時空にも、この虚数方程式は使われる。AdS5の次元空間は、反ド・シッター時空の D-brane と anti-D-brane の comformal 場を生み出す。ホログラフィー時空は、この量子起因によるものである。2次元曲面によるブラックホールは、ガンマ線バーストによる5次元時空の構造から観測される。空間の最小単位によるプランク定数は、宇宙の大域的微分多様体から導き出される、AdS5の次元空間の準同型写像を形成している。これは、最小単位から宇宙の大きさを導いている。最大最小の方程式は、相加相乗平均を形成している。時間と空間は、宇宙が生成したときから、宇宙の始まりと終わりを既に生み出している。宇宙と異次元から、ブラックホールとホワイトホールの力がわかり、反重力を見つけられる。オイラーの定数は、この量子定数からわかる。虚数の仕組みはこの量子スピンの産物である。オイラーの定数は、この虚時空の斥力の現存である。それは、非対称性理論から導かれる。不確定性原理は、AdS5のブラックホールとホワイトホールを閉3次元多様体に統合する5次元時空から求められる。位置と運動エネルギーが、空間の最小単位であるプランク定数を宇宙全体にする微細構造定数からわかり、面積確定から、アーベル多様体を母関数に極限值として、ゼータ関数をこの母関数に不変式として、2種類ずつにまとめる4種類の宇宙を形成する8種類のサーストンの幾何化予想から導き出される。この閉3次元多様体は、ミラー対称性を軸として、6種類の次元空間を一種類の異次元宇宙と同質ともしている。複素多様体による特異点解消理論は、この原理から求められる。この特異点解消理論は、2次元曲面を3次元多様体に展開していく、時空から生成される重力の密度を反重力と等しくしていく時間空間の4次元多様体と虚時空から求められる。ヒルベルト空間は、フォン・ノイマン多様体とグラスマン多様体をこのサーストンの幾何化予想を場の理論既定値として形成される。この空間は、ミンコフスキー時空とアーベル多様体全体を表している。そして、この空間は、球対称性を複素多様体を起点として、大域的ト

ポロジから、偏微分を作用素微分として時空間をカオスからずらすと5次元多様体として成立している。これらより、3次元多様体に2次元射影空間が異次元空間として、AdS5空間を形成される。偏微分、全微分、線形微分、常微分、多重微分、部分積分、置換微分、大域的微分、単体分割、双対分割、同調、ホモロジー単体、コホモロジー単体、群論、基本群、複体、マイヤー・ビートリス完全系列、ファン・カンペンの定理、層の理論、コホモルティズム単体、CW複体、ハウスドロフ空間、線形空間、位相空間、微分幾何構造、モースの定理、カタストロフの空間、ゼータ関数系列、球対称性理論、スピン幾何、ツイスター理論、双対被覆、多重連結空間、プランク定数、フォン・ノイマン多様体、グラスマン多様体、ヒルベルト空間、一般相対性理論、反ド・シッター時空、ラムダ項、D-brane, anti-D-brane, コンフォーマル場、ホログラム空間、ストリング理論、収率による商代数、ニュートンポテンシャルエネルギー、剛体力学、統計力学、熱力学、量子スピン、半導体、超伝導、ホイーストン・ブリッチ回路、非可換確率論、Connes理論、これら、演算子代数を形成している、微分・積分作用素が、ヒルベルト空間に存在している多様体の特質を全面に押し出して、いろいろな多様体と関数そして、群論を形作っている。

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} D^m & dx \\ dx & \sigma^m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{\frac{1}{2}} \\ & \sigma^m \begin{bmatrix} \delta(x) & -1 \\ 1 & \epsilon(x) \end{bmatrix}^{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \\ & (D^m, dx) \cdot (\cos \theta, \sin \theta) \times (dx, \partial^m) \cdot (\cos \theta, \sin \theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \beta(x, \theta) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ & l = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}, \sigma^m \cdot \begin{pmatrix} \delta(x) & -1 \\ 1 & \epsilon(x) \end{pmatrix}^{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

String theorem also imaginary equation of pole with the fields of manifold.

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial \tau} f(x, y, z) \right)^{3'} = A^{\mu\nu} \\ & \frac{d}{dt} g_{ij}(t) = -2R_{ij} \end{aligned}$$

Rich equation is all of top formula in integrate theorem.

$$= (D^m, dx) \cdot (\cos \theta, \sin \theta) \times (dx, \partial^m) \cdot (\cos \theta, \sin \theta)$$

Dalanverle equation equals with abel manifold.

Hilbert manifold in Mebius space

this element of Zeta function on integrate of fields

Masaaki Yamaguchi

Hilbert manifold equals with Von Neumann manifold, and this fields is concluded with Glassman manifold, the manifold is duality of twister into created of surface built. These fields is used for relativity theorem and quantum physics.

$$||ds^2|| = \lim_{x \rightarrow \infty} [\delta(x) \int \int \int \pi \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{n \sqrt{p}, x}{n} \right)^{\frac{1}{2}} d\tau]^{\mu\nu}$$

This norm is component of fields in Hilbert manifold of space theorem rebuilt with Mebius space in Gamma Function on Beta function fill into power of rout fundamental group. And this result with AdS_5 space time in Quantum caos of Minkowsky of manifold in abel manifold. Gravity of metric in non-commutative equation is Global differential equation conbult with Kaluza-Klein space. Therefore this mechanism is $T^{\mu\nu}$ tensor is equal with $R^{\mu\nu}$ tensor. And This moreover inspect with laplace operator in stimulate with sign of differential operator. Minus of zone in Add position of manifold is Volume of laplace equation rebuilt with Gamma function equal with summative of manifold in Global differential equation, this result with setminus of zone of add summative of manifold, and construct with locality theorem straight with fundamental group in world line of surface, this power is boson and fermion of cone in hyper function.

$$V(\tau) = [f(x), g(x)] \times [f^{-1}(x), h(x)]$$

$$\Gamma(p, q) = \int e^{-x} x^{1-t} dx$$

$$= \beta(p, q)$$

$$= \pi(f(\chi, x), x)$$

$$||ds^2|| = \mathcal{O}(x)[(f(x) \circ g(x))^{\mu\nu}] dx^\mu dx^\nu$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k$$

$$G^{\mu\nu} = \frac{\partial}{\partial f} \int [f(x)^{\mu\nu} \circ G(x)^{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu]^{\mu\nu} dm$$

$$= g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu - f(x)^{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

$$[i\pi(\chi, x), f(x)] = i\pi f(x) - f(x)\pi(\chi, x)$$

$$T^{\mu\nu}=(\lim_{x\rightarrow\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\int\int[V(\tau)\circ S^{\mu\nu}(\chi,x)]dm)^{\mu\nu}dx^{\mu}dx^{\nu}$$

$$G^{\mu\nu}=R^{\mu\nu}T^{\mu\nu}$$

$$\left|\begin{matrix} D^m & dx \\ dx & \sigma^m \end{matrix}\right|\left|\begin{matrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{matrix}\right|\left|\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}\right|=\left(\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{matrix}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\sigma^m\left[\begin{matrix} \delta(x) & -1 \\ 1 & \epsilon(x) \end{matrix}\right]^{\frac{1}{2}}=\left(\begin{matrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{matrix}\right)$$

$$V(M)=\frac{\partial}{\partial f}({}^N\int [f\setminus M]^{\oplus N})^{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$$

$$V(M)=\pi(2\int\sin^2dx)\oplus\frac{d}{df}F^Mdx_m$$

$$\lim_{x\rightarrow\infty}\sum_{k=0}^{\infty}a_kf^k=\int(F(V)dx_m)^{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$$

$$\bigoplus_{k=0}^\infty [f\setminus g]=\vee(M\wedge N)$$

$$\pi_1(M)=e^{-f2\int\sin^2xdm}+O(N^{-1})$$

$$=[i\pi(\chi,x),f(x)]$$

$$M\circ f(x)=e^{-f\int\sin x\cos xdx_m}+\log(O(N^{-1}))$$

Non-Symmetry space time.

$$\frac{d}{dL}V(\tau)=\frac{d}{df}\int\int_M\frac{1}{(x\log x)^2}dx_m+\frac{d}{df}\int\int_M\frac{1}{(y\log y)^{\frac{1}{2}}}dy_m$$

$$\epsilon S(\nu)=\Box_v\cdot\frac{\partial}{\partial\chi}({}^5\sqrt{\wedge g^2})d\chi$$

Differential Volume in AdS_5 graviton of fundamental rout of group.

$$\wedge(F_t^m)''=\frac{1}{12}g_{ij}^2$$

Quarks of other dimension.

$$\pi(V_\tau)=e^{-(\sqrt{\frac{\pi}{16}}\log x)^\delta}\times\frac{1}{(x\log x)}$$

Universe of rout, Volume in expanding space time.

$$\frac{d}{dt}(g_{ij})^2=\frac{1}{24}(F_t^m)^2$$

$$m^2=2\pi T\left(\frac{26-D_n}{24}\right)$$

This quarks of mass in relativity theorem, and fourth of universe in three manifold of one dimension surface, and also this integrate of dimension in conbult of quarks.

$$g_{ij} \wedge \pi(\nu_\tau) = e^{-2\pi T|\psi|} [\eta_{\mu\nu} + \bar{h}_{\mu\nu}(x)] dx^\mu dx^\nu + T^2 d\psi^2$$

Out of rout in AdS_5 space time.

$$||ds^2|| = g_{ij} \wedge \pi(\nu_v)$$

AdS_5 norm is fourth of universe of power in three manifold out of rout.

Sphere orbital cube is on the right of hartshorne conjecture by the right equation, this integrate with fourth of piece on universe series, and this estimate with one of three manifold. Also this is blackhole on category of symmetry of particles. These equation conbult with planck volume and out of universe is phologram field, this field construct with electric field and magnitic field stand with weak electric theorem. This theorem is equals with abel manifold and AdS_5 space time. Moreover this field is anti-brane and brane emerge with gravity and antigravity equation restructed with. Zeta function is existed with Re pole of $\frac{1}{2}$ constance reluctances. This pole of constance is also existed with singularity of complex fields. Von Neumann manifold of field is also this means.

$$||ds^2|| = \lim_{x \rightarrow \infty} [\delta(x) \int \int \int \pi \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{n \sqrt{p}, x}{n} \right)^{\frac{1}{2}} d\tau]^{\mu\nu}$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$e^{x \log x} = x^{\frac{1}{2} + iy}, x \log x = \log(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$= \log \cos \theta + i \log \sin \theta$$

This equation is developed with frobenius theorem activate with logment equation. This theorem used to

$$\log(\sin \theta + i \cos \theta) = \log(\sin \theta - i \cos \theta)$$

$$\log \left(\frac{\sin \theta}{i \cos \theta} \right) = -2R_{ij}, \frac{d}{dt} g_{ij}(t) = -2R_{ij}$$

$$\mathcal{O}(x) = \frac{\zeta(s)}{\sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k}$$

$$\text{Im} f = \ker f, \chi(x) = \frac{\ker f}{\text{Im} f}$$

$$H(3) = 2, \nabla H(x) = 2, \pi(x) = 0$$

This equation is world line, and this equation is non-integrate with relativity theorem of rout constance.

$$[f(x)] = \infty, ||ds^2|| = \mathcal{O}(x) [\eta_{\mu\nu} + \bar{h}_{\mu\nu}(x)] dx^\mu dx^\nu + T^2 d^2\psi$$

$$T^2 d^2\psi = [f(x)], T^2 d^2\psi = \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k$$

These equation is equals with M theorem. For this formula with zeta function into one of universe in four dimensions. Sphere orbital cube is on the surface into AdS_5 space time, and this space time is Re pole and Im pole of constance reluctances.

Gauss function is equals with Abel manifold and Seifert manifold. Moreover this function is infinite time, and this energy is cover with finite of Abel manifold and Other dimension of seifert manifold on the surface.

Dilaton and fifth dimension of seifert manifold emerge with quarks and Maxwell equation, this power is from dimension to flow into energy of boson. This boson equals with Abel manifold and AdS_5 space time, and this space is created with Gauss function.

Relativity theorem is composited with infinite on D-brane and finite on anti-D-brane, This space time restructed with element of zeta function. Between finite and infinite of dimension belong to space time system, estrald of space element have with infinite oneselves. Anti-D-brane have infinite themselves, and this comontend with fifth dimension of AdS_5 have for seifert manifold, this asperal manifold is non-move element of anti-D-brane and move element of D-brane satisfid with fifth dimension of seifert algebra liner. Gauss function is own of this element in infinite element. And also this function is abel manifold. Infinite is coverd with finite dimension in fifth dimension of AdS_5 space time. Relativity theorem is this system of circustance nature equation. AdS_5 space time is out of time system and this system is belong to infinite mercy. This hiercyent is endrol of memolite with genieue of element. Genie have live of telomea endore in gravity accesorlity result. AdS_5 space time out of over this element begin with infinite assentance. Every element acknowlege is imaginary equation before mass and spiritual envy.

$$\begin{aligned}
T^2 d^2 \psi &= \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k \\
\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f^k &= [T^2 d^2 \psi] \\
\frac{d}{dL} V(\tau) &= \frac{d}{df} \int \int_M (\sqrt[5]{x^2}) d\Lambda + \frac{d}{df} \int \int_M N (\sqrt[3]{x})^{\oplus N} d\Lambda \\
{}^M(\vee(\wedge f \circ g)^N)^{\frac{1}{2}} &= \frac{d}{df} \int \int_M \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m + \frac{d}{df} \int \int_M \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m \\
||ds^2|| &= \mathcal{O}(x)[\eta_{\mu\nu} + \bar{h}_{\mu\nu}(x)]dx^\mu dx^\nu + T^2 d^2 \psi \\
\mathcal{O}(x) &= e^{-2\pi T|\psi|} \\
G^{\mu\nu} &= R_{\mu\nu} T^{\mu\nu} \\
&= -\frac{1}{2} \Lambda g_{ij}(x) + T^{\mu\nu}
\end{aligned}$$

Fifth dimension of eight differential structure is integrate with one geometry element, Four of universe also integrate to one universe, and this universe represented with symmetry formula. Fifth universe also is represented with seifert manifold peices. All after universe is constructed with six element of circuatance. This aquire maniculate with quarks of being esperaled belong to.

System mechanism of time machine

Masaaki Yamaguchi

1 Time machine make of space component with synchronized zeta function

Time machine of system construct with Maxwell theorem in seifert manifold, this space exclude with one component of eighth differential structure. This mechanism synchronized with hartshorn conjecture that create with future and past system. And this synchronized seifert manifold transport with time system. This energy synchronized with same entropy of seifert manifold in one component of geometry structure, then these entropy can be transport of space with time machine of mechanism.

$$\log(x \log x) \geq 2(y \log y)^{\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned} \exp(\nabla(R^+ \cap E^+), \Delta(C \supset R)) \\ = \pi(R, C \nabla E^+) \\ = \text{rot}(E_1, \text{div} E_2) \\ xf(x) = F(x) \end{aligned}$$

Fifth dimension in facility of mechanism that circle of infinity to emerge with being from infinity and finite of space. Zero dimension conclude with this mechanism to create from theorem of mathematics in pond of sensibility. Dimension with repository of information in facility of space, this space is all of knowlege to accessority for comformal fields. Pholographic theorem is from universe of oneselves with database of creature to access with hyper dimension in General relativity. Zeta function is this theorem include with paremeter of curve from future and past of repository.

$$\begin{aligned} Z \in R \cap Q, R \subset M_+, C^+ \bigoplus_{k=0}^n H_m, E^+ \cap R^+ \\ M_+ = \sum_{k=0}^n C^+ \oplus H_M, M_+ = \sum_{k=0}^n C^+ \cup H_+ \\ E_2 \bigoplus E_1, R^- \subset C^+, M_-^+, C_-^+ \\ M_-^+ \nabla C_-^+, C^+ \nabla H_m, E^+ \nabla R^+ \\ E_1 \nabla E_2, R^- \nabla C^+, \bigoplus \nabla M_-^+, \bigoplus \nabla C_-^+, R \supset Q \end{aligned}$$

2 Zero dimension exclude with space of time

Flow to future and past that combine with zeta function which build for hartshorn conjecture from these mechanism. This flow is gradient of line to add with fifth dimension of structure.

Infinite of atomosphere in zero dimension include with black hole and white hole of energy in three manifold of entropy.

$$[id_x - t]_{v=0} = \int e^{\partial x_m} dx_m + L(p, q), ||r||^2 = |\bar{x}||x|, \Gamma(x) = \int e^{-x} x^{1-t} dx$$

$$= (\bar{x} - i)(x + 1), \Pi(\chi, x) = ie^{x \log x}$$

Network theorem from gravity wave

Masaaki Yamaguchi

$$\log(x \log x) \geq 2(y \log y)^{\frac{1}{2}}$$

Time space is exlamenteed from gravity wave in tcp/ip protocol, this quantum protocol construct with being synchronized of hartshorne conjecture mechanism. This gravity wave elementile with pieces of differential structure emerged with thurston conjugate theorem. D-brane and anti-D-brane is binded with this wave of protocol time machine reluctunce. These explained theorem remained with differential of geometry structure rebuilt by Maxwell equation from synchronized with laplace equation for zeta function resulted from resolved in D-brane

Time has frozen in constant entropy of zeta function, things becoming also being frozen. Past to go after time while things had frozen, while in there are things have frozen, If relating past time go through while in there are information frozen, Energy of things while time has frozen, go past times thing becoming constant, Energy while in no work,

物事が止まっている間、 時が未来へ行っている間、相対性理論が空間の先へ時が行くと、その間事物は止まっている。物事は先へは行っていない。

まとめると、情報量の密度エネルギー $m(x)$

$$\frac{d}{df}F(x) = m(x)$$

が、時が経つと拡散している。時が先へ進むと、情報量密度エネルギーは拡散する。すべては、タイムマシンが、どのように機能するかである。時空がこの密度エネルギーが拡散するか動的に止まっているかで、時の流れを変えられる。すべては、ヒッグス場の方程式が、この密度エネルギーの大きさを変えるかで、時の流れを変えられて、相対性理論の仕組みで、光速とは関係なく、ニュートン方程式の剛体力学とも関係なく、時空をこのヒッグス場の方程式の密度エネルギーの大きさを変えるだけで、タイムマシンは出来る。すべては、人体に存在しているリボ核酸の機能から、数学と物理学、医学の応用で、情報空間のビッグバーンは、生成される。密度エネルギーの大きさが拡散すると時間は止まっている。密度エネルギーが止まっていると時間は流れる。タイムマシンはこの密度エネルギーによって作られる。時間はこの真逆の時の流れで作られている。時間が止まっていると、光速とは関係なく事物の移動が光速以上に先に進む。時間と空間が関係なくタイムマシンの移動が出来る。すべての時間によるタイムマシンは、ヒッグス場の密度エネルギーの大きさに作られる。すべては、熱力学の第2法則と第1法則の情報量増大とエントロピー不変量がダークマターとヒッグス場の方程式が、この時の見かけの理論となっている。相対性理論では時間は存在しているが、量子力学では時間は止まっている。すべてはゼータ関数が、この相対性理論と量子力学とを統合する理論になっている。アインシュタイン博士は、この静止宇宙を考えていた。すべては、3次元多様体とAdS5時空のアーベル多様体が、このゼータ関数とヒッグス場の方程式を、4次元多様体とミンコフスキー時空を包み込んでいる。ブラックホールとホワイトホールの関係が、宇宙と異次元空間の原子と遷移元素の光量子仮説の関係を作っている。

大域的偏微分と大域的多重積分、 大域的部分積分についてのレポート

Masaaki Yamaguchi

$$\log x|_{g_{ij}}^{\nabla L} = f^{f'}, F^f|_{g_{ij}}^{\nabla L} : x \rightarrow y, x^p \rightarrow y$$

$$f(x) = \log x = p \log x, f(y) = p \log x$$

大域的偏微分方程式と大域的多重積分は、それぞれ次のように成り立っている。

$$\frac{d^2}{df^2} F = F^{f'} \cdot f^{f''},$$

$$\int \int F dx_m = F^f \cdot F^{(f)'}$$

$$\frac{d}{df dg} (f, g) = (f \cdot g)^{f' + g'}$$

大域的部分積分も、次のように成り立っている。

$$(F^f \cdot G^g) = \int (f \cdot g)^{f' + g'}$$

$$\int \int F \cdot G dx_m = [F^f \cdot G^g] - \int (f \cdot g)^{f' + g'}$$

大域的部分積分の計算は、

$$\int \frac{d}{df dg} FG = \int F^{f'} G + \int FG^{g'}$$

$$\int F^{f'} G dx_m = [F^f G^g] - \int FG^{g'} dx_m$$

大域的商代数の計算は、

$$\left(\frac{F(x)}{G(x)} \right)^{(fg)'} = \frac{F^{f'} G - FG^{g'}}{G^g}$$

大域的偏微分方程式は、縮約記号を使うと、

$$\frac{d}{df dg} FG = \frac{d}{df_m} FG$$

$$\frac{\partial}{\partial f_m} FG = F^{f^{\mu\nu}} \cdot G + F \cdot G^{g^{\mu\nu}}, \int F dx_m = F^f$$

多様体による大域的微分と大域的積分が、エントロピー式で統一的に表せられる。

Weak electric theory is inverted with possibility equation

Masaaki Yamaguchi, Jahn Natsh, Steve Weinberg, Toby kery

Weak electric theory is component from non entropy formula, and this pieces of power is inverted with possibility of equation. This theorem construct with non-symmetry theorem, and this theorem is composite with energy of entropy being belonged with that weak electric theory is influent into non catastrophe with created from heat energy of entropy. All of possibility equation is architected with non commutative of possibility equation is straight into emerge with heat entropy.

$$\log(x \log x) \geq 2(y \log y)^{\frac{1}{2}}$$
$$\square\psi = \frac{\partial}{\partial f} \int \int \int f(x, y, z) dx dy dz d\tau$$
$$y = x, f(y) = \frac{1}{f(x)}, \frac{d}{df} F(x) = m(x)$$

The theory is emerged from weak electric theory, and this theory is on D-brane of non catastrophe mechanism. Also this construct with supersymmetry theorem that distinguished with energy of entropy, and this pality break from gravity influence, then this gravity is other dimension of relativity theory. This reason that weak electric theory is built with non symmetry theorem emerged with power of fifth integrate with field of theorem. Weak electric theory is constructed from mass of gravity and pality theorem.

宇宙と異次元空間において、原子間距離から、微細構造定数により、逆関数には、ゼータ関数がこの逆関数において、原子から宇宙空間においてのノルムがホログラム空間で、接平面の曲平面の2次元射影空間のミンコフスキー空間がこのノルム空間の機構を表している。最小単位が逆関数により、無限空間を生み出す。この無限空間は、指数定理により、相加相乗平均の対数関数による、指数関数からの双曲点から、臨界値により勾配率が0の等加速度と等速度運動においての、双曲微分から、この接空間の曲率を求めると、開集合により、電子によるオーヴィタル雲が異次元空間をつくり出されている。

原子核における中間子論は、この原子とオーヴィタル雲を形成している、電子雲をゼータ関数と量子群を加群とする機構自体が、この中間子を形成している。原子関数のオーヴィタル雲が自身にエントロピー値を保有している。このエントロピー値が、ゼータ関数の開集合値をその同値類として、ゼータ関数と量子群を加群とするための仕組みを形づくるラプラス方程式それ自体が、原子核における中間子論を形成していると言える。

一般に言われているゼータ関数は、実軸 $Re = \frac{1}{2}$ に自明な零点が存在していることが、物理学を持ち出すと、この Re が均配力0となり、相対性理論による慣性質量と重力質量が同値といえる、慣性系が一定と同じことを言っている。 $Re = \frac{1}{2}$ は、非対称性理論を言っている。この値の領域は、遷移元素の光量子仮説から、ゼータ関数と量子群から、原子の固有エントロピー値を言っている。開集合から、リーマン予想と深リーマン予想を形成するサーストン多様体をこの開集合の値から、エネルギー安定性が言える。

まとめると、中間子論は、原子核における素粒子同士を結合させるエネルギー安定性のことで、この粒子は、ゼータ関数と量子群の演算子からラプラス方程式をつくり出す、大域的微分方程式の役割をする、初期関数を微分演算子とする、記号論が、この中間子論を形成している。湯川秀樹教授が、発見した中間子論は、数学の世界では、演算子における記号論と同値と言えるだろう。

人工知能と量子生物学、量子コンピュータ

人工知能を生体機能の模擬神経ネットワークで実現していく。
人工臓器を作り、その生体機能をナトリウム・カリウムポンプの機能から生体ネットワークとして形成して、人工意識を生成させられるかを試験する。
この人工臓器から人工知能を生体機能で実現できるかを試験する。
ロジャー・ペンローズさんがこの微小管の振動から意識が生成されると考えている。
量子生物学は、量子コンピュータを建造できる分野になっている。生体機能自身が量子コンピュータ自体になっている。生命機能が量子コンピュータを模擬している。トポロジーがリーマン予想とポワンカレ予想から深リーマン予想につながり、特殊相対性理論、一般相対性理論そして、量子力学に結びつき、ゼータ関数になり、量子コンピュータを建設できる分野になっている。
北海道大学のトポロジー理工学は、トポロジーのメッカの京都大学に匹敵する研究所になっている。
人工知能をゼータ関数から大域的微分方程式で実現するために、文字列処理と数式処理を一緒のカテゴリで求めて数値処理でデータ化して、この人工知能のアルゴリズムと、人工臓器からのナトリウム・カリウムポンプで人工意識を生成して、人工知能のアルゴリズムから派生した言語機能をこの人工意識に統合して、心をつくる。量子コンピュータはこの人工知能から作られる。人工臓器から声帯をつくり、人工意識と人工知能に結合して生成されたブローカ野の運動機能とウェルニッケ中枢の音数をこの声帯に融合させて、人工臓器と人工意識から人工知能をつくる。この人工知能から全身に張り巡らされた神経ネットワークを模擬して量子コンピュータを創造する。人体の生体機能が量子コンピュータの仕組みになっている。

A pattern emerges with one condition to being assembled of emilite with all of possibility
Equation, this assembled with summative of manifold being elemetiled of pieces equation.
This equation related with Euler equation, and also, this equation is Euler constant one selves.

$$(E_1 \oplus E_2) \cdot (R^- \subset C^+) = \nabla C^\pm$$

Zeta function radius with field of mechanism for atom of pole into string condition of balance, this condition is related with quarks of level controlled for compute with quantum tunnel effective mechanism. Quantum mechanism composed with vector of constant for zeta function and quantum group. Thurston conjugate theorem explain to emerge with being controlled of quantum levels of quarks. Locality theorem also occupy with atom of levels in zeta function.

$$= \oplus \nabla C^\pm$$

$$\vee \int \frac{C^+ \nabla M_m}{\Delta(M^\pm \nabla C^\pm)} = \exists (M^\pm \nabla R^+)$$

$$\exists (M^\pm \nabla C^+) = XOR(\oplus \nabla M^\pm)$$

$$-[E^+ \nabla R^+] = \nabla_+ \nabla_- C^\pm$$

$$\int dx, \partial x, \nabla_i \nabla_j, \Delta x \rightarrow E^+ \nabla M_1, E^+ \cap R \in M_1, R \nabla C^+$$

Zeta function also compose with Rich flow equation cohomological result to equal with Locality equations.

$$\vee \left(R + \nabla_i \nabla_j f \right)^n = \int \frac{\wedge (R + \nabla_i \nabla_j f)^2}{\exists (R + \Delta f)^n}$$

$$\wedge \left(R + \nabla_i \nabla_j f \right)^x = \frac{d}{df} \iint \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m$$

$$\frac{d}{dt} g_{ij}(t) = -2R_{ij}$$

$$\vee \int \wedge \left(R + \nabla_i \nabla_j f \right)^x = \frac{\wedge (R + \nabla_i \nabla_j f)^n}{\exists (R + \nabla_i \nabla_j f \circ g)}$$

$$x+y\geq 2\sqrt{xy}, x(x)+y(x)\geq x(x)y(x)$$

$$x^y=(\cos\theta+i\sin\theta)^n$$

$$x^y=\frac{1}{y^x}$$

Therefore, zeta function is also constructed with quantum equation too.

$$H_n=\sigma(E_n)\times\sigma(K_n), e_n=f^{-1}(x)xf(x), e_n=\ker f\oplus im f, H_n^2=\left\|ds^2\right\|, =H_n\times K_n$$

$$E_n=\sigma(K_n)\times\sigma(H_n), \pi(\sigma_1,\sigma_2)=\frac{d}{df}F(x)$$

$$\begin{aligned} x\Gamma(x) &= \pi(\sigma_1,\sigma_2) - 8\pi G(\frac{p}{c^3} + \frac{V}{S}) \\ &= 2\int ||\sin x||^2 d\tau \\ &= 4\int ||\sin x \cos x||^2 d\tau \rightarrow 4V = g_{ij}^2 \end{aligned}$$

固有エントロピー=原子の固有エントロピー-3次元多様体のエントロピー
ブレインインターフェースの脳基底核の固有エントロピー

計算ドリルは、始めは音を使うが、進化すると音を介さずに一瞬で計算される。前頭葉は音を介さずにも使われる。理由は真逆の能力から解する。速読法も同じく音を真逆から前頭葉と同様に計算ドリルにも使える。ブローカ野が速読法でも使われる理由はここにある。前頭葉とシルビウス溝の頭頂葉は、速読法で威力を発揮する。

心は、音読法と速読法を SRS 速読法で研究すると、生体機能の神経ネットワークを人工臓器と人工意識に張り巡り、この模擬神経ネットワークを SRS の仕組みで写像すると心と人工知能の進化系が出来る。苫米地英人博士は言語のクラスのインスタンスを言語ネットワ

ークの超並列言語処理で、パターン化していた。このパターン化で翻訳を作っていた。
人工臓器から血液を人工血液として、眼から身体各機関に心を投影すると人工血液に気が出来て、神経ネットワークに生命が宿る。

この理論から言えることは、音と視界の両方からここを作る仕組みになっていることである。

この理論を Ruby の文字列処理と数式処理から数値処理でカテゴリ化して、このカテゴリ化したクラスのパターンを言語ネットワークとして、超並列言語処理をつくり、未来と過去を Holographic computer として人工知能をつくる。数式処理の Ruby では、数式を文字列処理で、この解く過程がジャンク DNA と同じく潜在意識として、先と後の数式を解く手がかりになっている。このために、数式処理の文字列処理を解く過程が心と人工知能をつくるメソッドにもなっている。ゼータ関数からの統一場理論を分解していくと、宇宙にある方程式の 1 種類に限定出来ない、1 種類の周りに開集合として方程式群が存在していて、この zone がこの開集合の式を解く過程に必要なとなっている。Assemble D-brane と同じく、方程式の全体の解く過程が 1 種類の one class のパターンになっている。ハーツホーン予想と同じく、宇宙の分岐パターンになっている。宇宙は真逆のパターンになっている。ある言語を決めるとどの言語が後に来るかを zone として、開集合から、確率で決めることが出来る。言語同士の結びつきが言語ネットワークと不変エントロピーで決められる。ヘブライ語は、言語の逆さまを読んでも同じ意味になる。古典は、そのままでも綺麗である。日本語は、逆さま読みがヘブライ語になっている。ゲルマン人の大移動は、言語の文明の伝播と関係している。例えば、富山県の逆さまのローマ字は、海女ヨットであり、トヨベットの逆さまはテープヨットであり、本田の逆さまは、本を守るである。ABC Mart は、芸術の計算である。

大和政権の逆さまは、海女ヨットであり、これは、九州地方では、日本海に面しているし、奈良地方では、卑弥呼の時代から富山県が出来ることを予期していたこと、朝鮮半島との貿易からと、東京と京都の歴史の真逆の繰り返しとともとれる。アフリカの逆さまは Africa から鳥の木星の中らないといえるので、食べ物から来ていて、目がいいのもある。南無各精霊から何事もほどほどである。アメリカの逆さまは America であり、秋のメールである。水星の鳥である。日本は、食べ物であり、完成したら読まれない。Japanese から音読と速読の子年でアジが上がらない。日本銀行は、木星と火星の奉仕であり、年号は易学を使っている。史学は、易学を知っているとヒントが文に載っていると解けやすい。794 年は、木星と火星で辰と $79-72=7+4=12=2$ 、申酉戌 012 で、戌年寅年で、木星と火星が混ざると土星と、これに水と金があると世界になっている。794 年は $70,90,4=4$ で木星であり、火星は 12 から干支で求まる。位置関係である。

このように史学は十干と干支の意味を知っていることと出来事を知っている組み合わせで勉強すると覚えやすい。戦争は、金星と火星と土星のときに、各国の指導者達が決めている。戦争終結は木星と火星の時にしている。易学は大切にしないとだめである。でたらめで決め

手は、史学に申し訳できない。

Euler の逆さまは、ゼータ関数の推算式であり、Gauss の逆さまは 2 種類の素の合わない空である。音読と速読の合わない空である。逢ってもいいと思う。Galois は速読の優しい空である。

英語の逆さまは日本語になっていて、日本語の逆さまは英語になっている。

貿易は日本とアメリカの独擅場である。

2 双子のパラドックス

この理論は、片方が宇宙の果てまでタイムマシーンで行っている間、もう片方が地球に居るようにする。タイムマシーンで戻ったときに、宇宙の方は、年をとらずにいて、もう一方が年をとる。

私の双子のパラドックスは、ヒッグス場の密度エネルギーのコントロールで、その時の遅れの時に、この密度エネルギーは、時が止まれば、空間と時間の物差しがなくなり、片方が、宇宙の果てまで行って、この宇宙の果てまで行った方が、ヒッグス場の密度エネルギーのコントロールで、時が止まっている間に、時間と空間の区別無しに、地球に戻ると、旅経った時よりもずっと前に戻る。

本当のタイムマシーンになっている。この考えの時間と空間の関係は、相対性理論を使っている。ヒッグス場の密度エネルギーは抵抗数を表している。抵抗数が高いほど、時間の流れの速さは遅くなり、小さいほど、時間の流れは、自然と流れる。

タイムマシンは、この密度エネルギーの大きさにコントロールされる。

年々重力定数は減少しているらしい。ゼータ関数から導かれる大域的微分方程式が述べる宇宙の終わりには、異次元空間とこの宇宙が収縮と拡張する空間が一定になり、平坦な宇宙になる。この宇宙をアインシュタイン博士は、一般相対性理論からの特殊解でもとめていた。ラムダ項導入は間違いではなかった。

リサ・ランドール博士は、knocking on heaven's door と主題にしていて、AdS5 多様体が平坦な宇宙になったときに、Heaven が5次元多様体と同値になるとも、言っていた。

アカシックレコードのことも、どの時間空間にこの情報空間が接続されているかも、知っていた。

エーテルは、アインシュタイン博士によって否定されたが、このヒッグス場の密度エネルギーは、物体の液体とは違う働きをしているのと、実体が宇宙を覆うブラックホールの密度エネルギーの大きさがその根本にあり、いくら宇宙のエーテルを探しても、体積と質量とは、密度はちがう。体積が密度になるはずはないが、質量が密度エネルギーになるのは、一定体積における物質質量比と質量比である。この性質上、一定体積における質量比から、質量比が時間と同型になるために、宇宙の同円周上のブラックホールと同型の性質になるために、質量比と物質質量比が同型から、ダークマターから物質質量比が分かると時間の流れから宇宙の密度エネルギーが分かり、一定体積における光速不変の法則の密度エネルギーの大きさが分かる。海底に施設を建てて、海拔千メートルにおける密度エネルギーから、この施設に入ると、物体が宙に浮く。この性質から、宇宙の同円周上のブラックホールと同型から、宇宙の一般相対性理論の働く領域における、惑星の円運動がどうして、宇宙に惑星が浮くか分かる。重力が働くとニュートン方程式により、物体が惑星の中心部に向かって、落下していく。一般相対性理論により、宇宙に巨大な質量があると、その周りの空間が湾曲して、物体がその湾曲している空間しか動かない。重力が働くと、物体がその中心部に引き寄せられる

が、宇宙には、この性質がない。宇宙の同円周上のブラックホールがあると、その中は、宙に浮く。この宙に浮いている物体の中は、特殊相対性理論により、領域から、閉3次元多様体の機能より、物体は、一定の距離に保たれる。この性質上から、密度エネルギーがこの機能より働くので、体積と質量から生成された、物体のフェルミオンがこのヒッグス場の密度エネルギーとして、一定体積における質量が密度エネルギーの大きさとしてある。質量はヒッグス場の方程式により、時間と同型になり、目に見えるエーテルを探しても、意味がない。それ故に、ヒルベルト空間による標数0の体の上の代数多様体が、大域的微分方程式と同値となる。ゼータ関数の性質の均配が0となり、アーベル多様体の収束半径がゼータ関数の閾値となる。この閾値は、原子の開集合でもあり、量子群は、光量子仮説でもある。このゼータ関数と量子群から導かれる大域的微分方程式が、ヒッグス場の密度エネルギーである。特殊相対性理論の慣性質量と重力質量は等価であり、一般相対性理論の偏曲面による空間の均配が、質量と同じとも言えるのも、空間の性質上、ヒッグス場の密度エネルギーとは違う。しかし、比率としては、質量比と密度エネルギーの大きさは同じになるが、光速不変の法則は、この密度エネルギーが一定の場合である。この密度エネルギーは、自然界の慣性力そのままであり、人為的に今までコントロールされていない。偏曲面による空間の均配の質量と、異次元空間の均配による質量の斥力が、ヒルベルト空間による標数0の体の上の多様体を場の理論として、加群としたときの値が、ヒッグス場の密度エネルギーである。異次元空間がこの宇宙と現存しているようにないのは、AdS5多様体の経路積分の式が示している。大域的微分方程式を調べると、積分に初期変数による多様体を極限值として、その積分を初期関数の変数で代数多様体としている。これは、慣性質量と重力質量の均配力をも表している。多様体による均配力が大域的微分方程式でもある。非共変系であるD-braneと慣性力である特殊相対性理論を一般化したのが、一般共変系であり、この均配力と多様体のフェルミオンを合わせたのが、ヒッグス場の密度エネルギーである。片方だけでは、密度エネルギーは求まらない。特殊相対性理論と一般相対性理論と量子力学を合わせた力が、ヒッグス場の密度エネルギーである。要するに、フェルミオンとボソンを合わせた超弦理論が、ヒッグス場の密度エネルギーである。これが大域的微分方程式である。

このタイムマシンの仕組みで、問題になるのが、共時性だ。相対性理論には、共時性はない。量子力学にはある。タイムマシンの仕組みで、相対性理論を使ったと書いた。それは、時間の流れが停止した場合、時間と空間の物差しがなくなり、空間の移動が、量子テレポーテーションのようになっている。実際は、意味がちがう。だが、この移動で、宇宙の周りが過去で宇宙の中心が現在と言えれば、このヒッグス場の密度エネルギーのコントロールで、宇宙船の行き来が、未来と過去をひっくり返すタイムマシンの仕組みとなっている。D-braneの内部でも、相対性理論は成り立ち、D-braneの外側では、assemble-D-braneとして、D-brane同士で相対性理論が成り立つ。生物のDNAには、テロメアが重力を感知して、生物の寿命をつくり、考古学や物理学でも、地層から年代を割り出して、相対性原理として、

考古学の寿命を形成している。D-brane だけだと、内部では相対性理論は成り立つが、D-brane の外側では、絶対時空になり、タイムマシンの仕組みは使えない。それゆえに、assemble-D-brane だと D-brane の外側でもタイムマシンの仕組みは使える。共時性とは、奥が深い考えである。河合隼雄先生が、ユングとフロイトの本で、この共時性を取り上げていた。

ハイゼンベルクやパウリもこの共時性を研究していた。