

Differential dimension in quantum level of space emerged with extern of Glois group

Differential geometry in emerging with quantum space. This singularity of mass from being decomposed with fermion and boson, straight flow to boson creating at dark matter exert in universe and other dimension. This system is creating from universe of structure in fermion.

$$K_{mn} = E_n \times H_n$$

Hilbert space in creating with quantum space. Planck level relativity of quantum space.

$$\bigoplus \frac{M_p}{\nabla L} = \frac{\partial}{\partial L} V(\tau)$$

$$\Psi H = M_p$$

$$\frac{d}{df} F = \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m + \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m$$

$$\frac{d}{dl} V(\tau) = -\frac{2R_{ij}}{\delta T}$$

This mass of gravity equation is equals with mass of accesority. And also this dimension of Glois group is equals with universe and other dimensions. Twelve particles of being constructed in singularity of component from complex manifold, this singularity pieces in AdS5 dimension are paired with other dimensions from Mebius space. Rolents atractor in singularity is created with super symmetry theorem. This equation is resembled with Gamma function and Beta function.

$$\frac{d}{dt} g_{ij} = -2R_{ij}$$

D-brane out of volume space are existing with hyper dimension assemble of space. This dimensions is positive fermion and boson in Mebius space. And moreover this space is positive in D-brane and anti-D-brane.

$$E^2 = m^2 c^4$$

$$R_{\mu\nu} + g_{\mu\nu} \Lambda = 4\pi G \rho$$

These equation is proof with super Langrans conjecture.

拝啓

忙しいと存じていますが、失礼します。1999年に微分積分の本について、ソースコードミスを手紙で失礼しましたことを恥ずかしく思います。最近になって読み返していると Γ 関数と β 関数で可積分系に触れて、 ζ 関数が、アーベル多様体を母関数として、そして、この領域を有限と無限を極限值にして、オイラー数に行きつくことを本書で締めくくっていることに、この本は今までの微分積分の本と違うとわかりました。この本がきっかけで非相対論的量子力学による経路積分で表現していた方程式が ζ 関数を使い、ペレルマンさんが論文でこの関数に触れていたことに出会いました。ペレルマンさんは、閉3次元多様体を解析するのに、熱力学のエントロピーを使っていたが、 ζ 関数を使えば、私の目論んでいることに使えます。この宇宙は8種類の微分幾何構造が共鳴して1種類の閉3次元多様体になっていることをペレルマンさんが論文で表現していました。このエントロピー不変量が ζ 関数と同等ということを使えば、エタール・コホモロジーやスタンダード予想、ほとんどすべての数式がこの式から導けると私は考えています。この私の目指している群論は、ある時空間をこの圏が形を成して、その領域をいろんな関数が物理学の方程式として3次元構造として、いろいろな現象を示しているといえます。増田幹也さん、加藤十吉さん、堀田良之さん、佐藤文隆さん、雪江昭彦さん、小寺平治さん、竹内薫さん、今まで読んできた著者の人たちが、私に恩恵をくれました。10年以上をこの本が私に恩恵をくれました。ありがとうございます。

敬具

$$\begin{aligned}\Gamma(x) &= \int e^{-x} x^{1-t} dx, \beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx \\ &= - \int_1^0 (1-t)^{p-1} t^{q-1} dt \\ 0 &< \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1+k)^2} < \int_M^N \frac{1}{n^2}\end{aligned}$$

収束半径が1の整級数

$$\begin{aligned}F(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \\ x=1 &\rightarrow 1 \lim_{x=0} f(x) = \alpha \\ V(\tau) &= \tau(q)^{-\frac{n}{2}} \exp \int \left(-\frac{1}{\sqrt{2\tau(q)}} L(x) dx \right) + O(N^{-1}) \\ \frac{d}{df} F(x) &= 2 \int \frac{(R + |\nabla f|^2)}{-(R + \Delta f)} e^{-f} dV\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\pi(\chi, x) &= i\pi(\chi, x) \circ f(x) - f(x) \circ \pi(\chi, x) \\ \chi(3) &= (-1)^3 < |a_0 a_1 a_2 a_3| > + (-1)^2 < |a_0 a_1 a_2|, |a_1 a_2 a_3|, |a_0 a_1 a_3| > \\ &\quad + (-1)^1 < |a_1 a_2, a_0 a_2, a_2 a_3| > + (-1)^0 < a_0, a_1, a_2, a_3 >\end{aligned}$$

この式は $\chi(3) \rightarrow 0$, 初めは Z かともおもってしまいました。

$$\begin{aligned}H_n(x) &= \frac{\ker f}{\operatorname{im} f} \\ \chi(x) &= r(H_n(x)) \\ \chi(3) &= H_3(x) \rightarrow 0 \\ H_3(\Pi) &= Z\end{aligned}$$

これらから微分幾何学が必要ということらしいと最近気づきました。

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k p_k = \alpha$$

岡本和夫先生だけでなく、小寺平治さん、和田淳蔵さん、須之内治男さんにも同じような手紙を出していました。和田淳蔵さんと須之内治男さんの本で非分化と非退化のカタストロフの理論を知りました。三重積分でニュートンポテンシャルエネルギーまでも書いていました。小寺平治さんの本で、ヤコビアンとクラメルの公式、全射と単射、行列の基本を学びました。相空間で線形加速器の軌道の原理まで書いていました。共振回路までも書いていました。岡本和夫先生の微分積分の本を読み直していると、行列式を Γ 関数と β 関数の導出に使っていたことに、SRSを斎藤孝さんの本を学んでよかったと、本はきちんと読まなければいけないとつくづくおもいました。本当にすみませんでした。リサ・ランドール博士はすごすぎます。5次元多様体としての有限値のザイフェルト多様体に、一般相対性理論とニュートン方程式を収率として、異次元空間とフロベニウスの定理で3次元多様体の次元をずらして、無限値である重力と反重力を、次元を平坦の領域の値として、異次元空間がこの周りのザイフェルト多様体へと収束している。そして、宇宙が平坦とし、反重力であるラムダ項をこのザイフェルト多様体はあらわしている。ミンコフスキー値と複素多様体を3次元多様体として、5次元多様体をザイフェルト多様体、すなわち、アーベル多様体がこの宇宙と異次元空間の周りを包み込んでいる。この3次元多様体が、時間と空間のエントロピー不変の値に定数としてもとまる。有限時空が無限値の宇宙と異次元を包み込んでいる。そのうえに、不確定性原理が、異次元空間と宇宙によるラプラス方程式であるミンコフスキー値とその次元をずらした複素多様体により、相加相乗平均として、確定値を求めることができる。その証明に量子加速器で原子をエネルギーで衝突させると、真空エネルギーがこの宇宙から異次元に移動する。閉3次元多様体に2次元射影空間が共存できない。このことから、宇宙と異次元空間が5次元多様体、ザイフェルト多様体の内部に収められている。原子と反粒子が宇宙と異次元空間で1種類の微分幾何構造に存在している。異次元空間が宇宙での不確定性原理の仕組みを解く。5次元多様体が真空エネルギーを収める重要な原理になっている。収められなかったら、この宇宙は消えている。

非対称性理論における、複素多様体の AdS_5 時空を構成している超対称性素粒子は、閉 3 次元多様体をフェルミオンとボソンの慣性質量と重力質量を元として宇宙の生成元として、ヒッグス場の源になっている。ゼータ関数と対極する量子群は、この右巻きと左巻きの非可換確率方程式として、非可換代数多様体を、大域的微分方程式の場として、D-brane と anti-D-brane のメビウス空間の assemble-D-brane を生成している。微分幾何の量子化は、ウィークスケールのプランク質量の対極するゼータ関数と量子群を同じく表している。階層性理論は、層の理論を量子力学の粒子と波動の二重性を端的に表している。エネルギーと物体としての理論を力学的エネルギーの保存則として、物理の源になっている。物質波と波動関数をこの二重性は言い当てている。

$$||ds^2|| = e^{-2\pi T|\psi|}[\eta + \bar{h}_{\mu\nu}]dx^\mu dx^\nu + T^2 d^2\psi$$

$$\bigoplus \frac{M_p}{\nabla L} = \frac{d}{df} F(x)$$

$$\Psi H = M_p$$

$$\frac{d}{df} F = \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m + \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m$$

$$C=\int\int\frac{1}{(x\log x)^2}dx_m$$

$$E^2=m^2c^4, R_{\mu\nu}+g_{\mu\nu}\Lambda=4\pi G\rho$$

$$||ds^2||=8\pi G\left(\frac{p}{c^3}+\frac{V}{S}\right)$$

$$V(\tau)=\square\int\int\int_M(f(x,y,z)dx dy dz)'dL$$

ゼータ関数から言うと、エネルギーと物体はボソンとフェルミオンの関係として物理学の元の要素になっている。ヒッグス場は、この要素のスピンール場としてハーツホーン予想から、時空と生命そして、物質が生成されて、重力波が超ラングランズ予想の結果、4種類の力学、正確に言うと、5種類の力学から統合された結果、ゼータ関数として、重力が全部の力の代表となっている。

不確定性原理は、宇宙と異次元を観測値から、エネルギー不変量として答えられる。位置を特定すると確率を解して不確定性から、異次元とペアーになっているから、位置と運動量は運動量保存則から、エントロピー不変量で確率としての値になっている。ベクトル値はこの理由から一次独立としてのハーツホーン予想か

ら、楕円軌道として、宇宙と異次元を構成している閉3次元多様体から絶対値が2種類の世界から求められる。アインシュタイン博士が確率ではないと言っていたのは、相加相乗平均は確率のようで確率ではないからである。

$$\log(x \log x) \geq 2(y \log y)^{\frac{1}{2}}$$

$$r = \frac{d}{1 + e \cos \theta}$$

$$x^n + y^n = z^n$$