

時間計量の微分変数についての大域的微小量の表し方

Masaaki Yamaguchi

重力場理論の式は、Gravity equation is

$$\square = -\frac{16\pi G}{c^4}T^{\mu\nu}$$

This equation quoted with being logment of formula, and this formula divided with universe of number in prime zone, therefore, this dicided with varint equation is monotonicity of being composited with Weil's theorem united for Gamma function. この式は、対数を宇宙における数により求める素数分布論として、この大域的積分分断多様体がガンマ関数をヴェイユ予想を根幹とする単体量として決まることに起因する商代数として導かれる。

$$\cancel{\Box} = \frac{8\pi G}{c^4} T^{\mu\nu} / \log x$$

$${}^t\text{f}\text{f}\text{f}\text{f}\text{cohomD}_\chi[\text{I}_m]$$

$$= \oint (px^n + qx + r)^{\nabla l}$$

$$\frac{d}{dl}L(x, y) = 2 \int ||\sin 2x||^2 d\tau$$

$$\frac{d}{d\gamma}\Gamma$$

この関数は大域的微分多様体としてのアカシックレコードの合流地点として、タプルスペースを形成している。This function esterminate with acasic record of global differential manifolds.

$$= [i\pi(\chi, x), f(x)]$$

それにより、この多様体は基本群をアカシックレコードの相対性としての存在論の実存主義から統合される多様体自身としてのタプルスペースの池になっている。And this manifold from fundamental group estermine with also this manifold estimate relativity of acasic record.

$$\frac{d}{d\gamma}\Gamma = \int C dx_m = \int (\int \frac{1}{x^s} dx - \log x) \text{dvol}$$

また、このアカシックレコードはオイラーの定数のラムダドライバーにもなっている。More also this record tupled with lake of Euler product.

$$\bigoplus (i\hbar \nabla)^{\oplus L}$$

$$x^{\frac{1}{2}+iy} = e^{x \log x}$$

それゆえに、この定数はゼータ関数と微分幾何の量子化を因数にもつ素因子分解の式にもなっている。Therefore, this product also constructed with differential geometry of quantum level equation and zeta function.

$$= C$$

そして、この関数はオイラーの定数から広中平祐定理による4重帰納法のオイラーの公式からの多様体積分へのサーストン空間のスペクトラム関数ともなっている。And this function of Euler product respectrum of focus with Heisuke Hironaka manifold in four assembled of integral Euler equation..

$$C = b_0 + \frac{c_1}{b_1 + \frac{c_2}{b_2 + \frac{c_3}{b_3 + \frac{c_4}{b_4 + \dots}}}}$$

この方程式は指数による連分数としての役割も担っている。This equation demanded with continued number of step function.

$$x^{\frac{1}{2}+iy} = e^{x \log x}$$

$$(2.71828)^{2.828} = a^{a+b^{b+c^{c+d^{d \dots}}}}$$

$$= \int e^f \cdot x^{1-t} dx$$

This represent is Gamma function in Euler product. Therefore this product is zeta function of global differential equation.

$$\begin{aligned} \frac{d}{df} F(v_{ij}, h) &= \int e^{-f} dV [-\Delta v + \nabla_i \nabla_j v_{ij} - R_{ij} v_{ij} - v_{ij} \nabla_i \nabla_j + 2 \langle \nabla f, \nabla h \rangle + (R + \nabla f^2) (\frac{v}{2} - h)] \\ &= \frac{d}{df} F = \frac{2 \int (R + \nabla_i \nabla_j f)^2}{-(R + \Delta f)} dm \end{aligned}$$

これらの方程式は8種類の微分幾何の次元多様体として、そして、これらの多様体は曲平面による双対性をも生成している。そして、このガウスの曲平面は、大域的微分多様体と微分幾何の量子化から素因数を形成してもいる。These equation are eight differential geometry of dimension calyement. And these calyement equation excluded into pair of dimension surface. This surface of Gauss function are global differential manifold, and differential geometry of quantum level.

$$F \geq \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m + \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m$$

微分幾何の量子化はオイラーの定数とガンマ関数が指数による連分数としての不変性として素因数を形成していて、このガウスの曲平面による量子力学における重力場理論は、ダランベルシアン of 切断多様体がこの大域的切断多様体を付加してもいる。Differential geometry of quantum level constructed with Euler product and Gamma function being discatastrophed from continued fraction style. Gravity equation lend with

variant of monotonicity of level expressed from gravity of letter variant formula. これらの方程式は基本群と大域的微分多様体をエスコートしていてもいて、ヴェイユ予想がこのダランベルシアン of the cut-off equationたちから輸送のポートにもなっている。ベータ関数とガンマ関数がこれらのフォームラの方程式を放出してもいて、結果、これらの方程式は広中平祐定理の複素多様体とグリーシャ教授によるペレルマン多様体からサポートされてもいる。この 2 名の教授は、一つは抽象理論をもう一方は具象理論を説明としている。These equation escorted into Global differential manifold and fundamental equation. Weil's theorem is imported from this equation in gravity of letters. Beta function and Gamma function are excluded with these formulas. These equation comontius from Heisuke Hironaga of complex manifold and Gresha professor of Perelman manifold. These two professors are one of abstract theorem and the other of visual manifold theorem.

ガンマ関数についての大域的積分多様体は、単体量の時間計量に、 Σ_m を微分変数の微小量に使う

$$T^{\mu\nu}T^{\mu\nu} = \int T^{\mu\nu}\Sigma_m$$

$$T^{\mu\nu}T^{\mu\nu} = \int T^{\mu\nu}\Sigma_m$$

ガンマ関数についての大域的微分多様体は

$$T^{\mu\nu}T^{\mu\nu'} = \int T^{\mu\nu}dx_m$$

$$\Gamma^{\gamma'} = \frac{d}{d\gamma}\Gamma$$

大域的積分多様体は

$$\Gamma^{\gamma} = \int \Gamma dx_m$$

この x の x 乗の大域的積分多様体は

$$\Sigma = \int x^x dx_m$$

一般相対性理論の多様体積分が $T^{\mu\nu}T^{\mu\nu}$ と表せられて

$$T^{\mu\nu}T^{\mu\nu} = \int T^{\mu\nu}\Sigma_m$$

$$T^{\mu\nu}T^{\mu\nu'} = \int T^{\mu\nu}dx_m$$

$$\Gamma^{\gamma'} = \frac{d}{d\gamma}\Gamma$$

$$\Gamma^{\gamma} = \int \Gamma dx_m$$

$$\Sigma = \int x^x dx_m$$

x の x の冪乗の積分についての微小量として、使われる

$$T = \int \Gamma(\gamma)' dx_m$$

Jones 多項式についてのフェルマーの定理と同型であり、

$$\frac{d}{d\mathcal{T}} T^{\mu\nu} = \frac{d}{d\mathcal{T}} \int T dx_m$$

ここで、ガンマ関数における大域的部分積分多様体の特異点方程式は

$$||ds^2|| = \int [T] dx_m$$

と特異点の方程式は、ガウス記号を使う

これらをまとめると、次の式たちにまとめられることができる

$$\begin{aligned} &= \int \frac{\Gamma(\gamma)'}{h\nu} dx_m \\ &= \int \frac{\Gamma(\gamma)'}{x \log x} dx_m \\ &= d\bar{\mathcal{X}}_m \\ &\frac{d}{d\mathcal{T}} \int T^{\mu\nu} dx_m \\ &= \frac{d}{d\mathcal{T}} T^{\mu\nu} \end{aligned}$$

波動関数の波長は、光量子仮設で対数を同型として

$$\lambda = h\nu$$

これから、対数が

$$\sqrt{g} = 1 = \frac{1}{\log x}$$

と、ゼータ関数と関係していると言える

$$y = x - a, g = \log x = \log a$$

差関数は

$$x = a$$

この数値たちは、対数関数で

$$\begin{aligned} a &= \frac{a}{\log a} = 1 = \frac{1}{\log a} \\ &= \sqrt{g} = 1 \end{aligned}$$

と、ゼータ関数の基盤になっていてゼータ関数を対数と指数関数とで表せると

$$x^{\frac{1}{2}+iy} = x^{\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dx_y}$$

ベータ関数として

$$\frac{L^{n+1}}{n+1} = \int x^{1-t} t^{x-1} dt$$

$$\beta(p, q)$$

ゼータ関数は、

$$\frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(y \log y)^{\frac{1}{2}}} dy_m \geq \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{df} F &= F^{f'} \\ &= e^{x \log x} \end{aligned}$$

フェルマーの定理としての、大域的積分多様体は

$$\begin{aligned} \int F dx_m &= e^{2x \log x} \\ = F^f &= e^{x \log x} + e^{-x \log x} \geq e^{2x \log x} \\ x^{x \log x} &= x^{x^x} \end{aligned}$$

全数値は、直線体であり、

$$2^2 \cong 3^3 \cong 5^5 \cong 7^7 \cong 11^{11} \cong 13^{13} \cong 17^{17} \cong 23^{23}$$

冪乗が対数として

$$\begin{aligned} x^x &= a, x \log x = \log a, x = \frac{\log a}{\log x} \\ x &= \log \frac{a}{x} \\ \sqrt{g} &= 1, \sqrt{a} = x, x = y^0, x^x = e^{x \log x} \end{aligned}$$

と、ゼータ関数になり

$$\begin{aligned} a &= \frac{a}{\log a} = 1 = \frac{1}{\log a} \\ x^x &= a, e^x = a^L = \frac{1}{x}, x \rightarrow \infty \rightarrow 0 \\ e^{-f} dV &= \frac{f}{\log x} \end{aligned}$$

これらの式たちは、ゼータ関数への導く式たちである

$$\delta \int (L - \frac{1}{2\kappa} R) \sqrt{g} d^4 x = 0$$

$$R^{\mu\nu} = -\kappa (T^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} T)$$

$$R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R = -\kappa T^{\mu\nu}$$

$$(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R)_{i\nu} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha} (g^{\alpha\beta} \frac{\partial \log \sqrt{g}}{\partial x^\beta}) = -\kappa T$$

これらの式は、次の式たちへに行く

$$\begin{aligned}\Box\Psi &= -\frac{16\pi G}{c^4}T^{\mu\nu} \\ &= \frac{\Box\Psi}{\log x} = \frac{d}{df}\int\int\frac{1}{(y\log y)^{\frac{1}{2}}}dy_m\end{aligned}$$

$$\not\Box=\frac{8\pi G}{c^4}T^{\mu\nu}/\log x$$

$$\begin{aligned}&{}^t\overline{\mathop{\mathrm{f}}\nolimits\mathop{\mathrm{f}}\nolimits\mathop{\mathrm{f}}\nolimits\mathop{\mathrm{f}}\nolimits}\mathrm{cohomD}_\chi[\mathrm{I}_\mathrm{m}]\\&= \oint (px^n+qx+r)^{\nabla l}\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dl}L(x,y)=2\int ||\sin 2x||^2d\tau$$

$$\frac{d}{d\gamma}\Gamma$$