

2 次元 Ising 模型の厳密解

目次

1 計算公式	2
2 2 次元 ising 模型の分配関数	44
3 線型空間の一般論	47
4 線型写像の $\exp$	63
I 対角化の計算 (ホロノミック量子場付録 B)	73
5 転送行列	73
6 $e^X Y e^{-X} = e^{\text{ad}(X)}(Y)$ の証明	104
7 Z と Y の反交換関係	118
8 $\hat{Z}$ と $\hat{Y}$ の反交換関係	128
9 $T_{V_1}(\hat{Z})$ と $\hat{Z}, \hat{Y}$ の関係	130
10 定数 c の決定と V の固有値	197
11 分配関数の転送行列とパウリ行列表示の同一視	221
12 転送行列の最大固有値と分配関数の挟み撃ち	236
13 自由エネルギーと熱力学極限	249
14 偶セクターの半整数運動量モード	256
15 偶セクターの転送行列の共役作用	271
16 半整数運動量における $A(\tilde{\theta})$ の対角化	288
17 半整数運動量のフェルミオンと $V^{(+)} = c \check{V}'$	298
18 定数 c の決定と $V^{(+)}$ の固有値	311
19 $c_+(M)$ の決定と Onsager の自由エネルギー	330
20 最大固有値はどちらのセクターから来るか: $c(M) = c_+(M)$	350
21 臨界点と比熱の対数発散	354

1 計算公式

定義 1.1 (双曲線余弦と双曲線正弦). $x \in \mathbb{R}$ に対して、実数値の指数関数を使い

$$\cosh x := \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2}, \quad \sinh x := \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2}$$

と定める。

定義 1.2 (集合と代数構造の記号). 自然数・整数・実数の集合そのものはこの論文では構成せず、既知の集合としてそれぞれ $\mathbf{N}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{R}$ と書く。演算を持たない集合の記号と、演算を持つ代数構造の記号を区別する。

$$\mathbf{N} := (\mathbf{N}, +_{\mathbf{N}}, \cdot_{\mathbf{N}}, 0_{\mathbf{N}}, 1_{\mathbf{N}}, \leq_{\mathbf{N}}),$$

$$\mathbf{Z} := (\mathbf{Z}, +_{\mathbf{Z}}, \cdot_{\mathbf{Z}}, 0_{\mathbf{Z}}, 1_{\mathbf{Z}}, \leq_{\mathbf{Z}}),$$

$$\mathbf{R} := (\mathbf{R}, +_{\mathbf{R}}, \cdot_{\mathbf{R}}, 0_{\mathbf{R}}, 1_{\mathbf{R}}, \leq_{\mathbf{R}}).$$

各演算と順序の所属は次のとおりである。

$$+_{\mathbf{N}}, \cdot_{\mathbf{N}} : \mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N},$$

$$+_{\mathbf{Z}}, \cdot_{\mathbf{Z}} : \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z},$$

$$+_{\mathbf{R}}, \cdot_{\mathbf{R}} : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R},$$

$$\leq_{\mathbf{N}} \subset \mathbf{N} \times \mathbf{N}, \quad \leq_{\mathbf{Z}} \subset \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}, \quad \leq_{\mathbf{R}} \subset \mathbf{R} \times \mathbf{R}.$$

$\mathbf{N}$ は自然数の半環、 $\mathbf{Z}$ は整数環、 $\mathbf{R}$ は順序体を表す。たとえば $n \in \mathbf{Z}$ は厳密には $n \in \mathbf{Z}$ の略記であり、計算式中の $a + b$ は所属が $a, b \in \mathbf{Z}$ なら $a +_{\mathbf{Z}} b$ 、所属が $a, b \in \mathbf{R}$ なら $a +_{\mathbf{R}} b$ の略記とする。積、零元、単位元についても同様に、所属する代数構造の添字を省略した略記である。

$\mathbf{Z}_{\geq k}$ 、 $\mathbf{R}_{\geq 0}$ などは代数構造そのものではなく、その台集合から順序条件で切り出した部分集合の略記とする。たとえば

$$\mathbf{Z}_{\geq k} := \{n \in \mathbf{Z} \mid k \leq_{\mathbf{Z}} n\}, \quad \mathbf{R}_{\geq 0} := \{x \in \mathbf{R} \mid 0_{\mathbf{R}} \leq_{\mathbf{R}} x\}.$$

複素数の台集合と演算を持つ構造 $\mathbf{C}$ はここでは定義せず、後の 定義 1.11 で $\mathbf{R}^2$ に加法と乗法を入れて定義する。

定理 1.3 ($\cosh, \sinh$ の掛け算). 定義 1.1 の記号を用いる。

$$\forall a, b \in \mathbf{R}$$

$$\begin{aligned} \cosh(a) \sinh(b) &= \frac{1}{2} (\sinh(a+b) - \sinh(a-b)) \\ \cosh(a) \cosh(b) &= \frac{1}{2} (\cosh(a+b) + \cosh(a-b)) \end{aligned}$$

証明. 1 つめの等式。

$$\begin{aligned} \cosh(a) \sinh(b) &= \frac{\exp(a) + \exp(-a)}{2} \frac{\exp(b) - \exp(-b)}{2} && (\because \cosh, \sinh \text{ の定義}) \\ &= \frac{1}{4} ((\exp(a) \exp(b) - \exp(-a) \exp(-b)) - (\exp(a) \exp(-b) - \exp(-a) \exp(b))) && (\because \text{分配則}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\exp(a+b) - \exp(-(a+b))}{2} - \frac{\exp(a-b) - \exp(-(a-b))}{2} \right) && (\because \exp(s) \exp(t) = \exp(s+t) \text{ を 4 箇所へ}) \\ &= \frac{1}{2} (\sinh(a+b) - \sinh(a-b)) && (\because \sinh \text{ の定義}) \end{aligned}$$

2 つめの等式。

$$\begin{aligned}
\cosh(a) \cosh(b) &= \frac{\exp(a) + \exp(-a)}{2} \frac{\exp(b) + \exp(-b)}{2} & (\because \cosh \text{ の定義}) \\
&= \frac{1}{4} ((\exp(a) \exp(b) + \exp(-a) \exp(-b)) + (\exp(a) \exp(-b) + \exp(-a) \exp(b))) & (\because \text{分配則}) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{\exp(a+b) + \exp(-(a+b))}{2} + \frac{\exp(a-b) + \exp(-(a-b))}{2} \right) & (\because \exp(s) \exp(t) = \exp(s+t) \text{ を 4 箇所へ}) \\
&= \frac{1}{2} (\cosh(a+b) + \cosh(a-b)) & (\because \cosh \text{ の定義})
\end{aligned}$$

□

主張 1.4 ($\cosh$, $\sinh$ の基本性質). 定義 1.1 の $x \in \mathbb{R}$ における値について、次が成り立つ。

- (1) $\cosh x - \sinh x = \exp(-x) > 0$ かつ $\cosh x + \sinh x = \exp(x) > 0$ 。特に $\cosh x > 0$ かつ $\cosh x > \sinh x$ 。
- (2) $(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 = 1$ 。
- (3) $x > 0$ ならば $\cosh x > \sinh x > 0$ 。
- (4) $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ について $a^2 = b^2 \iff a = b$ 。

ここで $\exp$ については、実数の指数関数の基本性質として $\exp(x) \exp(y) = \exp(x+y)$ 、 $\exp(0) = 1$ 、 $\exp(x) > 0$ 、および $\exp$ が狭義単調増加であること ($x < y \Rightarrow \exp(x) < \exp(y)$) のみを用いる。

証明. (1) の証明。

$$\begin{aligned}
\cosh x - \sinh x &= \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} - \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} & (\because \cosh, \sinh \text{ の定義}) \\
&= \frac{(\exp(x) + \exp(-x)) - (\exp(x) - \exp(-x))}{2} & (\because \text{分母の等しい分数の差}) \\
&= \frac{2 \exp(-x)}{2} & (\because \text{分子の整理}) \\
&= \exp(-x) & (\because \text{約分})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cosh x + \sinh x &= \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} + \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} & (\because \cosh, \sinh \text{ の定義}) \\
&= \frac{(\exp(x) + \exp(-x)) + (\exp(x) - \exp(-x))}{2} & (\because \text{分母の等しい分数の和}) \\
&= \frac{2 \exp(x)}{2} & (\because \text{分子の整理}) \\
&= \exp(x) & (\because \text{約分})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cosh x - \sinh x &= \exp(-x) & (\because \text{上の第 1 式}) \\
&> 0 & (\because \exp \text{ の正値性})
\end{aligned}$$

$$\cosh x - \sinh x > 0 \implies \cosh x > \sinh x \quad (\because \text{両辺に } \sinh x \text{ を加える})$$

$$\begin{aligned}
2 \cosh x &= (\cosh x - \sinh x) + (\cosh x + \sinh x) & (\because \text{右辺の整理}) \\
&= \exp(-x) + \exp(x) & (\because \text{上の 2 式}) \\
&> 0 & (\because \exp \text{ の正値性})
\end{aligned}$$

$$2 \cosh x > 0 \implies \cosh x > 0 \quad (\because \text{両辺を } 2 > 0 \text{ で割る})$$

(2) の証明。

$$\begin{aligned}
 (\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 &= (\cosh x - \sinh x)(\cosh x + \sinh x) & (\because 2 \text{ 乗の差の因数分解}) \\
 &= \exp(-x) \exp(x) & (\because (1) \text{ の } 2 \text{ 式}) \\
 &= \exp(-x + x) & (\because \exp(x) \exp(y) = \exp(x + y)) \\
 &= \exp(0) & (\because -x + x = 0) \\
 &= 1 & (\because \exp(0) = 1)
 \end{aligned}$$

(3) の証明。

$$x > 0 \implies -x < 0 \quad (\because \text{両辺に } -1 < 0 \text{ を掛けると不等号の向きが反転する})$$

$$x > 0 \implies 0 < x \quad (\because \text{同じ不等式の左右を入れ替える})$$

$$\begin{aligned}
 \exp(-x) &< \exp(0) & (\because \exp \text{ が狭義単調増加で } -x < 0) \\
 &= 1 & (\because \exp(0) = 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1 &= \exp(0) & (\because \exp(0) = 1) \\
 &< \exp(x) & (\because \exp \text{ が狭義単調増加で } 0 < x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \exp(-x) < 1 < \exp(x) &\implies \exp(-x) < \exp(x) & (\because \mathbb{R} \text{ の順序の推移律}) \\
 &\implies \exp(x) - \exp(-x) > 0 & (\because \text{両辺に } -\exp(-x) \text{ を加える})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sinh x &= \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} & (\because \sinh \text{ の定義}) \\
 &> 0 & (\because \text{正の実数を } 2 > 0 \text{ で割った値は正})
 \end{aligned}$$

$$\cosh x > \sinh x \wedge \sinh x > 0 \implies \cosh x > \sinh x > 0 \quad (\because (1) \text{ と直前の不等式})$$

(4) の証明。両方向を別々に示すので、ここは一続きの式にしない。

$$a = b \implies a^2 = b^2 \quad (\because \text{等しい実数を二乗しても等しい})$$

逆に $a^2 = b^2$ とする。

$$\begin{aligned}
 (a - b)(a + b) &= a^2 - b^2 & (\because 2 \text{ 乗の差の因数分解}) \\
 &= 0 & (\because a^2 = b^2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a > 0 \wedge b > 0 &\implies a + b > 0 & (\because \text{正の実数の和は正}) \\
 &\implies a + b \neq 0 & (\because \text{正の実数は } 0 \text{ でない})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (a - b)(a + b) = 0 \wedge a + b \neq 0 &\implies a - b = 0 & (\because \mathbb{R} \text{ は整域}) \\
 &\implies a = b & (\because \text{両辺に } b \text{ を加える})
 \end{aligned}$$

□

主張 1.5 (非負実数の平方根の存在と一意性). $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について、

$$y \in \mathbb{R}_{\geq 0} \wedge y^2 = x$$

を満たす y がただ一つ存在する。

証明. ここで初めて非可算集合 $\mathbb{R}$ の完備性 (上限性質) へ移行する。すなわち、以下では $\mathbb{R}$ が「上に有界で空でない部分集合が必ず上限 (最小上界) をもつ順序体」であるという性質を使う。有理数体 $\mathbb{Q}$ はこの性質をもたない ($x = 2$ のとき $y^2 = 2$ なる $y \in \mathbb{Q}$ は存在しない) ので、存在の主張は $\mathbb{R}$ へ移行しなければ成り立たない。一方、一意性は順序体の代数だけで示せる。

一意性。 $y_1, y_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ がともに $y_1^2 = x$ 、 $y_2^2 = x$ を満たすとする。

$x = 0$ の場合と $x > 0$ の場合に分ける。

$x = 0$ のとき。

$$\begin{aligned} y_1^2 &= x \quad (\because y_1 \text{ の仮定}) \\ &= 0 \quad (\because \text{いまの場合分け}) \end{aligned}$$

であり、 $\mathbb{R}$ は整域だから $y_1 = 0$ である。 y_2 についても同じ議論で $y_2 = 0$ なので $y_1 = y_2$ である。

$x > 0$ のとき。まず $y_1 > 0$ である。実際 $y_1 = 0$ と仮定すると

$$\begin{aligned} x &= y_1^2 \quad (\because y_1 \text{ の仮定}) \\ &= 0^2 \quad (\because \text{仮定 } y_1 = 0) \\ &= 0 \quad (\because 0 \text{ の冪}) \end{aligned}$$

となり $x > 0$ に矛盾する。 $y_1 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ なので $y_1 > 0$ である。 y_2 についても同じ議論で $y_2 > 0$ である。

$$\begin{aligned} y_1^2 &= x \quad (\because y_1 \text{ の仮定}) \\ &= y_2^2 \quad (\because y_2 \text{ の仮定}) \end{aligned}$$

と主張 1.4 (4) ($a, b \in \mathbb{R}_{> 0}$ について $a^2 = b^2 \iff a = b$) より $y_1 = y_2$ である。

存在。 $x = 0$ のときは $y := 0$ と置けば $y \geq 0$ であり、

$$\begin{aligned} y^2 &= 0^2 \quad (\because y \text{ の定め方}) \\ &= 0 \quad (\because 0 \text{ の冪}) \\ &= x \quad (\because \text{いまの場合分け}) \end{aligned}$$

を満たす。以下 $x > 0$ とし、

$$S := \{ s \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid s^2 \leq x \} \subset \mathbb{R}$$

とおく。 $0 \in S$ を確かめると、

$$\begin{aligned} 0^2 &= 0 \quad (\because 0 \text{ の冪}) \\ &\leq x \quad (\because x \in \mathbb{R}_{\geq 0}) \end{aligned}$$

より $S \neq \emptyset$ 。また $1+x$ は S の上界である。実際、 $s \in S$ かつ $s > 1+x$ と仮定すると、

$$s > 1+x \wedge 1+x > 1 \implies s > 1 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の順序の推移律。 } 1+x > 1 \text{ は } x > 0 \text{ による})$$

であり、

$$\begin{aligned} s^2 &= s \cdot s \quad (\because 2 \text{ 乗の定義}) \\ &> (1+x) \cdot 1 \quad (\because s > 1+x > 0 \text{ と } s > 1 > 0, \text{ 順序体の乗法の単調性}) \\ &= 1+x \quad (\because 1 \text{ は乗法の単位元}) \\ &> x \quad (\because 1 > 0) \end{aligned}$$

となり $s^2 \leq x$ に矛盾する。よって S は空でなく上に有界であるから、 $\mathbb{R}$ の上限性質により $y := \sup S \in \mathbb{R}$ が定まる。 $0 \in S$ より $y \geq 0$ 。

この y について $y^2 = x$ を示す。三分律により $y^2 < x$ 、 $y^2 > x$ 、 $y^2 = x$ のいずれか一つが成り立つので、初めの 2 つが矛盾を導くことを示せばよい。

(a) $y^2 < x$ と仮定する。 $\varepsilon := \min \left\{ 1, \frac{x - y^2}{2y + 1} \right\} \in \mathbb{R}$ とおく ($2y + 1 \geq 1 > 0$ なので商は定義され、 $x - y^2 > 0$ より $\varepsilon > 0$)。

$$\begin{aligned}\varepsilon^2 &= \varepsilon \cdot \varepsilon & (\because 2 \text{ 乗の定義}) \\ &\leq 1 \cdot \varepsilon & (\because \varepsilon \leq 1, \varepsilon > 0, \text{順序体の乗法の単調性}) \\ &= \varepsilon & (\because 1 \text{ は乗法の単位元})\end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned}(y + \varepsilon)^2 &= y^2 + 2y\varepsilon + \varepsilon^2 & (\because \text{分配律}) \\ &\leq y^2 + 2y\varepsilon + \varepsilon & (\because \varepsilon^2 \leq \varepsilon) \\ &= y^2 + (2y + 1)\varepsilon & (\because \text{分配律}) \\ &\leq y^2 + (2y + 1) \cdot \frac{x - y^2}{2y + 1} & \left(\because \varepsilon \leq \frac{x - y^2}{2y + 1}, 2y + 1 > 0 \right) \\ &= y^2 + (x - y^2) & (\because 2y + 1 \neq 0 \text{ による約分}) \\ &= x & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合性と逆元})\end{aligned}$$

よって $y + \varepsilon \in S$ であり $y + \varepsilon > y = \sup S$ となって、 y が S の上界であることに矛盾する。

(b) $y^2 > x$ と仮定する。

$$\begin{aligned}y^2 > x \wedge x > 0 &\implies y^2 > 0 & (\because \mathbb{R} \text{ の順序の推移律}) \\ &\implies y > 0 & (\because y \geq 0 \text{ と正実数の二乗の単射性})\end{aligned}$$

$\delta := \frac{y^2 - x}{2y} \in \mathbb{R}_{>0}$ とおくと $\delta > 0$ である。また

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{y^2 - x}{2y} & (\because \delta \text{ の定め方}) \\ &< \frac{y^2}{2y} & (\because y^2 - x < y^2 \text{ と } 2y > 0) \\ &= \frac{y}{2} & (\because y \neq 0 \text{ による約分}) \\ &< y & (\because y > 0)\end{aligned}$$

なので $y - \delta \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、

$$\begin{aligned}(y - \delta)^2 &= y^2 - 2y\delta + \delta^2 & (\because \text{分配律}) \\ &\geq y^2 - 2y\delta & (\because \delta^2 \geq 0) \\ &= y^2 - 2y \cdot \frac{y^2 - x}{2y} & (\because \delta \text{ の定め方}) \\ &= y^2 - (y^2 - x) & (\because 2y \neq 0 \text{ による約分}) \\ &= x & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合性と逆元})\end{aligned}$$

したがって $s \in S$ すなわち $s \geq 0$ 、 $s^2 \leq x$ ならば $s^2 \leq x \leq (y - \delta)^2$ であり、 $s \geq 0$ かつ $y - \delta > 0$ なので $s > y - \delta$ と仮定すると $s^2 > (y - \delta)^2$ (正の数どうしの乗法の単調性) となって矛盾する。よって $s \leq y - \delta$ が全ての $s \in S$ について成り立ち、 $y - \delta$ は S の上界である。しかし $y - \delta < y = \sup S$ であり、 $\sup S$ が最小の上界であることに矛盾する。

以上より $y^2 = x$ であり、 $y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ なので存在が示された。一意性と合わせて主張を得る。 $\square$

定義 1.6 $(\sqrt{\cdot})$. $\sqrt{\cdot}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ を次で定める。

$$x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

について、 $y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ で

$$y \geq 0 \wedge y^2 = x$$

を満たすものがただ一つ存在する（主張 1.5）。

この y を用いて

$$\sqrt{x}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} := y$$

と定める。

定理 1.7 (負数 $\rightarrow \sqrt{\cdot}$).

$$x \in \mathbb{R}_{< 0}$$

$$x = -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$$

証明. 準備として $-x$ が平方根の定義の条件を満たすことを見る。

$$\begin{aligned} -x &> -0 \quad (\because x < 0 \text{ と加法の逆元による順序の反転}) \\ &= 0 \quad (\because 0 \text{ の加法の逆元は } 0) \end{aligned}$$

であり、とくに $-x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である。また、実数の平方は非負なので $(-x)^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である。したがって $y = -x$ は条件 $y \in \mathbb{R}_{\geq 0} \wedge y^2 = (-x)^2$ を満たす。この条件を満たす y はただ一つであり（主張 1.5）、それが $\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ である（定義 1.6）。よって

$$\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = -x \quad (\because \text{平方根の定義定義 1.6 と条件を満たす元の一意性主張 1.5})$$

である。以上を使って主張を示す。

$$\begin{aligned} -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= -(-x) \quad (\because \text{準備で得た等式}) \\ &= x \quad (\because \text{加法の逆元の逆元はもとの元}) \end{aligned}$$

すなわち $x = -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ である。 $\square$

定義 1.8 (行列の積の成分による定義). $m, n, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 $A \in \text{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ 、 $B \in \text{Mat}(n, p, \mathbb{C})$ とする ($\text{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ は成分が定義 1.11 の複素数である m 行 n 列の行列全体、 $\text{Mat}(n, \mathbb{C}) := \text{Mat}(n, n, \mathbb{C})$)。積 $AB \in \text{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ を、成分ごとに

$$(AB)_{ik} := \sum_{j=1}^n A_{ij} B_{jk} \quad (i \in \{1, \dots, m\}, k \in \{1, \dots, p\})$$

で定める。右辺は n 個の複素数の有限和である。数ベクトル $a \in \mathbb{C}^n$ は n 行 1 列の行列とみなし、 Aa も同じ式で定める。

定理 1.9 (行列の積は列ごとに作用する). $A \in \text{Mat}(m, n, \mathbb{C})$, $b_1, \dots, b_p \in \mathbb{C}^n$ とし、これらを列に並べた行列を $[b_1 \cdots b_p] \in \text{Mat}(n, p, \mathbb{C})$ と書く (第 k 列の第 j 成分が $(b_k)_j$ である行列)。このとき

$$A[b_1 \cdots b_p] = [Ab_1 \cdots Ab_p]$$

が成り立つ。

証明. 両辺は同じ大きさの行列なので、各成分が一致することを示せばよい。 $i \in \{1, \dots, m\}$, $k \in \{1, \dots, p\}$ を取る。

$$\begin{aligned} (A[b_1 \cdots b_p])_{ik} &= \sum_{j=1}^n A_{ij} ([b_1 \cdots b_p])_{jk} \quad (\because \text{行列の積の定義定義 1.8}) \\ &= \sum_{j=1}^n A_{ij} (b_k)_j \quad (\because \text{列に並べた行列の成分の定め方}) \\ &= (Ab_k)_i \quad (\because \text{行列の積の定義定義 1.8 を } Ab_k \text{ へ適用}) \\ &= ([Ab_1 \cdots Ab_p])_{ik} \quad (\because \text{列に並べた行列の成分の定め方}) \end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 $\square$

定理 1.10 (行列の共役). $A, B \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$, B は正則とする。

$\text{Mat}(n, \mathbb{C})$ の各元 A に対して $T_B(A) := BAB^{-1} \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ と定める。このとき T_B は和とスカラー倍を保つ。すなわち

$$T_B(A + C) = T_B(A) + T_B(C), \quad T_B(\alpha A) = \alpha T_B(A) \quad (A, C \in \text{Mat}(n, \mathbb{C}), \alpha \in \mathbb{C})$$

が成り立つ。

証明. 和を保つことと、スカラー倍を保つことを別々に示す。

第一に、和を保つこと。 $A, C \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して、

$$\begin{aligned} T_B(A + C) &= B(A + C)B^{-1} \quad (\because T_B \text{ の定義}) \\ &= (BA + BC)B^{-1} \quad (\because \text{行列の積の左からの分配則}) \\ &= BAB^{-1} + BCB^{-1} \quad (\because \text{行列の積の右からの分配則}) \\ &= T_B(A) + T_B(C) \quad (\because T_B \text{ の定義}) \end{aligned}$$

である。第二に、スカラー倍を保つこと。 $A \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ と $\alpha \in \mathbb{C}$ に対して、

$$\begin{aligned} T_B(\alpha A) &= B(\alpha A)B^{-1} \quad (\because T_B \text{ の定義}) \\ &= (\alpha(BA))B^{-1} \quad (\because \text{スカラー倍と行列の積の交換}) \\ &= \alpha(BAB^{-1}) \quad (\because \text{スカラー倍と行列の積の交換}) \\ &= \alpha T_B(A) \quad (\because T_B \text{ の定義}) \end{aligned}$$

である。以上より T_B は和とスカラー倍を保つ。 $\square$

定義 1.11 ($\mathbb{C}$ の定義). 定義 1.2 の実数の台集合と演算を使う。

$\mathbf{C} := \mathbf{R}^2$ を複素数の台集合とし、その上に以下の演算を入れた構造を $\mathbf{C}$ と書く。
和 (成分ごと)

$$+_C : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}, \quad (a, b) +_C (c, d) := (a +_{\mathbb{R}} c, b +_{\mathbb{R}} d)$$

積

$$\cdot_{\mathbb{C}} : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad (a, b) \cdot_{\mathbb{C}} (c, d) := (a \cdot_{\mathbb{R}} c - b \cdot_{\mathbb{R}} d, a \cdot_{\mathbb{R}} d + b \cdot_{\mathbb{R}} c)$$

本論文で $\mathbb{C}$ に必要な構造はこの 2 つの演算だけである。和は指数関数の級数（主張 4.2）と絶対値の三角不等式（主張 1.41）で必要になる。

定義 1.12 ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ の包含写像). $\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ を

$$\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(x) := (x, 0)$$

として定める。これを $\mathbb{R}$ から $\mathbb{C}$ への包含写像と呼ぶ。

略記として、 $r \in \mathbb{R}$ について

$$r_{\mathbb{C}} := \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(r)$$

と書く。

定義 1.13 (-1 倍). $z \in \mathbb{C}$ について、

$$-z := (-1_{\mathbb{C}}) \cdot z$$

定義 1.14 ($\sqrt{-1}$).

$$\sqrt{-1} := \sqrt{-1_{\mathbb{C}}}$$

定義 1.15 ($\mathbb{C}$ の実部/虚部).

$$x, y \in \mathbb{R}, (x, y) \in \mathbb{C}$$

$$Re : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x$$

$$Im : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto y$$

を定め、 $Re(z)$ 、 $Im(z)$ をそれぞれ z の実部、虚部と呼ぶ。

定義 1.16 (単位円). 定義 1.11 の台集合上で

$$C_{\text{unit}} := \{(x, y) \in \mathbb{C} \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

C_{unit} を単位円と呼ぶ。

定義 1.17 (円弧の定義). 定義 1.16 の点について、

$$P := (x, y), Q := (x', y') \in C_{\text{unit}}$$

について、齋藤微積分命題 2.1.3 (1) を満たす実数 $l(PQ)$ がただ一つ存在し、それを弧 PQ の長さと呼ぶ。

主張 1.18 (非零実数対の単位円への正規化). 定義 1.16 と 定義 1.6 を用いる。任意の $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ に対し、

$$rx_c = x, \quad ry_c = y, \quad r \in \mathbb{R}_{>0}, \quad (x_c, y_c) \in C_{\text{unit}}$$

を満たす $r, (x_c, y_c)$ が一意に存在する。

証明. $(x, y) \neq (0, 0)$ なので $x \neq 0$ または $y \neq 0$ である。実数の平方は非負で、非零実数の平方は正だから $x^2 + y^2 > 0$ 。よって

$$r := \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} > 0, \quad x_c := \frac{x}{r}, \quad y_c := \frac{y}{r}$$

と定められる。このとき $rx_c = x$ と $ry_c = y$ は x_c, y_c の定義の両辺に r を掛けて得られ、

$$\begin{aligned} x_c^2 + y_c^2 &= \left(\frac{x}{r}\right)^2 + \left(\frac{y}{r}\right)^2 \quad (\because x_c, y_c \text{ の定義}) \\ &= \frac{x^2 + y^2}{r^2} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &= \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} \quad \left(\because r \text{ の定義と正の平方根の平方 (定義: } \sqrt{\cdot}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})})\right) \\ &= 1 \quad (\because x^2 + y^2 > 0 \text{ なので約分できる}) \end{aligned}$$

だから存在する。別の $r' > 0, (x'_c, y'_c) \in C_{\text{unit}}$ が条件を満たすなら

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (r'x'_c)^2 + (r'y'_c)^2 \quad (\because \text{条件 } r'x'_c = x, r'y'_c = y) \\ &= (r')^2((x'_c)^2 + (y'_c)^2) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &= (r')^2 \quad (\because (x'_c, y'_c) \in C_{\text{unit}} \text{ の定義式 } (x'_c)^2 + (y'_c)^2 = 1) \end{aligned}$$

である。正の平方根の一意性より $r' = r$ 。したがって

$$\begin{aligned} x'_c &= \frac{x}{r'} \quad (\because \text{条件 } r'x'_c = x \text{ の両辺を } r' > 0 \text{ で割る}) \\ &= \frac{x}{r} \quad (\because r' = r) \\ &= x_c \quad (\because x_c \text{ の定義}) \\ y'_c &= \frac{y}{r'} \quad (\because \text{条件 } r'y'_c = y \text{ の両辺を } r' > 0 \text{ で割る}) \\ &= \frac{y}{r} \quad (\because r' = r) \\ &= y_c \quad (\because y_c \text{ の定義}) \end{aligned}$$

であり一意である。 □

定義 1.19 ($\mathbb{C} \rightarrow C_{\text{unit}}$). 定義 1.11 と 定義 1.16、主張 1.18 を用いる。 $c_{\text{unit}} : \mathbb{C} \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow C_{\text{unit}}$ を以下のように定める。

$$\forall (x, y) \in \mathbb{C} \setminus \{(0, 0)\}$$

について、上の存在一意性で定まる $r, (x_c, y_c)$ を用いて

$$c_{\text{unit}}(x, y) := (x_c, y_c)$$

と定める。

定義 1.20 ($\arcsin$ の定義). 定義 1.11、定義 1.16、定義 1.17、定義 1.6 の記号を用いる。

$$A := (1, 0) \in \mathbb{C}$$

- i) $\arcsin : \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\} \rightarrow \{\theta \in \mathbb{R} \mid -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2\}$ を以下のように定める。
 $y \in \mathbb{R}, 0 \leq y \leq 1$ について、 $P := (\sqrt{1-y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}, y) \in C_{\text{unit}}$ とおき、

$$\arcsin(y) := l(AP)$$

と定める。 $y' \in \mathbb{R}, -1 \leq y' \leq 0$ について、

$$\arcsin(y') := -\arcsin(-y')$$

と定める。

主張 1.21 ($\arcsin$ の単調性・連続性・全射性). 定義 1.20 は $[-1, 1]$ から $[-\pi/2, \pi/2]$ への狭義単調増加な連続全射であり、したがって全単射である。

証明. 円弧長による定義に対する齋藤微積分命題 2.1.5 を適用する。狭義単調増加性から単射、値域の記述から全射を得る。□

定義 1.22 ($\sin$ の定義). 主張 1.21 により 定義 1.20 の逆関数が存在する。この逆関数を $\sin : [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ と定める。

主張 1.23 ($\arctan$ の引数は $\arcsin$ の定義域に入る). 定義 1.6 を用いる。任意の $x \in \mathbb{R}$ について

$$-1 \leq \frac{x}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} \leq 1$$

が成り立つ。

証明. 準備として $s := \sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ と書く。非負平方根の定義（定義 1.6）から $s \geq 0$ かつ次が成り立つ。

$$\begin{aligned} s^2 &= 1 + x^2 & (\because \text{非負平方根の定義。定義 1.6}) \\ &\geq 1 & (\because x^2 \geq 0 \text{ と両辺への } 1 \text{ の加法}) \\ &> 0 & (\because 0 < 1) \end{aligned}$$

従って次の二つの不等式が成り立つ。

$$\begin{aligned} s &> 0 & (\because s \geq 0 \text{ かつ } s^2 > 0) \\ |x|^2 &= x^2 & (\because \text{絶対値の二乗}) \\ &\leq 1 + x^2 & (\because 0 \leq 1 \text{ と両辺への } x^2 \text{ の加法}) \\ &= s^2 & (\because \text{非負平方根の定義。定義 1.6}) \end{aligned}$$

$|x| \geq 0, s \geq 0$ なので、最後の二行と非負数上での二乗の単調性から $|x| \leq s$ を得る。以上を使って、

$$\begin{aligned} \left| \frac{x}{s} \right| &= \frac{|x|}{s} & (\because s > 0 \text{ と絶対値の商}) \\ &\leq \frac{s}{s} & (\because |x| \leq s \text{ と正の分母 } s \text{ で割る単調性}) \\ &= 1 & (\because s > 0 \text{ による約分}) \end{aligned}$$

$|x/s| \leq 1$ は主張の二つの不等式 $-1 \leq x/s \leq 1$ と同値である（絶対値の定義）。□

定義 1.24 ($\arctan$ の定義). 定義 1.20、定義 1.6、主張 1.23 を使い、 $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$\arctan(x) := \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}}\right)$$

と定める。

定義 1.25 ($\cos$ の定義). 定義 1.22 と 定義 1.6 を使い、 $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ に対して

$$\cos(\theta) := \sqrt{1 - (\sin \theta)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$$

と定める。

主張 1.26 ($\cos(\arctan(x))$, $\sin(\arctan(x))$). 主張 1.23 の引数の範囲を用いる。

定義 1.24、定義 1.22、定義 1.25、定義 1.6 の定義を用いる。

$x \in \mathbb{R}$ について、 $-1 \leq x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq 1$ であるから、

$$\begin{aligned} \cos(\arctan(x)) &= \cos\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right) && (\because \arctan \text{ の定義}) \\ &= \sqrt{1 - \left(\sin\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right)\right)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \cos \text{ の定義}) \\ &= \sqrt{1 - \left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \sin \text{ は } \arcsin \text{ の逆関数}) \\ &= \sqrt{1 - \frac{x^2}{\left(\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{商の二乗は二乗の商}) \\ &= \sqrt{1 - \frac{x^2}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{非負の平方根の二乗はもとの数}) \\ &= \sqrt{\frac{(1+x^2) - x^2}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{通分}) \\ &= \sqrt{\frac{1}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{加法逆元 } x^2 - x^2 = 0) \\ &= \frac{\sqrt{1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} && (\because \text{商の平方根は平方根の商}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} && (\because \sqrt{1} = 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(\arctan(x)) &= \sin\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right) && (\because \arctan \text{ の定義}) \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} && (\because \sin \text{ は } \arcsin \text{ の逆関数}) \end{aligned}$$

定義 1.27 (角度表現の同値類). $\mathbb{R}$ の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$ を $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\theta \sim_{\text{angle}} \theta' \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } (\theta - \theta') = 2n\pi$$

と定めると、商集合 $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ が定まる。

$\theta \in \mathbb{R}$ の $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ における同値類を

$$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} \in \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

と書く。

主張 1.28 ($0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ なる $n \in \mathbb{Z}$ の存在と一意性). $\theta \in \mathbb{R}$ について、

$$0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$$

を満たす $n \in \mathbb{Z}$ がただ一つ存在する。

証明. 以下では非可算集合 $\mathbb{R}$ の順序体としての構造と、そのアルキメデス性

$$\forall a \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } N > a$$

を使う（アルキメデス性は $\mathbb{R}$ の完備性から従う。ここが有理数体の代数だけでは閉じない箇所である）。極限・連続性は使わない。

存在。証明の中で使う記号を先に置く。 $\pi > 0$ より $2\pi > 0$ であるから $t := \frac{\theta}{2\pi} \in \mathbb{R}$ が定まる。アルキメデス性を $a = t$ に適用して $N > t$ なる $N \in \mathbb{Z}$ を、 $a = -t$ に適用して $M > -t$ なる $M \in \mathbb{Z}$ をとり、集合

$$S := \{m \in \mathbb{Z} \mid -M \leq m \leq N \wedge m \leq t\}$$

を置く。

準備の第一は $-M < t$ である。

$$\begin{aligned} -M &< -(-t) \quad (\because M > -t \text{ の両辺に } -1 \text{ を掛けると不等号の向きが変わる}) \\ &= t \quad (\because -(-t) = t) \end{aligned}$$

準備の第二は $n := \max S \in \mathbb{Z}$ が定まることである。 $-M < t$ と $-M < t < N$ より $-M \in S$ なので S は空でなく、 $\{m \in \mathbb{Z} \mid -M \leq m \leq N\}$ の部分集合として有限である。有限かつ空でない整数の集合は最大元をもつ。

準備の第三は $n \leq t$ である。これは $n \in S$ と S の定め方から出る。

準備の第四は $t < n+1$ である。 $n+1 \leq t$ と仮定すると $n+1 \leq t < N$ かつ $-M \leq n < n+1$ より $n+1 \in S$ となり、 $n = \max S$ に矛盾する。

以上のもとで、下界は

$$\begin{aligned} 0 &= 2\pi \cdot 0 \quad (\because 0 \text{ との積は } 0) \\ &\leq 2\pi(t - n) \quad (\because \text{準備の第三の } n \leq t \text{ より } 0 \leq t - n, \text{ および } 2\pi > 0) \\ &= 2\pi t - 2n\pi \quad (\because \text{分配則}) \\ &= \theta - 2n\pi \quad (\because t \text{ の定め方より } \theta = 2\pi t) \end{aligned}$$

であり、上界は

$$\begin{aligned} \theta - 2n\pi &= 2\pi t - 2n\pi \quad (\because t \text{ の定め方より } \theta = 2\pi t) \\ &= 2\pi(t - n) \quad (\because \text{分配則}) \\ &< 2\pi \cdot 1 \quad (\because \text{準備の第四の } t < n+1 \text{ より } t - n < 1, \text{ および } 2\pi > 0) \\ &= 2\pi \quad (\because 1 \text{ との積は変わらない}) \end{aligned}$$

である。すなわち $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たす $n \in \mathbb{Z}$ が存在する。

一意性。 $n, n' \in \mathbb{Z}$ がともに $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ 、 $0 \leq \theta - 2n'\pi < 2\pi$ を満たすとする。下から評価すると

$$\begin{aligned} 2(n' - n)\pi &= (\theta - 2n\pi) - (\theta - 2n'\pi) \quad (\because \text{右辺を展開すると } 2n'\pi - 2n\pi \text{ になる}) \\ &> 0 - 2\pi \quad (\because 0 \leq \theta - 2n\pi \text{ と } \theta - 2n'\pi < 2\pi) \\ &= -2\pi \quad (\because 0 \text{ から引くと符号が変わる}) \end{aligned}$$

であり、上から評価すると

$$\begin{aligned} 2(n' - n)\pi &= (\theta - 2n\pi) - (\theta - 2n'\pi) \quad (\because \text{右辺を展開すると } 2n'\pi - 2n\pi \text{ になる}) \\ &< 2\pi - 0 \quad (\because \theta - 2n\pi < 2\pi \text{ と } 0 \leq \theta - 2n'\pi) \\ &= 2\pi \quad (\because 0 \text{ を引いても変わらない}) \end{aligned}$$

である。各辺を $2\pi > 0$ で割って $-1 < n' - n < 1$ を得る。 $n' - n \in \mathbb{Z}$ であり、この範囲にある整数は 0 のみであるから $n' = n$ 。□

定義 1.29 (角度表現の切断). $s_{[0,2\pi)} : \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}} \rightarrow [0, 2\pi)$ を以下のように定める。

$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} \in \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ に対して、
 $n \in \mathbb{Z}$ で $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすようなものがただ一つ存在して (主張 1.28)、
この n を用いて、

$$s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) := \theta - 2n\pi$$

と定める。

定義 1.30 ($\mathbb{R}$ の角度表現). $\mathbb{R}$ の (角度表現) を、定義 1.27 の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$ による商集合 $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ に

$$+ : (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \times (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \rightarrow \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

$$([\theta]_{\sim_{\text{angle}}}, [\theta']_{\sim_{\text{angle}}}) \mapsto [\theta + \theta']_{\sim_{\text{angle}}}$$

$$\cdot_{\text{real}} : \mathbb{R} \times (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \rightarrow \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

$$(a, [\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) \mapsto [a \cdot s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}})]_{\sim_{\text{angle}}}$$

を入れたものとして定める。ここで $s_{[0,2\pi)}$ は 定義 1.29 の切断である。

定義 1.31 (極座標表現の同値類). 角度の同値関係は 定義 1.27 で定めたものを使う。半径が零の対は角度によらず同じ同値類に属するとし、正の半径の対は半径が等しく角度が同値な場合に同じ同値類に属するとする。

$\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ の同値関係 $\sim$ を $(r, \theta), (r', \theta') \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ に対して、

$$(r, \theta) \sim (r', \theta') \stackrel{\text{def}}{\iff} r = r' = 0 \vee (r = r' \wedge \theta \sim_{\text{angle}} \theta')$$

と定めると、商集合 $(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ が定まる。

$(r, \theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ の $(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ における同値類を

$$[(r, \theta)]_{\sim} \in (\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$$

と書く。

定義 1.32 (極座標表現の演算). 定義 1.31 の同値類に対して演算を定める。

$((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim)$ に二項演算 $\cdot$ を次で定める。

$$\cdot : ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim) \times ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim) \rightarrow ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim)$$

$$([(r, \theta)]_{\sim}, [(r', \theta')]_{\sim}) \mapsto [(rr', \theta + \theta')]_{\sim}$$

この構造を「極座標表現」と呼ぶ。

主張 1.33 ((極座標表現) の乗法群). (極座標表現) は二項演算 $\cdot$ についてモノイドをなす。

$$(\text{極座標表現})^{\times} := (\text{極座標表現}) \setminus \{[(0, 0)]_{\sim}\}$$

は二項演算 $\cdot$ について群をなす。

$[(r, \theta)]_{\sim}$ ($r \neq 0$) の逆元は

$$([(r, \theta)]_{\sim})^{-1} = [(1/r, -\theta)]_{\sim}$$

証明. 以下、定義 1.31 の同値関係 $\sim$ 、定義 1.27 の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$ 、および 定義 1.32 の二項演算 $\cdot$ を用いる。また (極座標表現) $= (\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}) / \sim$ である。証明は独立した中間目標へ分かれるので、以下ではそれぞれに名前を付けて示す。

準備 (二項演算が well-defined であること)。定義 1.32 は同値類の代表元を用いて $[(r, \theta)]_{\sim} \cdot [(r', \theta')]_{\sim} := [(rr', \theta + \theta')]_{\sim}$ と定めているので、右辺が代表元の取り方によらないことを確かめる必要がある。すなわち $(r, \theta), (r_1, \theta_1), (r', \theta'), (r'_1, \theta'_1) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ が

$$(r, \theta) \sim (r_1, \theta_1) \quad \text{かつ} \quad (r', \theta') \sim (r'_1, \theta'_1)$$

を満たすとき $(rr', \theta + \theta') \sim (r_1r'_1, \theta_1 + \theta'_1)$ を示す。定義 1.31 の定義

$$(r, \theta) \sim (r', \theta') \stackrel{\text{def}}{\iff} r = r' = 0 \vee (r = r' \wedge \theta \sim_{\text{angle}} \theta')$$

に従って、次の 2 つの場合に分ける。

場合 (a): $r = r_1 = 0$ または $r' = r'_1 = 0$ のとき。

$$\begin{aligned} rr' &= 0 & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\ &= r_1r'_1 & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \end{aligned}$$

であるから、 $(rr', \theta + \theta')$ と $(r_1r'_1, \theta_1 + \theta'_1)$ は第 1 成分がともに 0 であり、定義 1.31 の第 1 の選言により $(rr', \theta + \theta') \sim (r_1r'_1, \theta_1 + \theta'_1)$ 。

場合 (b): 場合 (a) でないとき。このとき $(r, \theta) \sim (r_1, \theta_1)$ の定義における第 1 の選言 $r = r_1 = 0$ は偽であるから第 2 の選言が成り立ち、 $r = r_1$ かつ $\theta \sim_{\text{angle}} \theta_1$ 。同様に $r' = r'_1$ かつ $\theta' \sim_{\text{angle}} \theta'_1$ 。

定義 1.27 より $n, n' \in \mathbb{Z}$ が存在して $\theta - \theta_1 = 2n\pi$ 、 $\theta' - \theta'_1 = 2n'\pi$ であるから、

$$\begin{aligned} (\theta + \theta') - (\theta_1 + \theta'_1) &= (\theta - \theta_1) + (\theta' - \theta'_1) & (\because \mathbb{R} \text{ の和と差の整理}) \\ &= 2n\pi + (\theta' - \theta'_1) & (\because \theta - \theta_1 = 2n\pi) \\ &= 2n\pi + 2n'\pi & (\because \theta' - \theta'_1 = 2n'\pi) \\ &= 2(n + n')\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \end{aligned}$$

であり $n + n' \in \mathbb{Z}$ であるから $\theta + \theta' \sim_{\text{angle}} \theta_1 + \theta'_1$ (定義 1.27)。また

$$\begin{aligned} rr' &= r_1r' & (\because r = r_1) \\ &= r_1r'_1 & (\because r' = r'_1) \end{aligned}$$

であるから、第 2 の選言により $(rr', \theta + \theta') \sim (r_1r'_1, \theta_1 + \theta'_1)$ 。以上より $\cdot$ は well-defined である。

結合律。 $[(r_1, \theta_1)]_{\sim}, [(r_2, \theta_2)]_{\sim}, [(r_3, \theta_3)]_{\sim} \in (\text{極座標表現})$ に対して、

$$\begin{aligned} ([(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2, \theta_2)]_{\sim}) \cdot [(r_3, \theta_3)]_{\sim} &= [(r_1r_2, \theta_1 + \theta_2)]_{\sim} \cdot [(r_3, \theta_3)]_{\sim} & (\because \text{極座標表現の積の定義}) \\ &= [((r_1r_2)r_3, (\theta_1 + \theta_2) + \theta_3)]_{\sim} & (\because \text{極座標表現の積の定義}) \\ &= [(r_1(r_2r_3), (\theta_1 + \theta_2) + \theta_3)]_{\sim} & (\because \mathbb{R} \text{ の積の結合律}) \\ &= [(r_1(r_2r_3), \theta_1 + (\theta_2 + \theta_3))]_{\sim} & (\because \mathbb{R} \text{ の和の結合律}) \\ &= [(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2r_3, \theta_2 + \theta_3)]_{\sim} & (\because \text{極座標表現の積の定義}) \\ &= [(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot ([(r_2, \theta_2)]_{\sim} \cdot [(r_3, \theta_3)]_{\sim}) & (\because \text{極座標表現の積の定義}) \end{aligned}$$

が成り立つ (積の定義は 定義 1.32)。 $r_1, r_2, r_3 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ の積は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に属するので、各段の右辺は (極座標表現) の元である。

単位元。 $e := [(1, 0)]_{\sim} \in (\text{極座標表現})$ とおくと、 $[(r, \theta)]_{\sim} \in (\text{極座標表現})$ に対して

$$\begin{aligned}
[(r, \theta)]_{\sim} \cdot e &= [(r \cdot 1, \theta + 0)]_{\sim} \quad (\because \text{極座標表現の積の定義と } e \text{ の定め方}) \\
&= [(r, \theta + 0)]_{\sim} \quad (\because 1 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の積の単位元}) \\
&= [(r, \theta)]_{\sim} \quad (\because 0 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の和の単位元})
\end{aligned}$$

であり、また

$$\begin{aligned}
e \cdot [(r, \theta)]_{\sim} &= [(1 \cdot r, 0 + \theta)]_{\sim} \quad (\because \text{極座標表現の積の定義と } e \text{ の定め方}) \\
&= [(r, 0 + \theta)]_{\sim} \quad (\because 1 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の積の単位元}) \\
&= [(r, \theta)]_{\sim} \quad (\because 0 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の和の単位元})
\end{aligned}$$

である。したがって e は $\cdot$ の単位元である。

モノイドであること。結合律と単位元の 2 つより、(極座標表現) は $\cdot$ について単位元 $e = [(1, 0)]_{\sim}$ をもつ結合的な二項演算をもつ、すなわちモノイドをなす。

零元との一致の判定。 $[(r, \theta)]_{\sim} = [(0, 0)]_{\sim} \iff r = 0$ を、両向きに分けて示す。

($\Leftarrow$) $r = 0$ ならば $(0, \theta)$ と $(0, 0)$ は第 1 成分がともに 0 であるから第 1 の選言により $(0, \theta) \sim (0, 0)$ 、すなわち $[(r, \theta)]_{\sim} = [(0, 0)]_{\sim}$ 。

($\Rightarrow$) $[(r, \theta)]_{\sim} = [(0, 0)]_{\sim}$ すなわち $(r, \theta) \sim (0, 0)$ のとき、第 1 の選言が成り立つならば $r = 0$ 、第 2 の選言が成り立つならば $r = 0$ (右辺の第 1 成分が 0 だから)。いずれの場合も $r = 0$ 。

積で閉じ、単位元を含むこと。 $[(r, \theta)]_{\sim}, [(r', \theta')]_{\sim} \in (\text{極座標表現})^{\times}$ とすると、零元との一致の判定より $r \neq 0$ かつ $r' \neq 0$ 。 $r, r' \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ かつ $r, r' \neq 0$ より $r > 0$ かつ $r' > 0$ であるから $rr' > 0$ 、特に $rr' \neq 0$ 。よって

$$\begin{aligned}
[(r, \theta)]_{\sim} \cdot [(r', \theta')]_{\sim} &= [(rr', \theta + \theta')]_{\sim} \quad (\because \text{極座標表現の積の定義}) \\
&\neq [(0, 0)]_{\sim} \quad (\because rr' \neq 0 \text{ と零元との一致の判定})
\end{aligned}$$

すなわち積は $(\text{極座標表現})^{\times}$ に属する。また $1 \neq 0$ より零元との一致の判定から $e = [(1, 0)]_{\sim} \neq [(0, 0)]_{\sim}$ であり $e \in (\text{極座標表現})^{\times}$ 。

逆元の存在。 $[(r, \theta)]_{\sim} \in (\text{極座標表現})^{\times}$ とすると、直前の議論より $r > 0$ であるから $1/r \in \mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$ が定まり $[(1/r, -\theta)]_{\sim} \in (\text{極座標表現})^{\times}$ ($1/r \neq 0$ と零元との一致の判定)。このとき

$$\begin{aligned}
[(r, \theta)]_{\sim} \cdot [(1/r, -\theta)]_{\sim} &= [(r \cdot (1/r), \theta + (-\theta))]_{\sim} \quad (\because \text{極座標表現の積の定義}) \\
&= [(1, \theta + (-\theta))]_{\sim} \quad (\because r > 0 \text{ より } r \cdot (1/r) = 1) \\
&= [(1, 0)]_{\sim} \quad (\because -\theta \text{ は } \theta \text{ の } \mathbb{R} \text{ における加法の逆元}) \\
&= e \quad (\because e \text{ の定め方})
\end{aligned}$$

であり、また

$$\begin{aligned}
[(1/r, -\theta)]_{\sim} \cdot [(r, \theta)]_{\sim} &= [((1/r) \cdot r, (-\theta) + \theta)]_{\sim} \quad (\because \text{極座標表現の積の定義}) \\
&= [(1, (-\theta) + \theta)]_{\sim} \quad (\because r > 0 \text{ より } (1/r) \cdot r = 1) \\
&= [(1, 0)]_{\sim} \quad (\because -\theta \text{ は } \theta \text{ の } \mathbb{R} \text{ における加法の逆元}) \\
&= e \quad (\because e \text{ の定め方})
\end{aligned}$$

である。

逆元の一意性。単位元 e をもつ結合的な二項演算をもつ集合 S において、 $a \in S$ に対し $b, b' \in S$ がともに $ab = ba = e$ 、 $ab' = b'a = e$ を満たすとする、

$$\begin{aligned}
b &= be & (\because e \text{ は単位元}) \\
&= b(ab') & (\because ab' = e) \\
&= (ba)b' & (\because \text{結合律}) \\
&= eb' & (\because ba = e) \\
&= b' & (\because e \text{ は単位元})
\end{aligned}$$

であるから逆元は一意である。よって逆元の存在で作った $[(1/r, -\theta)]_{\sim}$ が $[(r, \theta)]_{\sim}$ の唯一の逆元であり、

$$([(r, \theta)]_{\sim})^{-1} = [(1/r, -\theta)]_{\sim}$$

結論。積で閉じることより (極座標表現) $^{\times}$ は $\cdot$ について閉じており、結合律を満たし、単位元 e を含み、逆元の存在より各元が逆元をもつ。したがって (極座標表現) $^{\times}$ は $\cdot$ について群をなす。 $\square$

主張 1.34 ($\mathbb{C}$ の乗法群).

$$\mathbb{C}^{\times} := \mathbb{C} \setminus \{(0, 0)\}$$

は群をなす。

$z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$ に対して逆元を z^{-1} と書き、

$$z^{-1} = 1/z$$

証明. 以下、定義 1.11 の積

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ad + bc)$$

を用いる ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$)。また 定義 1.12 より $1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(1) = (1, 0)$ 、 $0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(0) = (0, 0)$ である。

証明は独立した中間目標へ分かれるので、以下ではそれぞれに名前を付けて示す。以下、 $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{C}$ は任意に取ったものとする (したがって $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$)。

積の可換律。

$$\begin{aligned}
(c, d) \cdot (a, b) &= (ca - db, cb + da) & (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\
&= (ac - bd, cb + da) & (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律を 2 箇所へ適用}) \\
&= (ac - bd, bc + ad) & (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律を 2 箇所へ適用}) \\
&= (ac - bd, ad + bc) & (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律}) \\
&= (a, b) \cdot (c, d) & (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義})
\end{aligned}$$

積の結合律。

$$\begin{aligned}
((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f) &= (ac - bd, ad + bc) \cdot (e, f) & (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\
&= ((ac - bd)e - (ad + bc)f, (ac - bd)f + (ad + bc)e) & (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\
&= (ace - bde - adf - bcf, acf - bdf + ade + bce) & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と積の結合律を 4 箇所へ適用}) \\
&= (ace - adf - bcf - bde, acf + ade + bce - bdf) & (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律と結合律}) \\
&= (a(ce - df) - b(cf + de), a(cf + de) + b(ce - df)) & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と積の結合律を 4 箇所へ適用}) \\
&= (a, b) \cdot (ce - df, cf + de) & (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\
&= (a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) & (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義})
\end{aligned}$$

第 3 の等号と第 5 の等号では、 $\mathbb{R}$ の分配律と積の結合律を同時に使っている (例えば $(ac - bd)e = ace - bde$ は分配律で 2 項に分けたうえで、各項の積の順序を結合律で括り直したものである)。同じ定理を複数箇所へ同時に適用しているので 1 行にまとめている。

積の単位元。

$$\begin{aligned}
(a, b) \cdot 1_{\mathbb{C}} &= (a, b) \cdot (1, 0) & (\because 1_{\mathbb{C}} = (1, 0)) \\
&= (a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) & (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\
&= (a - b \cdot 0, a \cdot 0 + b) & (\because \mathbb{R} \text{ では } 1 \text{ は積の単位元。2 箇所へ適用}) \\
&= (a - 0, 0 + b) & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0。2 \text{ 箇所へ適用}) \\
&= (a, b) & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元。2 箇所へ適用})
\end{aligned}$$

であり、また

$$\begin{aligned}
1_{\mathbb{C}} \cdot (a, b) &= (a, b) \cdot 1_{\mathbb{C}} & (\because \text{上で示した積の可換律}) \\
&= (a, b) & (\because \text{上の計算})
\end{aligned}$$

であるから $1_{\mathbb{C}}$ は積の単位元である。

零でないことと平方和が正であることの同値。 $z = (a, b) \in \mathbb{C}$ について $z \neq (0, 0) \iff a^2 + b^2 > 0$ を示す。まず

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 &\geq 0 + b^2 & (\because \mathbb{R} \text{ では平方は非負であることと、和が順序を保つこと}) \\
&\geq 0 + 0 & (\because \mathbb{R} \text{ では平方は非負であることと、和が順序を保つこと}) \\
&= 0 & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元})
\end{aligned}$$

である。次に $a^2 + b^2 = 0$ と仮定すると

$$\begin{aligned}
a^2 &= a^2 + 0 & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\
&= a^2 + (b^2 + (-b^2)) & (\because -b^2 \text{ は } b^2 \text{ の和の逆元}) \\
&= (a^2 + b^2) + (-b^2) & (\because \mathbb{R} \text{ の和の結合律}) \\
&= 0 + (-b^2) & (\because \text{仮定 } a^2 + b^2 = 0) \\
&= -b^2 & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\
&\leq 0 & (\because b^2 \geq 0 \text{ と、和の逆元が順序を反転すること})
\end{aligned}$$

となり、 $a^2 \geq 0$ と併せて $a^2 = 0$ 、したがって $a = 0$ である ($\mathbb{R}$ では $x \neq 0$ なら $x^2 > 0$ だから)。 a と b を入れ替えれば同じ議論で $b = 0$ を得る。逆に $a = b = 0$ のときは

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 &= 0^2 + 0^2 & (\because \text{仮定 } a = b = 0) \\
&= 0 + 0 & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0。2 \text{ 箇所へ適用}) \\
&= 0 & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元})
\end{aligned}$$

である。ゆえに $a^2 + b^2 = 0 \iff z = (0, 0)$ であり、これと $a^2 + b^2 \geq 0$ を併せて $z \neq (0, 0) \iff a^2 + b^2 > 0$ を得る。

$\mathbb{C}^\times$ が積について閉じること。まず次の恒等式を示す。

$$\begin{aligned}
(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 &= (a^2c^2 - 2abcd + b^2d^2) + (a^2d^2 + 2abcd + b^2c^2) & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と積の結合律・可換律を 2 箇所へ適用}) \\
&= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + ((-2abcd) + 2abcd) & (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律と結合律}) \\
&= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + 0 & (\because -2abcd \text{ は } 2abcd \text{ の和の逆元}) \\
&= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\
&= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と積の可換律})
\end{aligned}$$

$z = (a, b)$, $w = (c, d) \in \mathbb{C}^\times$ とすると、上で示した同値より $a^2 + b^2 > 0$ かつ $c^2 + d^2 > 0$ であるから $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) > 0$ である ($\mathbb{R}$ では正の元どうしの積は正)。この恒等式より $zw = (ac - bd, ad + bc)$ の 2 つの成分の平方和は正であり、再び上の同値より $zw \neq (0, 0)$ 、すなわち $zw \in \mathbb{C}^\times$ である。また

$$\begin{aligned}
1^2 + 0^2 &= 1 + 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ では } 1 \text{ は積の単位元、および } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\
&= 1 \quad (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\
&> 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の順序})
\end{aligned}$$

より $1_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}^{\times}$ である。

逆元の存在。 $z = (a, b) \in \mathbb{C}^{\times}$ とすると、上で示した同値より $a^2 + b^2 > 0$ であるから

$$w := \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$$

が定まり、

$$\begin{aligned}
z \cdot w &= (a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) && (\because w \text{ の定め方}) \\
&= \left(a \cdot \frac{a}{a^2 + b^2} - b \cdot \frac{-b}{a^2 + b^2}, a \cdot \frac{-b}{a^2 + b^2} + b \cdot \frac{a}{a^2 + b^2} \right) && (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\
&= \left(\frac{a^2}{a^2 + b^2} - \frac{-b^2}{a^2 + b^2}, \frac{-ab}{a^2 + b^2} + \frac{ab}{a^2 + b^2} \right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分数と積の関係を 4 箇所へ適用}) \\
&= \left(\frac{a^2 - (-b^2)}{a^2 + b^2}, \frac{(-ab) + ab}{a^2 + b^2} \right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分母の等しい分数の差と和}) \\
&= \left(\frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2}, \frac{0}{a^2 + b^2} \right) && (\because -(-b^2) = b^2 \text{ と、 } -ab \text{ が } ab \text{ の和の逆元であること}) \\
&= \left(1, \frac{0}{a^2 + b^2} \right) && (\because a^2 + b^2 \neq 0 \text{ による約分}) \\
&= (1, 0) && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を分子にもつ分数は } 0) \\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because 1_{\mathbb{C}} = (1, 0))
\end{aligned}$$

である。さらに

$$\begin{aligned}
w \cdot z &= z \cdot w \quad (\because \text{上で示した積の可換律}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の計算})
\end{aligned}$$

である。また $w = (0, 0)$ とすると 定義 1.11 の積の定義より $zw = (0, 0)$ となって $zw = 1_{\mathbb{C}} \neq (0, 0)$ に矛盾するから $w \neq (0, 0)$ 、すなわち $w \in \mathbb{C}^{\times}$ である。

逆元の一意性。単位元 e をもつ結合的な二項演算をもつ集合 S において、 $a \in S$ に対し $b, b' \in S$ がともに $ab = ba = e$ 、 $ab' = b'a = e$ を満たすとする、

$$\begin{aligned}
b &= be \quad (\because e \text{ は単位元}) \\
&= b(ab') \quad (\because ab' = e) \\
&= (ba)b' \quad (\because \text{結合律}) \\
&= eb' \quad (\because ba = e) \\
&= b' \quad (\because e \text{ は単位元})
\end{aligned}$$

であるから逆元は一意である。よって $z \in \mathbb{C}^{\times}$ の逆元を z^{-1} と書くことができ、

$$z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) \quad (z = (a, b))$$

である。

結論と記法。上で示したところにより $\mathbb{C}^{\times}$ は積について閉じ、結合律を満たし、単位元 $1_{\mathbb{C}}$ を含み、各元が逆元をもつ。したがって $\mathbb{C}^{\times}$ は群をなす（積の可換律も示したので可換群である）。

主張の最後の等式 $z^{-1} = 1/z$ は記法の約束である。すなわち $w \in \mathbb{C}$ 、 $z \in \mathbb{C}^{\times}$ に対して商を $w/z := w \cdot z^{-1}$ と定めると、

$$\begin{aligned} 1/z &= 1_{\mathbb{C}} \cdot z^{-1} \quad (\because \text{商の定め方}) \\ &= z^{-1} \quad (\because \text{上で示した } 1_{\mathbb{C}} \text{ が積の単位元であること}) \end{aligned}$$

であり、両記法は一致する。 □

主張 1.35 ($\mathbb{C}$ は体). $\mathbb{C}$ は体をなす。

証明. 加法について。定義 1.11 は $\mathbf{C} = \mathbf{R}^2$ 上の加法と積を定めている。その成分ごとの加法は $\mathbb{R}^2$ の実数成分を足す次の式

$$(a, b) + (c, d) := (a + c, b + d) \quad (a, b, c, d \in \mathbb{R})$$

である。以下ではこの加法と 定義 1.11 の積について、体の公理をすべて確かめる。

示すべきことは次の 5 つである。

- $(\mathbb{C}, +)$ は可換群である (加法の群構造)。
- 積は結合的・可換であり単位元 $1_{\mathbb{C}}$ をもつ (積のモノイド構造)。
- 分配律が成り立つ。
- $1_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$ である (単位元と零元の相違)。
- $0_{\mathbb{C}}$ 以外の元は積について可逆である (逆元の存在)。

以下 $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$ とし、 $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{C}$ とする。
加法の結合律。

$$\begin{aligned} ((a, b) + (c, d)) + (e, f) &= (a + c, b + d) + (e, f) && (\because \text{成分ごとの加法の定義}) \\ &= ((a + c) + e, (b + d) + f) && (\because \text{成分ごとの加法の定義}) \\ &= (a + (c + e), b + (d + f)) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の結合律を 2 箇所へ適用}) \\ &= (a, b) + (c + e, d + f) && (\because \text{成分ごとの加法の定義}) \\ &= (a, b) + ((c, d) + (e, f)) && (\because \text{成分ごとの加法の定義}) \end{aligned}$$

加法の可換律。

$$\begin{aligned} (a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d) && (\because \text{成分ごとの加法の定義}) \\ &= (c + a, d + b) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律を 2 箇所へ適用}) \\ &= (c, d) + (a, b) && (\because \text{成分ごとの加法の定義}) \end{aligned}$$

加法の単位元。

$$\begin{aligned} (a, b) + 0_{\mathbb{C}} &= (a, b) + (0, 0) && (\because \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ の包含写像の } 0_{\mathbb{C}} = (0, 0)) \\ &= (a + 0, b + 0) && (\because \text{成分ごとの加法の定義}) \\ &= (a, b) && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元。2 箇所へ適用}) \end{aligned}$$

引いたブロックは 定義 1.12 である。

加法の逆元。

$$\begin{aligned} (a, b) + (-a, -b) &= (a + (-a), b + (-b)) && (\because \text{成分ごとの加法の定義}) \\ &= (0, 0) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の逆元を 2 箇所へ適用}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} && (\because \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ の包含写像の } 0_{\mathbb{C}} = (0, 0)) \end{aligned}$$

ここで $-a, -b \in \mathbb{R}$ なので $(-a, -b) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ である。以上の 4 つより $(\mathbb{C}, +)$ は可換群である。引いたブロックは 定義 1.12 である。

この加法逆元は 定義 1.13 の $-z := (-1_{\mathbb{C}}) \cdot z$ と一致する。

$$\begin{aligned} (-1_{\mathbb{C}}) \cdot (a, b) &= (-1, 0) \cdot (a, b) & (\because \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ の包含写像 より } -1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(-1) = (-1, 0)) \\ &= ((-1)a - 0 \cdot b, (-1)b + 0 \cdot a) & (\because \mathbb{C} \text{ の定義 の積}) \\ &= (-a, -b) & (\because \mathbb{R} \text{ では } 1 \text{ は積の単位元、 } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0、0 \text{ は和の単位元}) \end{aligned}$$

引いたブロックは 定義 1.12 と 定義 1.11 である。

積のモノイド構造。積の結合律・可換律・単位元 $1_{\mathbb{C}}$ の存在は 主張 1.34 の「積の可換律」「積の結合律」「積の単位元」で示した（これらは $\mathbb{C}$ の全元について成り立つ主張である）。左からの分配律。

$$\begin{aligned} (a, b) \cdot ((c, d) + (e, f)) &= (a, b) \cdot (c + e, d + f) & (\because \text{成分ごとの加法の定義}) \\ &= (a(c + e) - b(d + f), a(d + f) + b(c + e)) & (\because \mathbb{C} \text{ の定義 の積}) \\ &= (ac + ae - (bd + bf), ad + af + (bc + be)) & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律を 4 箇所へ適用}) \\ &= ((ac - bd) + (ae - bf), (ad + bc) + (af + be)) & (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律・結合律、および和の逆元の分配}) \\ &= (ac - bd, ad + bc) + (ae - bf, af + be) & (\because \text{成分ごとの加法の定義}) \\ &= (a, b) \cdot (c, d) + (a, b) \cdot (e, f) & (\because \mathbb{C} \text{ の定義 の積を 2 箇所へ適用}) \end{aligned}$$

引いたブロックは 定義 1.11 である。第 4 の等号の「和の逆元の分配」とは $-(bd + bf) = (-bd) + (-bf)$ のことである。

右からの分配律。

$$\begin{aligned} ((c, d) + (e, f)) \cdot (a, b) &= (a, b) \cdot ((c, d) + (e, f)) & (\because \mathbb{C} \text{ の乗法群 の積の可換律}) \\ &= (a, b) \cdot (c, d) + (a, b) \cdot (e, f) & (\because \text{上で示した左からの分配律}) \\ &= (c, d) \cdot (a, b) + (e, f) \cdot (a, b) & (\because \mathbb{C} \text{ の乗法群 の積の可換律を 2 箇所へ適用}) \end{aligned}$$

引いたブロックは 主張 1.34 である。

単位元と零元の相違。

$$\begin{aligned} 1_{\mathbb{C}} &= (1, 0) & (\because \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ の包含写像 の } 1_{\mathbb{C}} = (1, 0)) \\ &\neq (0, 0) & (\because \mathbb{R} \text{ において } 1 \neq 0 \text{ であり、第 1 成分が異なる}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} & (\because \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ の包含写像 の } 0_{\mathbb{C}} = (0, 0)) \end{aligned}$$

引いたブロックは 定義 1.12 である。

逆元が存在。主張 1.34 より $\mathbb{C}^{\times} = \mathbb{C} \setminus \{(0, 0)\}$ は積について群をなす。したがって $z \neq 0_{\mathbb{C}}$ なる $z \in \mathbb{C}$ は $z \in \mathbb{C}^{\times}$ であり、積に関する逆元 $z^{-1} \in \mathbb{C}^{\times}$ をもつ。

結論。以上で 5 つがすべて成り立つので、 $\mathbb{C}$ は体をなす。 $\square$

定義 1.36 (複素数から極座標同値類への写像). 定義 1.31 の同値類と、定義 1.6、定義 1.24 を用いる。

$\phi_{\text{polar}} : \mathbb{C} \rightarrow (\text{極座標表現})$ を次で定める。

$$\phi_{\text{polar}}(x, y) := \begin{cases} \left[(\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x)) \right]_{\sim} & (x > 0), \\ \left[(\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x) + \pi) \right]_{\sim} & (x < 0, y \geq 0), \\ \left[(\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x) - \pi) \right]_{\sim} & (x < 0, y < 0), \\ [(y, \pi/2)]_{\sim} & (x = 0, y > 0), \\ [(-y, -\pi/2)]_{\sim} & (x = 0, y < 0), \\ [(0, 0)]_{\sim} & (x = 0, y = 0). \end{cases}$$

定義 1.37 (極座標同値類から複素数への写像). 定義 1.31 の商集合と 定義 1.27 の関係を使う。以下の式に必要な正弦・余弦は、現在の 定義 1.22 と 定義 1.25 では主値区間に限られている。全実数上への拡張と周期性が未整備のため、以下の写像定義と代表元独立性の説明は未完である。

$\phi_{\text{cartesian}} : (\text{極座標表現}) \rightarrow \mathbb{C}$ を次で定める。

$$\phi_{\text{cartesian}}([(r, \theta)]_{\sim}) := (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

この右辺は同値類の代表元の取り方によらないので、 $\phi_{\text{cartesian}}$ は well-defined である。実際、

$$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} = [\theta']_{\sim_{\text{angle}}} \Rightarrow \exists n \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } \theta - \theta' = 2n\pi \Rightarrow \cos \theta = \cos \theta', \sin \theta = \sin \theta'$$

主張 1.38 ($\phi_{\text{cartesian}}$ の同型性). (TODO: 原稿注記「体として同型を示す」あり)

$A, B \in (\text{極座標表現})$ に対して次が成り立つ。

- $\phi_{\text{cartesian}}(A \cdot B) = \phi_{\text{cartesian}}(A) \cdot \phi_{\text{cartesian}}(B)$ (モノイド準同型)
- $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射。

証明. モノイド準同型性. $[(r, \theta)]_{\sim}, [(r', \theta')]_{\sim} \in (\text{極座標表現})$ に対して、

$$\begin{aligned} \phi_{\text{cartesian}}([(r, \theta)]_{\sim} \cdot [(r', \theta')]_{\sim}) &= \phi_{\text{cartesian}}([(rr', \theta + \theta')]_{\sim}) && (\because \text{極座標表現の演算}) \\ &= (rr' \cos(\theta + \theta'), rr' \sin(\theta + \theta')) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\ &= (rr'(\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta'), rr'(\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta')) && (\because \text{三角関数の加法定理}) \\ &= (rr' \cos \theta \cos \theta' - rr' \sin \theta \sin \theta', rr' \cos \theta \sin \theta' + rr' \sin \theta \cos \theta') && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\ &= ((r \cos \theta)(r' \cos \theta') - (r \sin \theta)(r' \sin \theta'), (r \cos \theta)(r' \sin \theta') + (r \sin \theta)(r' \cos \theta')) && (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律と結合法則}) \\ &= (r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot (r' \cos \theta', r' \sin \theta') && (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}}([(r, \theta)]_{\sim}) \cdot \phi_{\text{cartesian}}([(r', \theta')]_{\sim}) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

である (引いたブロックは 定義 1.32、定義 1.37、定義 1.11)。

全単射性。合成 $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}}$ が $\mathbb{C}$ の恒等写像であることを、定義 1.36 の場合分けに沿って場合ごとに示す。場合分けなので全体を 1 つの式変形にはできないが、各場合の中の計算はそれぞれ一続きにする。

$x > 0$ の場合。

$$\begin{aligned} (\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x, y) &= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[(\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x))\right]_{\sim}\right) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x > 0 \text{ の場合}) \\ &= (\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos(\arctan(y/x)), \sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin(\arctan(y/x))) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\ &= \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}{\sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, \frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} (y/x)}{\sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \arctan \text{ の } \cos, \sin) \\ &= \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} x}{x \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, \frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} y}{x \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because x > 0 \text{ なので分母と分子に } x \text{ を掛けられる}) \\ &= \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} x}{\sqrt{x^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, \frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} y}{\sqrt{x^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because x > 0 \text{ と平方根の一意性から } x = \sqrt{x^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}) \\ &= \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} x}{\sqrt{x^2(1 + (y/x)^2)}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, \frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} y}{\sqrt{x^2(1 + (y/x)^2)}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \text{平方根の一意性から } \sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}) \\ &= \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} x}{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, \frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} y}{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because x^2(1 + (y/x)^2) = x^2 + y^2) \\ &= (x, y) && (\because x > 0 \text{ なので } \sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \neq 0 \text{ で約分できる}) \end{aligned}$$

である (引いたブロックは 定義 1.36、定義 1.37、主張 1.26、主張 1.5、定義 1.6)。

$x < 0$ の場合。 $y \geq 0$ と $y < 0$ で ϕ_{polar} の値は違うが、いずれも同じ式に着く。まず $y \geq 0$ のとき

$$\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x, y) &= \phi_{\text{cartesian}}\left([\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x) + \pi\right]_{\sim}) & (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x < 0, y \geq 0 \text{ の場合}) \\
&= \left(\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos(\arctan(y/x) + \pi), \sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin(\arctan(y/x) + \pi)\right) & (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\
&= \left(-\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos(\arctan(y/x)), -\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin(\arctan(y/x))\right) & (\because \cos(\theta + \pi) = -\cos \theta, \sin(\theta + \pi) = -\sin \theta)
\end{aligned}$$

であり、 $y < 0$ のとき

$$\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x, y) &= \phi_{\text{cartesian}}\left([\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x) - \pi\right]_{\sim}) & (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x < 0, y < 0 \text{ の場合}) \\
&= \left(\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos(\arctan(y/x) - \pi), \sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin(\arctan(y/x) - \pi)\right) & (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\
&= \left(-\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos(\arctan(y/x)), -\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin(\arctan(y/x))\right) & (\because \cos(\theta - \pi) = -\cos \theta, \sin(\theta - \pi) = -\sin \theta)
\end{aligned}$$

である。いずれの場合も同じ式に着いたので、そこから続けると

$$\begin{aligned}
&\left(-\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos(\arctan(y/x)), -\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin(\arctan(y/x))\right) \\
&= \left(-\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}{\sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, -\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} (y/x)}{\sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (\because \arctan \text{ の } \cos, \sin) \\
&= \left(-\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} x}{x \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, -\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} y}{x \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (\because x < 0 \text{ なので分母と分子に } x \text{ を掛けられる}) \\
&= \left(-\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} x}{-\sqrt{(-x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, -\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} y}{-\sqrt{(-x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (\because x < 0 \text{ のとき } x = -\sqrt{(-x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}) \\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} x}{\sqrt{(-x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, \frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} y}{\sqrt{(-x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (\because \text{分子の負号と分母の負号が相殺する}) \\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} x}{\sqrt{x^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, \frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} y}{\sqrt{x^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sqrt{1 + (y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (\because (-x)^2 = x^2) \\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} x}{\sqrt{x^2(1 + (y/x)^2)}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, \frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} y}{\sqrt{x^2(1 + (y/x)^2)}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (\because \text{平方根の一意性から } \sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}) \\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} x}{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}, \frac{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} y}{\sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (\because x^2(1 + (y/x)^2) = x^2 + y^2) \\
&= (x, y) & (\because x < 0 \text{ なので } \sqrt{x^2 + y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \neq 0 \text{ で約分できる})
\end{aligned}$$

である (引いたブロックは 定義 1.36、定義 1.37、主張 1.26、定理 1.7、主張 1.5)。

$x = 0$ かつ $y > 0$ の場合。

$$\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x, y) &= \phi_{\text{cartesian}}([(y, \pi/2)]_{\sim}) & (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x = 0, y > 0 \text{ の場合}) \\
&= (y \cos(\pi/2), y \sin(\pi/2)) & (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\
&= (y \cdot 0, y \cdot 1) & (\because \cos(\pi/2) = 0, \sin(\pi/2) = 1) \\
&= (0, y) & (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0, 1 \text{ は積の単位元}) \\
&= (x, y) & (\because x = 0)
\end{aligned}$$

である (引いたブロックは 定義 1.36、定義 1.37)。

$x = 0$ かつ $y < 0$ の場合。

$$\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x, y) &= \phi_{\text{cartesian}}([(-y, -\pi/2)]_{\sim}) & (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x = 0, y < 0 \text{ の場合}) \\
&= ((-y) \cos(-\pi/2), (-y) \sin(-\pi/2)) & (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\
&= ((-y) \cdot 0, (-y) \cdot (-1)) & (\because \cos(-\pi/2) = 0, \sin(-\pi/2) = -1) \\
&= (0, y) & (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0, \text{ 負号を } 2 \text{ 度施すともとに戻る}) \\
&= (x, y) & (\because x = 0)
\end{aligned}$$

である (引いたブロックは 定義 1.36、定義 1.37)。

$x = 0$ かつ $y = 0$ の場合。

$$\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x, y) &= \phi_{\text{cartesian}}([(0, 0)]_{\sim}) \quad (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x = 0, y = 0 \text{ の場合}) \\
&= (0 \cdot \cos 0, 0 \cdot \sin 0) \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\
&= (0, 0) \quad (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\
&= (x, y) \quad (\because x = 0 \text{ かつ } y = 0)
\end{aligned}$$

である (引いたブロックは 定義 1.36、定義 1.37)。

以上で ϕ_{polar} の定義のすべての場合について $(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x, y) = (x, y)$ が示され、 $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$ である。 $\square$

定義 1.39 (第 1 座標, 第 2 座標). 定義 1.31 の同値類から、半径と 定義 1.27 による角度の同値類を取り出す。

$[(r, \theta)]_{\sim} \in (\text{極座標表現})$ について、

$$\text{pr}_1 : (\text{極座標表現}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad [(r, \theta)]_{\sim} \mapsto r$$

$$\text{pr}_2 : (\text{極座標表現}) \rightarrow (\text{角度表現}), \quad [(r, \theta)]_{\sim} \mapsto \begin{cases} [0]_{\sim_{\text{angle}}} & (r = 0), \\ [\theta]_{\sim_{\text{angle}}} & (r \neq 0). \end{cases}$$

定義 1.40 (絶対値, 偏角). 定義 1.36、定義 1.39、定義 1.29 を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ について、
 $|\cdot| : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ を

$$|z| := \text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z))$$

と定め、 z の絶対値と呼ぶ。

$\arg^{[0, 2\pi)} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$\arg^{[0, 2\pi)}(z) := s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z)))$$

と定め、 z の偏角と呼ぶ。

主張 1.41 (絶対値の基本性質). 定義 1.40 の絶対値 $|\cdot| : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ について、次が成り立つ。

- (1) $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ について $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ 。
- (2) $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ について $|z|^2 = x^2 + y^2$ 。
- (3) $|z| = 0 \iff z = 0_{\mathbb{C}}$ 。
- (4) $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ 。
- (5) $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ 。
- (6) $x \in \mathbb{R}$ について $|\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(x)| = |x|$ (右辺は実数の絶対値)。

ここで $\mathbb{C}$ の加法は 主張 1.35 で定めた $\mathbb{R}^2$ の成分ごとの加法である。

証明. 証明の中で使うものを先に置く。 $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ 、 $z_1 = (a, b) \in \mathbb{C}$ 、 $z_2 = (c, d) \in \mathbb{C}$ と書く ($x, y, a, b, c, d \in \mathbb{R}$)。

pr_1 が well-defined であること。定義 1.39 は $\text{pr}_1([(r, \theta)]_\sim) := r$ と代表元を用いて定めている。 $(r, \theta) \sim (r', \theta')$ とすると 定義 1.31 より $r = r' = 0$ または $r = r'$ であり、いずれの場合も $r = r'$ である。よって値は代表元によらない。

非負実数の平方の比較。 $u, v \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について $u^2 \leq v^2$ ならば $u \leq v$ である。対偶を示す。 $u > v (\geq 0)$ とすると $u > 0$ であり、

$$\begin{aligned} u^2 &= u \cdot u \quad (\because \text{平方の定め方}) \\ &> v \cdot u \quad (\because u > v \text{ と } u > 0. \text{ 正の元を掛けても大小は保たれる}) \\ &\geq v \cdot v \quad (\because u \geq v \text{ と } v \geq 0. \text{ 非負の元を掛けても大小は保たれる}) \\ &= v^2 \quad (\because \text{平方の定め方}) \end{aligned}$$

であるから $u^2 > v^2$ である。とくに $u, v \geq 0$ かつ $u^2 = v^2$ ならば $u \leq v$ かつ $v \leq u$ より $u = v$ である。

以下、6 つの主張を順に示す。

(1) 成分による表示。定義 1.40 より $|z| = \text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z))$ であるから、定義 1.36 の場合分けに従って計算する。

$$\text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(x, y)) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x > 0), \\ \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x < 0, y \geq 0), \\ \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x < 0, y < 0), \\ y & (x = 0, y > 0), \\ -y & (x = 0, y < 0), \\ 0 & (x = 0, y = 0). \end{cases}$$

上 3 つの場合は主張の形をしている。残りの 3 つの場合を確かめる。以下、定義 1.6 より $\sqrt{s}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ は $u \geq 0$ かつ $u^2 = s$ を満たす唯一の u であることを使う。

$x = 0, y > 0$ のとき、

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{0^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because x = 0) \\ &= \sqrt{0 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\ &= \sqrt{y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\ &= y \quad (\because y > 0 \text{ なので } y \geq 0 \text{ であり } y^2 = y^2. \text{ 平方根の一意性}) \\ &= \text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(x, y)) \quad (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x = 0, y > 0 \text{ の場合}) \end{aligned}$$

$x = 0, y < 0$ のとき、

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{0^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because x = 0) \\ &= \sqrt{0 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\ &= \sqrt{y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\ &= \sqrt{(-y)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \mathbb{R} \text{ では } (-y)^2 = y^2) \\ &= -y \quad (\because y < 0 \text{ なので } -y \geq 0 \text{ であり } (-y)^2 = (-y)^2. \text{ 平方根の一意性}) \\ &= \text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(x, y)) \quad (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x = 0, y < 0 \text{ の場合}) \end{aligned}$$

$x = 0, y = 0$ のとき、

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{0^2 + 0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (\because x = 0 \text{ かつ } y = 0) \\
&= \sqrt{0 + 0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0. \text{ 2箇所へ適用}) \\
&= \sqrt{0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\
&= 0 & (\because 0 \geq 0 \text{ であり } 0^2 = 0. \text{ 平方根の一意性}) \\
&= \text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(x, y)) & (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x = 0, y = 0 \text{ の場合})
\end{aligned}$$

以上より、すべての場合で $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ である。

(2) 絶対値の平方。

$$\begin{aligned}
|z|^2 &= \left(\sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \right)^2 & (\because \text{上で示した成分による表示}) \\
&= x^2 + y^2 & (\because x^2 + y^2 \geq 0 \text{ と、平方根の定義 } \left(\sqrt{s}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \right)^2 = s)
\end{aligned}$$

(3) 絶対値が 0 であることと $z = 0_{\mathbb{C}}$ であることの同値。2 つの向きを別々に示す。

$|z| = 0$ とすると、

$$\begin{aligned}
x^2 + y^2 &= |z|^2 & (\because \text{上で示した絶対値の平方}) \\
&= 0^2 & (\because \text{仮定 } |z| = 0) \\
&= 0 & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0)
\end{aligned}$$

である。主張 1.34 の「零でないことと平方和が正であることの同値」で示したとおり $x^2 + y^2 = 0 \iff (x, y) = (0, 0)$ であるから $z = 0_{\mathbb{C}}$ である。逆に $z = 0_{\mathbb{C}} = (0, 0)$ とすると、

$$\begin{aligned}
|z| &= \sqrt{0^2 + 0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (\because \text{上で示した成分による表示と } z = (0, 0)) \\
&= 0 & (\because \text{上の } x = 0, y = 0 \text{ の場合の計算})
\end{aligned}$$

(4) 積の絶対値。

$$\begin{aligned}
|z_1 z_2|^2 &= |(ac - bd, ad + bc)|^2 & (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\
&= (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 & (\because \text{上で示した絶対値の平方}) \\
&= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) & (\because \text{複素数の乗法群の「積について閉じること」の恒等式}) \\
&= |z_1|^2 |z_2|^2 & (\because \text{上で示した絶対値の平方。2箇所へ適用}) \\
&= (|z_1| |z_2|)^2 & (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律と結合律})
\end{aligned}$$

定義 1.11、主張 1.34。 $|z_1 z_2| \geq 0$ かつ $|z_1| |z_2| \geq 0$ であるから、上で示した非負実数の平方の比較より $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ である。

Lagrange の恒等式。 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ について次が成り立つ。

$$\begin{aligned}
(ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 &= (a^2 c^2 + 2abcd + b^2 d^2) + (a^2 d^2 - 2abcd + b^2 c^2) & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律。2箇所へ適用}) \\
&= (a^2 c^2 + b^2 d^2 + a^2 d^2 + b^2 c^2) + (2abcd + (-2abcd)) & (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律と結合律}) \\
&= (a^2 c^2 + b^2 d^2 + a^2 d^2 + b^2 c^2) + 0 & (\because -2abcd \text{ は } 2abcd \text{ の和の逆元}) \\
&= a^2 c^2 + b^2 d^2 + a^2 d^2 + b^2 c^2 & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\
&= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}$$

Cauchy-Schwarz の不等式 (2 成分の場合)。

$$\begin{aligned}
(ac+bd)^2 &\leq (ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 && (\because \mathbb{R} \text{ では平方は非負であることと、和が順序を保つこと}) \\
&= (a^2+b^2)(c^2+d^2) && (\because \text{上で示した Lagrange の恒等式}) \\
&= |z_1|^2 |z_2|^2 && (\because \text{上で示した絶対値の平方。2箇所へ適用}) \\
&= (|z_1| |z_2|)^2 && (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律と結合律})
\end{aligned}$$

$ac+bd \leq 0$ のときは $ac+bd \leq 0 \leq |z_1| |z_2|$ である。 $ac+bd > 0$ のときは、上で示した非負実数の平方の比較を $u = ac+bd$ 、 $v = |z_1| |z_2|$ に適用して $ac+bd \leq |z_1| |z_2|$ である。いずれの場合も

$$ac+bd \leq |z_1| |z_2|$$

が成り立つ。

(5) 三角不等式。

$$\begin{aligned}
|z_1+z_2|^2 &= |(a+c, b+d)|^2 && (\because \mathbb{C} \text{ の成分ごとの加法}) \\
&= (a+c)^2 + (b+d)^2 && (\because \text{上で示した絶対値の平方}) \\
&= (a^2+b^2) + (c^2+d^2) + 2(ac+bd) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と、和の可換律・結合律}) \\
&= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2(ac+bd) && (\because \text{上で示した絶対値の平方。2箇所へ適用}) \\
&\leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1| |z_2| && (\because \text{上で示した Cauchy-Schwarz の不等式と、和が順序を保つこと}) \\
&= (|z_1| + |z_2|)^2 && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}$$

主張 1.35. $|z_1+z_2| \geq 0$ かつ $|z_1| + |z_2| \geq 0$ であるから、上で示した非負実数の平方の比較より $|z_1+z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ である。

(6) 実数の絶対値との一致。

$$\begin{aligned}
|\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(x)| &= |(x, 0)| && (\because \mathbb{R} \text{ から } \mathbb{C} \text{ への包含写像の定め方}) \\
&= \sqrt{x^2+0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{上で示した成分による表示}) \\
&= \sqrt{x^2+0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\
&= \sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元})
\end{aligned}$$

定義 1.12. あとは x の符号で場合を分ける。 $x \geq 0$ のときは

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= x && (\because x \geq 0 \text{ であり } x^2 = x^2. \text{平方根の一意性}) \\
&= |x| && (\because x \geq 0 \text{ における実数の絶対値の定め方})
\end{aligned}$$

であり、 $x < 0$ のときは

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \mathbb{R} \text{ では } (-x)^2 = x^2) \\
&= -x && (\because x < 0 \text{ なので } -x \geq 0 \text{ であり } (-x)^2 = (-x)^2. \text{平方根の一意性}) \\
&= |x| && (\because x < 0 \text{ における実数の絶対値の定め方})
\end{aligned}$$

である。いずれの場合も $|\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(x)| = |x|$ である。 □

主張 1.42. 定義 1.36 と 定義 1.29 を使う。非零性との同値には 主張 1.41、積の計算には 定義 1.32 を用いる。

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、 $r_1, r_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 、 $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\text{polar}}(z_i) = [(r_i, \theta_i)]_{\sim}$ とし、 $\arg^{[0, 2\pi)}(z_i) = \theta_i - 2n_i\pi$ ($n_i \in \mathbb{Z}$) とする。さらに $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ とする (定義 1.40 と 定義 1.39 により $r_i = |z_i|$ なので、これは $z_1 \neq 0$ かつ $z_2 \neq 0$ と同じことである)。このとき

$$\arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) & (0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi & (2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi) \end{cases}$$

が成り立つ。 $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ を落とすと主張は成り立たない。たとえば $z_1 = 0$ 、 $z_2 = (0, 1)$ では左辺が 0、右辺が $\pi/2$ になる。

証明. 証明の中で使うものを 2 つ先に置く。

第一に、 ϕ_{polar} は積を保つ。実際 主張 1.38 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$ なので、 ϕ_{polar} は $\phi_{\text{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\text{polar}}(z_1 z_2) = \phi_{\text{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2)$$

である。第二に、 $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ なので $r_1 r_2 \neq 0$ である（実数の積は、因子がどちらも 0 でなければ 0 でない）。

$$\begin{aligned} \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) &= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1 z_2))) & (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 1.40}) \\ &= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2))) & (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと}) \\ &= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2, \theta_2)]_{\sim})) & (\because r_i, \theta_i \text{ の取り方}) \\ &= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)]_{\sim})) & (\because \text{極座標表現の演算。定義 1.32}) \\ &= s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) & (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合 (定義 1.39) と } r_1 r_2 \neq 0) \end{aligned}$$

である。

ここから先は $\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi$ の値で 2 つに分かれる。

$0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi$ のとき。この不等式は 主張 1.28 が一意に定める整数が $n_1 + n_2$ であることを言っているので、

$$\begin{aligned} s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) &= \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi & (\because \text{角度表現の切断の定義 (定義 1.29) と、この場合の不等式 (主張 1.28)}) \\ &= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + (\theta_2 - 2n_2\pi) & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定}) \end{aligned}$$

である。

$2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi$ のとき。両辺から 2π を引けば $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2 + 1)\pi < 2\pi$ なので、主張 1.28 が一意に定める整数は $n_1 + n_2 + 1$ である。したがって

$$\begin{aligned} s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) &= \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2 + 1)\pi & (\because \text{角度表現の切断の定義 (定義 1.29) と、いま見た不等式 (主張 1.28)}) \\ &= (\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi) - 2\pi & (\because 2(n_1 + n_2 + 1)\pi = 2(n_1 + n_2)\pi + 2\pi) \\ &= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) - 2\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + (\theta_2 - 2n_2\pi) - 2\pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定}) \end{aligned}$$

である。 □

主張 1.43. 定義 1.36 と 定義 1.29 を使う。非零性との同値には 主張 1.41、積の計算には 定義 1.32 を用いる。

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、 $r_1, r_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 、 $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\text{polar}}(z_i) = [(r_i, \theta_i)]_{\sim}$ とし、 $\arg^{[0,2\pi)}(z_i) = \theta_i - 2n_i\pi$ ($n_i \in \mathbb{Z}$) とする。さらに $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ とする（定義 1.40 と 定義 1.39 により $r_i = |z_i|$ なので、これは $z_1 \neq 0$ かつ $z_2 \neq 0$ と同じことである）。このとき

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) & (0 \leq \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) + 2\pi & (-2\pi < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 0) \end{cases}$$

が成り立つ。 $r_2 \neq 0$ は商 z_1/z_2 が定まるために要る (主張 1.34)。 $r_1 \neq 0$ も落とせない。たとえば $z_1 = 0$ 、 $z_2 = (0, 1)$ では左辺が 0、右辺が $-\pi/2 + 2\pi$ になる。

証明. 証明の中で使うものを 4 つ先に置く。

第一に、 ϕ_{polar} は積を保つ。実際 主張 1.38 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$ なので、 ϕ_{polar} は $\phi_{\text{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\text{polar}}(zz') = \phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z')$$

が任意の $z, z' \in \mathbb{C}$ について成り立つ。

第二に、 ϕ_{polar} は逆元を逆元へ写す。 $r_2 \neq 0$ すなわち $z_2 \neq 0$ なので $z_2^{-1} \in \mathbb{C}$ が定まり (主張 1.34)、

$$\begin{aligned} \phi_{\text{polar}}(z_2) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2^{-1}) &= \phi_{\text{polar}}(z_2 z_2^{-1}) \quad (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと}) \\ &= \phi_{\text{polar}}(1_{\mathbb{C}}) \quad (\because z_2^{-1} \text{ が } z_2 \text{ の逆元であること}) \\ &= [(1, 0)]_{\sim} \quad (\because \text{モノイド準同型の逆写像は単位元を単位元へ写すこと}) \end{aligned}$$

である。したがって $\phi_{\text{polar}}(z_2^{-1})$ は $\phi_{\text{polar}}(z_2) = [(r_2, \theta_2)]_{\sim}$ の逆元であり、主張 1.33 の逆元の形 ($r_2 \neq 0$ の場合) により

$$\phi_{\text{polar}}(z_2^{-1}) = [(1/r_2, -\theta_2)]_{\sim}$$

である。

第三に、 $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ なので $r_1/r_2 \neq 0$ である (実数の商は、分子が 0 でなければ 0 でない)。

第四に、 $\arg^{[0, 2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi$ と $\arg^{[0, 2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi$ はどちらも $[0, 2\pi)$ の元なので (定義 1.40)、その差について

$$-2\pi < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 2\pi$$

が成り立つ。

$$\begin{aligned} \arg^{[0, 2\pi)}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) &= \arg^{[0, 2\pi)}(z_1 z_2^{-1}) && (\because \mathbb{C} \text{ の乗法群の } z^{-1} = 1/z. \text{ 主張 1.34}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1 z_2^{-1}))) && (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0, 2\pi)} \text{ の定義. 定義 1.40}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2^{-1}))) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(1/r_2, -\theta_2)]_{\sim})) && (\because r_1, \theta_1 \text{ の取り方と、上で見た } \phi_{\text{polar}}(z_2^{-1}) \text{ の形}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(r_1 \cdot (1/r_2), \theta_1 + (-\theta_2))]_{\sim})) && (\because \text{極座標表現の演算. 定義 1.32}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(r_1/r_2, \theta_1 - \theta_2)]_{\sim})) && (\because \mathbb{R} \text{ の商と差の定義}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}([\theta_1 - \theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) && (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合 (定義 1.39) と } r_1/r_2 \neq 0) \end{aligned}$$

である。

ここから先は $\theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi$ の値で 2 つに分かれる。第四の準備によりこの値は $(-2\pi, 2\pi)$ にあるので、この 2 つで尽きている。

$0 \leq \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 2\pi$ のとき。この不等式は 主張 1.28 が一意に定める整数が $n_1 - n_2$ であることを言っているので、

$$\begin{aligned} s_{[0, 2\pi)}([\theta_1 - \theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) &= \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi && (\because \text{角度表現の切断の定義 (定義 1.29) と、この場合の不等式 (主張 1.28)}) \\ &= (\theta_1 - 2n_1\pi) - (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= \arg^{[0, 2\pi)}(z_1) - (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because \arg^{[0, 2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\ &= \arg^{[0, 2\pi)}(z_1) - \arg^{[0, 2\pi)}(z_2) && (\because \arg^{[0, 2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定}) \end{aligned}$$

である。

$-2\pi < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 0$ のとき。各辺に 2π を足せば $0 < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2 - 1)\pi < 2\pi$ なので、主張 1.28 が一意に定める整数は $n_1 - n_2 - 1$ である。したがって

$$\begin{aligned} s_{[0,2\pi)}([\theta_1 - \theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) &= \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2 - 1)\pi & (\because \text{角度表現の切断の定義 (定義 1.29) と、いま見た不等式 (主張 1.28)}) \\ &= (\theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi) + 2\pi & (\because 2(n_1 - n_2 - 1)\pi = 2(n_1 - n_2)\pi - 2\pi) \\ &= (\theta_1 - 2n_1\pi) - (\theta_2 - 2n_2\pi) + 2\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - (\theta_2 - 2n_2\pi) + 2\pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) + 2\pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定}) \end{aligned}$$

である。 □

主張 1.44. 定義 1.36、定義 1.40 を使い、半径の非零性と複素数の非零性の同値には 主張 1.41 を用いる。

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、 $r_1, r_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 、 $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\text{polar}}(z_i) = [(r_i, \theta_i)]_{\sim}$ とし、 $\arg^{[0,2\pi)}(z_i) = \theta_i - 2n_i\pi$ ($n_i \in \mathbb{Z}$) とする。さらに $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ (すなわち $z_1 \neq 0$ かつ $z_2 \neq 0$) とし、 $\arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \pi$ とする。このとき

$$\begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \pi & (0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \pi + 2\pi & (2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi) \end{cases}$$

が成り立つ。場合分けの条件に現れる整数は $n_1 + n_2$ であって、条件を満たす整数が存在すること ($\exists m \in \mathbb{Z}$) ではない。主張 1.28 により $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2m\pi < 2\pi$ を満たす整数 m はつねに存在し、同様に $2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2m'\pi < 4\pi$ を満たす整数 m' もつねに存在する ($m' = m - 1$ と取ればよい) ので、存在の形で書くと 2 つの場合がつねに同時に成り立ち、 $\pi = \pi + 2\pi$ という偽の等式が出てしまう。

$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ が要るのは 主張 1.42 を使うためである。

証明. $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi$ のとき。

$$\begin{aligned} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) & (\because \text{この場合の不等式と複素数の積の } \arg \text{ の主張 (主張 1.42)}) \\ &= \pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \pi \text{ という仮定}) \end{aligned}$$

である。あわせて、この場合の $\theta_1 + \theta_2$ の値も定まる。

$$\begin{aligned} \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi &= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + (\theta_2 - 2n_2\pi) & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定}) \\ &= \pi & (\because \text{いま示したこと}) \end{aligned}$$

$2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi$ のとき。

$$\begin{aligned} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) &= (\arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi) + 2\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の逆元と単位元}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) + 2\pi & (\because \text{この場合の不等式と複素数の積の } \arg \text{ の主張 (主張 1.42)}) \\ &= \pi + 2\pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \pi \text{ という仮定}) \end{aligned}$$

である。あわせて、この場合の $\theta_1 + \theta_2$ の値も定まる。

$$\begin{aligned} \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2 + 1)\pi &= (\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi) - 2\pi & (\because 2(n_1 + n_2 + 1)\pi = 2(n_1 + n_2)\pi + 2\pi) \\ &= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) - 2\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + (\theta_2 - 2n_2\pi) - 2\pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定}) \\ &= \pi & (\because \text{いま示したこと}) \end{aligned}$$

□

主張 1.45 ($\mathbb{C}$ の自乗の $\arg$). 定義 1.36、定義 1.32、定義 1.29 を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ について、 $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 、 $\theta \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim}$ とし、 $\arg^{[0, 2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) とする。このとき

$$\arg^{[0, 2\pi)}(z^2) = \begin{cases} 2 \arg^{[0, 2\pi)}(z) & (0 \leq \arg^{[0, 2\pi)}(z) < \pi) \\ 2 \arg^{[0, 2\pi)}(z) - 2\pi & (\pi \leq \arg^{[0, 2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

が成り立つ。定義 1.40 より $\arg^{[0, 2\pi)}(z) \in [0, 2\pi)$ なので、2 つの場合はちょうど一方だけが成り立つ。

証明. 証明の中で使うものを 1 つ先に置く。 ϕ_{polar} は積を保つ。実際 主張 1.38 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$ なので、 ϕ_{polar} は $\phi_{\text{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\text{polar}}(z^2) = \phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z)$$

である。

ここから先は r が 0 かどうかで分かれる。定義 1.39 の pr_2 が $r = 0$ のとき $[0]_{\sim_{\text{angle}}}$ を返す定義になっているためである。

$r = 0$ のとき。まず

$$\begin{aligned} \arg^{[0, 2\pi)}(z) &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z))) & (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0, 2\pi)} \text{ の定義 (定義 1.40)}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(0, \theta)]_{\sim})) & (\because r = 0 \text{ という、この場合の仮定}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}}) & (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r = 0 \text{ の場合 (定義 1.39)}) \\ &= 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi & (\because \text{角度表現の切断の定義 (定義 1.29) と } 0 \leq 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi < 2\pi) \\ &= 0 & (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0 \text{ であり、} 0 \text{ は和の単位元}) \end{aligned}$$

であり、したがって $0 \leq \arg^{[0, 2\pi)}(z) < \pi$ すなわち第 1 の場合にあたる。一方

$$\begin{aligned} \arg^{[0, 2\pi)}(z^2) &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z^2))) & (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0, 2\pi)} \text{ の定義 (定義 1.40)}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z))) & (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと (主張 1.38)}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(0, \theta)]_{\sim} \cdot [(0, \theta)]_{\sim})) & (\because r = 0 \text{ という、この場合の仮定}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(0 \cdot 0, \theta + \theta)]_{\sim})) & (\because \text{極座標表現の演算 (定義 1.32)}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(0, \theta + \theta)]_{\sim})) & (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\ &= s_{[0, 2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}}) & (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r = 0 \text{ の場合 (定義 1.39)}) \\ &= 0 & (\because \text{いま見た } \arg^{[0, 2\pi)}(z) \text{ の計算の最後の 2 段}) \\ &= 2 \cdot 0 & (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\ &= 2 \arg^{[0, 2\pi)}(z) & (\because \text{いま見た } \arg^{[0, 2\pi)}(z) = 0) \end{aligned}$$

であり、主張の第 1 の場合の等式が成り立つ。

$r \neq 0$ のとき。 $r \neq 0$ なので $r \cdot r \neq 0$ である (実数の積は、因子がどちらも 0 でなければ 0 でない)。したがって

$$\begin{aligned} \arg^{[0, 2\pi)}(z^2) &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z^2))) & (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0, 2\pi)} \text{ の定義 (定義 1.40)}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z))) & (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと (主張 1.38)}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(r, \theta)]_{\sim} \cdot [(r, \theta)]_{\sim})) & (\because r, \theta \text{ の取り方}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(r \cdot r, \theta + \theta)]_{\sim})) & (\because \text{極座標表現の演算 (定義 1.32)}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}([\theta + \theta]_{\sim_{\text{angle}}}) & (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合 (定義 1.39) と } r \cdot r \neq 0) \end{aligned}$$

である。ここから先は $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ の値でさらに 2 つに分かれる。

$0 \leq \theta - 2n\pi < \pi$ のとき。

$$\begin{aligned} 0 &\leq \theta - 2n\pi < \pi \\ \implies 0 &\leq 2(\theta - 2n\pi) < 2\pi & (\because \text{各辺に正の数}2 \text{ を掛けても不等号は保たれる}) \\ \implies 0 &\leq (\theta + \theta) - 2(2n)\pi < 2\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \end{aligned}$$

なので、主張 1.28 が一意に定める整数は $2n$ である。したがって

$$\begin{aligned} s_{[0,2\pi)}([\theta + \theta]_{\sim_{\text{angle}}}) &= (\theta + \theta) - 2(2n)\pi & (\because \text{角度表現の切断の定義 (定義 1.29) と、いま見た不等式 (主張 1.28)}) \\ &= (\theta - 2n\pi) + (\theta - 2n\pi) & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z) + (\theta - 2n\pi) & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z) + \arg^{[0,2\pi)}(z) & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\ &= 2\arg^{[0,2\pi)}(z) & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と } 1 \text{ が積の単位元であること}) \end{aligned}$$

である。この場合の条件 $0 \leq \theta - 2n\pi < \pi$ は、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ により主張の第 1 の場合の条件 $0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi$ と同じである。

$\pi \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ のとき。

$$\begin{aligned} \pi &\leq \theta - 2n\pi < 2\pi \\ \implies 2\pi &\leq 2(\theta - 2n\pi) < 4\pi & (\because \text{各辺に正の数}2 \text{ を掛けても不等号は保たれる}) \\ \implies 2\pi &\leq (\theta + \theta) - 2(2n)\pi < 4\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\ \implies 0 &\leq (\theta + \theta) - 2(2n)\pi - 2\pi < 2\pi & (\because \text{各辺から}2\pi \text{ を引いても不等号は保たれる}) \\ \implies 0 &\leq (\theta + \theta) - 2(2n+1)\pi < 2\pi & (\because 2(2n)\pi + 2\pi = 2(2n+1)\pi) \end{aligned}$$

なので、主張 1.28 が一意に定める整数は $2n+1$ である。したがって

$$\begin{aligned} s_{[0,2\pi)}([\theta + \theta]_{\sim_{\text{angle}}}) &= (\theta + \theta) - 2(2n+1)\pi & (\because \text{角度表現の切断の定義 (定義 1.29) と、いま見た不等式 (主張 1.28)}) \\ &= ((\theta + \theta) - 2(2n)\pi) - 2\pi & (\because 2(2n+1)\pi = 2(2n)\pi + 2\pi) \\ &= (\theta - 2n\pi) + (\theta - 2n\pi) - 2\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z) + (\theta - 2n\pi) - 2\pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z) + \arg^{[0,2\pi)}(z) - 2\pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\ &= 2\arg^{[0,2\pi)}(z) - 2\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と } 1 \text{ が積の単位元であること}) \end{aligned}$$

である。この場合の条件も、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ により主張の第 2 の場合の条件 $\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi$ と同じである。□

主張 1.46 ($\mathbb{C}$ の逆数の $\arg$)。定義 1.36 と 定義 1.29 を使い、半径の非零性と複素数の非零性の同値には 主張 1.41 を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ について、 $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 、 $\theta \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim}$ とし、 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) とする。さらに $r \neq 0$ とする (定義 1.40 と 定義 1.39 により $r = |z|$ なので、これは $z \neq 0$ と同じことである)。このとき

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) = \begin{cases} 0 & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ 2\pi - \arg^{[0,2\pi)}(z) & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

が成り立つ。 $r \neq 0$ は逆数 $1/z$ が定まるために要る (主張 1.34)。定義 1.40 より $\arg^{[0,2\pi)}(z) \in [0, 2\pi)$ なので、2 つの場合はちょうど一方だけが成り立つ。

証明. 証明の中で使うものを 3 つ先に置く。

第一に、 ϕ_{polar} は積を保つ。実際 主張 1.38 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$ なので、 ϕ_{polar} は $\phi_{\text{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\text{polar}}(zz') = \phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z')$$

が任意の $z, z' \in \mathbb{C}$ について成り立つ。

第二に、 ϕ_{polar} は逆元を逆元へ写す。 $r \neq 0$ すなわち $z \neq 0$ なので $z^{-1} \in \mathbb{C}$ が定まり（主張 1.34）、

$$\begin{aligned} \phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z^{-1}) &= \phi_{\text{polar}}(zz^{-1}) \quad (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと}) \\ &= \phi_{\text{polar}}(1_{\mathbb{C}}) \quad (\because z^{-1} \text{ が } z \text{ の逆元であること}) \\ &= [(1, 0)]_{\sim} \quad (\because \text{モノイド準同型の逆写像は単位元を単位元へ写すこと}) \end{aligned}$$

である。したがって $\phi_{\text{polar}}(z^{-1})$ は $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim}$ の逆元であり、主張 1.33 の逆元の形 ($r \neq 0$ の場合) により

$$\phi_{\text{polar}}(z^{-1}) = [(1/r, -\theta)]_{\sim}$$

である。

第三に、 $r \neq 0$ なので $1/r \neq 0$ である（実数の商は、分子が 0 でなければ 0 でない）。本体に入る。

$$\begin{aligned} \arg^{[0, 2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) &= \arg^{[0, 2\pi)}(z^{-1}) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法群の } z^{-1} = 1/z. \text{ 主張 1.34}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z^{-1}))) \quad (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0, 2\pi)} \text{ の定義. 定義 1.40}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(1/r, -\theta)]_{\sim})) \quad (\because \text{上で見た } \phi_{\text{polar}}(z^{-1}) \text{ の形}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}([-\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) \quad (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合と } 1/r \neq 0. \text{ 定義 1.39}) \end{aligned}$$

である。

ここから先は $\arg^{[0, 2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ の値で 2 つに分かれる。定義 1.40 よりこの値は $[0, 2\pi)$ にあるので、この 2 つで尽きている。

$\theta - 2n\pi = 0$ のとき。このとき

$$\begin{aligned} -\theta - 2(-n)\pi &= -(\theta - 2n\pi) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= 0 \quad (\because \theta - 2n\pi = 0 \text{ という、この場合の条件}) \end{aligned}$$

であり $0 \leq 0 < 2\pi$ なので、主張 1.28 が一意に定める整数は $-n$ である。したがって

$$\begin{aligned} s_{[0, 2\pi)}([-\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) &= -\theta - 2(-n)\pi \quad (\because \text{角度表現の切断の定義と、いま見た不等式. 定義 1.29 主張 1.28}) \\ &= -(\theta - 2n\pi) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= -\arg^{[0, 2\pi)}(z) \quad (\because \arg^{[0, 2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\ &= -0 \quad (\because \arg^{[0, 2\pi)}(z) = 0 \text{ という、この場合の条件}) \\ &= 0 \quad (\because 0 \text{ の加法の逆元は } 0) \end{aligned}$$

である。この場合の条件 $\theta - 2n\pi = 0$ は、仮定 $\arg^{[0, 2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ により主張の第 1 の場合の条件 $\arg^{[0, 2\pi)}(z) = 0$ と同じである。

$0 < \theta - 2n\pi < 2\pi$ のとき。各辺に -1 を掛けて向きを入れ替えると $-2\pi < -(\theta - 2n\pi) < 0$ であり、さらに各辺へ 2π を足せば $0 < -\theta - 2(-n-1)\pi < 2\pi$ なので、主張 1.28 が一意に定める整数は $-n-1$ である。したがって

$$\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}([- \theta]_{\sim_{\text{angle}}}) &= -\theta - 2(-n-1)\pi & (\because \text{角度表現の切斷の定義と、いま見た不等式。定義 1.29 主張 1.28}) \\
&= (-\theta - 2(-n)\pi) + 2\pi & (\because 2(-n-1)\pi = 2(-n)\pi - 2\pi) \\
&= -(\theta - 2n\pi) + 2\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= -\arg^{[0,2\pi)}(z) + 2\pi & (\because \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\
&= 2\pi - \arg^{[0,2\pi)}(z) & (\because \mathbb{R} \text{ の加法の交換律と差の定義})
\end{aligned}$$

である。この場合の条件も、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ により主張の第 2 の場合の条件 $0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi$ と同じである。□

定義 1.47 ($\mathbb{C}$ の $\sqrt{\cdot}$)。定義 1.6、定義 1.36、定義 1.37、定義 1.39、定義 1.29、定義 1.31 を用いる。半角の値域は $[0, \pi)$ であり、現行の正弦・余弦の定義域を超える。逆方向写像が未完のため、以下の平方根写像の定義も未完である。

$\sqrt{\cdot} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ を以下のように定める。
 $z \in \mathbb{C}$ について、

$$\sqrt{z} := \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z))) \right) \right]_{\sim} \right)$$

主張 1.48. 定義 1.39 の射影を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ とし、 $(r, \theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ を $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim}$ なる代表元とする（定義 1.36、定義 1.31）。 $n \in \mathbb{Z}$ を $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすものとする（このような n は各 $\theta \in \mathbb{R}$ に対してただ一つ存在する。主張 1.28）、

$$\sqrt{z} = \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{\theta}{2} - n\pi \right) \right]_{\sim} \right)$$

ここで $\sqrt{\cdot} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ は 定義 1.47 の複素数の平方根、 $\sqrt{\cdot}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ は 定義 1.6 の非負実数の平方根、 $\phi_{\text{cartesian}}$ は 定義 1.37 の写像である。右辺の $\theta/2 - n\pi$ は実数体 $\mathbb{R}$ 内の演算（ θ と $1/2$ の積、および $n\pi$ との差）である。

証明。証明の中で使うものを 2 つ先に置く。

第一に、 $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たす $n \in \mathbb{Z}$ は各 $\theta \in \mathbb{R}$ に対してただ一つ存在する（主張 1.28）。この一意性により 定義 1.29 の $s_{[0,2\pi)}$ について

$$s_{[0,2\pi)}([- \theta]_{\sim_{\text{angle}}}) = \theta - 2n\pi$$

が成り立つ。

第二に、定義 1.6 より $\sqrt{0}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} = 0$ である。

主張の右辺が代表元 (r, θ) の取り方によらないことを先に見る。 $(r, \theta) \sim (r', \theta')$ とし、 $n, n' \in \mathbb{Z}$ をそれぞれ $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ 、 $0 \leq \theta' - 2n'\pi < 2\pi$ を満たすもの（準備の第一により一意）とする。定義 1.31 より次の 2 つの場合がある。

$r = r' = 0$ のとき。準備の第二より両辺の内側の対はそれぞれ $(0, \theta/2 - n\pi)$ と $(0, \theta'/2 - n'\pi)$ であり、第 1 成分がともに 0 なので 定義 1.31（ $r = r' = 0$ の場合）により同値、すなわち同じ同値類を定める。

$r = r'$ かつ $\theta \sim_{\text{angle}} \theta'$ のとき。定義 1.27 より $\theta - \theta' = 2k\pi$ なる $k \in \mathbb{Z}$ が存在する。このとき $\theta - 2(n' + k)\pi = \theta' - 2n'\pi \in [0, 2\pi)$ かつ $n' + k \in \mathbb{Z}$ なので、準備の第一の一意性より $n = n' + k$ である。したがって

$$\begin{aligned}
\frac{\theta}{2} - n\pi &= \frac{\theta' + 2k\pi}{2} - (n' + k)\pi \quad (\because \theta = \theta' + 2k\pi \text{ (定義 1.27) と } n = n' + k \text{ (主張 1.28)}) \\
&= \frac{\theta'}{2} + k\pi - (n' + k)\pi \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
&= \frac{\theta'}{2} + k\pi - n'\pi - k\pi \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
&= \frac{\theta'}{2} - n'\pi \quad (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律})
\end{aligned}$$

であり、第 1 成分も $\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} = \sqrt{r'}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}$ で一致するから、両者は同じ対であり同じ同値類を定める。いずれの場合も右辺は代表元によらない。

ここから先は r の値で 2 つに分かれる。

$r \neq 0$ のとき。

$$\begin{aligned}
\sqrt{z} &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z))) \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義. 定義 1.47}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z))) \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } \text{pr}_1 \text{ と } \phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim} \text{. 定義 1.39}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim \text{angle}}) \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } \text{pr}_2 \text{ の } r \neq 0 \text{ の場合. 定義 1.39}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2}(\theta - 2n\pi) \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \text{準備の第一. 主張 1.28}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{\theta}{2} - n\pi \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}$$

であり、これは主張の右辺そのものである。

$r = 0$ のとき。まず左辺を計算する。

$$\begin{aligned}
\sqrt{z} &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z))) \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義. 定義 1.47}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{0}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim \text{angle}}) \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r = 0 \text{ の場合. 定義 1.39}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[(0, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim \text{angle}})) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \text{準備の第二. 定義 1.6}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[(0, \frac{1}{2} \cdot 0) \right]_{\sim} \right) \quad (\because 0 \leq 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi < 2\pi \text{ と準備の第一}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}} \left([(0, 0)]_{\sim} \right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ で } a \cdot 0 = 0) \\
&= (0 \cdot \cos 0, 0 \cdot \sin 0) \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義. 定義 1.37}) \\
&= (0, 0) = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{R} \text{ で } 0 \cdot a = 0)
\end{aligned}$$

次に右辺を計算する。

$$\begin{aligned}
\phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{\theta}{2} - n\pi \right) \right]_{\sim} \right) &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{0}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{\theta}{2} - n\pi \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because r = 0 \text{ という、この場合の条件}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[(0, \frac{\theta}{2} - n\pi) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \text{準備の第二. 定義 1.6}) \\
&= (0 \cdot \cos(\frac{\theta}{2} - n\pi), 0 \cdot \sin(\frac{\theta}{2} - n\pi)) \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義. 定義 1.37}) \\
&= (0, 0) = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{R} \text{ で } 0 \cdot a = 0)
\end{aligned}$$

であり、両辺は一致する。 $\cos, \sin$ の値は $\mathbb{R}$ の元なので、最後の段は $\mathbb{R}$ 中の計算である。

以上より、 $r \neq 0$ と $r = 0$ のいずれの場合も主張の等式が成り立つ。右辺は代表元の取り方によらないので、主張は $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim}$ なる任意の代表元 (r, θ) について成り立つ。□

主張 1.49 (sqrt と積が可換になる条件). 定義 1.47、主張 1.48、定義 1.6、定義 1.36、定義 1.37 を用いる。

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、

$$\sqrt{z_1 z_2} = \begin{cases} \sqrt{z_1} \sqrt{z_2} & (0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) < 2\pi) \\ -\sqrt{z_1} \sqrt{z_2} & (2\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) < 4\pi) \end{cases}$$

証明. 証明の中で使うものを 3 つ先に置く。

第一に、主張 1.38 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、 $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$ なので ϕ_{polar} はその逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\text{polar}}(z_1 z_2) = \phi_{\text{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2)$$

である。

第二に、定義 1.32 より

$$[(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2, \theta_2)]_{\sim} = [(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)]_{\sim}$$

である。

第三に、主張 1.28 より、各 $\theta \in \mathbb{R}$ に対して $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たす $n \in \mathbb{Z}$ がただ一つ存在する。この一意性により、定義 1.29 の $s_{[0, 2\pi)}$ について $s_{[0, 2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) = \theta - 2n\pi$ が成り立つ。

ここから先は $r_1 r_2$ が 0 かどうかで分かれる。定義 1.39 の pr_2 が $r = 0$ のとき $[0]_{\sim_{\text{angle}}}$ を返す定義になっているため、 $\text{pr}_2([(r, \theta)]_{\sim}) = [\theta]_{\sim_{\text{angle}}}$ と書けるのは $r \neq 0$ のときだけだからである。

$r_1 = 0$ または $r_2 = 0$ のとき。まず左辺は

$$\begin{aligned} \sqrt{z_1 z_2} &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z_1 z_2))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1 z_2))) \right) \right]_{\sim} \right) & (\because \text{複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.47}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2))) \right) \right]_{\sim} \right) & (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと。主張 1.38}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1([(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2, \theta_2)]_{\sim})}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2, \theta_2)]_{\sim})) \right) \right]_{\sim} \right) & (\because r_1, r_2, \theta_1, \theta_2 \text{ の取り方}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1([(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)]_{\sim})}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)]_{\sim})) \right) \right]_{\sim} \right) & (\because \text{極座標表現の積。定義 1.32}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0, 2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}}) \right) \right]_{\sim} \right) & (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の定義と } r_1 r_2 = 0 \text{ 定義 1.39}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(0, \frac{1}{2} \cdot s_{[0, 2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}}) \right) \right]_{\sim} \right) & (\because r_1 r_2 = 0 \text{ と非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.6}) \\ &= (0 \cdot \cos \frac{1}{2} s_{[0, 2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}}), 0 \cdot \sin \frac{1}{2} s_{[0, 2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}})) & (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.37}) \\ &= (0, 0) & (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \end{aligned}$$

である。 $r_1 = 0$ の場合は右辺の第 1 因子が

$$\begin{aligned} \sqrt{z_1} &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{\theta_1}{2} - n_1 \pi \right) \right]_{\sim} \right) & (\because \text{複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の極座標表現による展開。主張 1.48}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(0, \frac{\theta_1}{2} - n_1 \pi \right) \right]_{\sim} \right) & (\because r_1 = 0 \text{ と非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.6}) \\ &= \left(0 \cdot \cos \left(\frac{\theta_1}{2} - n_1 \pi \right), 0 \cdot \sin \left(\frac{\theta_1}{2} - n_1 \pi \right) \right) & (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.37}) \\ &= (0, 0) & (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \end{aligned}$$

となる。したがって

$$\begin{aligned} \sqrt{z_1} \sqrt{z_2} &= (0, 0) \cdot \sqrt{z_2} \quad (\because \sqrt{z_1} = (0, 0) \text{ という直前の計算}) \\ &= (0, 0) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の零元を因子にもつ積は零元}) \end{aligned}$$

$(0, 0)$ は $\mathbb{C}$ の零元である。 $r_2 = 0$ の場合も第 2 因子について同じ計算になる。したがってこの場合

$$\begin{aligned} \sqrt{z_1 z_2} &= (0, 0) \quad (\because \text{上で計算した左辺}) \\ &= \sqrt{z_1} \sqrt{z_2} \quad (\because r_1 = 0 \text{ または } r_2 = 0 \text{ のときの直前の計算}) \end{aligned}$$

この場合が主張のどちらの場合にあたるかも見ておく。 $r_1 = 0$ なら

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z_1) &= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1))) \quad (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義. 定義 1.40}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(0, \theta_1)]_{\sim})) \quad (\because r_1 = 0 \text{ という、この場合の仮定}) \\
&= s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}}) \quad (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の定義. 定義 1.39}) \\
&= 0 \quad (\because \text{角度切断の一意性を } \theta = 0, n = 0 \text{ へ当てた. 主張 1.28})
\end{aligned}$$

であり、定義 1.40 より $\arg^{[0,2\pi)}(z_2) \in [0, 2\pi)$ なので $0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) < 2\pi$ すなわち主張の第 1 の場合にあたり、いま示した等式はその場合の等式である。 $r_2 = 0$ の場合も同じである。

$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ のとき。実数の積は因子がどちらも 0 でなければ 0 でないので $r_1 r_2 \neq 0$ である。 $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ を $0 \leq \theta_1 - 2n_1\pi < 2\pi$ 、 $0 \leq \theta_2 - 2n_2\pi < 2\pi$ を満たすもの（準備の第三によりそれぞれただ一つ存在する）とする。まず左辺は

$$\begin{aligned}
\sqrt{z_1 z_2} &= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z_1 z_2))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1 z_2)))\right)\right]_{\sim}\right) \quad (\because \text{複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義. 定義 1.47}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2)))\right)\right]_{\sim}\right) \quad (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと. 主張 1.38}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1([(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2, \theta_2)]_{\sim})}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2, \theta_2)]_{\sim}))\right)\right]_{\sim}\right) \quad (\because r_1, r_2, \theta_1, \theta_2 \text{ の取り方}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\text{pr}_1([(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)]_{\sim})}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)]_{\sim}))\right)\right]_{\sim}\right) \quad (\because \text{極座標表現の積. 定義 1.32}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\right)\right]_{\sim}\right) \quad (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の定義と } r_1 r_2 \neq 0 \text{ 定義 1.39}) \\
&= \left(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}), \sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\right) \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義. 定義 1.37})
\end{aligned}$$

である。次に右辺は

$$\begin{aligned}
\sqrt{z_1} \sqrt{z_2} &= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\right)\right]_{\sim}\right) \cdot \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\right)\right]_{\sim}\right) \quad (\because \text{複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ と第 1 座標, 第 2 座標の定義を } r_1, r_2 \neq 0 \text{ へ当てた. 定義 1.47 定義 1.39}) \\
&= \left(\sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}), \sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\right) \cdot \left(\sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}), \sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\right) \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義. 定義 1.37}) \\
&= \left(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} (\cos \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) \cos \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) - \sin \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) \sin \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}))\right. \\
&\quad \left. \sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} (\cos \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) \sin \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) + \sin \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) \cos \frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}))\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義と } \sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} = \sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}) \\
&= \left(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos \frac{1}{2} (s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}))\right), \sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin \frac{1}{2} (s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})) \quad (\because \text{三角関数の加法定理})
\end{aligned}$$

である。両者を比べるために、右辺に現れる角を計算する。

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} (s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})) &= \frac{1}{2} ((\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi)) \quad (\because \text{角度切断の一意性を } \theta_1, \theta_2 \text{ へ当てた. 主張 1.28}) \\
&= \frac{1}{2} (\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi) \quad (\because \text{実数の加法の交換則・結合則と分配則}) \\
&= \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} - (n_1 + n_2)\pi \quad (\because \text{実数の分配則})
\end{aligned}$$

また、

$$\begin{aligned}
0 &\leq \theta_1 - 2n_1\pi < 2\pi, \quad 0 \leq \theta_2 - 2n_2\pi < 2\pi \\
\Rightarrow 0 &\leq (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) < 4\pi \quad (\because \text{二つの不等式の辺々を加えた}) \\
\Rightarrow 0 &\leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi \quad (\because \mathbb{R} \text{ の加法の交換則・結合則と分配則})
\end{aligned}$$

であるから、ここで場合を 2 つに分ける。

$0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi$ の場合。左辺に現れる角は

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) &= \frac{1}{2} (\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi) \quad (\because \text{角度切断の一意性を } \theta = \theta_1 + \theta_2, n = n_1 + n_2 \text{ へ当てた. いまの場合分けがその範囲の条件である. 主張 1.28}) \\
&= \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} - (n_1 + n_2)\pi \quad (\because \text{実数の分配則})
\end{aligned}$$

であり、右辺に現れる角と一致する。したがって左辺と右辺の 2 つの成分がそれぞれ一致し、 $\sqrt{z_1 z_2} = \sqrt{z_1} \sqrt{z_2}$ である。

$2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi$ の場合。このとき $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2 + 1)\pi < 2\pi$ なので、左辺に現れる角は

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim \text{angle}}) &= \frac{1}{2}(\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2 + 1)\pi) \quad (\because \text{角度切断の一意性を } \theta = \theta_1 + \theta_2, n = n_1 + n_2 + 1 \text{ へ当てた。主張 1.28}) \\ &= \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} - (n_1 + n_2)\pi - \pi \quad (\because \text{実数の分配則})\end{aligned}$$

である。したがって左辺の 2 つの成分は

$$\begin{aligned}\cos \frac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim \text{angle}}) &= \cos \left(\left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} - (n_1 + n_2)\pi \right) - \pi \right) \quad (\because \text{いま計算した角}) \\ &= -\cos \left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} - (n_1 + n_2)\pi \right) \quad (\because \cos(x - \pi) = -\cos x) \\ &= -\cos \frac{1}{2}(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim \text{angle}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim \text{angle}})) \quad (\because \text{右辺に現れる角の計算})\end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim \text{angle}}) &= \sin \left(\left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} - (n_1 + n_2)\pi \right) - \pi \right) \quad (\because \text{いま計算した角}) \\ &= -\sin \left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} - (n_1 + n_2)\pi \right) \quad (\because \sin(x - \pi) = -\sin x) \\ &= -\sin \frac{1}{2}(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim \text{angle}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim \text{angle}})) \quad (\because \text{右辺に現れる角の計算})\end{aligned}$$

となり、2 つの成分がどちらも符号を変えたものになるので $\sqrt{z_1 z_2} = -\sqrt{z_1} \sqrt{z_2}$ である。

最後に、場合分けの条件を主張の形へ書き直す。 $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ のとき

$$\begin{aligned}\arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) &= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1))) + s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_2))) \quad (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 1.40}) \\ &= s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim \text{angle}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim \text{angle}}) \quad (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の定義と } r_1, r_2 \neq 0 \text{ 定義 1.39}) \\ &= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) \quad (\because \text{角度切断の一意性。主張 1.28}) \\ &= \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi \quad (\because \text{実数の加法の交換則・結合則と分配則})\end{aligned}$$

なので、2 つの場合分けの条件は主張の 2 つの場合の条件と一致する。 $\square$

主張 1.50 (sqrt の 2 乗は元に戻る). 主張 1.48、定義 1.32、定義 1.6 を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ について、 $\sqrt{z}\sqrt{z} = z$

証明. 証明の中で使うものを 3 つ先に置く。

第一に、 $(r, \theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ を $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim}$ なる代表元とし (定義 1.36、定義 1.31)、 $n \in \mathbb{Z}$ を $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすものとする (主張 1.28 により各 $\theta \in \mathbb{R}$ に対してただ一つ存在する)。

第二に、主張 1.38 より $\phi_{\text{cartesian}}$ はモノイド準同型であり、 $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$ である。

第三に、定義 1.31 の同値関係 $\sim$ は第 2 成分の 2π の整数倍の差を同一視するので、 $[(r, \theta - 2n\pi)]_{\sim} = [(r, \theta)]_{\sim}$ である。

求めたい値から始める。

$$\begin{aligned}\sqrt{z}\sqrt{z} &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{\theta}{2} - n\pi \right) \right]_{\sim} \right) \cdot \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{\theta}{2} - n\pi \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \text{複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の極座標表現による展開。主張 1.48}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{\theta}{2} - n\pi \right) \right]_{\sim} \cdot \left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{\theta}{2} - n\pi \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ が積を保つこと。主張 1.38}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cdot \sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \left(\frac{\theta}{2} - n\pi \right) + \left(\frac{\theta}{2} - n\pi \right) \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \text{極座標表現の演算。定義 1.32}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(r, \left(\frac{\theta}{2} - n\pi \right) + \left(\frac{\theta}{2} - n\pi \right) \right) \right]_{\sim} \right) \quad (\because \text{非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.6}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left([(r, \theta - 2n\pi)]_{\sim} \right) \quad (\because \text{実数の和の計算}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}} \left([(r, \theta)]_{\sim} \right) \quad (\because \text{極座標表現の同値関係。定義 1.31}) \\ &= \phi_{\text{cartesian}}(\phi_{\text{polar}}(z)) \quad (\because r, \theta \text{ の取り方。定義 1.36 定義 1.31}) \\ &= z \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}} \text{ 主張 1.38})\end{aligned}$$

$\square$

主張 1.51 ($z = \pm\sqrt{z^2}$). $z \in \mathbb{C}$ について、

$$z = \begin{cases} \sqrt{z^2} & (0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi) \\ -\sqrt{z^2} & (\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

証明. 証明の中で使う記号を先に置く。 $\alpha := \arg^{[0,2\pi)}(z) \in \mathbb{R}$ と書く (定義 1.40)。主張の場合分けは α の値によるものである。

$0 \leq \alpha < \pi$ の場合。このとき $0 \leq \alpha + \alpha < 2\pi$ なので、主張 1.49 は $z_1 = z_2 = z$ について第 1 の場合を与える。

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{z}\sqrt{z} \quad (\because \text{sqrt の 2 乗は元に戻る}) \\ &= \sqrt{z \cdot z} \quad (\because \text{sqrt と積が可換になる条件の第 1 の場合}) \\ &= \sqrt{z^2} \quad (\because z \cdot z = z^2) \end{aligned}$$

(第 1 の等号で引いたのは 主張 1.50。)

$\pi \leq \alpha < 2\pi$ の場合。このとき $2\pi \leq \alpha + \alpha < 4\pi$ なので、主張 1.49 は $z_1 = z_2 = z$ について第 2 の場合、すなわち $\sqrt{z \cdot z} = -\sqrt{z}\sqrt{z}$ を与える。

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{z}\sqrt{z} \quad (\because \text{sqrt の 2 乗は元に戻る}) \\ &= -(-\sqrt{z}\sqrt{z}) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の元 } w \text{ について } -(-w) = w) \\ &= -\sqrt{z \cdot z} \quad (\because \text{sqrt と積が可換になる条件の第 2 の場合}) \\ &= -\sqrt{z^2} \quad (\because z \cdot z = z^2) \end{aligned}$$

(第 1 の等号で引いたのは 主張 1.50。)

2 つの場合は $\alpha \in [0, 2\pi)$ を尽くしているので、主張を得る。 $\square$

主張 1.52 ($\mathbb{C}$ の逆数の $\sqrt{\cdot}$)。定義 1.47、主張 1.50、主張 1.48、定義 1.6、定義 1.37、定義 1.12、主張 1.46 を用いる。零での値の計算には 定義 1.24、定義 1.22、定義 1.25 の関数が現れる。

$z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$ について、

$$\sqrt{\frac{1}{z}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{z}} & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ -\frac{1}{\sqrt{z}} & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

証明. 証明の中で使うものを 4 つ先に置く。

第一に、 $(r, \theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ を $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim}$ なる代表元とし (定義 1.36、定義 1.31)、 $n \in \mathbb{Z}$ を $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすものとする (主張 1.28)。このとき $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ である (定義 1.40)。

第二に、仮定 $z \neq 0$ により逆数 $1/z$ が定まる (主張 1.34)。

第三に、 $\sqrt{z} \neq 0_{\mathbb{C}}$ である。実際 $\sqrt{z} = 0_{\mathbb{C}}$ とすると

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{z}\sqrt{z} \quad (\because \text{sqrt の 2 乗は元に戻る。主張 1.50}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{この場合の仮定を 2 箇所へ適用}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義。定義 1.11}) \end{aligned}$$

となって $z \neq 0$ に反する。したがって逆数 $1/\sqrt{z}$ が定まる (主張 1.34)。

第四に、 $\sqrt{1_{\mathbb{C}}} = 1_{\mathbb{C}}$ である。まず ϕ_{polar} の値を求める。

$$\begin{aligned}
\phi_{\text{polar}}(1_{\mathbb{C}}) &= \phi_{\text{polar}}((1, 0)) & (\because 1_{\mathbb{C}} = (1, 0), \text{定義 1.11 定義 1.12}) \\
&= \left[\left(\sqrt{1^2 + 0^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(0/1) \right) \right]_{\sim} & (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x > 0 \text{ の場合。定義 1.36}) \\
&= \left[\left(\sqrt{1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(0/1) \right) \right]_{\sim} & (\because \mathbb{R} \text{ の計算 } 1^2 + 0^2 = 1) \\
&= [(1, \arctan(0/1))]_{\sim} & (\because \text{非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.6}) \\
&= [(1, \arctan 0)]_{\sim} & (\because \mathbb{R} \text{ の計算 } 0/1 = 0) \\
&= [(1, 0)]_{\sim} & (\because \arctan 0 = 0)
\end{aligned}$$

であり、 $0 \leq 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi < 2\pi$ なので、この代表元に対する整数は 0 である。したがって

$$\begin{aligned}
\sqrt{1}_{\mathbb{C}} &= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(\sqrt{1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \frac{0}{2} - 0 \cdot \pi \right) \right]_{\sim} \right) & (\because \text{複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の極座標表現による展開。主張 1.48}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}} \left(\left[\left(1, \frac{0}{2} - 0 \cdot \pi \right) \right]_{\sim} \right) & (\because \text{非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.6}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}([(1, 0)]_{\sim}) & (\because \mathbb{R} \text{ の計算}) \\
&= (1 \cdot \cos 0, 1 \cdot \sin 0) & (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.37}) \\
&= (1 \cdot 1, 1 \cdot \sin 0) & (\because \cos 0 = 1) \\
&= (1 \cdot 1, 1 \cdot 0) & (\because \sin 0 = 0) \\
&= (1, 0) & (\because \mathbb{R} \text{ の積の計算を 2 箇所へ適用}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} & (\because 1_{\mathbb{C}} = (1, 0), \text{定義 1.11 定義 1.12})
\end{aligned}$$

である。

$\arg^{[0, 2\pi)}(z) = 0$ の場合。まず 2 つの偏角の和を求める。

$$\begin{aligned}
\arg^{[0, 2\pi)}(z) + \arg^{[0, 2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) &= 0 + \arg^{[0, 2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) & (\because \text{この場合の仮定}) \\
&= 0 + 0 & (\because \mathbb{C} \text{ の逆数の } \arg \text{ の第 1 の場合。主張 1.46}) \\
&= 0 & (\because \mathbb{R} \text{ の和の計算})
\end{aligned}$$

であり $0 \leq 0 < 2\pi$ なので、以下では 主張 1.49 の第 1 の場合が当たる。

$$\begin{aligned}
\sqrt{\frac{1}{z}} &= 1_{\mathbb{C}} \cdot \sqrt{\frac{1}{z}} & (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元}) \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \sqrt{z} \right) \cdot \sqrt{\frac{1}{z}} & (\because \text{準備の第三で取った } 1/\sqrt{z} \text{ の定め方}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \left(\sqrt{z} \cdot \sqrt{\frac{1}{z}} \right) & (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \sqrt{z \cdot \frac{1}{z}} & (\because \text{sqrt と積が可換になる条件の第 1 の場合}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \sqrt{1_{\mathbb{C}}} & (\because \text{準備の第二で取った } 1/z \text{ の定め方}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot 1_{\mathbb{C}} & (\because \text{準備の第四}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} & (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元})
\end{aligned}$$

$0 < \arg^{[0, 2\pi)}(z) < 2\pi$ の場合。まず 2 つの偏角の和を求める。

$$\begin{aligned}\arg^{[0,2\pi)}(z) + \arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) &= \arg^{[0,2\pi)}(z) + \left(2\pi - \arg^{[0,2\pi)}(z)\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の逆数の } \arg \text{ の第 2 の場合。主張 1.46}) \\ &= 2\pi \quad (\because \mathbb{R} \text{ の和の計算})\end{aligned}$$

であり $2\pi \leq 2\pi < 4\pi$ なので、以下では 主張 1.49 の第 2 の場合が当たる。

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{1}{z}} &= 1_{\mathbb{C}} \cdot \sqrt{\frac{1}{z}} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元}) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \sqrt{z}\right) \cdot \sqrt{\frac{1}{z}} && (\because \text{準備の第三で取った } 1/\sqrt{z} \text{ の定め方}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \left(\sqrt{z} \cdot \sqrt{\frac{1}{z}}\right) && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \left(-\left(-\left(\sqrt{z} \cdot \sqrt{\frac{1}{z}}\right)\right)\right) && (\because -(-w) = w) \\ &= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \left(-\sqrt{z \cdot \frac{1}{z}}\right) && (\because \text{sqrt と積が可換になる条件の第 2 の場合}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot (-\sqrt{1_{\mathbb{C}}}) && (\because \text{準備の第二で取った } 1/z \text{ の定め方}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot (-1_{\mathbb{C}}) && (\because \text{準備の第四}) \\ &= -\left(\frac{1}{\sqrt{z}} \cdot 1_{\mathbb{C}}\right) && (\because \mathbb{C} \text{ の積と符号の関係 } a \cdot (-b) = -(a \cdot b)) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{z}} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元})\end{aligned}$$

□

主張 1.53 ($\mathbb{C}$ の $\sqrt{\cdot}$ の逆数). 偏角は 定義 1.40 のものとする。

$z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$ について、

$$(\sqrt{z})^{-1} = \frac{1}{\sqrt{z}} = \begin{cases} \sqrt{1/z} & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ -\sqrt{1/z} & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

証明. 証明の中で使うものを 1 つ先に置く。 $z \neq 0$ なので 主張 1.52 の準備の第三と同じ議論により $\sqrt{z} \neq 0$ であり、 $\mathbb{C}$ の乗法群 (主張 1.34) の中で $\sqrt{z}$ の逆元 $(\sqrt{z})^{-1}$ が定まる。 $1/\sqrt{z}$ はこの逆元の別の書き方である。

$\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0$ の場合。

$$\begin{aligned}(\sqrt{z})^{-1} &= \frac{1}{\sqrt{z}} \quad (\because 1/\sqrt{z} \text{ は逆元 } (\sqrt{z})^{-1} \text{ の別の書き方である}) \\ &= \sqrt{\frac{1}{z}} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の逆数の } \sqrt{\cdot} \text{ の第 1 の場合。主張 1.52})\end{aligned}$$

$0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi$ の場合。

$$\begin{aligned}
(\sqrt{z})^{-1} &= \frac{1}{\sqrt{z}} & (\because 1/\sqrt{z} \text{ は逆元 } (\sqrt{z})^{-1} \text{ の別の書き方である}) \\
&= -\left(-\frac{1}{\sqrt{z}}\right) & (\because -(-w) = w) \\
&= -\sqrt{\frac{1}{z}} & (\because \mathbb{C} \text{ の逆数の } \sqrt{\cdot} \text{ の第 2 の場合。主張 1.52})
\end{aligned}$$

□

定理 1.54 ($\cos, \sin$ の Euler 表示). 現行の正弦・余弦は 定義 1.22、定義 1.25、複素数は 定義 1.11 で定めている。全実数上への拡張と複素指数の定義、および以下で使う Euler 式の導出は未整備である。

$$\forall \theta \in \mathbb{R}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

証明. 準備として、Euler の公式 $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ を $\varphi = -\theta$ で使う形を書いておく。

$$\begin{aligned}
e^{-i\theta} &= \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) & (\because \text{Euler の公式}) \\
&= \cos \theta + i(-\sin \theta) & (\because \cos \text{ は偶関数、} \sin \text{ は奇関数}) \\
&= \cos \theta - i \sin \theta
\end{aligned}$$

第 1 の等式を示す。

$$\begin{aligned}
\cos \theta &= \frac{2 \cos \theta}{2} \\
&= \frac{(\cos \theta + i \sin \theta) + (\cos \theta - i \sin \theta)}{2} & (\because i \sin \theta \text{ を足して引いた}) \\
&= \frac{e^{i\theta} + (\cos \theta - i \sin \theta)}{2} & (\because \text{Euler の公式}) \\
&= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} & (\because \text{上の準備})
\end{aligned}$$

第 2 の等式を示す。 $2i \neq 0$ なので割ってよい。

$$\begin{aligned}
\sin \theta &= \frac{2i \sin \theta}{2i} \\
&= \frac{(\cos \theta + i \sin \theta) - (\cos \theta - i \sin \theta)}{2i} & (\because \cos \theta \text{ を足して引いた}) \\
&= \frac{e^{i\theta} - (\cos \theta - i \sin \theta)}{2i} & (\because \text{Euler の公式}) \\
&= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} & (\because \text{上の準備})
\end{aligned}$$

□

主張 1.55 (共役写像は環準同型). $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

$B \in (\text{Mat}(n, \mathbb{C}))^\times$ (正則) について、共役写像 $T_B : \text{Mat}(n, \mathbb{C}) \rightarrow \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ 、 $T_B(A) = BAB^{-1}$ は次を満たす。

- 乗法的: 任意の $A, C \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ について $T_B(AC) = T_B(A)T_B(C)$

- 単位的: $T_B(I) = I$
- 合成則: $A, B \in (\text{Mat}(n, \mathbb{C}))^\times$ (正則) について $T_A \circ T_B = T_{AB}$

証明. 乗法性を示す。 $A, C \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ とする。

$$\begin{aligned}
T_B(AC) &= B(AC)B^{-1} & (\because T_B \text{ の定義}) \\
&= BACB^{-1} & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= BAICB^{-1} & (\because \text{単位元の性質 } IC = C) \\
&= BA(B^{-1}B)CB^{-1} & (\because B^{-1}B = I) \\
&= (BAB^{-1})(BCB^{-1}) & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= T_B(A)(BCB^{-1}) & (\because T_B \text{ の定義}) \\
&= T_B(A)T_B(C) & (\because T_B \text{ の定義})
\end{aligned}$$

(引いたブロック: 定理 1.10)

単位性を示す。

$$\begin{aligned}
T_B(I) &= BIB^{-1} & (\because T_B \text{ の定義}) \\
&= BB^{-1} & (\because \text{単位元の性質 } BI = B) \\
&= I & (\because BB^{-1} = I)
\end{aligned}$$

(引いたブロック: 定理 1.10)

合成則を示す。 $A, B \in (\text{Mat}(n, \mathbb{C}))^\times$ (正則) とする。準備として、行列の積の逆元 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ を確認する。 $B^{-1}A^{-1}$ が AB の右逆元かつ左逆元であることを示せばよい。

$$\begin{aligned}
(AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= AIA^{-1} & (\because BB^{-1} = I) \\
&= AA^{-1} & (\because \text{単位元の性質 } AI = A) \\
&= I & (\because AA^{-1} = I) \\
(B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= B^{-1}IB & (\because A^{-1}A = I) \\
&= B^{-1}B & (\because \text{単位元の性質 } IB = B) \\
&= I & (\because B^{-1}B = I)
\end{aligned}$$

よって、 $B^{-1}A^{-1}$ は AB の両側逆元であり、逆元の一意性から $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ が成り立つ。任意の $M \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して、

$$\begin{aligned}
(T_A \circ T_B)(M) &= T_A(T_B(M)) & (\because \text{写像の合成の定義}) \\
&= T_A(BMB^{-1}) & (\because T_B \text{ の定義}) \\
&= A(BMB^{-1})A^{-1} & (\because T_A \text{ の定義}) \\
&= (AB)M(B^{-1}A^{-1}) & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= (AB)M(AB)^{-1} & (\because (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}) \\
&= T_{AB}(M) & (\because T_{AB} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

(引いたブロック: 定理 1.10)

が成り立つ。よって、任意の $M \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ について $(T_A \circ T_B)(M) = T_{AB}(M)$ であるから、 $T_A \circ T_B = T_{AB}$ である。 $\square$

主張 1.56 (交換子と反交換子の関係). $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする. $a, b, c \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、交換子を $[x, y] := xy - yx$ 、反交換子を $[x, y]_+ := xy + yx$ と定めるとき、

$$[ab, c] = a[b, c]_+ - [a, c]_+ b$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned} [ab, c] &= (ab)c - c(ab) && (\because \text{交換子の定義}) \\ &= abc - cab && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= abc + acb - acb - cab && (\because acb - acb = O) \\ &= a(bc + cb) - acb - cab && (\because \text{行列の積の分配法則}) \\ &= a(bc + cb) - (ac + ca)b && (\because \text{行列の積の分配法則}) \\ &= a[b, c]_+ - [a, c]_+ b && (\because \text{反交換子の定義}) \end{aligned}$$

□

2 2次元 ising 模型の分配関数

定義 2.1 (格子サイズ). $M, N \in \mathbb{N}$ かつ $M \geq 1, N \geq 1$ とし、 M, N を格子のサイズとする。

定義 2.2 (2次元 ising 模型の分配関数). 定義 2.1 の格子サイズ M, N を固定する. $Z : \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ を以下のように定める。

$\mathfrak{S} := \text{Map}(\{1, \dots, M\} \times \{1, \dots, N\}, \{-1, 1\})$ として、

ここで $s \in \mathfrak{S}$ の定義域は $\{1, \dots, M\} \times \{1, \dots, N\}$ であって $s(M+1, j), s(i, N+1)$ はそのままでは定義されない。以下では s を両方向に周期的に延長したもの（周期境界条件）を用いる。すなわち $i \in \{1, \dots, M\}, j \in \{1, \dots, N\}$ に対して

$$s(M+1, j) := s(1, j), \quad s(i, N+1) := s(i, 1)$$

と定める。この規約のもとで、下式の被加数はすべて $\mathbb{R}$ の元として定まる。

$$Z(J, J') := \sum_{s \in \mathfrak{S}} \exp \left(\sum_{\substack{i \in \{1, \dots, M\} \\ j \in \{1, \dots, N\}}} (J s(i, j) s(i+1, j) + J' s(i, j) s(i, j+1)) \right)$$

$\mathfrak{S}$ は有限集合 ($|\mathfrak{S}| = 2^{MN}$) であり、各項は $\mathbb{R}_{>0}$ の元であるから、右辺は有限和として無条件に定まる（収束の議論を要しない）。

定義 2.3 (転送行列). $J, J' \in \mathbb{R}_{>0}$ を固定し、 $V_1, V_2 \in \text{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ を以下のように定める。

$\mathfrak{M} := \text{Map}(\{1, \dots, N\}, \{-1, 1\})$ とおく。 $|\mathfrak{M}| = 2^N$ であるから、 $\mathfrak{M}$ の元の対 $(\mu, \mu') \in \mathfrak{M} \times \mathfrak{M}$ を $\text{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ の成分の添え字として用いることができる（行・列の番号 $\{1, \dots, 2^N\}$ と $\mathfrak{M}$ の間の全単射をひとつ固定して同一視する。以下の議論は、この全単射の取り方に依らない）。

$\mu \in \mathfrak{M}$ の定義域は $\{1, \dots, N\}$ であって $\mu(N+1)$ はそのままでは定義されないため、定義 2.2 と同じく周期的に延長したものを用いる。すなわち

$$\mu(N+1) := \mu(1)$$

と定める。このとき、

$$(V_1)_{\mu,\mu'} := \delta_{\mu=\mu'} \exp \left(\sum_{j \in \{1, \dots, N\}} J' \mu(j) \mu(j+1) \right)$$

$$(V_2)_{\mu,\mu'} := \exp \left(\sum_{j \in \{1, \dots, N\}} J \mu(j) \mu'(j) \right)$$

ここで $\delta_{\mu=\mu'} \in \{0, 1\}$ は、 $\mu = \mu'$ (写像として一致、すなわち $\forall j \in \{1, \dots, N\}, \mu(j) = \mu'(j)$) のとき 1、そうでないとき 0 とする。

指数の肩は $J, J' \in \mathbb{R}_{>0}$ と $\mu(j), \mu'(j) \in \{-1, 1\} \subset \mathbb{R}$ の有限個の積和なので $\mathbb{R}$ の元であり、 $\exp$ の値は $\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$ に属する。

主張 2.4 (転送行列による分配関数の表式). 定義 2.2 の Z と 定義 2.3 の $V_1, V_2 \in \text{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ について、 $J, J' \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき

$$Z(J, J') = \text{tr}((V_1 V_2)^M)$$

証明. 以下、定義 2.3 の記号 $\mathfrak{M} = \text{Map}(\{1, \dots, N\}, \{-1, 1\})$ ($|\mathfrak{M}| = 2^N$ 、周期規約 $\mu(N+1) = \mu(1)$) を用い、 $A := V_1 V_2 \in \text{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ とおく。 A の成分も $\mathfrak{M} \times \mathfrak{M}$ を添え字として書く。行方向の周期規約として $\mu^{(M+1)} := \mu^{(1)}$ を置く。

本証明に現れる総和はすべて有限集合上の和であり、値は $\mathbb{C}$ の元である。したがって和の順序交換・結合・分配は $\mathbb{C}$ の可換環の公理から有限帰納法で従い、収束や極限の議論を一切要しない。トレースには 定義 10.2 の定義を用いる。

中間目標: 転送行列の積の成分。

$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$\begin{aligned} (V_1 V_2)_{\mu,\mu'} &= \sum_{\nu \in \mathfrak{M}} (V_1)_{\mu,\nu} (V_2)_{\nu,\mu'} && (\because \text{行列の積の定義}) \\ &= \sum_{\nu \in \mathfrak{M}} \delta_{\mu=\nu} \exp \left(\sum_{j \in \{1, \dots, N\}} J' \mu(j) \mu(j+1) \right) \exp \left(\sum_{j \in \{1, \dots, N\}} J \nu(j) \mu'(j) \right) && (\because V_1, V_2 \text{ の定義}) \\ &= \exp \left(\sum_{j \in \{1, \dots, N\}} J' \mu(j) \mu(j+1) \right) \exp \left(\sum_{j \in \{1, \dots, N\}} J \mu(j) \mu'(j) \right) && (\because \delta_{\mu=\nu} \text{ は } \nu = \mu \text{ のときだけ } 1 \text{ で他は } 0 \text{ である}) \\ &= \exp \left(\sum_{j \in \{1, \dots, N\}} J' \mu(j) \mu(j+1) + \sum_{j \in \{1, \dots, N\}} J \mu(j) \mu'(j) \right) && (\because \text{定理 4.5 を } n=1, K=\mathbb{R} \text{ へ適用する}) \\ &= \exp \left(\sum_{j \in \{1, \dots, N\}} (J' \mu(j) \mu(j+1) + J \mu(j) \mu'(j)) \right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則と結合則による有限和の項別加法}) \end{aligned}$$

中間目標: 行列の冪の成分。

任意の $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ と $\mu^{(1)}, \mu^{(m+1)} \in \mathfrak{M}$ に対して次が成り立つことを、 m についての帰納法で示す。

$$(A^m)_{\mu^{(1)}, \mu^{(m+1)}} = \sum_{(\mu^{(2)}, \dots, \mu^{(m)}) \in \mathfrak{M}^{m-1}} \prod_{k=1}^m A_{\mu^{(k)}, \mu^{(k+1)}} \quad (*)$$

$m = 1$ の場合である。

$$\begin{aligned} (A^1)_{\mu^{(1)}, \mu^{(2)}} &= A_{\mu^{(1)}, \mu^{(2)}} && (\because \text{行列の } 1 \text{ 乗はその行列自身である}) \\ &= \prod_{k=1}^1 A_{\mu^{(k)}, \mu^{(k+1)}} && (\because \text{因子が } 1 \text{ つの有限積はその因子である}) \\ &= \sum_{(\cdot) \in \mathfrak{M}^0} \prod_{k=1}^1 A_{\mu^{(k)}, \mu^{(k+1)}} && (\because \mathfrak{M}^0 \text{ は空列のみからなる } 1 \text{ 点集合である}) \end{aligned}$$

m で $(*)$ が成り立つと仮定し、 $\mu^{(1)}, \mu^{(m+2)} \in \mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$\begin{aligned}
(A^{m+1})_{\mu^{(1)}, \mu^{(m+2)}} &= \sum_{\mu^{(m+1)} \in \mathfrak{M}} (A^m)_{\mu^{(1)}, \mu^{(m+1)}} A_{\mu^{(m+1)}, \mu^{(m+2)}} & (\because A^{m+1} = A^m A \text{ と行列の積の定義}) \\
&= \sum_{\mu^{(m+1)} \in \mathfrak{M}} \left(\sum_{(\mu^{(2)}, \dots, \mu^{(m)}) \in \mathfrak{M}^{m-1}} \prod_{k=1}^m A_{\mu^{(k)}, \mu^{(k+1)}} \right) A_{\mu^{(m+1)}, \mu^{(m+2)}} & (\because \text{帰納法の仮定 } (*)) \\
&= \sum_{\mu^{(m+1)} \in \mathfrak{M}} \sum_{(\mu^{(2)}, \dots, \mu^{(m)}) \in \mathfrak{M}^{m-1}} \left(\prod_{k=1}^m A_{\mu^{(k)}, \mu^{(k+1)}} \right) A_{\mu^{(m+1)}, \mu^{(m+2)}} & (\because \text{有限和に対する分配則 } \left(\sum_{\lambda} x_{\lambda} \right) y = \sum_{\lambda} x_{\lambda} y) \\
&= \sum_{(\mu^{(2)}, \dots, \mu^{(m+1)}) \in \mathfrak{M}^m} \prod_{k=1}^{m+1} A_{\mu^{(k)}, \mu^{(k+1)}} & (\because \mathfrak{M} \times \mathfrak{M}^{m-1} \rightarrow \mathfrak{M}^m \text{ の全単射による添え字の付け替えと、末尾の因子を有限積へ入れること})
\end{aligned}$$

有限和なので添え字の付け替えは順序に依らず等号を与える。よってすべての $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $(*)$ が成り立つ。

中間目標: トレースの展開。

冒頭で置いた行方向の周期規約 $\mu^{(M+1)} = \mu^{(1)}$ のもとで、対角成分に $(*)$ を $m = M$ として当てる。

$$\begin{aligned}
\text{tr}(A^M) &= \sum_{\mu^{(1)} \in \mathfrak{M}} (A^M)_{\mu^{(1)}, \mu^{(1)}} & (\because \text{トレースの定義 } \text{tr}(B) = \sum_{\mu} B_{\mu, \mu}) \\
&= \sum_{\mu^{(1)} \in \mathfrak{M}} \sum_{(\mu^{(2)}, \dots, \mu^{(M)}) \in \mathfrak{M}^{M-1}} \prod_{k=1}^M A_{\mu^{(k)}, \mu^{(k+1)}} & (\because (*) \text{ を } m = M, \mu^{(M+1)} = \mu^{(1)} \text{ として}) \\
&= \sum_{(\mu^{(1)}, \dots, \mu^{(M)}) \in \mathfrak{M}^M} \prod_{k=1}^M A_{\mu^{(k)}, \mu^{(k+1)}} & (\because \mathfrak{M} \times \mathfrak{M}^{M-1} \rightarrow \mathfrak{M}^M \text{ の全単射による添え字の付け替え})
\end{aligned}$$

中間目標: 指数の積を指数の和へ。

準備として、任意の $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ と $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$ について $\prod_{k=1}^m \exp(x_k) = \exp(\sum_{k=1}^m x_k)$ を m についての帰納法で示す。 $m = 1$ のときは両辺とも $\exp(x_1)$ である。 m で成り立つとする。

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{m+1} \exp(x_k) &= \left(\prod_{k=1}^m \exp(x_k) \right) \exp(x_{m+1}) & (\because \text{有限積から末尾の因子を分けること}) \\
&= \exp\left(\sum_{k=1}^m x_k\right) \exp(x_{m+1}) & (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \exp\left(\sum_{k=1}^{m+1} x_k\right) & (\because \text{定理 4.5 を } n = 1, K = \mathbb{R} \text{ へ適用する})
\end{aligned}$$

$(\mu^{(1)}, \dots, \mu^{(M)}) \in \mathfrak{M}^M$ (および $\mu^{(M+1)} = \mu^{(1)}$) を任意に取る。

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^M A_{\mu^{(k)}, \mu^{(k+1)}} &= \prod_{k=1}^M \exp\left(\sum_{j \in \{1, \dots, N\}} (J' \mu^{(k)}(j) \mu^{(k)}(j+1) + J \mu^{(k)}(j) \mu^{(k+1)}(j))\right) & (\because \text{上で示した転送行列の積の成分}) \\
&= \exp\left(\sum_{k \in \{1, \dots, M\}} \sum_{j \in \{1, \dots, N\}} (J' \mu^{(k)}(j) \mu^{(k)}(j+1) + J \mu^{(k)}(j) \mu^{(k+1)}(j))\right) & (\because \text{直前に示した指数の積の法則}) \\
&= \exp\left(\sum_{\substack{k \in \{1, \dots, M\} \\ j \in \{1, \dots, N\}}} (J' \mu^{(k)}(j) \mu^{(k)}(j+1) + J \mu^{(k)}(j) \mu^{(k+1)}(j))\right) & (\because \text{有限集合 } \{1, \dots, M\} \times \{1, \dots, N\} \text{ 上の和を二重和として書き直すこと})
\end{aligned}$$

中間目標: $\mathfrak{M}^M$ と $\mathfrak{G}$ の全単射。両包含ではなく全単射の構成なので、一続きの式変形にはしない。

写像 $\Phi: \mathfrak{M}^M \rightarrow \mathfrak{G}$ を次で定める。 $(\mu^{(1)}, \dots, \mu^{(M)}) \in \mathfrak{M}^M$ に対し、

$$\Phi(\mu^{(1)}, \dots, \mu^{(M)}) := s, \quad s(i, j) := \mu^{(i)}(j) \quad (i \in \{1, \dots, M\}, j \in \{1, \dots, N\})$$

(well-defined 性) 各 $\mu^{(i)}$ は $\{1, \dots, N\} \rightarrow \{-1, 1\}$ の写像だから、 s は $\{1, \dots, M\} \times \{1, \dots, N\}$ の各元に $\{-1, 1\}$ の元をただ 1 つ対応させる。ゆえに $s \in \mathfrak{S}$ 。

(単射性) $\Phi(\mu^{(1)}, \dots, \mu^{(M)}) = \Phi(\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(M)})$ とすると、すべての $i \in \{1, \dots, M\}$ 、 $j \in \{1, \dots, N\}$ について $\mu^{(i)}(j) = \nu^{(i)}(j)$ 。写像の外延性より各 i で $\mu^{(i)} = \nu^{(i)}$ であり、組として $(\mu^{(1)}, \dots, \mu^{(M)}) = (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(M)})$ 。

(全射性) $s \in \mathfrak{S}$ を任意にとり、 $i \in \{1, \dots, M\}$ ごとに $\mu^{(i)} : \{1, \dots, N\} \rightarrow \{-1, 1\}$ を $\mu^{(i)}(j) := s(i, j)$ で定めれば $\mu^{(i)} \in \mathfrak{M}$ であり、 $\Phi(\mu^{(1)}, \dots, \mu^{(M)}) = s$ 。

よって Φ は全単射である。両辺の濃度も

$$\begin{aligned} |\mathfrak{M}^M| &= (2^N)^M \quad (\because \mathfrak{M}^M \text{ は } M \text{ 個の直積で、} |\mathfrak{M}| = 2^N(\{1, \dots, N\} \text{ から } \{-1, 1\} \text{ への写像の総数})) \\ &= 2^{MN} \quad (\because \text{指数法則 } (a^m)^n = a^{mn}) \\ &= |\mathfrak{S}| \quad (\because \mathfrak{S} \text{ は } \{1, \dots, M\} \times \{1, \dots, N\} \text{ から } \{-1, 1\} \text{ への写像全体で、その総数は } 2^{MN}) \end{aligned}$$

で整合する。

(周期規約の整合) $s = \Phi(\mu^{(1)}, \dots, \mu^{(M)})$ とおくと、冒頭で置いた規約 $\mu^{(M+1)} = \mu^{(1)}$ から

$$\begin{aligned} s(M+1, j) &= \mu^{(M+1)}(j) \quad (\because s(i, j) = \mu^{(i)}(j) (\Phi \text{ の定義})) \\ &= \mu^{(1)}(j) \quad (\because \mu^{(M+1)} = \mu^{(1)} (\text{周期規約})) \\ &= s(1, j) \quad (\because s(i, j) = \mu^{(i)}(j) (\Phi \text{ の定義})) \end{aligned}$$

を得る。また、定義 2.3 の規約 $\mu^{(i)}(N+1) = \mu^{(i)}(1)$ は $s(i, N+1) = s(i, 1)$ を与える。これらは 定義 2.2 で置いた周期境界条件そのものである。ゆえに指数の肩に現れる記号は、両辺で同じ規約のもとに解釈される。

中間目標: 分配関数との一致。

$$\begin{aligned} \text{tr}((V_1 V_2)^M) &= \sum_{(\mu^{(1)}, \dots, \mu^{(M)}) \in \mathfrak{M}^M} \exp \left(\sum_{\substack{k \in \{1, \dots, M\} \\ j \in \{1, \dots, N\}}} (J' \mu^{(k)}(j) \mu^{(k)}(j+1) + J \mu^{(k)}(j) \mu^{(k+1)}(j)) \right) \quad (\because \text{上で示したトレースの展開と、直前に示した積の表式}) \\ &= \sum_{s \in \mathfrak{S}} \exp \left(\sum_{\substack{i \in \{1, \dots, M\} \\ j \in \{1, \dots, N\}}} (J' s(i, j) s(i, j+1) + J s(i, j) s(i+1, j)) \right) \quad (\because \Phi \text{ が全単射であることによる添字の付け替えと } s(i, j) = \mu^{(i)}(j)) \\ &= \sum_{s \in \mathfrak{S}} \exp \left(\sum_{\substack{i \in \{1, \dots, M\} \\ j \in \{1, \dots, N\}}} (J s(i, j) s(i+1, j) + J' s(i, j) s(i, j+1)) \right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の加法の交換律}) \\ &= Z(J, J') \quad (\because \text{定義 2.2 の定義式そのもの}) \end{aligned}$$

□

3 線型空間の一般論

定義 3.1 (クロネッカー積 (2 次の複素行列・2 次元数ベクトルの M 個の積)). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。各成分が 1 か 2 である M 個組の全体

$$\mathcal{I}_M := \{1, 2\}^M = \{(i_1, \dots, i_M) \mid i_1, \dots, i_M \in \{1, 2\}\}$$

を添字集合とする。 $\#\mathcal{I}_M = 2^M$ である (下の Step 1)。写像

$$\nu : \mathcal{I}_M \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^M\}, \quad \nu(I) := 1 + \sum_{k=1}^M (i_k - 1) 2^{M-k} \quad (I = (i_1, \dots, i_M))$$

は全単射である (下の Step 2・Step 3)。以後、 $\mathcal{I}_M$ の元 I を、行番号・列番号 $\nu(I) \in \{1, \dots, 2^M\}$ と同一視して使う。

(1) 数ベクトルのクロネッカー積。 $v_1, \dots, v_M \in \mathbb{C}^2$ に対し、 $v_1 \boxtimes \dots \boxtimes v_M \in \mathbb{C}^{2^M}$ を成分で

$$(v_1 \boxtimes \dots \boxtimes v_M)_{\nu(I)} := \prod_{k=1}^M (v_k)_{i_k} \quad (I = (i_1, \dots, i_M) \in \mathcal{I}_M)$$

と定める (右辺は複素数の有限個の積であり、 $(v_k)_{i_k} \in \mathbb{C}$ は v_k の第 i_k 成分)。 ν が全単射だから、これで $\mathbb{C}^{2^M}$ の元が 1 つ確定する。

(2) 行列のクロネッカー積。 $A_1, \dots, A_M \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対し、 $A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を成分で

$$(A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M)_{\nu(I), \nu(J)} := \prod_{k=1}^M (A_k)_{i_k j_k} \quad (I = (i_1, \dots, i_M), J = (j_1, \dots, j_M) \in \mathcal{I}_M)$$

と定める。これは 2^M 行 2^M 列の複素行列であって、抽象的なテンソル積ではない。

(3) これらが住む空間。 $A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M$ は 2^M 次の複素正方行列全体 $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元、 $v_1 \boxtimes \dots \boxtimes v_M$ は 2^M 次元数ベクトル全体 $\mathbb{C}^{2^M}$ の元である。基底と単位行列に関する帰結は、定義後の成分計算で別に示す。

証明。 ν が定義どおりの写像であり全単射であること (定義が意味をもつために必要な事項) を確かめる。

Step 1: $\#\mathcal{I}_M = 2^M$ 。 M についての帰納法による。 $M = 1$ のとき $\mathcal{I}_1 = \{(1), (2)\}$ で元数は $2 = 2^1$ 。 M で $\#\mathcal{I}_M = 2^M$ とすると、 $\mathcal{I}_{M+1}$ の元は (I, i_{M+1}) ($I \in \mathcal{I}_M$ 、 $i_{M+1} \in \{1, 2\}$) と一対一に対応するから、次の一続きで $M + 1$ でも成り立つ。

$$\begin{aligned} \#\mathcal{I}_{M+1} &= \#\mathcal{I}_M \cdot 2 \quad (\because \text{一対一対応で } I \text{ が } \#\mathcal{I}_M \text{ 通り、 } i_{M+1} \text{ が } 2 \text{ 通り}) \\ &= 2^M \cdot 2 \quad (\because \text{帰納法の仮定 } \#\mathcal{I}_M = 2^M) \\ &= 2^{M+1} \quad (\because \text{指数法則 } 2^M \cdot 2 = 2^{M+1}) \end{aligned}$$

Step 2: 値域。まず $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1$ ($n = 0$ のときは空和で $0 = 2^0 - 1$ 、 n で成り立てば次の一続きで $n + 1$ でも成り立つ)。

$$\begin{aligned} \sum_{t=0}^n 2^t &= \sum_{t=0}^{n-1} 2^t + 2^n \quad (\because \text{有限和の最後の項を分ける}) \\ &= (2^n - 1) + 2^n \quad (\because \text{帰納法の仮定 } \sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1) \\ &= 2 \cdot 2^n - 1 \quad (\because \text{加法の結合則と } 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n) \\ &= 2^{n+1} - 1 \quad (\because \text{指数法則 } 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}) \end{aligned}$$

各 k について $i_k - 1 \in \{0, 1\}$ であるから

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{k=1}^M (i_k - 1) 2^{M-k} \quad (\because \text{各項は } 0 \leq i_k - 1 \text{ と } 2^{M-k} > 0 \text{ の積で非負}) \\ &\leq \sum_{k=1}^M 2^{M-k} \quad (\because \text{各項で } i_k - 1 \leq 1 \text{ かつ } 2^{M-k} > 0) \\ &= \sum_{t=0}^{M-1} 2^t \quad (\because \text{添字の置き換え } t := M - k) \\ &= 2^M - 1 \quad (\because \text{上の } \sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1 \text{ を } n := M \text{ で}) \end{aligned}$$

であり、 $1 \leq \nu(I) \leq 2^M$ 。よって ν は $\mathcal{I}_M$ から $\{1, \dots, 2^M\}$ への写像である。

Step 3: 単射性、および全単射性。 $I = (i_1, \dots, i_M) \neq J = (j_1, \dots, j_M)$ とし、 $i_k \neq j_k$ となる最小の k をとる。必要なら I と J を入れ替えて $i_k = 2, j_k = 1$ としてよい。 $l < k$ では $i_l = j_l$ だから

$$\begin{aligned}
\nu(I) - \nu(J) &= \left(1 + \sum_{l=1}^M (i_l - 1)2^{M-l}\right) - \left(1 + \sum_{l=1}^M (j_l - 1)2^{M-l}\right) \quad (\because \nu \text{ の定義}) \\
&= \sum_{l=1}^M (i_l - j_l)2^{M-l} \quad (\because \text{和の差を項ごとにとる。}(i_l - 1) - (j_l - 1) = i_l - j_l) \\
&= \sum_{l=k}^M (i_l - j_l)2^{M-l} \quad (\because l < k \text{ では } i_l = j_l \text{ で項が0}) \\
&= 2^{M-k} + \sum_{l=k+1}^M (i_l - j_l)2^{M-l} \quad (\because l = k \text{ の項を分ける。} i_k - j_k = 2 - 1 = 1)
\end{aligned}$$

であり、 $i_l - j_l \in \{-1, 0, 1\}$ より次の一続きが成り立つ。

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{l=k+1}^M (i_l - j_l)2^{M-l} \right| &\leq \sum_{l=k+1}^M |i_l - j_l| 2^{M-l} \quad (\because \text{三角不等式と } 2^{M-l} > 0) \\
&\leq \sum_{l=k+1}^M 2^{M-l} \quad (\because \text{各項で } |i_l - j_l| \leq 1 \text{ かつ } 2^{M-l} > 0) \\
&= \sum_{t=0}^{M-k-1} 2^t \quad (\because \text{添字の置き換え } t := M - l) \\
&= 2^{M-k} - 1 \quad (\because \text{Step 2 の } \sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1 \text{ を } n := M - k \text{ で}) \\
&< 2^{M-k} \quad (\because 2^{M-k} - 1 < 2^{M-k})
\end{aligned}$$

よって $\nu(I) - \nu(J) \neq 0$ すなわち ν は単射である。Step 1 より $\#\mathcal{I}_M = 2^M = \#\{1, \dots, 2^M\}$ であり、有限集合の間の単射で元数が等しいものは全射でもあるから（像は 2^M 個の元をもつ $\{1, \dots, 2^M\}$ の部分集合、すなわち全体）、 ν は全単射である。□

主張 3.2 (クロネッカー積の積の規則 (各因子ごとの積になること)). 定義 3.1 の記号のもと、 $A_1, \dots, A_M, B_1, \dots, B_M \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ 、 $v_1, \dots, v_M \in \mathbb{C}^2$ について次が成り立つ。

- (1) $(A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \dots \boxtimes B_M) = (A_1 B_1) \boxtimes \dots \boxtimes (A_M B_M)$ (左辺は 2^M 次の行列の積、右辺の各 $A_k B_k$ は 2 次の行列の積)。
- (2) $I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} \boxtimes \dots \boxtimes I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ 。
- (3) $(A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M)(v_1 \boxtimes \dots \boxtimes v_M) = (A_1 v_1) \boxtimes \dots \boxtimes (A_M v_M)$ 。

証明. 行列積と列ベクトルへの作用は 定義 1.8 に従い、複素数の結合律・可換律・分配律は 主張 1.35 を用いる。

多重添字についての和を、各因子ごとの和の積へ直すこと。 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ と、各 $k \in \{1, \dots, M\}$ ごとに与えられた複素数 $c_k(1), c_k(2) \in \mathbb{C}$ について

$$\sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^M c_k(t_k) = \prod_{k=1}^M \left(\sum_{t=1}^2 c_k(t) \right) \quad (K = (t_1, \dots, t_M))$$

が成り立つ。 M についての帰納法で示す。 $M = 1$ のときは両辺とも $c_1(1) + c_1(2)$ 。 M で成り立つとすると、 $\mathcal{I}_{M+1}$ の元は (K, t) ($K \in \mathcal{I}_M, t \in \{1, 2\}$) と一対一に対応するから

$$\begin{aligned}
\sum_{(t_1, \dots, t_{M+1}) \in \mathcal{I}_{M+1}} \prod_{k=1}^{M+1} c_k(t_k) &= \sum_{t=1}^2 \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \left(\prod_{k=1}^M c_k(t_k) \right) c_{M+1}(t) \quad (\because \text{最後の成分 } t_{M+1} = t \text{ で場合分けした有限和の分割}) \\
&= \left(\sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^M c_k(t_k) \right) \left(\sum_{t=1}^2 c_{M+1}(t) \right) \quad (\because \text{分配律}) \\
&= \left(\prod_{k=1}^M \left(\sum_{s=1}^2 c_k(s) \right) \right) \left(\sum_{t=1}^2 c_{M+1}(t) \right) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \prod_{k=1}^{M+1} \left(\sum_{t=1}^2 c_k(t) \right) \quad (\because \text{有限積の最後の因子を戻した (積の定義)})
\end{aligned}$$

(1) の証明。 $I = (i_1, \dots, i_M)$, $L = (l_1, \dots, l_M) \in \mathcal{I}_M$ を任意に取る。行列の積の定義と、定義 3.1 の ν が全単射であること (和の変数 $p \in \{1, \dots, 2^M\}$ を $p = \nu(K)$, $K = (t_1, \dots, t_M) \in \mathcal{I}_M$ と書き換えてよい) より、

$$\begin{aligned}
((A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M) (B_1 \boxtimes \dots \boxtimes B_M))_{\nu(I), \nu(L)} &= \sum_{p=1}^{2^M} (A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M)_{\nu(I), p} (B_1 \boxtimes \dots \boxtimes B_M)_{p, \nu(L)} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \left(\prod_{k=1}^M (A_k)_{i_k t_k} \right) \left(\prod_{k=1}^M (B_k)_{t_k l_k} \right) \quad (\because \nu \text{ は全単射、} \boxtimes \text{ の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^M ((A_k)_{i_k t_k} (B_k)_{t_k l_k}) \quad (\because \text{複素数の積の可換律・結合律}) \\
&= \prod_{k=1}^M \left(\sum_{t=1}^2 (A_k)_{i_k t} (B_k)_{t l_k} \right) \quad (\because \text{多重添字の和を各因子ごとの和の積へ直す段を } c_k(t) = (A_k)_{i_k t} (B_k)_{t l_k} \text{ に適用}) \\
&= \prod_{k=1}^M (A_k B_k)_{i_k l_k} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= ((A_1 B_1) \boxtimes \dots \boxtimes (A_M B_M))_{\nu(I), \nu(L)} \quad (\because \boxtimes \text{ の定義})
\end{aligned}$$

ν は全単射だから、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。

(2) の証明。 $I = (i_1, \dots, i_M)$, $J = (j_1, \dots, j_M) \in \mathcal{I}_M$ を任意に取る。単位行列の成分は $(I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})})_{ij} = \delta_{ij}$ ($i = j$ のとき 1、そうでなければ 0) である。

$$\begin{aligned}
(I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} \boxtimes \dots \boxtimes I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})})_{\nu(I), \nu(J)} &= \prod_{k=1}^M \delta_{i_k j_k} \quad (\because \boxtimes \text{ の定義と単位行列の成分}) \\
&= \begin{cases} 1 & (I = J) \\ 0 & (I \neq J) \end{cases} \quad (\because \text{積が1になるのは全ての } k \text{ で } i_k = j_k, \text{ すなわち } I = J \text{ のときに限り、そうでなければ因子に0が現れる}) \\
&= (I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})})_{\nu(I), \nu(J)} \quad (\because \nu \text{ は単射なので } I = J \iff \nu(I) = \nu(J), \text{ および単位行列の成分})
\end{aligned}$$

ν は全単射だから、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。

(3) の証明。(1) と同じ計算を、第 2 の因子を数ベクトルに置き換えて行う。

$$\begin{aligned}
((A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M) (v_1 \boxtimes \dots \boxtimes v_M))_{\nu(I)} &= \sum_{p=1}^{2^M} (A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M)_{\nu(I), p} (v_1 \boxtimes \dots \boxtimes v_M)_p \quad (\because \text{行列と数ベクトルの積の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \left(\prod_{k=1}^M (A_k)_{i_k t_k} \right) \left(\prod_{k=1}^M (v_k)_{t_k} \right) \quad (\because \nu \text{ は全単射、} \boxtimes \text{ の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^M ((A_k)_{i_k t_k} (v_k)_{t_k}) \quad (\because \text{複素数の積の可換律・結合律}) \\
&= \prod_{k=1}^M \left(\sum_{t=1}^2 (A_k)_{i_k t} (v_k)_t \right) \quad (\because \text{多重添字の和を各因子ごとの和の積へ直す段を } c_k(t) = (A_k)_{i_k t} (v_k)_t \text{ に適用}) \\
&= \prod_{k=1}^M (A_k v_k)_{i_k} \quad (\because \text{行列と数ベクトルの積の定義}) \\
&= ((A_1 v_1) \boxtimes \dots \boxtimes (A_M v_M))_{\nu(I)} \quad (\because \boxtimes \text{ の定義})
\end{aligned}$$

□

主張 3.3 (クロネッカー積の各因子についての線型性)。定義 3.1 の記号のもと、 $j \in \{1, \dots, M\}$ を固定し、 $A_1, \dots, A_M \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ 、 $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $c_1, \dots, c_r \in \mathbb{C}$ 、 $B_1, \dots, B_r \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ とする。第 j 因子が $A_j = \sum_{a=1}^r c_a B_a$ と書けているとき、

$$A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\left(\sum_{a=1}^r c_a B_a \right)}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M = \sum_{a=1}^r c_a \left(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{B_a}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M \right)$$

が成り立つ。特に $r = 1$ として、 $c \in \mathbb{C}$ について

$$A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(c A_j)}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M = c (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)$$

である。数ベクトルのクロネッカー積についても、 $\mathbb{C}^2$ の元を同じ形に分解したとき同じ等式が成り立つ。

証明. 成分の複素数の演算には 主張 1.35 の結合律・可換律・分配律を用いる。

準備. $I = (i_1, \dots, i_M)$, $J = (j_1, \dots, j_M) \in \mathcal{I}_M$ を任意に取り、両辺の $(\nu(I), \nu(J))$ 成分を比べる。以下で $\prod_{k \neq j} (A_k)_{i_k j_k}$ は $k \in \{1, \dots, M\} \setminus \{j\}$ についての積を表す。

$$\begin{aligned} \left(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \left(\sum_{a=1}^r c_a B_a \right) \boxtimes \cdots \boxtimes A_M \right)_{\nu(I), \nu(J)} &= \left(\prod_{k \neq j} (A_k)_{i_k j_k} \right) \left(\sum_{a=1}^r c_a B_a \right)_{i_j j_j} && (\because \boxtimes \text{ の定義}) \\ &= \left(\prod_{k \neq j} (A_k)_{i_k j_k} \right) \left(\sum_{a=1}^r c_a (B_a)_{i_j j_j} \right) && (\because \text{行列の和} \cdot \text{スカラー倍は成分ごとの演算}) \\ &= \sum_{a=1}^r c_a \left(\prod_{k \neq j} (A_k)_{i_k j_k} \right) (B_a)_{i_j j_j} && (\because \text{複素数の分配律}) \\ &= \sum_{a=1}^r c_a (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_a \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I), \nu(J)} && (\because \boxtimes \text{ の定義}) \\ &= \left(\sum_{a=1}^r c_a (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_a \boxtimes \cdots \boxtimes A_M) \right)_{\nu(I), \nu(J)} && (\because \text{行列の和} \cdot \text{スカラー倍は成分ごとの演算}) \end{aligned}$$

ν は全単射だから、すべての成分が一致し両辺は等しい。 $r = 1$, $c_1 = c$, $B_1 = A_j$ とすればスカラーを前に出す式を得る。数ベクトルの場合は、上の計算で $(A_k)_{i_k j_k}$ を $(v_k)_{i_k}$ に置き換えれば同じ議論がそのまま通用する。 $\square$

主張 3.4 (クロネッカー積の転置 (因子ごとの転置になること)). 定義 3.1 の記号のもと、 $A_1, \dots, A_M \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ について、 2^M 次の複素行列の転置 $(B^\top)_{pq} := B_{qp}$ ($p, q \in \{1, \dots, 2^M\}$) に関して

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)^\top = A_1^\top \boxtimes \cdots \boxtimes A_M^\top$$

が成り立つ。

証明. $I = (i_1, \dots, i_M)$, $J = (j_1, \dots, j_M) \in \mathcal{I}_M$ を任意に取り、両辺の $(\nu(I), \nu(J))$ 成分を比べる。

$$\begin{aligned} \left((A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)^\top \right)_{\nu(I), \nu(J)} &= (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(J), \nu(I)} && (\because \text{転置の定義}) \\ &= \prod_{k=1}^M (A_k)_{j_k i_k} && (\because \text{定義 3.1 のクロネッカー積の成分の定め方}) \\ &= \prod_{k=1}^M (A_k^\top)_{i_k j_k} && (\because 2 \text{ 次の行列の転置の定義}) \\ &= \left(A_1^\top \boxtimes \cdots \boxtimes A_M^\top \right)_{\nu(I), \nu(J)} && (\because \text{定義 3.1 のクロネッカー積の成分の定め方}) \end{aligned}$$

ν は 定義 3.1 により全単射であり、 $\{1, \dots, 2^M\}$ のどの成分の番号も $\nu(I)$ の形に書けるので、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。 $\square$

定理 3.5 (クロネッカー積がつくる基底). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、記号は 定義 3.1 のものとする。 $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の行列単位を E_{ij} ((i, j) 成分が 1 で他の成分が 0, $i, j \in \{1, 2\}$)、 $\mathbb{C}^2$ の標準基底を $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ とする。 $I = (i_1, \dots, i_M)$, $J = (j_1, \dots, j_M) \in \mathcal{I}_M$ について

$$E_{I,J} := E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M} \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}), \quad f_I := e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M} \in \mathbb{C}^{2^M}$$

とおく。次が成り立つ。

- (1) 族 $(E_{I,J})_{I,J \in \mathcal{I}_M}$ は $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$ -基底である。特に $\dim_{\mathbb{C}} \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = 4^M$ 。
- (2) $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ を $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の任意の $\mathbb{C}$ -基底とすると、多重添字 $(a_1, \dots, a_M) \in \{1, 2, 3, 4\}^M$ で添字づけられた 4^M 個の元からなる族 $(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M})_{(a_1, \dots, a_M) \in \{1, 2, 3, 4\}^M}$ は $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$ -基底である。
- (3) $\{u_1, u_2\}$ を $\mathbb{C}^2$ の任意の $\mathbb{C}$ -基底とすると、族 $(u_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes u_{a_M})_{(a_1, \dots, a_M) \in \{1, 2\}^M}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ の $\mathbb{C}$ -基底である。特に $(f_I)_{I \in \mathcal{I}_M}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底であり $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M} = 2^M$ 。

(1)(2) は 2^M 次の複素正方行列全体 $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の基底についての主張、(3) は 2^M 次元数ベクトル空間 $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底についての主張である。

証明. Step 1: (3) の特別な場合 (標準基底)。(e_i)_t = δ_{it} であるから、 $K = (k_1, \dots, k_M) \in \mathcal{I}_M$ について

$$\begin{aligned} (f_I)_{\nu(K)} &= \prod_{k=1}^M (e_{i_k})_{k_k} && (\because \text{定義 3.1 のクロネッカー積の成分の定め方}) \\ &= \prod_{k=1}^M \delta_{i_k k_k} && (\because (e_i)_t = \delta_{it}) \\ &= \begin{cases} 1 & (I = K) \\ 0 & (I \neq K) \end{cases} && (\because I = K \text{ ならばどの因子も } 1, I \neq K \text{ ならば } i_k \neq k_k \text{ となる } k \text{ があってその因子が } 0) \end{aligned}$$

すなわち f_I は第 $\nu(I)$ 成分だけが 1 で他が 0 の数ベクトル、つまり $\mathbb{C}^{2^M}$ の標準基底ベクトルである。 ν が全単射だから $(f_I)_{I \in \mathcal{I}_M}$ は標準基底全体と一致し、これは $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底である (任意の $w = (w_1, \dots, w_{2^M})$ は $w = \sum_{p=1}^{2^M} w_p$ (第 p 標準基底ベクトル) と成分比較で一意に書ける)。特に $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M} = 2^M$ 。

Step 2: (1)。同様に $(E_{ij})_{st} = \delta_{is} \delta_{jt}$ であるから、 $K, L \in \mathcal{I}_M$ について

$$\begin{aligned} (E_{I,J})_{\nu(K), \nu(L)} &= \prod_{k=1}^M (E_{i_k j_k})_{k_k l_k} && (\because \text{定義 3.1 のクロネッカー積の成分の定め方}) \\ &= \prod_{k=1}^M \delta_{i_k k_k} \delta_{j_k l_k} && (\because (E_{ij})_{st} = \delta_{is} \delta_{jt}) \\ &= \begin{cases} 1 & (I = K \text{ かつ } J = L) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases} && (\because I = K \text{ かつ } J = L \text{ ならばどの因子も } 1, \text{ そうでなければ } 0 \text{ となる因子がある}) \end{aligned}$$

すなわち $E_{I,J}$ は $(\nu(I), \nu(J))$ 成分だけが 1 で他が 0 の 2^M 次行列 ($\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の行列単位) である。 ν が全単射だから $(E_{I,J})_{I,J \in \mathcal{I}_M}$ は 2^M 次の行列単位全体と一致する。任意の $A = (a_{pq}) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ は成分比較により $A = \sum_{p,q=1}^{2^M} a_{pq}$ (第 (p, q) 行列単位) と一意に書けるから、これは基底であり、元数は $2^M \cdot 2^M = 4^M$ 。よって $\dim_{\mathbb{C}} \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = 4^M$ 。

Step 3: 有限次元線型空間についての 2 つの事実。以下で次を使う。

- (a) d 次元 $\mathbb{C}$ -線型空間を張る有限族の元数は d 以上である。

- (b) したがって、 d 次元 $\mathbb{C}$ -線型空間を張る、ちょうど d 個の元からなる族は基底である。実際、線型独立でなければ、ある元が他の元の線型結合になり、その元を除いた $d-1$ 個の族がなお全体を張るので (a) に反する。

Step 4: (2)。 $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_4\}$ は $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の基底だから、各行列単位 E_{ij} ($i, j \in \{1, 2\}$) は

$$E_{ij} = \sum_{a=1}^4 d_a^{(ij)} b_a \quad (d_a^{(ij)} \in \mathbb{C})$$

と書ける。 $I, J \in \mathcal{I}_M$ を固定し、 $E_{I,J} = E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M}$ の第 1 因子から順にこの展開を代入する。主張 3.3 を第 j 因子に適用する操作を $j = 1, 2, \dots, M$ と繰り返す (j についての帰納法) と、

$$E_{I,J} = \sum_{(a_1, \dots, a_M) \in \{1, 2, 3, 4\}^M} \left(\prod_{k=1}^M d_{a_k}^{(i_k j_k)} \right) (b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M}) \quad (\because \text{各因子についての線型性})$$

を得る (各段階で和の項数が 4 倍になり、 M 段階で 4^M 項になる)。よって $E_{I,J}$ は族 $(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M})$ の $\mathbb{C}$ -線型結合である。Step 2 より $(E_{I,J})$ は $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を張るから、 $(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M})$ も $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を張る (既知の基底の各元がこの候補族の線型結合で書けるので、既知の基底が張る空間は候補族が張る空間に含まれる)。この族の元数は $\#\{1, 2, 3, 4\}^M = 4^M$ であり、Step 2 より $\dim_{\mathbb{C}} \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = 4^M$ であるから、Step 3 (b) よりこの族は基底である。

Step 5: (3) の一般の基底の場合。Step 4 とまったく同じ議論を、 $e_i = \sum_{a=1}^2 d_a^{(i)} u_a$ 、主張 3.3 の数ベクトル版、Step 1 の (f_I) が $\mathbb{C}^{2^M}$ を張ること、 $\#\{1, 2\}^M = 2^M = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M}$ に対して行えばよい。□

主張 3.6 ($c \cdot I$ は全行列と可換). $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $c \in \mathbb{C}$ 、 $A \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、

$$[c \cdot I, A] = 0$$

行列積は定義 1.8、交換子は主張 1.56 の定義を用い、成分の複素数の演算は主張 1.35 に従う。

証明.

$$\begin{aligned} [c \cdot I, A] &= (c \cdot I)A - A(c \cdot I) \quad (\because \text{交換子の定義}) \\ &= c(IA) - c(AI) \quad (\because \text{スカラー倍は行列の積の外へ出せる}) \\ &= cA - cA \quad (\because \text{単位行列の性質 } IA = A, AI = A) \\ &= 0 \quad (\because \text{同じ元の差は零行列}) \end{aligned}$$

□

主張 3.7 ($\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の中で全元と可換な元はスカラー). 行列単位の成分積は定義 1.8、複素係数の演算は主張 1.35 による。

$M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。 $W \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ が、すべての $x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について $Wx = xW$ を満たすならば、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して $W = c \cdot I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ が成り立つ。

証明. Step 1: $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の行列単位。 $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の行列単位を

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対し

$$A = a_{11}E_{11} + a_{12}E_{12} + a_{21}E_{21} + a_{22}E_{22} \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つので $\mathcal{E}_0 := \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ は $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ を張り、 $\dim_{\mathbb{C}} \text{Mat}(2, \mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{E}_0$ であるから $\mathcal{E}_0$ は基底である。成分計算により、 $i, j, k, l \in \{1, 2\}$ について

$$E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il} \quad (\because \text{行列の積の成分計算})$$

(δ_{jk} は Kronecker のデルタ)。特に $E_{11} + E_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}$ 。多重添字 $I = (i_1, \dots, i_M)$, $J = (j_1, \dots, j_M) \in \{1, 2\}^M$ について $E_{IJ} := E_{i_1 j_1} \boxtimes E_{i_2 j_2} \boxtimes \dots \boxtimes E_{i_M j_M} \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ とおく (定義 3.1 のクロネッカー積。これは 2^M 次の複素行列である)。 $\mathcal{E} := \{E_{IJ} : I, J \in \{1, 2\}^M\}$ は $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の基底である (定理 3.5 (1))。その元数は $\#\mathcal{E} = (2^M)^2 = 4^M$ 。

Step 2: 行列単位 E_{IJ} の積公式。 $I, J, K, L \in \{1, 2\}^M$ について、主張 3.2 (1)、主張 3.3 と Step 1 より

$$\begin{aligned} E_{IJ}E_{KL} &= (E_{i_1 j_1} \boxtimes \dots \boxtimes E_{i_M j_M})(E_{k_1 l_1} \boxtimes \dots \boxtimes E_{k_M l_M}) \\ &= (E_{i_1 j_1} E_{k_1 l_1}) \boxtimes \dots \boxtimes (E_{i_M j_M} E_{k_M l_M}) && (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\ &= (\delta_{j_1 k_1} E_{i_1 l_1}) \boxtimes \dots \boxtimes (\delta_{j_M k_M} E_{i_M l_M}) && (\because E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}) \\ &= \left(\prod_{r=1}^M \delta_{j_r k_r} \right) E_{IL} && (\because \text{各因子についての線型性を } M \text{ 回}) \end{aligned}$$

$\delta_{JK} := \prod_{r=1}^M \delta_{j_r k_r}$ とおくと、これは $J = K$ のとき 1、そうでなければ 0 であるから $E_{IJ}E_{KL} = \delta_{JK}E_{IL}$ 。また各因子に $I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}$ を代入して展開すると

$$\begin{aligned} I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} &= I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} \boxtimes \dots \boxtimes I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} && (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (2) を右辺から左辺へ}) \\ &= (E_{11} + E_{22}) \boxtimes \dots \boxtimes (E_{11} + E_{22}) && (\because I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}) \\ &= \sum_{P=(p_1, \dots, p_M) \in \{1, 2\}^M} E_{p_1 p_1} \boxtimes \dots \boxtimes E_{p_M p_M} && (\because \text{各因子についての線型性を } M \text{ 回}) \\ &= \sum_{P \in \{1, 2\}^M} E_{PP} && (\because E_{PP} \text{ の定め方}) \end{aligned}$$

(引いたのは 主張 3.2 (2) と 主張 3.3 である)。

Step 3: W を行列単位で展開し、可換性から係数を決定する。 $\mathcal{E}$ は基底であるから W は一意に $W = \sum_{I, J \in \{1, 2\}^M} w_{IJ} E_{IJ}$ ($w_{IJ} \in \mathbb{C}$) と展開できる。仮定より各 E_{KL} について $WE_{KL} = E_{KL}W$ 。左辺は

$$\begin{aligned} WE_{KL} &= \left(\sum_{I, J} w_{IJ} E_{IJ} \right) E_{KL} && (\because W \text{ の基底 } \mathcal{E} \text{ による展開}) \\ &= \sum_{I, J} w_{IJ} (E_{IJ} E_{KL}) && (\because \text{積の双線型性}) \\ &= \sum_{I, J} w_{IJ} \delta_{JK} E_{IL} && (\because \text{Step 2 の積公式}) \\ &= \sum_{I \in \{1, 2\}^M} w_{IK} E_{IL} && (\because \delta_{JK} \text{ は } J = K \text{ でのみ非零}) \end{aligned}$$

右辺は

$$\begin{aligned}
E_{KL}W &= E_{KL} \left(\sum_{I,J} w_{IJ} E_{IJ} \right) \quad (\because W \text{ の基底 } \mathcal{E} \text{ による展開}) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ} (E_{KL} E_{IJ}) \quad (\because \text{積の双線型性}) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ} \delta_{LI} E_{KJ} \quad (\because \text{Step 2 の積公式}) \\
&= \sum_{J \in \{1,2\}^M} w_{LJ} E_{KJ} \quad (\because \delta_{LI} \text{ は } I=L \text{ でのみ非零})
\end{aligned}$$

$\mathcal{E}$ は基底であるから両辺の係数は一致する。任意に $P, Q \in \{1, 2\}^M$ を固定し E_{PQ} の係数を比較する。

場合 1: $Q = L$ かつ $P = K$ のとき。左辺で E_{PL} の係数は $w_{PK} = w_{KK}$ 、右辺で E_{KQ} の係数は $w_{LQ} = w_{LL}$ であるから $w_{KK} = w_{LL}$ 。これは任意の K, L で成立するから対角係数は K によらない定数 $c := w_{KK}$ である。

場合 2: $K \neq L$ とし $P = K, Q = K$ のとき (E_{KK} の係数比較)。第 2 添字が $K \neq L$ なので左辺に E_{KK} は現れず係数は 0、右辺で E_{KK} の係数は w_{LK} であるから $w_{LK} = 0$ 。すなわち $I \neq J$ なる非対角係数 w_{IJ} はすべて 0。

Step 4: 結論。

$$\begin{aligned}
W &= \sum_{I,J \in \{1,2\}^M} w_{IJ} E_{IJ} \quad (\because \text{Step 3 の } W \text{ の基底 } \mathcal{E} \text{ による展開}) \\
&= \sum_{P \in \{1,2\}^M} w_{PP} E_{PP} \quad (\because \text{Step 3: 非対角係数は0}) \\
&= \sum_{P \in \{1,2\}^M} c E_{PP} \quad (\because \text{Step 3: 対角係数は共通の } c) \\
&= c \sum_{P \in \{1,2\}^M} E_{PP} \quad (\because \text{和のスカラー倍}) \\
&= c \cdot I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} = \sum_{P \in \{1,2\}^M} E_{PP})
\end{aligned}$$

□

定義 3.8 (数ベクトル・行列のノルムと収束). $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ 、 $d, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

$|\cdot|: K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ を、 $K = \mathbb{R}$ のときは実数の絶対値、 $K = \mathbb{C}$ のときは定義 1.40 の絶対値とする (主張 1.41 (6) より、 $\mathbb{R}$ を $\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}$ (定義 1.12) で $\mathbb{C}$ に埋め込んだとき両者は一致する)。

$w = (w_1, \dots, w_d) \in K^d$ のノルムを

$$\|w\| := \sqrt{\sum_{i=1}^d |w_i|^2} \quad (\mathbb{R}_{\geq 0}) \quad \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める。また $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \text{Mat}(n, K)$ のノルムを

$$\|A\| := \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2} \quad (\mathbb{R}_{\geq 0}) \quad \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める (いずれも根号の中は非負実数の有限和なので 定義 1.6 により定まる)。

$\text{Mat}(n, K)$ の列 $(A_N)_{N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ と $A \in \text{Mat}(n, K)$ について、

$$A_N \rightarrow A \stackrel{\text{def}}{\iff} \|A_N - A\| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty)$$

と定める（右辺は実数列 $(\|A_N - A\|)_N$ の 0 への収束）。このとき A を (A_N) の極限といい $A = \lim_{N \rightarrow \infty} A_N$ と書く。さらに $B_0, B_1, \dots \in \text{Mat}(n, K)$ について、部分和 $S_N := \sum_{m=0}^N B_m$ が S に収束するとき

$$\sum_{m=0}^{\infty} B_m := S$$

と書く。

K^d の列の収束も同様に $\|w_N - w\| \rightarrow 0$ で定める。

主張 3.9 (ノルムの基本性質 (非退化性・斉次性・三角不等式)). 定義 3.8 のノルムについて、 $A, B \in \text{Mat}(n, K)$ 、 $c \in K$ に対して次が成り立つ。

- (1) $\|A\| \geq 0$ であり、 $\|A\| = 0 \iff A = O$ (O は零行列)。
- (2) $\|cA\| = |c| \|A\|$ 。
- (3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ 。
- (4) 定義 3.8 の意味での極限は、存在すれば一意である。すなわち $A_N \rightarrow A$ かつ $A_N \rightarrow A'$ ならば $A = A'$ 。

K^d のノルムについても同じ 4 つが成り立つ（証明は成分の添字を 1 重にするだけで同一）。

証明. 以下、 $A = (a_{ij})$ 、 $B = (b_{ij})$ とおき、和は $1 \leq i, j \leq n$ の全体にわたるものとする。

Step 0: 補題（非負実数の平方の単調性）。 $u, v \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について

$$u \leq v \iff u^2 \leq v^2$$

が成り立つ。実際、 $u \leq v$ ならば

$$\begin{aligned} u^2 &= u \cdot u \quad (\because \text{平方の定義}) \\ &\leq v \cdot u \quad (\because u \leq v, u \geq 0) \\ &\leq v \cdot v \quad (\because u \leq v, v \geq 0) \\ &= v^2 \quad (\because \text{平方の定義}) \end{aligned}$$

である。逆に $u > v (\geq 0)$ ならば $u > 0$ であり、

$$\begin{aligned} u^2 &= u \cdot u \quad (\because \text{平方の定義}) \\ &> v \cdot u \quad (\because u > v, u > 0) \\ &\geq v \cdot v \quad (\because u > v, v \geq 0) \\ &= v^2 \quad (\because \text{平方の定義}) \end{aligned}$$

であるから、対偶により $u^2 \leq v^2 \Rightarrow u \leq v$ 。特に $u^2 = v^2 \Rightarrow u = v$ 。

Step 1: 絶対値の性質。 $z, w \in K$ について

$$|z| \geq 0, \quad |zw| = |z| |w|, \quad |z + w| \leq |z| + |w|, \quad (|z| = 0 \iff z = 0)$$

が成り立つ。 $K = \mathbb{C}$ のときは 主張 1.41 (3)(4)(5) と 定義 1.40 (値域が $\mathbb{R}_{\geq 0}$) による。 $K = \mathbb{R}$ のときは、定義 1.12 の $\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}$ が和と積を保つこと

$$\begin{aligned}
\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(x) + \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(y) &= (x, 0) + (y, 0) \quad (\because \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ の定め方}) \\
&= (x + y, 0) \quad (\because \text{複素数の和の定め方}) \\
&= \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(x + y) \quad (\because \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ の定め方})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(x) \cdot \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(y) &= (x, 0) \cdot (y, 0) \quad (\because \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ の定め方}) \\
&= (xy - 0 \cdot 0, x \cdot 0 + 0 \cdot y) \quad (\because \text{複素数の積の定め方}) \\
&= (xy, 0) \quad (\because 0 \text{ を掛けた項が消えること}) \\
&= \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(xy) \quad (\because \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ の定め方})
\end{aligned}$$

と主張 1.41 (6) を組み合わせて同じ 4 つの性質が従う。たとえば $x, y \in \mathbb{R}$ について $|x + y| = |\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(x + y)| = |\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(x) + \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(y)| \leq |\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(x)| + |\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(y)| = |x| + |y|$ であり、乗法性・非負性・非退化性も同様である。

Step 2: (1)。定義 1.6 より $\|A\| \geq 0$ 。また Step 0 より $\|A\| = 0$ と $\|A\|^2 = 0$ は同値であり、

$$\|A\|^2 = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2$$

は非負実数の有限和であるから、 $\|A\|^2 = 0$ と「すべての i, j について $|a_{ij}|^2 = 0$ 」は同値（非負数の有限和が 0 ならば各項が 0、逆も明らか）。Step 1 より $|a_{ij}| = 0 \iff a_{ij} = 0$ であるから $\|A\| = 0 \iff A = O$ 。

Step 3: (2)。Step 1 の乗法性より、

$$\begin{aligned}
\|cA\|^2 &= \sum_{i,j} |c a_{ij}|^2 \quad (\because \text{ノルムの定め方と } (cA)_{ij} = c a_{ij}) \\
&= \sum_{i,j} (|c| |a_{ij}|)^2 \quad (\because \text{Step 1 の乗法性 } |zw| = |z||w|) \\
&= \sum_{i,j} |c|^2 |a_{ij}|^2 \quad (\because \text{積の平方は平方の積}) \\
&= |c|^2 \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \quad (\because \text{有限和についての分配律}) \\
&= |c|^2 \|A\|^2 \quad (\because \text{ノルムの定め方}) \\
&= (|c| \|A\|)^2 \quad (\because \text{積の平方は平方の積})
\end{aligned}$$

$\|cA\| \geq 0$ かつ $|c| \|A\| \geq 0$ であるから Step 0 より $\|cA\| = |c| \|A\|$ 。

Step 4: 有限列に対する Cauchy-Schwarz の不等式。 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_m \in \mathbb{R}$ について

$$\left(\sum_{k=1}^m u_k v_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^m u_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^m v_k^2 \right)$$

が成り立つ。実際 $P := \sum_k u_k^2$, $Q := \sum_k v_k^2$, $R := \sum_k u_k v_k$ とおく。 $Q = 0$ のときは非負数の有限和が 0 であることから各 $v_k^2 = 0$ すなわち $v_k = 0$ となり $R = 0$ であるから $R^2 = 0 = PQ$ 。 $Q > 0$ のときは、任意の $t \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}
0 &\leq \sum_{k=1}^m (u_k - t v_k)^2 \quad (\because \text{実数の平方は非負であり、非負数の有限和は非負}) \\
&= \sum_{k=1}^m (u_k^2 - 2t u_k v_k + t^2 v_k^2) \quad (\because \text{分配律}) \\
&= P - 2tR + t^2 Q \quad (\because P, Q, R \text{ の置き方と有限和の分解})
\end{aligned}$$

であるから、 $t := R/Q$ とおくと

$$\begin{aligned}
0 &\leq P - 2\frac{R}{Q}R + \left(\frac{R}{Q}\right)^2 Q \quad (\because \text{上の不等式に } t = R/Q \text{ を代入した}) \\
&= P - 2\frac{R^2}{Q} + \frac{R^2}{Q} \quad (\because Q > 0 \text{ による約分}) \\
&= P - \frac{R^2}{Q} \quad (\because \text{同類項をまとめた})
\end{aligned}$$

となる。したがって

$$\begin{aligned}
R^2 &= \frac{R^2}{Q} \cdot Q \quad (\because Q > 0 \text{ と } \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\leq P \cdot Q \quad (\because \text{直前の } 0 \leq P - R^2/Q \text{ の移項による } R^2/Q \leq P \text{ と、両辺に正の数 } Q \text{ を掛けても順序が保たれること})
\end{aligned}$$

を得る。すなわち $R^2 \leq PQ$ 。

Step 5: (3)。Step 1 の三角不等式と Step 0 より、各 i, j について $|a_{ij} + b_{ij}| \leq |a_{ij}| + |b_{ij}|$ であり、両辺とも非負なので

$$\begin{aligned}
|a_{ij} + b_{ij}|^2 &\leq (|a_{ij}| + |b_{ij}|)^2 \quad (\because \text{Step 0 を } u = |a_{ij} + b_{ij}|, v = |a_{ij}| + |b_{ij}| \text{ に当てた}) \\
&= |a_{ij}|^2 + 2|a_{ij}||b_{ij}| + |b_{ij}|^2 \quad (\because \text{分配律})
\end{aligned}$$

これを i, j について加えると、

$$\begin{aligned}
\|A + B\|^2 &= \sum_{i,j} |a_{ij} + b_{ij}|^2 \quad (\because \text{ノルムの定め方と } (A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}) \\
&\leq \sum_{i,j} (|a_{ij}|^2 + 2|a_{ij}||b_{ij}| + |b_{ij}|^2) \quad (\because \text{上の各項ごとの不等式を } i, j \text{ について加えた}) \\
&= \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 + 2 \sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| + \sum_{i,j} |b_{ij}|^2 \quad (\because \text{有限和の分解と分配律}) \\
&= \|A\|^2 + 2 \sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| + \|B\|^2 \quad (\because \text{ノルムの定め方})
\end{aligned}$$

ここで Step 4 を $m = n^2$ 個の添字 (i, j) について $u_{(i,j)} = |a_{ij}|$, $v_{(i,j)} = |b_{ij}|$ として適用すると

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| \right)^2 &\leq \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \right) \left(\sum_{i,j} |b_{ij}|^2 \right) \quad (\because \text{Step 4}) \\
&= \|A\|^2 \|B\|^2 \quad (\because \text{ノルムの定め方}) \\
&= (\|A\| \|B\|)^2 \quad (\because \text{積の平方は平方の積})
\end{aligned}$$

である。また

$$\begin{aligned}
0 &\leq \sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| \quad (\because \text{非負実数の有限和は非負}) \\
0 &\leq \|A\| \|B\| \quad (\because \text{ノルムは非負であり、非負実数の積は非負}) \\
\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| &\leq \|A\| \|B\| \quad (\because \text{直前の平方の不等式と Step 0})
\end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}
\|A+B\|^2 &\leq \|A\|^2 + 2 \sum_{i,j} |a_{ij}| |b_{ij}| + \|B\|^2 \quad (\because \text{上の式変形}) \\
&\leq \|A\|^2 + 2\|A\| \|B\| + \|B\|^2 \quad (\because \sum_{i,j} |a_{ij}| |b_{ij}| \leq \|A\| \|B\|) \\
&= (\|A\| + \|B\|)^2 \quad (\because \text{分配律})
\end{aligned}$$

となり、両辺の平方根をとる (Step 0, $\|A+B\| \geq 0$, $\|A\| + \|B\| \geq 0$) ことで $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$ を得る。

Step 6: (4)。 $A_N \rightarrow A$ かつ $A_N \rightarrow A'$ とする。各 N について $A - A' = (A - A_N) + (A_N - A')$ であるから、Step 5 より

$$\begin{aligned}
0 &\leq \|A - A'\| \quad (\because (1)) \\
&\leq \|A - A_N\| + \|A_N - A'\| \quad (\because \text{Step 5 を } A - A' = (A - A_N) + (A_N - A') \text{ に当てた}) \\
&= \|A_N - A\| + \|A_N - A'\| \quad (\because A - A_N = (-1)(A_N - A) \text{ と Step 3 } (c = -1), \text{ および } |-1| = 1 (K = \mathbb{C} \text{ のときは主張 1.41 (6) より } |-1_{\mathbb{C}}| = |-1| = 1))
\end{aligned}$$

右辺は $N \rightarrow \infty$ で 0 に収束する実数列であり、左辺の $\|A - A'\|$ は N によらない定数である。非負の定数が 0 に収束する列で上から抑えられるならその定数は 0 であるから $\|A - A'\| = 0$ 、Step 2 より $A - A' = O$ すなわち $A = A'$ 。

Step 7: K^d の場合。上の Step 2・Step 3・Step 5・Step 6 で添字の組 (i, j) を単一の添字 i に置き換えれば、同じ議論がそのまま通用する。 $\square$

主張 3.10 (行列ノルムの劣乗法性). 行列積の成分式は 定義 1.8、非負実数の平方根は 定義 1.6 を用いる。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ 、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $A, B \in \text{Mat}(n, K)$ について、

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

ここで $\|\cdot\|$ は 定義 3.8 のノルムである。

証明. $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 、 $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ とおく。行列の積の定義より $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$ である。

Step 1: 有限和の三角不等式。 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $z_1, \dots, z_m \in K$ について

$$\left| \sum_{k=1}^m z_k \right| \leq \sum_{k=1}^m |z_k|$$

が成り立つ。 m に関する帰納法で示す。 $m = 1$ のときは両辺とも $|z_1|$ で等号成立。 m で成り立つと仮定すると、主張 3.9 の Step 1 (絶対値の三角不等式) より

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{k=1}^{m+1} z_k \right| &= \left| \left(\sum_{k=1}^m z_k \right) + z_{m+1} \right| \\
&\leq \left| \sum_{k=1}^m z_k \right| + |z_{m+1}| \quad (\because \text{主張 3.9 の Step 1}) \\
&\leq \sum_{k=1}^m |z_k| + |z_{m+1}| \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{k=1}^{m+1} |z_k| \quad (\because \text{有限和の末項の吸収})
\end{aligned}$$

Step 2: 各成分の評価。 $1 \leq i, j \leq n$ を固定する。Step 1 と絶対値の乗法性 (主張 3.9 の Step 1) より

$$\begin{aligned}
|(AB)_{ij}| &= \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right| \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\
&\leq \sum_{k=1}^n |a_{ik} b_{kj}| \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \quad (\because \text{絶対値の乗法性})
\end{aligned}$$

である。ここから、主張 3.9 の Step 0 (非負実数の平方の単調性) と Step 4 (Cauchy–Schwarz の不等式) により

$$\begin{aligned}
|(AB)_{ij}|^2 &\leq \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \right)^2 \quad (\because \text{直前の評価と主張 3.9 の Step 0}) \\
&\leq \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \quad (\because \text{主張 3.9 の Step 4 を } u_k = |a_{ik}|, v_k = |b_{kj}| \text{ として適用}) \\
&= \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{l=1}^n |b_{lj}|^2 \right) \quad (\because \text{第 2 因子の和の添字の付け替え})
\end{aligned}$$

Step 3: 全成分についての和。Step 2 の不等式を $1 \leq i, j \leq n$ について加えると、右辺の第 1 因子は i のみ、第 2 因子は j のみに依存するので二重和が積に分解して、

$$\begin{aligned}
\|AB\|^2 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |(AB)_{ij}|^2 \quad (\because \|\cdot\| \text{ の定義と } (\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})})^2 = a) \\
&\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{l=1}^n |b_{lj}|^2 \right) \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n |b_{lj}|^2 \right) \quad (\because \text{有限和の分配律}) \\
&= \|A\|^2 \|B\|^2 \quad (\because \|\cdot\| \text{ の定義と } (\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})})^2 = a) \\
&= (\|A\| \cdot \|B\|)^2 \quad (\because \text{非負実数の積の平方 } (xy)^2 = x^2 y^2)
\end{aligned}$$

Step 4: 結論。 $\|AB\| \geq 0$ かつ $\|A\| \cdot \|B\| \geq 0$ であるから、主張 3.9 の Step 0 より

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \quad (\because \text{主張 3.9 の Step 0 を Step 3 の平方の不等式へ適用})$$

□

主張 3.11 (行列ノルムによる数ベクトルの評価). 行列と数ベクトルの積は 定義 1.8、零成分の絶対値は 主張 3.9 の証明冒頭、積のノルムの評価は 主張 3.10 による。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ 、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $A \in \text{Mat}(n, K)$ 、 $w \in K^n$ について、

$$\|Aw\| \leq \|A\| \cdot \|w\|$$

ここで $\|\cdot\|$ は 定義 3.8 のノルム (左辺と右辺第 2 因子は K^n のノルム、右辺第 1 因子は $\text{Mat}(n, K)$ のノルム) である。

証明. $w = (w_1, \dots, w_n)$ に対し、第 1 列が w 、第 2 列以降が 0 である行列 $W \in \text{Mat}(n, K)$ を

$$W_{i1} := w_i \quad (1 \leq i \leq n), \quad W_{ij} := 0 \quad (1 \leq i \leq n, 2 \leq j \leq n)$$

で定める。第 1 列の成分は

$$\begin{aligned} (AW)_{i1} &= \sum_{k=1}^n a_{ik} W_{k1} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} w_k \quad (\because W \text{ の第 1 列の定め方}) \\ &= (Aw)_i \quad (\because \text{行列と数ベクトルの積の定義}) \end{aligned}$$

であり、 $2 \leq j \leq n$ について第 j 列の成分は

$$\begin{aligned} (AW)_{ij} &= \sum_{k=1}^n a_{ik} W_{kj} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot 0 \quad (\because W \text{ の第 2 列以降の定め方}) \\ &= 0 \quad (\because 0 \text{ を掛けた項だけの有限和は } 0) \end{aligned}$$

である。これを使って

$$\begin{aligned} \|AW\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |(AW)_{ij}|^2} \quad (\because \text{ノルムの定義。定義 3.8}) \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |(AW)_{i1}|^2} \quad (\because |0| = 0 \text{ (ノルムの基本性質の Step 1。主張 3.9) なので第 2 列以降は平方和に寄与しない}) \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |(Aw)_i|^2} \quad (\because \text{上の第 1 列の成分の等式}) \\ &= \|Aw\| \quad (\because \text{ノルムの定義。定義 3.8}) \end{aligned}$$

、および

$$\begin{aligned} \|W\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |W_{ij}|^2} \quad (\because \text{ノルムの定義。定義 3.8}) \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |W_{i1}|^2} \quad (\because |0| = 0 \text{ (ノルムの基本性質の Step 1。主張 3.9) なので第 2 列以降は平方和に寄与しない}) \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |w_i|^2} \quad (\because W \text{ の第 1 列の定め方}) \\ &= \|w\| \quad (\because \text{ノルムの定義。定義 3.8}) \end{aligned}$$

を得る。したがって

$$\begin{aligned} \|Aw\| &= \|AW\| \quad (\because \text{上の第 1 の等式}) \\ &\leq \|A\| \cdot \|W\| \quad (\because \text{行列ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\ &= \|A\| \cdot \|w\| \quad (\because \text{上の第 2 の等式}) \end{aligned}$$

である。 □

主張 3.12 ($\text{Mat}(n, K)$ の完備性と絶対収束判定). $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ 、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、ノルムと収束は定義 3.8 のものとする。

- (1) (完備性) $(A_N)_{N \geq 0}$ を $\text{Mat}(n, K)$ の列とし、Cauchy 列である、すなわち $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}, \exists N_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ s.t. $\forall N, M \geq N_0, \|A_N - A_M\| < \varepsilon$ とする。このとき $A \in \text{Mat}(n, K)$ が存在して $A_N \rightarrow A$ 。
- (2) (絶対収束判定) $B_0, B_1, \dots \in \text{Mat}(n, K)$ について実数列の級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$ が収束するならば $\sum_{m=0}^{\infty} B_m$ は $\text{Mat}(n, K)$ において収束し、 $\|\sum_{m=0}^{\infty} B_m\| \leq \sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$ 。

証明. Step 1: 成分はノルムで抑えられる。 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}(n, K)$ と $1 \leq i, j \leq n$ について

$$\begin{aligned} |a_{ij}|^2 &\leq \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n |a_{kl}|^2 \quad (\because \text{非負項の有限和は各項以上}) \\ &= \|A\|^2 \quad (\because \text{行列ノルムの定義}) \end{aligned}$$

であり、 $|a_{ij}| \geq 0$ 、 $\|A\| \geq 0$ であるから 主張 3.9 の Step 0 より次の一段を得る。

$$|a_{ij}| \leq \|A\| \quad (\because \text{直前の平方の評価と非負実数の平方の単調性})$$

Step 2: K の Cauchy 列は収束する。 $K = \mathbb{R}$ のときは $\mathbb{R}$ の完備性そのものである。 $K = \mathbb{C}$ のとき、 $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ について 主張 1.41 (2) より、次の一続きの評価を得る。

$$\begin{aligned} |z|^2 &= x^2 + y^2 \quad (\because \text{複素数の絶対値の平方}) \\ &\geq x^2 \quad (\because y^2 \geq 0) \\ &= |x|^2 \quad (\because \text{実数の絶対値の定義}) \end{aligned}$$

最後の等号は実数の絶対値の定義 $|x| \in \{x, -x\}$ による。主張 3.9 の Step 0 より $|x| \leq |z|$ 、同様に $|y| \leq |z|$ 。主張 1.35 より $\mathbb{C}$ の加法とその逆元は成分ごとである。いま示した評価を $z = z_N - z_M$ に適用すると

$$\begin{aligned} z_N - z_M &= (x_N - x_M, y_N - y_M) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の減法は成分ごと}) \\ |x_N - x_M| &\leq |z_N - z_M| \quad (\because \text{直前の第 1 成分の評価}) \\ |y_N - y_M| &\leq |z_N - z_M| \quad (\because \text{同じ評価の第 2 成分版}) \end{aligned}$$

よって $\mathbb{C}$ の Cauchy 列 $(z_N) = ((x_N, y_N))$ に対して $(x_N), (y_N)$ は $\mathbb{R}$ の Cauchy 列であり、 $\mathbb{R}$ の完備性より $x_N \rightarrow x$ 、 $y_N \rightarrow y$ なる $x, y \in \mathbb{R}$ が存在する。このとき 主張 1.41 (2) より

$$\begin{aligned} |z_N - (x, y)|^2 &= (x_N - x)^2 + (y_N - y)^2 \quad (\because \text{複素数の絶対値の平方}) \\ &\rightarrow 0 \quad (\because x_N \rightarrow x \text{ と } y_N \rightarrow y) \end{aligned}$$

であるから $|z_N - (x, y)| \rightarrow 0$ (非負実数について $u_N^2 \rightarrow 0 \Rightarrow u_N \rightarrow 0$ 。実際 $\varepsilon > 0$ に対し $u_N^2 < \varepsilon^2$ なる N 以降で 主張 3.9 の Step 0 より $u_N < \varepsilon$)。

Step 3: (1) の証明。 (A_N) を Cauchy 列とすると、Step 1 より各成分について

$$\begin{aligned} |(A_N)_{ij} - (A_M)_{ij}| &= |(A_N - A_M)_{ij}| \quad (\because \text{行列の差は成分ごとである}) \\ &\leq \|A_N - A_M\| \quad (\because \text{Step 1}) \end{aligned}$$

であるから、 $((A_N)_{ij})_N$ は K の Cauchy 列である。Step 2 よりその極限 $a_{ij} \in K$ が存在する。 $A := (a_{ij}) \in \text{Mat}(n, K)$ とおくと

$$\begin{aligned} \|A_N - A\|^2 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |(A_N)_{ij} - a_{ij}|^2 \quad (\because \text{行列ノルムの定義}) \\ &\rightarrow 0 \quad (\because \text{有限個の 0 に収束する実数列の和}) \end{aligned}$$

であり、Step 2 末尾と同じ理由で $\|A_N - A\| \rightarrow 0$ 、すなわち $A_N \rightarrow A$ 。

Step 4: (2) の証明。 $S_N := \sum_{m=0}^N B_m$ 、 $T_N := \sum_{m=0}^N \|B_m\|$ とおく。仮定より (T_N) は収束するので Cauchy 列である。 $N > M$ のとき 主張 3.9 (3) を繰り返し用いて

$$\begin{aligned}\|S_N - S_M\| &= \left\| \sum_{m=M+1}^N B_m \right\| \quad (\because S_N \text{ と } S_M \text{ の定義と、有限和の差}) \\ &\leq \sum_{m=M+1}^N \|B_m\| \quad (\because \text{行列ノルムの三角不等式を繰り返し用いる}) \\ &= T_N - T_M \quad (\because T_N \text{ と } T_M \text{ の定義と、有限和の差})\end{aligned}$$

であるから (S_N) は Cauchy 列であり、(1) より $S := \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ が存在する。すなわち $\sum_{m=0}^{\infty} B_m = S$ 。

Step 5: ノルムの評価。主張 3.9 (3) より

$$\begin{aligned}\|S_N\| &\leq T_N \quad (\because \text{行列ノルムの三角不等式を有限回適用}) \\ &\leq T \quad (\because \text{非負項の級数の部分和はその極限以下})\end{aligned}$$

ここで $T := \sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$ である。 (T_N) は非負項の級数の部分和なので単調非減少であり $T_N \leq T$ 。また 主張 3.9 (3) より

$$\begin{aligned}\|S\| &\leq \|S - S_N\| + \|S_N\| \quad (\because S = (S - S_N) + S_N \text{ と行列ノルムの三角不等式}) \\ &\leq \|S - S_N\| + T \quad (\because \|S_N\| \leq T)\end{aligned}$$

であり、右辺第 1 項は $N \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。 $\|S\|$ は N によらない定数であるから $\|S\| \leq T$ 。 $\square$

主張 3.13 (行列乗算の連続性). ノルムと収束は 定義 3.8、行列積は 定義 1.8、積のノルムの評価は 主張 3.10 による。 $(A_N)_{N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ は以下の行列空間の列とする。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ 、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $A_N, A, B \in \text{Mat}(n, K)$ 、 $\|A_N - A\| \rightarrow 0$ のとき、

$$\|A_N B - AB\| \rightarrow 0$$

証明.

$$\begin{aligned}\|A_N B - AB\| &= \|(A_N - A)B\| \quad (\because \text{行列の積の右分配則}) \\ &\leq \|A_N - A\| \cdot \|B\| \quad (\because \text{行列ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\ &\rightarrow 0 \quad (\because \|A_N - A\| \rightarrow 0 \text{ と、収束する実数列に定数を掛けた列の極限})\end{aligned}$$

$\square$

4 線型写像の exp

主張 4.1 (非負実数の指数級数の収束). $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とし、 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$E_N(a) := \sum_{m=0}^N \frac{a^m}{m!} \quad (a^0 := 1, 0! := 1)$$

とおく。このとき次が成り立つ。

- (1) $(E_N(a))_{N \geq 0}$ は単調非減少かつ上に有界であり、収束する。その極限を $E(a) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{a^m}{m!}$ と書く。

- (2) すべての N について $E_N(a) \leq E(a)$ 。
- (3) 剰余 $R_N(a) := E(a) - E_N(a)$ は非負であり $R_N(a) \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$)。さらに $p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $p \leq q$ について $\sum_{m=p}^q \frac{a^m}{m!} \leq R_{p-1}(a)$ 。

証明. Step 1: 単調非減少性。 $a \geq 0$ より各項 $a^m/m! \geq 0$ であるから

$$E_{N+1}(a) - E_N(a) = \frac{a^{N+1}}{(N+1)!} \geq 0$$

Step 2: 上に有界であること。Archimedes の原理より $m_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $m_0 \geq 2a$ を満たすものがとれる。 $m \geq m_0$ のとき $m+1 > m_0 \geq 2a$ すなわち $a/(m+1) \leq 1/2$ であるから

$$\begin{aligned} \frac{a^{m+1}}{(m+1)!} &= \frac{a}{m+1} \cdot \frac{a^m}{m!} \quad (\because (m+1)! = (m+1) \cdot m!) \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot \frac{a^m}{m!} \quad (\because a/(m+1) \leq 1/2 \text{ と } a^m/m! \geq 0) \end{aligned}$$

これを k に関する帰納法で繰り返すと $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\frac{a^{m_0+k}}{(m_0+k)!} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^k \frac{a^{m_0}}{m_0!}$$

($k=0$ は等号。 k から $k+1$ へは上の不等式を $m = m_0 + k$ ($\geq m_0$) に適用する。) よって $N \geq m_0$ のとき等比数列の和の公式より

$$\begin{aligned} \sum_{m=m_0}^N \frac{a^m}{m!} &\leq \frac{a^{m_0}}{m_0!} \sum_{k=0}^{N-m_0} \left(\frac{1}{2}\right)^k \quad (\because \text{各項へ直前の評価 } a^{m_0+k}/(m_0+k)! \leq (1/2)^k a^{m_0}/m_0! \text{ を適用した}) \\ &= \frac{a^{m_0}}{m_0!} \left(2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{N-m_0}\right) \quad (\because \text{等比数列の和の公式}) \\ &\leq \frac{2a^{m_0}}{m_0!} \quad (\because (1/2)^{N-m_0} \geq 0) \end{aligned}$$

したがって $N \geq m_0$ について $E_N(a) \leq E_{m_0-1}(a) + \frac{2a^{m_0}}{m_0!} =: C$ 。 $N < m_0$ のときは Step 1 より $E_N(a) \leq E_{m_0-1}(a) \leq C$ 。 よって $(E_N(a))$ は C で上に有界である。

Step 3: (1)。単調非減少かつ上に有界な実数列は収束する ($\mathbb{R}$ の連続性、すなわち上に有界な集合が上限をもつことによる)。 よって $E(a) := \lim_{N \rightarrow \infty} E_N(a)$ が存在する。

Step 4: (2)。単調非減少な収束列の極限はその上限であるから、すべての N について $E_N(a) \leq E(a)$ 。

Step 5: (3)。 (2) より $R_N(a) = E(a) - E_N(a) \geq 0$ であり、 $E_N(a) \rightarrow E(a)$ より $R_N(a) \rightarrow 0$ 。 また $1 \leq p \leq q$ について

$$\begin{aligned} \sum_{m=p}^q \frac{a^m}{m!} &= E_q(a) - E_{p-1}(a) \quad (\because E_N(a) = \sum_{m=0}^N a^m/m! \text{ の差}) \\ &\leq E(a) - E_{p-1}(a) \quad (\because (2)) \\ &= R_{p-1}(a) \quad (\because R_N(a) = E(a) - E_N(a) \text{ の定義}) \end{aligned}$$

□

主張 4.2 (行列の $\exp$ 級数はノルム収束する)。行列積は 定義 1.8、実数係数を複素数として使うときの包含は 定義 1.12 による。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ 、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $A \in \text{Mat}(n, K)$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。 $A^0 := I$ (単位行列) とおき

$$S_N(A) := \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} A^m \in \text{Mat}(n, K)$$

とおくと、次が成り立つ。

- (1) $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m := \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(A)$ は $\text{Mat}(n, K)$ において存在する。
- (2) $M_A := \|I\| + E(\|A\|)$ (E は 主張 4.1 の極限) とおくと、すべての N について $\|S_N(A)\| \leq M_A$ であり、 $\|\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m\| \leq M_A$ 。

証明. Step 1: $m \geq 1$ について $\|A^m\| \leq \|A\|^m$ 。 m に関する帰納法で示す。 $m = 1$ のときは等号。 m で成り立つとすると 主張 3.10 より

$$\begin{aligned} \|A^{m+1}\| &= \|A^m A\| & (\because A^{m+1} = A^m A) \\ &\leq \|A^m\| \cdot \|A\| & (\because \text{ノルムの劣乗法性}) \\ &\leq \|A\|^m \cdot \|A\| & (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= \|A\|^{m+1} & (\because \text{冪の定義}) \end{aligned}$$

Step 2: 実数級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \left\| \frac{1}{m!} A^m \right\|$ の収束。 主張 3.9 (2) より $\left\| \frac{1}{m!} A^m \right\| = \frac{1}{m!} \|A^m\|$ ($1/m! > 0$ なので $|1/m!| = 1/m!$) であるから、Step 1 より

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^N \left\| \frac{1}{m!} A^m \right\| &= \|I\| + \sum_{m=1}^N \frac{\|A^m\|}{m!} & (\because m=0 \text{ の項は } \|A^0\| = \|I\|, \text{ 他の項は上の等式}) \\ &\leq \|I\| + \sum_{m=1}^N \frac{\|A\|^m}{m!} & (\because \text{Step 1}) \\ &\leq \|I\| + E(\|A\|) & (\because \text{非負実数の指数級数の収束(2)}) \\ &= M_A & (\because M_A \text{ の定義}) \end{aligned}$$

(第 3 行の不等号は 主張 4.1 (2) による。) この実数級数は非負項なので部分和は単調非減少であり、いま M_A で上に有界であるから収束する ($\mathbb{R}$ の連続性)。

Step 3: (1)。 Step 2 と 主張 3.12 (2) (絶対収束判定) より $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m$ は $\text{Mat}(n, K)$ において収束する。

Step 4: (2)。 有限和については

$$\begin{aligned} \|S_N(A)\| &\leq \sum_{m=0}^N \left\| \frac{1}{m!} A^m \right\| & (\because \text{ノルムの三角不等式(3) を繰り返し用いる}) \\ &\leq M_A & (\because \text{Step 2 の評価}) \end{aligned}$$

である。 無限和については

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m \right\| &\leq \sum_{m=0}^{\infty} \left\| \frac{1}{m!} A^m \right\| & (\because \text{Mat}(n, K) \text{ の完備性と絶対収束判定(2) の後半}) \\ &\leq M_A & (\because \text{Step 2 の評価}) \end{aligned}$$

である (引いたブロックは 主張 3.9 と 主張 3.12)。

□

定理 4.3 (exp 級数の各点収束 (数ベクトルへの作用・成分・行列への線型写像)). 行列と数ベクトルの積は 定義 1.8、非負実数の平方根は 定義 1.6、実数係数の複素数への包含は 定義 1.12 による。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ 、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。

(1) $A \in \text{Mat}(n, K)$ とし、

$$S_N := \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} A^m \in \text{Mat}(n, K), \quad S := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m \in \text{Mat}(n, K)$$

とおく (S の存在は 主張 4.2 (1) による)。このとき次が成り立つ。

- (1a) (数ベクトルへの作用の各点収束) すべての $v \in K^n$ について $S_N v \rightarrow S v$ が K^n において成り立つ。
- (1b) (成分ごとの収束) すべての $i, j \in \{1, \dots, n\}$ について $(S_N)_{ij} \rightarrow S_{ij}$ 、すなわち $|(S_N)_{ij} - S_{ij}| \rightarrow 0$ 。

(2) $\Phi : \text{Mat}(n, K) \rightarrow \text{Mat}(n, K)$ を K -線型写像とする。すなわち $Y, Z \in \text{Mat}(n, K)$ 、 $c \in K$ について $\Phi(Y + Z) = \Phi(Y) + \Phi(Z)$ かつ $\Phi(cY) = c\Phi(Y)$ が成り立つとする。 $k, l \in \{1, \dots, n\}$ について行列単位 $E^{(k,l)} \in \text{Mat}(n, K)$ を

$$\left(E^{(k,l)}\right)_{ij} := \begin{cases} 1 & ((i, j) = (k, l)) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

で定め、

$$c_\Phi := \sqrt{\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \|\Phi(E^{(k,l)})\|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

とおく。また $\Phi^0 := \text{id}_{\text{Mat}(n, K)}$ 、 $\Phi^{m+1} := \Phi \circ \Phi^m$ ($m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) とおく。このとき次が成り立つ。

- (2a) すべての $Y \in \text{Mat}(n, K)$ について $\|\Phi(Y)\| \leq c_\Phi \|Y\|$ 。
- (2b) すべての $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について Φ^m は K -線型であり、 $\|\Phi^m(Y)\| \leq c_\Phi^m \|Y\|$ ($c_\Phi^0 := 1$)。
- (2c) (各点収束) すべての $Y \in \text{Mat}(n, K)$ について、部分和 $T_N(Y) := \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} \Phi^m(Y)$ は $\text{Mat}(n, K)$ において収束する。その極限を $T(Y) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \Phi^m(Y)$ と書く。
- (2d) $T : \text{Mat}(n, K) \rightarrow \text{Mat}(n, K)$ は K -線型写像である。

証明. 以下、 $\|\cdot\|$ と収束は 定義 3.8 のもの (K^n と $\text{Mat}(n, K)$ の成分の平方和の平方根) である。

Step 1: 成分の絶対値はノルム以下である。 $B = (b_{ij}) \in \text{Mat}(n, K)$ と $i, j \in \{1, \dots, n\}$ について、定義 3.8 の定義に現れる平方和は非負項の有限和であり $|b_{ij}|^2$ はその項の 1 つであるから

$$\begin{aligned} |b_{ij}|^2 &\leq \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n |b_{kl}|^2 \quad (\because \text{非負項の有限和は各項以上である}) \\ &= \|B\|^2 \quad (\because \text{ノルムの定義と } \left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = a) \end{aligned}$$

$|b_{ij}| \geq 0$ かつ $\|B\| \geq 0$ であるから 主張 3.9 の Step 0 (非負実数の平方の単調性) より

$$|b_{ij}| \leq \|B\| \quad (i, j \in \{1, \dots, n\})$$

Step 2: (1b)。主張 4.2 (1) と 定義 3.8 の収束の定義より $\|S_N - S\| \rightarrow 0$ 。行列の差は成分ごとの差であるから $(S_N - S)_{ij} = (S_N)_{ij} - S_{ij}$ であり、Step 1 を $B = S_N - S$ に適用して

$$\begin{aligned} 0 &\leq |(S_N)_{ij} - S_{ij}| \quad (\because \text{絶対値は非負である}) \\ &= |(S_N - S)_{ij}| \quad (\because \text{行列の差は成分ごとの差である}) \\ &\leq \|S_N - S\| \quad (\because \text{Step 1 を } B = S_N - S \text{ に適用する}) \end{aligned}$$

右辺は 0 に収束するから $|(S_N)_{ij} - S_{ij}| \rightarrow 0$ 。

Step 3: (1a)。 $v \in K^n$ を固定する。行列と数ベクトルの積は分配律を満たすから $S_N v - S v = (S_N - S)v$ であり、主張 3.11 より

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|S_N v - S v\| \quad (\because \text{ノルムは非負である}) \\ &= \|(S_N - S)v\| \quad (\because \text{行列と数ベクトルの積の分配律}) \\ &\leq \|S_N - S\| \cdot \|v\| \quad (\because \text{行列のノルムによる数ベクトルの評価}) \end{aligned}$$

$\|v\|$ は N によらない非負定数であり、Step 2 より $\|S_N - S\| \rightarrow 0$ であるから右辺は 0 に収束する。よって $\|S_N v - S v\| \rightarrow 0$ すなわち $S_N v \rightarrow S v$ 。

Step 4: 行列単位による展開。 $Y = (y_{kl}) \in \text{Mat}(n, K)$ について

$$Y = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n y_{kl} E^{(k,l)}$$

が成り立つ。実際、行列の和とスカラー倍は成分ごとに定まるので右辺の (i, j) 成分は $\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n y_{kl} (E^{(k,l)})_{ij}$ であり、 $E^{(k,l)}$ の定義よりこの和では $(k, l) = (i, j)$ の項が $y_{ij} \cdot 1 = y_{ij}$ 、他の項は $y_{kl} \cdot 0 = 0$ であるから、和は y_{ij} に等しい。また 定義 3.8 より

$$\begin{aligned} \|E^{(k,l)}\| &= \sqrt{1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \text{行列ノルムの定義と } E^{(k,l)} \text{ の成分の定義}) \\ &= 1 \quad (\because \mathbb{R}_{\geq 0} \text{ における } 1 \text{ の非負平方根}). \end{aligned}$$

Step 5: (2a)。 Φ の線型性を Step 4 の有限和に繰り返し適用すると（項数に関する帰納法）

$$\Phi(Y) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n y_{kl} \Phi(E^{(k,l)})$$

主張 3.9 (3) を有限個の項に繰り返し使い、続いて同 (2) を用いると

$$\begin{aligned} \|\Phi(Y)\| &= \left\| \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n y_{kl} \Phi(E^{(k,l)}) \right\| \quad (\because \text{直前の等式}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \left\| y_{kl} \Phi(E^{(k,l)}) \right\| \quad (\because \text{三角不等式を有限個の項に繰り返し用いる}) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n |y_{kl}| \left\| \Phi(E^{(k,l)}) \right\| \quad (\because \text{スカラー倍のノルム}) \end{aligned}$$

この二重和に Cauchy–Schwarz の不等式を適用する。全単射

$$\sigma: \{1, \dots, n\}^2 \rightarrow \{1, \dots, n^2\}, \quad \sigma(k, l) := (k-1)n + l$$

により二重和を 1 重の和へ書き換え（有限和の項の並べ替え）、主張 3.9 の Step 4（有限列に対する Cauchy–Schwarz の不等式）を $u_{\sigma(k,l)} := |y_{kl}|$ 、 $v_{\sigma(k,l)} := \|\Phi(E^{(k,l)})\|$ に適用すると

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n |y_{kl}| \left\| \Phi(E^{(k,l)}) \right\| \right)^2 &\leq \left(\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n |y_{kl}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \left\| \Phi(E^{(k,l)}) \right\|^2 \right) \quad (\because \text{有限列に対する Cauchy-Schwarz の不等式}) \\
&= \|Y\|^2 c_\Phi^2 \quad (\because \left(\sqrt{a}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \right)^2 = a \text{ を両方の和に用いる}) \\
&= (c_\Phi \|Y\|)^2 \quad (\because \text{非負実数の積の平方})
\end{aligned}$$

左辺の平方の中身 $\sum_{k,l} |y_{kl}| \left\| \Phi(E^{(k,l)}) \right\|$ と $c_\Phi \|Y\|$ はともに非負であるから、主張 3.9 の Step 0 より

$$\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n |y_{kl}| \left\| \Phi(E^{(k,l)}) \right\| \leq c_\Phi \|Y\|$$

以上を合わせて $\|\Phi(Y)\| \leq c_\Phi \|Y\|$ 。

Step 6: (2b)。 m に関する帰納法で示す。 $m = 0$ のとき $\Phi^0 = \text{id}_{\text{Mat}(n,K)}$ は線型である。ノルムについては

$$\begin{aligned}
\|\Phi^0(Y)\| &= \|Y\| \quad (\because \Phi^0 = \text{id}_{\text{Mat}(n,K)}) \\
&= c_\Phi^0 \|Y\| \quad (\because \text{非負実数の零乗は1})
\end{aligned}$$

m で成り立つとすると、 $Y, Z \in \text{Mat}(n, K)$ 、 $c \in K$ について

$$\begin{aligned}
\Phi^{m+1}(Y+Z) &= \Phi(\Phi^m(Y+Z)) & (\because \Phi^{m+1} = \Phi \circ \Phi^m) \\
&= \Phi(\Phi^m(Y) + \Phi^m(Z)) & (\because \Phi^m \text{ の線型性}) \\
&= \Phi(\Phi^m(Y)) + \Phi(\Phi^m(Z)) & (\because \Phi \text{ の線型性}) \\
&= \Phi^{m+1}(Y) + \Phi^{m+1}(Z) & (\because \Phi^{m+1} = \Phi \circ \Phi^m) \\
\Phi^{m+1}(cY) &= \Phi(\Phi^m(cY)) & (\because \Phi^{m+1} = \Phi \circ \Phi^m) \\
&= \Phi(c \Phi^m(Y)) & (\because \Phi^m \text{ の線型性}) \\
&= c \Phi(\Phi^m(Y)) & (\because \Phi \text{ の線型性}) \\
&= c \Phi^{m+1}(Y) & (\because \Phi^{m+1} = \Phi \circ \Phi^m)
\end{aligned}$$

であるから Φ^{m+1} は K -線型。ノルムについては Step 5 と帰納法の仮定より

$$\begin{aligned}
\|\Phi^{m+1}(Y)\| &= \|\Phi(\Phi^m(Y))\| \quad (\because \Phi^{m+1} = \Phi \circ \Phi^m) \\
&\leq c_\Phi \|\Phi^m(Y)\| \quad (\because \text{Step 5 を } Y = \Phi^m(Y) \text{ に適用する}) \\
&\leq c_\Phi \cdot c_\Phi^m \|Y\| \quad (\because \text{帰納法の仮定と } c_\Phi \geq 0) \\
&= c_\Phi^{m+1} \|Y\| \quad (\because \text{非負実数の冪の指数法則})
\end{aligned}$$

Step 7: (2c)。 $Y \in \text{Mat}(n, K)$ を固定する。主張 3.9 (2) ($1/m! > 0$ なので $|1/m!| = 1/m!$) と (2b) より

$$\begin{aligned}
\sum_{m=0}^N \left\| \frac{1}{m!} \Phi^m(Y) \right\| &= \sum_{m=0}^N \frac{\|\Phi^m(Y)\|}{m!} \quad (\because \text{スカラー倍のノルムと } |1/m!| = 1/m!) \\
&\leq \|Y\| \sum_{m=0}^N \frac{c_\Phi^m}{m!} \quad (\because (2b) \text{ を各項に適用する}) \\
&\leq \|Y\| E(c_\Phi) \quad (\because \text{非負実数の指数級数の部分和の上界を } a = c_\Phi \text{ に適用し、 } \|Y\| \geq 0)
\end{aligned}$$

(最後の不等号で引いたのは 主張 4.1 (2) である)。左辺は非負項の実数級数の部分和なので単調非減少であり、いま $\|Y\| E(c_\Phi)$ で上に有界であるから収束する ($\mathbb{R}$ の連続性)。よって 主

張 3.12 (2) (絶対収束判定) より $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \Phi^m(Y)$ は $\text{Mat}(n, K)$ において収束する。極限が一意であることは 主張 3.9 (4) による。

Step 8: (2d)。まず T_N は線型である。実際 (2b) より各 Φ^m は線型であり、行列の和とスカラー倍の性質から $T_N(Y + Z) = T_N(Y) + T_N(Z)$ 、 $T_N(cY) = cT_N(Y)$ が成り立つ (有限和なので項ごとに確かめればよい)。

$Y, Z \in \text{Mat}(n, K)$ について、 T_N の線型性と 主張 3.9 (3) より

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|T_N(Y + Z) - (T(Y) + T(Z))\| && (\because \text{ノルムは非負である}) \\ &= \|(T_N(Y) - T(Y)) + (T_N(Z) - T(Z))\| && (\because T_N \text{ の線型性}) \\ &\leq \|T_N(Y) - T(Y)\| + \|T_N(Z) - T(Z)\| && (\because \text{三角不等式}) \end{aligned}$$

右辺は Step 7 ($T_N(Y) \rightarrow T(Y)$ と $T_N(Z) \rightarrow T(Z)$) より 0 に収束するから $T_N(Y + Z) \rightarrow T(Y) + T(Z)$ 。一方、 T の定義より $T_N(Y + Z) \rightarrow T(Y + Z)$ であるから、主張 3.9 (4) (極限の一意性) より $T(Y + Z) = T(Y) + T(Z)$ 。

同様に $c \in K$ について、 T_N の線型性と 主張 3.9 (2) より

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|T_N(cY) - cT(Y)\| && (\because \text{ノルムは非負である}) \\ &= \|c(T_N(Y) - T(Y))\| && (\because T_N \text{ の線型性}) \\ &= |c| \cdot \|T_N(Y) - T(Y)\| && (\because \text{スカラー倍のノルム}) \end{aligned}$$

であり、右辺は Step 7 より 0 に収束する。よって $T_N(cY) \rightarrow cT(Y)$ であり、 $T_N(cY) \rightarrow T(cY)$ と極限の一意性より $T(cY) = cT(Y)$ 。したがって T は K -線型写像である。 $\square$

定義 4.4 ($\exp$ の定義 (行列の場合と、行列への線型写像の場合)). 行列の積は 定義 1.8、実数係数の複素数への包含は 定義 1.12 を用いる。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ 、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。

(1) (行列の $\exp$) $A \in \text{Mat}(n, K)$ について、 $A^0 := I$ (単位行列)、 $A^{m+1} := A^m A$ とおき

$$\exp(A) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} A^m \in \text{Mat}(n, K)$$

と定める。この極限は 主張 4.2 (1) により存在し、主張 3.9 (4) により一意である。これにより写像 $\exp : \text{Mat}(n, K) \rightarrow \text{Mat}(n, K)$ が定まる。

(2) (行列への線型写像の $\exp$) $\Phi : \text{Mat}(n, K) \rightarrow \text{Mat}(n, K)$ を K -線型写像とし、 $\Phi^0 := \text{id}_{\text{Mat}(n, K)}$ 、 $\Phi^{m+1} := \Phi \circ \Phi^m$ とおく。写像 $\exp(\Phi) : \text{Mat}(n, K) \rightarrow \text{Mat}(n, K)$ を

$$(\exp(\Phi))(Y) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \Phi^m(Y) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} \Phi^m(Y) \quad (Y \in \text{Mat}(n, K))$$

で定める。各 Y についてこの極限が存在すること (各点収束) は 定理 4.3 (2c) により、一意であることは 主張 3.9 (4) による。また 定理 4.3 (2d) より $\exp(\Phi)$ は K -線型写像である。

定理 4.5 (可換行列の $\exp$ 積公式). 行列積は 定義 1.8、成分の演算は 主張 1.35、実数係数の包含は 定義 1.12、非負平方根は 定義 1.6 による。二項係数と Pascal の関係式は 定理 6.4 の定義と証明の準備で述べたものを使う。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ 、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$

$A, B \in \text{Mat}(n, K)$ が $AB = BA$ を満たすとき、

$$\exp(A) \exp(B) = \exp(A + B)$$

証明. 以下、定義 4.4 (1) の $\exp$ を

$$\exp(A) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m \in \text{Mat}(n, K)$$

(定義 3.8 の意味での収束) として扱う。この級数が収束することは 主張 4.2 による。記号を

$$S_N := \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} A^m, \quad T_N := \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} B^m, \quad C_N := \sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} (A+B)^k$$

と定め、 $a := \|A\|$, $b := \|B\| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とおく。

Step 1: A は B の冪と可換である。すなわち $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $AB^m = B^m A$ 。 m に関する帰納法で示す。 $m = 0$ のときは

$$\begin{aligned} AI &= A \quad (\because I \text{ は単位行列である}) \\ &= IA \quad (\because I \text{ は単位行列である}) \end{aligned}$$

m で成り立つとすると、

$$\begin{aligned} AB^{m+1} &= (AB^m)B \quad (\because B^{m+1} = B^m B \text{ と積の結合律}) \\ &= (B^m A)B \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= B^m (AB) \quad (\because \text{積の結合律}) \\ &= B^m (BA) \quad (\because AB = BA) \\ &= B^{m+1} A \quad (\because \text{積の結合律と } B^m B = B^{m+1}) \end{aligned}$$

Step 2: 二項定理。 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$(A+B)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^j B^{k-j}$$

を k に関する帰納法で示す。 $k = 0$ のときは両辺とも I 。 k で成り立つとすると、

$$\begin{aligned} (A+B)^{k+1} &= (A+B)^k (A+B) \quad (\because \text{冪の定義}) \\ &= \left(\sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^j B^{k-j} \right) (A+B) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^j B^{k-j} A + \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^j B^{k-j} B \quad (\because \text{積の分配律}) \\ &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^{j+1} B^{k-j} + \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^j B^{k-j+1} \quad (\because \text{Step 1 を第 1 和の各項へ当てる}) \\ &= \sum_{j=1}^{k+1} \binom{k}{j-1} A^j B^{k+1-j} + \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^j B^{k+1-j} \quad (\because \text{第 1 和で } j \rightarrow j-1 \text{ と添字を付け替えた}) \\ &= \sum_{j=0}^{k+1} \left(\binom{k}{j-1} + \binom{k}{j} \right) A^j B^{k+1-j} \quad \left(\because \binom{k}{-1} := 0, \binom{k}{k+1} := 0 \text{ として和をまとめた} \right) \\ &= \sum_{j=0}^{k+1} \binom{k+1}{j} A^j B^{k+1-j} \quad (\because \text{Pascal の関係式}) \end{aligned}$$

Step 3: 部分和の書き換え。 $\binom{k}{j} \frac{1}{k!} = \frac{1}{j! (k-j)!}$ であるから、Step 2 より

$$\begin{aligned} C_N &= \sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^j B^{k-j} \quad (\because \text{Step 2 を各 } k \text{ へ当てる}) \\ &= \sum_{k=0}^N \sum_{j=0}^k \frac{1}{j! (k-j)!} A^j B^{k-j} \quad \left(\because \binom{k}{j} \frac{1}{k!} = \frac{1}{j! (k-j)!} \right) \\ &= \sum_{(j,l) \in D_N} \frac{1}{j! l!} A^j B^l \quad (\because l := k-j \text{ と置くと添字は } D_N := \{(j,l) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 \mid j+l \leq N\} \text{ を走る}) \end{aligned}$$

一方、有限和の積を展開して

$$\begin{aligned} S_N T_N &= \left(\sum_{j=0}^N \frac{1}{j!} A^j \right) \left(\sum_{l=0}^N \frac{1}{l!} B^l \right) \quad (\because S_N, T_N \text{ の置き方}) \\ &= \sum_{(j,l) \in Q_N} \frac{1}{j! l!} A^j B^l \quad (\because \text{積の分配律。添字は } Q_N := \{0, 1, \dots, N\}^2 \text{ を走る}) \end{aligned}$$

$(j, l) \in D_N$ ならば $j \leq j+l \leq N$ かつ $l \leq N$ であるから $D_N \subseteq Q_N$ 。よって

$$S_N T_N - C_N = \sum_{(j,l) \in Q_N \setminus D_N} \frac{1}{j! l!} A^j B^l$$

Step 4: 各項のノルム評価。 $\|I\| \geq 1$ である (定義 3.8 より $\|I\| = \sqrt{n}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ であり $n \geq 1$)。主張 4.2 の Step 1 より $j \geq 1$ で $\|A^j\| \leq a^j$ 、 $j = 0$ では $\|A^0\| = \|I\|$ であるから、いずれの場合も

$$\|A^j\| \leq \|I\| a^j \quad (j \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

B についても同様。よって 主張 3.10 と 主張 3.9 (2) より

$$\begin{aligned} \left\| \frac{1}{j! l!} A^j B^l \right\| &= \frac{\|A^j B^l\|}{j! l!} \quad (\because \text{ノルムのスカラー倍についての等式と } 1/(j! l!) > 0) \\ &\leq \frac{\|A^j\| \|B^l\|}{j! l!} \quad (\because \text{行列ノルムの劣乗法性と } 1/(j! l!) > 0) \\ &\leq \|I\|^2 \cdot \frac{a^j}{j!} \cdot \frac{b^l}{l!} \quad (\because \|A^j\| \leq \|I\| a^j \text{ と } \|B^l\| \leq \|I\| b^l) \end{aligned}$$

Step 5: $\|S_N T_N - C_N\| \rightarrow 0$ 。まず添字集合を評価する。 $(j, l) \in Q_N \setminus D_N$ とすると $j+l > N$ であるから $2j > N$ または $2l > N$ である (もし $2j \leq N$ かつ $2l \leq N$ なら $j+l \leq N$ となり矛盾)。 $P_N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を $P_N \geq (N+1)/2$ を満たす最小の整数とすると、整数 j について $2j > N$ は $2j \geq N+1$ すなわち $j \geq P_N$ と同値であるから

$$Q_N \setminus D_N \subseteq (\{P_N, \dots, N\} \times \{0, \dots, N\}) \cup (\{0, \dots, N\} \times \{P_N, \dots, N\})$$

($P_N > N$ のときは対応する部分は空集合とする。) 主張 3.9 (3) を有限個の項に繰り返し用い、Step 4 の評価と、非負項を付け加えても和が増えるだけであることを使うと、

$$\begin{aligned} \|S_N T_N - C_N\| &\leq \sum_{(j,l) \in Q_N \setminus D_N} \left\| \frac{1}{j! l!} A^j B^l \right\| \quad (\because \text{三角不等式を有限個の項に繰り返し用いる}) \\ &\leq \|I\|^2 \sum_{(j,l) \in Q_N \setminus D_N} \frac{a^j}{j!} \cdot \frac{b^l}{l!} \quad (\because \text{Step 4 を各項へ当てる}) \\ &\leq \|I\|^2 \left(\left(\sum_{j=P_N}^N \frac{a^j}{j!} \right) \left(\sum_{l=0}^N \frac{b^l}{l!} \right) + \left(\sum_{j=0}^N \frac{a^j}{j!} \right) \left(\sum_{l=P_N}^N \frac{b^l}{l!} \right) \right) \quad (\because \text{上の添字集合の包含と、非負項を付け加えても和は増えるだけであること}) \\ &\leq \|I\|^2 (R_{P_N-1}(a) E(b) + E(a) R_{P_N-1}(b)) \quad (\because \text{非負実数の指数級数の収束の (2)(3)}) \end{aligned}$$

最後の不等号で引いたのは 主張 4.1 の (2)(3) である。 $P_N \geq (N+1)/2$ より $P_N - 1 \rightarrow \infty$ であり、主張 4.1 (3) より $R_{P_N-1}(a) \rightarrow 0$ 、 $R_{P_N-1}(b) \rightarrow 0$ 。 $\|I\|^2$ 、 $E(a)$ 、 $E(b)$ は N によらない定数であるから $\|S_N T_N - C_N\| \rightarrow 0$ 。

Step 6: $S_N T_N \rightarrow \exp(A) \exp(B)$ 。主張 3.9 (3)、主張 3.10、および 主張 4.2 (2) の評価 $\|S_N\| \leq M_A$ 、 $\|\exp(B)\| \leq M_B$ ($M_A = \|I\| + E(\|A\|)$ 、 $M_B = \|I\| + E(\|B\|)$) は 主張 4.2 (2) をそれぞれ A 、 B に適用したもの) より、

$$\begin{aligned}
\|S_N T_N - \exp(A) \exp(B)\| &\leq \|S_N T_N - S_N \exp(B)\| + \|S_N \exp(B) - \exp(A) \exp(B)\| & (\because \text{三角不等式}) \\
&= \|S_N (T_N - \exp(B))\| + \|(S_N - \exp(A)) \exp(B)\| & (\because \text{積の分配律}) \\
&\leq \|S_N\| \cdot \|T_N - \exp(B)\| + \|S_N - \exp(A)\| \cdot \|\exp(B)\| & (\because \text{行列ノルムの劣乗法性を2つの項へ当てる}) \\
&\leq M_A \|T_N - \exp(B)\| + M_B \|S_N - \exp(A)\| & (\because \|S_N\| \leq M_A \text{ と } \|\exp(B)\| \leq M_B)
\end{aligned}$$

主張 4.2 (1) より $\|S_N - \exp(A)\| \rightarrow 0$ 、 $\|T_N - \exp(B)\| \rightarrow 0$ であるから右辺は 0 に収束する。

Step 7: $C_N \rightarrow \exp(A + B)$ 。主張 4.2 を行列 $A + B$ に適用すれば、 C_N は $\exp(A + B)$ の部分行列であるから $\|C_N - \exp(A + B)\| \rightarrow 0$ 。

Step 8: 結論。主張 3.9 (3) より各 N について

$$\begin{aligned}
0 &\leq \|\exp(A) \exp(B) - \exp(A + B)\| & (\because \text{ノルムは非負実数として定まる}) \\
&\leq \|\exp(A) \exp(B) - S_N T_N\| + \|S_N T_N - \exp(A + B)\| & (\because \text{三角不等式}) \\
&\leq \|\exp(A) \exp(B) - S_N T_N\| + \|S_N T_N - C_N\| + \|C_N - \exp(A + B)\| & (\because \text{第2項へもう一度三角不等式})
\end{aligned}$$

右辺は Step 5・Step 6・Step 7 より $N \rightarrow \infty$ で 0 に収束する ($\|\exp(A) \exp(B) - S_N T_N\| = \|S_N T_N - \exp(A) \exp(B)\|$ は主張 3.9 (2) を $c = -1$ に適用し $|-1| = 1$ を用いて得られる)。左辺は N によらない非負定数であるから $\|\exp(A) \exp(B) - \exp(A + B)\| = 0$ であり、主張 3.9 (1) より

$$\exp(A) \exp(B) = \exp(A + B)$$

なお、この証明で用いたのは行列の積・和の計算と 定義 3.8 のノルムに関する評価のみであり、微分は用いていない。 $\square$

定理 4.6 ($\exp(O) = I$)。行列指数は 定義 4.4、成分積は 定義 1.8、実数係数の包含は 定義 1.12 による。実数級数の収束は 主張 4.1 を指数 1 に適用する。

$d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 $O, I \in \text{Mat}(d, \mathbb{C})$ とする。

O を零行列、 I を単位行列とすると、

$$\exp(O) = I$$

証明. 準備として、零行列の冪を書き下しておく。行列の冪の定義より $O^0 = I$ であり、 $n \geq 1$ のとき $O^n = O$ である。

$$\begin{aligned}
\exp(O) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{O^n}{n!} & (\because \exp \text{ の定義 (行列の場合と、行列への線型写像の場合)。定義 4.4}) \\
&= \frac{O^0}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O^n}{n!} & (\because \text{収束級数の第0項を分ける}) \\
&= \frac{I}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O^n}{n!} & (\because O^0 = I) \\
&= \frac{I}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O}{n!} & (\because n \geq 1 \text{ のとき } O^n = O) \\
&= I + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O}{n!} & (\because 0! = 1) \\
&= I + O \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} & (\because \text{収束級数のスカラー倍は各項のスカラー倍の和である}) \\
&= I + O & (\because \text{零行列のスカラー倍は零行列である}) \\
&= I & (\because \text{零行列は行列の加法の単位元である})
\end{aligned}$$

$\square$

部 I

対角化の計算 (ホロノミック量子場付録 B)

5 転送行列

定義 5.1 (サイトごとの Pauli 行列族). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする. 主張 7.1 で定めた二次の Pauli 行列 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z$ と単位行列 $I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}$ 、および 定義 3.1 のクロネッカー積を用いる。

$1 \leq k \leq M$ と $a \in \{x, y, z\}$ に対して、サイト k だけに σ^a を置く行列を

$$\sigma_k^a := I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{\text{kth}} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。これにより $(\sigma_k^a)_{\substack{1 \leq k \leq M \\ a \in \{x, y, z\}}}$ は一つの添字つき行列族として定まる。

定義 5.2 (第一の転送行列と周期規約). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $K_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。定義 5.1 のサイトごとの Pauli 行列族について、 $\sigma_{M+1}^z := \sigma_1^z$ と周期的に延長する。第一の転送行列を

$$V_1 := \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^M \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) = \exp(K_1 (\sigma_1^z \sigma_2^z + \sigma_2^z \sigma_3^z + \cdots + \sigma_M^z \sigma_1^z)) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

で定める。ここに現れる $\exp$ は、定義 4.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

定義 5.3 (第二の転送行列). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $K_2, K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。定義 5.1 のサイトごとの Pauli 行列族を用いて、第二の転送行列を

$$V_2 := (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x\right) = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp(K_2^* (\sigma_1^x + \sigma_2^x + \cdots + \sigma_M^x)) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

で定める。ここに現れる $\sinh$ は 定義 1.1 の双曲線正弦である。 $K_2 > 0$ と 主張 1.4 より $2 \sinh 2K_2 > 0$ であり、前係数は 定義 1.6 の非負平方根を用いて

$$(2 \sinh 2K_2)^{M/2} := \left(\sqrt{2 \sinh 2K_2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^M \in \mathbb{R}_{>0}$$

と定める。また、 $\exp$ は 定義 4.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

定義 5.4 (Jordan–Wigner 行列族 Z_m). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 5.1 で定めたサイトごとの Pauli 行列族を用いる。各 $m \in \{1, \dots, M\}$ に対して、Jordan–Wigner 行列 Z_m を

$$Z_m := \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。 $m = 1$ では左側の積を空積とし、 $Z_1 := \sigma_1^z$ とする。また周期端では $Z_{M+1} := Z_1$ と定める。ホロノミック量子場では Z_m を p_m と書く。

定義 5.5 (Jordan–Wigner 行列族 Y_m). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 5.1 で定めたサイトごとの Pauli 行列族を用いる。各 $m \in \{1, \dots, M\}$ に対して、Jordan–Wigner 行列 Y_m を

$$Y_m := \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。 $m = 1$ では左側の積を空積とし、 $Y_1 := \sigma_1^y$ とする。また周期端では $Y_{M+1} := Y_1$ と定める。ホロノミック量子場では Y_m を q_m と書く。

定義 5.6 (全スピン反転行列). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 5.1 で定めたサイトごとの Pauli 行列族を用いて、全スピン反転行列を

$$\varepsilon := \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_M^x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。積はサイト番号の昇順に取る。

主張 5.7 (全スピン反転行列の Jordan–Wigner 表示). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 5.4 の $Z_1, \dots, Z_M$ 、定義 5.5 の $Y_1, \dots, Y_M$ 、および 定義 5.6 の全スピン反転行列 ε について、

$$\varepsilon = i^M (Z_1 Y_1)(Z_2 Y_2) \cdots (Z_M Y_M) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

が成り立つ。右辺は $Z_m Y_m$ の積であって、和ではない。

証明. 主張 7.1 の Pauli 行列の成分表示、定義 1.8 の行列積、および 主張 1.35 の複素数の四則から、

$$\begin{aligned} \sigma^z \sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{Pauli 行列の定義。主張 7.1}) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because 2 \times 2 \text{ 行列の積の定義。定義 1.8}) \\ &= -i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\ &= -i \sigma^x \quad (\because \text{Pauli 行列の定義。主張 7.1}) \end{aligned}$$

を得る。次に任意の $m \in \{1, \dots, M\}$ を固定する。まず $r \in \{0, 1, \dots, M\}$ に対して $P_r := \sigma_1^x \cdots \sigma_r^x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と置き、 $P_0 := I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ とする。定義 5.1 と 主張 3.2 を用いる有限帰納法で、次の表示を示す。後で一因子の複素スカラーを外へ出すときは 主張 3.3 の各因子についての線型性を用いる。

$$P_r = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^r \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-r} \quad (0 \leq r \leq M)$$

を示す。初項では

$$\begin{aligned} P_0 &= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because P_0 \text{ の定義}) \\ &= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^M \quad (\because \text{単位因子のクロネッカー積。主張 3.2}) \end{aligned}$$

である。 $0 \leq r < M$ で帰納法の仮定が成り立つとする。このとき

$$\begin{aligned} P_{r+1} &= P_r \sigma_{r+1}^x && (\because P_{r+1} \text{ の定義}) \\ &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^r \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-r} \right) \sigma_{r+1}^x && (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^r \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-r} \right) \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^r \boxtimes \sigma^x \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-r-1} \right) && (\because \text{サイト行列の定義。定義 5.1}) \\ &= \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^r \boxtimes (I \sigma^x) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M-r-1} && (\because \text{クロネッカー積の積の規則。主張 3.2}) \\ &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{r+1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-r-1} && (\because AI = IA = A) \end{aligned}$$

となる。よって有限帰納法により上の P_r の表示がすべての $0 \leq r \leq M$ で成り立つ。特に 定義 5.4 と 定義 5.5 から、

$$\begin{aligned}
Z_m &= P_{m-1} \sigma_m^z & (\because Z_m \text{ の定義。定義 5.4}) \\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m+1} \right) \sigma_m^z & (\because P_{m-1} \text{ の表示}) \\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m+1} \right) \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} \right) & (\because \text{ サイト行列の定義。定義 5.1}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^z) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M-m} & (\because \text{ クロネッカー積の積の規則。主張 3.2}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} & (\because AI = IA = A)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Y_m &= P_{m-1} \sigma_m^y & (\because Y_m \text{ の定義。定義 5.5}) \\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m+1} \right) \sigma_m^y & (\because P_{m-1} \text{ の表示}) \\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m+1} \right) \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} \right) & (\because \text{ サイト行列の定義。定義 5.1}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^y) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M-m} & (\because \text{ クロネッカー積の積の規則。主張 3.2}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} & (\because AI = IA = A)
\end{aligned}$$

を得る。したがって

$$\begin{aligned}
Z_m Y_m &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} \right) \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} \right) & (\because \text{ 直前の } Z_m, Y_m \text{ のクロネッカー積表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x \sigma^x)}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^y) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M-m} & (\because \text{ クロネッカー積の積の規則。主張 3.2}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^y) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M-m} & (\because \sigma^x \sigma^x = I. \text{ 主張 7.1}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^y) \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} & (\because II = I) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(-i \sigma^x) \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} & (\because \text{ 上の } \sigma^z \sigma^y = -i \sigma^x) \\
&= -i \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^x \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} \right) & (\because \text{ クロネッカー積の線型性。主張 3.3}) \\
&= -i \sigma_m^x & (\because \text{ サイト行列の定義。定義 5.1})
\end{aligned}$$

$m = 1$ では先頭の $m - 1$ 因子を空積、 $m = M$ では末尾の $M - m$ 因子を空積と読む。ここで $Q_0 := I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ 、 $Q_r := (Z_1 Y_1) \cdots (Z_r Y_r) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と置く。 $Q_r = (-i)^r P_r$ を $r = 0, \dots, M$ について有限帰納法で示す。初項は

$$\begin{aligned}
Q_0 &= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because Q_0 \text{ の定義}) \\
&= (-i)^0 I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because (-i)^0 = 1) \\
&= (-i)^0 P_0 & (\because P_0 \text{ の定義})
\end{aligned}$$

である。 $0 \leq r < M$ で帰納法の仮定が成り立つとすると、因子を並べ替えずに

$$\begin{aligned}
Q_{r+1} &= Q_r(Z_{r+1}Y_{r+1}) & (\because Q_{r+1} \text{ の定義}) \\
&= (-i)^r P_r(Z_{r+1}Y_{r+1}) & (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= (-i)^r P_r(-i\sigma_{r+1}^x) & (\because Z_{r+1}Y_{r+1} = -i\sigma_{r+1}^x) \\
&= (-i)^r (P_r(-i\sigma_{r+1}^x)) & (\because \text{左側のスカラー倍と行列積の両立}) \\
&= (-i)^r ((-i)(P_r\sigma_{r+1}^x)) & (\because \text{右側のスカラー倍と行列積の両立}) \\
&= ((-i)^r(-i))(P_r\sigma_{r+1}^x) & (\because \text{スカラー倍の結合律}) \\
&= (-i)^{r+1} P_r\sigma_{r+1}^x & (\because \text{冪の再帰}) \\
&= (-i)^{r+1} P_{r+1} & (\because P_{r+1} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

となる。したがって有限帰納法の終端 $r = M$ で $Q_M = (-i)^M P_M$ を得る。ゆえに

$$\begin{aligned}
\varepsilon &= \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_M^x & (\because \text{全スピン反転行列の定義。定義 5.6}) \\
&= P_M & (\because P_M \text{ の定義}) \\
&= 1^M P_M & (\because 1^M = 1) \\
&= (i(-i))^M P_M & (\because i(-i) = 1) \\
&= i^M (-i)^M P_M & (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換律と冪の法則}) \\
&= i^M Q_M & (\because \text{有限帰納法の終端}) \\
&= i^M (Z_1 Y_1)(Z_2 Y_2) \cdots (Z_M Y_M) & (\because Q_M \text{ の定義})
\end{aligned}$$

ゆえに主張が示された。 □

定義 5.8 (記号の定義). 定義 5.2 で定めた第一の転送行列と周期規約、定義 5.3 で定めた第二の転送行列、主張 7.1 で定めた二次の Pauli 行列と単位行列、主張 3.2 の (2) で示した二次の単位行列のクロネッカー積、定義 5.1 で定めたサイトごとの Pauli 行列族、主張 5.7 で示した全スピン反転行列の Jordan–Wigner 表示、および 定義 1.1 で定めた双曲線余弦・双曲線正弦を用いる。後者の正值性には 主張 1.4 を用いる。

- $K_1^* := -\frac{1}{2} \log(\tanh K_1) \iff \sinh(2K_1) \sinh(2K_1^*) = 1$
- $K_2^* := -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2) \iff \sinh(2K_2) \sinh(2K_2^*) = 1$
- $c_i := \cosh 2K_i, \quad s_i := \sinh 2K_i, \quad c_i^* := \cosh 2K_i^*, \quad s_i^* := \sinh 2K_i^*$

$K_i, K_i^* > 0$ より、 $c_i, s_i, c_i^*, s_i^* > 0$

ここで $\boxtimes$ は 定義 3.1 のクロネッカー積であり、 $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ は 2^M 次の複素正方行列全体である。すなわち上の $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z, Z_m, Y_m, \varepsilon$ などとはすべて具体的な 2^M 次の複素行列である。

主張 5.9 (Z_m, Y_m は線型独立). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 5.4 の $Z_1, \dots, Z_M$ と 定義 5.5 の $Y_1, \dots, Y_M$ を $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元として考える。 $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を $\mathbb{C}$ -線型空間とみなすとき、

$$\{Z_1, \dots, Z_M, Y_1, \dots, Y_M\} \text{ は線型独立}$$

すなわち $\alpha_1, \dots, \alpha_M, \beta_1, \dots, \beta_M \in \mathbb{C}$ が $\sum_{m=1}^M \alpha_m Z_m + \sum_{m=1}^M \beta_m Y_m = 0$ を満たすならば、すべての m について $\alpha_m = \beta_m = 0$ である。

証明. 以下、 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ を標準的な Pauli 行列

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I := I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。定義 5.1 のとおり σ_k^a ($a \in \{x, y, z\}$) は第 k 番目の因子 (サイト) のみが σ^a で他の因子がすべて I である元である。

Step 1: $\mathcal{B} := \{I, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ は $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$ -基底である。任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対して

$$A = \frac{a_{11} + a_{22}}{2} I + \frac{a_{12} + a_{21}}{2} \sigma^x + \frac{i(a_{12} - a_{21})}{2} \sigma^y + \frac{a_{11} - a_{22}}{2} \sigma^z \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つ。右辺の 4 つの成分を 1 つずつ計算すると、

$$\begin{aligned} \left(\frac{a_{11} + a_{22}}{2} I + \frac{a_{12} + a_{21}}{2} \sigma^x + \frac{i(a_{12} - a_{21})}{2} \sigma^y + \frac{a_{11} - a_{22}}{2} \sigma^z \right)_{11} &= \frac{a_{11} + a_{22}}{2} \cdot 1 + \frac{a_{11} - a_{22}}{2} \cdot 1 \quad (\because I_{11} = \sigma_{11}^z = 1, \sigma_{11}^x = \sigma_{11}^y = 0) \\ &= \frac{a_{11} + a_{22}}{2} + \frac{a_{11} - a_{22}}{2} \quad (\because 1 \text{ を掛けても変わらない}) \\ &= \frac{2a_{11}}{2} \quad (\because \text{同分母の和}) \\ &= a_{11} \quad (\because \text{約分}) \end{aligned}$$

であり、同じ計算を残りの 3 つの成分について行くと、

$$\begin{aligned} (\cdots)_{22} &= \frac{a_{11} + a_{22}}{2} \cdot 1 + \frac{a_{11} - a_{22}}{2} \cdot (-1) \quad (\because I_{22} = 1, \sigma_{22}^z = -1, \sigma_{22}^x = \sigma_{22}^y = 0) \\ &= \frac{a_{11} + a_{22}}{2} - \frac{a_{11} - a_{22}}{2} \quad (\because (-1) \text{ を掛けることは符号を変えること}) \\ &= \frac{2a_{22}}{2} \quad (\because \text{同分母の差}) \\ &= a_{22} \quad (\because \text{約分}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\cdots)_{12} &= \frac{a_{12} + a_{21}}{2} \cdot 1 + \frac{i(a_{12} - a_{21})}{2} \cdot (-i) \quad (\because \sigma_{12}^x = 1, \sigma_{12}^y = -i, I_{12} = \sigma_{12}^z = 0) \\ &= \frac{a_{12} + a_{21}}{2} + \frac{a_{12} - a_{21}}{2} \quad (\because i \cdot (-i) = 1) \\ &= \frac{2a_{12}}{2} \quad (\because \text{同分母の和}) \\ &= a_{12} \quad (\because \text{約分}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\cdots)_{21} &= \frac{a_{12} + a_{21}}{2} \cdot 1 + \frac{i(a_{12} - a_{21})}{2} \cdot i \quad (\because \sigma_{21}^x = 1, \sigma_{21}^y = i, I_{21} = \sigma_{21}^z = 0) \\ &= \frac{a_{12} + a_{21}}{2} - \frac{a_{12} - a_{21}}{2} \quad (\because i \cdot i = -1) \\ &= \frac{2a_{21}}{2} \quad (\because \text{同分母の差}) \\ &= a_{21} \quad (\because \text{約分}) \end{aligned}$$

となる ($(\cdots)$ は上と同じ右辺の行列である)。よって $\mathcal{B}$ は $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ を張り、 $\dim_{\mathbb{C}} \text{Mat}(2, \mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{B}$ であるから $\mathcal{B}$ は基底である。以下

$$e_1 := I, \quad e_2 := \sigma^x, \quad e_3 := \sigma^y, \quad e_4 := \sigma^z$$

と番号を付ける。

Step 2: クロネッカー積がつくる基底。定理 3.5 (2) を基底 $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ に適用すると、多重添字 $(i_1, \dots, i_M) \in \{1, 2, 3, 4\}^M$ で添字づけられた族

$$\mathcal{E} := \{ e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M} \mid (i_1, \dots, i_M) \in \{1, 2, 3, 4\}^M \}$$

は $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$ -基底である。

Step 3: Z_m, Y_m のクロネッカー積による表示。まず $1 \leq r \leq M$ と $a_1, \dots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$\sigma_1^{a_1} \sigma_2^{a_2} \cdots \sigma_r^{a_r} = \sigma_1^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma_r^{a_r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-r}$$

が成り立つことを r に関する帰納法で示す。 $r = 1$ のときは 定義 5.8 の $\sigma_1^{a_1}$ の定義そのものである。 r で成り立つとすると、クロネッカー積の積が各サイトごとの積であること（主張 3.2 (1)）

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M B_M)$$

と $AI = IA = A$ より、

$$\begin{aligned} \sigma_1^{a_1} \cdots \sigma_r^{a_r} \sigma_{r+1}^{a_{r+1}} &= (\sigma_1^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma_r^{a_r} \boxtimes I \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{\sigma_{r+1}^{a_{r+1}}}^{(r+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= (\sigma_1^{a_1} I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma_r^{a_r} I) \boxtimes (I \sigma_{r+1}^{a_{r+1}}) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\ &= \sigma_1^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma_r^{a_r} \boxtimes \sigma_{r+1}^{a_{r+1}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-(r+1)} \quad (\because AI = IA = A) \end{aligned}$$

定義 5.4 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$ と、定義 5.5 の $Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ にこれを適用すると ($m = 1$ のときは前半の積が空積で $Z_1 = \sigma_1^z$ 、 $Y_1 = \sigma_1^y$ であり、下の式で σ^x の個数を 0 とすればよい)、

$$\begin{aligned} Z_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} \quad (\because \text{Step 3 の帰納法と } Z_m \text{ の定義}) \\ Y_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} \quad (\because \text{Step 3 の帰納法と } Y_m \text{ の定義定義 5.5}) \end{aligned}$$

Step 4: 対応する多重添字。Step 1 の番号付け $e_1 = I$, $e_2 = \sigma^x$, $e_3 = \sigma^y$, $e_4 = \sigma^z$ のもとで、Step 3 の表示は Z_m, Y_m がそれぞれ多重添字

$$\zeta(m)_k := \begin{cases} 2 & (k < m) \\ 4 & (k = m) \\ 1 & (k > m) \end{cases} \quad \eta(m)_k := \begin{cases} 2 & (k < m) \\ 3 & (k = m) \\ 1 & (k > m) \end{cases}$$

に対応する $\mathcal{E}$ の元であることを意味する。すなわち $Z_m = e_{\zeta(m)_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{\zeta(m)_M}$ 、 $Y_m = e_{\eta(m)_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{\eta(m)_M}$ 。

Step 5: これら $2M$ 個の多重添字は相異なる。 $m, m' \in \{1, \dots, M\}$ について次のように場合分けする。

- $\zeta(m)$ と $\zeta(m')$ ($m < m'$) : 第 m 成分は $\zeta(m)_m = 4$ 、 $\zeta(m')_m = 2$ ($m < m'$ より) であり相異なる。
- $\eta(m)$ と $\eta(m')$ ($m < m'$) : 第 m 成分は $\eta(m)_m = 3$ 、 $\eta(m')_m = 2$ であり相異なる。
- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m = m'$ のとき: 第 m 成分は 4 と 3 で相異なる。
- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m < m'$ のとき: 第 m 成分は 4 と 2 で相異なる。
- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m > m'$ のとき: 第 m' 成分は $\zeta(m)_{m'} = 2$ ($m' < m$ より) と $\eta(m')_{m'} = 3$ で相異なる。

以上より $\zeta(1), \dots, \zeta(M), \eta(1), \dots, \eta(M)$ は相異なる $2M$ 個の多重添字であり、対応する $Z_1, \dots, Z_M, Y_1, \dots, Y_M$ は基底 $\mathcal{E}$ の相異なる $2M$ 個の元である。

Step 6: 結論。 $\alpha_1, \dots, \alpha_M, \beta_1, \dots, \beta_M \in \mathbb{C}$ が

$$\sum_{m=1}^M \alpha_m Z_m + \sum_{m=1}^M \beta_m Y_m = 0$$

を満たすとする。Step 5 より左辺は基底 $\mathcal{E}$ の相異なる元の $\mathbb{C}$ -線型結合であり、 $\mathcal{E}$ のそれ以外の元の係数は 0 である。基底による表示は一意（特に 0 の表示はすべての係数が 0）であるから、

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_M = \beta_1 = \dots = \beta_M = 0$$

すなわち $\{Z_1, \dots, Z_M, Y_1, \dots, Y_M\}$ は線型独立である。 $\square$

主張 5.10 (V_1 を Z, Y, ε で表す). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 5.8 の $V_1, Z_m, Y_m, \varepsilon, K_1$ を考える。このとき $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の中で

$$V_1 = \exp(iK_1(Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \dots + Y_{M-1} Z_M - \varepsilon Y_M Z_1))$$

が成り立つ ($i \in \mathbb{C}$ は虚数単位)。

証明. 証明の方針: $\exp$ の中身どうしが $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元として等しいことを示す。 $\exp$ は写像であるから、これが示されれば $\exp$ の値も等しく、主張が従う（したがって 定理 4.5 のような $\exp$ の分解は用いない）。

以下、 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z, I := I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ は 主張 7.1 の Pauli 行列とし、クロネッカー積の積が各サイトごとの積であること（主張 3.2 (1)）

$$(A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \dots \boxtimes B_M) = (A_1 B_1) \boxtimes \dots \boxtimes (A_M B_M) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

と、クロネッカー積が各因子について $\mathbb{C}$ -線型であること（主張 3.3）

$$C_1 \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(c C_j)}^{\text{jth}} \boxtimes \dots \boxtimes C_M = c(C_1 \boxtimes \dots \boxtimes C_M) \quad (c \in \mathbb{C}) \quad (\because \text{第 } j \text{ 因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性})$$

を繰り返し用いる。

Step 0: 単一サイトの Pauli 行列の積。主張 7.1 の $\sigma^x \sigma^x = I$ に加えて、以下の 3 式を 2×2 行列の積の成分計算で確かめる。

$$\begin{aligned} \sigma^y \sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{Pauli 行列の定義}) \\ &= \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + (-i) \cdot 1 & 0 \cdot 1 + (-i) \cdot 0 \\ i \cdot 0 + 0 \cdot 1 & i \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} && (\because 2 \times 2 \text{ 行列の積の成分計算}) \\ &= \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\ &= -i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} && (\because \text{行列のスカラー倍の定義}) \\ &= -i \sigma^z && (\because \text{Pauli 行列の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^x \sigma^y &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} & (\because \text{Pauli 行列の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 1 \cdot i & 0 \cdot (-i) + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot i & 1 \cdot (-i) + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} & (\because 2 \times 2 \text{ 行列の積の成分計算}) \\
&= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} & (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} & (\because \text{行列のスカラー倍の定義}) \\
&= i \sigma^z & (\because \text{Pauli 行列の定義}) \\
\\
\sigma^z \sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} & (\because \text{Pauli 行列の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 0 \cdot i & 1 \cdot (-i) + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + (-1) \cdot i & 0 \cdot (-i) + (-1) \cdot 0 \end{pmatrix} & (\because 2 \times 2 \text{ 行列の積の成分計算}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} & (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= -i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & (\because \text{行列のスカラー倍の定義}) \\
&= -i \sigma^x & (\because \text{Pauli 行列の定義})
\end{aligned}$$

Step 1: $Z_m, Y_m, \varepsilon, \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z, \sigma_m^x$ のクロネッカー積による表示。まず $1 \leq r \leq M$ と $a_1, \dots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$\sigma_1^{a_1} \sigma_2^{a_2} \cdots \sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-r}$$

が成り立つ。これを r に関する帰納法で示す。 $r = 1$ のときは 定義 5.8 の $\sigma_1^{a_1}$ の定義そのものである。 r で成り立つとすると、

$$\begin{aligned}
\sigma_1^{a_1} \cdots \sigma_r^{a_r} \sigma_{r+1}^{a_{r+1}} &= (\sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{\sigma^{a_{r+1}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{(r+1)\text{th}} \right) & (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= (\sigma^{a_1} I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^{a_r} I) \boxtimes (I \sigma^{a_{r+1}}) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) & (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_{r+1}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-(r+1)} & (\because AI = IA = A)
\end{aligned}$$

これを 定義 5.4 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$ 、定義 5.5 の $Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ 、定義 5.8 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ に適用すると ($m = 1$ のときは前半の積が空積で $Z_1 = \sigma_1^z$ 、 $Y_1 = \sigma_1^y$ 。以下の式で σ^x の個数を 0 とすればよい)、

$$\begin{aligned}
Z_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} & (\because \text{上の一般式と } Z_m \text{ の定義}) \\
Y_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} & (\because \text{上の一般式と } Y_m \text{ の定義定義 5.5}) \\
\varepsilon &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^M & (\because \text{上の一般式 } (r = M) \text{ と } \varepsilon \text{ の定義})
\end{aligned}$$

また σ_m^x は第 m 因子のみ σ^x で他は I であり、 $1 \leq m \leq M - 1$ について (第 m 因子と第 $m + 1$ 因子以外はすべて $II = I$)

$$\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z = \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

である。同様に $M \geq 2$ より第 1 因子と第 M 因子は異なるので

$$\begin{aligned} \sigma_M^z \sigma_1^z &= \overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-2} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\ &= \sigma_1^z \sigma_M^z \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \end{aligned}$$

Step 2: $1 \leq m \leq M-1$ について $Y_m Z_{m+1} = -i \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ 。Step 1 の表示を用いて因子ごとに計算する。

$$\begin{aligned} Y_m Z_{m+1} &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{Step 1}) \\ &= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^z)}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\ &= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(-i \sigma^z)}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I, \sigma^y \sigma^x = -i \sigma^z (\text{Step 0})) \\ &= (-i) \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{第 } m \text{ 因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\ &= -i \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{Step 1}) \\ \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z &= (i \cdot (-i)) \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \quad (\because i \cdot (-i) = 1 (\text{複素数の四則})) \\ &= i((-i) \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) \quad (\because \text{複素数倍の結合則}) \\ &= i Y_m Z_{m+1} \quad (\because \text{上の Step 2 の等式}) \quad (1 \leq m \leq M-1) \end{aligned}$$

Step 3: 境界項 $\varepsilon Y_M Z_1 = i \sigma_M^z \sigma_1^z$ 。ここで Jordan–Wigner 文字列 $\sigma_1^x \cdots \sigma_{M-1}^x$ が周期境界で一週し、 $Z_1 = \sigma_1^z$ の側に文字列が付いていないため、Step 2 の計算では第 1 因子の σ^x が相殺せずに残る。これを打ち消すのが $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ である。実際、 $M \geq 2$ のもとで 3 つの元の積を (クロネッカー積の積の規則を 2 回使って) 因子ごとに計算すると、

$$\begin{aligned} \varepsilon Y_M Z_1 &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^M \right) \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{M\text{th}} \right) \left(\overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-1} \right) \quad (\because \text{Step 1}) \\ &= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x \sigma^z)}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x \sigma^x I)}^{2\text{nd}, \dots, (M-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y I)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\ &= \overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-2} \boxtimes \overbrace{(i \sigma^z)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I, AI = A, \sigma^x \sigma^y = i \sigma^z (\text{Step 0})) \\ &= i \left(\overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-2} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{M\text{th}} \right) \quad (\because \text{第 } M \text{ 因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\ &= i \sigma_M^z \sigma_1^z \quad (\because \text{Step 1 の最後の式}) \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \sigma_M^z \sigma_1^z &= ((-i) \cdot i) \sigma_M^z \sigma_1^z \quad (\because (-i) \cdot i = 1 (\text{複素数の四則})) \\ &= (-i)(i \sigma_M^z \sigma_1^z) \quad (\because \text{複素数倍の結合則}) \\ &= -i \varepsilon Y_M Z_1 \quad (\because \text{上の Step 3 の等式}) \end{aligned}$$

Step 4: V_1 の表式。定義 5.8 の V_1 の指数の中身を、 $\sigma_{M+1}^z = \sigma_1^z$ により最後の項 $\sigma_M^z \sigma_{M+1}^z = \sigma_M^z \sigma_1^z$ だけ分けて書くと、

$$\begin{aligned}
K_1 \sum_{m=1}^M \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z &= K_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) + K_1 \sigma_M^z \sigma_1^z & (\because \sigma_{M+1}^z = \sigma_1^z \text{ として有限和の最後の項を分ける}) \\
&= K_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} i Y_m Z_{m+1} \right) + K_1 (-i \varepsilon Y_M Z_1) & (\because \text{Step 2, Step 3}) \\
&= i K_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} - \varepsilon Y_M Z_1 \right) & (\because \mathbb{C}\text{-線型空間 } \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \text{ でのスカラー倍の分配律}) \\
&= i K_1 (Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \cdots + Y_{M-1} Z_M - \varepsilon Y_M Z_1) & (\because \text{有限和を項ごとに書く})
\end{aligned}$$

両辺は $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の同一の元であるから、 $\exp$ の値も等しく、

$$\begin{aligned}
V_1 &= \exp \left(K_1 \sum_{m=1}^M \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) & (\because V_1 \text{ の定義}) \\
&= \exp(i K_1 (Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \cdots + Y_{M-1} Z_M - \varepsilon Y_M Z_1)) & (\because \text{直前の指数の等式})
\end{aligned}$$

以上で主張が示された。 $\square$

主張 5.11 (V_2 を Z, Y で表す). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 5.8 の $V_2, Z_m, Y_m, K_2^*, s_2 (= \sinh 2K_2)$ を考える。このとき $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の中で

$$V_2 = (2s_2)^{M/2} \exp(i K_2^* (Z_1 Y_1 + Z_2 Y_2 + \cdots + Z_M Y_M))$$

が成り立つ ($i \in \mathbb{C}$ は虚数単位)。

証明. 証明の方針: $\exp$ の中身どうしが $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元として等しいことを示す。以下、 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z, I := I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}$ は主張 7.1 の Pauli 行列とする。クロネッカー積の積の規則 (主張 3.2 (1)) と各因子についての $\mathbb{C}$ -線型性 (主張 3.3) を用いる。

Step 0: 単一サイトの積 $\sigma^z \sigma^y = -i \sigma^x$ を成分計算で確かめる。

$$\begin{aligned}
\sigma^z \sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} & (\because \text{Pauli 行列の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 0 \cdot i & 1 \cdot (-i) + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + (-1) \cdot i & 0 \cdot (-i) + (-1) \cdot 0 \end{pmatrix} & (\because 2 \times 2 \text{ 行列の積の成分計算}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} & (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= -i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & (\because \text{行列のスカラー倍の定義}) \\
&= -i \sigma^x & (\because \text{Pauli 行列の定義})
\end{aligned}$$

Step 1: Z_m, Y_m, σ_m^x のクロネッカー積表示。まず $1 \leq r \leq M$ と $a_1, \dots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$\sigma_1^{a_1} \cdots \sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-r}$$

が成り立つ。 $r = 1$ は定義 5.8 の定義である。 r で成り立つと仮定して $\sigma_{r+1}^{a_{r+1}}$ を右から掛けると、

$$\begin{aligned}
\sigma_1^{a_1} \cdots \sigma_r^{a_r} \sigma_{r+1}^{a_{r+1}} &= (\sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{\sigma^{a_{r+1}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{(r+1)\text{th}} \right) & (\because \text{帰納法の仮定とサイト作用素の定義}) \\
&= (\sigma^{a_1} I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^{a_r} I) \boxtimes (I \sigma^{a_{r+1}}) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) & (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_{r+1}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-(r+1)} & (\because AI = IA = A)
\end{aligned}$$

よって帰納法により一般式が成り立つ。定義へ適用すると

$$\begin{aligned}
Z_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m}, \\
Y_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m}, \quad (\because \text{一般式とサイト作用素の定義}) \\
\sigma_m^x &= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m}
\end{aligned}$$

Step 2: $1 \leq m \leq M$ について $Z_m Y_m = -i \sigma_m^x$

$$\begin{aligned}
Z_m Y_m &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x \sigma^x)}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z \sigma^y) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (-i \sigma^x) \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I \text{ と Step 0}) \\
&= -i \sigma_m^x \quad (\because \text{第 } m \text{ 因子についての複素線型性と Step 1})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_m^x &= (i \cdot (-i)) \sigma_m^x \quad (\because i \cdot (-i) = 1) \\
&= i((-i) \sigma_m^x) \quad (\because \text{複素数倍の結合則}) \\
&= i Z_m Y_m \quad (\because \text{Step 2})
\end{aligned}$$

Step 3: V_2 の表式。指数の中身は

$$\begin{aligned}
K_2^* (\sigma_1^x + \cdots + \sigma_M^x) &= K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x \quad (\because \text{有限和を } \sum \text{ 記法で書く}) \\
&= K_2^* \sum_{m=1}^M i Z_m Y_m \quad (\because \text{Step 2 の直後の等式を各項へ適用}) \\
&= i K_2^* (Z_1 Y_1 + \cdots + Z_M Y_M) \quad (\because \text{スカラー倍の分配律と有限和を項ごとに書く})
\end{aligned}$$

両辺へ行列指数関数を適用し、定義 5.8 の V_2 と $s_2 = \sinh 2K_2$ の定義を使うと

$$\begin{aligned}
V_2 &= (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp(K_2^* (\sigma_1^x + \cdots + \sigma_M^x)) \quad (\because V_2 \text{ の定義}) \\
&= (2s_2)^{M/2} \exp(K_2^* (\sigma_1^x + \cdots + \sigma_M^x)) \quad (\because s_2 = \sinh 2K_2) \\
&= (2s_2)^{M/2} \exp(i K_2^* (Z_1 Y_1 + \cdots + Z_M Y_M)) \quad (\because \text{直前の指数の等式})
\end{aligned}$$

□

定義 5.12 ($\text{end} : \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \rightarrow \text{End}(\mathcal{F})$). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、

$$\mathcal{F} := \mathbb{C}^{2^M}$$

とおく (2^M 次元の数ベクトル全体。定義 3.1 のクロネッカー積 $v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M$ が住む空間である)。 $\mathbb{C}^2$ の標準基底を $e_1 := (1, 0)$, $e_2 := (0, 1)$ 、 $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の行列単位を E_{ij} ((i, j) 成分が 1 で他が 0, $i, j \in \{1, 2\}$) とする。多重添字 $\mathcal{I} := \{1, 2\}^M$ の元 $I = (i_1, \dots, i_M)$, $J = (j_1, \dots, j_M)$ について

$$f_I := e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M} \in \mathcal{F}, \quad E_{I,J} := E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M} \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

とおく (定義 3.1 のクロネッカー積。 $f_I \in \mathbb{C}^{2^M}$ は数ベクトル、 $E_{I,J} \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ は 2^M 次の複素行列である)。定理 3.5 (3) と (1) より $(f_I)_{I \in \mathcal{I}}$ は $\mathcal{F}$ の $\mathbb{C}$ -基底 ($\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{F} = 2^M$) であり、

$(E_{I,J})_{I,J \in \mathcal{I}}$ は $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$ -基底 ($\dim_{\mathbb{C}} = 4^M$) である。さらに $\Theta_{I,J} \in \text{End}(\mathcal{F})$ を、基底 $(f_K)_{K \in \mathcal{I}}$ 上の値

$$\Theta_{I,J}(f_K) := \begin{cases} f_I & (K = J) \\ 0 & (K \neq J) \end{cases}$$

で定まる $\mathbb{C}$ -線型写像とする (基底上の値を与えれば線型写像が一意に定まる)。このとき **end** を、基底 $(E_{I,J})$ 上で

$$\mathbf{end}(E_{I,J}) := \Theta_{I,J} \quad (I, J \in \mathcal{I})$$

と定めて $\mathbb{C}$ -線型に拡張した写像

$$\mathbf{end} : \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \rightarrow \text{End}(\mathcal{F})$$

とおく (この写像が積と単位行列を保つ全単射であることは、直後の主張で成分計算から示す)。 $A \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の $\mathcal{F}$ への作用 Af ($f \in \mathcal{F}$) は、以後つねに $(\mathbf{end}(A))(f)$ を意味する。

主張 5.13 (**end** は単位的 $\mathbb{C}$ -代数の同型). 定義 5.12 の **end** について、次が成り立つ。

- (1) **end** は $\mathbb{C}$ -線型同型 (全単射) である。
- (2) $\mathbf{end}(AB) = \mathbf{end}(A) \circ \mathbf{end}(B)$ ($A, B \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$)。
- (3) $\mathbf{end}\left(I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}\right) = \text{id}_{\mathcal{F}}$ 。

証明. 記号は 定義 5.12 のものとする。多重添字 $I, J \in \mathcal{I} = \{1, 2\}^M$ について $\delta_{I,J} := 1$ ($I = J$)、 0 ($I \neq J$) とおく。成分ごとの $\delta_{i,j}$ についても同様とし、 $I = J \iff \forall m, i_m = j_m$ より

$$\delta_{I,J} = \prod_{m=1}^M \delta_{i_m, j_m}$$

が成り立つ。

Step 1: $(\Theta_{I,J})_{I,J \in \mathcal{I}}$ は $\text{End}(\mathcal{F})$ の $\mathbb{C}$ -基底である。まず張ること: $T \in \text{End}(\mathcal{F})$ を任意に取り、基底 (f_I) による表示 $T(f_J) = \sum_{I \in \mathcal{I}} t_{I,J} f_I$ ($t_{I,J} \in \mathbb{C}$ は一意) を取ると、任意の $K \in \mathcal{I}$ について

$$\begin{aligned} \left(\sum_{I,J \in \mathcal{I}} t_{I,J} \Theta_{I,J} \right) (f_K) &= \sum_{I,J \in \mathcal{I}} t_{I,J} \Theta_{I,J}(f_K) \quad (\because \text{線型写像の和とスカラー倍の値の定義}) \\ &= \sum_{I,J \in \mathcal{I}} t_{I,J} \delta_{J,K} f_I \quad (\because \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I \text{ (}\Theta_{I,J} \text{ の定義)}) \\ &= \sum_{I \in \mathcal{I}} t_{I,K} f_I \quad (\because \delta_{J,K} \text{ は } J = K \text{ のときだけ } 1 \text{ で他は } 0) \\ &= T(f_K) \quad (\because T(f_K) = \sum_{I \in \mathcal{I}} t_{I,K} f_I \text{ (表示の取り方)}) \end{aligned}$$

であり、基底上で一致する線型写像は等しいから $T = \sum_{I,J} t_{I,J} \Theta_{I,J}$ 。次に線型独立性: $c_{I,J} \in \mathbb{C}$ が $\sum_{I,J} c_{I,J} \Theta_{I,J} = 0$ を満たすとする、各 K について次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
0 &= \left(\sum_{I,J \in \mathcal{I}} c_{I,J} \Theta_{I,J} \right) (f_K) \quad (\because \sum_{I,J} c_{I,J} \Theta_{I,J} = 0) \\
&= \sum_{I,J \in \mathcal{I}} c_{I,J} \delta_{J,K} f_I \quad (\because \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I \text{ と線型写像の和の値の定義}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} c_{I,K} f_I \quad (\because \delta_{J,K} \text{ は } J = K \text{ のときだけ } 1 \text{ で他は } 0)
\end{aligned}$$

(f_I) が基底だからすべての I で $c_{I,K} = 0$ 。 K は任意だからすべての係数が 0 である。

Step 2: (1)。 **end** は基底 $(E_{I,J})$ を基底 $(\Theta_{I,J})$ へ、添字を保って一対一に写す線型写像である。基底を基底へ写す線型写像は全単射である（基底の像が張るので全射、基底の像が線型独立なので単射）。

Step 3: (2)。両辺は (A, B) について $\mathbb{C}$ -双線型（左辺は積の双線型性と **end** の線型性、右辺は写像の合成の双線型性）だから、基底の元 $A = E_{I,J}$, $B = E_{K,L}$ について示せば十分である。 $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の行列単位積は $E_{ij}E_{kl} = \delta_{j,k}E_{il}$ （成分計算）であるから、クロネッカー積の積の規則（主張 3.2 (1)）と各因子についての $\mathbb{C}$ -線型性（主張 3.3）より

$$\begin{aligned}
E_{I,J}E_{K,L} &= (E_{i_1j_1}E_{k_1l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{i_Mj_M}E_{k_Ml_M}) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= (\delta_{j_1,k_1}E_{i_1l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\delta_{j_M,k_M}E_{i_Ml_M}) \quad (\because E_{ij}E_{kl} = \delta_{j,k}E_{il} \text{ を各因子へ同時に適用}) \\
&= \left(\prod_{m=1}^M \delta_{j_m,k_m} \right) (E_{i_1l_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_Ml_M}) \quad (\because \text{各因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= \left(\prod_{m=1}^M \delta_{j_m,k_m} \right) E_{I,L} \quad (\because E_{I,L} \text{ の定義}) \\
&= \delta_{J,K} E_{I,L} \quad (\because \delta_{J,K} = \prod_{m=1}^M \delta_{j_m,k_m})
\end{aligned}$$

一方、任意の $P \in \mathcal{I}$ について

$$\begin{aligned}
(\Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L})(f_P) &= \Theta_{I,J}(\Theta_{K,L}(f_P)) \quad (\because \text{写像の合成の定義}) \\
&= \Theta_{I,J}(\delta_{L,P} f_K) \quad (\because \Theta_{K,L}(f_P) = \delta_{L,P} f_K \text{ } (\Theta_{K,L} \text{ の定義})) \\
&= \delta_{L,P} \Theta_{I,J}(f_K) \quad (\because \Theta_{I,J} \text{ の } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= \delta_{L,P} \delta_{J,K} f_I \quad (\because \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I \text{ } (\Theta_{I,J} \text{ の定義})) \\
&= \delta_{J,K} \delta_{L,P} f_I \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則}) \\
&= \delta_{J,K} \Theta_{I,L}(f_P) \quad (\because \Theta_{I,L}(f_P) = \delta_{L,P} f_I \text{ } (\Theta_{I,L} \text{ の定義}))
\end{aligned}$$

であり、基底上で一致するから $\Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L} = \delta_{J,K} \Theta_{I,L}$ 。 よって

$$\begin{aligned}
\mathbf{end}(E_{I,J}E_{K,L}) &= \mathbf{end}(\delta_{J,K}E_{I,L}) \quad (\because \text{上で示した } E_{I,J}E_{K,L} = \delta_{J,K}E_{I,L}) \\
&= \delta_{J,K} \mathbf{end}(E_{I,L}) \quad (\because \mathbf{end} \text{ の } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= \delta_{J,K} \Theta_{I,L} \quad (\because \mathbf{end}(E_{I,L}) = \Theta_{I,L} \text{ } (\mathbf{end} \text{ の定義})) \\
&= \Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L} \quad (\because \text{上で示した } \Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L} = \delta_{J,K} \Theta_{I,L}) \\
&= \mathbf{end}(E_{I,J}) \circ \mathbf{end}(E_{K,L}) \quad (\because \mathbf{end} \text{ の定義を 2 箇所へ同時に適用})
\end{aligned}$$

Step 4: (3)。 $I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}$ 、主張 3.2 (2)、およびクロネッカー積の各因子についての $\mathbb{C}$ -線型性（主張 3.3。和で展開する）より

$$\begin{aligned}
I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} &= \underbrace{I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}}_M & (\because \text{クロネッカー積の単位元の規則}) \\
&= \underbrace{(E_{11} + E_{22}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{11} + E_{22})}_M & (\because I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} = E_{11} + E_{22} \text{ を各因子へ同時に適用}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} E_{i_1 i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M i_M} & (\because \text{各因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性で和を展開}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} E_{I, I} & (\because E_{I, I} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

であり、各 $K \in \mathcal{I}$ について

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{I \in \mathcal{I}} \Theta_{I, I} \right) (f_K) &= \sum_{I \in \mathcal{I}} \Theta_{I, I} (f_K) & (\because \text{線型写像の和の値の定義}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} \delta_{I, K} f_I & (\because \Theta_{I, J} (f_K) = \delta_{J, K} f_I \text{ (}\Theta_{I, J} \text{ の定義) を } J = I \text{ に取ること}) \\
&= f_K & (\because \delta_{I, K} \text{ は } I = K \text{ のときだけ } 1 \text{ で他は } 0) \\
&= \text{id}_{\mathcal{F}} (f_K) & (\because \text{恒等写像の定義})
\end{aligned}$$

であり、基底上で一致する線型写像は等しいから $\sum_I \Theta_{I, I} = \text{id}_{\mathcal{F}}$ である。したがって次の一続きの式変形を得る。

$$\begin{aligned}
\text{end} \left(I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) &= \text{end} \left(\sum_{I \in \mathcal{I}} E_{I, I} \right) & (\because I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} = \sum_{I \in \mathcal{I}} E_{I, I} \text{ を上で示した}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} \text{end}(E_{I, I}) & (\because \text{end の } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} \Theta_{I, I} & (\because \text{end}(E_{I, I}) = \Theta_{I, I} \text{ (end の定義)}) \\
&= \text{id}_{\mathcal{F}} & (\because \sum_{I \in \mathcal{I}} \Theta_{I, I} = \text{id}_{\mathcal{F}} \text{ を上で示した})
\end{aligned}$$

□

主張 5.14 (クロネッカー積で作る行列の作用). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, A_1, \dots, A_M \in \text{Mat}(2, \mathbb{C}), v_1, \dots, v_M \in \mathbb{C}^2$ とする。定義 5.12 の写像について

$$(\text{end}(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)) (v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M) = (A_1 v_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M v_M)$$

が成り立つ。

証明. 主張 3.3 より、両辺は $A_1, \dots, A_M, v_1, \dots, v_M$ の各々について $\mathbb{C}$ -線型であるから、 $A_m = E_{i_m j_m}, v_m = e_{k_m}$ の場合に示せば十分である。 $E_{ij} e_k = \delta_{j, k} e_i$ (成分計算) より右辺は

$$\begin{aligned}
(E_{i_1 j_1} e_{k_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{i_M j_M} e_{k_M}) &= (\delta_{j_1, k_1} e_{i_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\delta_{j_M, k_M} e_{i_M}) & (\because E_{ij} e_k = \delta_{j, k} e_i \text{ を各因子へ同時に適用}) \\
&= \left(\prod_{m=1}^M \delta_{j_m, k_m} \right) (e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M}) & (\because \text{各因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= \left(\prod_{m=1}^M \delta_{j_m, k_m} \right) f_I & (\because f_I \text{ の定義}) \\
&= \delta_{J, K} f_I & (\because \delta_{J, K} = \prod_{m=1}^M \delta_{j_m, k_m})
\end{aligned}$$

であり、左辺は

$$\begin{aligned} (\mathbf{end}(E_{I,J}))(f_K) &= \Theta_{I,J}(f_K) \quad (\because \mathbf{end}(E_{I,J}) = \Theta_{I,J} \text{ (end の定義)}) \\ &= \delta_{J,K} f_I \quad (\because \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I \text{ (}\Theta_{I,J} \text{ の定義)}) \end{aligned}$$

であるから一致する。 $\square$

主張 5.15 (行列表示と線型写像表示は指数関数を保つ). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $A \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$, $f \in \mathcal{F} = \mathbb{C}^{2^M}$ とする。定義 5.12 の写像と 定義 4.4 の行列指数関数について

$\mathbf{end}(A)^0 := \text{id}_{\mathcal{F}}$, $\mathbf{end}(A)^{n+1} := \mathbf{end}(A)^n \circ \mathbf{end}(A)$ ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) と定める。このとき

$$(\mathbf{end}(\exp(A)))(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} (\mathbf{end}(A)^n)(f) \quad (\mathcal{F} \text{ のノルムに関する収束})$$

が成り立つ。右辺は線型写像の指数関数という未定義の記号を使わず、数ベクトルの極限として定める。

証明. Step 1: すべての $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\mathbf{end}(A^n) = \mathbf{end}(A)^n$ 。主張 5.13 の単位元保存より、

$$\begin{aligned} \mathbf{end}(A^0) &= \mathbf{end}(I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}) \quad (\because A^0 = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \text{ という行列の零乗の定義}) \\ &= \text{id}_{\mathcal{F}} \quad (\because \mathbf{end} \text{ の単位元保存}) \\ &= \mathbf{end}(A)^0 \quad (\because \text{線型写像の零乗の定義}). \end{aligned}$$

n で成り立つと仮定する。主張 5.13 の乗法性より

$$\begin{aligned} \mathbf{end}(A^{n+1}) &= \mathbf{end}(A^n A) \quad (\because \text{行列の冪の定義}) \\ &= \mathbf{end}(A^n) \circ \mathbf{end}(A) \quad (\because \mathbf{end} \text{ の乗法性}) \\ &= \mathbf{end}(A)^n \circ \mathbf{end}(A) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= \mathbf{end}(A)^{n+1} \quad (\because \text{線型写像の冪の定義}). \end{aligned}$$

Step 2: $S_N := \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} A^n$, $S := \exp(A)$ とおく。定義 4.4 と 定理 4.3 の数ベクトルへの作用の各点収束より、

$$S_N f \longrightarrow S f \quad (\mathcal{F} \text{ のノルムに関する収束})$$

が成り立つ。定義 5.12 の作用の記法と 主張 5.13 の線型性、および Step 1 より、各 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned} S_N f &= (\mathbf{end}(S_N))(f) \quad (\because \text{行列の作用の記法}) \\ &= \left(\mathbf{end} \left(\sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} A^n \right) \right) (f) \quad (\because S_N \text{ の定義}) \\ &= \left(\sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} \mathbf{end}(A^n) \right) (f) \quad (\because \mathbf{end} \text{ の } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\ &= \left(\sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} \mathbf{end}(A)^n \right) (f) \quad (\because \text{Step 1 を各 } n \in \{0, \dots, N\} \text{ へ適用}) \\ &= \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} (\mathbf{end}(A)^n)(f) \quad (\because \text{線型写像の有限和とスカラー倍の値の定義}). \end{aligned}$$

また $S f = (\mathbf{end}(\exp(A)))(f)$ である。Step 2 の収束でこの部分并表示を用いれば、主張の極限等式を得る。 $\square$

定義 5.16 (ε の固有値 $+1$ の固有ベクトル全体). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 5.8 の $\varepsilon \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を考える。 ε を 2^M 成分の複素数ベクトルへ 定義 1.8 の通常の行列と数ベクトルの積として作用させ、

$$\mathcal{F}^{(+)} := \left\{ f \in \mathbb{C}^{2^M} \mid \varepsilon f = f \right\}$$

と定める。すなわち $\mathcal{F}^{(+)}$ は、全スピン反転行列を左から掛けても変わらない複素数ベクトルの全体である。

定義 5.17 (ε の固有値 -1 の固有ベクトル全体). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 5.8 の $\varepsilon \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を考える。 ε を 2^M 成分の複素数ベクトルへ 定義 1.8 の通常の行列と数ベクトルの積として作用させ、

$$\mathcal{F}^{(-)} := \left\{ f \in \mathbb{C}^{2^M} \mid \varepsilon f = -f \right\}$$

と定める。すなわち $\mathcal{F}^{(-)}$ は、全スピン反転行列を左から掛けると符号が反転する複素数ベクトルの全体である。

主張 5.18 ($\mathcal{F}^{(+)}$ の複素部分線型空間性). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 5.16 の $\mathcal{F}^{(+)} \subseteq \mathbb{C}^{2^M}$ を考える。この集合は零ベクトルを含み、複素数ベクトルの和と複素スカラー倍について閉じる。すなわち、

$$0 \in \mathcal{F}^{(+)}$$

であり、任意の $f, g \in \mathcal{F}^{(+)}$ と $a \in \mathbb{C}$ に対して、

$$f + g \in \mathcal{F}^{(+)}, \quad af \in \mathcal{F}^{(+)}$$

が成り立つ。したがって $\mathcal{F}^{(+)}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ の複素部分線型空間である。

証明. 定義 1.8 の行列と数ベクトルの積、および 主張 1.35 の複素数の演算法則を用いる。複素数ベクトルの演算は成分ごとに定め、任意の $u, v \in \mathbb{C}^{2^M}$ 、 $a \in \mathbb{C}$ 、 $r \in \{1, \dots, 2^M\}$ に対して $[u + v]_r := u_r + v_r$ および $[au]_r := au_r$ とする。まず零ベクトルを考える。任意の $r \in \{1, \dots, 2^M\}$ について、

$$\begin{aligned} [\varepsilon 0]_r &= \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs} 0 \quad (\because \text{定義 1.8}) \\ &= \sum_{s=1}^{2^M} 0 \quad (\because \text{主張 1.35 の零倍}) \\ &= 0 \quad (\because \text{有限個の零の和}). \end{aligned}$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon 0 = 0$ である。よって 定義 5.16 から $0 \in \mathcal{F}^{(+)}$ である。

次に $f, g \in \mathcal{F}^{(+)}$ とする。定義 5.16 より $\varepsilon f = f$ かつ $\varepsilon g = g$ である。任意の $r \in \{1, \dots, 2^M\}$ について、

$$\begin{aligned}
[\varepsilon(f+g)]_r &= \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs}(f_s + g_s) & (\because \text{定義 1.8}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^M} (\varepsilon_{rs}f_s + \varepsilon_{rs}g_s) & (\because \text{主張 1.35 の分配律}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs}f_s + \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs}g_s & (\because \text{有限和を項ごとに分ける}) \\
&= [\varepsilon f]_r + [\varepsilon g]_r & (\because \text{定義 1.8}) \\
&= f_r + g_r & (\because \varepsilon f = f \text{ かつ } \varepsilon g = g) \\
&= [f+g]_r & (\because \text{複素数ベクトルの和の定義}).
\end{aligned}$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon(f+g) = f+g$ である。よって 定義 5.16 から $f+g \in \mathcal{F}^{(+)}$ である。

最後に $a \in \mathbb{C}$ と $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ を取る。定義 5.16 より $\varepsilon f = f$ である。任意の $r \in \{1, \dots, 2^M\}$ について、

$$\begin{aligned}
[\varepsilon(af)]_r &= \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs}(af_s) & (\because \text{定義 1.8}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^M} (\varepsilon_{rs}a)f_s & (\because \text{主張 1.35 の積の結合律}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^M} (a\varepsilon_{rs})f_s & (\because \text{主張 1.35 の積の可換律}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^M} a(\varepsilon_{rs}f_s) & (\because \text{主張 1.35 の積の結合律}) \\
&= a \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs}f_s & (\because \text{主張 1.35 の分配律を有限回適用}) \\
&= a[\varepsilon f]_r & (\because \text{定義 1.8}) \\
&= af_r & (\because \varepsilon f = f) \\
&= [af]_r & (\because \text{複素数ベクトルのスカラー倍の定義}).
\end{aligned}$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon(af) = af$ である。よって 定義 5.16 から $af \in \mathcal{F}^{(+)}$ である。零ベクトル・和・複素スカラー倍についての三つの結果から、主張を得る。 $\square$

主張 5.19 ($\mathcal{F}^{(-)}$ の複素部分線型空間性). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 5.17 の $\mathcal{F}^{(-)} \subseteq \mathbb{C}^{2^M}$ を考える。この集合は零ベクトルを含み、複素数ベクトルの和と複素スカラー倍について閉じる。すなわち、

$$0 \in \mathcal{F}^{(-)}$$

であり、任意の $f, g \in \mathcal{F}^{(-)}$ と $a \in \mathbb{C}$ に対して、

$$f+g \in \mathcal{F}^{(-)}, \quad af \in \mathcal{F}^{(-)}$$

が成り立つ。したがって $\mathcal{F}^{(-)}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ の複素部分線型空間である。

証明. 定義 1.8 の行列と数ベクトルの積、および 主張 1.35 の複素数の演算法則を用いる。複素数ベクトルの演算は成分ごとに定め、任意の $u, v \in \mathbb{C}^{2^M}$ 、 $a \in \mathbb{C}$ 、 $r \in \{1, \dots, 2^M\}$ に対して $[u + v]_r := u_r + v_r$ 、 $[au]_r := au_r$ および $[-u]_r := -u_r$ とする。まず零ベクトルを考える。任意の $r \in \{1, \dots, 2^M\}$ について、

$$\begin{aligned} [\varepsilon 0]_r &= \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs} 0 \quad (\because \text{定義 1.8}) \\ &= \sum_{s=1}^{2^M} 0 \quad (\because \text{主張 1.35 の零倍}) \\ &= 0 \quad (\because \text{有限個の零の和}) \\ &= -0 \quad (\because \text{主張 1.35 の零の加法逆元}). \end{aligned}$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon 0 = -0$ である。よって 定義 5.17 から $0 \in \mathcal{F}^{(-)}$ である。

次に $f, g \in \mathcal{F}^{(-)}$ とする。定義 5.17 より $\varepsilon f = -f$ かつ $\varepsilon g = -g$ である。任意の $r \in \{1, \dots, 2^M\}$ について、

$$\begin{aligned} [\varepsilon(f + g)]_r &= \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs} (f_s + g_s) \quad (\because \text{定義 1.8}) \\ &= \sum_{s=1}^{2^M} (\varepsilon_{rs} f_s + \varepsilon_{rs} g_s) \quad (\because \text{主張 1.35 の分配律}) \\ &= \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs} f_s + \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs} g_s \quad (\because \text{有限和を項ごとに分ける}) \\ &= [\varepsilon f]_r + [\varepsilon g]_r \quad (\because \text{定義 1.8}) \\ &= -f_r + (-g_r) \quad (\because \varepsilon f = -f \text{ かつ } \varepsilon g = -g) \\ &= -(f_r + g_r) \quad (\because \text{主張 1.35 の和の加法逆元}) \\ &= [-(f + g)]_r \quad (\because \text{複素数ベクトルの加法逆元の定義}). \end{aligned}$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon(f + g) = -(f + g)$ である。よって 定義 5.17 から $f + g \in \mathcal{F}^{(-)}$ である。

最後に $a \in \mathbb{C}$ と $f \in \mathcal{F}^{(-)}$ を取る。定義 5.17 より $\varepsilon f = -f$ である。任意の $r \in \{1, \dots, 2^M\}$ について、

$$\begin{aligned}
[\varepsilon(af)]_r &= \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs}(af_s) \quad (\because \text{定義 1.8}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^M} (\varepsilon_{rs}a)f_s \quad (\because \text{主張 1.35 の積の結合律}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^M} (a\varepsilon_{rs})f_s \quad (\because \text{主張 1.35 の積の可換律}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^M} a(\varepsilon_{rs}f_s) \quad (\because \text{主張 1.35 の積の結合律}) \\
&= a \sum_{s=1}^{2^M} \varepsilon_{rs}f_s \quad (\because \text{主張 1.35 の分配律を有限回適用}) \\
&= a[\varepsilon f]_r \quad (\because \text{定義 1.8}) \\
&= a(-f_r) \quad (\because \varepsilon f = -f) \\
&= -(af_r) \quad (\because \text{主張 1.35 の積と加法逆元の両立}) \\
&= [-(af)]_r \quad (\because \text{複素数ベクトルの加法逆元とスカラー倍の定義}).
\end{aligned}$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon(af) = -(af)$ である。よって 定義 5.17 から $af \in \mathcal{F}^{(-)}$ である。零ベクトル・和・複素スカラー倍についての三つの結果から、主張を得る。 $\square$

主張 5.20 (ε の二つの固有ベクトル集合は複素部分線型空間である). 定義 5.16 で $\mathcal{F}^{(+)}$ を、定義 5.17 で $\mathcal{F}^{(-)}$ を定めた。

主張 5.18 により $\mathcal{F}^{(+)}$ は $\mathbb{C}$ -部分線型空間である。残る $\mathcal{F}^{(-)}$ について、

主張 5.19 により $\mathcal{F}^{(-)}$ も $\mathbb{C}^{2^M}$ の $\mathbb{C}$ -部分線型空間である。

主張 5.21 (ε の二乗). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 5.8 の $\varepsilon \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について、

$$\varepsilon^2 = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$$

証明. まず $I := I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}$ と略記し、 $P_0 := I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ 、 $P_r := \sigma_1^x \cdots \sigma_r^x$ ($1 \leq r \leq M$) と置く。各 $r \in \{0, \dots, M\}$ について、

$$P_r = \underbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}_r \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M-r}$$

を示す。ただし、因子が零個の部分は書かない。 $r = 0$ の場合は、主張 3.2 (2) を繰り返し使うと、右辺は $I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} = P_0$ である。ある $r \in \{0, \dots, M-1\}$ についてこの式が成り立つと仮定する。このとき $r+1 \leq M$ なので、サイト作用素の定義と 主張 3.2 (1)(2) より、

$$\begin{aligned}
P_{r+1} &= P_r \sigma_{r+1}^x = \left(\underbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}_r \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M-r} \right) \left(\underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_r \boxtimes \sigma^x \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M-r-1} \right) \quad (\because \text{帰納法の仮定と } \sigma_{r+1}^x \text{ の定義}) \\
&= \underbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}_r \boxtimes (I \sigma^x) \boxtimes \underbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}_{M-r-1} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \underbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}_{r+1} \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M-r-1} \quad (\because \sigma^x I = I \sigma^x = \sigma^x \text{ と } II = I).
\end{aligned}$$

よって有限帰納法により一般式が成り立つ。 $r = M$ と 定義 5.8 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ の定義から $\varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x$ を得る。したがって、主張 7.1 の $\sigma^x \sigma^x = I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}$ 、および 主張 3.2 (1)(2) より

$$\begin{aligned}
\varepsilon^2 &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)(\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) \quad (\because \varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) \\
&= (\sigma^x \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x \sigma^x) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \underbrace{I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}}_M \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} \text{ を各因子へ同時に適用}) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{クロネッカー積の単位元の規則})
\end{aligned}$$

□

主張 5.22 (ε の行列作用の固有値候補). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 5.8 の $\varepsilon \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を考える。非零ベクトル $f \in \mathbb{C}^{2^M} \setminus \{0\}$ と複素数 $\lambda \in \mathbb{C}$ が $\varepsilon f = \lambda f$ を満たすなら、 λ は 1 または -1 に限る。

証明. 主張 5.21、行列と数ベクトルの積の結合則 定義 1.8、および複素数の体の法則 主張 1.35 を用いる。まず、この証明で使う行列作用の結合則を成分から確かめる。任意の $A, B \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 、 $g \in \mathbb{C}^{2^M}$ 、 $i \in \{1, \dots, 2^M\}$ について、

$$\begin{aligned}
((AB)g)_i &= \sum_{k=1}^{2^M} (AB)_{ik} g_k \quad (\because \text{定義 1.8 の数ベクトルへの作用の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} \left(\sum_{\ell=1}^{2^M} A_{i\ell} B_{\ell k} \right) g_k \quad (\because \text{定義 1.8 の行列積の成分の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} \sum_{\ell=1}^{2^M} (A_{i\ell} B_{\ell k}) g_k \quad (\because \text{主張 1.35 の分配律を有限回適用}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} \sum_{\ell=1}^{2^M} A_{i\ell} (B_{\ell k} g_k) \quad (\because \text{主張 1.35 の積の結合律}) \\
&= \sum_{\ell=1}^{2^M} \sum_{k=1}^{2^M} A_{i\ell} (B_{\ell k} g_k) \quad (\because \text{有限二重和の順序交換}) \\
&= \sum_{\ell=1}^{2^M} A_{i\ell} \left(\sum_{k=1}^{2^M} B_{\ell k} g_k \right) \quad (\because \text{主張 1.35 の分配律を有限回適用}) \\
&= (A(Bg))_i \quad (\because \text{定義 1.8 の数ベクトルへの作用の定義}).
\end{aligned}$$

したがって $(AB)g = A(Bg)$ である。同様に、任意の $\mu \in \mathbb{C}$ について、

$$\begin{aligned}
(A(\mu g))_i &= \sum_{k=1}^{2^M} A_{ik}(\mu g_k) \quad (\because \text{定義 1.8 の数ベクトルへの作用の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} (A_{ik}\mu)g_k \quad (\because \text{主張 1.35 の積の結合律}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} (\mu A_{ik})g_k \quad (\because \text{主張 1.35 の積の交換律}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} \mu(A_{ik}g_k) \quad (\because \text{主張 1.35 の積の結合律}) \\
&= \mu \sum_{k=1}^{2^M} A_{ik}g_k \quad (\because \text{主張 1.35 の分配律を有限回適用}) \\
&= (\mu(Ag))_i \quad (\because \text{定義 1.8 の数ベクトルへの作用の定義}).
\end{aligned}$$

したがって $A(\mu g) = \mu(Ag)$ である。また、単位行列の作用も成分から確かめると、任意の $i \in \{1, \dots, 2^M\}$ について、

$$\begin{aligned}
(I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}f)_i &= \sum_{k=1}^{2^M} (I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})})_{ik}f_k \quad (\because \text{定義 1.8 の数ベクトルへの作用の定義}) \\
&= f_i \quad (\because \text{単位行列の成分と主張 1.35 の } 0, 1 \text{ の法則}).
\end{aligned}$$

したがって $I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}f = f$ である。以上の三つの等式と仮定 $\varepsilon f = \lambda f$ を二回適用すると、

$$\begin{aligned}
f &= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}f \quad (\because \text{直前に成分ごとに示した単位行列の作用}) \\
&= \varepsilon^2 f \quad (\because \text{主張 5.21}) \\
&= \varepsilon(\varepsilon f) \quad (\because \text{定義 1.8, 主張 1.35 から直前に成分ごとに示した結合則}) \\
&= \varepsilon(\lambda f) \quad (\because \varepsilon f = \lambda f) \\
&= \lambda(\varepsilon f) \quad (\because \text{定義 1.8, 主張 1.35 から直前に成分ごとに示した複素線型性}) \\
&= \lambda(\lambda f) \quad (\because \varepsilon f = \lambda f) \\
&= (\lambda\lambda)f \quad (\because \text{主張 1.35 の積の結合則}) \\
&= \lambda^2 f \quad (\because \lambda^2 = \lambda\lambda \text{ という二乗の定義}).
\end{aligned}$$

$f \neq 0$ だから、ある $j \in \{1, \dots, 2^M\}$ について $f_j \neq 0$ である。等式 $f = \lambda^2 f$ の第 j 成分を比べると $f_j = \lambda^2 f_j$ だから、

$$\begin{aligned}
\lambda^2 f_j - f_j &= 0 \quad (\because f_j = \lambda^2 f_j \text{ の両辺から } f_j \text{ を引く}) \\
(\lambda^2 - 1)f_j &= \lambda^2 f_j - 1f_j \quad (\because \text{主張 1.35 の分配律}) \\
&= \lambda^2 f_j - f_j \quad (\because 1f_j = f_j) \\
&= 0 \quad (\because \lambda^2 f_j - f_j = 0) \\
\lambda^2 - 1 &= 0 \quad (\because f_j \neq 0 \text{ と主張 1.35 の零積則}) \\
(\lambda - 1)(\lambda + 1) &= \lambda^2 - 1 \quad (\because \text{主張 1.35 の分配律}) \\
&= 0 \quad (\because \lambda^2 - 1 = 0) \\
\lambda - 1 = 0 \quad \text{または} \quad \lambda + 1 &= 0 \quad (\because \text{主張 1.35 の零積則}) \\
\lambda = 1 \quad \text{または} \quad \lambda = -1 &\quad (\because \text{主張 1.35 の加法}).
\end{aligned}$$

□

主張 5.23 (V_1 の固有空間への制限). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 5.8 の V_1 、定義 5.12 の **end**、主張 5.20 の $\mathcal{F}^{(\pm)}$ について (複号同順)、

$$(\mathbf{end}(V_1))|_{\mathcal{F}^{(\pm)}} = (\mathbf{end}(\exp(iK_1(Y_1Z_2 + \cdots + Y_{M-1}Z_M \mp Y_MZ_1))))|_{\mathcal{F}^{(\pm)}}$$

が成り立つ。両辺は $\mathcal{F}^{(\pm)}$ から $\mathcal{F}$ への写像として一致する、という意味である (右辺の $\exp(\cdots)$ をこの証明内で $V_1^{(\pm)}$ と略記する)。

証明. 記号を固定する。主張 5.10 より $V_1 = \exp(G)$ 、また上の略記より $V_1^{(\pm)} = \exp(G^{(\pm)})$ 。ここで

$$\begin{aligned} W &:= Y_M Z_1 \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \\ G &:= iK_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} - \varepsilon W \right) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \\ G^{(\pm)} &:= iK_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} \mp W \right) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \end{aligned}$$

である (複号同順)。以下 $A \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ に対し $\hat{A} := \mathbf{end}(A) \in \text{End}(\mathcal{F})$ と書く。主張 5.13 より $\widehat{AB} = \hat{A} \circ \hat{B}$ かつ $A \mapsto \hat{A}$ は $\mathbb{C}$ -線型である。

Step 1: ε は各 Z_m, Y_m ($m \in \{1, \dots, M\}$) と反交換する。すなわち

$$\varepsilon Z_m = -Z_m \varepsilon, \quad \varepsilon Y_m = -Y_m \varepsilon$$

主張 5.10 の証明 Step 1 と同じクロネッカー積による表示

$$\varepsilon = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^M, \quad Z_m = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m}, \quad Y_m = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m}$$

のもとで 主張 7.2 を $X = \varepsilon$ 、 $Y = Z_m$ に適用する。第 k 因子の組 (x_k, y_k) は

- $k < m$ のとき (σ^x, σ^x) 。 $\sigma^x \sigma^x = \sigma^x \sigma^x$ より可換。
- $k = m$ のとき (σ^x, σ^z) 。 主張 7.1 の $\sigma^z \sigma^x = -\sigma^x \sigma^z$ より反可換。
- $k > m$ のとき (σ^x, I) 。 $I \sigma^x = \sigma^x I$ より可換。

であり、反可換なサイトはちょうど 1 つ ($k = m$) だから $[\varepsilon, Z_m]_+ = \varepsilon Z_m + Z_m \varepsilon = 0$ 、すなわち $\varepsilon Z_m = -Z_m \varepsilon$ 。 Y_m についても、 $k = m$ の組が (σ^x, σ^y) で 主張 7.1 の $\sigma^y \sigma^x = -\sigma^x \sigma^y$ より反可換、他のサイトは同じく可換であるから $\varepsilon Y_m = -Y_m \varepsilon$ 。

Step 2: ε は W 、各 $Y_m Z_{m+1}$ 、 εW 、および $G, G^{(\pm)}$ と可換である。実際、 $a, b \in \{1, \dots, M\}$ について Step 1 を 2 回使うと

$$\begin{aligned} \varepsilon(Y_a Z_b) &= (\varepsilon Y_a) Z_b && (\because \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \text{ の積の結合律}) \\ &= (-Y_a \varepsilon) Z_b && (\because \text{Step 1 の } \varepsilon Y_a = -Y_a \varepsilon) \\ &= -(Y_a \varepsilon) Z_b && (\because \text{スカラー倍と積の可換性}) \\ &= -Y_a (\varepsilon Z_b) && (\because \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \text{ の積の結合律}) \\ &= -Y_a (-Z_b \varepsilon) && (\because \text{Step 1 の } \varepsilon Z_b = -Z_b \varepsilon) \\ &= (Y_a Z_b) \varepsilon && (\because \text{スカラー倍と積の可換性、および } -(-1) = 1) \end{aligned}$$

が成り立つ。特に $\varepsilon W = W \varepsilon$ かつ $\varepsilon(Y_m Z_{m+1}) = (Y_m Z_{m+1}) \varepsilon$ 。また

$$\begin{aligned}\varepsilon(\varepsilon W) &= \varepsilon(W\varepsilon) \quad (\because \text{上で示した } \varepsilon W = W\varepsilon) \\ &= (\varepsilon W)\varepsilon \quad (\because \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \text{ の積の結合律})\end{aligned}$$

であるから、 $G, G^{(\pm)}$ はいずれも ε と可換な元の $\mathbb{C}$ -線型結合であり、積の双線型性より $\varepsilon G = G\varepsilon$ 、 $\varepsilon G^{(\pm)} = G^{(\pm)}\varepsilon$ 。

Step 3: $\mathcal{F}^{(\pm)}$ は $\hat{W}, \hat{G}, \hat{G}^{(\pm)}$ で不変である。 $A \in \{W, G, G^{(\pm)}\}$ は Step 2 より $\varepsilon A = A\varepsilon$ を満たすから、主張 5.13 (2) より次が成り立つ。

$$\begin{aligned}\hat{\varepsilon} \circ \hat{A} &= \widehat{\varepsilon A} \quad (\because \text{end が積を保つこと}) \\ &= \widehat{A\varepsilon} \quad (\because \text{Step 2 の } \varepsilon A = A\varepsilon) \\ &= \hat{A} \circ \hat{\varepsilon} \quad (\because \text{end が積を保つこと})\end{aligned}$$

よって $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ (すなわち $\hat{\varepsilon}f = \pm f$) に対し

$$\begin{aligned}\hat{\varepsilon}(\hat{A}f) &= \hat{A}(\hat{\varepsilon}f) \quad (\because \hat{\varepsilon} \circ \hat{A} = \hat{A} \circ \hat{\varepsilon}) \\ &= \hat{A}(\pm f) \quad (\because f \in \mathcal{F}^{(\pm)} \text{ すなわち } \hat{\varepsilon}f = \pm f) \\ &= \pm \hat{A}f \quad (\because \hat{A} \text{ の線型性})\end{aligned}$$

であり $\hat{A}f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ 。

Step 4: $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ に対し $\hat{G}f = \hat{G}^{(\pm)}f$ 。まず $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の中で

$$\begin{aligned}G - G^{(\pm)} &= iK_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} - \varepsilon W \right) - iK_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} \mp W \right) \quad (\because G, G^{(\pm)} \text{ の定義}) \\ &= iK_1 \left(\left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} - \varepsilon W \right) - \left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} \mp W \right) \right) \quad (\because \text{スカラー倍の分配則}) \\ &= iK_1 (-\varepsilon W \pm W) \quad (\because \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \text{ の加法の四則})\end{aligned}$$

である。主張 5.13 の線型性と (2) より $\widehat{\varepsilon W} = \hat{\varepsilon} \circ \hat{W}$ だから、Step 3 の $\hat{W}f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ を使って

$$\begin{aligned}(\hat{G} - \hat{G}^{(\pm)})f &= \widehat{(G - G^{(\pm)})}f \quad (\because \text{end の線型性 (差の像は像の差)}) \\ &= \widehat{iK_1 (-\varepsilon W \pm W)}f \quad (\because \text{上で示した } G - G^{(\pm)} \text{ の表示}) \\ &= iK_1 \widehat{(-\varepsilon W \pm W)}f \quad (\because \text{end の線型性}) \\ &= iK_1 \left(-\widehat{\varepsilon W} \pm \widehat{W}f \right) \quad (\because \widehat{\varepsilon W} = \hat{\varepsilon} \circ \hat{W} \text{ (end が積を保つこと) と写像の値の書き下し}) \\ &= iK_1 \left(-(\pm \hat{W}f) \pm \hat{W}f \right) \quad (\because \hat{W}f \in \mathcal{F}^{(\pm)} \text{ より } \hat{\varepsilon}(\hat{W}f) = \pm \hat{W}f \text{ (Step 3)}) \\ &= iK_1 (\mp \hat{W}f \pm \hat{W}f) \quad (\because -(\pm x) = \mp x) \\ &= iK_1 \cdot 0 \quad (\because \mp x \pm x = 0 \text{ (複号同順)}) \\ &= 0 \quad (\because \text{零ベクトルのスカラー倍は零ベクトル})\end{aligned}$$

が成り立つ (複号同順)。よって $\hat{G}f = \hat{G}^{(\pm)}f$ 。

Step 5: $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ について $\hat{G}^n f = \left(\hat{G}^{(\pm)} \right)^n f$ ($\hat{G}^0 := \text{id}_{\mathcal{F}}$)。 n についての帰納法で示す。 $n = 0$ では

$$\begin{aligned}
\hat{G}^0 f &= \text{id}_{\mathcal{F}}(f) & (\because \text{写像の零乗の定義}) \\
&= f & (\because \text{恒等写像の定義}) \\
&= \text{id}_{\mathcal{F}}(f) & (\because \text{恒等写像の定義}) \\
&= \left(\hat{G}^{(\pm)}\right)^0 f & (\because \text{写像の零乗の定義})
\end{aligned}$$

である。 n で成立するとし $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ を取ると、Step 4 より $g := \hat{G}f = \hat{G}^{(\pm)}f$ であり、Step 3 より $g \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ だから帰納法の仮定を g に適用でき、

$$\begin{aligned}
\hat{G}^{n+1} f &= \hat{G}^n (\hat{G}f) & (\because \text{写像の冪の定義}) \\
&= \hat{G}^n g & (\because g := \hat{G}f) \\
&= \left(\hat{G}^{(\pm)}\right)^n g & (\because \text{帰納法の仮定を } g \in \mathcal{F}^{(\pm)} \text{ に適用}) \\
&= \left(\hat{G}^{(\pm)}\right)^n \left(\hat{G}^{(\pm)}f\right) & (\because \text{Step 4 の } g = \hat{G}^{(\pm)}f) \\
&= \left(\hat{G}^{(\pm)}\right)^{n+1} f & (\because \text{写像の冪の定義})
\end{aligned}$$

Step 6: $\exp$ への持ち上げ。主張 5.15 を $A = G$ と $A = G^{(\pm)}$ に適用する。任意の $f \in \mathcal{F}$ について、

$$\begin{aligned}
(\mathbf{end}(V_1))(f) &= (\mathbf{end}(\exp(G)))(f) & (\because V_1 = \exp(G)) \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} \hat{G}^n f & (\because \text{行列表示と線型写像表示の間の指数関数保存}),
\end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned}
(\mathbf{end}(V_1^{(\pm)}))(f) &= (\mathbf{end}(\exp(G^{(\pm)})))(f) & (\because V_1^{(\pm)} = \exp(G^{(\pm)})) \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} \left(\hat{G}^{(\pm)}\right)^n f & (\because \text{行列表示と線型写像表示の間の指数関数保存})
\end{aligned}$$

が成り立つ。ここで解析的操作 ($\mathbb{C}$ 上の無限級数の極限) へ移行するのはこの箇所だけであり、Step 1~5 はすべて有限個の元の代数的な等式である。

いま $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ を任意に取る。Step 5 より、各 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について部分和が

$$\begin{aligned}
S_N &:= \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} \hat{G}^n f = \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} \left(\hat{G}^{(\pm)}\right)^n f & (\because \text{Step 5 を各 } n \in \{0, \dots, N\} \text{ に適用}) \\
&=: S_N^{(\pm)} & (\because S_N^{(\pm)} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

と一致する。上の各点収束より $S_N \rightarrow (\mathbf{end}(V_1))(f)$ かつ $S_N^{(\pm)} = S_N \rightarrow (\mathbf{end}(V_1^{(\pm)}))(f)$ であり、同一の点列が 2 つの極限 α, β を持てば、ノルムの三角不等式と極限の定義から次の鎖を得る。主張 3.9 のノルムの非負性・三角不等式・非退化性を用いる。

$$\begin{aligned}
0 &\leq \|\alpha - \beta\| & (\because \text{ノルムの非負性}) \\
&\leq \|\alpha - S_N\| + \|S_N - \beta\| & (\because \alpha - \beta = (\alpha - S_N) + (S_N - \beta) \text{ と三角不等式}) \\
&\rightarrow 0 & (\because S_N \rightarrow \alpha \text{ かつ } S_N \rightarrow \beta).
\end{aligned}$$

したがって次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}\|\alpha - \beta\| &= 0 \quad (\because 0 \leq \|\alpha - \beta\| \leq \|\alpha - S_N\| + \|S_N - \beta\| \rightarrow 0) \\ \alpha &= \beta \quad (\because \|\alpha - \beta\| = 0 \text{ なら } \alpha - \beta = 0).\end{aligned}$$

よって

$$(\mathbf{end}(V_1))f = \left(\mathbf{end}\left(V_1^{(\pm)}\right)\right)f \quad (\because \text{同一の点列 } S_N = S_N^{(\pm)} \text{ の極限の一意性})$$

$f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ は任意だったから、 $\mathcal{F}^{(\pm)}$ 上の写像として

$$\begin{aligned}(\mathbf{end}(V_1))|_{\mathcal{F}^{(\pm)}} &= \left(\mathbf{end}\left(V_1^{(\pm)}\right)\right)|_{\mathcal{F}^{(\pm)}} & (\because \text{上の等式が任意の } f \in \mathcal{F}^{(\pm)} \text{ で成り立つこと}) \\ &= (\mathbf{end}(\exp(iK_1(Y_1Z_2 + \cdots + Y_{M-1}Z_M \mp Y_MZ_1))))|_{\mathcal{F}^{(\pm)}} & (\because V_1^{(\pm)} \text{ の定義})\end{aligned}$$

が示された。 □

定義 5.24 ($V_1^{(\pm)}$ の定義). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし (複号同順)、定義 5.8 の K_1, Y_m, Z_m を用いて

$$V_1^{(\pm)} := \exp(iK_1(Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M-1}Z_M \mp Y_MZ_1)) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

とおく。exp は 定義 5.12 の同一視のもとでの 定義 4.4 の exp である。

定義 5.25 ($\delta_{(\mu, \nu)}^M$ の定義).

$$\delta_{(\mu, \nu)}^M := \begin{cases} 1 & (\mu \equiv \nu \pmod{M}) \\ 0 & (\mu \not\equiv \nu \pmod{M}) \end{cases}$$

主張 5.26. $k \in \mathbb{Z}$ について、

$$\sum_{j=1}^M \exp\left(\frac{2\pi i j k}{M}\right) = M \delta_{(k, 0)}^M$$

証明. $k \equiv 0 \pmod{M}$ であるか否かで場合を分ける。

(a) $k \equiv 0 \pmod{M}$ のとき。 $k = lM$ を満たす $l \in \mathbb{Z}$ を 1 つ取る。

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^M \exp\left(\frac{2\pi i j k}{M}\right) &= \sum_{j=1}^M \exp\left(\frac{2\pi i j \cdot lM}{M}\right) & (\because k = lM) \\ &= \sum_{j=1}^M \exp(2\pi i l j) & (\because M \text{ で約分した}) \\ &= \sum_{j=1}^M (\cos 2\pi l j + i \sin 2\pi l j) & (\because \text{オイラーの公式}) \\ &= \sum_{j=1}^M (1 + i \cdot 0) & (\because l j \in \mathbb{Z} \text{ なので } \cos 2\pi l j = 1, \sin 2\pi l j = 0) \\ &= \sum_{j=1}^M 1 & (\because 1 + i \cdot 0 = 1) \\ &= M & (\because \text{項数が } M \text{ である}) \\ &= M \delta_{(k, 0)}^M & (\because k \equiv 0 \pmod{M} \text{ なので } \delta_{(k, 0)}^M = 1 \text{ である})\end{aligned}$$

引いたのは 定理 1.54 と 定義 5.25 である。

(b) $k \not\equiv 0 \pmod{M}$ のとき。 $r := \exp\left(\frac{2\pi ik}{M}\right) \in \mathbb{C}$ と置く。 $k \not\equiv 0 \pmod{M}$ なので $r \neq 1$ である。

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^M \exp\left(\frac{2\pi ijk}{M}\right) &= \sum_{j=1}^M r^j & (\because r \text{ の定義と } \exp(a)^j &= \exp(ja)) \\
&= r \cdot \frac{1-r^M}{1-r} & (\because \text{等比数列の和の公式 } (r \neq 1)) \\
&= r \cdot \frac{1-\exp(2\pi ik)}{1-r} & (\because r^M = \exp(2\pi ik)) \\
&= r \cdot \frac{1-1}{1-r} & (\because k \in \mathbb{Z} \text{ なので } \exp(2\pi ik) = 1) \\
&= 0 & (\because 1-1=0 \text{ であり、分子が } 0 \text{ の分数は } 0 \text{ である } (1-r \neq 0)) \\
&= M \delta_{(k,0)}^M & (\because k \not\equiv 0 \pmod{M} \text{ なので } \delta_{(k,0)}^M = 0 \text{ である})
\end{aligned}$$

引いたのは 定義 5.25 である。 □

定義 5.27 ($\hat{Z}, \hat{Y}$ の定義). $\mathcal{M} := \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ とし、 $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\begin{aligned}
\hat{Z}_\mu^{(\pm)} &:= \sum_{j=1}^M \begin{cases} \mp 1 & (j=1) \\ 1 & (j \neq 1) \end{cases} Z_j \exp\left(-i \frac{2\pi j\mu}{M}\right) \\
&= \mp Z_1 \exp\left(-i \frac{2\pi\mu}{M}\right) + \sum_{j=2}^M Z_j \exp\left(-i \frac{2\pi j\mu}{M}\right) & (\because \text{有限和の最初の項 } (j=1) \text{ を分け、場合分けの係数を代入した}) \\
\hat{Y}_\mu &:= \sum_{j=1}^M Y_j \exp\left(-i \frac{2\pi j\mu}{M}\right)
\end{aligned}$$

定義 5.28. 定義 5.8 の $Y_m, Z_m, K_1, K_2^*, s_2, V_2$ と 定義 5.24 の $V_1^{(\pm)}$ を用いる。

$$\begin{aligned}
H_1^{(\pm)} &:= Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \dots + Y_{M-1} Z_M \mp Y_M Z_1 \\
H_2 &:= Z_1 Y_1 + Z_2 Y_2 + \dots + Z_M Y_M
\end{aligned}$$

すると、定義 5.24 と 主張 5.11 より

$$\begin{aligned}
V_1^{(\pm)} &= \exp\left(i K_1 H_1^{(\pm)}\right) & (\because \text{定義 5.24}) \\
V_2 &= (2s_2)^{M/2} \exp(i K_2^* H_2) & (\because \text{主張 5.11})
\end{aligned}$$

主張 5.29 ($H_1^{(\pm)}, H_2$ を $\hat{Z}, \hat{Y}$ で表す).

$$\begin{aligned}
H_1^{(\pm)} &= \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \exp\left(-i \frac{2\pi j}{M}\right) \\
H_2 &= \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j
\end{aligned}$$

証明. $H_1^{(\pm)}$ について、

$$\begin{aligned}
(\text{右辺}) &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \exp\left(-i \frac{2\pi j}{M}\right) & (\because \text{主張の右辺を書き下したものの}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \overbrace{\left(\sum_{k_1=1}^M Y_{k_1} \exp\left(-ik_1 \frac{2\pi j}{M}\right) \right)}^{\hat{Y}_j} \overbrace{\left(\sum_{k_2=1}^M \left\{ \begin{smallmatrix} 1 & (k_2 \neq 1) \\ \mp 1 & (k_2 = 1) \end{smallmatrix} \right\} Z_{k_2} \exp\left(-ik_2 \frac{2\pi(-j)}{M}\right) \right)}^{\hat{Z}_{-j}^{(\pm)}} \exp\left(-i \frac{2\pi j}{M}\right) & (\because \hat{Y}_j, \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \text{ の定義定義 5.27 の展開}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \sum_{k_1, k_2=1}^M \left(Y_{k_1} \exp\left(-ik_1 \frac{2\pi j}{M}\right) \right) \left(\left\{ \begin{smallmatrix} 1 & (k_2 \neq 1) \\ \mp 1 & (k_2 = 1) \end{smallmatrix} \right\} Z_{k_2} \exp\left(-ik_2 \frac{2\pi(-j)}{M}\right) \right) \exp\left(-i \frac{2\pi j}{M}\right) & (\because \text{有限和どうしの積は二重和である (分配則)}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \sum_{k_1, k_2=1}^M \left\{ \begin{smallmatrix} 1 & (k_2 \neq 1) \\ \mp 1 & (k_2 = 1) \end{smallmatrix} \right\} \exp\left(-ik_1 \frac{2\pi j}{M}\right) \exp\left(-ik_2 \frac{2\pi(-j)}{M}\right) \exp\left(-i \frac{2\pi j}{M}\right) (Y_{k_1} Z_{k_2}) & (\because \text{複素数の積の可換性と結合則 (符号と exp を前へ, } YZ \text{ を後ろへ移した)}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \sum_{k_1, k_2=1}^M \left\{ \begin{smallmatrix} 1 & (k_2 \neq 1) \\ \mp 1 & (k_2 = 1) \end{smallmatrix} \right\} \exp\left(-i \frac{2\pi j}{M} (k_1 - k_2 + 1)\right) (Y_{k_1} Z_{k_2}) & (\because \exp a \cdot \exp b = \exp(a+b)) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{k_1, k_2=1}^M \left\{ \begin{smallmatrix} 1 & (k_2 \neq 1) \\ \mp 1 & (k_2 = 1) \end{smallmatrix} \right\} \left(\sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \exp\left(-i \frac{2\pi j}{M} (k_1 - k_2 + 1)\right) \right) (Y_{k_1} Z_{k_2}) & (\because \text{有限和の順序交換と、} j \text{ に依らない因子を和の外へ出すこと}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{k_1, k_2=1}^M \left\{ \begin{smallmatrix} 1 & (k_2 \neq 1) \\ \mp 1 & (k_2 = 1) \end{smallmatrix} \right\} M \delta_{-(k_1 - k_2 + 1), 0}^{(M)} (Y_{k_1} Z_{k_2}) & (\because \text{主張 5.26}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\substack{k_1, k_2 \in \{1, \dots, M\} \\ -(k_1 - k_2 + 1) \equiv 0 \pmod{M}}} \left\{ \begin{smallmatrix} 1 & (k_2 \neq 1) \\ \mp 1 & (k_2 = 1) \end{smallmatrix} \right\} M (Y_{k_1} Z_{k_2}) & (\because \delta^M \text{ が } 0 \text{ を与える項が落ちること}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\substack{k_1 \in \{1, \dots, M\} \\ k_2 \in \{2, \dots, M\} \\ -(k_1 - k_2 + 1) \equiv 0 \pmod{M}}} M (Y_{k_1} Z_{k_2}) + \frac{1}{M} \sum_{\substack{k_1 \in \{1, \dots, M\} \\ -k_1 \equiv 0 \pmod{M}}} \mp M (Y_{k_1} Z_1) & (\because k_2 = 1 \text{ の項とそれ以外 } (k_2 \in \{2, \dots, M\}) \text{ の項へ和を分けた}) \\
&= (Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \dots + Y_{M-1} Z_M) + (\mp Y_M Z_1) & (\because \text{下記の通り第 1 項は } k_1 = k_2 - 1, \text{ 第 2 項は } k_1 = M \text{ に限ること、および } \frac{1}{M} \cdot M = 1) \\
&= H_1^{(\pm)} & (\because H_1^{(\pm)} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

ここで第 1 項は、 $k_1 \in \{1, \dots, M\}$ 、 $k_2 \in \{2, \dots, M\}$ 、 $-(k_1 - k_2 + 1) \equiv 0 \pmod{M}$ すなわち $k_1 \equiv k_2 - 1 \pmod{M}$ より $k_2 - 1 \in \{1, \dots, M-1\}$ かつ $k_1 = k_2 - 1$ に限る ($\{1, \dots, M-1\}$ の範囲で合同を満たす k_1 は一意)。第 2 項は $-k_1 \equiv 0 \pmod{M}$ かつ $k_1 \in \{1, \dots, M\}$ より $k_1 = M$ 。

H_2 について、

$$\begin{aligned}
(\text{右辺}) &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j & (\because \text{主張の右辺を書き下したものの}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \overbrace{\left(\sum_{k_1=1}^M \left\{ \begin{smallmatrix} 1 & (k_1 \neq 1) \\ +1 & (k_1 = 1) \end{smallmatrix} \right\} Z_{k_1} \exp\left(-ik_1 \frac{2\pi(-j)}{M}\right) \right)}^{\hat{Z}_{-j}^{(-)}} \overbrace{\left(\sum_{k_2=1}^M Y_{k_2} \exp\left(-ik_2 \frac{2\pi j}{M}\right) \right)}^{\hat{Y}_j} & (\because \hat{Z}_{-j}^{(-)}, \hat{Y}_j \text{ の定義定義 5.27 の展開}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \sum_{k_1, k_2=1}^M \left(Z_{k_1} \exp\left(-ik_1 \frac{2\pi(-j)}{M}\right) \right) \left(Y_{k_2} \exp\left(-ik_2 \frac{2\pi j}{M}\right) \right) & (\because \text{有限和どうしの積は二重和である (分配則)。} k_1 = 1 \text{ の場合の係数も } +1 \text{ である}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \sum_{k_1, k_2=1}^M \exp\left(-ik_1 \frac{2\pi(-j)}{M} - ik_2 \frac{2\pi j}{M}\right) Z_{k_1} Y_{k_2} & (\because \text{複素数の積の可換性と結合則、および } \exp a \cdot \exp b = \exp(a+b)) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{k_1, k_2=1}^M \left(\sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \exp\left((k_1 - k_2) i \frac{2\pi j}{M}\right) \right) Z_{k_1} Y_{k_2} & (\because \text{有限和の順序交換と、} j \text{ に依らない因子を和の外へ出すこと}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{k_1, k_2=1}^M M \delta_{(k_1 - k_2), 0}^{(M)} Z_{k_1} Y_{k_2} & (\because \text{主張 5.26}) \\
&= \sum_{k_1, k_2=1}^M \delta_{(k_1 - k_2), 0}^{(M)} Z_{k_1} Y_{k_2} & (\because \frac{1}{M} \cdot M = 1) \\
&= \sum_{\substack{k_1, k_2 \in \{1, \dots, M\} \\ k_1 - k_2 \equiv 0 \pmod{M}}} Z_{k_1} Y_{k_2} & (\because \delta^M \text{ が } 0 \text{ を与える項が落ちること}) \\
&= \sum_{\substack{k_1, k_2 \in \{1, \dots, M\} \\ k_1 = k_2}} Z_{k_1} Y_{k_2} & (\because k_1, k_2 \in \{1, \dots, M\} \text{ では } k_1 - k_2 \equiv 0 \pmod{M} \text{ と } k_1 = k_2 \text{ が同値}) \\
&= Z_1 Y_1 + Z_2 Y_2 + \dots + Z_M Y_M & (\because \text{和の添字を } k_1 = k_2 \text{ で走らせて書き下したものの}) \\
&= H_2 & (\because H_2 \text{ の定義})
\end{aligned}$$

□

主張 5.30 ($\hat{Z}_M^{(-)} = \hat{Z}_{-M}^{(-)}$, $\hat{Y}_M = \hat{Y}_{-M}$).

$$\hat{Z}_M^{(-)} = \hat{Z}_{-M}^{(-)}, \quad \hat{Y}_M = \hat{Y}_{-M}$$

証明. 準備として、各 $j \in \{1, \dots, M\}$ について係数が一致することを示す。

$$\begin{aligned}
\exp\left(-i\frac{2\pi jM}{M}\right) &= \exp(-2\pi ij) & (\because M/M = 1) \\
&= \cos(2\pi j) - i\sin(2\pi j) & (\because \text{オイラーの公式}) \\
&= \cos(2\pi j) + i\sin(2\pi j) & (\because j \in \mathbb{Z} \text{ での三角関数の値}) \\
&= \exp(2\pi ij) & (\because \text{オイラーの公式}) \\
&= \exp\left(-i\frac{2\pi j(-M)}{M}\right) & (\because (-M)/M = -1)
\end{aligned}$$

この係数の一致を各項に当てる。

$$\begin{aligned}
\hat{Z}_M^{(-)} &= \sum_{j=1}^M Z_j \exp\left(-i\frac{2\pi jM}{M}\right) & (\because \text{定義 } \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \text{ 定義 5.27 で } \mu = M, \text{ 複号下では } j = 1 \text{ の係数も } 1) \\
&= \sum_{j=1}^M Z_j \exp\left(-i\frac{2\pi j(-M)}{M}\right) & (\because \text{上で示した各 } j \text{ についての係数の一致}) \\
&= \hat{Z}_{-M}^{(-)} & (\because \text{定義 } \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \text{ 定義 5.27 で } \mu = -M, \text{ 複号下では } j = 1 \text{ の係数も } 1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\hat{Y}_M &= \sum_{j=1}^M Y_j \exp\left(-i\frac{2\pi jM}{M}\right) & (\because \text{定義 } \hat{Y}_\mu \text{ 定義 5.27 で } \mu = M) \\
&= \sum_{j=1}^M Y_j \exp\left(-i\frac{2\pi j(-M)}{M}\right) & (\because \text{上で示した各 } j \text{ についての係数の一致}) \\
&= \hat{Y}_{-M} & (\because \text{定義 } \hat{Y}_\mu \text{ 定義 5.27 で } \mu = -M)
\end{aligned}$$

□

主張 5.31 ($\hat{Z}, \hat{Y}$ から Z, Y の復元). 定義 5.27 の記号のもと、 $\hat{Z}^{(-)}$ は全 j について重み +1 (uniform) であり、すなわち $\hat{Z}_\mu^{(-)} = \sum_{j=1}^M Z_j \exp\left(-ij\frac{2\pi\mu}{M}\right)$ である。各 $m \in \{1, \dots, M\}$ について、次が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\sum_{\mu=1}^M \hat{Y}_\mu \exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right) &= MY_m \\
\sum_{\mu=1}^M \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right) &= MZ_m
\end{aligned}$$

ゆえに、

$$\begin{aligned}
Y_m &= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \hat{Y}_\mu \exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right) \\
Z_m &= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right)
\end{aligned}$$

証明. $m \in \{1, \dots, M\}$ を任意に固定する。補題 (μ についての指数和の直交性): $j \in \{1, \dots, M\}$ を固定し $k := m - j \in \mathbb{Z}$ とおく。指数和の直交性で和の変数を $j \leftrightarrow \mu$ 、定数を $k = m - j$ と読み替えることで、

$$\sum_{\mu=1}^M \exp\left((m-j) \cdot \frac{2\pi i \mu}{M}\right) = M \delta_{(m-j, 0)}^M \quad (\because \text{指数和の直交性 主張 5.26})$$

が成り立つ。さらに $m, j \in \{1, \dots, M\}$ より $-(M-1) \leq m-j \leq M-1$ 、すなわち $|m-j| < M$ であるから、 $m-j \equiv 0 \pmod{M}$ と $m=j$ は同値である。したがって、

$$\sum_{\mu=1}^M \exp\left((m-j) \cdot \frac{2\pi i \mu}{M}\right) = \begin{cases} M & (j=m) \\ 0 & (j \neq m) \end{cases} \quad (\because \text{指数和の直交性 主張 5.26 と } |m-j| < M)$$

が成り立つ (以下この等式を $(*)$ と呼ぶ)。

Step 1: $\hat{Y}$ からの復元。

$$\begin{aligned} \sum_{\mu=1}^M \hat{Y}_\mu \exp\left(im \frac{2\pi \mu}{M}\right) &= \sum_{\mu=1}^M \left(\sum_{j=1}^M Y_j \exp\left(-ij \frac{2\pi \mu}{M}\right) \right) \exp\left(im \frac{2\pi \mu}{M}\right) \quad (\because \hat{Y}_\mu \text{ の定義 定義 5.27}) \\ &= \sum_{\mu=1}^M \sum_{j=1}^M Y_j \exp\left(i(m-j) \frac{2\pi \mu}{M}\right) \quad (\because \text{指数法則}) \\ &= \sum_{j=1}^M Y_j \sum_{\mu=1}^M \exp\left((m-j) \cdot \frac{2\pi i \mu}{M}\right) \quad (\because \text{有限二重和の順序交換}) \\ &= \sum_{j=1}^M Y_j \begin{cases} M & (j=m) \\ 0 & (j \neq m) \end{cases} \quad (\because (*)) \\ &= Y_m \cdot M \quad (\because j \neq m \text{ の項は係数が } 0 \text{ なので落ち、残るのは } j=m \text{ の項だけである}) \\ &= MY_m \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の可換性}) \end{aligned}$$

Step 2: $\hat{Z}^{(-)}$ からの復元。

$$\begin{aligned} \sum_{\mu=1}^M \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(im \frac{2\pi \mu}{M}\right) &= \sum_{\mu=1}^M \left(\sum_{j=1}^M Z_j \exp\left(-ij \frac{2\pi \mu}{M}\right) \right) \exp\left(im \frac{2\pi \mu}{M}\right) \quad (\because \hat{Z}_\mu^{(-)} \text{ の定義 定義 5.27}) \\ &= \sum_{\mu=1}^M \sum_{j=1}^M Z_j \exp\left(i(m-j) \frac{2\pi \mu}{M}\right) \quad (\because \text{指数法則}) \\ &= \sum_{j=1}^M Z_j \sum_{\mu=1}^M \exp\left((m-j) \cdot \frac{2\pi i \mu}{M}\right) \quad (\because \text{有限二重和の順序交換}) \\ &= \sum_{j=1}^M Z_j \begin{cases} M & (j=m) \\ 0 & (j \neq m) \end{cases} \quad (\because (*)) \\ &= Z_m \cdot M \quad (\because j \neq m \text{ の項は係数が } 0 \text{ なので落ち、残るのは } j=m \text{ の項だけである}) \\ &= MZ_m \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の可換性}) \end{aligned}$$

Step 3: 復元式。 $M \geq 1$ なので $\frac{1}{M} \in \mathbb{C}$ が取れる。

$$\begin{aligned} Y_m &= \frac{1}{M} \cdot MY_m \quad (\because \frac{1}{M} \cdot M = 1) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \hat{Y}_\mu \exp\left(im \frac{2\pi \mu}{M}\right) \quad (\because \text{Step 1 の等式}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Z_m &= \frac{1}{M} \cdot M Z_m \quad (\because \frac{1}{M} \cdot M = 1) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \hat{Z}_{\mu}^{(-)} \exp\left(im \frac{2\pi\mu}{M}\right) \quad (\because \text{Step 2 の等式})
\end{aligned}$$

□

主張 5.32 (Z, Y から和・スカラー倍・積だけで 2^M 次の複素行列がすべて得られる). 定義 5.8 (004 章冒頭の記号の定義) で定義された $Z_1, \dots, Z_M, Y_1, \dots, Y_M \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について、集合 $S := \{Z_1, \dots, Z_M, Y_1, \dots, Y_M\}$ を考える (定義 3.1 の同一視により $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ であり、 S の元はいずれも 2^M 次の複素行列である)。

$\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の部分集合 T が「閉じている」とは、次の 4 条件を満たすことをいう。

- (i) $S \subseteq T$ 、すなわち $Z_1, \dots, Z_M, Y_1, \dots, Y_M \in T$ 。
- (ii) $I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \in T$ (単位行列を含む)。
- (iii) $A, B \in T$ ならば $A + B \in T$ 、および $c \in \mathbb{C}$ について $cA \in T$ (和とスカラー倍で閉じる)。
- (iv) $A, B \in T$ ならば $AB \in T$ (行列の積で閉じる)。

$\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 自身は閉じているからそのような T は少なくとも 1 つ存在し、閉じている部分集合すべての共通部分もまた (i)~(iv) を満たす (共通部分の元は各 T に属するので、和・スカラー倍・積も各 T に属し、したがって共通部分に属する)。よって、閉じている部分集合のうち最小のものが存在する。それを $\mathcal{A}$ とおく。

このとき $\mathcal{A} = \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ である。すなわち、 $Z_1, \dots, Z_M, Y_1, \dots, Y_M$ と単位行列から出発して、和・スカラー倍・行列の積を有限回繰り返すだけで 2^M 次の複素行列がすべて得られる。

証明. 以下、 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ を標準的な Pauli 行列 $\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 、 $\sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ 、 $\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ とする。 $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z$ は定義 5.8 のとおり、第 k 番目の因子 (サイト) のみに対応する Pauli 行列で、他の因子はすべて $I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}$ であるものとする。

Step 1: 単一サイトの Pauli 行列の積公式。

$$\begin{aligned}
\sigma^x \sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^x \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の成分計算}) \\
&= I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} \quad (\because \text{単位行列の定義}) \\
\sigma^y \sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^y, \sigma^z \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の成分計算}) \\
&= i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{スカラー倍の成分計算}) \\
&= i \sigma^x \quad (\because \sigma^x \text{ の定義})
\end{aligned}$$

第 2 式から σ^x を書き直す。

$$\begin{aligned}
\sigma^x &= 1 \cdot \sigma^x \quad (\because 1 \text{ は積の単位元}) \\
&= ((-i)i) \sigma^x \quad (\because (-i)i = 1) \\
&= -i(i\sigma^x) \quad (\because \text{スカラー倍の結合則}) \\
&= -i\sigma^y\sigma^z \quad (\because \text{第2式 } \sigma^y\sigma^z = i\sigma^x)
\end{aligned}$$

これらをクロネッカー積へ持ち上げる。 $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の積は各因子ごとの積であり $(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M B_M)$ (主張 3.2 (1))。第 k 因子のみが非自明な σ_k^a どの積は $(I := I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})})$

$$\begin{aligned}
\sigma_k^a \sigma_k^b &= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I)(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^b}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I) \quad (\because \sigma_k^a, \sigma_k^b \text{ の定義の代入}) \\
&= (II) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^a \sigma^b)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^a \sigma^b)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because II = I)
\end{aligned}$$

これより $\sigma_k^x \sigma_k^x = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ 、 $\sigma_k^x = -i\sigma_k^y \sigma_k^z$ を得る。また異なるサイト $k \neq l$ の σ_k^a, σ_l^b は可換である ($k < l$ として)。

$$\begin{aligned}
\sigma_k^a \sigma_l^b &= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I)(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^b}^{l\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I) \quad (\because \sigma_k^a, \sigma_l^b \text{ の定義の代入}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^b}^{l\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^b}^{l\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I)(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma_l^b \sigma_k^a \quad (\because \sigma_l^b, \sigma_k^a \text{ の定義 (第 } l \text{ 因子} \cdot \text{第 } k \text{ 因子のみが非自明)})
\end{aligned}$$

Step 2: $\mathcal{A}$ が各 $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z$ を含むこと。各 m について「 $\sigma_1^x, \dots, \sigma_{m-1}^x \in \mathcal{A}$ 」を仮定とする m に関する帰納法で示す。 $m = 1$ のとき $\sigma_1^x = Z_1 \in \mathcal{A}$ 、 $\sigma_1^y = Y_1 \in \mathcal{A}$ である。

$$\begin{aligned}
\sigma_1^x &= -i\sigma_1^y \sigma_1^z \quad (\because \text{Step 1 の } \sigma_k^x = -i\sigma_k^y \sigma_k^z \text{ を } k = 1 \text{ に取る}) \\
&= -iY_1 Z_1 \quad (\because \sigma_1^y = Y_1, \sigma_1^z = Z_1)
\end{aligned}$$

$Y_1, Z_1 \in \mathcal{A}$ かつ $\mathcal{A}$ は積とスカラー倍について閉じるから $\sigma_1^x \in \mathcal{A}$ 。

$m \geq 2$ とし $\sigma_1^x, \dots, \sigma_{m-1}^x \in \mathcal{A}$ を仮定する。 $P_{m-1} := \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{m-1}^x$ とおくと $P_{m-1} \in \mathcal{A}$ ($m = 1$ では空積 $P_0 := I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$)。異サイトの可換性と $\sigma_k^x \sigma_k^x = I$ より

$$\begin{aligned}
P_{m-1} P_{m-1} &= (\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x)(\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x) \quad (\because P_{m-1} \text{ の定義}) \\
&= (\sigma_1^x \sigma_1^x)(\sigma_2^x \sigma_2^x) \cdots (\sigma_{m-1}^x \sigma_{m-1}^x) \quad (\because \text{異サイトの可換性}) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \sigma_k^x \sigma_k^x = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})})
\end{aligned}$$

ゆえに P_{m-1} は可逆で $P_{m-1}^{-1} = P_{m-1} \in \mathcal{A}$ 。定義より $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z = P_{m-1} \sigma_m^z$ であるから、

$$\begin{aligned}
P_{m-1} Z_m &= P_{m-1} P_{m-1} \sigma_m^z \quad (\because Z_m = P_{m-1} \sigma_m^z) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \sigma_m^z \quad (\because P_{m-1} P_{m-1} = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}) \\
&= \sigma_m^z \quad (\because I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \text{ は積の単位元})
\end{aligned}$$

$P_{m-1}, Z_m \in \mathcal{A}$ かつ $\mathcal{A}$ は積について閉じるから $\sigma_m^z = P_{m-1}Z_m \in \mathcal{A}$ 。 σ_m^y についても同じ形の鎖が書ける。定義より $Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y = P_{m-1}\sigma_m^y$ であるから、

$$\begin{aligned} P_{m-1}Y_m &= P_{m-1}P_{m-1}\sigma_m^y \quad (\because Y_m = P_{m-1}\sigma_m^y) \\ &= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}\sigma_m^y \quad (\because P_{m-1}P_{m-1} = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}) \\ &= \sigma_m^y \quad (\because I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \text{ は積の単位元}) \end{aligned}$$

$P_{m-1}, Y_m \in \mathcal{A}$ かつ $\mathcal{A}$ は積について閉じるから $\sigma_m^y = P_{m-1}Y_m \in \mathcal{A}$ 。さらに Step 1 より $\sigma_m^x = -i\sigma_m^y\sigma_m^z$ であり、 $\mathcal{A}$ は積とスカラー倍について閉じるから $\sigma_m^x \in \mathcal{A}$ 。よって $\sigma_m^x, \sigma_m^y, \sigma_m^z \in \mathcal{A}$ が示され、帰納法によりすべての $k \in \{1, \dots, M\}$ について $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z \in \mathcal{A}$ 。

Step 3: $\mathcal{A} = \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 。まず $\mathcal{B} := \{I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ は $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$ 上の基底である。実際、任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ に対し

$$A = \frac{a_{11} + a_{22}}{2} I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} + \frac{a_{12} + a_{21}}{2} \sigma^x + \frac{i(a_{12} - a_{21})}{2} \sigma^y + \frac{a_{11} - a_{22}}{2} \sigma^z \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つので $\mathcal{B}$ は張り、 $\dim_{\mathbb{C}} \text{Mat}(2, \mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{B}$ より基底である。次に $\mathcal{B}^{\boxtimes M} := \{e_1 \boxtimes \cdots \boxtimes e_M : e_1, \dots, e_M \in \mathcal{B}\}$ は $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の基底である (定理 3.5 (2) を基底 $\mathcal{B}$ に適用した)。

一方、各 $e_1 \boxtimes \cdots \boxtimes e_M$ について、各 k で $\sigma_k^{a_k} := I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{e_k}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I$ とおくと、Step 1 の異サイト積公式を繰り返して

$$\sigma_1^{a_1} \sigma_2^{a_2} \cdots \sigma_M^{a_M} = e_1 \boxtimes e_2 \boxtimes \cdots \boxtimes e_M \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

Step 2 より各 $\sigma_k^{a_k} \in \mathcal{A}$ ($I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \in \mathcal{A}$ も含む) であり、 $\mathcal{A}$ は積について閉じるから $e_1 \boxtimes \cdots \boxtimes e_M = \sigma_1^{a_1} \cdots \sigma_M^{a_M} \in \mathcal{A}$ 。よって $\mathcal{B}^{\boxtimes M} \subseteq \mathcal{A}$ 。 $\mathcal{A}$ は $\mathbb{C}$ -線型結合について閉じ、 $\mathcal{B}^{\boxtimes M}$ は基底であるから

$$\text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = \text{span}_{\mathbb{C}}(\mathcal{B}^{\boxtimes M}) \subseteq \mathcal{A} \quad (\because \mathcal{A} \text{ は } \mathbb{C}\text{-線型結合について閉じる})$$

一方 $\mathcal{A} \subseteq \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ は定義より明らかであるから $\mathcal{A} = \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 。 □

6 $e^X Y e^{-X} = e^{\text{ad}(X)}(Y)$ の証明

定義 6.1 (複素共役). 定義 1.11 の $z = (x, y) \in \mathbf{C} = \mathbf{R}^2$ に対して

$$\bar{z} := (x, -y) \in \mathbf{C}$$

と定める。実部は 定義 1.15 で定義済みである。

定義 6.2 ($M(n; \mathbb{C})$ の Frobenius 内積). $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 $M(n; \mathbb{C}) := \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ を $\mathbb{C}^{n \times n}$ (成分が 定義 1.11 の $\mathbb{C}$ に属する $n \times n$ 配列全体) と同一視する。以下、 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M(n; \mathbb{C})$ とする。

定義 10.12 の共役転置、定義 1.8 の行列積と 定義 10.2 のトレースを使い、Frobenius 内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle : M(n; \mathbb{C}) \times M(n; \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ を

$$\langle A, B \rangle := \text{tr}(A^* B)$$

と定める。成分表示と内積の基本性質は後続の内積の性質の主張で成分計算から示す。この $\langle \cdot, \cdot \rangle$ のノルムは既出の成分公式 定義 3.8 を使う。後続の内積の性質の主張で、この内積から得る長さと同じ値になることを示す。

主張 6.3 (Frobenius 内積の性質 (Hermite 内積の公理と Cauchy-Schwarz の不等式)). 成分計算に使う行列積は 定義 1.8、共役転置は 定義 10.12、トレースは 定義 10.2 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = (c_{ij}) \in M(n; \mathbb{C})$ 、 $\lambda \in \mathbb{C}$ とし、 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 、 $\overline{\cdot}$ 、 Re は 定義 6.2、複素共役は 定義 6.1、実部は 定義 1.15 のものとする。次が成り立つ。

- (0) (成分表示) $\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(A^* B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \overline{a_{ij}} b_{ij}$ 。
- (1) (共役対称性) $\langle B, A \rangle = \overline{\langle A, B \rangle}$ 。
- (2) (第 2 変数についての線型性・第 1 変数についての共役線型性) $\langle A, B + C \rangle = \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle$ 、 $\langle A, \lambda B \rangle = \lambda \langle A, B \rangle$ 、 $\langle A + B, C \rangle = \langle A, C \rangle + \langle B, C \rangle$ 、 $\langle \lambda A, B \rangle = \overline{\lambda} \langle A, B \rangle$ 。
- (3) (正定値性) $\langle A, A \rangle = \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \right)_{\mathbb{C}}$ 。特に $\langle A, A \rangle$ は 定義 1.12 による非負実数の像であり、 $\langle A, A \rangle = 0_{\mathbb{C}} \iff A = O$ 。また 定義 3.8 で定義したノルムについて $\langle A, A \rangle = (\|A\|_{\mathbb{C}})^2$ 。
- (4) (Cauchy-Schwarz の不等式) $|\langle A, B \rangle| \leq \|A\| \|B\|$ (左辺は 定義 1.40 の絶対値)。
- (5) (三角不等式) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ 。

証明. Step 0: 複素共役の基本性質。 $z = (x, y)$, $w = (u, v) \in \mathbb{C}$ について 定義 1.11 の演算を使うと

$$\begin{aligned} \overline{z + w} &= \overline{(x + u, y + v)} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の定義}) \\ &= (x + u, -(y + v)) \quad (\because \text{複素共役の定義}) \\ &= (x, -y) + (u, -v) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の符号の計算と } \mathbb{C} \text{ の加法の定義}) \\ &= \overline{z} + \overline{w} \quad (\because \text{複素共役の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{zw} &= \overline{(xu - yv, xv + yu)} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の定義}) \\ &= (xu - yv, -(xv + yu)) \quad (\because \text{複素共役の定義}) \\ &= (xu - (-y)(-v), x(-v) + (-y)u) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の符号の計算}) \\ &= (x, -y) \cdot (u, -v) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の定義}) \\ &= \overline{z} \cdot \overline{w} \quad (\because \text{複素共役の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{\overline{z}} &= \overline{(x, -y)} \quad (\because \text{複素共役の定義}) \\ &= (x, y) \quad (\because \text{複素共役の定義}) \\ &= z \quad (\because z = (x, y)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{zz} &= (x, -y) \cdot (x, y) \quad (\because \text{複素共役の定義}) \\ &= (x \cdot x - (-y) \cdot y, x \cdot y + (-y) \cdot x) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の定義}) \\ &= (x^2 + y^2, 0) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の符号の計算}) \\ &= (|z|^2)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{絶対値の基本性質 (2) と } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ の包含写像}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(z) &= x \quad (\because \operatorname{Re} \text{ の定義}) \\ &\leq \sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because x \leq |x| = \sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}) \\ &\leq \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \sqrt{\cdot} \text{ の単調性と } x^2 \leq x^2 + y^2) \\ &= |z| \quad (\because \text{絶対値の基本性質 (1)}) \end{aligned}$$

が成り立つ (用いた 定義 1.11、主張 1.41、定義 1.12、定義 1.6 は各行の $(\cdot \cdot \cdot)$ に挙げたとおりである)。

Step 1: (0)。行列の積の定義と 定義 1.11 の加法・乗法より、

$$\begin{aligned}
 \operatorname{tr}(A^*B) &= \sum_{i=1}^n (A^*B)_{ii} \quad (\because \operatorname{tr} \text{ の定義}) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (A^*)_{ij} b_{ji} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \overline{a_{ji}} b_{ji} \quad (\because (A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}) \\
 &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \overline{a_{ji}} b_{ji} \quad (\because \text{有限和の順序交換}) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \overline{a_{ij}} b_{ij} \quad (\because \text{添字 } i, j \text{ の付け替え})
 \end{aligned}$$

Step 2: (1)。Step 0 の $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$ 、 $\overline{zw} = \overline{z} \overline{w}$ 、 $\overline{\overline{z}} = z$ より、

$$\begin{aligned}
 \overline{\langle A, B \rangle} &= \overline{\sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij}} \quad (\because (0)) \\
 &= \sum_{i,j} \overline{\overline{a_{ij}} b_{ij}} \quad (\because \overline{} \text{ は加法的、有限和}) \\
 &= \sum_{i,j} \overline{\overline{a_{ij}} \cdot b_{ij}} \quad (\because \overline{} \text{ は乗法的}) \\
 &= \sum_{i,j} \overline{b_{ij}} \overline{a_{ij}} \quad (\because \overline{\overline{z}} = z, \mathbb{C} \text{ の乗法の可換性}) \\
 &= \langle B, A \rangle \quad (\because (0))
 \end{aligned}$$

Step 3: (2)。分配律と Step 0 の乗法性より、

$$\begin{aligned}
 \langle A, B+C \rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} (b_{ij} + c_{ij}) \quad (\because (0) \text{ と行列の和の定義}) \\
 &= \sum_{i,j} (\overline{a_{ij}} b_{ij} + \overline{a_{ij}} c_{ij}) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の分配律}) \\
 &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij} + \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} c_{ij} \quad (\because \text{有限和の分割}) \\
 &= \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle \quad (\because (0)) \\
 \langle A, \lambda B \rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} (\lambda b_{ij}) \quad (\because (0) \text{ とスカラー倍の定義}) \\
 &= \sum_{i,j} \lambda (\overline{a_{ij}} b_{ij}) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換性と結合律}) \\
 &= \lambda \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij} \quad (\because \text{有限和と元の積についての分配律}) \\
 &= \lambda \langle A, B \rangle \quad (\because (0))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle A+B, C \rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij} + b_{ij}} c_{ij} \quad (\because (0) \text{ と行列の和の定義}) \\
&= \sum_{i,j} (\overline{a_{ij}} + \overline{b_{ij}}) c_{ij} \quad (\because \text{Step 0 の } \overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}) \\
&= \sum_{i,j} (\overline{a_{ij}} c_{ij} + \overline{b_{ij}} c_{ij}) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の分配律}) \\
&= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} c_{ij} + \sum_{i,j} \overline{b_{ij}} c_{ij} \quad (\because \text{有限和の分割}) \\
&= \langle A, C \rangle + \langle B, C \rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \lambda A, B \rangle &= \sum_{i,j} \overline{\lambda a_{ij}} b_{ij} \quad (\because (0) \text{ とスカラー倍の定義}) \\
&= \sum_{i,j} \overline{\lambda} \overline{a_{ij}} b_{ij} \quad (\because \text{Step 0 の } \overline{zw} = \overline{z} \overline{w}) \\
&= \overline{\lambda} \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij} \quad (\because \text{有限和と元の積についての分配律}) \\
&= \overline{\lambda} \langle A, B \rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}$$

Step 4: (3)。Step 0 の $\overline{zz} = (|z|^2)_{\mathbb{C}}$ より、

$$\begin{aligned}
\langle A, A \rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} a_{ij} \quad (\because (0)) \\
&= \sum_{i,j} (|a_{ij}|^2)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{Step 0 の } \overline{zz} = (|z|^2)_{\mathbb{C}}) \\
&= \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ の包含写像 } \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ が加法を保つこと})
\end{aligned}$$

最後の段で引いたのは 定義 1.12 である。さらに

$$\begin{aligned}
\langle A, A \rangle &= \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の鎖}) \\
&= (\|A\|^2)_{\mathbb{C}} \quad (\because \|A\|^2 = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \text{ (ノルムの定義)})
\end{aligned}$$

である(ノルムの定義は 定義 3.8)。よって $\langle A, A \rangle$ は非負実数 $\|A\|^2$ の像であり、 $\sqrt{\langle A, A \rangle} = \|A\|$ 。
 $\langle A, A \rangle = 0_{\mathbb{C}} \iff \|A\| = 0 \iff A = O$ は 主張 3.9 (1) による。

Step 5: (4)。 $u := \langle A, B \rangle \in \mathbb{C}$ とおく。

場合 1: $\|B\| = 0$ のとき。(3) より $B = O$ であるから

$$\begin{aligned}
u &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij} \quad (\because u \text{ の定義と } (0)) \\
&= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} \cdot 0_{\mathbb{C}} \quad (\because B = O \text{ なので各成分 } b_{ij} = 0_{\mathbb{C}}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ との積が } 0_{\mathbb{C}} \text{ であることと有限和})
\end{aligned}$$

となる。したがって

$$\begin{aligned}
|u| &= |0_{\mathbb{C}}| \quad (\because \text{上の鎖 } u = 0_{\mathbb{C}}) \\
&= 0 \quad (\because \text{絶対値の基本性質}) \\
&= \|A\| \cdot 0 \quad (\because \text{実数の0との積は0}) \\
&= \|A\| \|B\| \quad (\because \|B\| = 0)
\end{aligned}$$

であり、 $|u| = \|A\| \|B\|$ (主張 1.41) を得る。

場合 2: $\|B\| > 0$ のとき。 $t := \frac{\bar{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \in \mathbb{C}$ とおく ($\|B\|^2 > 0$ なので 主張 1.35 により逆元が存在する)。 (2)(1) を展開すると

$$\begin{aligned}
0 &\leq \|A - tB\|^2 \\
\left(\|A - tB\|^2 \right)_{\mathbb{C}} &= \langle A - tB, A - tB \rangle \quad (\because (3)) \\
&= \langle A, A \rangle - \langle A, tB \rangle - \langle tB, A \rangle + \langle tB, tB \rangle \quad (\because (2) \text{ を各変数に適用}) \\
&= \langle A, A \rangle - t \langle A, B \rangle - \bar{t} \langle B, A \rangle + \bar{t} t \langle B, B \rangle \quad (\because (2))
\end{aligned}$$

三つの積の項を順に計算すると

$$\begin{aligned}
-t \langle A, B \rangle &= -\frac{\bar{u} u}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because t \text{ の定義と、 } u \text{ の定義 } \langle A, B \rangle = u \text{ の代入}) \\
&= -\frac{(|u|^2)_{\mathbb{C}}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 の } \bar{u}u = (|u|^2)_{\mathbb{C}}) \\
&= -\left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2} \right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ が積と逆元を保つこと}) \\
-\bar{t} \langle B, A \rangle &= -\frac{u \bar{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 と } \overline{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} = (\|B\|^2)_{\mathbb{C}} \text{ による } \bar{t} = u / (\|B\|^2)_{\mathbb{C}} \text{ と、(1) の } \langle B, A \rangle = \bar{u} \text{ の代入}) \\
&= -\frac{(|u|^2)_{\mathbb{C}}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 の } \bar{u}u = (|u|^2)_{\mathbb{C}} \text{ と } \mathbb{C} \text{ の乗法の可換性}) \\
&= -\left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2} \right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ が積と逆元を保つこと}) \\
\bar{t} t \langle B, B \rangle &= \frac{u \bar{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}} (\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \cdot (\|B\|^2)_{\mathbb{C}} \quad (\because \bar{t}, t \text{ の定義と、(3) の } \langle B, B \rangle = (\|B\|^2)_{\mathbb{C}} \text{ の代入}) \\
&= \frac{u \bar{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because (\|B\|^2)_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}} \text{ による約分}) \\
&= \frac{(|u|^2)_{\mathbb{C}}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 の } \bar{u}u = (|u|^2)_{\mathbb{C}} \text{ と } \mathbb{C} \text{ の乗法の可換性}) \\
&= \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2} \right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ が積と逆元を保つこと})
\end{aligned}$$

となり、合わせて

$$\begin{aligned}
\left(\|A - tB\|^2 \right)_{\mathbb{C}} &= (\|A\|^2)_{\mathbb{C}} - \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2} \right)_{\mathbb{C}} - \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2} \right)_{\mathbb{C}} + \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2} \right)_{\mathbb{C}} \quad (\because (3) \text{ の } \langle A, A \rangle = (\|A\|^2)_{\mathbb{C}} \text{ と直前の三つの計算を展開式へ代入}) \\
&= (\|A\|^2)_{\mathbb{C}} - \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2} \right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の結合律と加法逆元}) \\
&= \left(\|A\|^2 - \frac{|u|^2}{\|B\|^2} \right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ が減法を保つこと})
\end{aligned}$$

$\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}$ は単射なので実数の等式 $\|A - tB\|^2 = \|A\|^2 - |u|^2 / \|B\|^2$ を得る。これと 主張 3.9 (1) から

$$\begin{aligned}
0 &\leq \|A - tB\|^2 \quad (\because \text{ノルムの基本性質 (非退化性・斉次性・三角不等式) の (1)}) \\
&= \|A\|^2 - \frac{|u|^2}{\|B\|^2} \quad (\because \text{直前の実数の等式})
\end{aligned}$$

である。これを移項して

$$\begin{aligned}
\frac{|u|^2}{\|B\|^2} &= \|A\|^2 - \left(\|A\|^2 - \frac{|u|^2}{\|B\|^2} \right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\leq \|A\|^2 - 0 \quad (\because \text{直前の } 0 \leq \|A\|^2 - |u|^2/\|B\|^2 \text{ と、} \mathbb{R} \text{ で引く数が多いほど差は小さいこと}) \\
&= \|A\|^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

を得る。したがって

$$\begin{aligned}
|u|^2 &= \frac{|u|^2}{\|B\|^2} \cdot \|B\|^2 \quad (\because \|B\|^2 > 0 \text{ と } \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\leq \|A\|^2 \cdot \|B\|^2 \quad (\because \text{直前の不等式の両辺に正の数 } \|B\|^2 \text{ を掛ける}) \\
&= (\|A\| \|B\|)^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の乗法の可換性と結合性})
\end{aligned}$$

を得る。 $|u| \geq 0$ かつ $\|A\| \|B\| \geq 0$ なので非負実数の平方の単調性 (主張 3.9 の証明 Step 0) により $|u| \leq \|A\| \|B\|$ 。

Step 6: (5)。 (3)(2)(1) より

$$\begin{aligned}
(\|A + B\|^2)_{\mathbb{C}} &= \langle A + B, A + B \rangle \quad (\because (3)) \\
&= \langle A, A \rangle + \langle A, B \rangle + \langle B, A \rangle + \langle B, B \rangle \quad (\because (2)) \\
&= (\|A\|^2)_{\mathbb{C}} + (u + \bar{u}) + (\|B\|^2)_{\mathbb{C}} \quad (\because (1), (3), u = \langle A, B \rangle)
\end{aligned}$$

ここで $u = (x, y)$ と書けば

$$\begin{aligned}
u + \bar{u} &= (x, y) + (x, -y) \quad (\because u = (x, y) \text{ と複素共役の定義}) \\
&= (2x, 0) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の定義と } \mathbb{R} \text{ の計算}) \\
&= (2 \operatorname{Re}(u))_{\mathbb{C}} \quad (\because \operatorname{Re} \text{ の定義と } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ の包含写像})
\end{aligned}$$

であるから、

$$\begin{aligned}
(\|A + B\|^2)_{\mathbb{C}} &= (\|A\|^2)_{\mathbb{C}} + (u + \bar{u}) + (\|B\|^2)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の 3 段の鎖}) \\
&= (\|A\|^2)_{\mathbb{C}} + (2 \operatorname{Re}(u))_{\mathbb{C}} + (\|B\|^2)_{\mathbb{C}} \quad (\because u + \bar{u} \text{ の鎖}) \\
&= (\|A\|^2 + 2 \operatorname{Re}(u) + \|B\|^2)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ は加法を保つ})
\end{aligned}$$

である。したがって、Step 0 の $\operatorname{Re}(u) \leq |u|$ と Step 5 の (4) を使って

$$\begin{aligned}
\|A + B\|^2 &= \|A\|^2 + 2 \operatorname{Re}(u) + \|B\|^2 \quad (\because \text{上の鎖と } \iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}} \text{ の単射性}) \\
&\leq \|A\|^2 + 2|u| + \|B\|^2 \quad (\because \text{Step 0 の } \operatorname{Re}(u) \leq |u|) \\
&\leq \|A\|^2 + 2\|A\| \|B\| + \|B\|^2 \quad (\because \text{Step 5 の Cauchy-Schwarz の不等式}) \\
&= (\|A\| + \|B\|)^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}$$

となる。両辺とも非負実数 ($0 \leq \|A + B\|$, $0 \leq \|A\| + \|B\|$ 。ノルムの非負性) なので、含意の鎖

$$\begin{aligned}
&\|A + B\|^2 \leq (\|A\| + \|B\|)^2 \quad (\because \text{上の鎖}) \\
\Rightarrow \|A + B\| &\leq \|A\| + \|B\| \quad (\because \text{非負実数の平方の単調性 (「ノルムの基本性質 (非退化性・斉次性・三角不等式)」の証明 Step 0) を } u = \|A + B\|, v = \|A\| + \|B\| \text{ に当てた})
\end{aligned}$$

により (5) が従う (Step 0 の補題は 主張 3.9 の証明にある)。

□

定理 6.4 (ad 展開の二項定理的公式 (Brian Hall exercise 14)). 行列の積は 定義 1.8 の成分計算による。

$K := \mathbb{R}$ もしくは $K := \mathbb{C}$ 、 $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $X, Y \in M(K, d) := \text{Mat}(d, K)$ とする。交換子を $[P, Q] := PQ - QP \in \text{Mat}(d, K)$ と定め、 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 重の交換子 $\text{ad}_X^m(Y) \in \text{Mat}(d, K)$ を m についての再帰で

$$\text{ad}_X^0(Y) := Y, \quad \text{ad}_X^{m+1}(Y) := [X, \text{ad}_X^m(Y)] \quad (m \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

と定める (すなわち $\text{ad}_X^m(Y) = \underbrace{[X, [X, \dots, [X, Y] \dots]]}_{m \text{ times}}$ であり、 $m = 0$ のときは括弧を付け

ずに Y そのものとする規約である)。また $P^0 := I$ (単位行列)、 $\binom{m}{k} := \frac{m!}{k!(m-k)!} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ($0 \leq k \leq m$)、および $k < 0$ または $k > m$ のとき $\binom{m}{k} := 0$ と約束する。このとき次が成り立つ。

$$\underbrace{[X, [X, \dots, [X, Y] \dots]]}_{m \text{ times}} = \text{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \quad (m \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

証明. この主張は $\text{Mat}(d, K)$ の環構造 (加法・乗法・分配律・結合律) と K のスカラー倍だけを使う純代数的な主張であり、収束・極限は一切使わない。 m についての帰納法で示す。

Step 0: 準備 (符号の処理)。 $l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $(-X)^l = (-1)^l X^l$ であり ($-X = (-1)X$ と、スカラー $(-1) \in K$ が行列と可換であることによる l についての帰納法)、 X は自分自身と可換なので

$$\begin{aligned} (-X)^l X &= (-1)^l X^l X \quad (\because (-X)^l = (-1)^l X^l) \\ &= (-1)^l X^{l+1} \quad (\because \text{冪の定義}) \\ &= -((-1)^{l+1} X^{l+1}) \quad (\because (-1)^l = -(-1)^{l+1}) \\ &= -(-X)^{l+1} \quad (\because (-X)^{l+1} = (-1)^{l+1} X^{l+1}) \end{aligned}$$

Step 1: 準備 (Pascal の法則)。 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 、 $k \in \mathbb{Z}$ について

$$\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} = \binom{m+1}{k}$$

が成り立つ。実際、 $1 \leq k \leq m$ のときは

$$\begin{aligned} \binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} &= \frac{m!}{(k-1)!(m-k+1)!} + \frac{m!}{k!(m-k)!} \quad (\because \text{二項係数の定義}) \\ &= \frac{m! \cdot k}{k!(m+1-k)!} + \frac{m! \cdot (m+1-k)}{k!(m+1-k)!} \quad (\because k! = k \cdot (k-1)!, (m+1-k)! = (m+1-k) \cdot (m-k)!) \\ &= \frac{m!(k + (m+1-k))}{k!(m+1-k)!} \quad (\because \text{分配律}) \\ &= \frac{m!(m+1)}{k!(m+1-k)!} \quad (\because k + (m+1-k) = m+1) \\ &= \frac{(m+1)!}{k!(m+1-k)!} \quad (\because (m+1)! = (m+1) \cdot m!) \\ &= \binom{m+1}{k} \quad (\because \text{二項係数の定義}) \end{aligned}$$

$k = 0$ のときは

$$\begin{aligned}
\binom{m}{-1} + \binom{m}{0} &= 0 + \binom{m}{0} \quad (\because k < 0 \text{ のとき } \binom{m}{k} := 0 \text{ という約束}) \\
&= \binom{m}{0} \quad (\because \text{零元との和}) \\
&= 1 \quad (\because \text{二項係数の定義と } 0! = 1) \\
&= \binom{m+1}{0} \quad (\because \text{二項係数の定義と } 0! = 1)
\end{aligned}$$

$k = m + 1$ のときは

$$\begin{aligned}
\binom{m}{m} + \binom{m}{m+1} &= \binom{m}{m} + 0 \quad (\because k > m \text{ のとき } \binom{m}{k} := 0 \text{ という約束}) \\
&= \binom{m}{m} \quad (\because \text{零元との和}) \\
&= 1 \quad (\because \text{二項係数の定義と } 0! = 1) \\
&= \binom{m+1}{m+1} \quad (\because \text{二項係数の定義と } 0! = 1)
\end{aligned}$$

$k < 0$ または $k > m + 1$ のときは、 $\binom{m}{k-1}$ も $\binom{m}{k}$ も $\binom{m+1}{k}$ も約束により 0 なので、両辺とも 0 である。

Step 2: $m = 0$ の場合。

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} X^k Y (-X)^{0-k} &= \binom{0}{0} X^0 Y (-X)^0 \quad (\because \text{和の項が } k = 0 \text{ の 1 つだけである}) \\
&= 1 \cdot X^0 Y (-X)^0 \quad (\because \binom{0}{0} = 1) \\
&= 1 \cdot I Y I \quad (\because P^0 := I \text{ という約束}) \\
&= Y \quad (\because \text{単位行列との積とスカラー1倍}) \\
&= \text{ad}_X^0(Y) \quad (\because \text{ad}_X^0 \text{ の定義})
\end{aligned}$$

Step 3: 帰納段階。ある $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\text{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k}$$

が成り立つと仮定する（帰納法の仮定）。定義と分配律より

$$\begin{aligned}
\text{ad}_X^{m+1}(Y) &= [X, \text{ad}_X^m(Y)] \quad (\because \text{ad}_X^{m+1} \text{ の定義}) \\
&= X \text{ad}_X^m(Y) - \text{ad}_X^m(Y) X \quad (\because [P, Q] = PQ - QP) \\
&= X \left(\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \right) - \left(\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \right) X \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^{k+1} Y (-X)^{m-k} - \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} X \quad (\because \text{分配律・結合律・スカラーの可換性})
\end{aligned}$$

第 2 項に Step 0 を $l = m - k$ として適用すると

$$\begin{aligned}
-\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} X &= -\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y \left(-(-X)^{m+1-k} \right) \quad (\because \text{Step 0}) \\
&= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m+1-k} \quad (\because \text{符号の反転が 2 度で打ち消し合うこと})
\end{aligned}$$

第 1 項は添字を $j := k + 1$ ($k = 0, \dots, m$ に対し $j = 1, \dots, m + 1$) と付け替えると

$$\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^{k+1} Y (-X)^{m-k} = \sum_{j=1}^{m+1} \binom{m}{j-1} X^j Y (-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{添字の付け替え } j := k + 1 \text{ (全単射なので和の値は変わらない)})$$

第 2 項の添字を $j := k$ と書き換え、 $\binom{m}{-1} = 0$ 、 $\binom{m}{m+1} = 0$ の約束により両方の和の範囲を $j = 0, \dots, m + 1$ に揃えると

$$\begin{aligned}
\text{ad}_X^{m+1}(Y) &= \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m}{j-1} X^j Y (-X)^{m+1-j} + \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m}{j} X^j Y (-X)^{m+1-j} \quad (\because \binom{m}{-1} = 0, \binom{m}{m+1} = 0 \text{ の約束により足した項が 0 である}) \\
&= \sum_{j=0}^{m+1} \left(\binom{m}{j-1} + \binom{m}{j} \right) X^j Y (-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{分配律}) \\
&= \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m+1}{j} X^j Y (-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{Step 1: Pascal の法則})
\end{aligned}$$

これは $m + 1$ についての主張である。したがって帰納法により、すべての $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について主張が成り立つ。 $\square$

定義 6.5 (ad_X と Ad_g の定義 (複素行列)). 行列の積は 定義 1.8 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 $M(n, \mathbb{C}) := \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ は 定義 6.2 のもの (成分が 定義 1.11 の $\mathbb{C}$ に属する $n \times n$ 行列全体) とする。交換子は 定理 6.4 と同じく $[P, Q] := PQ - QP \in M(n, \mathbb{C})$ とする。

(1) $X \in M(n, \mathbb{C})$ に対し、写像 ad_X を

$$\text{ad}_X : M(n, \mathbb{C}) \rightarrow M(n, \mathbb{C}), \quad Y \mapsto [X, Y] = XY - YX$$

と定める (右辺は $M(n, \mathbb{C})$ の積と差だけで定まるので、 ad_X は well-defined である)。 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 重の反復 ad_X^m は 定理 6.4 の再帰 $\text{ad}_X^0(Y) = Y$, $\text{ad}_X^{m+1}(Y) = [X, \text{ad}_X^m(Y)]$ による。

(2) $g \in M(n, \mathbb{C})$ が正則 (すなわち $gh = hg = I$ を満たす $h \in M(n, \mathbb{C})$ が存在し、この h を g^{-1} と書く) であるとき、写像 Ad_g を

$$\text{Ad}_g : M(n, \mathbb{C}) \rightarrow M(n, \mathbb{C}), \quad Y \mapsto gYg^{-1}$$

と定める (g^{-1} は存在すれば一意である。実際 h, h' がともに逆行列なら

$$\begin{aligned}
h &= hI \quad (\because \text{単位行列との右からの積}) \\
&= h(gh') \quad (\because gh' = I) \\
&= (hg)h' \quad (\because \text{行列積の結合律}) \\
&= Ih' \quad (\because hg = I) \\
&= h' \quad (\because \text{単位行列との左からの積})
\end{aligned}$$

である。したがって右辺は $M(n, \mathbb{C})$ の積だけで一意に定まる)。

この定義に Lie 群・Lie 環は現れない。必要なのは $M(n, \mathbb{C})$ の和・積と、逆行列の存在だけである。

定理 6.6 (行列版: $e^X Y e^{-X} = e^{\text{ad}_X}(Y)$). 行列積は 定義 1.8、複素成分の演算は 主張 1.35、実数係数の包含は 定義 1.12、ノルムの積の評価は 主張 3.10 を用いる。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $X, Y \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ とする。ノルム $\|\cdot\|$ と収束は 定義 3.8、 $\exp$ は 定義 4.4、 ad_X は 定義 6.5 ($\text{ad}_X(Z) = [X, Z] = XZ - ZX$)、 ad_X^m は 定理 6.4 の m 重交換子とする。このとき次が成り立つ。

- (1) 級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y)$ は $\text{Mat}(n, \mathbb{C})$ において収束し、
- (2) $\exp(X) Y \exp(-X) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y) = \exp(\text{ad}_X)(Y)$ 。
- (3) さらに $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ であるから、 $\text{Ad}_{\exp(X)}(Y) := \exp(X) Y \exp(X)^{-1} = \exp(\text{ad}_X)(Y)$ 。

証明. 以下 $a := \|X\| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とおき、主張 4.1 の記号 $E_N(a) = \sum_{m=0}^N a^m/m!$ 、 $E(a) = \lim_{N \rightarrow \infty} E_N(a)$ 、 $R_N(a) = E(a) - E_N(a)$ を使う。また $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 、 $A \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ について $S_N(A) := \sum_{p=0}^N \frac{1}{p!} A^p \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ ($A^0 := I$) とおく。主張 4.2 より $S_N(X) \rightarrow \exp(X)$ 、 $S_N(-X) \rightarrow \exp(-X)$ 。この二つの収束と、後で使う実指数級数の剰余 $R_N(a) \rightarrow 0$ の根拠は $\mathbb{R}$ の完備性 (主張 3.12 および 主張 4.1) へ遡る。さらに Step 2 では収束する実数列の有界性、有界列と 0 収束列の積、および 0 収束列の有限和を使う。Step 5 では $\lfloor N/2 \rfloor \rightarrow \infty$ に沿う 0 収束、0 収束列の非負定数倍、およびはさみうちを使う。Step 6 では 0 収束列の和と、主張 3.9 (4) の極限一意性を使う。したがって非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の解析へ移る箇所は、これらの実数列・行列列の極限操作であり、それ以外は有限和の代数計算である。

Step 1: ad_X は $\mathbb{C}$ -線型。 $Z, W \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ 、 $c \in \mathbb{C}$ について分配律より

$$\begin{aligned} \text{ad}_X(Z + W) &= X(Z + W) - (Z + W)X && (\because \text{ad}_X \text{ の定義}) \\ &= (XZ + XW) - (ZX + WX) && (\because \text{行列の積の分配律}) \\ &= (XZ - ZX) + (XW - WX) && (\because \text{行列の加法の交換則と結合則}) \\ &= \text{ad}_X(Z) + \text{ad}_X(W) && (\because \text{ad}_X \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ad}_X(cZ) &= X(cZ) - (cZ)X && (\because \text{ad}_X \text{ の定義}) \\ &= c(XZ) - c(ZX) && (\because \text{スカラー倍と行列の積の両立}) \\ &= c(XZ - ZX) && (\because \text{スカラー倍の分配律}) \\ &= c \text{ad}_X(Z) && (\because \text{ad}_X \text{ の定義}) \end{aligned}$$

したがって $\text{ad}_X \in \text{End}(\text{Mat}(n, \mathbb{C}))$ であり、 $\text{Mat}(n, \mathbb{C})$ は 定義 3.8 のノルムをもつ有限次元 $\mathbb{C}$ -線型空間 (次元 n^2) なので、定義 4.4 の $\exp(\text{ad}_X)$ が定義され、定理 4.3 より

$$\exp(\text{ad}_X)(Y) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y) = \lim_{N \rightarrow \infty} P_N, \quad P_N := \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y)$$

である (右辺の収束は Step 6 で独立に示すので、循環はしない)。

Step 2: 積の同時収束。 $C_N \rightarrow C$ 、 $D_N \rightarrow D$ ならば $C_N D_N \rightarrow CD$ 。実際

$$\begin{aligned} \|C_N D_N - CD\| &= \|C_N D_N - C_N D + C_N D - CD\| && (\because \text{中間項 } C_N D \text{ を引いて足した}) \\ &= \|C_N(D_N - D) + (C_N - C)D\| && (\because \text{行列の積の分配律}) \\ &\leq \|C_N(D_N - D)\| + \|(C_N - C)D\| && (\because \text{三角不等式。主張 3.9}) \\ &\leq \|C_N\| \|D_N - D\| + \|C_N - C\| \|D\| && (\because \text{行列ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}\|C_N\| &= \|C + (C_N - C)\| \quad (\because C_N = C + (C_N - C)) \\ &\leq \|C\| + \|C_N - C\| \quad (\because \text{三角不等式。主張 3.9})\end{aligned}$$

は $\|C_N - C\| \rightarrow 0$ より有界 (十分大きい N で $\|C_N - C\| \leq 1$ なので $\|C_N\| \leq \|C\| + 1$) だから、右辺は 0 に収束する。これを 2 回使って

$$Q_N := S_N(X) Y S_N(-X) \longrightarrow \exp(X) Y \exp(-X) \quad (N \rightarrow \infty)$$

(1 回目は $C_N = S_N(X)$, $D_N = Y$ (定数列) として $S_N(X)Y \rightarrow \exp(X)Y$ 、2 回目は $C_N = S_N(X)Y$, $D_N = S_N(-X)$ として)。

Step 3: Q_N と P_N の有限和表示。まず $(-X)^q = (-1)^q X^q$ に注意すると、有限和の分配律より

$$\begin{aligned}Q_N &= S_N(X) Y S_N(-X) \quad (\because Q_N \text{ の定義 (Step 2)}) \\ &= \left(\sum_{p=0}^N \frac{1}{p!} X^p \right) Y \left(\sum_{q=0}^N \frac{1}{q!} (-X)^q \right) \quad (\because \text{部分和 } S_N \text{ の定義}) \\ &= \sum_{p=0}^N \sum_{q=0}^N \frac{1}{p!} \frac{1}{q!} X^p Y (-X)^q \quad (\because \text{有限和の分配律を 2 度。定理 6.4 の証明 Step 0}) \\ &= \sum_{p=0}^N \sum_{q=0}^N \frac{1}{p! q!} X^p Y (-X)^q \quad (\because \text{スカラーの積})\end{aligned}$$

一方 $\text{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k}$ であり、各 $0 \leq k \leq m$ について

$$\begin{aligned}\frac{1}{m!} \binom{m}{k} &= \frac{1}{m!} \cdot \frac{m!}{k! (m-k)!} \quad (\because \text{二項係数の定義}) \\ &= \frac{1}{k! (m-k)!} \quad (\because \text{約分 } (m! \neq 0))\end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned}P_N &= \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y) \quad (\because P_N \text{ の定義 (Step 1)}) \\ &= \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \quad (\because \text{ad の二項展開。定理 6.4}) \\ &= \sum_{m=0}^N \sum_{k=0}^m \frac{1}{m!} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \quad (\because \text{有限和の分配律}) \\ &= \sum_{m=0}^N \sum_{k=0}^m \frac{1}{k! (m-k)!} X^k Y (-X)^{m-k} \quad (\because \frac{1}{m!} \binom{m}{k} = \frac{1}{k! (m-k)!}) \\ &= \sum_{(p,q) \in T_N} \frac{1}{p! q!} X^p Y (-X)^q, \quad T_N := \{(p, q) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 \mid p + q \leq N\} \quad (\because \text{添字の全単射 } (m, k) \mapsto (k, m - k))\end{aligned}$$

(最後の等号は $(m, k) \mapsto (p, q) := (k, m - k)$ が $\{(m, k) \mid 0 \leq m \leq N, 0 \leq k \leq m\}$ から T_N への全単射であることによる。逆写像は $(p, q) \mapsto (p + q, p)$)。 $T_N \subset \{0, \dots, N\}^2$ であるから

$$\begin{aligned}
Q_N - P_N &= \sum_{(p,q) \in \{0,\dots,N\}^2} \frac{1}{p!q!} X^p Y (-X)^q - \sum_{(p,q) \in T_N} \frac{1}{p!q!} X^p Y (-X)^q \quad (\because \text{上の 2 つの有限和表示}) \\
&= \sum_{(p,q) \in \{0,\dots,N\}^2 \setminus T_N} \frac{1}{p!q!} X^p Y (-X)^q \quad (\because T_N \subset \{0,\dots,N\}^2 \text{ による有限和の差}) \\
&= \sum_{(p,q) \in D_N} \frac{1}{p!q!} X^p Y (-X)^q, \quad D_N := \{(p,q) \mid 0 \leq p, q \leq N, p+q > N\} \quad (\because D_N \text{ の定義})
\end{aligned}$$

Step 4: 項ごとのノルム評価。 $p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\|X^p Y (-X)^q\| \leq a^{p+q} \|Y\|$$

が成り立つ。準備として $l \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について $\|X^l\| \leq a^l$ を l についての帰納法で示す。 $l = 1$ のときは

$$\begin{aligned}
\|X^1\| &= \|X\| \quad (\because X^1 = X \text{ (行列の冪の定義)}) \\
&= a \quad (\because a \text{ の定義}) \\
&= a^1 \quad (\because a^1 = a \text{ (指数法則)})
\end{aligned}$$

である。 l のとき $\|X^l\| \leq a^l$ とすると

$$\begin{aligned}
\|X^{l+1}\| &= \|X^l X\| \quad (\because \text{行列の冪の定義}) \\
&\leq \|X^l\| \|X\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\
&\leq a^l \|X\| \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= a^l a \quad (\because a \text{ の定義}) \\
&= a^{l+1} \quad (\because \text{指数法則})
\end{aligned}$$

であるから、任意の $l \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について $\|X^l\| \leq a^l$ が成り立つ。符号を付けたものも同じ評価をもつ。

$$\begin{aligned}
\|(-X)^l\| &= \|(-1)^l X^l\| \quad (\because (-X)^l = (-1)^l X^l) \\
&= |(-1)^l| \|X^l\| \quad (\because \text{ノルムの斉次性。主張 3.9}) \\
&= \|X^l\| \quad (\because |(-1)^l| = 1) \\
&\leq a^l \quad (\because \text{直前の帰納法})
\end{aligned}$$

以上を使って p, q の 4 つの場合を評価する。

- $p \geq 1, q \geq 1$ のとき

$$\begin{aligned}
\|X^p Y (-X)^q\| &\leq \|X^p\| \|Y (-X)^q\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\
&\leq \|X^p\| \|Y\| \|(-X)^q\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\
&\leq a^p \|Y\| \|(-X)^q\| \quad (\because \|X^p\| \leq a^p) \\
&\leq a^p \|Y\| a^q \quad (\because \|(-X)^q\| \leq a^q)
\end{aligned}$$

- $p = 0, q \geq 1$ のとき

$$\begin{aligned}
\|X^0 Y (-X)^q\| &= \|Y (-X)^q\| \quad (\because X^0 = I \text{ と } IY = Y) \\
&\leq \|Y\| \|(-X)^q\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\
&\leq \|Y\| a^q \quad (\because \|(-X)^q\| \leq a^q) \\
&= a^0 \|Y\| a^q \quad (\because a^0 = 1)
\end{aligned}$$

- $p \geq 1, q = 0$ のとき

$$\begin{aligned}
\|X^p Y (-X)^0\| &= \|X^p Y\| \quad (\because (-X)^0 = I \text{ と } YI = Y) \\
&\leq \|X^p\| \|Y\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\
&\leq a^p \|Y\| \quad (\because \|X^p\| \leq a^p) \\
&= a^p \|Y\| a^0 \quad (\because a^0 = 1)
\end{aligned}$$

- $p = q = 0$ のとき

$$\begin{aligned}
\|X^0 Y (-X)^0\| &= \|Y\| \quad (\because X^0 = (-X)^0 = I \text{ と } IYI = Y) \\
&= a^0 \|Y\| a^0 \quad (\because a^0 = 1)
\end{aligned}$$

いずれの場合も次が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\|X^p Y (-X)^q\| &\leq a^p \|Y\| a^q \quad (\because \text{上の 4 つの場合}) \\
&= a^p a^q \|Y\| \quad (\because \text{実数の積の可換性}) \\
&= a^{p+q} \|Y\| \quad (\because \text{指数法則})
\end{aligned}$$

Step 5: $\|Q_N - P_N\| \rightarrow 0$ 。 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 $L := \lfloor N/2 \rfloor$ ($2L \leq N$ を満たす最大の非負整数) とおく。 $(p, q) \in D_N$ ならば $p \geq L+1$ または $q \geq L+1$ である (もし $p \leq L$ かつ $q \leq L$ なら $p+q \leq 2L \leq N$ となり $p+q > N$ に矛盾する)。したがって

$$D_N \subset \underbrace{\{(p, q) \mid L+1 \leq p \leq N, 0 \leq q \leq N\}}_{=: A_N} \cup \underbrace{\{(p, q) \mid 0 \leq p \leq N, L+1 \leq q \leq N\}}_{=: B_N}$$

であり ($N \geq 1$ より $L \leq N/2 < N$ すなわち $L+1 \leq N$ なので A_N, B_N は空でない)。

$$\begin{aligned}
\|Q_N - P_N\| &\leq \sum_{(p,q) \in D_N} \frac{1}{p! q!} \|X^p Y (-X)^q\| \quad (\because \text{三角不等式} \cdot \text{斉次性。主張 3.9}) \\
&\leq \|Y\| \sum_{(p,q) \in D_N} \frac{a^p}{p!} \cdot \frac{a^q}{q!} \quad (\because \text{Step 4}) \\
&\leq \|Y\| \left(\sum_{(p,q) \in A_N} \frac{a^p}{p!} \frac{a^q}{q!} + \sum_{(p,q) \in B_N} \frac{a^p}{p!} \frac{a^q}{q!} \right) \quad (\because D_N \subset A_N \cup B_N, \text{各項} \geq 0)
\end{aligned}$$

ここで $\sum_{q=0}^N \frac{a^q}{q!} = E_N(a) \leq E(a)$ かつ $\sum_{p=L+1}^N \frac{a^p}{p!} \leq R_L(a)$ ((3) の後半を $p = L+1 \geq 1, q = N$ として適用) であるから

$$\begin{aligned}
\sum_{(p,q) \in A_N} \frac{a^p}{p!} \frac{a^q}{q!} &= \left(\sum_{p=L+1}^N \frac{a^p}{p!} \right) \left(\sum_{q=0}^N \frac{a^q}{q!} \right) \quad (\because \text{長方形の添字集合にわたる有限和の、積への分解 (分配律)}) \\
&\leq R_L(a) \left(\sum_{q=0}^N \frac{a^q}{q!} \right) \quad (\because \sum_{p=L+1}^N \frac{a^p}{p!} \leq R_L(a) \text{ と } \sum_{q=0}^N \frac{a^q}{q!} \geq 0. \text{主張 4.1}) \\
&= R_L(a) E_N(a) \quad (\because E_N(a) \text{ の定義}) \\
&\leq R_L(a) E(a) \quad (\because E_N(a) \leq E(a) \text{ と } R_L(a) \geq 0. \text{主張 4.1})
\end{aligned}$$

同じ 4 段を B_N について繰り返して

$$\begin{aligned}
\sum_{(p,q) \in B_N} \frac{a^p}{p!} \frac{a^q}{q!} &= \left(\sum_{p=0}^N \frac{a^p}{p!} \right) \left(\sum_{q=L+1}^N \frac{a^q}{q!} \right) \quad (\because \text{長方形の添字集合にわたる有限和の、積への分解 (分配律)}) \\
&\leq \left(\sum_{p=0}^N \frac{a^p}{p!} \right) R_L(a) \quad (\because \sum_{q=L+1}^N \frac{a^q}{q!} \leq R_L(a) \text{ と } \sum_{p=0}^N \frac{a^p}{p!} \geq 0. \text{ 主張 4.1}) \\
&= E_N(a) R_L(a) \quad (\because E_N(a) \text{ の定義}) \\
&\leq E(a) R_L(a) \quad (\because E_N(a) \leq E(a) \text{ と } R_L(a) \geq 0. \text{ 主張 4.1})
\end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}
\|Q_N - P_N\| &\leq \|Y\| \left(\sum_{(p,q) \in A_N} \frac{a^p}{p!} \frac{a^q}{q!} + \sum_{(p,q) \in B_N} \frac{a^p}{p!} \frac{a^q}{q!} \right) \quad (\because \text{上の } \|Q_N - P_N\| \text{ の評価の最後の行}) \\
&\leq \|Y\| (R_L(a) E(a) + E(a) R_L(a)) \quad (\because \text{直前の 2 つの評価と } \|Y\| \geq 0) \\
&= 2 \|Y\| E(a) R_L(a) \quad (\because \text{実数の積の可換性と } c + c = 2c)
\end{aligned}$$

である ($L = \lfloor N/2 \rfloor$)。

$N \rightarrow \infty$ のとき $L = \lfloor N/2 \rfloor \rightarrow \infty$ であり、主張 4.1 (3) より $R_L(a) \rightarrow 0$ 。 $2\|Y\|E(a)$ は N によらない定数なので $\|Q_N - P_N\| \rightarrow 0$ 。

Step 6: 結論。Step 2 より $\|Q_N - \exp(X)Y \exp(-X)\| \rightarrow 0$ 、Step 5 より $\|Q_N - P_N\| \rightarrow 0$ である。ノルムの基本性質 (主張 3.9 の (2)(3)) と実数列の評価により

$$\begin{aligned}
\|P_N - \exp(X)Y \exp(-X)\| &= \|(P_N - Q_N) + (Q_N - \exp(X)Y \exp(-X))\| \quad (\because \text{行列の和の結合則と } (-Q_N) + Q_N = O) \\
&\leq \|P_N - Q_N\| + \|Q_N - \exp(X)Y \exp(-X)\| \quad (\because \text{ノルムの三角不等式。主張 3.9}) \\
&= \|Q_N - P_N\| + \|Q_N - \exp(X)Y \exp(-X)\| \quad (\because \text{ノルムの斉次性を } c = -1 \text{ に取ること。主張 3.9}) \\
&\rightarrow 0 + 0 \quad (\because \text{Step 5 と Step 2}) \\
&= 0 \quad (\because \text{実数の加法の単位元})
\end{aligned}$$

であり、左辺は非負 (主張 3.9 の (1)) なので $\|P_N - \exp(X)Y \exp(-X)\| \rightarrow 0$ 。すなわち $P_N \rightarrow \exp(X)Y \exp(-X)$ 。これは主張 (1) (級数の収束) と (2) の第 1 の等号 $\exp(X)Y \exp(-X) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y)$ を与える。第 2 の等号は Step 1 の $\exp(\text{ad}_X)(Y) = \lim_{N \rightarrow \infty} P_N$ と極限の一意性 (主張 3.9 (4)) による。

Step 7: (3)。まず X と $-X$ が交換することを見る。

$$\begin{aligned}
X(-X) &= -(XX) \quad (\because \text{行列のスカラー倍と積の両立を } c = -1 \text{ に取ること}) \\
&= -X^2 \quad (\because \text{行列の冪の定義}) \\
&= -(XX) \quad (\because \text{行列の冪の定義}) \\
&= (-X)X \quad (\because \text{行列のスカラー倍と積の両立を } c = -1 \text{ に取ること})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\exp(X) \exp(-X) &= \exp(X + (-X)) \quad (\because \text{可換な 2 つの行列の指数の積 定理 4.5 と、直前に示した } X(-X) = (-X)X) \\
&= \exp(O) \quad (\because \text{行列の加法についての逆元 } X + (-X) = O) \\
&= I \quad (\because \text{零行列の指数は単位行列であること 定理 4.6})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\exp(-X) \exp(X) &= \exp((-X) + X) \quad (\because \text{可換な 2 つの行列の指数の積 定理 4.5 と、直前に示した } (-X)X = X(-X)) \\
&= \exp(O) \quad (\because \text{行列の加法についての逆元 } (-X) + X = O) \\
&= I \quad (\because \text{零行列の指数は単位行列であること 定理 4.6})
\end{aligned}$$

2 つの積がどちらも I なので、逆行列の定義により $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ である。したがって

$$\begin{aligned}
\text{Ad}_{\exp(X)}(Y) &= \exp(X) Y \exp(X)^{-1} \quad (\because \text{Ad の定義}) \\
&= \exp(X) Y \exp(-X) \quad (\because \text{直前に示した } \exp(X)^{-1} = \exp(-X)) \\
&= \exp(\text{ad}_X)(Y) \quad (\because \text{Step 6 で示した (2)。} \text{ad}_X \text{ の定義は 定義 6.5})
\end{aligned}$$

□

定理 6.7 ($e^{\text{ad}_X}(Y)$ の級数展開). $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし, $\forall X, Y \in \text{M}(n, \mathbb{C})$ について考える。ここで $\text{ad}_X : \text{M}(n, \mathbb{C}) \rightarrow \text{M}(n, \mathbb{C})$ は 定義 6.5 の写像 $Z \mapsto [X, Z] = XZ - ZX$ 、 ad_X^m ($m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) は 定理 6.4 の再帰 $\text{ad}_X^0(Y) = Y$, $\text{ad}_X^{m+1}(Y) = [X, \text{ad}_X^m(Y)]$ で定まる m 重交換子、 $e^{\text{ad}_X} := \exp(\text{ad}_X)$ は 定義 4.4 の指数写像を有限次元 $\mathbb{C}$ -線型空間 $\text{M}(n, \mathbb{C})$ (次元 n^2 、ノルムは 定義 3.8) の自己準同型 ad_X に適用したものとする。このとき右辺の級数は $\text{M}(n, \mathbb{C})$ において収束し、

$$e^{\text{ad}_X}(Y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{[X, [X, \dots, [X, Y] \dots]]}_{n \text{ times}} = Y + [X, Y] + \frac{1}{2}[X, [X, Y]] + \frac{1}{6}[X, [X, [X, Y]]] + \dots$$

が成り立つ ($n=0$ のときは Y とする)。

証明. 定理 6.6 を $K := \mathbb{C}$ として適用する (同ブロックは Lie 群論を使わず、定理 6.4 (純代数) と 主張 4.1・主張 3.10・主張 4.2 だけから証明されているので、循環しない)。

Step 1: 記号の一致。定理 6.4 の再帰の定義より $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\text{ad}_X^m(Y) = \underbrace{[X, [X, \dots, [X, Y] \dots]]}_{m \text{ times}} \quad (\because \text{ad}_X^m \text{ の再帰的定義}) \quad (m=0 \text{ のときは } Y)$$

であるから、主張の右辺は $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y)$ に他ならない。

Step 2: 収束。定理 6.6 (1) より、級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y)$ は $\text{M}(n, \mathbb{C})$ において収束する。より正確には、同ブロックの証明 Step 6 で有限和 $P_N = \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y)$ が $\exp(X)Y \exp(-X)$ に収束することが示されている。

Step 3: 等号。定理 6.6 の証明 Step 1 より $\text{ad}_X \in \text{End}(\text{M}(n, \mathbb{C}))$ であり、定義 4.4 と 定理 4.3 により $\exp(\text{ad}_X)$ が定まって

$$\begin{aligned}
e^{\text{ad}_X}(Y) &= \exp(\text{ad}_X)(Y) \quad (\because e^{\text{ad}_X} := \exp(\text{ad}_X) \text{ という本定理の主張での記号の定め方}) \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} P_N \quad (\because \text{指数写像の定義 定義 4.4 と級数の収束 定理 4.3 および 定理 6.6 の (2) の第 2 の等号。} P_N \text{ は Step 2 の有限和}) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y) \quad (\because \text{無限級数の値は部分和の列の極限であること})
\end{aligned}$$

が成り立つ。Step 1 の記号の一致と合わせて主張を得る。

解析 (非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の極限) を使うのは Step 2・Step 3 の極限操作だけであり、その根拠は 主張 3.12 ($\mathbb{R}$ の完備性) である。Step 1 は $\text{M}(n, \mathbb{C})$ の環構造だけを使う純代数的な議論である。 □

7 Z と Y の反交換関係

主張 7.1 (Pauli 行列の積). 2 次の複素行列を

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I := I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$$

とする。このとき $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の中で

$$\sigma^x \sigma^x = \sigma^y \sigma^y = \sigma^z \sigma^z = I,$$

$$\sigma^z \sigma^x = -\sigma^x \sigma^z, \quad \sigma^y \sigma^x = -\sigma^x \sigma^y, \quad \sigma^y \sigma^z = -\sigma^z \sigma^y$$

が成り立つ。

証明. 準備として $\mathbb{C}$ の中で次を計算しておく。

$$\begin{aligned} (-i) \cdot i &= -(i \cdot i) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法と符号の計算}) \\ &= -(-1) \quad (\because i \cdot i = -1) \\ &= 1 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の符号の計算}) \end{aligned}$$

続けて逆順の積を計算する。

$$\begin{aligned} i \cdot (-i) &= (-i) \cdot i \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換律}) \\ &= 1 \quad (\because \text{直前の鎖}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma^x \sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^x \text{ の定義}) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の定義。定義 1.8}) \\ &= I \quad (\because I \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma^y \sigma^y &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^y \text{ の定義}) \\ &= \begin{pmatrix} (-i) \cdot i & 0 \\ 0 & i \cdot (-i) \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の定義。定義 1.8}) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{上の準備}) \\ &= I \quad (\because I \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma^z \sigma^z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^z \text{ の定義}) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の定義。定義 1.8 と } (-1) \cdot (-1) = 1) \\ &= I \quad (\because I \text{ の定義}) \end{aligned}$$

次に反可換性の 3 式について、

$$\begin{aligned} \sigma^z \sigma^x &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^z, \sigma^x \text{ の定義}) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の定義。定義 1.8}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma^x \sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^x, \sigma^z \text{ の定義}) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の定義。定義 1.8}) \\ &= -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列のスカラー倍の定義と } \mathbb{C} \text{ の符号の計算}) \\ &= -\sigma^z \sigma^x \quad (\because \text{上で計算した } \sigma^z \sigma^x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^y \sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^y, \sigma^x \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の定義。定義 1.8}) \\
\sigma^x \sigma^y &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^x, \sigma^y \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の定義。定義 1.8}) \\
&= -\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列のスカラー倍の定義と } \mathbb{C} \text{ の符号の計算}) \\
&= -\sigma^y \sigma^x \quad (\because \text{上で計算した } \sigma^y \sigma^x) \\
\sigma^y \sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^y, \sigma^z \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の定義。定義 1.8 と } (-i) \cdot (-1) = i) \\
\sigma^z \sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^z, \sigma^y \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の定義。定義 1.8 と } (-1) \cdot i = -i) \\
&= -\begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列のスカラー倍の定義と } \mathbb{C} \text{ の符号の計算}) \\
&= -\sigma^y \sigma^z \quad (\because \text{上で計算した } \sigma^y \sigma^z)
\end{aligned}$$

以上で 6 式すべてが確かめられた。なお $\sigma^x \sigma^x = I$ より σ^x は σ^x と可換であり、 I は $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ のすべての元と可換である ($IA = AI = A$)。□

主張 7.2 (1 因子だけ反可換ならクロネッカー積は反交換する). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 $x_1, \dots, x_M, y_1, \dots, y_M \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対して

$$X := x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M, \quad Y := y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

とおく。ある $j \in \{1, \dots, M\}$ が存在して

- $y_j x_j = -(x_j y_j)$ (第 j 因子では反可換)
- $i \in \{1, \dots, M\}, i \neq j \implies y_i x_i = x_i y_i$ (他の因子では可換)

が成り立つならば、

$$[X, Y]_+ := XY + YX = 0$$

が成り立つ。

証明. 2^M 次の複素行列としての積は、クロネッカー積で書かれた行列どうしでは各因子ごとの 2 次の行列の積になる。すなわち $A_1, \dots, A_M, B_1, \dots, B_M \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対し、

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M B_M) \quad (\because \text{主張 3.2 の積の規則})$$

また $c \in \mathbb{C}$ と $j \in \{1, \dots, M\}$ に対し

$$C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(c C_j)^{j\text{th}}} \boxtimes \cdots \boxtimes C_M = c (C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes C_M) \quad (\because \text{主張 3.3 の第 } j \text{ 因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性})$$

$$\begin{aligned} XY &= (x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M)(y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M) \quad (\because X, Y \text{ の定義}) \\ &= (x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M) \quad (\because \text{主張 3.2 の積の規則}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} YX &= (y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M)(x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M) \quad (\because X, Y \text{ の定義}) \\ &= (y_1 x_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (y_M x_M) \quad (\because \text{主張 3.2 の積の規則}) \\ &= (x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(y_j x_j)^{j\text{th}}} \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M) \quad (\because i \neq j \text{ では } y_i x_i = x_i y_i) \\ &= (x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((-1)(x_j y_j))^{j\text{th}}} \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M) \quad (\because y_j x_j = -(x_j y_j)) \\ &= (-1)((x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M)) \quad (\because \text{主張 3.3 の第 } j \text{ 因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\ &= (-1)(XY) \quad (\because \text{上の } XY \text{ の計算}) \\ &= -XY \quad (\because \text{スカラー } -1 \text{ 倍は加法の逆元}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [X, Y]_+ &= XY + YX \quad (\because [X, Y]_+ \text{ の定義}) \\ &= XY + (-XY) \quad (\because \text{上の } YX \text{ の計算}) \\ &= 0 \quad (\because \text{加法の逆元}) \end{aligned}$$

□

主張 7.3 (Z と Y の反交換関係).

$$[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta_{(\mu, \nu)}^M, \quad [Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0, \quad [Y_\mu, Y_\nu]_+ = 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta_{(\mu, \nu)}^M$$

証明. 記号を固定する. $I := I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}$ (2 次の単位行列) とし, $I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ を 2^M 次の単位行列とする. 主張 3.2 (2) より $I \boxtimes \cdots \boxtimes I = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ (左辺は M 個のクロネッカー積) である. $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ は 主張 7.1 の Pauli 行列である.

添字について. 定義 5.8 の Z_m, Y_m は $m \in \{1, \dots, M\}$ に対して定義され, $Z_{M+1} := Z_1$, $Y_{M+1} := Y_1$ と M 周期に拡張されている. よって Z_μ, Y_ν は添字の M を法とする剰余類のみで定まり, 代表元を $\mu, \nu \in \{1, \dots, M\}$ にとってよい. この範囲では $\mu \equiv \nu \pmod{M} \iff \mu = \nu$ であるから、であるから

$$\delta_{(\mu, \nu)}^M = \begin{cases} 1 & (\mu = \nu) \\ 0 & (\mu \neq \nu) \end{cases} \quad (\mu, \nu \in \{1, \dots, M\}) \quad (\because \text{定義 5.25 の定義})$$

クロネッカー積による表示. $m \in \{1, \dots, M\}$ に対し, 定義 5.8 の σ_k^a が「第 k 因子だけが σ^a で他は I であるクロネッカー積」であることと, 主張 3.2 (1) (クロネッカー積どうしの積は各サイトごとの積) および $I\sigma^a = \sigma^a I = \sigma^a$ から、

$$\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^a = \overbrace{\sigma^x}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \quad (a \in \{x, y, z\})$$

が成り立つ. 特に 定義 5.8 の定義により

$$\begin{aligned} Z_\mu &= \overbrace{\sigma^x}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \quad (\because \text{定義 5.8 の } Z_\mu \text{ の定義と、直前の表示を } a = z \text{ で読む}) \\ Y_\mu &= \overbrace{\sigma^x}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \quad (\because \text{定義 5.8 の } Y_\mu \text{ の定義と、直前の表示を } a = y \text{ で読む}) \end{aligned}$$

($\mu = 1$ のときは第 1 因子の左に因子が無い。この端の場合も次の一続きで定義と一致する。

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sigma^z \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{上のクロネッカー積表示を } \mu = 1 \text{ で読む}) \\ &= \sigma_1^z \quad (\because \text{定義 5.8 の } \sigma_1^z \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_1 &= \sigma^y \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{上のクロネッカー積表示を } \mu = 1 \text{ で読む}) \\ &= \sigma_1^y \quad (\because \text{定義 5.8 の } \sigma_1^y \text{ の定義}) \end{aligned}$$

また $\mu = M$ のときは第 M 因子の右に因子が無い。

以下、 $\mu, \nu \in \{1, \dots, M\}$ を固定して 3 つの式を順に示す。

【第 1 式】 $[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta_{(\mu, \nu)}^M$
 $\mu = \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$\begin{aligned} Z_\mu Z_\mu &= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (1)}) \\ &= \overbrace{I}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I, \text{ Pauli 行列の積}) \\ &= \overbrace{I}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^z \sigma^z = I, \text{ Pauli 行列の積}) \\ &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because II = I) \\ &= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (2)}) \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} [Z_\mu, Z_\mu]_+ &= Z_\mu Z_\mu + Z_\mu Z_\mu \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{上の計算を 2 箇所へ適用}) \\ &= 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{同じ行列の和}) \\ &= 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta_{(\mu, \mu)}^M \quad (\because \delta_{(\mu, \mu)}^M = 1) \end{aligned}$$

$\mu < \nu$ のとき、 Z_μ, Z_ν をクロネッカー積で表して各サイトごとに積をとると、

$$\begin{aligned} Z_\mu Z_\nu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\ &\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \quad (\because \text{上のクロネッカー積による表示}) \\ &= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (1)}) \\ &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^x \sigma^x = II = I, I \sigma^a = \sigma^a) \\ \\ Z_\nu Z_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\ &\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \quad (\because \text{上のクロネッカー積による表示}) \\ &= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{\text{1st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z I)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (1)}) \\ &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^x \sigma^x = II = I, \sigma^a I = \sigma^a) \end{aligned}$$

2つの結果は第 μ 因子のみが異なり、そこでは $\sigma^x \sigma^z = -\sigma^z \sigma^x$ (主張 7.1) である。クロネッカー積の第 μ 因子についての $\mathbb{C}$ -線型性 (主張 3.3) よりスカラー -1 が外へ出て、

$$\begin{aligned}
Z_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I & (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^z \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I & (\because \sigma^x \sigma^z = -\sigma^z \sigma^x, \text{Pauli 行列の積}) \\
&= - \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) & (\because \text{第 } \mu \text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Z_\nu & (\because \text{上の計算})
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
[Z_\mu, Z_\nu]_+ &= Z_\mu Z_\nu + Z_\nu Z_\mu & (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Z_\nu + (-Z_\mu Z_\nu) & (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 & (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}$$

$\mu > \nu$ のときは、上と同じ計算で μ と ν の役割が入れ替わる。因子ごとの積は

$$\begin{aligned}
Z_\mu Z_\nu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I & (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (1), } \sigma^x \sigma^x = II = I) \\
Z_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I & (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (1), } \sigma^x \sigma^x = II = I)
\end{aligned}$$

であり (第 $i < \nu$ 因子は $\sigma^x \sigma^x = I$ 、 $\nu < i < \mu$ では一方が I なので σ^x 、第 μ 因子は一方が I なので σ^z 、 $i > \mu$ では $II = I$)、食い違うのは第 ν 因子だけで $\sigma^z \sigma^x = -\sigma^x \sigma^z$ (主張 7.1) である。クロネッカー積の第 ν 因子についての $\mathbb{C}$ -線型性 (主張 3.3) でスカラー -1 を外へ出すと

$$\begin{aligned}
Z_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I & (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^x \sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I & (\because \sigma^z \sigma^x = -\sigma^x \sigma^z, \text{Pauli 行列の積}) \\
&= - \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) & (\because \text{第 } \nu \text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Z_\nu & (\because \text{上の計算})
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
[Z_\mu, Z_\nu]_+ &= Z_\mu Z_\nu + Z_\nu Z_\mu & (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Z_\nu + (-Z_\mu Z_\nu) & (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 & (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}$$

よって $\mu \neq \nu$ では $[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 0 = 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta_{(\mu, \nu)}^M$ であり、第 1 式が示された。

【第 2 式】 $[Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0$ 。この式は $\mu = \nu$ の場合も含めてすべての μ, ν で成り立つ (対角成分も消える)。 $\mu = \nu$ 、 $\mu < \nu$ 、 $\mu > \nu$ の 3 通りに分ける。

$\mu = \nu$ のとき、 Z_μ と Y_μ は第 μ 因子以外がすべて等しいので、因子ごとの積をとると

$$\begin{aligned}
Z_\mu Y_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \quad (\because Z_\mu, Y_\mu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I. \text{ Pauli 行列の積}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because II = I. \text{ 単位行列どうしの積})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Y_\mu Z_\mu &= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I. \text{ Pauli 行列の積}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because II = I. \text{ 単位行列どうしの積})
\end{aligned}$$

食い違うのは第 μ 因子であり、主張 7.1 より $\sigma^y \sigma^z = -\sigma^z \sigma^y$ 。クロネッカー積の第 μ 因子についての $\mathbb{C}$ -線型性 (主張 3.3) でスカラー -1 を外へ出すと

$$\begin{aligned}
Y_\mu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^z \sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^y \sigma^z = -\sigma^z \sigma^y. \text{ Pauli 行列の積}) \\
&= - \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{第 } \mu \text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Y_\mu \quad (\because \text{上の計算})
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
[Z_\mu, Y_\mu]_+ &= Z_\mu Y_\mu + Y_\mu Z_\mu \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Y_\mu + (-Z_\mu Y_\mu) \quad (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 \quad (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}$$

(これは 主張 7.2 を $j = \mu$ 、 x_i, y_i を上の各因子として適用した形でもある。) $\mu < \nu$ のとき、

$$\begin{aligned}
Z_\mu Y_\nu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \quad (\because Z_\mu, Y_\nu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I. \text{Pauli 行列の積}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because I \text{ は積の単位元}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \dots \boxtimes I \quad (\because II = I. \text{単位行列どうしの積})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \quad (\because Y_\nu, Z_\mu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y I)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y I)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I. \text{Pauli 行列の積}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because I \text{ は積の単位元}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \dots \boxtimes I \quad (\because II = I. \text{単位行列どうしの積})
\end{aligned}$$

第 i 因子を i の範囲ごとに比べると、 $i < \mu$ では両者とも I 、 $\mu < i < \nu$ では両者とも σ^x 、 $i = \nu$ では両者とも σ^y 、 $i > \nu$ では両者とも I で一致する。食い違うのは第 μ 因子だけで、そこは $\sigma^z \sigma^x$ と $\sigma^x \sigma^z = -\sigma^z \sigma^x$ (主張 7.1) である。クロネッカー積の第 μ 因子についての $\mathbb{C}$ -線型性 (主張 3.3) でスカラー -1 を外へ出して

$$\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \dots \boxtimes I \quad (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^z \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \dots \boxtimes I \quad (\because \sigma^x \sigma^z = -\sigma^z \sigma^x. \text{Pauli 行列の積}) \\
&= - \left(I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \dots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{第 } \mu \text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Y_\nu \quad (\because \text{上の計算})
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
[Z_\mu, Y_\nu]_+ &= Z_\mu Y_\nu + Y_\nu Z_\mu \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Y_\nu + (-Z_\mu Y_\nu) \quad (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 \quad (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}$$

$\mu > \nu$ のとき、 $\nu < \mu$ なので第 ν 因子で Z_μ 側が σ^x 、 Y_ν 側が σ^y になる。因子ごとの積をとると

$$\begin{aligned}
Z_\mu Y_\nu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\nu\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \quad (\because Z_\mu, Y_\nu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z I)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z I)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I. \text{ Pauli 行列の積}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because I \text{ は積の単位元}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \dots \boxtimes I \quad (\because II = I. \text{ 単位行列どうしの積})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\nu\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \quad (\because Y_\nu, Z_\mu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I. \text{ Pauli 行列の積}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because I \text{ は積の単位元}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \dots \boxtimes I \quad (\because II = I. \text{ 単位行列どうしの積})
\end{aligned}$$

食い違うのは第 ν 因子だけで、そこは $\sigma^x \sigma^y$ と $\sigma^y \sigma^x = -\sigma^x \sigma^y$ (主張 7.1) である。よって同様に、クロネッカー積の第 ν 因子についての $\mathbb{C}$ -線型性 (主張 3.3) でスカラー -1 が外へ出て

$$\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \dots \boxtimes I \quad (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^x \sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \dots \boxtimes I \quad (\because \sigma^y \sigma^x = -\sigma^x \sigma^y. \text{ Pauli 行列の積}) \\
&= - \left(I \boxtimes \dots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \dots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \dots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{第 } \nu \text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Y_\nu \quad (\because \text{上の計算})
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
[Z_\mu, Y_\nu]_+ &= Z_\mu Y_\nu + Y_\nu Z_\mu \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Y_\nu + (-Z_\mu Y_\nu) \quad (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 \quad (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}$$

3 通りすべてで $[Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0$ が示されたので、第 2 式が成り立つ。

【第 3 式】 $[Y_\mu, Y_\nu]_+ = 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta_{(\mu, \nu)}^M$

$\mu = \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$\begin{aligned}
Y_\mu Y_\mu &= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (1)}) \\
&= \overbrace{I}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I, \text{Pauli 行列の積}) \\
&= \overbrace{I}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^y \sigma^y = I, \text{Pauli 行列の積}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because II = I) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (2)})
\end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned}
[Y_\mu, Y_\mu]_+ &= Y_\mu Y_\mu + Y_\mu Y_\mu \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{上の計算を 2 箇所へ適用}) \\
&= 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{同じ行列の和}) \\
&= 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta_{(\mu, \mu)}^M \quad (\because \delta_{(\mu, \mu)}^M = 1)
\end{aligned}$$

$\mu < \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$\begin{aligned}
Y_\mu Y_\nu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \quad (\because \text{上のクロネッカー積による表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I \sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (1)}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^x \sigma^x = II = I, I \sigma^a = \sigma^a)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Y_\nu Y_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \quad (\because \text{上のクロネッカー積による表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y I)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (1)}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^x \sigma^x = II = I, \sigma^a I = \sigma^a)
\end{aligned}$$

食い違うのは第 μ 因子だけで、そこは $\sigma^y \sigma^x$ と $\sigma^x \sigma^y = -\sigma^y \sigma^x$ (主張 7.1) である。クロネッカー積の第 μ 因子についての $\mathbb{C}$ -線型性 (主張 3.3) でスカラー -1 を外へ出すと

$$\begin{aligned}
Y_\nu Y_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^y \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^x \sigma^y = -\sigma^y \sigma^x, \text{Pauli 行列の積}) \\
&= - \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{第 } \mu \text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Y_\mu Y_\nu \quad (\because \text{上の計算})
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
[Y_\mu, Y_\nu]_+ &= Y_\mu Y_\nu + Y_\nu Y_\mu \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Y_\mu Y_\nu + (-Y_\mu Y_\nu) \quad (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 \quad (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}$$

$\mu > \nu$ のときは、上の計算で μ と ν の役割を入れ替えればよい。因子ごとの積は

$$\begin{aligned}
Y_\mu Y_\nu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y)^{\nu \text{th}}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x^{(\nu+1) \text{th}}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x^{(\mu-1) \text{th}}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y^{\mu \text{th}}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (1), } \sigma^x \sigma^x = II = I) \\
Y_\nu Y_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)^{\nu \text{th}}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x^{(\nu+1) \text{th}}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x^{(\mu-1) \text{th}}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y^{\mu \text{th}}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (1), } \sigma^x \sigma^x = II = I)
\end{aligned}$$

であり（第 $i < \nu$ 因子は $\sigma^x \sigma^x = I$ 、 $\nu < i < \mu$ では一方が I なので σ^x 、第 μ 因子は一方が I なので σ^y 、 $i > \mu$ では $II = I$ ）、食い違うのは第 ν 因子だけで $\sigma^y \sigma^x = -\sigma^x \sigma^y$ であるから、クロネッカー積の第 ν 因子についての $\mathbb{C}$ -線型性（主張 3.3）でスカラー -1 を外へ出すと

$$\begin{aligned}
Y_\nu Y_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)^{\nu \text{th}}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x^{(\nu+1) \text{th}}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x^{(\mu-1) \text{th}}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y^{\mu \text{th}}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^x \sigma^y)^{\nu \text{th}}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x^{(\nu+1) \text{th}}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x^{(\mu-1) \text{th}}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y^{\mu \text{th}}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^y \sigma^x = -\sigma^x \sigma^y, \text{ Pauli 行列の積}) \\
&= - \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x \sigma^y)^{\nu \text{th}}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x^{(\nu+1) \text{th}}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x^{(\mu-1) \text{th}}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y^{\mu \text{th}}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{第 } \nu \text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Y_\mu Y_\nu \quad (\because \text{上の計算})
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
[Y_\mu, Y_\nu]_+ &= Y_\mu Y_\nu + Y_\nu Y_\mu \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Y_\mu Y_\nu + (-Y_\mu Y_\nu) \quad (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 \quad (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}$$

よって $\mu \neq \nu$ では $[Y_\mu, Y_\nu]_+ = 0 = 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta_{(\mu, \nu)}^M$ であり、第 3 式が示された。以上で 3 式すべてが証明された。□

8 $\hat{Z}$ と $\hat{Y}$ の反交換関係

主張 8.1 ($\hat{Z}$ と $\hat{Y}$ の反交換関係). $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu$ は Z_j, Y_j の $\mathbb{C}$ -線型結合であり、定義 5.8 のとおり $Z_j, Y_j \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ であるから、以下の等式はすべて 2^M 次の複素行列の等式である。 $I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ は 2^M 次の単位行列を表す（定義 3.1、主張 3.2 (2)）。

$$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\pm)}]_+ = 2M \delta_{\mu+\nu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\text{複合同順})$$

$$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\mp)}]_+ = 2M \delta_{\mu+\nu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + \left(-2 \exp\left(-i \frac{2\pi}{M} (\mu + \nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) \quad (\text{複合同順})$$

$$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\nu]_+ = 0$$

$$[\hat{Y}_\mu, \hat{Y}_\nu]_+ = 2M \delta_{\mu+\nu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$$

証明. はじめに記号を 1 つ置く。 $j \in \{1, \dots, M\}$ について次のように置く。

$$\varepsilon_j^{(\pm)} := \begin{cases} \mp 1 & (j = 1), \\ +1 & (j \neq 1) \end{cases} \in \{+1, -1\} \quad (\because \text{場合分けによる定義})$$

定義 5.27 の定義は $\hat{Z}_\mu^{(\pm)} = \sum_{j=1}^M \varepsilon_j^{(\pm)} Z_j \exp\left(-i\frac{2\pi j\mu}{M}\right)$ と書ける。 $\varepsilon_j^{(\pm)}$ は $\mathbb{C}$ の元であり、行列の積と可換に動かせる。

$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\pm)}]_+$ の計算:

$$\begin{aligned} [\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\pm)}]_+ &= \left[\sum_{j=1}^M \varepsilon_j^{(\pm)} Z_j \exp\left(-i\frac{2\pi j\mu}{M}\right), \sum_{k=1}^M \varepsilon_k^{(\pm)} Z_k \exp\left(-i\frac{2\pi k\nu}{M}\right) \right]_+ \quad (\because \text{定義 5.27 と上で置いた記号}) \\ &= \left(\sum_{j=1}^M \varepsilon_j^{(\pm)} Z_j \exp\left(-i\frac{2\pi j\mu}{M}\right) \right) \left(\sum_{k=1}^M \varepsilon_k^{(\pm)} Z_k \exp\left(-i\frac{2\pi k\nu}{M}\right) \right) \\ &\quad + \left(\sum_{k=1}^M \varepsilon_k^{(\pm)} Z_k \exp\left(-i\frac{2\pi k\nu}{M}\right) \right) \left(\sum_{j=1}^M \varepsilon_j^{(\pm)} Z_j \exp\left(-i\frac{2\pi j\mu}{M}\right) \right) \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= \sum_{j,k=1}^M \varepsilon_j^{(\pm)} \varepsilon_k^{(\pm)} Z_j Z_k \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + k\nu)\right) \\ &\quad + \sum_{j,k=1}^M \varepsilon_k^{(\pm)} \varepsilon_j^{(\pm)} Z_k Z_j \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(k\nu + j\mu)\right) \quad (\because \text{有限和どうしの積を二重和へ開いた (分配則)}) \\ &= \sum_{j,k=1}^M \varepsilon_j^{(\pm)} \varepsilon_k^{(\pm)} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + k\nu)\right) (Z_j Z_k + Z_k Z_j) \quad (\because \text{2 つの二重和をまとめ、}\mathbb{C}\text{ の係数を前へ出した}) \\ &= \sum_{j,k=1}^M \varepsilon_j^{(\pm)} \varepsilon_k^{(\pm)} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + k\nu)\right) [Z_j, Z_k]_+ \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= \sum_{j,k=1}^M \varepsilon_j^{(\pm)} \varepsilon_k^{(\pm)} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + k\nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta_{(j,k)}^M \quad (\because \text{主張 7.3 の第 1 式}) \\ &= \sum_{j=1}^M \varepsilon_j^{(\pm)} \varepsilon_j^{(\pm)} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + j\nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{定義 5.25 により } k \neq j \text{ の項が消える}) \\ &= \sum_{j=1}^M \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + j\nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \varepsilon_j^{(\pm)} \in \{+1, -1\} \text{ なので } \varepsilon_j^{(\pm)} \varepsilon_j^{(\pm)} = 1) \\ &= \sum_{j=1}^M \exp\left(-i\frac{2\pi j}{M}(\mu + \nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because j\mu + j\nu = j(\mu + \nu)) \\ &= 2M \delta_{\mu+\nu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{主張 5.26 を } k = -(\mu + \nu) \text{ で使った}) \end{aligned}$$

$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\mp)}]_+$ の計算に入る前に、2 つの符号の積の値を求めておく。 $j = 1$ のとき (複合同順)

$$\begin{aligned} \varepsilon_1^{(\pm)} \varepsilon_1^{(\mp)} &= (\mp 1)(\pm 1) \quad (\because \varepsilon_j^{(\pm)} \text{ の定義の } j = 1 \text{ の場合を 2 つの符号へ当てた}) \\ &= -1 \quad (\because \text{実数の積 } (-1)(+1) = (+1)(-1) = -1) \end{aligned}$$

であり、 $j \neq 1$ のとき

$$\begin{aligned} \varepsilon_j^{(\pm)} \varepsilon_j^{(\mp)} &= (+1)(+1) \quad (\because \varepsilon_j^{(\pm)} \text{ の定義の } j \neq 1 \text{ の場合を 2 つの符号へ当てた}) \\ &= +1 \quad (\because \text{実数の積 } 1 \cdot 1 = 1) \end{aligned}$$

である。すなわち $j = 1$ の項だけ符号が反転する。

$$\begin{aligned}
[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\mp)}]_+ &= \sum_{j=1}^M \varepsilon_j^{(\pm)} \varepsilon_j^{(\mp)} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + j\nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because \text{第 1 式の鎖の第 1 段から第 8 段までと同じ計算。第 2 の因子の符号だけが } \varepsilon^{(\mp)} \text{ である}) \\
&= \varepsilon_1^{(\pm)} \varepsilon_1^{(\mp)} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(\mu + \nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + \sum_{j=2}^M \varepsilon_j^{(\pm)} \varepsilon_j^{(\mp)} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + j\nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because \text{有限和から } j=1 \text{ の項を分けた}) \\
&= (-1) \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(\mu + \nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + \sum_{j=2}^M \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + j\nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because \text{上で求めた符号の積の値}) \\
&= (-1) \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(\mu + \nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \\
&\quad + \left(\sum_{j=1}^M \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + j\nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} - \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(\mu + \nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) & (\because j=1 \text{ の項を足して引いた}) \\
&= \sum_{j=1}^M \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + j\nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + \left(-2 \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(\mu + \nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) & (\because \text{同じ項どうしをまとめた}) \\
&= \sum_{j=1}^M \exp\left(-i\frac{2\pi j}{M}(\mu + \nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + \left(-2 \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(\mu + \nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) & (\because j\mu + j\nu = j(\mu + \nu)) \\
&= 2M \delta_{\mu+\nu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + \left(-2 \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(\mu + \nu)\right) \cdot 2I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) & (\because \text{主張 5.26 を } k = -(\mu + \nu) \text{ で使い、定義 5.25 で書いた})
\end{aligned}$$

$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\nu]_+$ 、 $[\hat{Y}_\mu, \hat{Y}_\nu]_+$ についても同様（原文もこの 2 つは「同様」として詳細を省いている）。 $\square$

9 $T_{V_1}(\hat{Z})$ と $\hat{Z}, \hat{Y}$ の関係

主張 9.1 ($H_1^{(\pm)}, H_2$ と $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu$ の交換関係). $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\begin{aligned}
[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] &= 2e^{-i2\pi\mu/M} \hat{Y}_\mu \\
[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)}] &= 2e^{-i2\pi\mu/M} \hat{Y}_\mu \\
[H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] &= -2e^{i2\pi\mu/M} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \\
[H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}] &= -2\hat{Y}_\mu \\
[H_2, \hat{Z}_\mu^{(+)}] &= -2\hat{Y}_\mu + \frac{4}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)} \hat{Y}_j \\
[H_2, \hat{Y}_\mu] &= 2\hat{Z}_\mu^{(-)}
\end{aligned}$$

証明. 以下の各変形では 主張 5.29 の表式と 主張 8.1 の反交換関係を用いる。

(1) $[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}]$ について、 $\mu \in \mathcal{M}$ を任意に取る。準備として次の 3 つを先に用意する。
準備 1 ($\hat{Y}$ の M ずれ)。 $\nu \in \mathbb{Z}$ について、

$$\begin{aligned}
\hat{Y}_{\nu+M} &= \sum_{j=1}^M Y_j \exp\left(-i\frac{2\pi j(\nu+M)}{M}\right) & (\because \hat{Z}, \hat{Y} \text{ の定義}) \\
&= \sum_{j=1}^M Y_j \exp\left(-i\frac{2\pi j\nu}{M}\right) \exp(-i2\pi j) & (\because \text{指数法則}) \\
&= \sum_{j=1}^M Y_j \exp\left(-i\frac{2\pi j\nu}{M}\right) \cdot 1 & (\because j \in \mathbb{Z} \text{ でのオイラーの公式 } (\hat{Z}_M^{(-)} = \hat{Z}_{-M}^{(-)}, \hat{Y}_M = \hat{Y}_{-M} \text{ と同じ計算}) \\
&= \hat{Y}_\nu & (\because \hat{Z}, \hat{Y} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

準備 2 (指数の M ずれ)。 $\nu \in \mathbb{Z}$ について、

$$\begin{aligned}
\exp\left(-i\frac{2\pi(\nu+M)}{M}\right) &= \exp\left(-i\frac{2\pi\nu}{M}\right) \exp(-i2\pi) & (\because \text{指数法則}) \\
&= \exp\left(-i\frac{2\pi\nu}{M}\right) \cdot 1 & (\because \text{オイラーの公式}) \\
&= \exp\left(-i\frac{2\pi\nu}{M}\right) & (\because \text{複素数の四則})
\end{aligned}$$

準備 3 (和に残る j の決定)。 $j \in \{1, \dots, M\}$ かつ $-j + \mu \equiv 0 \pmod{M}$ を満たす j はちょうど 1 つであり、

$$j = \begin{cases} M & (\mu = -M) \\ M + \mu & (-M + 1 \leq \mu \leq -1) \\ \mu & (1 \leq \mu \leq M) \end{cases} \quad (\because 1 \leq j \leq M \text{ と合同式の条件})$$

また、 $\hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j = -\hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ である (主張 8.1 の $[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\nu]_+ = 0$ を移項したもの)。以上のもとで、

$$\begin{aligned} [H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] &= \left(\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \right) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \left(\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \right) \quad (\because H_1^{(\pm)}, H_2 \text{ を } \hat{Z}, \hat{Y} \text{ で表す、と交換子の定義}) \\ &= \frac{1}{M} \left(\sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \text{有限和と行列の積の分配則}) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \text{有限和どうしの差は項ごとの差の和}) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \left(\hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \text{分配則}) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \left(\hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} + \hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j = -\hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \text{ すなわち } \hat{Z} \text{ と } \hat{Y} \text{ の反交換関係}) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left(\hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} + \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \text{分配則}) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j [\hat{Z}_{-j}^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}]_+ \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left(2M \delta_{-j+\mu, 0}^M I_{\text{Mat}(2M, \mathbb{C})} \right) \quad (\because \hat{Z} \text{ と } \hat{Y} \text{ の反交換関係の } [\hat{Z}, \hat{Z}]_+ \text{ の値}) \\ &= 2 \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \delta_{-j+\mu, 0}^M e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \quad (\because \text{単位行列との積とスカラーの整理}) \\ &= 2 \sum_{\substack{j \in \{1, \dots, M\} \\ -j+\mu \equiv 0 \pmod{M}}} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \quad (\because \delta^M \text{ の定義}) \\ &= 2 \begin{cases} e^{-i \frac{2\pi M}{M}} \hat{Y}_M & (\mu = -M) \\ e^{-i \frac{2\pi(M+\mu)}{M}} \hat{Y}_{M+\mu} & (-M+1 \leq \mu \leq -1) \\ e^{-i \frac{2\pi \mu}{M}} \hat{Y}_\mu & (1 \leq \mu \leq M) \end{cases} \quad (\because \text{準備 3}) \\ &= 2 e^{-i \frac{2\pi \mu}{M}} \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{準備 1 と準備 2 } (\nu = \mu \text{ または } \nu = -M)) \end{aligned}$$

引いたブロックは 定義 5.27、主張 5.30、主張 5.29、主張 8.1、定義 5.25 である。

(2) $[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)}]$ について、 $\mu \in \mathcal{M}$ を任意に取る。準備 1 と準備 2 に加えて、次の 3 つを先に用意する。

準備 4 ($H_1^{(\pm)}$ の表式)。

$$H_1^{(\pm)} = \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(\hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i \frac{2\pi j}{M}} \right) \quad (\because H_1^{(\pm)}, H_2 \text{ を } \hat{Z}, \hat{Y} \text{ で表す})$$

準備 5 (反交換関係の移項)。 $j \in \{1, \dots, M\}$ について $\hat{Z}_\mu^{(\mp)} \hat{Y}_j = -\hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\mp)}$ である (主張 8.1 の $[\hat{Z}_\mu^{(\mp)}, \hat{Y}_j]_+ = 0$ を移項したもの)。

準備 6 (第 1 項の和に残る j の決定)。 $j \in \{1, \dots, M\}$ かつ $-j + \mu \equiv 0 \pmod{M}$ を満たす j はちょうど 1 つであり、

$$j = \begin{cases} 2M + \mu & (\mu = -M) \\ M + \mu & (-M + 1 \leq \mu \leq -1) \\ \mu & (1 \leq \mu \leq M) \end{cases} \quad (\because 1 \leq j \leq M \text{ と合同式の条件})$$

以上のもとで、

$$\begin{aligned}
[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)}] &= \left[\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(\hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \right), \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \right] & (\because \text{準備 4}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left[\hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i\frac{2\pi j}{M}}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \right] & (\because \text{交換子の定義と、有限和・スカラー倍についての分配則}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left[\hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \right] & (\because \text{スカラー倍を交換子の外へ出した}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left(\hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\mp)} - \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) & (\because \text{交換子の定義}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left(\hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\mp)} + \hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) & (\because \text{準備 5}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left(\hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\mp)} + \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) & (\because \text{分配則}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left[\hat{Z}_{-j}^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \right]_+ & (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left(2M \delta_{-j+\mu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + \left(-2 e^{-i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)} \cdot 2 I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) \right) & (\because \hat{Z} \text{ と } \hat{Y} \text{ の反交換関係の } [\hat{Z}^{(\pm)}, \hat{Z}^{(\mp)}]_+ \text{ の値}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left(2M \delta_{-j+\mu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) + \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left(-2 e^{-i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)} \cdot 2 I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) & (\because \text{分配則と、有限和の項ごとの分割}) \\
&= 2 \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \delta_{-j+\mu, 0}^M - \frac{4}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M} - i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)} \hat{Y}_j & (\because \text{単位行列との積とスカラーの整理、および指数法則}) \\
&= 2 \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \delta_{-j+\mu, 0}^M - \frac{4}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \hat{Y}_j & (\because \text{指数の中の } j \text{ が打ち消し合う}) \\
&= 2 \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \delta_{-j+\mu, 0}^M - \frac{4}{M} e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Y}_j & (\because j \text{ によらない因子を有限和の外へ出した}) \\
&= 2 \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \delta_{-j+\mu, 0}^M - \frac{4}{M} e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \sum_{k=1}^M Y_k e^{-ik\frac{2\pi j}{M}} & (\because \hat{Z}, \hat{Y} \text{ の定義}) \\
&= 2 \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \delta_{-j+\mu, 0}^M - \frac{4}{M} e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \sum_{k=1}^M Y_k \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-ik\frac{2\pi j}{M}} & (\because \text{有限和の順序の入れ替えと、} k \text{ によらない因子を内側の和の外へ出した}) \\
&= 2 \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \delta_{-j+\mu, 0}^M - \frac{4}{M} e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \sum_{k=1}^M Y_k M \delta_{(k, 0)}^M & (\because \text{指数和の公式}) \\
&= 2 \begin{cases} e^{-i\frac{2\pi(2M+\mu)}{M}} \hat{Y}_{2M+\mu} & (\mu = -M) \\ e^{-i\frac{2\pi(M+\mu)}{M}} \hat{Y}_{M+\mu} & (-M+1 \leq \mu \leq -1) \\ e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \hat{Y}_\mu & (1 \leq \mu \leq M) \end{cases} & \left(\begin{array}{l} \text{第 1 項は準備 6} \\ \text{第 2 項は原文が 0 とおいている} \end{array} \right) \\
&= 2 e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \hat{Y}_\mu & (\because \text{準備 1 と準備 2 } (\nu = \mu \text{ または } \nu = M + \mu))
\end{aligned}$$

指数和の公式は主張 5.26 による。第 2 項を 0 とおく段は、原文の扱いをそのまま写したものであり、本文では確かめていない。

引いたブロックは定義 5.27、主張 5.30、主張 5.29、主張 8.1、定義 5.25、主張 5.26 である。

(3) $[H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu]$ について、 $\mu \in \mathcal{M}$ を任意に取る。準備として次の 3 つを先に用意する。

準備 1 ($\hat{Z}^{(\pm)}$ の M ずれ)。 $\nu \in \mathbb{Z}$ について、

$$\begin{aligned}
\hat{Z}_{\nu+M}^{(\pm)} &= \sum_{j=1}^M Z_j^{(\pm)} \exp\left(-i\frac{2\pi j(\nu+M)}{M}\right) & (\because \hat{Z}, \hat{Y} \text{ の定義}) \\
&= \sum_{j=1}^M Z_j^{(\pm)} \exp\left(-i\frac{2\pi j\nu}{M}\right) \exp(-i2\pi j) & (\because \text{指数法則}) \\
&= \sum_{j=1}^M Z_j^{(\pm)} \exp\left(-i\frac{2\pi j\nu}{M}\right) \cdot 1 & (\because j \in \mathbb{Z} \text{ でのオイラーの公式 } (\hat{Z}_M^{(-)} = \hat{Z}_{-M}^{(-)} \text{ と同じ計算}) \\
&= \hat{Z}_\nu^{(\pm)} & (\because \hat{Z}, \hat{Y} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

準備 2 (指数の M ずれ)。(1) の準備 2 をそのまま使う。すなわち $\nu \in \mathbb{Z}$ について $\exp\left(-i\frac{2\pi(\nu+M)}{M}\right) = \exp\left(-i\frac{2\pi\nu}{M}\right)$ である。

準備 3 (和に残る j の決定)。 $j \in \{1, \dots, M\}$ かつ $j + \mu \equiv 0 \pmod{M}$ を満たす j はちょうど 1 つであり、

$$j = \begin{cases} -\mu & (\mu \leq -1) \\ M - \mu & (1 \leq \mu \leq M-1) \\ M & (\mu = M) \end{cases} \quad (\because 1 \leq j \leq M \text{ と合同式の条件})$$

また、 $\hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Y}_\mu = -\hat{Y}_\mu \hat{Z}_{-j}^{(\pm)}$ である (主張 8.1 の $[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\nu]_+ = 0$ を移項したもの)。以上のもつで、

$$\begin{aligned}
[H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] &= \left(\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \right) \hat{Y}_\mu - \hat{Y}_\mu \left(\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \right) \quad (\because H_1^{(\pm)}, H_2 \text{ を } \hat{Z}, \hat{Y} \text{ で表す、と交換子の定義}) \\
&= \frac{1}{M} \left(\sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Y}_\mu - \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \text{有限和と行列の積の分配則}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Y}_\mu - e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \text{有限和どうしの差は項ごとの差の和}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left(\hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Y}_\mu - \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \text{分配則}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left(-\hat{Y}_j \hat{Y}_\mu \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} - \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Y}_\mu = -\hat{Y}_\mu \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \text{ すなわち } \hat{Z} \text{ と } \hat{Y} \text{ の反交換関係}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left(-\hat{Y}_j \hat{Y}_\mu - \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \right) \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \quad (\because \text{分配則}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left(-[\hat{Y}_j, \hat{Y}_\mu]_+ \right) \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left(-2M \delta_{j+\mu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \quad (\because \hat{Z} \text{ と } \hat{Y} \text{ の反交換関係の } [\hat{Y}, \hat{Y}]_+ \text{ の値}) \\
&= -2 \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \delta_{j+\mu, 0}^M e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \quad (\because \text{単位行列との積とスカラーの整理}) \\
&= -2 \sum_{\substack{j \in \{1, \dots, M\} \\ j+\mu \equiv 0 \pmod{M}}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \quad (\because \delta^M \text{ の定義}) \\
&= -2 \begin{cases} e^{-i\frac{2\pi(-\mu)}{M}} \hat{Z}_{-(-\mu)}^{(\pm)} & (\mu \leq -1) \\ e^{-i\frac{2\pi(M-\mu)}{M}} \hat{Z}_{-(M-\mu)}^{(\pm)} & (1 \leq \mu \leq M-1) \\ e^{-i\frac{2\pi M}{M}} \hat{Z}_{-M}^{(\pm)} & (\mu = M) \end{cases} \quad (\because \text{準備 3}) \\
&= -2 e^{-i\frac{2\pi(-\mu)}{M}} \hat{Z}_{\mu}^{(\pm)} \quad (\because \text{準備 1 と準備 2 } (1 \leq \mu \leq M-1 \text{ では } \nu = -\mu \text{ として 1 度、} \mu = M \text{ では } \nu = -M, 0 \text{ として 2 度当てる)}) \\
&= -2 e^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \hat{Z}_{\mu}^{(\pm)} \quad (\because \text{指数の符号の整理})
\end{aligned}$$

引いたブロックは 定義 5.27、主張 5.30、主張 5.29、主張 8.1、定義 5.25 である。

(4) $[H_2, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}]$ について、 $\mu \in \mathcal{M}$ を任意に取る。準備として次の 3 つを先に用意する。

準備 1 ($\hat{Z}$ と $\hat{Y}$ の入れ替え)。 $\hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j = -\hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ である (主張 8.1 の $[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\nu]_+ = 0$ を移項したもの)。

準備 2 (和に残る j の決定)。 $j \in \{1, \dots, M\}$ かつ $-j + \mu \equiv 0 \pmod{M}$ を満たす j はちょうど 1 つであり、

$$j = \begin{cases} M & (\mu = -M) \\ M + \mu & (-M + 1 \leq \mu \leq -1) \\ \mu & (1 \leq \mu \leq M) \end{cases} \quad (\because 1 \leq j \leq M \text{ と合同式の条件})$$

準備 3 ($\hat{Y}$ の M 周期性)。 $\nu \in \mathbb{Z}$ について $\hat{Y}_{\nu+M} = \hat{Y}_\nu$ である (主張 5.30)。以上のもとで、まず $\hat{Z}$ の符号によらず次まで進む。

$$\begin{aligned}
[H_2, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] &= \left(\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \left(\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \quad (\because H_1^{(\pm)}, H_2 \text{ を } \hat{Z}, \hat{Y} \text{ で表す、と交換子の定義}) \\
&= \frac{1}{M} \left(\left(\sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \left(\sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \right) \quad (\because \text{スカラー倍は行列の積と可換に動かせる}) \\
&= \frac{1}{M} \left(\sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \quad (\because \text{有限和と行列の積の分配則}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(\hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \quad (\because \text{有限和どうしの差は項ごとの差の和}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(-\hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \quad (\because \text{準備 1}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(-\hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \right) \hat{Y}_j \quad (\because \text{分配則}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(-[\hat{Z}_{-j}^{(-)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}]_+ \right) \hat{Y}_j \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(-[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_{-j}^{(-)}]_+ \right) \hat{Y}_j \quad (\because \text{反交換子は 2 つの引数の順序を入れ替えても変わらない})
\end{aligned}$$

以下、 $\hat{Z}$ の符号で分岐する (反交換子 $[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\pm)}]_+$ と $[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\mp)}]_+$ の値が異なるためである。主張 8.1)。

(4.1) $[H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}]$ について：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} (-[\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Z}_{-j}^{(-)}]_+) \hat{Y}_j &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} (-2M \delta_{-j+\mu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}) \hat{Y}_j \quad (\because \hat{Z} \text{ と } \hat{Y} \text{ の反交換関係の } [\hat{Z}^{(\pm)}, \hat{Z}^{(\pm)}]_+ \text{ の値}) \\
&= -2 \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \delta_{-j+\mu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \hat{Y}_j \quad (\because \text{スカラーの整理}) \\
&= -2 \sum_{\substack{j \in \{1, \dots, M\} \\ -j+\mu \equiv 0 \pmod{M}}} \hat{Y}_j \quad (\because \delta^M \text{ の定義と単位行列との積}) \\
&= -2 \begin{cases} \hat{Y}_M & (\mu = -M) \\ \hat{Y}_{M+\mu} & (-M+1 \leq \mu \leq -1) \\ \hat{Y}_\mu & (1 \leq \mu \leq M) \end{cases} \quad (\because \text{準備 2}) \\
&= -2 \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{準備 3 } (\mu = -M \text{ では } \nu = 0, -M \text{ として 2 度、} -M+1 \leq \mu \leq -1 \text{ では } \nu = \mu \text{ として 1 度当てる}))
\end{aligned}$$

(4.2) $[H_2, \hat{Z}_\mu^{(+)}]$ について：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} (-[\hat{Z}_\mu^{(+)}, \hat{Z}_{-j}^{(-)}]_+) \hat{Y}_j &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} (- (2M \delta_{-j+\mu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + (-2 e^{-i \frac{2\pi}{M}} (-j+\mu) \cdot 2 I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})})) \hat{Y}_j \quad (\because \hat{Z} \text{ と } \hat{Y} \text{ の反交換関係の } [\hat{Z}^{(\pm)}, \hat{Z}^{(\mp)}]_+ \text{ の値を } \nu = -j \text{ で使う}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} (-2M \delta_{-j+\mu, 0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} + 4 e^{-i \frac{2\pi}{M}} (-j+\mu) I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}) \hat{Y}_j \quad (\because \text{括弧の展開 (負号を両項へ配る) と複素数の四則}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} (-2M \delta_{-j+\mu, 0}^M \hat{Y}_j + 4 e^{-i \frac{2\pi}{M}} (-j+\mu) \hat{Y}_j) \quad (\because \text{分配則と単位行列との積}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} (-2M \delta_{-j+\mu, 0}^M \hat{Y}_j) + \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} (4 e^{-i \frac{2\pi}{M}} (-j+\mu) \hat{Y}_j) \quad (\because \text{項ごとの和の有限和は有限和どうしの和}) \\
&= -2 \sum_{\substack{j \in \{1, \dots, M\} \\ -j+\mu \equiv 0 \pmod{M}}} \hat{Y}_j + \frac{4}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i \frac{2\pi}{M}} (-j+\mu) \hat{Y}_j \quad (\because \delta^M \text{ の定義とスカラーの整理}) \\
&= -2 \begin{cases} \hat{Y}_M & (\mu = -M) \\ \hat{Y}_{M+\mu} & (-M+1 \leq \mu \leq -1) \\ \hat{Y}_\mu & (1 \leq \mu \leq M) \end{cases} + \frac{4}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i \frac{2\pi}{M}} (-j+\mu) \hat{Y}_j \quad (\because \text{準備 2}) \\
&= -2 \hat{Y}_\mu + \frac{4}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} e^{-i \frac{2\pi}{M}} (-j+\mu) \hat{Y}_j \quad (\because \text{準備 3 } (\mu = -M \text{ では } \nu = 0, -M \text{ として 2 度、} -M+1 \leq \mu \leq -1 \text{ では } \nu = \mu \text{ として 1 度当てる}))
\end{aligned}$$

第 2 項は消えない。 $\hat{Y}_j$ の定義を入れて j について和を取ると $4 e^{-i \frac{2\pi}{M}} Y_1$ になる (主張 14.2 が $[H_2, \hat{Z}_\mu^{(+)}] = -2 \hat{Y}_\mu + 4 e^{-i \frac{2\pi}{M}} Y_1$ として使っている形である)。すなわち $[H_2, \hat{Z}_\mu^{(+)}] \neq -2 \hat{Y}_\mu$ であり、(4.1) と同じ形にはならない。

(5) $[H_2, \hat{Y}_\mu]$ について、 $\mu \in M$ を任意に取る。準備として次の 3 つを先に用意する (以下この (5) の中でだけ準備 1~3 と呼ぶ)。

準備 1 ($\hat{Y}$ と $\hat{Z}$ の入れ替え)。 $\hat{Y}_\mu \hat{Z}_{-j}^{(-)} = -\hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_\mu$ である (主張 8.1 の $[\hat{Z}_\nu^{(\pm)}, \hat{Y}_{\nu'}]_+ = 0$ を移項したもの)。

準備 2 (和に残る j の決定)。 $j \in \{1, \dots, M\}$ かつ $j + \mu \equiv 0 \pmod{M}$ を満たす j はちょうど 1 つであり、

$$j = \begin{cases} -\mu & (-M \leq \mu \leq -1) \\ M - \mu & (1 \leq \mu \leq M-1) \\ M & (\mu = M) \end{cases} \quad (\because 1 \leq j \leq M \text{ と合同式の条件})$$

準備 3 ($\hat{Z}$ の M 周期性)。 $\nu \in \mathbb{Z}$ について $\hat{Z}_{\nu+M}^{(-)} = \hat{Z}_\nu^{(-)}$ である (主張 5.30)。以上のもとで、

$$\begin{aligned}
[H_2, \hat{Y}_\mu] &= \left(\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \hat{Y}_\mu - \hat{Y}_\mu \left(\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \quad (\because H_1^{(\pm)}, H_2 \text{ を } \hat{Z}, \hat{Y} \text{ で表す、と交換子の定義}) \\
&= \frac{1}{M} \left(\left(\sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \hat{Y}_\mu - \hat{Y}_\mu \left(\sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \right) \quad (\because \text{スカラー倍は行列の積と可換に動かせる}) \\
&= \frac{1}{M} \left(\sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \hat{Y}_\mu - \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Y}_\mu \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \quad (\because \text{有限和と行列の積の分配則}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(\hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \hat{Y}_\mu - \hat{Y}_\mu \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \quad (\because \text{有限和どうしの差は項ごとの差の和}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \left(\hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \hat{Y}_\mu + \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \right) \quad (\because \text{準備 1}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \left(\hat{Y}_j \hat{Y}_\mu + \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \right) \quad (\because \text{行列の積の分配則}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} [\hat{Y}_j, \hat{Y}_\mu]_+ \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \left(2M \delta_{j+\mu, 0}^{M} I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) \quad (\because \hat{Z} \text{ と } \hat{Y} \text{ の反交換関係の } [\hat{Y}, \hat{Y}]_+ \text{ の値}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} 2M \delta_{j+\mu, 0}^{M} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \quad (\because \text{単位行列との積と、スカラー倍を行列の前へ出すこと}) \\
&= 2 \sum_{\substack{j \in \{1, \dots, M\} \\ j+\mu \equiv 0 \pmod{M}}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \quad (\because \delta^M \text{ の定義とスカラーの整理}) \\
&= 2 \begin{cases} \hat{Z}_{-M+\mu}^{(-)} & (-M \leq \mu \leq -1) \\ \hat{Z}_{-\mu}^{(-)} & (1 \leq \mu \leq M-1) \\ \hat{Z}_{-M}^{(-)} & (\mu = M) \end{cases} \quad (\because \text{準備 2}) \\
&= 2 \hat{Z}_{-\mu}^{(-)} \quad (\because \text{準備 3 } (-M \leq \mu \leq -1 \text{ では使わず、} 1 \leq \mu \leq M-1 \text{ では } \nu = -M + \mu \text{ として 1 度、} \mu = M \text{ では } \nu = -M, 0 \text{ として 2 度当てる}))
\end{aligned}$$

引いたブロックは 主張 5.30、主張 5.29、主張 8.1、定義 5.25 である。 $\square$

主張 9.2. $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 、 $\mu \in \mathcal{M}$ とする。以下に現れる $H_1^{(\pm)}, H_2, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu$ はすべて結合代数 $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元であり (主張 5.29、定義 5.27)、 $K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$ はスカラー、 $[X, Y] := XY - YX$ は同代数の交換子である。

また、 $X \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を固定するごとに n 重の交換子を

$$\underbrace{[X, \dots, [X, W] \dots]}_n := \underbrace{\text{ad}_X \circ \dots \circ \text{ad}_X}_n(W), \quad \text{ad}_X(W) := [X, W]$$

と定める ($\text{ad}_X : \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \rightarrow \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ は $\mathbb{C}$ 線型写像)。とくに $n = 0$ の場合は恒等写像であり、0 重の交換子の値は作用素そのもの W である。

(h1.z)

$$\underbrace{[K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, [K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] \dots]}_n = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i2\pi\mu/M} \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(ただし $n = 0$ のとき値は $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$)

(h1.y)

$$\underbrace{[K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, [K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] \dots]}_n = \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i2\pi\mu/M} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(ただし $n = 0$ のとき値は $\hat{Y}_\mu$)

(h2.z-)

$$\underbrace{[K_2^* H_2, \dots, [K_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}] \dots]}_n = \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(ただし $n = 0$ のとき値は $\hat{Z}_\mu^{(-)}$)

(h2.y)

$$\underbrace{[K_2^* H_2, \dots, [K_2^* H_2, \hat{Y}_\mu] \dots]}_n = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(ただし $n = 0$ のとき値は $\hat{Y}_\mu$)

証明. 以下、 $\theta := \frac{2\pi\mu}{M} \in \mathbb{R}$ と略記する。証明はすべて $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に関する帰納法であり、帰納段階では主張 9.1 の 1 重の交換子の公式

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & [H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] = 2e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu, \quad \text{(B)} \quad [H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] = -2e^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \\ \text{(C)} \quad & [H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}] = -2\hat{Y}_\mu, \quad \text{(D)} \quad [H_2, \hat{Y}_\mu] = 2\hat{Z}_\mu^{(-)} \end{aligned}$$

と、交換子の第 1 引数・第 2 引数についての $\mathbb{C}$ 双線型性

$$[\alpha X, \beta W] = \alpha\beta[X, W] \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C}, X, W \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}))$$

のみを用いる。後者は次の一続きの計算による（スカラー倍が積と可換なことは主張 3.6 による）。

$$\begin{aligned} [\alpha X, \beta W] &= (\alpha X)(\beta W) - (\beta W)(\alpha X) \quad (\because \text{交換子の定義}) \\ &= \alpha\beta(XW) - \beta\alpha(WX) \quad (\because \text{スカラー倍が積と可換なこと}) \\ &= \alpha\beta(XW - WX) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の可換則 } \beta\alpha = \alpha\beta \text{ と分配則}) \\ &= \alpha\beta[X, W] \quad (\because \text{交換子の定義}) \end{aligned}$$

各主張の右辺は n の偶奇で場合分けされているので、帰納段階は「 n 偶数 $\rightarrow n+1$ 奇数」「 n 奇数 $\rightarrow n+1$ 偶数」の 2 通りを別々に示す。

$$\text{(h1.z) の証明. } C_n := \underbrace{[K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, [K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] \dots]}_n \text{ とおく。定義より } C_{n+1} = [K_1 H_1^{(\pm)}, C_n]$$

が $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について成り立つ。

基底段階 ($n = 0$, 偶数)。 C_0 から主張の偶数側の右辺へ至る。

$$\begin{aligned} C_0 &= \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \quad (\because 0 \text{ 重の交換子の規約}) \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \quad (\because 1 \text{ はスカラー倍の単位元}) \\ &= (-1)^{0/2} (2K_1)^0 \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \quad (\because \alpha^0 = 1 \text{ を } \alpha = -1 \text{ と } \alpha = 2K_1 \text{ へ}) \end{aligned}$$

帰納段階 1 (n 偶数 $\rightarrow n+1$ 奇数)。 n が偶数で $C_n = (-1)^{n/2} (2K_1)^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ と仮定する。

$$\begin{aligned} C_{n+1} &= [K_1 H_1^{(\pm)}, C_n] \quad (\because n \text{ 重の交換子の定義}) \\ &= [K_1 H_1^{(\pm)}, (-1)^{n/2} (2K_1)^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= K_1 \cdot (-1)^{n/2} (2K_1)^n [H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_1 \cdot (-1)^{n/2} (2K_1)^n \cdot 2e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{(A)}) \\ &= (-1)^{n/2} (2K_1)^{n+1} e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu \quad (\because 2K_1 \cdot (2K_1)^n = (2K_1)^{n+1} \text{ とスカラーの積の可換性}) \\ &= (-1)^{((n+1)-1)/2} (2K_1)^{n+1} e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu \quad (\because \frac{(n+1)-1}{2} = \frac{n}{2}) \end{aligned}$$

最後の行が、 $n+1$ が奇数のときの主張の右辺である。

帰納段階 2 (n 奇数 $\rightarrow n+1$ 偶数)。 n が奇数で $C_n = (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu$ と仮定する。

$$\begin{aligned}
C_{n+1} &= [K_1 H_1^{(\pm)}, C_n] & (\because n \text{ 重の交換子の定義}) \\
&= [K_1 H_1^{(\pm)}, (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu] & (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\theta} [H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] & (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\theta} \cdot (-2e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)}) & (\because (B)) \\
&= (-1) \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^{n+1} e^{-i\theta} e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (\because 2K_1 \cdot (2K_1)^n = (2K_1)^{n+1} \text{ とスカラーの積の可換性}) \\
&= (-1) \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^{n+1} e^0 \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (\because \text{複素指数関数の積公式と } -i\theta + i\theta = 0) \\
&= (-1) \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^{n+1} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (\because e^0 = 1) \\
&= (-1)^{(n-1)/2+1} (2K_1)^{n+1} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (\because (-1) \cdot (-1)^k = (-1)^{k+1}) \\
&= (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^{n+1} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (\because \frac{n-1}{2} + 1 = \frac{n+1}{2})
\end{aligned}$$

最後の行が、 $n+1$ が偶数のときの主張の右辺である。基底段階と 2 つの帰納段階により、すべての $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について (h1.z) が成り立つ。

(h1.y) の証明。 $D_n := \underbrace{[K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, [K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] \dots]}_n$ とおく。 $D_{n+1} = [K_1 H_1^{(\pm)}, D_n]$ 。

基底段階 ($n = 0$ 、偶数)。 D_0 から主張の偶数側の右辺へ至る。

$$\begin{aligned}
D_0 &= \hat{Y}_\mu & (\because 0 \text{ 重の交換子の規約}) \\
&= 1 \cdot 1 \cdot \hat{Y}_\mu & (\because 1 \text{ はスカラー倍の単位元}) \\
&= (-1)^{0/2} (2K_1)^0 \hat{Y}_\mu & (\because \alpha^0 = 1 \text{ を } \alpha = -1 \text{ と } \alpha = 2K_1 \text{ へ})
\end{aligned}$$

帰納段階 1 (n 偶数 $\rightarrow n+1$ 奇数)。 n が偶数で $D_n = (-1)^{n/2} (2K_1)^n \hat{Y}_\mu$ と仮定する。

$$\begin{aligned}
D_{n+1} &= [K_1 H_1^{(\pm)}, D_n] & (\because n \text{ 重の交換子の定義}) \\
&= [K_1 H_1^{(\pm)}, (-1)^{n/2} (2K_1)^n \hat{Y}_\mu] & (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{n/2} (2K_1)^n [H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] & (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{n/2} (2K_1)^n \cdot (-2e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)}) & (\because (B)) \\
&= (-1) \cdot (-1)^{n/2} (2K_1)^{n+1} e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (\because 2K_1 \cdot (2K_1)^n = (2K_1)^{n+1} \text{ とスカラーの積の可換性}) \\
&= (-1)^{n/2+1} (2K_1)^{n+1} e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (\because (-1) \cdot (-1)^k = (-1)^{k+1}) \\
&= (-1)^{((n+1)+1)/2} (2K_1)^{n+1} e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (\because \frac{(n+1)+1}{2} = \frac{n}{2} + 1)
\end{aligned}$$

最後の行が、 $n+1$ が奇数のときの主張の右辺である。

帰納段階 2 (n 奇数 $\rightarrow n+1$ 偶数)。 n が奇数で $D_n = (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ と仮定する。

$$\begin{aligned}
D_{n+1} &= [K_1 H_1^{(\pm)}, D_n] & (\because n \text{ 重の交換子の定義}) \\
&= [K_1 H_1^{(\pm)}, (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] & (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\theta} [H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] & (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\theta} \cdot 2e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu & (\because (A)) \\
&= (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^{n+1} e^{i\theta} e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu & (\because 2K_1 \cdot (2K_1)^n = (2K_1)^{n+1} \text{ とスカラーの積の可換性}) \\
&= (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^{n+1} \hat{Y}_\mu & (\because e^{i\theta} e^{-i\theta} = e^0 = 1)
\end{aligned}$$

最後の行が、 $n+1$ が偶数のときの主張の右辺である。基底段階と 2 つの帰納段階により、すべての $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について (h1.y) が成り立つ。

(h2.z-) の証明。 $E_n := \underbrace{[K_2^* H_2, \dots, [K_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}] \dots]}_n$ とおく。 $E_{n+1} = [K_2^* H_2, E_n]$ 。この場

合は位相因子が現れない ((C), (D) の右辺に $e^{\pm i\theta}$ が無い)。

基底段階 ($n = 0$ 、偶数)。 E_0 から主張の偶数側の右辺へ至る。

$$\begin{aligned} E_0 &= \hat{Z}_\mu^{(-)} & (\because 0 \text{ 重の交換子の規約}) \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} & (\because 1 \text{ はスカラー倍の単位元}) \\ &= (-1)^{0/2} (2K_2^*)^0 \hat{Z}_\mu^{(-)} & (\because \alpha^0 = 1 \text{ を } \alpha = -1 \text{ と } \alpha = 2K_2^* \text{ へ}) \end{aligned}$$

帰納段階 1 (n 偶数 $\rightarrow n+1$ 奇数)。 n が偶数で $E_n = (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)}$ と仮定する。

$$\begin{aligned} E_{n+1} &= [K_2^* H_2, E_n] & (\because n \text{ 重の交換子の定義}) \\ &= \left[K_2^* H_2, (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] & (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \left[H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] & (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \cdot (-2\hat{Y}_\mu) & (\because (C)) \\ &= (-1) \cdot (-1)^{n/2} (2K_2^*)^{n+1} \hat{Y}_\mu & (\because 2K_2^* \cdot (2K_2^*)^n = (2K_2^*)^{n+1} \text{ とスカラーの積の可換性}) \\ &= (-1)^{n/2+1} (2K_2^*)^{n+1} \hat{Y}_\mu & (\because (-1) \cdot (-1)^k = (-1)^{k+1}) \\ &= (-1)^{((n+1)+1)/2} (2K_2^*)^{n+1} \hat{Y}_\mu & (\because \frac{(n+1)+1}{2} = \frac{n}{2} + 1) \end{aligned}$$

最後の行が、 $n+1$ が奇数のときの主張の右辺である。

帰納段階 2 (n 奇数 $\rightarrow n+1$ 偶数)。 n が奇数で $E_n = (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu$ と仮定する。

$$\begin{aligned} E_{n+1} &= [K_2^* H_2, E_n] & (\because n \text{ 重の交換子の定義}) \\ &= \left[K_2^* H_2, (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu \right] & (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \left[H_2, \hat{Y}_\mu \right] & (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \cdot 2\hat{Z}_\mu^{(-)} & (\because (D)) \\ &= (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^{n+1} \hat{Z}_\mu^{(-)} & (\because 2K_2^* \cdot (2K_2^*)^n = (2K_2^*)^{n+1} \text{ とスカラーの積の可換性}) \end{aligned}$$

最後の行が、 $n+1$ が偶数のときの主張の右辺である。基底段階と 2 つの帰納段階により、すべての $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について (h2.z-) が成り立つ。

(h2.y) の証明。 $F_n := \underbrace{[K_2^* H_2, \dots, [K_2^* H_2, \hat{Y}_\mu] \dots]}_n$ とおく。 $F_{n+1} = [K_2^* H_2, F_n]$ 。

基底段階 ($n = 0$ 、偶数)。 F_0 から主張の偶数側の右辺へ至る。

$$\begin{aligned} F_0 &= \hat{Y}_\mu & (\because 0 \text{ 重の交換子の規約}) \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \hat{Y}_\mu & (\because 1 \text{ はスカラー倍の単位元}) \\ &= (-1)^{0/2} (2K_2^*)^0 \hat{Y}_\mu & (\because \alpha^0 = 1 \text{ を } \alpha = -1 \text{ と } \alpha = 2K_2^* \text{ へ}) \end{aligned}$$

帰納段階 1 (n 偶数 $\rightarrow n+1$ 奇数)。 n が偶数で $F_n = (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu$ と仮定する。

$$\begin{aligned}
F_{n+1} &= [K_2^* H_2, F_n] & (\because n \text{ 重の交換子の定義}) \\
&= \left[K_2^* H_2, (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu \right] & (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \left[H_2, \hat{Y}_\mu \right] & (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \cdot 2 \hat{Z}_\mu^{(-)} & (\because (D)) \\
&= (-1)^{n/2} (2K_2^*)^{n+1} \hat{Z}_\mu^{(-)} & (\because 2K_2^* \cdot (2K_2^*)^n = (2K_2^*)^{n+1} \text{ とスカラーの積の可換性}) \\
&= (-1)^{((n+1)-1)/2} (2K_2^*)^{n+1} \hat{Z}_\mu^{(-)} & (\because \frac{(n+1)-1}{2} = \frac{n}{2})
\end{aligned}$$

最後の行が、 $n+1$ が奇数のときの主張の右辺である。

帰納段階 2 (n 奇数 $\rightarrow n+1$ 偶数)。 n が奇数で $F_n = (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)}$ と仮定する。

$$\begin{aligned}
F_{n+1} &= [K_2^* H_2, F_n] & (\because n \text{ 重の交換子の定義}) \\
&= \left[K_2^* H_2, (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] & (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \left[H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] & (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \cdot (-2 \hat{Y}_\mu) & (\because (C)) \\
&= (-1) \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^{n+1} \hat{Y}_\mu & (\because 2K_2^* \cdot (2K_2^*)^n = (2K_2^*)^{n+1} \text{ とスカラーの積の可換性}) \\
&= (-1)^{(n-1)/2+1} (2K_2^*)^{n+1} \hat{Y}_\mu & (\because (-1) \cdot (-1)^k = (-1)^{k+1}) \\
&= (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^{n+1} \hat{Y}_\mu & (\because \frac{n-1}{2} + 1 = \frac{n+1}{2})
\end{aligned}$$

最後の行が、 $n+1$ が偶数のときの主張の右辺である。基底段階と 2 つの帰納段階により、すべての $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について (h2.y) が成り立つ。 $\square$

主張 9.3. (h1.z)

$$\underbrace{\left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, \left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \right] \dots \right]}_n = \begin{cases} i K_1^n e^{-i2\pi\mu/M} \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h1.y)

$$\underbrace{\left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, \left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n = \begin{cases} -i K_1^n e^{i2\pi\mu/M} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.z-)

$$\underbrace{\left[i K_2^* H_2, \dots, \left[i K_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] \dots \right]}_n = \begin{cases} -i (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.y)

$$\underbrace{\left[i K_2^* H_2, \dots, \left[i K_2^* H_2, \hat{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n = \begin{cases} i (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

証明. 以下、 $\theta := \frac{2\pi\mu}{M} \in \mathbb{R}$ と略記する。まず 4 式すべてで用いる次の 2 つの補題を用意する。

補題 1 (生成子のスカラー倍) : $\alpha \in \mathbb{C}$ 、 $X, W \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\underbrace{[\alpha X, \dots, [\alpha X, W] \dots]}_n = \alpha^n \underbrace{[X, \dots, [X, W] \dots]}_n$$

が成り立つ。実際、任意の W について

$$\begin{aligned} \text{ad}_{\alpha X}(W) &= [\alpha X, W] \quad (\because \text{ad の定義}) \\ &= \alpha[X, W] \quad (\because \text{交換子の第 1 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\ &= \alpha \text{ad}_X(W) \quad (\because \text{ad の定義}) \end{aligned}$$

であるから、線型写像として $\text{ad}_{\alpha X} = \alpha \text{ad}_X$ が成り立つ。よって、任意の $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned} \text{ad}_{\alpha X}^n &= (\alpha \text{ad}_X)^n \quad (\because \text{上で示した } \text{ad}_{\alpha X} = \alpha \text{ad}_X) \\ &= \alpha^n \text{ad}_X^n \quad (\because \text{ad}_X \text{ は } \mathbb{C} \text{ 線型なのでスカラー倍と可換であり、合成の各段からスカラーを前へ出せる。} n=0 \text{ のときは両辺とも恒等写像で } \alpha^0=1) \end{aligned}$$

が成り立つ。

補題 2 (虚数単位の冪) : $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$i^n = \begin{cases} i(-1)^{(n-1)/2} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

が成り立つ。実際、 n が偶数のとき $n/2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 、奇数のとき $(n-1)/2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ なので、以下の指数はいずれも整数である。 n が偶数なら

$$\begin{aligned} i^n &= (i^2)^{n/2} \quad (\because \text{指数法則 } (i^2)^{n/2} = i^{2 \cdot (n/2)} = i^n) \\ &= (-1)^{n/2} \quad (\because i^2 = -1) \end{aligned}$$

であり、 n が奇数なら

$$\begin{aligned} i^n &= i \cdot i^{n-1} \quad (\because \text{指数法則 } i^{1+(n-1)} = i \cdot i^{n-1}) \\ &= i(i^2)^{(n-1)/2} \quad (\because \text{指数法則 } (i^2)^{(n-1)/2} = i^{2 \cdot ((n-1)/2)} = i^{n-1}) \\ &= i(-1)^{(n-1)/2} \quad (\because i^2 = -1) \end{aligned}$$

である。

(h1.z) について、主張 9.2 (h1.z) の生成子を $K_1 H_1^{(\pm)} \rightarrow \frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}$ に置き換えて代入する。すなわち補題 1 を $\alpha = \frac{i}{2}$ 、 $X = K_1 H_1^{(\pm)}$ 、 $W = \hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ として使い、さらに補題 2 で i^n を書き換える。

$$\begin{aligned} \underbrace{\left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, \left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \right] \dots \right]}_n &= \left(\frac{i}{2} \right)^n \underbrace{\left[K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, \left[K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \right] \dots \right]}_n \quad (\because \text{補題 1}) \\ &= \left(\frac{i}{2} \right)^n \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{交換子のネスト (h1.z)}) \\ &= \begin{cases} i^n 2^{-n} (-1)^{(n-1)/2} 2^n K_1^n e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ i^n 2^{-n} (-1)^{n/2} 2^n K_1^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \left(\frac{i}{2} \right)^n = i^n 2^{-n}, (2K_1)^n = 2^n K_1^n) \\ &= \begin{cases} i^n (-1)^{(n-1)/2} K_1^n e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ i^n (-1)^{n/2} K_1^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because 2^{-n} 2^n = 1) \\ &= \begin{cases} i(-1)^{(n-1)/2} (-1)^{(n-1)/2} K_1^n e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (-1)^{n/2} K_1^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\ &= \begin{cases} i(-1)^{n-1} K_1^n e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n K_1^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \frac{n-1}{2} + \frac{n-1}{2} = n-1, \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n) \\ &= \begin{cases} i K_1^n e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n \text{ 奇数なら } (-1)^{n-1} = 1, n \text{ 偶数なら } (-1)^n = 1) \\ &= \begin{cases} i K_1^n e^{-i2\pi\mu/M} \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \theta = \frac{2\pi\mu}{M} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

最後の行が (h1.z) の主張の右辺である。

(h1.y) について、同じく補題 1 を $\alpha = \frac{i}{2}$ 、 $X = K_1 H_1^{(\pm)}$ 、 $W = \hat{Y}_\mu$ として使う。

$$\begin{aligned}
\underbrace{\left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, \left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n &= \left(\frac{i}{2} \right)^n \underbrace{\left[K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, \left[K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n & (\because \text{補題 1}) \\
&= \left(\frac{i}{2} \right)^n \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \text{交換子のネスト (h1.y)}) \\
&= \begin{cases} i^n 2^{-n} (-1)^{(n+1)/2} 2^n K_1^n e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ i^n 2^{-n} (-1)^{n/2} 2^n K_1^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \left(\frac{i}{2} \right)^n = i^n 2^{-n}, (2K_1)^n = 2^n K_1^n) \\
&= \begin{cases} i^n (-1)^{(n+1)/2} K_1^n e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ i^n (-1)^{n/2} K_1^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because 2^{-n} 2^n = 1) \\
&= \begin{cases} i (-1)^{(n-1)/2} (-1)^{(n+1)/2} K_1^n e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (-1)^{n/2} K_1^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i (-1)^n K_1^n e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n K_1^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \frac{n-1}{2} + \frac{n+1}{2} = n, \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n) \\
&= \begin{cases} -i K_1^n e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because n \text{ 奇数なら } (-1)^n = -1, n \text{ 偶数なら } (-1)^n = 1) \\
&= \begin{cases} -i K_1^n e^{i2\pi\mu/M} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \theta = \frac{2\pi\mu}{M} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

最後の行が (h1.y) の主張の右辺である。

(h2.z-) について、補題 1 を $\alpha = i$ 、 $X = K_2^* H_2$ 、 $W = \hat{Z}_\mu^{(-)}$ として使う。今回は $\alpha = i$ で 2 の冪が現れないので、 $(2K_2^*)^n$ はそのまま残る。

$$\begin{aligned}
\underbrace{\left[i K_2^* H_2, \dots, \left[i K_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] \dots \right]}_n &= i^n \underbrace{\left[K_2^* H_2, \dots, \left[K_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] \dots \right]}_n & (\because \text{補題 1}) \\
&= i^n \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \text{交換子のネスト (h2.z-)}) \\
&= \begin{cases} i (-1)^{(n-1)/2} (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i (-1)^n (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \frac{n-1}{2} + \frac{n+1}{2} = n, \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n) \\
&= \begin{cases} -i (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because n \text{ 奇数なら } (-1)^n = -1, n \text{ 偶数なら } (-1)^n = 1)
\end{aligned}$$

最後の行が (h2.z-) の主張の右辺である。

(h2.y) について、補題 1 を $\alpha = i$ 、 $X = K_2^* H_2$ 、 $W = \hat{Y}_\mu$ として使う。

$$\begin{aligned}
\underbrace{\left[i K_2^* H_2, \dots, \left[i K_2^* H_2, \hat{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n &= i^n \underbrace{\left[K_2^* H_2, \dots, \left[K_2^* H_2, \hat{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n & (\because \text{補題 1}) \\
&= i^n \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \text{交換子のネスト (h2.y)}) \\
&= \begin{cases} i (-1)^{(n-1)/2} (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i (-1)^{n-1} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because \frac{n-1}{2} + \frac{n-1}{2} = n-1, \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n) \\
&= \begin{cases} i (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} & (\because n \text{ 奇数なら } n-1 \text{ は偶数で } (-1)^{n-1} = 1, n \text{ 偶数なら } (-1)^n = 1)
\end{aligned}$$

最後の行が (h2.y) の主張の右辺である。

以上 4 式が、主張 9.2 の各式に補題 1・補題 2 を適用して得られた。 $\square$

主張 9.4 ($\sinh, \cosh$ のテイラー展開). $x \in \mathbb{R}$ とする。双曲線正弦と双曲線余弦は 定義 1.1 の定義による。

$$\sinh x = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{x^n}{n!}, \quad \cosh x = \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{x^n}{n!}$$

主張 9.5. (h1.z)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, \left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \right] \dots \right]}_n = \cosh(K_1) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} + i e^{-i2\pi\mu/M} \sinh(K_1) \hat{Y}_\mu$$

(h1.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \dots, \left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n = -i e^{i2\pi\mu/M} \sinh(K_1) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} + \cosh(K_1) \hat{Y}_\mu$$

(h2.z-)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[i K_2^* H_2, \dots, \left[i K_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] \dots \right]}_n = \cosh(2K_2^*) \hat{Z}_\mu^{(-)} - i \sinh(2K_2^*) \hat{Y}_\mu$$

(h2.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[i K_2^* H_2, \dots, \left[i K_2^* H_2, \hat{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n = i \sinh(2K_2^*) \hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(2K_2^*) \hat{Y}_\mu$$

証明. 以下、各級数を 主張 9.3 により偶数項・奇数項に分け、主張 9.2 直後の $\sinh/\cosh$ テイラー展開を用いる。

(h1.z) について、

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= \frac{1}{0!} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{cases} i \cdot K_1^n \cdot e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \cdot \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \cdot \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n=0 \text{ の項を分け、 } n \geq 1 \text{ の各項へ「cosh, sinh の展開係数への変換」の (h1.z)}) \\ &= \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \left(\frac{1}{n!} K_1^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \right) + \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \left(\frac{1}{n!} i K_1^n e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \hat{Y}_\mu \right) \quad (\because K_1^0 \hat{Z}_\mu^{(\pm)} = \frac{1}{0!} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \text{ なので } n=0 \text{ の項を偶数側の和へ吸収した}) \\ &= \left(\sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{1}{n!} K_1^n \right) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} + i e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \left(\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{1}{n!} K_1^n \right) \hat{Y}_\mu \quad (\because \hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu, i e^{-i2\pi\mu/M} \text{ が } n \text{ に依らないので和の外へ出した}) \\ &= \cosh(K_1) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} + i e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{「sinh, cosh のテイラー展開」}) \end{aligned}$$

鎖の終点は主張の (h1.z) の右辺と字句どおり一致する。以下の 3 式でも、 $n=0$ の項を同じ理由で偶数側の和へ吸収する。

(h1.y) について、

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= \frac{1}{0!} \hat{Y}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{cases} -i \cdot K_1^n \cdot e^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \cdot \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \cdot \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n=0 \text{ の項を分け、 } n \geq 1 \text{ の各項へ「cosh, sinh の展開係数への変換」の (h1.y)}) \\ &= \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \left(\frac{1}{n!} K_1^n \hat{Y}_\mu \right) + \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \left(\frac{1}{n!} (-i) K_1^n e^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \right) \quad (\because K_1^0 \hat{Y}_\mu = \frac{1}{0!} \hat{Y}_\mu \text{ なので } n=0 \text{ の項を偶数側の和へ吸収した}) \\ &= \left(\sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{1}{n!} K_1^n \right) \hat{Y}_\mu - i e^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \left(\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{1}{n!} K_1^n \right) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \quad (\because \hat{Y}_\mu, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}, (-i) e^{i2\pi\mu/M} \text{ が } n \text{ に依らないので和の外へ出した}) \\ &= \cosh(K_1) \hat{Y}_\mu - i e^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \quad (\because \text{「sinh, cosh のテイラー展開」}) \\ &= -i e^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} + \cosh(K_1) \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{行列の和の可換則により 2 つの項を並べ替えた}) \end{aligned}$$

鎖の終点は主張の (h1.y) の右辺と字句どおり一致する。

(h2.z-) について、

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!} \hat{Z}_\mu^{(-)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{cases} -i \cdot (2K_2^*)^n \cdot \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n=0 \text{ の項を分け、 } n \geq 1 \text{ の各項へ「cosh, sinh の展開係数への変換」の (h2.z-)) \\
&= \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \left(\frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} \right) + \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \left(\frac{1}{n!} (-i) (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu \right) \quad (\because (2K_2^*)^0 \hat{Z}_\mu^{(-)} = \frac{1}{0!} \hat{Z}_\mu^{(-)} \text{ なので } n=0 \text{ の項を偶数側の和へ吸収した}) \\
&= \left(\sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \right) \hat{Z}_\mu^{(-)} - i \left(\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \right) \hat{Y}_\mu \quad (\because \hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu, -i \text{ が } n \text{ に依らないので和の外へ出した}) \\
&= \cosh(2K_2^*) \hat{Z}_\mu^{(-)} - i \sinh(2K_2^*) \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{「sinh, cosh のテイラー展開」})
\end{aligned}$$

鎖の終点は主張の (h2.z-) の右辺と字句どおり一致する。

(h2.y) について、

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!} \hat{Y}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{cases} i \cdot (2K_2^*)^n \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \cdot \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n=0 \text{ の項を分け、 } n \geq 1 \text{ の各項へ「cosh, sinh の展開係数への変換」の (h2.y)}) \\
&= \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \left(\frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu \right) + \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \left(\frac{1}{n!} i (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} \right) \quad (\because (2K_2^*)^0 \hat{Y}_\mu = \frac{1}{0!} \hat{Y}_\mu \text{ なので } n=0 \text{ の項を偶数側の和へ吸収した}) \\
&= \left(\sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \right) \hat{Y}_\mu + i \left(\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \right) \hat{Z}_\mu^{(-)} \quad (\because \hat{Y}_\mu, \hat{Z}_\mu^{(-)}, i \text{ が } n \text{ に依らないので和の外へ出した}) \\
&= \cosh(2K_2^*) \hat{Y}_\mu + i \sinh(2K_2^*) \hat{Z}_\mu^{(-)} \quad (\because \text{「sinh, cosh のテイラー展開」}) \\
&= i \sinh(2K_2^*) \hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(2K_2^*) \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{和の可換性で 2 項を並べ替えた})
\end{aligned}$$

鎖の終点は主張の (h2.y) の右辺と字句どおり一致する。以上 4 式がいずれも statement の右辺と一致するので、主張が成り立つ。 $\square$

主張 9.6. $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, X, Y \in \text{Mat}(d, \mathbb{C})$ とする。exp は定義 4.4, $\text{ad}_X : \text{Mat}(d, \mathbb{C}) \rightarrow \text{Mat}(d, \mathbb{C}), Z \mapsto [X, Z] = XZ - ZX$ は定義 6.5, $\text{Ad}_g(Y) := gYg^{-1}$ (g は正則行列) も定義 6.5 の記号とする。このとき $\exp(X)$ は正則であり、右辺の級数は $\text{Mat}(d, \mathbb{C})$ において収束して、

$$\exp(X) Y \exp(-X) = \text{Ad}_{\exp(X)}(Y) = \exp(\text{ad}_X)(Y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{[X, [X, \dots, [X, Y] \dots]]}_n$$

が成り立つ ($n=0$ のとき括弧なしで Y)。

証明. 本主張は行列環 $\text{Mat}(d, \mathbb{C})$ 上の主張であり、Lie 群・Lie 環の理論を使わずに証明できる。定理 6.6 を $K := \mathbb{C}, n := d$ として適用する。同ブロックは定理 6.4 (純代数的な ad 展開公式) と主張 4.1・主張 3.10・主張 4.2 (指数級数の絶対収束と行列ノルムの劣乗法性) だけから証明されており、Lie 群論には依存しない。

Step 1: 定理 6.6 (1) より級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y)$ は $\text{Mat}(d, \mathbb{C})$ において収束し、(2) より

$$\begin{aligned}
\exp(X) Y \exp(-X) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \text{ad}_X^m(Y) \quad (\because \text{「行列の exp による共役と交換子級数」(2)}) \\
&= \exp(\text{ad}_X)(Y) \quad (\because \text{行列への線型写像 } \text{ad}_X \text{ の exp の定義})
\end{aligned}$$

Step 2: 定理 6.4 の再帰の定義 $\text{ad}_X^0(Y) = Y, \text{ad}_X^{m+1}(Y) = [X, \text{ad}_X^m(Y)]$ を出発点にすると、

$$\begin{aligned}
\text{ad}_X^0(Y) &= Y & (\because \text{ad}_X \text{ の反復の定義}), \\
\text{ad}_X^{m+1}(Y) &= [X, \text{ad}_X^m(Y)] & (\because \text{ad}_X \text{ の反復の定義}), \\
\text{ad}_X^m(Y) &= \underbrace{[X, [X, \dots, [X, Y] \dots]]}_m & (\because m \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ について上の二式を反復})
\end{aligned}$$

最後の式では $m = 0$ のとき括弧なしで Y と読む。したがって Step 1 の中辺は主張の最右辺に一致する。

Step 3: 定理 6.6 (3) より $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ であるから

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) &= \exp(X) Y \exp(X)^{-1} \quad (\because \mathrm{Ad}_g(Y) = gYg^{-1} \text{ の定義}) \\ &= \exp(X) Y \exp(-X) \quad (\because \exp(X)^{-1} = \exp(-X))\end{aligned}$$

以上より主張のすべての等号が成り立つ。なお、本証明で非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の解析（極限）を使うのは 定理 6.6 の内部の収束議論だけであり、その根拠は 主張 3.12 ($\mathbb{R}$ の完備性) である。 $\square$

定義 9.7 ($\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の可逆元). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。行列の積は 定義 1.8、複素係数の演算は 主張 1.35 による。

$R := \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と書き、その単位元を $I := I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ と書く。 $g \in R$ が可逆であるとは、

$$\exists h \in R, \quad gh = I \text{ かつ } hg = I$$

が成り立つことをいう。可逆な元全体の集合を

$$R^\times := \{g \in R \mid g \text{ は可逆}\}$$

と書く。 $g \in R^\times$ に対して上の h はただ 1 つに定まり、これを g^{-1} と書く。さらに次が成り立つ。

- (i) $I \in R^\times$ であり $I^{-1} = I$ 。
- (ii) $g_1, g_2 \in R^\times$ なら $g_1 g_2 \in R^\times$ であり $(g_1 g_2)^{-1} = g_2^{-1} g_1^{-1}$ 。
- (iii) $g \in R^\times$ なら $g^{-1} \in R^\times$ であり $(g^{-1})^{-1} = g$ 。
- (iv) $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ なら $cI \in R^\times$ であり $(cI)^{-1} = c^{-1}I$ 。

証明. (逆元の一意性) $h_1, h_2 \in R$ がともに $gh_1 = h_1g = I$ 、 $gh_2 = h_2g = I$ を満たすとする。

$$\begin{aligned}h_1 &= h_1 I && (\because \text{単位行列との積}) \\ &= h_1 (gh_2) && (\because gh_2 = I \text{ の代入}) \\ &= (h_1 g) h_2 && (\because \text{行列の積の結合律}) \\ &= I h_2 && (\because h_1 g = I \text{ の代入}) \\ &= h_2 && (\because \text{単位行列との積})\end{aligned}$$

であるから、逆元はただ 1 つである。

(i) $II = I$ より I は可逆で $I^{-1} = I$ 。

(ii) $h := g_2^{-1} g_1^{-1}$ とおくと、

$$\begin{aligned}(g_1 g_2) h &= g_1 g_2 g_2^{-1} g_1^{-1} && (\because h = g_2^{-1} g_1^{-1} \text{ の代入と行列の積の結合律}) \\ &= g_1 I g_1^{-1} && (\because g_2 g_2^{-1} = I) \\ &= g_1 g_1^{-1} && (\because \text{単位行列との積}) \\ &= I && (\because g_1 g_1^{-1} = I) \\ h(g_1 g_2) &= g_2^{-1} g_1^{-1} g_1 g_2 && (\because h = g_2^{-1} g_1^{-1} \text{ の代入と行列の積の結合律}) \\ &= g_2^{-1} I g_2 && (\because g_1^{-1} g_1 = I) \\ &= g_2^{-1} g_2 && (\because \text{単位行列との積}) \\ &= I && (\because g_2^{-1} g_2 = I)\end{aligned}$$

であるから $g_1 g_2 \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(g_1 g_2)^{-1} = g_2^{-1} g_1^{-1}$ 。

(iii) $g g^{-1} = g^{-1} g = I$ は、 g^{-1} に対して g が逆元の条件を満たすことをそのまま述べている。よって $g^{-1} \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(g^{-1})^{-1} = g$ 。

(iv) 次の 2 つの一続きの変形による。

$$\begin{aligned} (cI)(c^{-1}I) &= (cc^{-1})I \quad (\because \text{スカラー倍の単位行列は積と可換 (スカラー倍と単位行列の積の整理)}) \\ &= I \quad (\because cc^{-1} = 1 \text{ と単位行列のスカラー } 1 \text{ 倍}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (c^{-1}I)(cI) &= (c^{-1}c)I \quad (\because \text{スカラー倍の単位行列は積と可換 (スカラー倍と単位行列の積の整理)}) \\ &= I \quad (\because c^{-1}c = 1 \text{ と単位行列のスカラー } 1 \text{ 倍}) \end{aligned}$$

(スカラー倍と単位行列の積の整理は 主張 3.6 による。) であるから $cI \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(cI)^{-1} = c^{-1}I$ 。□

定義 9.8 (パウリ行列群). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 $R := \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と書く。主張 7.1 の Pauli 行列 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z$ と単位行列 $\sigma^0 := I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}$ を用い、 $\mathbb{A} := \{0, x, y, z\}$ とおく。

M 因子のパウリ行列群を

$$\mathcal{P}_M := \left\{ i^k \sigma^{a_1} \boxtimes \sigma^{a_2} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_M} \mid k \in \{0, 1, 2, 3\}, (a_1, \dots, a_M) \in \mathbb{A}^M \right\} \subseteq R$$

と定める。 $\mathcal{P}_M$ は行列の積について群をなす (主張 7.1 より各 $\sigma^a \sigma^b$ は $i^k \sigma^c$ の形になり、クロネッカー積どうしの積は各因子ごとの 2 次の行列の積になる: 主張 3.2 (1)。スカラー倍を外へ出すのは 主張 3.3)。 $\#\mathcal{P}_M = 4 \cdot 4^M$ であり、とくに有限群である。

定義 9.9 (クリフォード行列群). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 $R := \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と書く。定義 9.8 のパウリ行列群を $\mathcal{P}_M$ とする。

クリフォード群を、 R の可逆元全体 (定義 9.7) $R^\times$ の中で $\mathcal{P}_M$ を保つ元全体、すなわち $\mathcal{P}_M$ の $R^\times$ における正規化群として

$$\mathcal{C}_M := \{ g \in R^\times \mid g \mathcal{P}_M g^{-1} = \mathcal{P}_M \}$$

と定める。 $\mathcal{C}_M$ は $R^\times$ の部分群である。単位元については $I \mathcal{P}_M I^{-1} = \mathcal{P}_M$ なので $I \in \mathcal{C}_M$ 。積については、 $g_1, g_2 \in \mathcal{C}_M$ のとき

$$\begin{aligned} (g_1 g_2) \mathcal{P}_M (g_1 g_2)^{-1} &= g_1 (g_2 \mathcal{P}_M g_2^{-1}) g_1^{-1} \quad (\because (g_1 g_2)^{-1} = g_2^{-1} g_1^{-1} \text{ と行列の積の結合則}) \\ &= g_1 \mathcal{P}_M g_1^{-1} \quad (\because g_2 \in \mathcal{C}_M) \\ &= \mathcal{P}_M \quad (\because g_1 \in \mathcal{C}_M) \end{aligned}$$

なので $g_1 g_2 \in \mathcal{C}_M$ 。逆元については、 $g \mathcal{P}_M g^{-1} = \mathcal{P}_M$ の両辺を左から g^{-1} 、右から g で挟んで $g^{-1} \mathcal{P}_M g = \mathcal{P}_M$ なので $g^{-1} \in \mathcal{C}_M$ である。

主張 9.10 ($V_2 \notin \mathcal{C}_M$). 定義 5.8 の $V_2 = (2s_2)^{M/2} \exp\left(K_2^* \sum_{k=1}^M \sigma_k^x\right)$ は 定義 9.9 のクリフォード群 $\mathcal{C}_M$ に属さない。

したがって 定義 9.11 の T_g の定義域をクリフォード群に限定すると、本証明に必要な T_{V_2} およびその合成 $T_{(V)}$ が定義できなくなる。

証明. Step 1: $\{\sigma^0, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ が $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の基底であること。 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ について

$$a\sigma^0 + b\sigma^x + c\sigma^y + d\sigma^z = \begin{pmatrix} a+d & b-ic \\ b+ic & a-d \end{pmatrix}$$

が零行列なら、 $a + d = 0$, $a - d = 0$ より $a = d = 0$, $b - ic = 0$, $b + ic = 0$ より辺々加えて $2b = 0$ すなわち $b = 0$ 、したがって $c = 0$ 。よって 4 元は線型独立であり、 $\dim_{\mathbb{C}} \text{Mat}(2, \mathbb{C}) = 4$ なので基底である。定理 3.5 より $\{\sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_M} \mid (a_1, \dots, a_M) \in \mathbb{A}^M\}$ は R の基底である。

Step 2: $t \in \mathbb{C}$ について $\exp(t\sigma^x) = \cosh(t)\sigma^0 + \sinh(t)\sigma^x$ 。 $(\sigma^x)^2 = \sigma^0$ (主張 7.1) より $(\sigma^x)^n = \sigma^0$ (n 偶数)、 $(\sigma^x)^n = \sigma^x$ (n 奇数) であるから、定義 4.4 の級数を偶数項・奇数項に分けて

$$\exp(t\sigma^x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} (\sigma^x)^n = \left(\sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{t^n}{n!} \right) \sigma^0 + \left(\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{t^n}{n!} \right) \sigma^x = \cosh(t)\sigma^0 + \sinh(t)\sigma^x$$

(級数の絶対収束は 主張 4.2 による。偶奇の分割と $\cosh, \sinh$ の級数は 主張 4.1 の実指数級数の並べ替えである。)

Step 3: $\sigma_1^z := \sigma^z \boxtimes \sigma^0 \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^0 \in \mathcal{P}_M$ の V_2 による共役を計算する。 $k \neq l$ のとき σ_k^x と σ_l^x はクロネッカー積の異なるサイトにのみ σ^x を置き (他のサイトは $\sigma^0 = I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}$)、主張 3.2 (1) より積は各サイトごとの 2 次の行列の積になるから可換であり、定理 4.5 より

$$\exp\left(K_2^* \sum_{k=1}^M \sigma_k^x\right) = \prod_{k=1}^M \exp(K_2^* \sigma_k^x)$$

また $k \neq 1$ のとき $\exp(K_2^* \sigma_k^x)$ は第 1 因子に σ^0 をもつので σ_1^z と可換であり、共役の中で相殺する。スカラー $(2s_2)^{M/2}$ も 主張 3.6 により相殺する。よって

$$V_2 \sigma_1^z V_2^{-1} = \exp(K_2^* \sigma_1^x) \sigma_1^z \exp(-K_2^* \sigma_1^x) = (\exp(K_2^* \sigma^x) \sigma^z \exp(-K_2^* \sigma^x)) \boxtimes \sigma^0 \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^0$$

Step 4: 第 1 因子を計算する。主張 7.1 の $\sigma^z \sigma^x = -\sigma^x \sigma^z$ を n 回使うと $\sigma^z (\sigma^x)^n = (-\sigma^x)^n \sigma^z$ 、すなわち $(\sigma^x)^n \sigma^z = \sigma^z (-\sigma^x)^n$ なので、級数の各項ごとに

$$\exp(K_2^* \sigma^x) \sigma^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(K_2^*)^n}{n!} (\sigma^x)^n \sigma^z = \sigma^z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-K_2^*)^n}{n!} (\sigma^x)^n = \sigma^z \exp(-K_2^* \sigma^x)$$

また、 $c_2^* = \cosh 2K_2^*$, $s_2^* = \sinh 2K_2^*$ (定義 5.8) と、成分計算 (定義 1.8) による

$$\sigma^z \sigma^x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i \sigma^y \quad (\because \text{行列の積の成分計算とスカラー倍の定義})$$

を使う。すると

$$\begin{aligned} \exp(K_2^* \sigma^x) \sigma^z \exp(-K_2^* \sigma^x) &= \sigma^z \exp(-K_2^* \sigma^x) \exp(-K_2^* \sigma^x) \quad (\because \text{直前の式 } \exp(K_2^* \sigma^x) \sigma^z = \sigma^z \exp(-K_2^* \sigma^x)) \\ &= \sigma^z \exp(-2K_2^* \sigma^x) \quad (\because \text{可換な行列の } \exp \text{ 積公式}) \\ &= \sigma^z (\cosh(2K_2^*) \sigma^0 - \sinh(2K_2^*) \sigma^x) \quad (\because \text{Step 2, } \cosh(-t) = \cosh t, \sinh(-t) = -\sinh t) \\ &= \cosh(2K_2^*) \sigma^z - \sinh(2K_2^*) \sigma^z \sigma^x \quad (\because \text{行列の積の分配則と } \sigma^z \sigma^0 = \sigma^z) \\ &= c_2^* \sigma^z - i s_2^* \sigma^y \quad (\because \text{上で計算した } \sigma^z \sigma^x = i \sigma^y \text{ と略記 } c_2^*, s_2^*) \end{aligned}$$

Step 5: 結論。 $K_2^* > 0$ より $c_2^* > 0$ かつ $s_2^* > 0$ (定義 5.8) なので、Step 3・Step 4 より

$$V_2 \sigma_1^z V_2^{-1} = c_2^* (\sigma^z \boxtimes \sigma^0 \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^0) - i s_2^* (\sigma^y \boxtimes \sigma^0 \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^0)$$

は Step 1 の基底に関して相異なる 2 つの基底元の係数がともに 0 でない。一方 $\mathcal{P}_M$ の元 $i^k \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_M}$ は同じ基底に関して非零の係数をちょうど 1 つしかもたない。基底に関する表示の一意性より $V_2 \sigma_1^z V_2^{-1} \notin \mathcal{P}_M$ 。したがって $V_2 \mathcal{P}_M V_2^{-1} \neq \mathcal{P}_M$ であり $V_2 \notin \mathcal{C}_M$ 。 $\square$

定義 9.11 (T_g の定義). 定義 9.7 の記号を使い、 $g \in (\text{Mat}(2^M, \mathbb{C}))^\times$ について、

$$T_g : \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \rightarrow \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}), \quad h \mapsto g \cdot h \cdot g^{-1}$$

主張 9.12 $(\text{Mat}(2^M, \mathbb{C}))^\times$ の全元と可換する可逆行列). $R := \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 、 $I := I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ とし、 $R^\times$ を 定義 9.7 の可逆行列全体とする。さらに、 $R^\times$ のすべての元と可換な $R^\times$ の元全体を

$$C(R^\times) := \{ W \in R^\times \mid \forall h \in R^\times, Wh = hW \}$$

と書く。このとき

$$C(R^\times) = \{ cI \mid c \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \}$$

である。すなわち、すべての可逆行列と可換する可逆行列は、非零複素数倍の単位行列に限る。

証明. まず右辺が左辺に含まれることを示す。 $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ とする。定義 9.7 (iv) より $cI \in R^\times$ であり、主張 3.6 より cI はすべての $h \in R^\times$ と可換する。したがって $cI \in C(R^\times)$ である。

次に左辺が右辺に含まれることを示す。 $W \in C(R^\times)$ とする。定理 3.5 (1) の多重添字を使い、 $P, Q \in \mathcal{I}_M$ に対応する行列単位を $E_{P,Q}$ と書く。まず、この行列単位の積を確認する。

$P = (p_1, \dots, p_M)$ 、 $Q = (q_1, \dots, q_M)$ 、 $K = (k_1, \dots, k_M)$ 、 $L = (l_1, \dots, l_M)$ とする。また、 $q, k \in \{1, 2\}$ に対して δ_{qk} を次のように定める。

$$\delta_{qk} := \begin{cases} 1 & (q = k), \\ 0 & (q \neq k). \end{cases}$$

主張 3.2 (1) と 主張 3.3 を使うと、

$$\begin{aligned} E_{P,Q} E_{K,L} &= (E_{p_1 q_1} E_{k_1 l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{p_M q_M} E_{k_M l_M}) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\ &= (\delta_{q_1 k_1} E_{p_1 l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\delta_{q_M k_M} E_{p_M l_M}) \quad (\because E_{pq} E_{kl} = \delta_{qk} E_{pl} \text{ という 2 次行列の成分計算}) \\ &= \left(\prod_{r=1}^M \delta_{q_r k_r} \right) E_{P,L} \quad (\because \text{各因子についての複素スカラー倍の線型性}). \end{aligned}$$

$\delta_{Q,K} := \prod_{r=1}^M \delta_{q_r k_r}$ と書けば、 $E_{P,Q} E_{K,L} = \delta_{Q,K} E_{P,L}$ である。特に $E := E_{P,Q}$ とおくと、 $P \neq Q$ なら $E^2 = O$ 、 $P = Q$ なら $E^2 = E$ である。

$P \neq Q$ の場合は $I + E$ の逆行列が $I - E$ である。実際、

$$\begin{aligned} (I + E)(I - E) &= I - E + E - E^2 \quad (\because \text{行列積の分配律}) \\ &= I \quad (\because E^2 = O), \\ (I - E)(I + E) &= I + E - E - E^2 \quad (\because \text{行列積の分配律}) \\ &= I \quad (\because E^2 = O). \end{aligned}$$

$P = Q$ の場合は $I - 2E$ が自分自身を逆行列にもつ。実際、

$$\begin{aligned} (I - 2E)(I - 2E) &= I - 2E - 2E + 4E^2 \quad (\because \text{行列積の分配律}) \\ &= I - 4E + 4E \quad (\because E^2 = E) \\ &= I \quad (\because \text{同じ行列の差は零行列}). \end{aligned}$$

よって $P \neq Q$ なら $U_{P,Q} := I + E_{P,Q}$ 、 $P = Q$ なら $U_{P,P} := I - 2E_{P,P}$ とおけば、どちらも 定義 9.7 の定義により $R^\times$ に属する。

$P \neq Q$ なら、 $WU_{P,Q} = U_{P,Q}W$ を分配して両辺から W を引くと

$$\begin{aligned}
W + WE_{P,Q} &= WU_{P,Q} & (\because U_{P,Q} = I + E_{P,Q}) \\
&= U_{P,Q}W & (\because W \in C(R^\times), U_{P,Q} \in R^\times) \\
&= W + E_{P,Q}W & (\because U_{P,Q} = I + E_{P,Q}),
\end{aligned}$$

したがって $WE_{P,Q} = E_{P,Q}W$ である。 $P = Q$ なら同様に $WU_{P,P} = U_{P,P}W$ から

$$\begin{aligned}
W - 2WE_{P,P} &= WU_{P,P} & (\because U_{P,P} = I - 2E_{P,P}) \\
&= U_{P,P}W & (\because W \in C(R^\times), U_{P,P} \in R^\times) \\
&= W - 2E_{P,P}W & (\because U_{P,P} = I - 2E_{P,P}),
\end{aligned}$$

を得る。両辺から W を引き、非零複素数 -2 を消去すると $WE_{P,P} = E_{P,P}W$ である。ゆえにすべての $P, Q \in \mathcal{I}_M$ について $WE_{P,Q} = E_{P,Q}W$ が成り立つ。

定理 3.5 (1) より、任意の $x \in R$ は一意に $x = \sum_{P,Q \in \mathcal{I}_M} x_{P,Q} E_{P,Q}$ ($x_{P,Q} \in \mathbb{C}$) と書ける。したがって

$$\begin{aligned}
Wx &= \sum_{P,Q} x_{P,Q} WE_{P,Q} & (\because x \text{ の基底展開と行列積の分配律}) \\
&= \sum_{P,Q} x_{P,Q} E_{P,Q}W & (\because WE_{P,Q} = E_{P,Q}W) \\
&= xW & (\because x \text{ の基底展開と行列積の分配律}).
\end{aligned}$$

$x \in R$ は任意だったので、主張 3.7 より、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して $W = cI$ である。もし $c = 0$ なら、どの行列 B に対しても $WB = OB = O \neq I$ となり W は可逆でない。ところが $W \in R^\times$ なので $c \neq 0$ である。以上より $W \in \{cI \mid c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}\}$ を得た。□

主張 9.13 (T の (定数倍を除いた) 単射性). $R := \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 、 $I := I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ とし、 $R^\times$ を定義 9.7 の可逆行列全体とする。これは 定義 9.11 で共役写像を定める行列 g の許容範囲であり、各 T_g 自身の定義域は R である。このとき、
 $g, g' \in R^\times$ について

$$T_g = T_{g'} \iff \exists c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \quad g' = cg$$

が成り立つ。

証明. Step 1: $u := g^{-1}g'$ とおくと、 $u \in R^\times$ かつ $gu = g'$ である。

定義 9.7 (iii) より $g^{-1} \in R^\times$ であり、同 (ii) より $u = g^{-1}g' \in R^\times$ である。また、

$$\begin{aligned}
gu &= g(g^{-1}g') & (\because u = g^{-1}g') \\
&= (gg^{-1})g' & (\because \text{行列積の結合律}) \\
&= Ig' & (\because gg^{-1} = I) \\
&= g' & (\because I \text{ は積の単位元}).
\end{aligned}$$

Step 2: 任意の $h \in R$ について、 $T_g(h) = T_{g'}(h)$ と $hu = uh$ は同値である。

$h \in R$ を固定する。定義 9.11 と、可逆行列を左または右から掛ける操作が逆行列によって戻せることから、

$$\begin{aligned}
T_g(h) = T_{g'}(h) &\iff ghg^{-1} = g'hg'^{-1} & (\because T_g, T_{g'} \text{ の定め方}) \\
&\iff g^{-1}(ghg^{-1}) = g^{-1}(g'hg'^{-1}) & (\because \text{両辺に左から可逆行列 } g^{-1} \text{ を掛ける同値変形}) \\
&\iff (g^{-1}g)hg^{-1} = (g^{-1}g')hg'^{-1} & (\because \text{行列積の結合律}) \\
&\iff Ihg^{-1} = (g^{-1}g')hg'^{-1} & (\because g^{-1}g = I) \\
&\iff hg^{-1} = (g^{-1}g')hg'^{-1} & (\because I \text{ は積の単位元}) \\
&\iff (hg^{-1})g' = ((g^{-1}g')hg'^{-1})g' & (\because \text{両辺に右から可逆行列 } g' \text{ を掛ける同値変形}) \\
&\iff h(g^{-1}g') = (g^{-1}g')h(g'^{-1}g') & (\because \text{行列積の結合律}) \\
&\iff h(g^{-1}g') = (g^{-1}g')hI & (\because g'^{-1}g' = I) \\
&\iff h(g^{-1}g') = (g^{-1}g')h & (\because I \text{ は積の単位元}) \\
&\iff hu = uh & (\because u = g^{-1}g').
\end{aligned}$$

Step 3: $T_g = T_{g'}$ ならば、ある $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ が存在して $g' = cg$ である。

$T_g = T_{g'}$ とする。すべての $h \in R^\times$ について $T_g(h) = T_{g'}(h)$ なので、Step 2 より $uh = hu$ である。Step 1 の $u \in R^\times$ と合わせると、主張 9.12 より、ある $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ が存在して $u = cI$ である。したがって、

$$\begin{aligned}
g' &= gu & (\because \text{Step 1}) \\
&= g(cI) & (\because u = cI) \\
&= c(gI) & (\because \text{複素スカラー倍と行列積の結合律}) \\
&= cg & (\because gI = g).
\end{aligned}$$

Step 4: ある $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ について $g' = cg$ ならば、 $T_g = T_{g'}$ である。

$g' = cg$ とする。すると

$$\begin{aligned}
u &= g^{-1}g' & (\because u = g^{-1}g') \\
&= g^{-1}(cg) & (\because g' = cg) \\
&= c(g^{-1}g) & (\because \text{複素スカラー倍と行列積の結合律}) \\
&= cI & (\because g^{-1}g = I).
\end{aligned}$$

任意の $h \in R$ に対し、

$$\begin{aligned}
uh &= (cI)h & (\because u = cI) \\
&= h(cI) & (\because \text{主張 3.6}) \\
&= hu & (\because u = cI)
\end{aligned}$$

である (主張 3.6)。Step 2 の逆向きにより $T_g(h) = T_{g'}(h)$ であり、 $h \in R$ は任意なので $T_g = T_{g'}$ を得る。Step 3 と Step 4 を合わせて主張が成り立つ。 $\square$

主張 9.14 (ホロノミック量子場 p142 下段).

$$\begin{aligned}
T_{(V_1^{(\pm)})_{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= \cosh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(-)} + ie^{-i2\pi\mu/M} \sinh(K_1)\hat{Y}_\mu \\
T_{(V_1^{(\pm)})_{1/2}}(\hat{Y}_\mu) &= -ie^{i2\pi\mu/M} \sinh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(K_1)\hat{Y}_\mu \\
T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= \cosh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)} - i \sinh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu \\
T_{V_2}(\hat{Y}_\mu) &= i \sinh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu
\end{aligned}$$

証明. 以下、主張 9.5 の (h1.z), (h1.y) は $\pm$ の 2 つの符号選択について成り立つが、本主張では $\hat{Z}_\mu^{(-)}$ に作用させるので、いずれも $\pm = -$ (すなわち $H_1^{(-)}$ と $\hat{Z}_\mu^{(-)}$ の組) を選んで適用する。

$T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)})$ について、次の変形で 主張 9.6 と 主張 9.5 を用いる。

$$\begin{aligned}
T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= (V_1^{(\pm)})^{1/2} \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} \cdot (V_1^{(\pm)})^{-1/2} \quad (\because \text{共役写像 } T \text{ の定義}) \\
&= \left(\exp(iK_1 H_1^{(\pm)}) \right)^{1/2} \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} \cdot \left(\exp(iK_1 H_1^{(\pm)}) \right)^{-1/2} \quad (\because V_1^{(\pm)} \text{ の指数表示}) \\
&= \exp\left(\frac{1}{2}iK_1 H_1^{(\pm)}\right) \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} \cdot \exp\left(-\left(\frac{1}{2}iK_1 H_1^{(\pm)}\right)\right) \quad (\because \text{指数行列の平方根と逆元}) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[\frac{1}{2}iK_1 H_1^{(\pm)}, \dots, \left[\frac{1}{2}iK_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] \dots \right]}_{n \text{ times}} \quad (\because \exp \text{ 共役の級数展開}) \\
&= \cosh(K_1) \hat{Z}_\mu^{(-)} + i e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{テイラー係数の抽出}) \\
&= \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ i e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{行ベクトルと列ベクトルの積の定義})
\end{aligned}$$

$T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu)$ について、作用させる元が $\hat{Z}_\mu^{(-)}$ から $\hat{Y}_\mu$ へ変わるだけで、共役の展開はまったく同じ手順である。

$$\begin{aligned}
T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu) &= (V_1^{(\pm)})^{1/2} \cdot \hat{Y}_\mu \cdot (V_1^{(\pm)})^{-1/2} \quad (\because \text{共役写像 } T \text{ の定義}) \\
&= \left(\exp(iK_1 H_1^{(\pm)}) \right)^{1/2} \cdot \hat{Y}_\mu \cdot \left(\exp(iK_1 H_1^{(\pm)}) \right)^{-1/2} \quad (\because V_1^{(\pm)} \text{ の指数表示}) \\
&= \exp\left(\frac{1}{2}iK_1 H_1^{(\pm)}\right) \cdot \hat{Y}_\mu \cdot \exp\left(-\left(\frac{1}{2}iK_1 H_1^{(\pm)}\right)\right) \quad (\because \text{指数行列の平方根と逆元}) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[\frac{1}{2}iK_1 H_1^{(\pm)}, \dots, \left[\frac{1}{2}iK_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu \right] \dots \right]}_{n \text{ times}} \quad (\because \exp \text{ 共役の級数展開}) \\
&= -i e^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) \hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(K_1) \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{テイラー係数の抽出 (h1.y)}) \\
&= \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} -i e^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{行ベクトルと列ベクトルの積の定義})
\end{aligned}$$

最後の等号は、行ベクトルと列ベクトルの積の定義 $(A, B) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = aA + bB$ による ($A, B \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$, $a, b \in \mathbb{C}$)。

$T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)})$ について。準備として 2 つ置く。第一に、スカラー $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{C}^\times$ は 主張 3.6 により $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の任意の元と可換である。第二に、 $(2s_2)^{M/2} ((2s_2)^{M/2})^{-1} = 1$ である ($\mathbb{C}^\times$ の逆元の定義)。

$$\begin{aligned}
T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= V_2 \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} \cdot V_2^{-1} \quad (\because \text{共役写像 } T \text{ の定義}) \\
&= \left((2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^* H_2) \right) \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} \cdot \left((2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^* H_2) \right)^{-1} \quad (\because V_2 \text{ の指数表示}) \\
&= (2s_2)^{M/2} \cdot \exp(iK_2^* H_2) \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} \cdot \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} \cdot \exp(iK_2^* H_2)^{-1} \quad (\because \text{スカラー倍の行列の逆元 } (cA)^{-1} = c^{-1}A^{-1}) \\
&= (2s_2)^{M/2} \cdot \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} \cdot \exp(iK_2^* H_2) \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} \cdot \exp(iK_2^* H_2)^{-1} \quad (\because \text{スカラーは任意の元と可換 (準備の第一)}) \\
&= \exp(iK_2^* H_2) \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} \cdot \exp(iK_2^* H_2)^{-1} \quad (\because \text{スカラーとその逆元の積は1(準備の第二)}) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[iK_2^* H_2, \dots, \left[iK_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] \dots \right]}_{n \text{ times}} \quad (\because \exp \text{ 共役の級数展開}) \\
&= \cosh(2K_2^*) \hat{Z}_\mu^{(-)} - i \sinh(2K_2^*) \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{テイラー係数の抽出}) \\
&= \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) \\ -i \sinh(2K_2^*) \end{pmatrix} \quad (\because \text{行ベクトルと列ベクトルの積の定義})
\end{aligned}$$

$T_{V_2}(\hat{Y}_\mu)$ についても、スカラー $(2s_2)^{M/2}$ が共役で打ち消し合うことは同じで、作用させる元だけが $\hat{Y}_\mu$ に変わる。

$$\begin{aligned}
T_{V_2}(\hat{Y}_\mu) &= V_2 \cdot \hat{Y}_\mu \cdot V_2^{-1} \quad (\because \text{共役写像 } T \text{ の定義}) \\
&= \left((2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^* H_2) \right) \cdot \hat{Y}_\mu \cdot \left((2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^* H_2) \right)^{-1} \quad (\because V_2 \text{ の指数表示}) \\
&= (2s_2)^{M/2} \cdot \exp(iK_2^* H_2) \cdot \hat{Y}_\mu \cdot \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} \cdot \exp(iK_2^* H_2)^{-1} \quad (\because \text{スカラー倍の行列の逆元 } (cA)^{-1} = c^{-1}A^{-1}) \\
&= (2s_2)^{M/2} \cdot \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} \cdot \exp(iK_2^* H_2) \cdot \hat{Y}_\mu \cdot \exp(iK_2^* H_2)^{-1} \quad (\because \text{スカラーは任意の元と可換 (準備の第一)}) \\
&= \exp(iK_2^* H_2) \cdot \hat{Y}_\mu \cdot \exp(iK_2^* H_2)^{-1} \quad (\because \text{スカラーとその逆元の積は1(準備の第二)}) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[iK_2^* H_2, \dots, [iK_2^* H_2, \hat{Y}_\mu] \dots \right]}_{n \text{ times}} \quad (\because \exp \text{ 共役の級数展開}) \\
&= i \sinh(2K_2^*) \hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(2K_2^*) \hat{Y}_\mu \quad (\because \text{テイラー係数の抽出 (h2.y)}) \\
&= \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} i \sinh(2K_2^*) \\ \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix} \quad (\because \text{行ベクトルと列ベクトルの積の定義})
\end{aligned}$$

以上 4 式が statement と一致する。 □

定義 9.15.

$$\begin{aligned}
\left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \times T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \right) (X, Y) &:= \left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(X), T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(Y) \right) \\
(T_{V_2} \times T_{V_2}) (X, Y) &:= (T_{V_2}(X), T_{V_2}(Y))
\end{aligned}$$

主張 9.16.

$$\begin{aligned}
\left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \times T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \right) (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) &= \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} \cosh K_1 & -ie^{i\theta_\mu} \sinh K_1 \\ ie^{-i\theta_\mu} \sinh K_1 & \cosh K_1 \end{pmatrix} \\
(T_{V_2} \times T_{V_2}) (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) &= \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} \cosh 2K_2^* & i \sinh 2K_2^* \\ -i \sinh 2K_2^* & \cosh 2K_2^* \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

ただし $\theta_\mu := 2\pi\mu/M$ 。

証明. 直積写像の定義より各成分に分解し、主張 9.14 の行列表示を代入して 2 列を並べる。

$$\begin{aligned}
\left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \times T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \right) (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) &= \left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu) \right) \quad (\because \text{直積写像の定義}) \\
&= \left(\left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ ie^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) \end{pmatrix}, \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} -ie^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \right) \quad (\because \text{二つの共役作用の行列表示}) \\
&= \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} \cosh(K_1) & -ie^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) \\ ie^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \sinh(K_1) & \cosh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{二つの列ベクトルを一つの行列の二列として並べる})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(T_{V_2} \times T_{V_2}) (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) &= \left(T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{V_2}(\hat{Y}_\mu) \right) \quad (\because \text{直積写像の定義}) \\
&= \left(\left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) \\ -i \sinh(2K_2^*) \end{pmatrix}, \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} i \sinh(2K_2^*) \\ \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix} \right) \quad (\because \text{二つの共役作用の行列表示}) \\
&= \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) & i \sinh(2K_2^*) \\ -i \sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix} \quad (\because \text{二つの列ベクトルを一つの行列の二列として並べる})
\end{aligned}$$

ただし $\theta_\mu := 2\pi\mu/M$ と書けば上記の $e^{\pm i\frac{2\pi\mu}{M}} = e^{\pm i\theta_\mu}$ であり statement の形になる。 □

主張 9.17 (T_g の $\mathbb{C}$ 線型性). 任意の $M \in \mathbb{N}_{>0}$ をとる。定義 9.7 の $R := \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と $R^\times$ を用いる。任意の $g \in R^\times$ 、 $a, b \in \mathbb{C}$ 、 $X, W \in R$ について、

$$T_g(aX + bW) = aT_g(X) + bT_g(W)$$

証明. 定義 9.11 の定義を用い、行列積の左右の分配と、複素スカラー倍と行列積の両立を一回ずつ適用する。

$$\begin{aligned}
T_g(aX + bW) &= g(aX + bW)g^{-1} & (\because \text{定義 9.11}) \\
&= (g(aX) + g(bW))g^{-1} & (\because \text{左からの行列積の分配法則}) \\
&= g(aX)g^{-1} + g(bW)g^{-1} & (\because \text{右からの行列積の分配法則}) \\
&= a(gX)g^{-1} + b(gW)g^{-1} & (\because \text{左からの行列積と複素スカラー倍の両立}) \\
&= a(gXg^{-1}) + b(gWg^{-1}) & (\because \text{右からの行列積と複素スカラー倍の両立}) \\
&= aT_g(X) + bT_g(W) & (\because \text{定義 9.11}).
\end{aligned}$$

□

定義 9.18 ($T_{(V)}$ の定義). $\forall X \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について、

$$T_{(V)}(X) := T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \left(T_{V_2} \left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(X) \right) \right)$$

主張 9.19 (K_2 と K_2^* の双対関係). 定義 5.8 の記号 ($K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $K_2^* := -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2)$, $c_2 := \cosh 2K_2$, $s_2 := \sinh 2K_2$, $c_2^* := \cosh 2K_2^*$, $s_2^* := \sinh 2K_2^*$) について、

$$s_2^* = \frac{1}{s_2}, \quad c_2^* = \frac{c_2}{s_2}, \quad \text{したがって} \quad c_2^* = s_2^* c_2$$

証明. $K_2 > 0$ より $0 < \tanh K_2 < 1$ であり $\log(\tanh K_2)$ は $\mathbb{R}$ の中で定義される。 $K_2^* = -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2)$ から必要な指数の表示を先に作る。

$$\begin{aligned}
-2K_2^* &= \log(\tanh K_2) & (\because K_2^* = -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2) \text{ と } \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
e^{-2K_2^*} &= e^{\log(\tanh K_2)} & (\because \text{直前の等式の両辺の指数}) \\
&= \tanh K_2 & (\because 0 < \tanh K_2 \text{ と実対数・指数の逆写像性}) \\
e^{2K_2^*} &= (\tanh K_2)^{-1} & (\because \text{直前の等式の逆数と } \tanh K_2 \neq 0).
\end{aligned}$$

$\sinh K_2 > 0$, $\cosh K_2 > 0$ であるから、以下の分母はいずれも 0 ではない。

$$\begin{aligned}
s_2^* &= \sinh 2K_2^* & (\because s_2^* = \sinh 2K_2^* \text{ の定義}) \\
&= \frac{e^{2K_2^*} - e^{-2K_2^*}}{2} & (\because \sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})) \\
&= \frac{(\tanh K_2)^{-1} - \tanh K_2}{2} & (\because \text{準備の } e^{2K_2^*} = (\tanh K_2)^{-1}, e^{-2K_2^*} = \tanh K_2) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2} \right) & (\because \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} \text{ とその逆数}) \\
&= \frac{\cosh^2 K_2 - \sinh^2 K_2}{2 \sinh K_2 \cosh K_2} & (\because \text{通分. 分母 } \sinh K_2 \cosh K_2 \neq 0 \text{ は準備で確認済み}) \\
&= \frac{1}{\sinh 2K_2} & (\because \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, 2 \sinh x \cosh x = \sinh 2x) \\
&= \frac{1}{s_2} & (\because s_2 = \sinh 2K_2 \text{ の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c_2^* &= \cosh 2K_2^* & (\because c_2^* = \cosh 2K_2^* \text{ の定義}) \\
&= \frac{e^{2K_2^*} + e^{-2K_2^*}}{2} & (\because \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})) \\
&= \frac{(\tanh K_2)^{-1} + \tanh K_2}{2} & (\because \text{準備の } e^{2K_2^*} = (\tanh K_2)^{-1}, e^{-2K_2^*} = \tanh K_2) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} + \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2} \right) & (\because \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} \text{ とその逆数}) \\
&= \frac{\cosh^2 K_2 + \sinh^2 K_2}{2 \sinh K_2 \cosh K_2} & (\because \text{通分。分母 } \sinh K_2 \cosh K_2 \neq 0 \text{ は準備で確認済み}) \\
&= \frac{\cosh 2K_2}{\sinh 2K_2} & (\because \cosh^2 x + \sinh^2 x = \cosh 2x, 2 \sinh x \cosh x = \sinh 2x) \\
&= \frac{c_2}{s_2} & (\because c_2 = \cosh 2K_2 \text{ の定義})
\end{aligned}$$

この 2 式より

$$\begin{aligned}
c_2^* &= \frac{c_2}{s_2} & (\because \text{上の鎖}) \\
&= c_2 \cdot \frac{1}{s_2} & (\because \mathbb{R} \text{ の除法は逆数との積 } (s_2 \neq 0 \text{ は準備で確認済み})) \\
&= c_2 s_2^* & (\because \text{もう一方の鎖の } s_2^* = \frac{1}{s_2}) \\
&= s_2^* c_2 & (\because \mathbb{R} \text{ の乗法の可換性})
\end{aligned}$$

□

定義 9.20 ($A(\theta)$ の定義). $\theta \in \mathbb{C}$ について、

$$A(\theta) := \begin{pmatrix} c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta & ie^{i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2) \\ -ie^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2) & c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta \end{pmatrix}$$

主張 9.21 ($T_{(V)}$ の $\hat{Z}, \hat{Y}$ への作用). $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\left(T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) \right) = \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) A \left(\frac{2\pi\mu}{M} \right)$$

証明. 以下 $\theta_\mu := 2\pi\mu/M$ とし、次の 2 行列を用いる (それぞれ 主張 9.16 の V_1, V_2 分に対応):

$$B_1(\theta_\mu) := \begin{pmatrix} \cosh(K_1) & -ie^{i\theta_\mu} \sinh(K_1) \\ ie^{-i\theta_\mu} \sinh(K_1) & \cosh(K_1) \end{pmatrix}, \quad B_2 := \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) & i \sinh(2K_2^*) \\ -i \sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix}$$

(z) $T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)})$ について、 T の線型性 (主張 9.17)、主張 9.16、主張 9.14 を用いる。

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \left(T_{V_2} \left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) \right) \right) & (\because V = (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2} \text{ と共役作用の合成則}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \left(T_{V_2} \left(\cosh(K_1) \hat{Z}_\mu^{(-)} + ie^{-i\theta_\mu} \sinh(K_1) \hat{Y}_\mu \right) \right) & (\because \text{直積作用の計算}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \left(\left(T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{V_2}(\hat{Y}_\mu) \right) \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ ie^{-i\theta_\mu} \sinh(K_1) \end{pmatrix} \right) & (\because T \text{ の線型性}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \left((\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) B_2 \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ ie^{-i\theta_\mu} \sinh(K_1) \end{pmatrix} \right) & (\because \text{直積作用の計算}) \\
&= \left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu) \right) B_2 \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ ie^{-i\theta_\mu} \sinh(K_1) \end{pmatrix} & (\because T \text{ の線型性}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) B_1(\theta_\mu) B_2 \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ ie^{-i\theta_\mu} \sinh(K_1) \end{pmatrix} & (\because \text{直積作用の計算})
\end{aligned}$$

(y) $T_{(V)}(\hat{Y}_\mu)$ について、同様に、

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) &= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \left(T_{V_2} \left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu) \right) \right) \quad (\because V = (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2} \text{ と共役作用の合成則}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \left(T_{V_2} \left(-ie^{i\theta_\mu} \sinh(K_1) \hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(K_1) \hat{Y}_\mu \right) \right) \quad (\because \text{直積作用の計算}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \left(\left(T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{V_2}(\hat{Y}_\mu) \right) \begin{pmatrix} -ie^{i\theta_\mu} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \right) \quad (\because T \text{ の線型性}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \left(\left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \right) B_2 \begin{pmatrix} -ie^{i\theta_\mu} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \right) \quad (\because \text{直積作用の計算}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) B_1(\theta_\mu) B_2 \begin{pmatrix} -ie^{i\theta_\mu} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because T \text{ の線型性と直積作用の計算})
\end{aligned}$$

よって、上記 2 列を並べると (2 つの列ベクトルはちょうど $B_1(\theta_\mu)$ の 2 列)、

$$\begin{aligned}
\left(T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) \right) &= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) B_1(\theta_\mu) B_2 B_1(\theta_\mu) \quad (\because \text{直前の二列を並べ、} B_1(\theta_\mu) \text{ の二列の定義を用いた}) \\
\text{最後に } B_1(\theta_\mu) B_2 B_1(\theta_\mu) &= A(\theta_\mu) \quad (\text{定義 9.20}) \text{ を具体的な行列積で確かめる。以下、記号を}
\end{aligned}$$

$a := \cosh K_1 \in \mathbb{R}$, $b := \sinh K_1 \in \mathbb{R}$, $C := \cosh 2K_2^* = c_2^* \in \mathbb{R}$, $S := \sinh 2K_2^* = s_2^* \in \mathbb{R}$, $\theta := \theta_\mu \in \mathbb{R}$
と略記する (c_2^*, s_2^* は 定義 5.8 の記号)。倍角公式

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 &= \cosh^2 K_1 + \sinh^2 K_1 \quad (\because a = \cosh K_1, b = \sinh K_1 \text{ の略記}) \\
&= \cosh 2K_1 \quad (\because \text{双曲線関数の倍角公式}) \\
&= c_1 \quad (\because c_1 = \cosh 2K_1 \text{ の定義}) \\
2ab &= 2 \sinh K_1 \cosh K_1 \quad (\because a = \cosh K_1, b = \sinh K_1 \text{ の略記}) \\
&= \sinh 2K_1 \quad (\because \text{双曲線関数の倍角公式}) \\
&= s_1 \quad (\because s_1 = \sinh 2K_1 \text{ の定義}) \\
a^2 - b^2 &= \cosh^2 K_1 - \sinh^2 K_1 \quad (\because a = \cosh K_1, b = \sinh K_1 \text{ の略記}) \\
&= 1 \quad (\because \cosh^2 K_1 - \sinh^2 K_1 = 1)
\end{aligned}$$

を後で用いる。この記号で $B_1(\theta) = \begin{pmatrix} a & -ie^{i\theta}b \\ ie^{-i\theta}b & a \end{pmatrix}$ 、 $B_2 = \begin{pmatrix} C & iS \\ -iS & C \end{pmatrix}$ である。

Step 1: $N := B_2 B_1(\theta)$ を成分ごとに計算する (行列の積は 定義 1.8)。

$$\begin{aligned}
N_{11} &= C \cdot a + (iS) \cdot \left(ie^{-i\theta}b \right) \quad (\because \text{行列積の定義}) \\
&= Ca + i^2 S b e^{-i\theta} \quad (\because \text{複素数の積の結合則と可換則}) \\
&= Ca - S b e^{-i\theta} \quad (\because i^2 = -1) \\
N_{12} &= C \cdot \left(-ie^{i\theta}b \right) + (iS) \cdot a \quad (\because \text{行列積の定義}) \\
&= i \left(Sa - C b e^{i\theta} \right) \quad (\because \text{分配則と複素数の積の可換則}) \\
N_{21} &= (-iS) \cdot a + C \cdot \left(ie^{-i\theta}b \right) \quad (\because \text{行列積の定義}) \\
&= i \left(C b e^{-i\theta} - Sa \right) \quad (\because \text{分配則と複素数の積の可換則}) \\
N_{22} &= (-iS) \cdot \left(-ie^{i\theta}b \right) + C \cdot a \quad (\because \text{行列積の定義}) \\
&= i^2 S b e^{i\theta} + Ca \quad (\because (-i)(-i) = i^2 \text{ と複素数の積の結合則}) \\
&= Ca - S b e^{i\theta} \quad (\because i^2 = -1 \text{ と加法の可換則})
\end{aligned}$$

Step 2: $P := B_1(\theta) N = B_1(\theta) B_2 B_1(\theta)$ の (1,1) 成分。

$$\begin{aligned}
P_{11} &= a N_{11} + (-ie^{i\theta}b) N_{21} & (\because \text{行列積の定義}) \\
&= a (Ca - Sb e^{-i\theta}) + (-ie^{i\theta}b) \cdot i (Cb e^{-i\theta} - Sa) & (\because \text{Step 1 の } N_{11}, N_{21} \text{ の表示}) \\
&= Ca^2 - Sab e^{-i\theta} + e^{i\theta}b (Cb e^{-i\theta} - Sa) & (\because -i \cdot i = 1) \\
&= Ca^2 - Sab e^{-i\theta} + Cb^2 - Sab e^{i\theta} & (\because e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1) \\
&= C(a^2 + b^2) - Sab(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) & (\because \text{分配則による括り出し}) \\
&= C c_1 - S \cdot \frac{s_1}{2} \cdot 2 \cos \theta & (\because a^2 + b^2 = c_1, 2ab = s_1, e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta) \\
&= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta & (\because C = c_2^*, S = s_2^* \text{ の略記})
\end{aligned}$$

($e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$ は定理 1.54 による。) これは定義 9.20 の $A(\theta)$ の (1,1) 成分 $c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta = \gamma_1(\theta)$ に一致する。

Step 3: P の (2,2) 成分。

$$\begin{aligned}
P_{22} &= (ie^{-i\theta}b) N_{12} + a N_{22} & (\because \text{行列積の定義}) \\
&= (ie^{-i\theta}b) \cdot i (Sa - Cb e^{i\theta}) + a (Ca - Sb e^{i\theta}) & (\because \text{Step 1 の } N_{12}, N_{22} \text{ の表示}) \\
&= -e^{-i\theta}b (Sa - Cb e^{i\theta}) + Ca^2 - Sab e^{i\theta} & (\because i \cdot i = -1) \\
&= -Sab e^{-i\theta} + Cb^2 + Ca^2 - Sab e^{i\theta} & (\because \text{分配則と } e^{-i\theta} e^{i\theta} = 1) \\
&= C(a^2 + b^2) - Sab(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) & (\because \text{加法の可換則と分配則による括り出し}) \\
&= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta & (\because a^2 + b^2 = c_1, 2ab = s_1, e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta, C = c_2^*, S = s_2^*)
\end{aligned}$$

これは $A(\theta)$ の (2,2) 成分 $\gamma_1(\theta)$ に一致する ((1,1) 成分と同一の式)。

Step 4: P の (1,2) 成分。

$$\begin{aligned}
P_{12} &= a N_{12} + (-ie^{i\theta}b) N_{22} & (\because \text{行列積の定義}) \\
&= a \cdot i (Sa - Cb e^{i\theta}) + (-ie^{i\theta}b) (Ca - Sb e^{i\theta}) & (\because \text{Step 1 の } N_{12}, N_{22} \text{ の表示}) \\
&= i [Sa^2 - Cab e^{i\theta}] + i [-Cab e^{i\theta} + Sb^2 e^{2i\theta}] & (\because \text{分配則と複素数の積の結合則}) \\
&= i [S(a^2 + b^2 e^{2i\theta}) - 2Cab e^{i\theta}] & (\because \text{分配則による括り出し})
\end{aligned}$$

ここで括弧内の第 1 項を $e^{i\theta}$ でくくると、

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 e^{2i\theta} &= e^{i\theta} (a^2 e^{-i\theta} + b^2 e^{i\theta}) & (\because e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1 \text{ と指数法則}) \\
&= e^{i\theta} (a^2 (\cos \theta - i \sin \theta) + b^2 (\cos \theta + i \sin \theta)) & (\because \text{Euler の公式}) \\
&= e^{i\theta} ((a^2 + b^2) \cos \theta - i (a^2 - b^2) \sin \theta) & (\because \text{分配則による整理}) \\
&= e^{i\theta} (c_1 \cos \theta - i \sin \theta) & (\because a^2 + b^2 = c_1, a^2 - b^2 = 1)
\end{aligned}$$

また $2ab = s_1$ なので、

$$\begin{aligned}
P_{12} &= i [S e^{i\theta} (c_1 \cos \theta - i \sin \theta) - C s_1 e^{i\theta}] & (\because \text{直前の補助計算と } 2ab = s_1) \\
&= i e^{i\theta} [S (c_1 \cos \theta - i \sin \theta) - C s_1] & (\because \text{分配則による } e^{i\theta} \text{ の括り出し}) \\
&= i e^{i\theta} [s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta) - c_2^* s_1] & (\because S = s_2^*, C = c_2^* \text{ の略記}) \\
&= i e^{i\theta} [s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta) - s_2^* c_2 s_1] & (\because c_2^* = s_2^* c_2) \\
&= i e^{i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2) & (\because \text{分配則による } s_2^* \text{ の括り出し})
\end{aligned}$$

ここで $c_2^* = s_2^* c_2$ は主張 9.19 による (この置き換えが、定義 9.20 の γ_2 で c_2^* ではなく c_2 が現れる理由である)。得られた P_{12} は $A(\theta)$ の (1,2) 成分 $ie^{i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2) = \gamma_2(\theta)$ に一致する。

Step 5: P の (2,1) 成分。

$$\begin{aligned}
P_{21} &= (ie^{-i\theta} b) N_{11} + a N_{21} & (\because \text{行列積の定義}) \\
&= (ie^{-i\theta} b) (Ca - Sbe^{-i\theta}) + a \cdot i (Cbe^{-i\theta} - Sa) & (\because \text{Step 1 の } N_{11}, N_{21} \text{ の表示}) \\
&= i [Cabe^{-i\theta} - Sb^2 e^{-2i\theta}] + i [Cabe^{-i\theta} - Sa^2] & (\because \text{分配則と複素数の積の結合則}) \\
&= -i [S(a^2 + b^2 e^{-2i\theta}) - 2Cabe^{-i\theta}] & (\because \text{分配則による括り出し})
\end{aligned}$$

括弧内は Step 4 の括弧内で θ を $-\theta$ に置き換えたものに他ならない。よって Step 4 と同じ計算 ($\cos(-\theta) = \cos \theta$, $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ を用いる) により、

$$\begin{aligned}
S(a^2 + b^2 e^{-2i\theta}) - 2Cabe^{-i\theta} &= e^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2) & (\because \text{Step 4 の補助計算で } \theta \text{ を } -\theta \text{ に置換}) \\
P_{21} &= -ie^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2) & (\because \text{直前の等式を } P_{21} \text{ の表示へ代入}) \\
&= -\gamma_2(-\theta) & (\because \gamma_2 \text{ の定義と } \cos(-\theta) = \cos \theta, \sin(-\theta) = -\sin \theta)
\end{aligned}$$

実際、

$$\begin{aligned}
\gamma_2(-\theta) &= ie^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos(-\theta) - i \sin(-\theta) - s_1 c_2) & (\because \gamma_2 \text{ の定義}) \\
&= ie^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2) & (\because \cos(-\theta) = \cos \theta, \sin(-\theta) = -\sin \theta)
\end{aligned}$$

であるから $P_{21} = -\gamma_2(-\theta)$ であり、これは定義 9.20 の $A(\theta)$ の (2,1) 成分 $-ie^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2)$ に一致する。

Step 6: Step 2~5 により $P = B_1(\theta_\mu) B_2 B_1(\theta_\mu)$ の 4 成分すべてが $A(\theta_\mu)$ の対応成分に一致するので $B_1(\theta_\mu) B_2 B_1(\theta_\mu) = A(\theta_\mu)$ 。したがって statement を得る：

$$(T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{(V)}(\hat{Y}_\mu)) = (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) A(\theta_\mu) \quad (\because B_1(\theta_\mu) B_2 B_1(\theta_\mu) = A(\theta_\mu))$$

□

主張 9.22 ($A(\theta_\mu)$ の行列分解). $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$B_1(\theta_\mu) := \begin{pmatrix} \cosh K_1 & -ie^{i\theta_\mu} \sinh K_1 \\ ie^{-i\theta_\mu} \sinh K_1 & \cosh K_1 \end{pmatrix}, \quad B_2 := \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) & i \sinh(2K_2^*) \\ -i \sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix}$$

とおくと

$$A(\theta_\mu) = B_1(\theta_\mu) \cdot B_2 \cdot B_1(\theta_\mu)$$

証明. 主張 9.16 より $T_{(V_1^{(\pm)})_{1/2}}$ は $(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)$ に右から $B_1(\theta_\mu)$ を掛け、 $T_{(V_2)}$ は右から B_2 を掛ける。 $T_{(V)} = T_{(V_1^{(\pm)})_{1/2}} \circ T_{(V_2)} \circ T_{(V_1^{(\pm)})_{1/2}}$ と定義 9.20 の定義から $A(\theta_\mu) = B_1(\theta_\mu) B_2 B_1(\theta_\mu)$ 。□

定義 9.23 (θ_μ の定義). $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\theta_\mu := \frac{2\pi\mu}{M}$$

定義 9.24 ($\gamma_1(\theta_\mu), \gamma_2(\theta_\mu)$ の定義).

$$\gamma_1(\theta_\mu) := c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta_\mu \in \mathbb{R}$$

$$\gamma_2(\theta_\mu) := i e^{i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) \in \mathbb{C}$$

とおくと、

$$A(\theta_\mu) = \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta_\mu) & \gamma_2(\theta_\mu) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu) \end{pmatrix}$$

主張 9.25 ($\arg(\gamma_1(\theta_\mu))$). 定義 5.8 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ (したがって $K_1^*, K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$) とし、 $\mathcal{M} := \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ 、 $\theta_\mu := \frac{2\pi\mu}{M} \in \mathbb{R}$ とする。 $\mu \in \mathcal{M}$ について、 $\gamma_1(\theta) := c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta$ (定義 9.20 の対角成分) は $\gamma_1(\theta_\mu) \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ を満たし、その偏角 (定義 1.40) は

$$\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_1(\theta_\mu)) = \begin{cases} 0 & (\cos \theta_\mu \leq c_1 c_2^* / (s_1 s_2^*)) \\ \pi & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

さらに $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ のもとでは常に $\frac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*} > 1 \geq \cos \theta_\mu$ であるから、第 2 の場合 (otherwise) は実際には起こらない。すなわちすべての $\mu \in \mathcal{M}$ について $\gamma_1(\theta_\mu) > 0$ であり $\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_1(\theta_\mu)) = 0$ 。

証明. Step 1: 正值性と所属集合。定義 5.8 より $K_1, K_1^*, K_2, K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき $c_1 = \cosh 2K_1$ 、 $s_1 = \sinh 2K_1$ 、 $c_2^* = \cosh 2K_2^*$ 、 $s_2^* = \sinh 2K_2^*$ はいずれも正の実数である (主張 1.4 (1)(3) を $x = 2K_1 > 0$ 、 $x = 2K_2^* > 0$ に適用)。また $\mu \in \mathcal{M} \subset \mathbb{Z}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ より $\theta_\mu \in \mathbb{R}$ であり $\cos \theta_\mu \in \mathbb{R}$ 。よって $\gamma_1(\theta_\mu) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta_\mu$ は実数の四則演算で得られる実数であり、 $\gamma_1(\theta_\mu) \in \mathbb{R}$ 。特に $s_1 s_2^* > 0$ なので、以下でこれによる除算ができる。

Step 2: 符号の判定。 $s_1 s_2^* > 0$ で割ると、実数の順序の性質より

$$\begin{aligned} \gamma_1(\theta_\mu) > 0 &\iff c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta_\mu > 0 & (\because \gamma_1 \text{ の定義}) \\ &\iff c_1 c_2^* > s_1 s_2^* \cos \theta_\mu & (\because \text{実数の不等式の両辺へ同じ数を足した}) \\ &\iff \cos \theta_\mu < \frac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*} & (\because s_1 s_2^* > 0 \text{ で両辺を割った}) \\ \gamma_1(\theta_\mu) = 0 &\iff c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta_\mu = 0 & (\because \gamma_1 \text{ の定義}) \\ &\iff c_1 c_2^* = s_1 s_2^* \cos \theta_\mu & (\because \text{実数の等式の両辺へ同じ数を足した}) \\ &\iff \cos \theta_\mu = \frac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*} & (\because s_1 s_2^* > 0 \text{ で両辺を割った}) \\ \gamma_1(\theta_\mu) < 0 &\iff c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta_\mu < 0 & (\because \gamma_1 \text{ の定義}) \\ &\iff c_1 c_2^* < s_1 s_2^* \cos \theta_\mu & (\because \text{実数の不等式の両辺へ同じ数を足した}) \\ &\iff \cos \theta_\mu > \frac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*} & (\because s_1 s_2^* > 0 \text{ で両辺を割った}) \end{aligned}$$

したがって $\cos \theta_\mu \leq c_1 c_2^* / (s_1 s_2^*) \iff \gamma_1(\theta_\mu) \geq 0$ 、otherwise $\iff \gamma_1(\theta_\mu) < 0$ 。

Step 3: 実数の偏角。 $t \in \mathbb{R}$ を $\iota_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}}(t) = (t, 0) \in \mathbb{C}$ (定義 1.12) と見る。定義 1.36 の場合分けを $(x, y) = (t, 0)$ に適用すると、

$$\begin{aligned}
t > 0 : \quad \phi_{\text{polar}}(t, 0) &= [(\sqrt{t^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}, \arctan(0/t))]_{\sim} & (\because \text{極座標表示の定義の } x > 0 \text{ の場合}) \\
&= [(t, 0)]_{\sim} & (\because \sqrt{t^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = t, \arctan 0 = 0) \\
t < 0 : \quad \phi_{\text{polar}}(t, 0) &= [(\sqrt{t^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}, \arctan(0/t) + \pi)]_{\sim} & (\because \text{極座標表示の定義の } x < 0, y \geq 0 \text{ の場合}) \\
&= [(-t, \pi)]_{\sim} & (\because \sqrt{t^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = -t, \arctan 0 = 0) \\
t = 0 : \quad \phi_{\text{polar}}(t, 0) &= [(0, 0)]_{\sim} & (\because \text{極座標表示の定義の } (x, y) = (0, 0) \text{ の場合})
\end{aligned}$$

($t < 0$ の行は $x = t < 0$ かつ $y = 0 \geq 0$ の場合であり、 $\arctan 0 = 0$ 、 $\sqrt{t^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = -t > 0$ 。) よって 定義 1.39 と 定義 1.40 より

$$\begin{aligned}
t > 0 : \quad \arg^{[0, 2\pi)}(t) &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(t, 0))) & (\because \arg^{[0, 2\pi)} \text{ の定義}) \\
&= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(t, 0)]_{\sim})) & (\because \text{上の } t > 0 \text{ の場合の } \phi_{\text{polar}}(t, 0) = [(t, 0)]_{\sim}) \\
&= s_{[0, 2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}}) & (\because \text{pr}_2 \text{ の定義の } r = t > 0 \text{ の場合}) \\
&= 0 & (\because 0 \in [0, 2\pi) \text{ なので代表を返す写像 } s_{[0, 2\pi)} \text{ はそのまま } 0 \text{ を返す}) \\
t < 0 : \quad \arg^{[0, 2\pi)}(t) &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(t, 0))) & (\because \arg^{[0, 2\pi)} \text{ の定義}) \\
&= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(-t, \pi)]_{\sim})) & (\because \text{上の } t < 0 \text{ の場合の } \phi_{\text{polar}}(t, 0) = [(-t, \pi)]_{\sim}) \\
&= s_{[0, 2\pi)}([\pi]_{\sim_{\text{angle}}}) & (\because \text{pr}_2 \text{ の定義の } r = -t > 0 \text{ の場合}) \\
&= \pi & (\because \pi \in [0, 2\pi) \text{ なので } s_{[0, 2\pi)} \text{ はそのまま } \pi \text{ を返す}) \\
t = 0 : \quad \arg^{[0, 2\pi)}(t) &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(t, 0))) & (\because \arg^{[0, 2\pi)} \text{ の定義}) \\
&= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(0, 0)]_{\sim})) & (\because \text{上の } t = 0 \text{ の場合の } \phi_{\text{polar}}(t, 0) = [(0, 0)]_{\sim}) \\
&= s_{[0, 2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}}) & (\because \text{pr}_2 \text{ の定義は } r = 0 \text{ のとき } [0]_{\sim_{\text{angle}}} \text{ を返す}) \\
&= 0 & (\because 0 \in [0, 2\pi) \text{ なので } s_{[0, 2\pi)} \text{ はそのまま } 0 \text{ を返す})
\end{aligned}$$

($\arg^{[0, 2\pi)}$ と $s_{[0, 2\pi)}$ は 定義 1.40、 pr_2 は 定義 1.39。 $t = 0$ の場合が示すとおり、本リポジトリの規約では $\arg^{[0, 2\pi)}(0_{\mathbb{C}}) = 0$ である。) まとめると $\arg^{[0, 2\pi)}(t) = 0 \iff t \geq 0$ 、 $\arg^{[0, 2\pi)}(t) = \pi \iff t < 0$ 。

Step 4: 結論。 Step 2 と Step 3 を合わせると、 $\cos \theta_{\mu} \leq c_1 c_2^* / (s_1 s_2^*)$ のとき $\gamma_1(\theta_{\mu}) \geq 0$ ゆえ $\arg^{[0, 2\pi)}(\gamma_1(\theta_{\mu})) = 0$ 、それ以外るとき $\gamma_1(\theta_{\mu}) < 0$ ゆえ $\arg^{[0, 2\pi)}(\gamma_1(\theta_{\mu})) = \pi$ 。これで主張の場合分けが示された (境界 $\cos \theta_{\mu} = c_1 c_2^* / (s_1 s_2^*)$ では $\gamma_1(\theta_{\mu}) = 0$ となるが、上の規約により $\arg^{[0, 2\pi)}(0_{\mathbb{C}}) = 0$ なので、境界を $\arg = 0$ 側に含める原文の場合分けは正しい)。

Step 5: 第 2 の場合が空であること。主張 1.4 (1)(3) より $2K_1 > 0$ に対して $c_1 = \cosh 2K_1 > \sinh 2K_1 = s_1 > 0$ 、同様に $2K_2^* > 0$ に対して $c_2^* > s_2^* > 0$ 。正数どうしの不等式の積より

$$\begin{aligned}
c_1 c_2^* &> s_1 s_2^* & (\because c_1 > s_1 \text{ の両辺に正数 } c_2^* \text{ を掛けた}) \\
s_1 c_2^* &> s_1 s_2^* & (\because c_2^* > s_2^* \text{ の両辺に正数 } s_1 \text{ を掛けた}) \\
s_1 s_2^* &> 0 & (\because s_1 > 0 \text{ かつ } s_2^* > 0)
\end{aligned}$$

よって $s_1 s_2^* > 0$ で割って $\frac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*} > 1$ 。一方 $\theta_{\mu} \in \mathbb{R}$ より $\cos \theta_{\mu} \leq 1 < \frac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*}$ であるから、Step 2 より常に $\gamma_1(\theta_{\mu}) > 0$ であり、第 2 の場合 (otherwise) を満たす $\mu \in \mathcal{M}$ は存在しない。 $\square$

主張 9.26 ($\gamma_2(\theta_{\mu}) = 0$ になる条件). 定義 5.8 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ (したがって $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$) とし、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $\mathcal{M} := \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ 、 $\theta_{\mu} := \frac{2\pi\mu}{M} \in \mathbb{R}$ とする。この前提から $c_1, s_1, c_2, s_2^* > 0$ 、特に $s_2^* \neq 0$ が従う (証明の Step 0。 $s_2^* \neq 0$ は以下の同値のすべてに不可欠である)。 $\mu \in \mathcal{M}$ について、 $\gamma_2(\theta) := ie^{i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2)$ (定義 9.20 の (1, 2) 成分) は次を満たす。

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta_\mu) = 0 &\iff \begin{cases} \sin \theta_\mu = 0 \\ c_2 s_1 - c_1 \cos \theta_\mu = 0 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \theta_\mu = 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \dots \\ c_2 s_1 = c_1 \cos \theta_\mu \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \mu = \pm M \\ c_2 s_1 = c_1 \cos \theta_\mu \end{cases} \iff \begin{cases} \mu = \pm M \\ c_1 = s_1 c_2 \end{cases}
\end{aligned}$$

上の同値はいずれも「連立条件全体としての同値」である。特に第 2 段から第 3 段への同値において、 $\sin \theta_\mu = 0$ という条件だけでは $\mu = \pm M$ は従わない。実際 M が偶数のときは $\mu = \pm M/2 \in \mathcal{M}$ も $\theta_\mu = \pm\pi$ 、 $\sin \theta_\mu = 0$ を満たす。この μ が排除されるのは、もう一方の条件 $c_2 s_1 = c_1 \cos \theta_\mu = -c_1 < 0$ が $c_1, s_1, c_2 > 0$ と矛盾するからである（証明の Step 4 を参照）。

証明. Step 0: 記号と所属集合の確認。定義 5.8 より $c_1 = \cosh 2K_1, s_1 = \sinh 2K_1, c_2 = \cosh 2K_2, s_2^* = \sinh 2K_2^*$ はいずれも実数であり、 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ である。ここで $K_2^* > 0$ を確認しておく：定義 5.8 の $K_2^* := -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2)$ において、

$$\begin{aligned}
0 &< \tanh K_2 & (\because K_2 > 0 \text{ における } \tanh \text{ の正值性}) \\
\tanh K_2 &< 1 & (\because K_2 > 0 \text{ における } \tanh \text{ の上界}) \\
\log(\tanh K_2) &< 0 & (\because 0 < \tanh K_2 < 1 \text{ における実対数の符号}) \\
K_2^* = -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2) &> 0 & (\because \text{負数に負数 } -\frac{1}{2} \text{ を掛けた})
\end{aligned}$$

したがって $K_1, K_2, K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、 $x > 0$ で $\cosh x > 0$ 、 $\sinh x > 0$ であることから

$$c_1 = \cosh 2K_1 > 0, \quad s_1 = \sinh 2K_1 > 0, \quad c_2 = \cosh 2K_2 > 0, \quad s_2^* = \sinh 2K_2^* > 0$$

特に $s_2^* \neq 0$ である。この $s_2^* \neq 0$ は Step 1 ($\gamma_2(\theta_\mu)$ の第 1 因子が 0 でないこと) に不可欠であり、これが無いと第 1 の同値そのものが成り立たない ($s_2^* = 0$ ならすべての μ について $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ になってしまう)。また $\mu \in \mathcal{M} \subset \mathbb{Z}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ より $\theta_\mu = 2\pi\mu/M \in \mathbb{R}$ であり、 $\cos \theta_\mu, \sin \theta_\mu \in \mathbb{R}$ 。

Step 1: 因子 $i e^{i\theta_\mu} s_2^*$ が $\mathbb{C}^\times$ に属すること。準備として 3 つの因子の絶対値を確かめる。定理 1.54 より $e^{i\theta_\mu} = \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu$ であるから、

$$\begin{aligned}
\left| e^{i\theta_\mu} \right|^2 &= (\cos \theta_\mu)^2 + (\sin \theta_\mu)^2 & (\because \text{絶対値の基本性質 (2)}) \\
&= 1 & (\because \cos^2 t + \sin^2 t = 1)
\end{aligned}$$

すなわち $|e^{i\theta_\mu}| = 1$ (絶対値は非負なので平方が 1 なら値も 1)。同様に $|i| = 1$ であり、 $s_2^* > 0$ より $|s_2^*| = s_2^*$ (主張 1.41 (6))。この準備のもとで、

$$\begin{aligned}
\left| i e^{i\theta_\mu} s_2^* \right| &= |i| \left| e^{i\theta_\mu} \right| |s_2^*| & (\because \text{絶対値の乗法性。絶対値の基本性質 (4)}) \\
&= 1 \cdot \left| e^{i\theta_\mu} \right| |s_2^*| & (\because |i| = 1) \\
&= 1 \cdot 1 \cdot |s_2^*| & (\because \left| e^{i\theta_\mu} \right| = 1) \\
&= 1 \cdot 1 \cdot s_2^* & (\because |s_2^*| = s_2^*) \\
&= s_2^* & (\because 1 \text{ との積}) \\
&> 0 & (\because \text{Step 0 の } s_2^* > 0)
\end{aligned}$$

であり、主張 1.41 (3) より $i e^{i\theta_\mu} s_2^* \neq 0_{\mathbb{C}}$ 。

Step 2: 第 1 の同値。 $w_\mu := c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2 \in \mathbb{C}$ とおくと $\gamma_2(\theta_\mu) = (i e^{i\theta_\mu} s_2^*) w_\mu$ 。 $\mathbb{C}$ は体 (主張 1.35) ゆえ整域であり、Step 1 より第 1 因子は $0_{\mathbb{C}}$ でないから

$$\begin{aligned} \gamma_2(\theta_\mu) = 0_{\mathbb{C}} &\iff (i e^{i\theta_\mu} s_2^*) w_\mu = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \gamma_2(\theta_\mu) = (i e^{i\theta_\mu} s_2^*) w_\mu) \\ &\iff w_\mu = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{C} \text{ は整域であり、Step 1 より第 1 因子は零元でない}) \end{aligned}$$

ここで $c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2 \in \mathbb{R}$ 、 $-\sin \theta_\mu \in \mathbb{R}$ であるから、定義 1.11 の成分表示で

$$w_\mu = (c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2, -\sin \theta_\mu) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C} \quad (\because \text{複素数の成分表示の定義})$$

であり、 $\mathbb{C}$ の零元は $(0, 0)$ であるから

$$\begin{aligned} w_\mu = 0_{\mathbb{C}} &\iff (c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2, -\sin \theta_\mu) = (0, 0) \quad (\because w_\mu \text{ の成分表示と } 0_{\mathbb{C}} = (0, 0)) \\ &\iff \begin{cases} c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2 = 0 \\ -\sin \theta_\mu = 0 \end{cases} \quad (\because \text{順序対の相等は各成分の相等と同値}) \\ &\iff \begin{cases} \sin \theta_\mu = 0 \\ c_2 s_1 - c_1 \cos \theta_\mu = 0 \end{cases} \quad (\because \text{各式を } -1 \text{ 倍し、実数の積を交換した}) \end{aligned}$$

これで第 1 の同値を得た。

Step 3: 第 2 の同値。第 2 式 $c_2 s_1 - c_1 \cos \theta_\mu = 0$ と $c_2 s_1 = c_1 \cos \theta_\mu$ は同じ式である。第 1 式については、実数 $t \in \mathbb{R}$ に対する $\sin$ の零点の特徴づけ $\sin t = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z} : t = k\pi$ を用いると

$$\sin \theta_\mu = 0 \iff \theta_\mu \in \pi\mathbb{Z} = \{0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots\}$$

となり、第 2 の同値を得る。

Step 3': 第 1 式だけを μ の言葉に翻訳しておく (第 3 の同値を正しく述べるために必要)。
 $\theta_\mu = 2\pi\mu/M$ であるから、 $k \in \mathbb{Z}$ を用いて

$$\begin{aligned} \theta_\mu \in \pi\mathbb{Z} &\iff \exists k \in \mathbb{Z} : \frac{2\pi\mu}{M} = k\pi \quad (\because \theta_\mu = 2\pi\mu/M \text{ を代入し、}\pi\mathbb{Z} \text{ の元であることを } k \text{ の存在で書いた}) \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z} : 2\mu = kM \quad (\because \text{両辺に } M/\pi \text{ を掛けた。}\pi \neq 0 \text{ かつ } M \geq 1 \text{ なので同値}) \\ &\iff M \mid 2\mu \quad (\because \text{整除 } M \mid 2\mu \text{ の定義そのもの}) \end{aligned}$$

ここで $M \mid 2\mu$ を M の偶奇で言い換える。 M が奇数の場合。

$$M \mid 2\mu \iff M \mid \mu \quad (\because \gcd(M, 2) = 1 \text{ なので } M \text{ が } 2\mu \text{ を割れば } \mu \text{ を割る。逆は倍を取るだけ})$$

M が偶数の場合。 $M = 2M'$ とおくと

$$\begin{aligned} M \mid 2\mu &\iff 2M' \mid 2\mu \quad (\because M = 2M' \text{ を代入した}) \\ &\iff M' \mid \mu \quad (\because \text{両辺の商の等式を } 2 \text{ で約した。} 2 \neq 0 \text{ なので同値}) \end{aligned}$$

$M' = M/2$ だから、これは $\mu \equiv 0 \pmod{M}$ または $\mu \equiv M/2 \pmod{M}$ と同値である。まとめると

$$\sin \theta_\mu = 0 \iff \begin{cases} \mu \equiv 0 \pmod{M} & (M \text{ が奇数}) \\ \mu \equiv 0 \pmod{M} \text{ または } \mu \equiv M/2 \pmod{M} & (M \text{ が偶数}) \end{cases}$$

特に、 M が偶数のときは $\mu = \pm M/2 \in \mathcal{M}$ も第 1 式を満たすので、 $\sin \theta_\mu = 0 \iff \mu = \pm M$ は偽である。第 3 の同値が成り立つのは、あくまで第 2 式との連立の下だけである。

Step 4: 第 3 の同値。ここは連立条件の下ではじめて成立するので、両向きを分けて示す。

($\Rightarrow$) $\theta_\mu \in \pi\mathbb{Z}$ かつ $c_2 s_1 = c_1 \cos \theta_\mu$ とする。 $\theta_\mu = 2\pi\mu/M = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) は $2\mu = kM$ と同値であり、これは $M \mid 2\mu$ を意味する。 $\mu \in \mathcal{M}$ より、

$$\begin{aligned} 1 &\leq |\mu| & (\because \mu \in \mathcal{M}) \\ |\mu| &\leq M & (\because \mu \in \mathcal{M}) \\ 2 &\leq 2|\mu| & (\because 1 \leq |\mu| \text{ の両辺を正数 } 2 \text{ 倍した}) \\ 2|\mu| &\leq 2M & (\because |\mu| \leq M \text{ の両辺を正数 } 2 \text{ 倍した}) \\ M &\mid 2|\mu| & (\because M \mid 2\mu \text{ ならば } M \mid 2|\mu| = 2|\mu|) \end{aligned}$$

である。この範囲で M の倍数は M と $2M$ のみであるから、

$$\begin{aligned} 2|\mu| &\in \{M, 2M\} & (\because 2 \leq 2|\mu| \leq 2M \text{ かつ } M \mid 2|\mu|) \\ |\mu| &\in \{M/2, M\} & (\because \text{各候補を } 2 \text{ で割った}) \end{aligned}$$

したがって $|\mu| = M/2$ (このとき M は偶数) または $|\mu| = M$ である。

$|\mu| = M/2$ の場合は $\mu = \pm M/2$ なので、

$$\begin{aligned} \theta_\mu &= \frac{2\pi(\pm M/2)}{M} & (\because \theta_\mu = 2\pi\mu/M \text{ へ } \mu = \pm M/2 \text{ を代入した}) \\ &= \pm\pi & (\because M \geq 1 \text{ なので } M \neq 0 \text{ として約した}) \\ \cos \theta_\mu &= \cos(\pm\pi) & (\because \theta_\mu = \pm\pi) \\ &= -1 & (\because \cos(\pm\pi) = -1) \\ c_2 s_1 &= c_1 \cos \theta_\mu & (\because \text{第 2 式}) \\ &= -c_1 & (\because \cos \theta_\mu = -1) \end{aligned}$$

一方、Step 0 の正值性から

$$\begin{aligned} 0 &< c_2 s_1 & (\because c_2 > 0 \text{ かつ } s_1 > 0) \\ c_2 s_1 &= -c_1 & (\because \text{上の第 2 式の計算}) \\ -c_1 &< 0 & (\because c_1 > 0) \end{aligned}$$

となり矛盾する。よってこの場合は起こらず、 $|\mu| = M$ すなわち $\mu = \pm M$ である (第 2 式はそのまま保たれる)。

($\Leftarrow$) $\mu = \pm M$ とすると、

$$\begin{aligned} \theta_\mu &= \frac{2\pi(\pm M)}{M} & (\because \theta_\mu = 2\pi\mu/M \text{ へ } \mu = \pm M \text{ を代入した}) \\ &= \pm 2\pi & (\because M \geq 1 \text{ なので } M \neq 0 \text{ として約した}) \\ &\in \pi\mathbb{Z} & (\because \pm 2 \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

ゆえに第 1 式が成り立つ。第 2 式は連立条件の両側に同じ形で置かれているので、そのまま保たれる。

Step 5: 第 4 の同値。 $\mu = \pm M$ とする。第 2 式について

$$\begin{aligned} c_2 s_1 = c_1 \cos \theta_\mu &\iff c_2 s_1 = c_1 \cos(\pm 2\pi) & (\because \theta_\mu = 2\pi\mu/M \text{ に } \mu = \pm M \text{ を代入すると } \theta_\mu = \pm 2\pi) \\ &\iff c_2 s_1 = c_1 \cdot 1 & (\because \cos(\pm 2\pi) = 1) \\ &\iff c_2 s_1 = c_1 & (\because 1 \text{ は実数の積の単位元}) \\ &\iff c_1 = s_1 c_2 & (\because \text{相等の対称性と、実数の積の交換}) \end{aligned}$$

以上で主張のすべての同値が示された。

□

主張 9.27 ($\gamma_2(\theta_\mu)$ と $\gamma_2(-\theta_\mu)$ の関係). $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\gamma_2(-\theta_\mu) = -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)}$$

ゆえに、

$$\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2$$

証明.

$$\begin{aligned} \gamma_2(-\theta_\mu) &= i e^{-i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) & (\because \text{定義 9.20 の } \gamma_2 \text{ の定義と } \cos(-\theta) = \cos \theta, \sin(-\theta) = -\sin \theta) \\ &= -((-i) e^{-i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu - s_1 c_2)) & (\because -(-i) = i) \\ &= \overline{-i e^{i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2)} & (\because \text{複素共役は積を保ち、実数を固定し、} \bar{\bar{i}} = -i, \overline{e^{i\theta_\mu}} = e^{-i\theta_\mu}) \\ &= -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)} & (\because \text{定義 9.20 の } \gamma_2 \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) &= \gamma_2(\theta_\mu) \left(-\overline{\gamma_2(\theta_\mu)} \right) & (\because \gamma_2(-\theta_\mu) = -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)}) \\ &= -\left(\gamma_2(\theta_\mu) \overline{\gamma_2(\theta_\mu)} \right) & (\because \mathbb{C} \text{ の分配則}) \\ &= -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 & (\because |z|^2 = z\bar{z}) \end{aligned}$$

□

主張 9.28 ($\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)) = \pi$). $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)) = \pi$$

証明. $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\begin{aligned} \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) &= \left(i e^{i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) \right) \left(i e^{-i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos(-\theta_\mu) - i \sin(-\theta_\mu) - s_1 c_2) \right) & (\because \text{定義 9.20 の } \gamma_2 \text{ の定義}) \\ &= \left(i e^{i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) \right) \left(i e^{-i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) \right) & (\because \cos \text{ は偶関数、} \sin \text{ は奇関数}) \\ &= (i \cdot i) \left(e^{i\theta_\mu} e^{-i\theta_\mu} \right) (s_2^*)^2 (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) (c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) & (\because \mathbb{C} \text{ の積の可換性と結合則で因子を並べ替えた}) \\ &= (-1) \left(e^{i\theta_\mu + i(-\theta_\mu)} \right) (s_2^*)^2 (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) (c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) & (\because i \cdot i = -1 \text{ と指数法則}) \\ &= (-1) (e^0) (s_2^*)^2 (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) (c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) & (\because i\theta_\mu + i(-\theta_\mu) = 0) \\ &= -(s_2^*)^2 (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) (c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) & (\because e^0 = 1) \\ &= -(s_2^*)^2 \left((c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2)^2 + (\sin \theta_\mu)^2 \right) & (\because (a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2 \text{ を } a = c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2, b = \sin \theta_\mu \text{ へ当てた}) \\ &= -(s_2^*)^2 \left((c_1 \cos \frac{2\pi\mu}{M} - s_1 c_2)^2 + (\sin \frac{2\pi\mu}{M})^2 \right) & (\because \theta_\mu = \frac{2\pi\mu}{M}) \end{aligned}$$

ここで $s_2^* > 0$ (定義 5.8) より $(s_2^*)^2 > 0$ である。また

$$\begin{aligned} |\gamma_2(\theta_\mu)|^2 &= \left| i e^{i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) \right|^2 & (\because \text{定義 9.20 の } \gamma_2 \text{ の定義}) \\ &= (s_2^*)^2 \left((c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2)^2 + (\sin \theta_\mu)^2 \right) & (\because |i| = |e^{i\theta_\mu}| = 1 \text{ と、絶対値は積を保つこと}) \end{aligned}$$

である。この 2 つから

$$\begin{aligned} (c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2)^2 + (\sin \theta_\mu)^2 &= \frac{|\gamma_2(\theta_\mu)|^2}{(s_2^*)^2} & (\because \text{直前の等式の両辺を } (s_2^*)^2 > 0 \text{ で割った}) \\ &> 0 & (\because \gamma_2(\theta_\mu) \neq 0 \text{ より } |\gamma_2(\theta_\mu)|^2 > 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) &= -(s_2^*)^2 \left((c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2)^2 + (\sin \theta_\mu)^2 \right) & (\because \text{最初の式変形}) \\ &< 0 & (\because (s_2^*)^2 > 0 \text{ と直前の不等式の積は正であり、その } (-1) \text{ 倍は負}) \end{aligned}$$

すなわち $\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)$ は負の実数であり、負の実数の偏角は π であるから $\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)) = \pi$ 。
□

主張 9.29 ($\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)) + \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(-\theta_\mu))$). $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について (主張 9.27 より $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0 \iff \gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ であるから、 $\gamma_2(\theta_\mu), \gamma_2(-\theta_\mu)$ はともに非零であり、その偏角 $\arg^{[0,2\pi)}$ が定義される)、 $r_+, r_- \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 、 $\theta_+, \theta_- \in \mathbb{R}$ として $\gamma_2(\theta_\mu) = [(r_+, \theta_+)]$ 、 $\gamma_2(-\theta_\mu) = [(r_-, \theta_-)]$ とするとき、

$$\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)) + \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(-\theta_\mu)) = \begin{cases} \pi & (\exists m \in \mathbb{Z} : 0 \leq \theta_+ + \theta_- - 2m\pi < 2\pi) \\ \pi + 2\pi & (\exists m \in \mathbb{Z} : 2\pi \leq \theta_+ + \theta_- - 2m\pi < 4\pi) \end{cases}$$

証明. 主張 9.28 と 主張 1.44 より。 □

主張 9.30 ($\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)/\gamma_2(-\theta_\mu))$). $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について (主張 9.27 より $\gamma_2(-\theta_\mu) = -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)} \neq 0$ でもあるから、商 $\gamma_2(\theta_\mu)/\gamma_2(-\theta_\mu) \in \mathbb{C}^\times$ が定義される)、 $\varphi_\mu := \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)) \in [0, 2\pi)$ とおくと、

$$\left| \frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)} \right| = 1, \quad \arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\right) = s_{[0,2\pi)}([2\varphi_\mu + \pi]_{\sim_{\text{angle}}})$$

すなわち $2\varphi_\mu + \pi$ を $\text{mod } 2\pi$ で $[0, 2\pi)$ へ還元したものであり、具体的には

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\right) = \begin{cases} 2\varphi_\mu + \pi & (0 \leq \varphi_\mu < \frac{\pi}{2}) \\ 2\varphi_\mu - \pi & (\frac{\pi}{2} \leq \varphi_\mu < \frac{3\pi}{2}) \\ 2\varphi_\mu - 3\pi & (\frac{3\pi}{2} \leq \varphi_\mu < 2\pi) \end{cases}$$

証明. 以下 $z := \gamma_2(\theta_\mu) \in \mathbb{C}^\times$ 、 $r := |z| \in \mathbb{R}_{>0}$ (主張 1.41 (3) より $z \neq 0 \Rightarrow r > 0$)、 $\varphi_\mu := \arg^{[0,2\pi)}(z) \in [0, 2\pi)$ と略記する。

Step 0: ϕ_{polar} が $\phi_{\text{cartesian}}$ の逆写像であること。主張 1.38 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射であり、その証明中で $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$ が示されている。全単射に右逆写像が存在すればそれは逆写像に一致するから $\phi_{\text{polar}} = \phi_{\text{cartesian}}^{-1}$ したがって $\phi_{\text{cartesian}}([(\rho, \vartheta)]_{\sim}) = w$ を確かめれば $\phi_{\text{polar}}(w) = [(\rho, \vartheta)]_{\sim}$ が従う。また同 claim より $\phi_{\text{cartesian}}$ はモノイド準同型なので、その逆写像 ϕ_{polar} もモノイド準同型である： $\phi_{\text{polar}}(w_1 w_2) = \phi_{\text{polar}}(w_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(w_2)$ (右辺の積は定義 1.32)。

Step 1: $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \varphi_\mu)]_{\sim}$ 。実際 $\phi_{\text{polar}}(z) = [(\rho, \vartheta)]_{\sim}$ とおくと、定義 1.40 より $\text{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z)) = |z| = r > 0$ であり、 $\rho \neq 0$ ゆえ 定義 1.39 より $\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z)) = [\vartheta]_{\sim_{\text{angle}}}$ 。よって $\varphi_\mu = s_{[0,2\pi)}([\vartheta]_{\sim_{\text{angle}}}) = \vartheta - 2n\pi$ (定義 1.29 の $n \in \mathbb{Z}$) となり $[\vartheta]_{\sim_{\text{angle}}} = [\varphi_\mu]_{\sim_{\text{angle}}}$ 、定義 1.31 より $[(\rho, \vartheta)]_{\sim} = [(r, \varphi_\mu)]_{\sim}$ 。

Step 2: 商の書き換え。主張 9.27 より $\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 = -r^2$ であり、 $r > 0$ より $-r^2 \neq 0$ ゆえ $\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ 。 $\mathbb{C}$ は体 (主張 1.35) だから、分子・分母に $z \neq 0$ を掛けて

$$\begin{aligned} \frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)} &= \frac{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \quad (\because \text{分子と分母に同じ } \gamma_2(\theta_\mu) = z \neq 0 \text{ を掛けても商は変わらない}) \\ &= \frac{z^2}{-r^2} \quad (\because \text{分子は } z \text{ の定義、分母は上の積の等式 } \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) = -r^2) \\ &= z^2 \cdot \left(-\frac{1}{r^2}\right) \quad (\because -r^2 \neq 0 \text{ による商から積への書き換え}) \end{aligned}$$

Step 3: 各因子の極座標表現。Step 0 と Step 1 より

$$\begin{aligned} \phi_{\text{polar}}(z^2) &= \phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z) \quad (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の乗法性}) \\ &= [(r, \varphi_\mu)]_{\sim} \cdot [(r, \varphi_\mu)]_{\sim} \quad (\because \text{Step 1}) \\ &= [(r^2, 2\varphi_\mu)]_{\sim} \quad (\because \text{極座標表現の積の定義}) \end{aligned}$$

また $-\frac{1}{r^2} \in \mathbb{R}_{<0}$ については、定義 1.37 より

$$\begin{aligned}\phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\frac{1}{r^2}, \pi\right)\right]_{\sim}\right) &= \left(\frac{1}{r^2} \cos \pi, \frac{1}{r^2} \sin \pi\right) \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\ &= \left(-\frac{1}{r^2}, 0\right) \quad (\because \cos \pi = -1, \sin \pi = 0) \\ &= -\frac{1}{r^2} \quad (\because \mathbb{R} \text{ を } \mathbb{C} \text{ の実軸と同一視する})\end{aligned}$$

であるから、Step 0 より $\phi_{\text{polar}}\left(-\frac{1}{r^2}\right) = \left[\left(\frac{1}{r^2}, \pi\right)\right]_{\sim}$ 。

Step 4: 商の極座標表現。

$$\begin{aligned}\phi_{\text{polar}}\left(\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\right) &= \phi_{\text{polar}}\left(z^2 \cdot \left(-\frac{1}{r^2}\right)\right) \quad (\because \text{Step 2 の商から積への書き換え}) \\ &= \phi_{\text{polar}}(z^2) \cdot \phi_{\text{polar}}\left(-\frac{1}{r^2}\right) \quad (\because \text{Step 0 の } \phi_{\text{polar}} \text{ の乗法性}) \\ &= [(r^2, 2\varphi_\mu)]_{\sim} \cdot \left[\left(\frac{1}{r^2}, \pi\right)\right]_{\sim} \quad (\because \text{Step 3 の各因子の極座標表現}) \\ &= \left[\left(r^2 \cdot \frac{1}{r^2}, 2\varphi_\mu + \pi\right)\right]_{\sim} \quad (\because \text{極座標表現の積の定義}) \\ &= [(1, 2\varphi_\mu + \pi)]_{\sim} \quad (\because r^2 \cdot \frac{1}{r^2} = 1)\end{aligned}$$

よって、絶対値は

$$\begin{aligned}\left|\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\right| &= \text{pr}_1([(1, 2\varphi_\mu + \pi)]_{\sim}) \quad (\because \text{絶対値の定義}) \\ &= 1 \quad (\because \text{第 1 射影は代表の第 1 成分を返す})\end{aligned}$$

(定義 1.40、定義 1.39)。第 1 成分 $1 \neq 0$ なので pr_2 は $[2\varphi_\mu + \pi]_{\sim_{\text{angle}}}$ を返し、偏角は

$$\begin{aligned}\arg^{[0, 2\pi)}\left(\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\right) &= s_{[0, 2\pi)}(\text{pr}_2([(1, 2\varphi_\mu + \pi)]_{\sim})) \quad (\because \text{偏角の定義}) \\ &= s_{[0, 2\pi)}([2\varphi_\mu + \pi]_{\sim_{\text{angle}}}) \quad (\because \text{第 2 射影は第 1 成分が零でないとき角の類を返す})\end{aligned}$$

(定義 1.40、定義 1.39)。

Step 5: $\text{mod } 2\pi$ の還元。 $0 \leq \varphi_\mu < 2\pi$ より $\pi \leq 2\varphi_\mu + \pi < 5\pi$ である。定義 1.29 は $0 \leq (2\varphi_\mu + \pi) - 2n\pi < 2\pi$ なる唯一の $n \in \mathbb{Z}$ をとって $(2\varphi_\mu + \pi) - 2n\pi$ を返すから、

$$\begin{aligned}0 \leq \varphi_\mu < \frac{\pi}{2} &\Rightarrow \pi \leq 2\varphi_\mu + \pi < 2\pi \quad (\because \text{不等式の各辺を 2 倍して } \pi \text{ を足す}) \\ &\Rightarrow 0 \leq (2\varphi_\mu + \pi) - 2 \cdot 0 \cdot \pi < 2\pi \quad (\because \pi \geq 0) \\ &\Rightarrow n = 0 \quad (\because \text{条件を満たす } n \in \mathbb{Z} \text{ の一意性}) \\ &\Rightarrow \arg^{[0, 2\pi)} = 2\varphi_\mu + \pi \quad (\because \text{区間 } [0, 2\pi) \text{ への代表を返す写像の定義})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{2} \leq \varphi_\mu < \frac{3\pi}{2} &\Rightarrow 2\pi \leq 2\varphi_\mu + \pi < 4\pi \quad (\because \text{不等式の各辺を 2 倍して } \pi \text{ を足す}) \\ &\Rightarrow 0 \leq (2\varphi_\mu + \pi) - 2 \cdot 1 \cdot \pi < 2\pi \quad (\because \text{各辺から } 2\pi \text{ を引く}) \\ &\Rightarrow n = 1 \quad (\because \text{条件を満たす } n \in \mathbb{Z} \text{ の一意性}) \\ &\Rightarrow \arg^{[0, 2\pi)} = 2\varphi_\mu - \pi \quad (\because (2\varphi_\mu + \pi) - 2\pi = 2\varphi_\mu - \pi)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{3\pi}{2} \leq \varphi_\mu < 2\pi &\Rightarrow 4\pi \leq 2\varphi_\mu + \pi < 5\pi \quad (\because \text{不等式の各辺を 2 倍して } \pi \text{ を足す}) \\ &\Rightarrow 0 \leq (2\varphi_\mu + \pi) - 2 \cdot 2 \cdot \pi < \pi \quad (\because \text{各辺から } 4\pi \text{ を引く}) \\ &\Rightarrow 0 \leq (2\varphi_\mu + \pi) - 2 \cdot 2 \cdot \pi < 2\pi \quad (\because \pi < 2\pi) \\ &\Rightarrow n = 2 \quad (\because \text{条件を満たす } n \in \mathbb{Z} \text{ の一意性}) \\ &\Rightarrow \arg^{[0, 2\pi)} = 2\varphi_\mu - 3\pi \quad (\because (2\varphi_\mu + \pi) - 4\pi = 2\varphi_\mu - 3\pi)\end{aligned}$$

を得る。これで主張の場合分けが示された。

Step 6 (補足) : φ_μ 自身の書き下し。 $w_\mu := c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2 - i \sin \theta_\mu \in \mathbb{C}$ とおくと $\gamma_2(\theta_\mu) = i e^{i\theta_\mu} s_2^* w_\mu$ であり、 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ より $w_\mu \neq 0$ 。 定義 1.37 と Step 0 より

$$\phi_{\text{polar}}(i) = [(1, \frac{\pi}{2})]_{\sim}, \quad \phi_{\text{polar}}(e^{i\theta_\mu}) = [(1, \theta_\mu)]_{\sim}, \quad \phi_{\text{polar}}(s_2^*) = [(s_2^*, 0)]_{\sim}$$

この 3 つの等式は、定義 1.37 をそれぞれの類へ当てた次の 3 本の鎖で確かめられる (2 本目の鎖の Euler の公式は 定理 1.54)。

$$\begin{aligned} \phi_{\text{cartesian}}([(1, \frac{\pi}{2})]_{\sim}) &= (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\ &= (0, 1) \quad (\because \cos \frac{\pi}{2} = 0, \sin \frac{\pi}{2} = 1) \\ &= i \quad (\because \mathbb{R}^2 = \mathbb{C} \text{ の同一視で } (0, 1) \text{ は } i) \\ \phi_{\text{cartesian}}([(1, \theta_\mu)]_{\sim}) &= (\cos \theta_\mu, \sin \theta_\mu) \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\ &= e^{i\theta_\mu} \quad (\because \text{Euler の公式}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi_{\text{cartesian}}([(s_2^*, 0)]_{\sim}) &= (s_2^* \cos 0, s_2^* \sin 0) \quad (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\ &= (s_2^*, 0) \quad (\because \cos 0 = 1, \sin 0 = 0) \\ &= s_2^* \quad (\because \mathbb{R}^2 = \mathbb{C} \text{ の同一視。 } s_2^* > 0 \text{ なので実軸上の点}) \end{aligned}$$

$\psi_\mu := \arg^{[0, 2\pi)}(w_\mu)$ とおくと Step 1 と同様に $\phi_{\text{polar}}(w_\mu) = [|w_\mu|, \psi_\mu]_{\sim}$ であるから、準同型性より

$$\phi_{\text{polar}}(\gamma_2(\theta_\mu)) = [(s_2^* |w_\mu|, \frac{\pi}{2} + \theta_\mu + \psi_\mu)]_{\sim}, \quad \varphi_\mu = s_{[0, 2\pi)} \left([\theta_\mu + \frac{\pi}{2} + \psi_\mu]_{\sim_{\text{angle}}} \right)$$

ここで $w_\mu = (c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2, -\sin \theta_\mu) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ であり、 $|w_\mu| = \sqrt{(c_1 \cos \theta_\mu - s_1 c_2)^2 + (\sin \theta_\mu)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ 、 ψ_μ は 定義 1.36 の場合分け (arctan による) で定まる。 $\square$

主張 9.31 ($A(\theta_\mu)$ の固有値と固有ベクトル). $\mu \in \mathcal{M}$ について、 $A(\theta_\mu)$ の固有値は

$$\lambda_{\pm, \mu} := \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)}$$

対応する固有ベクトルは：

- 1) $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ のとき: 任意の $v \in \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$
- 2) $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ のとき: $c \in \mathbb{C}^\times$ として

$$v_{\pm, \mu} = c \begin{pmatrix} \pm i \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \\ \gamma_2(-\theta_\mu) \end{pmatrix}$$

証明. $A(\theta_\mu)$ の定義

$$A(\theta_\mu) := \begin{pmatrix} c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta_\mu & i e^{i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) \\ -i e^{-i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu - s_1 c_2) & c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta_\mu \end{pmatrix}$$

において $\gamma_1(\theta_\mu) := c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta_\mu$ 、 $\gamma_2(\theta_\mu) := i e^{i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2)$ とおくと、

$$A(\theta_\mu) = \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta_\mu) & \gamma_2(\theta_\mu) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu) \end{pmatrix}$$

とかける。ゆえに固有方程式は $\lambda \in \mathbb{C}$ として

$$|A(\theta_\mu) - \lambda I| = 0$$

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \begin{vmatrix} \gamma_1(\theta_\mu) - \lambda & \gamma_2(\theta_\mu) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu) - \lambda \end{vmatrix} & (\because A(\theta_\mu) \text{ の成分表示}) \\
&= (\gamma_1(\theta_\mu) - \lambda)(\gamma_1(\theta_\mu) - \lambda) - \gamma_2(\theta_\mu)(-\gamma_2(-\theta_\mu)) & (\because 2 \times 2 \text{ 行列の行列式の定義}) \\
&= (\gamma_1(\theta_\mu) - \lambda)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) & (\because \text{同じ元の積は 2 乗であり、負元を引くことは元を足すこと}) \\
&= \gamma_1(\theta_\mu)^2 - 2\lambda\gamma_1(\theta_\mu) + \lambda^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) & (\because \text{平方の展開と複素数の積の可換則})
\end{aligned}$$

より

$$\lambda^2 - 2\lambda\gamma_1(\theta_\mu) + \gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = 0$$

である。以下の鎖の第 4 の等号では、根号の中の 4 が正の実数で偏角が 0 であることから 主張 1.49 を用いる。

$$\begin{aligned}
\lambda &= \frac{2\gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{(-2\gamma_1(\theta_\mu))^2 - 4(\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu))}}{2} & (\because 2 \text{ 次方程式の解の公式。係数は } a=1, b=-2\gamma_1(\theta_\mu), c=\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)) \\
&= \frac{2\gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{4\gamma_1(\theta_\mu)^2 - 4(\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu))}}{2} & (\because (-2\gamma_1(\theta_\mu))^2 = 4\gamma_1(\theta_\mu)^2 \text{ (負元の 2 乗は 2 乗、積の 2 乗)}) \\
&= \frac{2\gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{4(\gamma_1(\theta_\mu)^2 - (\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)))}}{2} & (\because \text{分配則で 4 をくくる}) \\
&= \frac{2\gamma_1(\theta_\mu) \pm 2\sqrt{\gamma_1(\theta_\mu)^2 - (\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu))}}{2} & (\because \text{「sqrt」と積が可換になる条件」より } \sqrt{4z} = \sqrt{4}\sqrt{z} = 2\sqrt{z}) \\
&= \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{\gamma_1(\theta_\mu)^2 - (\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu))} & (\because \text{分子の各項と分母を 2 で約分}) \\
&= \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} & (\because \text{同じ元 } \gamma_1(\theta_\mu)^2 \text{ を引いて消す})
\end{aligned}$$

を得る。対応する固有ベクトルは $v := \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$ として $A(\theta_\mu)v = \lambda v$ すなわち $(A(\theta_\mu) - \lambda I)v = 0$ を解けばよい。 $\lambda = \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ を代入すると対角成分は $\gamma_1(\theta_\mu) - (\gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}) = \mp \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ となり、

$$\begin{pmatrix} \mp \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} & \gamma_2(\theta_\mu) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \mp \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \dots (*)$$

1) $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ のとき：

$\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ より $\gamma_2(-\theta_\mu) = 0$ (主張 9.27)、かつ $\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} = 0$ であるから (*) は

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

となり、 v は $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ の任意のベクトルをとる。この場合 $A(\theta_\mu) = I$ (2×2 単位行列) となる (証明は 主張 9.43 を参照)。

2) $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ のとき：

$\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \neq 0$ だから、(*) の第 1 行に $\gamma_2(-\theta_\mu)/(\mp \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)})$ を掛ける行基本変形を行うと、

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} \mp \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \cdot \frac{\gamma_2(-\theta_\mu)}{-\gamma_2(-\theta_\mu)} & \gamma_2(\theta_\mu) \cdot \frac{\gamma_2(-\theta_\mu)}{\mp \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}} \\ \gamma_2(-\theta_\mu) & \mp \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 & (\because \text{第 1 行を零でない複素数で定数倍する行基本変形}) \\
&\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \frac{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}{\mp \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \mp \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 & (\because \text{第 1 行の第 1 成分を約分し、第 2 成分の分子をまとめた}) \\
&\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\mp \sqrt{-1_{\mathbb{C}} \cdot \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \mp \sqrt{-1_{\mathbb{C}} \cdot \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 & (\because \sqrt{z}\sqrt{z} = z \text{ と } -z = (-1_{\mathbb{C}})z)
\end{aligned}$$

ここで $\arg^{[0,2\pi)}(-1_{\mathbb{C}}) + \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)) = 2\pi$ (負の実数 $\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)$ の偏角は π 、主張 9.28) であるから、主張 1.49 より $\sqrt{-1_{\mathbb{C}}} \cdot \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = -\sqrt{-1_{\mathbb{C}}} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ 。これを代入して符号 $\mp(\cdot) = \pm(\cdot)$ を整理すると、

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\mp(-\sqrt{-1_{\mathbb{C}}} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)})} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \mp(-\sqrt{-1_{\mathbb{C}}} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (\because \text{根号と積が可換になる条件を分母と第 2 行へ代入した})$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (\because \mp(-x) = \pm x \text{ として符号を整理した})$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (\because \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \neq 0 \text{ なので約分した})$$

さらに $\frac{1}{\pm x} = \pm \frac{1}{x}$ と、主張 1.52 および $0 < \arg^{[0,2\pi)}(-1_{\mathbb{C}}) = \pi < 2\pi$ による $\frac{1_{\mathbb{C}}}{\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}} = -\sqrt{\frac{1_{\mathbb{C}}}{-1_{\mathbb{C}}}} = -\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}$ を用いると、

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \pm \left(\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \cdot \frac{1_{\mathbb{C}}}{\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}} \right) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (\because 1/(\pm x) = \pm(1/x) \text{ として逆数を積へ書き直した})$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \mp \left(\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \cdot \sqrt{-1_{\mathbb{C}}} \right) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (\because \text{複素平方根の逆数の公式を代入し、符号を整理した})$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \mp i \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \pm i \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (\because \sqrt{-1_{\mathbb{C}}} = i \text{ と複素数の積の可換則})$$

第 1 行 $\gamma_2(-\theta_\mu) v_1 \mp i \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} v_2 = 0$ より、 $c \in \mathbb{C}^\times$ として

$$v = c \begin{pmatrix} \pm i \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ \gamma_2(-\theta_\mu) \end{pmatrix}$$

□

主張 9.32 ($A(\theta_\mu)$ の対角化(P_μ, D_μ)). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $\mu \in \mathcal{M}$ 、 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ のとき、主張 9.31 の任意定数を $c = \frac{1}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu)}$ と選んで、

$$P_\mu := \begin{pmatrix} \frac{+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu)} & \frac{-i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ \frac{1}{2\sqrt{M}} & \frac{1}{2\sqrt{M}} \end{pmatrix}, \quad D_\mu := \begin{pmatrix} \lambda_{+, \mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-, \mu} \end{pmatrix}$$

とおく。このとき $\det P_\mu \neq 0$ であり (したがって P_μ^{-1} が存在し)、

$$\det P_\mu = \frac{i \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2M \gamma_2(-\theta_\mu)} \neq 0_{\mathbb{C}}, \quad A(\theta_\mu) = P_\mu D_\mu P_\mu^{-1}$$

$\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ のとき $A(\theta_\mu) = I$ (単位行列)。

証明. Step 1: P_μ の各成分が定義される (分母が 0 でない) こと。仮定 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ と主張 9.27 の $\gamma_2(-\theta_\mu) = -\gamma_2(\theta_\mu)$ より $\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ (複素共役は 0 を 0 にしか写さない)。また $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ より $\sqrt{M} > 0$ 。よって $2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ であり、 P_μ の 4 成分はすべて定まる。

Step 2: P_μ の 2 つの列が主張 9.31 の固有ベクトルであること。主張 9.31 の固有ベクトルは任意定数 $c \in \mathbb{C}^\times$ を用いて $v_{\pm, \mu} = c(\pm i \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}, \gamma_2(-\theta_\mu))^T$ であった。Step 1 より

$c := \frac{1}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu)} \in \mathbb{C}^\times$ と選べて、このとき第 2 成分は $c\gamma_2(-\theta_\mu) = \frac{1}{2\sqrt{M}}$ となり、 $v_{+,\mu}, v_{-,\mu}$ はそれぞれ上に書いた P_μ の第 1 列・第 2 列に一致する。すなわち

$$A(\theta_\mu) v_{\pm,\mu} = \lambda_{\pm,\mu} v_{\pm,\mu} \implies A(\theta_\mu) P_\mu = P_\mu D_\mu$$

(右の等式は、行列の積を列ごとに見れば左辺の第 1 列が $A(\theta_\mu)v_{+,\mu} = \lambda_{+,\mu}v_{+,\mu}$ 、右辺の第 1 列が $v_{+,\mu}\lambda_{+,\mu}$ で一致すること、第 2 列も同様であることによる。)

Step 3: $\det P_\mu$ の計算。以下 $t := \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \in \mathbb{C}$ と略記する。 2×2 行列の行列式の定義より

$$\begin{aligned} \det P_\mu &= \frac{+it}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M}} - \frac{-it}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M}} \quad (\because 2 \times 2 \text{ 行列式の定義}) \\ &= \frac{it}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu) \cdot 2\sqrt{M}} - \frac{-it}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu) \cdot 2\sqrt{M}} \quad (\because \text{分数の積は、分子の積を分母の積で割ったもの}) \\ &= \frac{it}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu) \cdot 2\sqrt{M}} + \frac{it}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu) \cdot 2\sqrt{M}} \quad (\because \text{分子の負号を分数の外へ出し、負元を引くことは加えること}) \\ &= 2 \cdot \frac{it}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu) \cdot 2\sqrt{M}} \quad (\because \text{同じ項を 2 つ加えることは 2 倍すること}) \\ &= 2 \cdot \frac{it}{4M\gamma_2(-\theta_\mu)} \quad (\because \text{積の可換性と } (2\sqrt{M}) \cdot (2\sqrt{M}) = 4M (\sqrt{M} \text{ の 2 乗は } M) \text{)}) \\ &= \frac{it}{2M\gamma_2(-\theta_\mu)} \quad (\because \text{分子と分母を 2 で約分}) \end{aligned}$$

Step 4: $\det P_\mu \neq 0$ 。主張 9.27 より $\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2$ であり、仮定 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ より $|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 > 0$ であるから $t^2 = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 \neq 0_{\mathbb{C}}$ 、ゆえに $t \neq 0_{\mathbb{C}}$ 。さらに $i \neq 0$ 、 $2M \neq 0$ ($M \geq 1$)、Step 1 より $\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ 。 $\mathbb{C}$ は体 (主張 1.35) ゆえ零因子を持たないから

$$\det P_\mu = \frac{it}{2M\gamma_2(-\theta_\mu)} \neq 0_{\mathbb{C}}$$

Step 5: 対角化。 $\det P_\mu \neq 0$ より P_μ は可逆であり P_μ^{-1} が存在する。Step 2 の $A(\theta_\mu)P_\mu = P_\mu D_\mu$ の両辺に右から P_μ^{-1} を掛けて

$$A(\theta_\mu) = P_\mu D_\mu P_\mu^{-1}$$

Step 6: $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ の場合。この場合は P_μ が定義されない (Step 1 の分母が 0 になる) が、主張 9.43 より $A(\theta_\mu) = I$ であって対角化は不要である。□

主張 9.33 ($a(\theta_\mu)$). $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ のとき、

$$\alpha_1 := \tanh K_1 \tanh K_2^*, \quad \alpha_2 := (\tanh K_1)^{-1} \tanh K_2^*$$

$$a(\theta_\mu) := \sqrt{\frac{(1 - \alpha_1 e^{i\theta_\mu})(1 - \alpha_2^{-1} e^{i\theta_\mu})}{(1 - \alpha_1 e^{-i\theta_\mu})(1 - \alpha_2^{-1} e^{-i\theta_\mu})}}$$

と定めるとき、

$$a(\theta_\mu) = \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} = \begin{cases} \frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & (0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(-\theta_\mu)) \leq \frac{\pi}{2} \text{ or } \frac{3\pi}{2} < \dots < 2\pi) \\ -\frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & (\frac{\pi}{2} < \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(-\theta_\mu)) \leq \frac{3\pi}{2}) \end{cases}$$

証明. $\mu \in \mathcal{M}$ について、以下 $\varphi := \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(-\theta_\mu))$ と略記する。

Part A: $\frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\gamma_2(-\theta_\mu)}$ と $\sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}}$ の関係。

Step 1: 主張 1.45 より、

$$\arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) = \begin{cases} 2\varphi & (0 \leq \varphi < \pi) \\ 2\varphi - 2\pi & (\pi \leq \varphi < 2\pi) \end{cases}$$

特に、

$$\arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) = 0 \iff \varphi \in \{0, \pi\}$$

Step 2: 主張 9.28 より、

$$\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)) = \pi$$

Step 3: 主張 1.46 より、

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}\right) = \begin{cases} 0 & (\arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) = 0) \\ 2\pi - \arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) & (0 < \arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) < 2\pi) \end{cases}$$

Step 1 の結果を代入すると、

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}\right) = \begin{cases} 0 & (\varphi = 0) \\ 2\pi - 2\varphi & (0 < \varphi < \pi) \\ 0 & (\varphi = \pi) \\ 4\pi - 2\varphi & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases}$$

Step 4: 偏角の和は

$$\begin{aligned} & \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)) + \arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}\right) \\ &= \pi + \begin{cases} 0 & (\varphi = 0) \\ 2\pi - 2\varphi & (0 < \varphi < \pi) \\ 0 & (\varphi = \pi) \\ 4\pi - 2\varphi & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases} \quad (\because \text{Step 2 と Step 3}) \\ &= \begin{cases} \pi & (\varphi = 0) \\ 3\pi - 2\varphi & (0 < \varphi < \pi) \\ \pi & (\varphi = \pi) \\ 5\pi - 2\varphi & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases} \quad (\because \text{各場合で } \pi \text{ を足す}) \end{aligned}$$

Step 5: 和（以下 sum と書く）が $[0, 2\pi)$ と $[2\pi, 4\pi)$ のどちらに入るかを判定する。

$\varphi = 0 \Rightarrow \text{sum} = \pi \in [0, 2\pi)$	($\because$ Step 4 の第 1 の場合と $0 \leq \pi < 2\pi$)
$0 < \varphi < \frac{\pi}{2} \Rightarrow 2\pi < 3\pi - 2\varphi < 3\pi \Rightarrow \text{sum} \in [2\pi, 4\pi)$	($\because$ Step 4 の第 2 の場合。各辺を -2 倍して 3π を足すと不等号の向きが反転し、 $(2\pi, 3\pi) \subset [2\pi, 4\pi)$)
$\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{sum} = 2\pi \in [2\pi, 4\pi)$	($\because$ Step 4 の第 2 の場合へ $\varphi = \frac{\pi}{2}$ を代入すると $3\pi - \pi = 2\pi$)
$\frac{\pi}{2} < \varphi < \pi \Rightarrow \pi < 3\pi - 2\varphi < 2\pi \Rightarrow \text{sum} \in [0, 2\pi)$	($\because$ Step 4 の第 2 の場合。各辺を -2 倍して 3π を足すと不等号の向きが反転し、 $(\pi, 2\pi) \subset [0, 2\pi)$)
$\varphi = \pi \Rightarrow \text{sum} = \pi \in [0, 2\pi)$	($\because$ Step 4 の第 3 の場合と $0 \leq \pi < 2\pi$)
$\pi < \varphi < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow 2\pi < 5\pi - 2\varphi < 3\pi \Rightarrow \text{sum} \in [2\pi, 4\pi)$	($\because$ Step 4 の第 4 の場合。各辺を -2 倍して 5π を足すと不等号の向きが反転し、 $(2\pi, 3\pi) \subset [2\pi, 4\pi)$)
$\varphi = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \text{sum} = 2\pi \in [2\pi, 4\pi)$	($\because$ Step 4 の第 4 の場合へ $\varphi = \frac{3\pi}{2}$ を代入すると $5\pi - 3\pi = 2\pi$)
$\frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi \Rightarrow \pi < 5\pi - 2\varphi < 2\pi \Rightarrow \text{sum} \in [0, 2\pi)$	($\because$ Step 4 の第 4 の場合。各辺を -2 倍して 5π を足すと不等号の向きが反転し、 $(\pi, 2\pi) \subset [0, 2\pi)$)

以上をまとめると、

$$\begin{cases} 0 \leq \text{sum} < 2\pi & (\varphi = 0 \text{ or } \frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi \text{ or } \frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \\ 2\pi \leq \text{sum} < 4\pi & (0 < \varphi \leq \frac{\pi}{2} \text{ or } \pi < \varphi \leq \frac{3\pi}{2}) \end{cases}$$

Step 6: 主張 1.49 より、

$$\begin{aligned} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} &= \begin{cases} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \cdot \frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} & (0 \leq \text{sum} < 2\pi) \\ -\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \cdot \frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} & (2\pi \leq \text{sum} < 4\pi) \end{cases} & (\because \text{根号と積の交換条件}) \\ &= \begin{cases} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \cdot \frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} & (\varphi = 0 \text{ or } \frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi \text{ or } \frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \\ -\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \cdot \frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} & (0 < \varphi \leq \frac{\pi}{2} \text{ or } \pi < \varphi \leq \frac{3\pi}{2}) \end{cases} & (\because \text{Step 5 の 2 つの場合の記述}) \\ &= \begin{cases} \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} & (\varphi = 0 \text{ or } \frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi \text{ or } \frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \\ -\sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} & (0 < \varphi \leq \frac{\pi}{2} \text{ or } \pi < \varphi \leq \frac{3\pi}{2}) \end{cases} & (\because \gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0 \text{ なので、分子と分母の共通因子 } \gamma_2(-\theta_\mu) \text{ を各場合で約分}) \end{aligned}$$

Step 7: 主張 1.51 より $\sqrt{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2} = \begin{cases} \gamma_2(-\theta_\mu) & (0 \leq \varphi < \pi) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & (\pi \leq \varphi < 2\pi) \end{cases}$ 、また 主張 1.52 より

$$\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} & (\arg^{[0,2\pi]}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) = 0) \\ -\frac{1}{\sqrt{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} & (0 < \arg^{[0,2\pi]}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) < 2\pi) \end{cases}$$

Step 1 の結果と合わせて場合分けすると、

$$\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} = \begin{cases} \frac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & (\varphi = 0) \\ -\frac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & (0 < \varphi < \pi) \\ -\frac{1}{-\gamma_2(-\theta_\mu)} & (\varphi = \pi) \\ -\left(-\frac{1}{-\gamma_2(-\theta_\mu)}\right) & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & (\varphi = 0 \text{ or } \pi < \varphi < 2\pi) \\ -\frac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & (0 < \varphi \leq \pi) \end{cases}$$

Step 8: Step 6 と Step 7 を組み合わせる。準備として、Step 7 の等式の両辺へ $\gamma_2(-\theta_\mu)$ を掛けた等式を作る。

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} \gamma_2(-\theta_\mu) &= \begin{cases} \frac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)} \gamma_2(-\theta_\mu) & (\varphi = 0 \text{ or } \pi < \varphi < 2\pi) \\ -\frac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)} \gamma_2(-\theta_\mu) & (0 < \varphi \leq \pi) \end{cases} & (\because \text{Step 7 の 2 つの場合の記述}) \\ &= \begin{cases} 1 & (\varphi = 0 \text{ or } \pi < \varphi < 2\pi) \\ -1 & (0 < \varphi \leq \pi) \end{cases} & (\because \gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0 \text{ と逆数との積}) \end{aligned}$$

準備の等式の左辺は各場合で ± 1 であり零でない。そこで、

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\gamma_2(-\theta_\mu)} &= \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} \left(\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} \gamma_2(-\theta_\mu) \right)^{-1} && (\because \sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} \neq 0 \text{ と } \mathbb{C} \text{ の積の可換性から } \sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} (\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} \gamma_2(-\theta_\mu))^{-1} = \frac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)}) \\
&= \begin{cases} \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} & (\varphi = 0 \text{ or } \frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi \text{ or } \frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \\ -\sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} & (0 < \varphi \leq \frac{\pi}{2} \text{ or } \pi < \varphi \leq \frac{3\pi}{2}) \end{cases} \cdot \left(\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} \gamma_2(-\theta_\mu) \right)^{-1} && (\because \text{Step 6}) \\
&= \begin{cases} \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot 1^{-1} & (\varphi = 0) \\ -\sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot (-1)^{-1} & (0 < \varphi \leq \frac{\pi}{2}) \\ \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot (-1)^{-1} & (\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi) \\ -\sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot 1^{-1} & (\pi < \varphi \leq \frac{3\pi}{2}) \\ \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot 1^{-1} & (\frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \end{cases} && (\because \text{準備の等式。2つの場合分けを } \varphi \text{ の区間の共通細分 (5 区間) で重ねた}) \\
&= \begin{cases} \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot 1 & (\varphi = 0) \\ -\sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot (-1) & (0 < \varphi \leq \frac{\pi}{2}) \\ \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot (-1) & (\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi) \\ -\sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot 1 & (\pi < \varphi \leq \frac{3\pi}{2}) \\ \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot 1 & (\frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \end{cases} && (\because 1^{-1} = 1 \text{ と } (-1)^{-1} = -1) \\
&= \begin{cases} \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} & (0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \text{ or } \frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \\ -\sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} & (\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \frac{3\pi}{2}) \end{cases} && (\because \text{各場合の符号の積の計算と、同符号の区間の合併})
\end{aligned}$$

Part B: $\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}$ の α_1, α_2 表式への変換。以下では $\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}$ が $a(\theta_\mu)$ の定義式の $\sqrt{\quad}$ の中身に等しいことを示す。

Steps 9–11: γ_2 の定義を代入し、偶奇性を使って共通因子を約分する。

$$\begin{aligned}
\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)} &= \frac{i e^{i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2)}{i e^{-i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos(-\theta_\mu) - i \sin(-\theta_\mu) - s_1 c_2)} && (\because \gamma_2 \text{ の定義を分子と分母へ代入}) \\
&= \frac{i e^{i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2)}{i e^{-i\theta_\mu} s_2^* (c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu - s_1 c_2)} && (\because \cos(-\theta_\mu) = \cos \theta_\mu \text{ かつ } \sin(-\theta_\mu) = -\sin \theta_\mu) \\
&= \frac{e^{i\theta_\mu} (c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu - s_1 c_2)}{e^{-i\theta_\mu} (c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu - s_1 c_2)} && (\because i s_2^* \neq 0 \text{ なので分子と分母の共通因子を約分})
\end{aligned}$$

Step 12: 定理 1.54 より $\cos \theta_\mu = \frac{e^{i\theta_\mu} + e^{-i\theta_\mu}}{2}$ 、 $\sin \theta_\mu = \frac{e^{i\theta_\mu} - e^{-i\theta_\mu}}{2i}$ を用いると、

$$\begin{aligned}
c_1 \cos \theta_\mu - i \sin \theta_\mu &= c_1 \frac{e^{i\theta_\mu} + e^{-i\theta_\mu}}{2} - i \cdot \frac{e^{i\theta_\mu} - e^{-i\theta_\mu}}{2i} && (\because \text{「cos, sin の Euler 表示」の } \cos \theta_\mu \text{ と } \sin \theta_\mu \text{ の表式を代入}) \\
&= c_1 \frac{e^{i\theta_\mu} + e^{-i\theta_\mu}}{2} - \frac{e^{i\theta_\mu} - e^{-i\theta_\mu}}{2} && (\because i \cdot \frac{1}{2i} = \frac{1}{2}。共通因子 } i \neq 0 \text{ の約分}) \\
&= \frac{(c_1 - 1)e^{i\theta_\mu} + (c_1 + 1)e^{-i\theta_\mu}}{2} && (\because \text{分配則で } e^{i\theta_\mu}, e^{-i\theta_\mu} \text{ の係数をまとめる})
\end{aligned}$$

もう 1 本も同じ 3 段で計算する。

$$\begin{aligned}
c_1 \cos \theta_\mu + i \sin \theta_\mu &= c_1 \frac{e^{i\theta_\mu} + e^{-i\theta_\mu}}{2} + i \cdot \frac{e^{i\theta_\mu} - e^{-i\theta_\mu}}{2i} && (\because \text{「cos, sin の Euler 表示」の } \cos \theta_\mu \text{ と } \sin \theta_\mu \text{ の表式を代入}) \\
&= c_1 \frac{e^{i\theta_\mu} + e^{-i\theta_\mu}}{2} + \frac{e^{i\theta_\mu} - e^{-i\theta_\mu}}{2} && (\because i \cdot \frac{1}{2i} = \frac{1}{2}。共通因子 } i \neq 0 \text{ の約分}) \\
&= \frac{(c_1 + 1)e^{i\theta_\mu} + (c_1 - 1)e^{-i\theta_\mu}}{2} && (\because \text{分配則で } e^{i\theta_\mu}, e^{-i\theta_\mu} \text{ の係数をまとめる})
\end{aligned}$$

Step 13: 分子分母へ代入し整理すると、

$$\begin{aligned}
\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)} &= \frac{e^{i\theta_\mu} \left(\frac{(c_1-1)e^{i\theta_\mu} + (c_1+1)e^{-i\theta_\mu}}{2} - s_1 c_2 \right)}{e^{-i\theta_\mu} \left(\frac{(c_1+1)e^{i\theta_\mu} + (c_1-1)e^{-i\theta_\mu}}{2} - s_1 c_2 \right)} \quad (\because \text{Steps 9-11 の比へ Step 12 の 2 つの計算結果を代入}) \\
&= \frac{e^{i\theta_\mu} ((c_1-1)e^{i\theta_\mu} + (c_1+1)e^{-i\theta_\mu} - 2s_1 c_2)}{e^{-i\theta_\mu} ((c_1+1)e^{i\theta_\mu} + (c_1-1)e^{-i\theta_\mu} - 2s_1 c_2)} \quad (\because \text{分子と分母の括弧内を共通分母2へ通分し、共通因子}\frac{1}{2}\text{を約分}) \\
&= \frac{(c_1-1)e^{2i\theta_\mu} + (c_1+1) - 2s_1 c_2 e^{i\theta_\mu}}{(c_1+1) + (c_1-1)e^{-2i\theta_\mu} - 2s_1 c_2 e^{-i\theta_\mu}} \quad (\because \text{分配則と } e^{i\theta_\mu} e^{-i\theta_\mu} = e^{-i\theta_\mu} e^{i\theta_\mu} = 1)
\end{aligned}$$

Step 14: $x := e^{i\theta_\mu}$ とおく ($x e^{-i\theta_\mu} = e^{i\theta_\mu} e^{-i\theta_\mu} = 1$ より $x \neq 0$ であり、 $x^{-1} = e^{-i\theta_\mu}$)。Step 13 の分子を書き直す。

$$\begin{aligned}
(c_1-1)e^{2i\theta_\mu} + (c_1+1) - 2s_1 c_2 e^{i\theta_\mu} &= (c_1-1)x^2 - 2s_1 c_2 x + (c_1+1) \quad (\because x \text{ の定義と指数法則 } e^{2i\theta_\mu} = (e^{i\theta_\mu})^2. \text{ 項を } x \text{ の降幕に並べ替え}) \\
&= (c_1+1) \left(\frac{c_1-1}{c_1+1} x^2 - \frac{2s_1 c_2}{c_1+1} x + 1 \right) \quad (\because c_1 > 0 \text{ より } c_1+1 \neq 0. \text{ 各項を } (c_1+1) \cdot \frac{\text{係数}}{c_1+1} \text{ と書き、分配則でくくる})
\end{aligned}$$

分母も同じ 2 段で書き直す。

$$\begin{aligned}
(c_1+1) + (c_1-1)e^{-2i\theta_\mu} - 2s_1 c_2 e^{-i\theta_\mu} &= (c_1-1)x^{-2} - 2s_1 c_2 x^{-1} + (c_1+1) \quad (\because x^{-1} = e^{-i\theta_\mu} \text{ と指数法則 } e^{-2i\theta_\mu} = (e^{-i\theta_\mu})^2. \text{ 項を } x^{-1} \text{ の降幕に並べ替え}) \\
&= (c_1+1) \left(\frac{c_1-1}{c_1+1} x^{-2} - \frac{2s_1 c_2}{c_1+1} x^{-1} + 1 \right) \quad (\because c_1 > 0 \text{ より } c_1+1 \neq 0. \text{ 各項を } (c_1+1) \cdot \frac{\text{係数}}{c_1+1} \text{ と書き、分配則でくくる})
\end{aligned}$$

Step 15: $\frac{c_1-1}{c_1+1} = \alpha_1 \alpha_2^{-1}$ の証明。

$$\begin{aligned}
\alpha_1 \alpha_2^{-1} &= (\tanh K_1 \tanh K_2^*) \cdot ((\tanh K_1)^{-1} \tanh K_2^*)^{-1} \quad (\because \alpha_1, \alpha_2 \text{ の定義}) \\
&= (\tanh K_1 \tanh K_2^*) \cdot (\tanh K_1 (\tanh K_2^*)^{-1}) \quad (\because \text{非零な積の逆数と逆数の逆数}) \\
&= (\tanh K_1)^2 \cdot (\tanh K_2^* (\tanh K_2^*)^{-1}) \quad (\because \text{複素数の積の可換則と結合則}) \\
&= (\tanh K_1)^2 \cdot 1 \quad (\because \tanh K_2^* \neq 0 \text{ と逆数の定義}) \\
&= (\tanh K_1)^2 \quad (\because \text{積の単位元})
\end{aligned}$$

一方、

$$\begin{aligned}
\frac{c_1-1}{c_1+1} &= \frac{\cosh 2K_1 - 1}{\cosh 2K_1 + 1} \quad (\because c_1 = \cosh 2K_1) \\
&= \frac{2 \sinh^2 K_1}{2 \cosh^2 K_1} \quad (\because \cosh 2x - 1 = 2 \sinh^2 x \text{ と } \cosh 2x + 1 = 2 \cosh^2 x) \\
&= \frac{\sinh^2 K_1}{\cosh^2 K_1} \quad (\because 2 \neq 0 \text{ より分子と分母の共通因子 2 を約分}) \\
&= \left(\frac{\sinh K_1}{\cosh K_1} \right)^2 \quad (\because \text{分数の積}) \\
&= (\tanh K_1)^2 \quad (\because \tanh \text{ の定義})
\end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned}
\frac{c_1-1}{c_1+1} &= (\tanh K_1)^2 \quad (\because \text{上の第 2 の計算}) \\
&= \alpha_1 \alpha_2^{-1} \quad (\because \text{上の第 1 の計算を逆向きに使う}) \quad \dots (\star)
\end{aligned}$$

Step 16: $\frac{2s_1 c_2}{c_1+1} = \alpha_1 + \alpha_2^{-1}$ の証明。まず

$$\begin{aligned}
\alpha_1 + \alpha_2^{-1} &= \tanh K_1 \tanh K_2^* + ((\tanh K_1)^{-1} \tanh K_2^*)^{-1} \quad (\because \alpha_1, \alpha_2 \text{ の定義}) \\
&= \tanh K_1 \tanh K_2^* + \tanh K_1 (\tanh K_2^*)^{-1} \quad (\because \text{積の逆元は逆元の積であり、} ((\tanh K_1)^{-1})^{-1} = \tanh K_1) \\
&= \tanh K_1 (\tanh K_2^* + (\tanh K_2^*)^{-1}) \quad (\because \text{分配則で } \tanh K_1 \text{ をくくり出す})
\end{aligned}$$

ここで、

$$\begin{aligned}
\tanh K_2^* + (\tanh K_2^*)^{-1} &= \frac{\sinh K_2^*}{\cosh K_2^*} + \frac{\cosh K_2^*}{\sinh K_2^*} \quad (\because \tanh \text{ の定義と、分数の逆数}) \\
&= \frac{\sinh^2 K_2^* + \cosh^2 K_2^*}{\sinh K_2^* \cosh K_2^*} \quad (\because \text{通分}) \\
&= \frac{\cosh 2K_2^*}{\sinh K_2^* \cosh K_2^*} \quad (\because \cosh^2 x + \sinh^2 x = \cosh 2x) \\
&= \frac{2 \cosh 2K_2^*}{2 \sinh K_2^* \cosh K_2^*} \quad (\because \text{分子と分母に } 2 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{2 \cosh 2K_2^*}{\sinh 2K_2^*} \quad (\because 2 \sinh x \cosh x = \sinh 2x)
\end{aligned}$$

$K_2^* = -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2)$ すなわち $e^{-2K_2^*} = \tanh K_2$ より、

$$\begin{aligned}
\sinh 2K_2^* &= \frac{e^{2K_2^*} - e^{-2K_2^*}}{2} \quad (\because \sinh \text{ の定義}) \\
&= \frac{(\tanh K_2)^{-1} - \tanh K_2}{2} \quad (\because e^{-2K_2^*} = \tanh K_2 \text{ と、その逆数 } e^{2K_2^*} = (\tanh K_2)^{-1}) \\
&= \frac{\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}}{2} \quad (\because \tanh \text{ の定義と、分数の逆数}) \\
&= \frac{\cosh^2 K_2 - \sinh^2 K_2}{2 \sinh K_2 \cosh K_2} \quad (\because \text{通分}) \\
&= \frac{1}{2 \sinh K_2 \cosh K_2} \quad (\because \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1) \\
&= \frac{1}{\sinh 2K_2} \quad (\because 2 \sinh x \cosh x = \sinh 2x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cosh 2K_2^* &= \frac{e^{2K_2^*} + e^{-2K_2^*}}{2} \quad (\because \cosh \text{ の定義}) \\
&= \frac{(\tanh K_2)^{-1} + \tanh K_2}{2} \quad (\because e^{-2K_2^*} = \tanh K_2 \text{ と、その逆数 } e^{2K_2^*} = (\tanh K_2)^{-1}) \\
&= \frac{\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} + \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}}{2} \quad (\because \tanh \text{ の定義と、分数の逆数}) \\
&= \frac{\cosh^2 K_2 + \sinh^2 K_2}{2 \sinh K_2 \cosh K_2} \quad (\because \text{通分}) \\
&= \frac{\cosh 2K_2}{2 \sinh K_2 \cosh K_2} \quad (\because \cosh^2 x + \sinh^2 x = \cosh 2x) \\
&= \frac{\cosh 2K_2}{\sinh 2K_2} \quad (\because 2 \sinh x \cosh x = \sinh 2x)
\end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned}
\frac{2 \cosh 2K_2^*}{\sinh 2K_2^*} &= 2 \cdot \frac{\cosh 2K_2 / \sinh 2K_2}{1 / \sinh 2K_2} \quad (\because \text{上の 2 本の計算を代入}) \\
&= 2 \cosh 2K_2 \quad (\because \text{分子と分母に } \sinh 2K_2 \text{ を掛ける}) \\
\alpha_1 + \alpha_2^{-1} &= \tanh K_1 \cdot \frac{2 \cosh 2K_2^*}{\sinh 2K_2^*} \quad (\because \text{この Step の最初の鎖と、その次の鎖}) \\
&= \tanh K_1 \cdot 2 \cosh 2K_2 \quad (\because \text{直前の計算}) \\
&= 2 \tanh K_1 \cosh 2K_2 \quad (\because \text{積の可換性})
\end{aligned}$$

一方、

$$\begin{aligned}
\frac{2s_1c_2}{c_1+1} &= \frac{2 \sinh 2K_1 \cosh 2K_2}{\cosh 2K_1 + 1} \quad (\because s_1, c_1, c_2 \text{ の定義}) \\
&= \frac{2 \cdot 2 \sinh K_1 \cosh K_1 \cdot \cosh 2K_2}{\cosh 2K_1 + 1} \quad (\because \sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x) \\
&= \frac{2 \cdot 2 \sinh K_1 \cosh K_1 \cdot \cosh 2K_2}{2 \cosh^2 K_1} \quad (\because \cosh 2x + 1 = 2 \cosh^2 x) \\
&= \frac{2 \sinh K_1 \cosh 2K_2}{\cosh K_1} \quad (\because \text{分子と分母を } 2 \cosh K_1 \text{ で割る}) \\
&= 2 \tanh K_1 \cosh 2K_2 \quad (\because \tanh \text{ の定義})
\end{aligned}$$

よって、

$$\frac{2s_1c_2}{c_1+1} = \alpha_1 + \alpha_2^{-1} \quad (\because \text{両者とも } 2 \tanh K_1 \cosh 2K_2 \text{ に等しい}) \quad \dots (\star\star)$$

Step 17: 因数分解の検証。 $(1 - \alpha_1 x)(1 - \alpha_2^{-1} x)$ を展開すると、

$$\begin{aligned}
(1 - \alpha_1 x)(1 - \alpha_2^{-1} x) &= 1 - \alpha_2^{-1} x - \alpha_1 x + \alpha_1 \alpha_2^{-1} x^2 \quad (\because \text{分配則}) \\
&= 1 - (\alpha_1 + \alpha_2^{-1}) x + \alpha_1 \alpha_2^{-1} x^2 \quad (\because \text{分配則}) \\
&= 1 - \frac{2s_1c_2}{c_1+1} x + \frac{c_1-1}{c_1+1} x^2 \quad (\because (\star), (\star\star))
\end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}
(c_1 + 1)(1 - \alpha_1 x)(1 - \alpha_2^{-1} x) &= (c_1 + 1) \left(1 - \frac{2s_1c_2}{c_1+1} x + \frac{c_1-1}{c_1+1} x^2 \right) \quad (\because \text{上の計算}) \\
&= (c_1 + 1) - 2s_1c_2 x + (c_1 - 1)x^2 \quad (\because c_1 + 1 \neq 0 \text{ と分配則})
\end{aligned}$$

これは Step 14 の分子と一致する ($x = e^{i\theta_\mu}$)。同様に $y := e^{-i\theta_\mu} = x^{-1}$ とおくと $(c_1 + 1)(1 - \alpha_1 y)(1 - \alpha_2^{-1} y) = (c_1 + 1) - 2s_1c_2 y + (c_1 - 1)y^2$ が Step 14 の分母と一致する。

Step 18: 結論。 Step 14 と Step 17 より、

$$\begin{aligned}
\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)} &= \frac{(c_1 + 1)(1 - \alpha_1 e^{i\theta_\mu})(1 - \alpha_2^{-1} e^{i\theta_\mu})}{(c_1 + 1)(1 - \alpha_1 e^{-i\theta_\mu})(1 - \alpha_2^{-1} e^{-i\theta_\mu})} \quad (\because \text{Step 14 と Step 17}) \\
&= \frac{(1 - \alpha_1 e^{i\theta_\mu})(1 - \alpha_2^{-1} e^{i\theta_\mu})}{(1 - \alpha_1 e^{-i\theta_\mu})(1 - \alpha_2^{-1} e^{-i\theta_\mu})} \quad (\because c_1 + 1 \neq 0 \text{ による約分})
\end{aligned}$$

したがって $a(\theta_\mu)$ の定義より、

$$\begin{aligned}
a(\theta_\mu) &= \sqrt{\frac{(1 - \alpha_1 e^{i\theta_\mu})(1 - \alpha_2^{-1} e^{i\theta_\mu})}{(1 - \alpha_1 e^{-i\theta_\mu})(1 - \alpha_2^{-1} e^{-i\theta_\mu})}} \quad (\because a(\theta_\mu) \text{ の定義}) \\
&= \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \quad (\because \text{上の計算})
\end{aligned}$$

Part A の Step 8 の結果と合わせて、Claim のステートメントが示された。 $\square$

定義 9.34 (フェルミオン). $\mathcal{M} := \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ とする。 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ についてのみ、 $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を

$$\begin{aligned}
(\psi_\mu^\dagger \quad \psi_\mu) &:= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) \cdot P_\mu \quad (\because \text{定義「フェルミオン」}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) \cdot \frac{1}{2\sqrt{M} \gamma_2(-\theta_\mu)} \begin{pmatrix} +i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} & -i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ \gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_2(-\theta_\mu) \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張「} A(\theta_\mu) \text{ の対角化}(P_\mu, D_\mu)\text{」の} P_\mu \text{ の表示})
\end{aligned}$$

すなわち

$$\begin{aligned}
\psi_\mu^\dagger &= \frac{+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2\sqrt{M} \gamma_2(-\theta_\mu)} \hat{Z}_\mu^{(-)} + \frac{1}{2\sqrt{M}} \hat{Y}_\mu \\
\psi_\mu &= \frac{-i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2\sqrt{M} \gamma_2(-\theta_\mu)} \hat{Z}_\mu^{(-)} + \frac{1}{2\sqrt{M}} \hat{Y}_\mu
\end{aligned}$$

と定める。

この定義は正規化因子 $\frac{1}{2\sqrt{M} \gamma_2(-\theta_\mu)}$ を含むため、 $\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ すなわち $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ (主張 9.27 より両者は同値) のときのみ意味をもつ。 $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となる $\mu \in \mathcal{M}$ については P_μ (主張 9.32) が定義されず、正規化因子 $\frac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)}$ が 0 除算となるため、 $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger$ は定義されない (存在しない)。主張 9.26 より $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となるのは $\mu = \pm M$ かつ臨界条件 $c_1 = s_1 c_2$ (主張 9.49 より Ising 臨界点 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ に対応) を満たす場合に限られる。特に臨界点では $\psi_M, \psi_M^\dagger$ が存在しない。この μ に対する $T_{(V)}, T_{(V')}$ の作用は 主張 9.44 および 主張 9.45 の場合 2 で、フェルミオンを経由せず直接扱う。

主張 9.35 (V と ψ の交換関係 (B.13)). $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について (このとき 定義 9.34 より $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger$ が定義される)、

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(\psi_\mu^\dagger) &= \left(\gamma_1(\theta_\mu) + \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \right) \psi_\mu^\dagger \\
T_{(V)}(\psi_\mu) &= \left(\gamma_1(\theta_\mu) - \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \right) \psi_\mu
\end{aligned}$$

証明. 定義 9.34 より、

$$(\psi_\mu^\dagger \quad \psi_\mu) = (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) \cdot P_\mu$$

$T_{(V)}$ は 定理 1.10 より線型写像であり、 P_μ の各成分は $\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu$ に依らない複素数なので、

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(\psi_\mu^\dagger \quad \psi_\mu) &= T_{(V)}((\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) \cdot P_\mu) \quad (\because \text{フェルミオンの定義}) \\
&= \left(T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) \quad T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) \right) \cdot P_\mu \quad (\because T_{(V)} \text{ の線形性}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) A(\theta_\mu) \cdot P_\mu \quad (\because T_{(V)} \text{ の } \hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu \text{ への作用}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) (P_\mu D_\mu P_\mu^{-1}) \cdot P_\mu \quad (\because A(\theta_\mu) = P_\mu D_\mu P_\mu^{-1}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) P_\mu D_\mu \quad (\because \text{行列の積の結合則と } P_\mu^{-1} P_\mu = I) \\
&= \begin{pmatrix} \psi_\mu^\dagger & \psi_\mu \end{pmatrix} D_\mu \quad (\because \text{フェルミオンの定義}) \\
&= \begin{pmatrix} \psi_\mu^\dagger & \psi_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_{+, \mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-, \mu} \end{pmatrix} \quad (\because D_\mu \text{ の成分}) \\
&= \begin{pmatrix} \lambda_{+, \mu} \psi_\mu^\dagger & \lambda_{-, \mu} \psi_\mu \end{pmatrix} \quad (\because \text{行ベクトルと対角行列の積の成分計算}) \\
&= \left((\gamma_1(\theta_\mu) + \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}) \psi_\mu^\dagger \quad (\gamma_1(\theta_\mu) - \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}) \psi_\mu \right) \quad (\because \lambda_{\pm, \mu} \text{ の値})
\end{aligned}$$

ここで、第 3 の等号の作用は 主張 9.21、第 4 の等号の対角化 $A(\theta_\mu) = P_\mu D_\mu P_\mu^{-1}$ と第 7・第 9 の等号の D_μ の成分・固有値 $\lambda_{\pm, \mu} = \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ は 主張 9.31 および 主張 9.32、第 1・第 6 の等号は 定義 9.34 による。両成分を比較して主張を得る。 $\square$

主張 9.36 (ψ の反交換関係). $\mathcal{M} := \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ とする。

$\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ かつ $\gamma_2(\theta_\nu) \neq 0$ なる $\mu, \nu \in \mathcal{M}$ について (このとき 定義 9.34 より $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger, \psi_\nu, \psi_\nu^\dagger$ が定義される)、

$$[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+ = 0, \quad [\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu]_+ = \delta_{\mu+\nu, 0}^M I_{\text{Mat}(2M, \mathbb{C})}, \quad [\psi_\mu, \psi_\nu]_+ = 0$$

ここで $\sqrt{\cdot}$ (定義 9.34 を通じて $\psi_\mu^\dagger, \psi_\mu$ の係数に現れる) は 定義 1.47 で定めた単一値の写像 $\sqrt{\cdot} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ である。すなわち、平方根は根号の中身だけで一意に定まる複素数であって、 μ ごとに $\pm$ を選ぶ自由度は無い。この一意性は主張の成立に不可欠であり、証明の Step 0 で明示的に使う。

証明. Step 0: 平方根の値が μ と ν で一致すること (分枝の一致)。以下 $t_\mu := \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \in \mathbb{C}$ 、 $t_\nu := \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)} \in \mathbb{C}$ と略記する。

Step 0-1: γ_2 は 2π 周期である。実際 $k \in \mathbb{Z}$ と $\theta \in \mathbb{R}$ について $\cos(\theta + 2k\pi) = \cos \theta$ 、 $\sin(\theta + 2k\pi) = \sin \theta$ であり、定理 1.54 の Euler の公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ より $e^{i(\theta + 2k\pi)} = e^{i\theta}$ 。 $\gamma_2(\theta) = ie^{i\theta} s_2^*(c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2)$ は $e^{i\theta}, \cos \theta, \sin \theta$ のみを通じて θ に依存するから、

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta + 2k\pi) &= ie^{i(\theta + 2k\pi)} s_2^*(c_1 \cos(\theta + 2k\pi) - i \sin(\theta + 2k\pi) - s_1 c_2) \quad (\because \gamma_2 \text{ の定義}) \\
&= ie^{i\theta} s_2^*(c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2) \quad (\because e^{i\theta}, \cos \theta, \sin \theta \text{ の } 2\pi \text{ 周期性}) \\
&= \gamma_2(\theta) \quad (\because \gamma_2 \text{ の定義})
\end{aligned}$$

Step 0-2: $\delta_{\mu+\nu, 0}^M \neq 0$ のとき $\mu + \nu \equiv 0 \pmod{M}$ すなわち $\nu = -\mu + kM$ なる $k \in \mathbb{Z}$ が存在する。このとき

$$\begin{aligned}
\theta_\nu &= \frac{2\pi\nu}{M} \quad (\because \theta_\nu \text{ の定義}) \\
&= \frac{2\pi(-\mu + kM)}{M} \quad (\because \nu = -\mu + kM) \\
&= -\frac{2\pi\mu}{M} + 2k\pi \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則と約分}) \\
&= -\theta_\mu + 2k\pi \quad (\because \theta_\mu \text{ の定義})
\end{aligned}$$

であるから、Step 0-1 より

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta_\nu) &= \gamma_2(-\theta_\mu + 2k\pi) \quad (\because \theta_\nu = -\theta_\mu + 2k\pi) \\
&= \gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because \gamma_2 \text{ の } 2\pi \text{ 周期性}), \\
\gamma_2(-\theta_\nu) &= \gamma_2(\theta_\mu - 2k\pi) \quad (\because \theta_\nu = -\theta_\mu + 2k\pi) \\
&= \gamma_2(\theta_\mu) \quad (\because \gamma_2 \text{ の } 2\pi \text{ 周期性})
\end{aligned}$$

($\theta_\nu = -\theta_\mu + 2k\pi$ は $\mathbb{R}$ における等式であって $\theta_\nu = -\theta_\mu$ とは限らない。両者が γ_2 の値として一致するのは、Step 0-1 の周期性による。) したがって根号の中身は $\mathbb{C}$ の元として一致する：

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu) &= \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(\theta_\mu) \quad (\because \text{上の二つの等式}) \\
&= \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の可換則})
\end{aligned}$$

Step 0-3: 定義 1.47 の $\sqrt{\cdot}$ は $\mathbb{C}$ から $\mathbb{C}$ への写像である。写像は等しい入力に等しい値を返すから、Step 0-2 の等式より

$$\begin{aligned}
t_\nu &= \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)} \quad (\because t_\nu \text{ の定義}) \\
&= \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \quad (\because \text{根号の中身について上で得た等式}) \\
&= t_\mu \quad (\because t_\mu \text{ の定義})
\end{aligned}$$

すなわち t_ν と t_μ は同一の複素数である ($t_\nu = -t_\mu$ という可能性は残らない)。

Step 0-4: この一致は結論に不可欠である。主張 9.27 より $\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2$ であり、仮定 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ より $|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 > 0$ であるから

$$\begin{aligned}
t_\mu^2 &= \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because t_\mu \text{ の定義と } (\sqrt{z})^2 = z) \\
&= -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 \quad (\because \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2) \\
&\neq 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \gamma_2(\theta_\mu) \neq 0 \text{ より } |\gamma_2(\theta_\mu)|^2 > 0), \\
t_\mu &\neq 0_{\mathbb{C}} \quad (\because t_\mu = 0_{\mathbb{C}} \text{ ならば } t_\mu^2 = 0_{\mathbb{C}})
\end{aligned}$$

後述の a) の係数の括弧は次の一続きの式変形により因数分解できる。

$$\begin{aligned}
-t_\mu t_\nu + \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu) &= -t_\mu t_\nu + \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(\theta_\mu) \quad (\because \text{Step 0-2}) \\
&= t_\mu^2 - t_\mu t_\nu \quad (\because t_\mu^2 = \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)) \\
&= t_\mu(t_\mu - t_\nu) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の分配則})
\end{aligned}$$

Step 0-3 の $t_\nu = t_\mu$ によってのみ 0 になる。仮に $t_\nu = -t_\mu$ であれば括弧は $2t_\mu^2 \neq 0$ となり第 1 の等式は偽になる (同様に b) の括弧は $t_\mu t_\nu + t_\mu^2$ で、 $t_\nu = -t_\mu$ なら 0 となって第 2 の等式も偽になる)。

定義 9.34 より、 $c_\mu := \frac{1}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\mu)}$ とおくと

$$\begin{aligned}
\psi_\mu^\dagger &= c_\mu(+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\hat{Z}_\mu^{(-)} + \gamma_2(-\theta_\mu)\hat{Y}_\mu) \quad (\because \text{定義「フェルミオン」の } \psi_\mu^\dagger \text{ の表示式で } c_\mu \text{ を括り出した}) \\
\psi_\mu &= c_\mu(-i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\hat{Z}_\mu^{(-)} + \gamma_2(-\theta_\mu)\hat{Y}_\mu) \quad (\because \text{定義「フェルミオン」の } \psi_\mu \text{ の表示式で } c_\mu \text{ を括り出した})
\end{aligned}$$

である。また、主張 8.1 より、

$$[\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Z}_\nu^{(-)}]_+ = 2M\delta_{\mu+\nu,0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}, \quad [\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\nu]_+ = 0, \quad [\hat{Y}_\mu, \hat{Y}_\nu]_+ = 2M\delta_{\mu+\nu,0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$$

である。

a) $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+$ について、反交換子の双線型性より

$$\begin{aligned}
[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+ &= c_\mu c_\nu \left((i)(i) \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu) \gamma_2(-\theta_\nu)} [\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Z}_\nu^{(-)}]_+ \right. \\
&\quad + i \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \gamma_2(-\theta_\nu) [\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\nu]_+ \\
&\quad + \gamma_2(-\theta_\mu) i \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu) \gamma_2(-\theta_\nu)} [\hat{Y}_\mu, \hat{Z}_\nu^{(-)}]_+ \\
&\quad \left. + \gamma_2(-\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\nu) [\hat{Y}_\mu, \hat{Y}_\nu]_+ \right) \quad (\because \text{反交換子の双線型性と } \psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger \text{ の定義}) \\
&= c_\mu c_\nu (-\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu) \gamma_2(-\theta_\nu)} + \gamma_2(-\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\nu)) \cdot 2M \delta_{\mu+\nu,0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{二つの交差項の反交換子は零であり、} i^2 = -1)
\end{aligned}$$

$\delta_{\mu+\nu,0}^M \neq 0$ のとき、Step 0-3 の $t_\nu = t_\mu$ (平方根が単一値であることから従う分枝の一致) を使うと

$$\begin{aligned}
\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu) \gamma_2(-\theta_\nu)} &= t_\mu t_\nu \quad (\because t_\mu, t_\nu \text{ の定義}) \\
&= t_\mu^2 \quad (\because \text{Step 0-3 の } t_\nu = t_\mu) \\
&= (\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)})^2 \quad (\because t_\mu \text{ の定義}) \\
&= \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because (\sqrt{z})^2 = z)
\end{aligned}$$

(第 2 の等号が Step 0-3 の $t_\nu = t_\mu$ である。ここを $t_\nu = \pm t_\mu$ までしか言えないと結論は得られない。) また Step 0-2 の $\gamma_2(-\theta_\nu) = \gamma_2(\theta_\mu)$ より

$$\begin{aligned}
\gamma_2(-\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\nu) &= \gamma_2(-\theta_\mu) \gamma_2(\theta_\mu) \quad (\because \text{Step 0-2 の } \gamma_2(-\theta_\nu) = \gamma_2(\theta_\mu)) \\
&= \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の可換則})
\end{aligned}$$

したがって係数の和は

$$\begin{aligned}
&-\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu) \gamma_2(-\theta_\nu)} + \gamma_2(-\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\nu) \\
&= -\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) + \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because \text{上の二つの式変形}) \\
&= 0 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法逆元})
\end{aligned}$$

$\delta_{\mu+\nu,0}^M = 0$ のときは、先に得た反交換子の式の因子が零なので、同じ結論を得る。以上から $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+ = 0$ 。

b) $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu]_+$ について、反交換子の双線型性より

$$\begin{aligned}
[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu]_+ &= c_\mu c_\nu \left((i)(-i) \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu) \gamma_2(-\theta_\nu)} [\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Z}_\nu^{(-)}]_+ \right. \\
&\quad + i \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \gamma_2(-\theta_\nu) [\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\nu]_+ \\
&\quad + \gamma_2(-\theta_\mu) (-i) \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu) \gamma_2(-\theta_\nu)} [\hat{Y}_\mu, \hat{Z}_\nu^{(-)}]_+ \\
&\quad \left. + \gamma_2(-\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\nu) [\hat{Y}_\mu, \hat{Y}_\nu]_+ \right) \quad (\because \text{反交換子の双線型性と } \psi_\mu^\dagger, \psi_\nu \text{ の定義}) \\
&= c_\mu c_\nu (\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu) \gamma_2(-\theta_\nu)} + \gamma_2(-\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\nu)) \cdot 2M \delta_{\mu+\nu,0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{二つの交差項の反交換子は零であり、} (i)(-i) = 1)
\end{aligned}$$

$\delta_{\mu+\nu,0}^M \neq 0$ のとき、a) で示した平方根の積の式変形と γ_2 の積の式変形を使うと、係数の括弧は

$$\begin{aligned}
&\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)} \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu) \gamma_2(-\theta_\nu)} + \gamma_2(-\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\nu) \\
&= \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) + \gamma_2(-\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\nu) \quad (\because \text{a) の平方根の積の式変形}) \\
&= \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) + \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because \text{a) の } \gamma_2 \text{ の積の式変形}) \\
&= 2\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because \text{同じ項の和})
\end{aligned}$$

である。また係数の積は

$$\begin{aligned}
c_\mu c_\nu &= \frac{1}{4M\gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu)} \quad (\because c_\mu, c_\nu \text{ の定義と分数の積}) \\
&= \frac{1}{4M\gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(\theta_\mu)} \quad (\because \text{Step 0-2 の } \gamma_2(-\theta_\nu) = \gamma_2(\theta_\mu)) \\
&= \frac{1}{4M\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の可換則})
\end{aligned}$$

であるから、

$$\begin{aligned}
[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu]_+ &= \frac{1}{4M\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \cdot 2\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \cdot 2M \cdot \delta_{\mu+\nu,0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{上の三つの式変形}) \\
&= \delta_{\mu+\nu,0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{約分})
\end{aligned}$$

$\delta_{\mu+\nu,0}^M = 0$ のときは、先に得た反交換子の式の因子が零なので、全体が 0 となり、同じ結論を得る。以上から $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu]_+ = \delta_{\mu+\nu,0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ 。

c) $[\psi_\mu, \psi_\nu]_+$ について、反交換子の双線型性より

$$\begin{aligned}
[\psi_\mu, \psi_\nu]_+ &= c_\mu c_\nu \left((-i)(-i)\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)}[\dot{Z}_\mu^{(-)}, \dot{Z}_\nu^{(-)}]_+ \right. \\
&\quad + (-i)\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\gamma_2(-\theta_\nu)[\dot{Z}_\mu^{(-)}, \dot{Y}_\nu]_+ \\
&\quad + \gamma_2(-\theta_\mu)(-i)\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)}[\dot{Y}_\mu, \dot{Z}_\nu^{(-)}]_+ \\
&\quad \left. + \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu)[\dot{Y}_\mu, \dot{Y}_\nu]_+ \right) \quad (\because \text{反交換子の双線型性と } \psi_\mu, \psi_\nu \text{ の定義}) \\
&= c_\mu c_\nu \left(-\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)} + \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu) \right) \cdot 2M\delta_{\mu+\nu,0}^M I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{二つの交差項の反交換子は零であり、} (-i)(-i) = -1)
\end{aligned}$$

$\delta_{\mu+\nu,0}^M \neq 0$ のとき、a) で示した二つの式変形を当てると、係数の括弧は

$$\begin{aligned}
& -\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)} + \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu) \\
&= -\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because \text{a) の平方根の積と } \gamma_2 \text{ の積の式変形}) \\
&= 0 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法逆元})
\end{aligned}$$

$\delta_{\mu+\nu,0}^M = 0$ のときは、先に得た反交換子の式の因子が零なので、全体が 0 となる。以上から $[\psi_\mu, \psi_\nu]_+ = 0$ 。□

主張 9.37 ($\det A(\theta_\mu) = 1$)。定義 5.8 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。 $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\det A(\theta_\mu) = 1, \quad \gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = 1, \quad \lambda_{+,\mu} \cdot \lambda_{-,\mu} = 1$$

証明. Step 0: 使う 3 つの関係式。定義 5.8 の記号のもと、 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。次の 3 つを使う。

$$(i) \ c_1^2 - s_1^2 = 1, \quad (ii) \ (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1, \quad (iii) \ c_2 s_2^* = c_2^*$$

(i) は $c_1 = \cosh 2K_1$ 、 $s_1 = \sinh 2K_1$ と恒等式 $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ ($x = 2K_1$) による。(ii) は同じ恒等式を $x = 2K_2^*$ に適用したものである。(iii) は主張 9.19 そのもの、すなわち K_2 と K_2^* の双対関係 $\sinh(2K_2)\sinh(2K_2^*) = 1$ (定義 5.8) の帰結 $c_2^* = s_2^* c_2$ である。

((iii) は $A(\theta)$ の定義に現れる c_2 と B_2 に現れる c_2^* を結ぶ関係であり、これを落とすと以下の計算は成立しない。主張 9.22 の分解 $A(\theta_\mu) = B_1(\theta_\mu)B_2B_1(\theta_\mu)$ 自体がこの関係を経由して成り立っているの、ここでは分解を経由せず 定義 9.20 の定義から直接計算する。)

Step 1: $\det A(\theta_\mu)$ の定義からの計算。定義 9.20 より

$$A(\theta_\mu) = \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta_\mu) & \gamma_2(\theta_\mu) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu) \end{pmatrix}$$

2×2 行列の行列式の定義より

$$\begin{aligned}\det A(\theta_\mu) &= \gamma_1(\theta_\mu) \cdot \gamma_1(\theta_\mu) - \gamma_2(\theta_\mu) \cdot (-\gamma_2(-\theta_\mu)) \quad (\because 2 \times 2 \text{ 行列の行列式の定義と直前の行列表示}) \\ &= \gamma_1(\theta_\mu)^2 - (-\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)) \quad (\because \text{ 冪の定義と積の結合則}) \\ &= \gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because a - (-b) = a + b)\end{aligned}$$

これで statement の第 1 の量と第 2 の量が等しいことが言えた。残りは、この値が 1 であることである。

Step 2: $\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu)$ の実部表示。以下 $u := \cos \theta_\mu \in \mathbb{R}$, $v := \sin \theta_\mu \in \mathbb{R}$ と略記する ($u^2 + v^2 = 1$)。定義 9.20 の γ_2 の定義より

$$\begin{aligned}\gamma_2(\theta_\mu) &= i e^{i\theta_\mu} s_2^* ((c_1 u - s_1 c_2) - iv) \quad (\because \gamma_2 \text{ の定義と } u, v \text{ の略記}) \\ \gamma_2(-\theta_\mu) &= i e^{-i\theta_\mu} s_2^* ((c_1 u - s_1 c_2) + iv) \quad (\because \cos(-\theta_\mu) = u, \sin(-\theta_\mu) = -v) \\ (\cos(-\theta_\mu) = u, \sin(-\theta_\mu) = -v \text{ を代入した。}) \quad i \cdot i &= -1 \text{ と } e^{i\theta_\mu} e^{-i\theta_\mu} = e^0 = 1, \text{ および} \\ (a - iv)(a + iv) &= a^2 + v^2 \quad (a := c_1 u - s_1 c_2 \in \mathbb{R}) \text{ より}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) &= i^2 e^{i\theta_\mu} e^{-i\theta_\mu} (s_2^*)^2 ((c_1 u - s_1 c_2) - iv)((c_1 u - s_1 c_2) + iv) \quad (\because \text{ 直前の 2 式の代入と積の結合則}) \\ &= -e^0 (s_2^*)^2 ((c_1 u - s_1 c_2) - iv)((c_1 u - s_1 c_2) + iv) \quad (\because i^2 = -1, e^{i\theta_\mu} e^{-i\theta_\mu} = e^0) \\ &= -(s_2^*)^2 ((c_1 u - s_1 c_2)^2 - (iv)^2) \quad (\because e^0 = 1, (a - b)(a + b) = a^2 - b^2) \\ &= -(s_2^*)^2 ((c_1 u - s_1 c_2)^2 + v^2) \quad (\because (iv)^2 = -v^2) \\ &= -(s_2^*)^2 ((c_1 u - s_1 c_2)^2 + 1 - u^2) \quad (\because u^2 + v^2 = 1)\end{aligned}$$

Step 3: 展開。 $\gamma_1(\theta_\mu) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* u$ より

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta_\mu)^2 &= (c_1 c_2^* - s_1 s_2^* u)^2 \quad (\because \gamma_1(\theta_\mu) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* u) \\ &= c_1^2 (c_2^*)^2 - 2c_1 c_2^* s_1 s_2^* u + s_1^2 (s_2^*)^2 u^2 \quad (\because (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) &= -(s_2^*)^2 ((c_1 u - s_1 c_2)^2 + 1 - u^2) \quad (\because \text{ Step 2 の終点}) \\ &= -(s_2^*)^2 (c_1^2 u^2 - 2c_1 s_1 c_2 u + s_1^2 c_2^2 + 1 - u^2) \quad (\because (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2) \\ &= -c_1^2 (s_2^*)^2 u^2 + 2c_1 s_1 c_2 (s_2^*)^2 u - s_1^2 c_2^2 (s_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2 \quad (\because \text{ 分配則})\end{aligned}$$

Step 4: (iii) による c_2 の消去。 (iii) $c_2 s_2^* = c_2^*$ を使うと

$$\begin{aligned}2c_1 s_1 c_2 (s_2^*)^2 u &= 2c_1 s_1 (c_2 s_2^*) s_2^* u \quad (\because (s_2^*)^2 = s_2^* s_2^* \text{ と積の結合則}) \\ &= 2c_1 s_1 c_2^* s_2^* u \quad (\because \text{ (iii) } c_2 s_2^* = c_2^*), \\ s_1^2 c_2^2 (s_2^*)^2 &= s_1^2 (c_2 s_2^*)^2 \quad (\because c_2^2 (s_2^*)^2 = (c_2 s_2^*)^2) \\ &= s_1^2 (c_2^*)^2 \quad (\because \text{ (iii) } c_2 s_2^* = c_2^*)\end{aligned}$$

これを代入して Step 3 の 2 式を足すと

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu) \gamma_2(-\theta_\mu) &= (c_1^2 (c_2^*)^2 - 2c_1 c_2^* s_1 s_2^* u + s_1^2 (s_2^*)^2 u^2) \\ &\quad + (-c_1^2 (s_2^*)^2 u^2 + 2c_1 s_1 c_2^* s_2^* u - s_1^2 (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2) \quad (\because \text{ Step 3 の 2 式と直前の } c_2 \text{ の消去}) \\ &= (c_1^2 - s_1^2) (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2 (s_1^2 - c_1^2 + 1) \quad (\because u \text{ の 1 次の項を相殺し、残る項を分配則でまとめる})\end{aligned}$$

(u の 1 次の項 $-2c_1 c_2^* s_1 s_2^* u$ と $+2c_1 s_1 c_2^* s_2^* u$ は相殺した。これが (iii) を使った箇所である。)

Step 5: (i)(ii) による結論。 (i) $c_1^2 - s_1^2 = 1$ より $s_1^2 - c_1^2 + 1 = 0$ であるから u^2 の項は消え、同じく (i) より第 1 項は $(c_2^*)^2$ になる。よって (ii) $(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1$ より

$$\begin{aligned}
\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) &= (c_1^2 - s_1^2)(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2 (s_1^2 - c_1^2 + 1) & (\because \text{Step 4 の終点}) \\
&= (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2 (-1 + 1) & (\because \text{(i) } c_1^2 - s_1^2 = 1 \text{ を 2 箇所へ適用}) \\
&= (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2 \cdot 0 & (\because -1 + 1 = 0) \\
&= (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 & (\because a \cdot 0 = 0, b + 0 = b) \\
&= 1 & (\because \text{(ii) } (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1)
\end{aligned}$$

Step 1 と合わせて $\det A(\theta_\mu) = \gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = 1$ 。

Step 6: 固有値の積。主張 9.31 より $\lambda_{\pm, \mu} = \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ であり、 $(\sqrt{z})^2 = z$ (定義 1.47) を $z = -\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)$ に適用して

$$\begin{aligned}
\lambda_{+, \mu} \lambda_{-, \mu} &= \left(\gamma_1(\theta_\mu) + \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \right) \left(\gamma_1(\theta_\mu) - \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \right) & (\because \lambda_{\pm, \mu} \text{ の式を代入}) \\
&= \gamma_1(\theta_\mu)^2 - \left(\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \right)^2 & (\because (a+b)(a-b) = a^2 - b^2) \\
&= \gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) & (\because (\sqrt{z})^2 = z, z = -\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)) \\
&= 1 & (\because \text{Step 5 の終点})
\end{aligned}$$

以上で statement の 3 つの等式がすべて示された。 □

主張 9.38 ($\gamma_1(\theta_\mu) \geq 1$). $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\gamma_1(\theta_\mu) \geq 1$$

証明. 主張 9.27 より $\gamma_2(-\theta_\mu) = -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)}$ すなわち $-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = |\gamma_2(\theta_\mu)|^2$ であるから、

$$\begin{aligned}
\gamma_1(\theta_\mu)^2 &= 1 - \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) & (\because \text{主張 9.37}) \\
&= 1 + |\gamma_2(\theta_\mu)|^2 & (\because \text{主張 9.27}) \\
&\geq 1 & (\because |\gamma_2(\theta_\mu)|^2 \geq 0)
\end{aligned}$$

また、

$$\begin{aligned}
\gamma_1(\theta_\mu) &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta_\mu & (\because \gamma_1 \text{ の定義}) \\
&\geq c_1 c_2^* - s_1 s_2^* & (\because \cos \theta_\mu \leq 1) \\
&> 0 & (\because \cosh > \sinh \text{ より } c_1 c_2^* > s_1 s_2^*)
\end{aligned}$$

したがって、

$$\gamma_1(\theta_\mu) \geq 1 \quad (\because \gamma_1(\theta_\mu)^2 \geq 1 \text{ かつ } \gamma_1(\theta_\mu) > 0)$$

□

定義 9.39 ($\gamma(\theta_\mu)$ の定義). $\mu \in \mathcal{M}$ について、 $\gamma_1(\theta_\mu) \geq 1$ より well-defined であり、

$$\gamma(\theta_\mu) := \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta_\mu)) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

主張 9.40 ($\lambda_{\pm, \mu} = e^{\pm \gamma(\theta_\mu)}$). $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\lambda_{+, \mu} = e^{\gamma(\theta_\mu)}, \quad \lambda_{-, \mu} = e^{-\gamma(\theta_\mu)}$$

証明. 主張 9.37 と 主張 9.31 より、 $\det A(\theta_\mu) = 1$ と固有値の和・積から、

$$\begin{aligned}
\lambda_{+,\mu}\lambda_{-,\mu} &= \det A(\theta_\mu) \quad (\because \lambda_{+,\mu}, \lambda_{-,\mu} \text{ は } A(\theta_\mu) \text{ の固有値}) \\
&= 1 \quad (\because \det A(\theta_\mu) = 1) \\
\lambda_{+,\mu} + \lambda_{-,\mu} &= 2\gamma_1(\theta_\mu) \quad (\because \lambda_{\pm,\mu} = \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}) \\
&\geq 2 \quad (\because \gamma_1(\theta_\mu) \geq 1) \\
&> 0 \quad (\because 2 > 0) \\
\lambda_{+,\mu} > 0, \quad \lambda_{-,\mu} > 0 & \quad (\because \lambda_{+,\mu}\lambda_{-,\mu} > 0 \text{ かつ } \lambda_{+,\mu} + \lambda_{-,\mu} > 0) \\
\gamma(\theta_\mu) &\geq 0 \quad (\because \gamma(\theta_\mu) = \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta_\mu)) \in \mathbb{R}_{\geq 0}) \\
\lambda_{\pm,\mu} &= e^{\pm\gamma(\theta_\mu)} \quad (\because \text{正の二固有値を相反する指数として書く}) \\
\cosh(\gamma(\theta_\mu)) &= \gamma_1(\theta_\mu) \quad (\because \gamma(\theta_\mu) \text{ の定義})
\end{aligned}$$

□

定義 9.41 (V' の定義). $\mathcal{M} := \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ とする。

$$V' := \exp\left(+ \sum_{\substack{\mu \in \{1, \dots, M\} \\ \gamma_2(\theta_\mu) \neq 0}} \gamma(\theta_\mu) \left(\psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu} - \frac{1}{2} \right)\right)$$

ここで和は $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ を満たす $\mu \in \{1, \dots, M\}$ にわたる。この μ に対しては 定義 9.34 と 主張 9.27 ($\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0 \iff \gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$) より $\psi_\mu^\dagger, \psi_{-\mu}$ がともに定義されるため、和の各項は well-defined である。

主張 9.42 ($T_{(V')}$ の ψ への作用). $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について (このとき 定義 9.34 より $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger$ が定義される)、

$$T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) = e^{+\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu^\dagger, \quad T_{(V')}(\psi_\mu) = e^{-\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu$$

証明. 定義 9.41 より $V' = \exp(X)$ ただし

$$X := + \sum_{\substack{\nu \in \{1, \dots, M\} \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}} \gamma(\theta_\nu) \left(\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} - \frac{1}{2} \right)$$

である (定義 9.41 の和と同じく $\gamma_2(\theta_\nu) \neq 0$ なる $\nu \in \{1, \dots, M\}$ にわたる。この ν については 定義 9.34 と 主張 9.27 より $\psi_\nu^\dagger, \psi_{-\nu}$ がともに定義される)。

X と $-X$ について

$$\begin{aligned}
X(-X) &= -X^2 \quad (\because \text{スカラー } -1 \text{ を積の外へ出す}) \\
&= (-X)X \quad (\because \text{同じ } X \text{ どうしの積})
\end{aligned}$$

なので可換である。したがって 定理 4.5 より

$$\begin{aligned}
\exp(X) \exp(-X) &= \exp(X + (-X)) \quad (\because \text{指数行列の積の定理}) \\
&= \exp(O) \quad (\because X + (-X) = O) \\
&= I \quad (\because \text{零行列の指数行列})
\end{aligned}$$

故に $V'^{-1} = \exp(-X)$ であり、

$$\begin{aligned}
T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) &= V' \psi_\mu^\dagger V'^{-1} \quad (\because T_{(V')} \text{ の定義}) \\
&= \exp(X) \psi_\mu^\dagger \exp(-X) \quad (\because V' = \exp(X), V'^{-1} = \exp(-X))
\end{aligned}$$

Step 1: $[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}, \psi_\mu^\dagger] = \delta_{\mu-\nu,0}^M \psi_\nu^\dagger$

$$\begin{aligned}
\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} \psi_\mu^\dagger &= \psi_\nu^\dagger (\delta_{\mu-\nu,0}^M I - \psi_\mu^\dagger \psi_{-\nu}) & (\because [\psi_{-\nu}, \psi_\mu^\dagger]_+ &= \delta_{\mu-\nu,0}^M I) \\
&= \delta_{\mu-\nu,0}^M \psi_\nu^\dagger I - \psi_\nu^\dagger \psi_\mu^\dagger \psi_{-\nu} & (\because \text{分配則}) \\
&= \delta_{\mu-\nu,0}^M \psi_\nu^\dagger - \psi_\nu^\dagger \psi_\mu^\dagger \psi_{-\nu} & (\because \psi_\nu^\dagger I = \psi_\nu^\dagger) \\
&= \delta_{\mu-\nu,0}^M \psi_\nu^\dagger - (-\psi_\mu^\dagger \psi_\nu^\dagger) \psi_{-\nu} & (\because [\psi_\nu^\dagger, \psi_\mu^\dagger]_+ = 0) \\
&= \delta_{\mu-\nu,0}^M \psi_\nu^\dagger + \psi_\mu^\dagger \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} & (\because \text{加法逆元の符号則})
\end{aligned}$$

(反交換関係は 主張 9.36 による)。ゆえに

$$\begin{aligned}
[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}, \psi_\mu^\dagger] &= \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} \psi_\mu^\dagger - \psi_\mu^\dagger \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} & (\because \text{交換子の定義}) \\
&= (\delta_{\mu-\nu,0}^M \psi_\nu^\dagger + \psi_\mu^\dagger \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}) - \psi_\mu^\dagger \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} & (\because \text{直前の式変形}) \\
&= \delta_{\mu-\nu,0}^M \psi_\nu^\dagger & (\because \text{加法逆元による相殺})
\end{aligned}$$

Step 2: $[X, \psi_\mu^\dagger] = +\gamma(\theta_\mu) \psi_\mu^\dagger$

$$\begin{aligned}
[X, \psi_\mu^\dagger] &= + \sum_{\substack{\nu \in \{1, \dots, M\} \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}} \gamma(\theta_\nu) [\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}, \psi_\mu^\dagger] & (\because \text{scalar_identity_commutes}) \\
&= + \sum_{\substack{\nu \in \{1, \dots, M\} \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}} \gamma(\theta_\nu) \delta_{\mu-\nu,0}^M \psi_\nu^\dagger & (\because \text{Step 1})
\end{aligned}$$

$\delta_{\mu-\nu,0}^M \neq 0$ となる $\nu \in \{1, \dots, M\}$ を μ の場合分けで特定する。特定される ν はいずれも $\theta_\nu \equiv \pm \theta_\mu \pmod{2\pi}$ を満たし、 γ_2 は θ の $\cos, \sin, e^{i\theta}$ のみに依存するから $\gamma_2(\theta_\nu) = \gamma_2(\pm \theta_\mu)$ 。 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ と 主張 9.27 ($\gamma_2(-\theta_\mu) = -\gamma_2(\theta_\mu)$) より $\gamma_2(\pm \theta_\mu) \neq 0$ であるから、特定される ν は和の添字集合に属する。

a) $\mu \in \{1, \dots, M\}$ のとき: $\mu \equiv \nu \pmod{M}$ かつ $\nu \in \{1, \dots, M\}$ を満たす ν は $\nu = \mu$ のみ。よって $[X, \psi_\mu^\dagger] = \gamma(\theta_\mu) \psi_\mu^\dagger$ 。

b) $\mu = -k$ ($k \in \{1, \dots, M-1\}$) のとき: $-k \equiv \nu \pmod{M}$ かつ $\nu \in \{1, \dots, M\}$ を満たす ν は $\nu = M-k$ のみ。 $\theta_{M-k} = 2\pi - \theta_k$ より $e^{i\theta_{M-k}} = e^{-i\theta_k}$ 、 $\cos \theta_{M-k} = \cos \theta_k$ 、 $\sin \theta_{M-k} = -\sin \theta_k$ 。また 定義 5.27 より $\hat{Z}_{M-k}^{(-)} = \hat{Z}_{-k}^{(-)}$ 、 $\hat{Y}_{M-k} = \hat{Y}_{-k}$ 。定義 9.20 より

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta_{M-k}) &= i e^{i\theta_{M-k}} s_2^* (c_1 \cos \theta_{M-k} - i \sin \theta_{M-k} - s_1 c_2) & (\because \gamma_2 \text{ の定義}) \\
&= i e^{-i\theta_k} s_2^* (c_1 \cos \theta_k + i \sin \theta_k - s_1 c_2) & (\because e^{i\theta_{M-k}} = e^{-i\theta_k}, \cos \theta_{M-k} = \cos \theta_k, \sin \theta_{M-k} = -\sin \theta_k) \\
&= \gamma_2(-\theta_k) & (\because \gamma_2 \text{ の定義に } -\theta_k \text{ を代入した形}) \\
&= \gamma_2(\theta_{-k}) & (\because \theta_{-k} = -\theta_k)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma_2(-\theta_{M-k}) &= i e^{-i\theta_{M-k}} s_2^* (c_1 \cos \theta_{M-k} + i \sin \theta_{M-k} - s_1 c_2) & (\because \gamma_2 \text{ の定義に } -\theta_{M-k} \text{ を代入した形}) \\
&= i e^{i\theta_k} s_2^* (c_1 \cos \theta_k - i \sin \theta_k - s_1 c_2) & (\because e^{-i\theta_{M-k}} = e^{i\theta_k}, \cos \theta_{M-k} = \cos \theta_k, \sin \theta_{M-k} = -\sin \theta_k) \\
&= \gamma_2(\theta_k) & (\because \gamma_2 \text{ の定義}) \\
&= \gamma_2(-\theta_{-k}) & (\because -\theta_{-k} = \theta_k)
\end{aligned}$$

これらと 定義 9.34 より $\psi_{M-k}^\dagger = \psi_{-k}^\dagger$ 、また $\cos \theta_{M-k} = \cos \theta_k = \cos \theta_{-k}$ より $\gamma_1(\theta_{M-k}) = \gamma_1(\theta_{-k})$ ゆえ $\gamma(\theta_{M-k}) = \gamma(\theta_{-k})$ 。よって $[X, \psi_{-k}^\dagger] = \gamma(\theta_{-k}) \psi_{-k}^\dagger$ 。

c) $\mu = -M$ のとき: $\nu = M$ のみ。主張 5.30 より $\hat{Z}_M^{(-)} = \hat{Z}_{-M}^{(-)}$ 、 $\hat{Y}_M = \hat{Y}_{-M}$ 、主張 9.48 より $\gamma_2(\theta_M) = \gamma_2(\theta_{-M})$ 、 $\gamma_2(-\theta_M) = \gamma_2(-\theta_{-M})$ 。ゆえ 定義 9.34 より $\psi_M^\dagger = \psi_{-M}^\dagger$ 、 $\gamma(\theta_M) = \gamma(\theta_{-M})$ であり $[X, \psi_{-M}^\dagger] = \gamma(\theta_{-M}) \psi_{-M}^\dagger$ 。

a)~c) より全 $\mu \in \mathcal{M}$ について $[X, \psi_\mu^\dagger] = \gamma(\theta_\mu) \psi_\mu^\dagger$ である。したがって

$$\begin{aligned}
X\psi_\mu^\dagger &= \psi_\mu^\dagger X + \gamma(\theta_\mu)\psi_\mu^\dagger \quad (\because [X, \psi_\mu^\dagger] = \gamma(\theta_\mu)\psi_\mu^\dagger \text{ と交換子の定義}) \\
&= \psi_\mu^\dagger X + \psi_\mu^\dagger \gamma(\theta_\mu)I \quad (\because \gamma(\theta_\mu) \text{ はスカラー}) \\
&= \psi_\mu^\dagger (X + \gamma(\theta_\mu)I) \quad (\because \text{分配則})
\end{aligned}$$

Step 3: 帰納法で $X^n \psi_\mu^\dagger = \psi_\mu^\dagger (X + \gamma(\theta_\mu)I)^n$ を示す。 $n = 0$ のときは

$$\begin{aligned}
X^0 \psi_\mu^\dagger &= I \psi_\mu^\dagger \quad (\because \text{冪の定義 } X^0 = I) \\
&= \psi_\mu^\dagger \quad (\because \text{単位行列との積}) \\
&= \psi_\mu^\dagger I \quad (\because \text{単位行列との積}) \\
&= \psi_\mu^\dagger (X + \gamma(\theta_\mu)I)^0 \quad (\because \text{冪の定義 } (X + \gamma(\theta_\mu)I)^0 = I)
\end{aligned}$$

で成立する。 n で成立すると仮定すると

$$\begin{aligned}
X^{n+1} \psi_\mu^\dagger &= (X \cdot X^n) \psi_\mu^\dagger \quad (\because \text{冪の定義}) \\
&= X \cdot (X^n \psi_\mu^\dagger) \quad (\because \text{積の結合則}) \\
&= X \cdot (\psi_\mu^\dagger (X + \gamma(\theta_\mu)I)^n) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= (X \psi_\mu^\dagger) \cdot (X + \gamma(\theta_\mu)I)^n \quad (\because \text{積の結合則}) \\
&= (\psi_\mu^\dagger (X + \gamma(\theta_\mu)I)) \cdot (X + \gamma(\theta_\mu)I)^n \quad (\because \text{Step 2 のまとめ}) \\
&= \psi_\mu^\dagger ((X + \gamma(\theta_\mu)I) \cdot (X + \gamma(\theta_\mu)I)^n) \quad (\because \text{積の結合則}) \\
&= \psi_\mu^\dagger (X + \gamma(\theta_\mu)I)^{n+1} \quad (\because \text{冪の定義})
\end{aligned}$$

となるから、全 $n \geq 0$ で成立する。

Step 4: $\exp(X) \psi_\mu^\dagger = \psi_\mu^\dagger \exp(X + \gamma(\theta_\mu)I)$ 。

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^N \frac{X^n}{n!} \psi_\mu^\dagger &= \sum_{n=0}^N \frac{X^n \psi_\mu^\dagger}{n!} \quad (\because \text{有限和の各項へ右から } \psi_\mu^\dagger \text{ を掛ける}) \\
&= \sum_{n=0}^N \frac{\psi_\mu^\dagger (X + \gamma(\theta_\mu)I)^n}{n!} \quad (\because \text{Step 3}) \\
&= \psi_\mu^\dagger \sum_{n=0}^N \frac{(X + \gamma(\theta_\mu)I)^n}{n!} \quad (\because \text{有限和に対する分配則})
\end{aligned}$$

$N \rightarrow \infty$ の極限で 定理 4.3 より右辺は $\psi_\mu^\dagger \exp(X + \gamma(\theta_\mu)I)$ に収束し (主張 3.13)、 $\exp(X) \psi_\mu^\dagger = \psi_\mu^\dagger \exp(X + \gamma(\theta_\mu)I)$ 。

Step 5: 結論。 $(X + \gamma(\theta_\mu)I)$ と $(-X)$ は可換だから 定理 4.5 より、

$$\begin{aligned}
T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) &= \exp(X) \psi_\mu^\dagger \exp(-X) \quad (\because \text{証明冒頭の鎖}) \\
&= \psi_\mu^\dagger \exp(X + \gamma(\theta_\mu)I) \exp(-X) \quad (\because \text{Step 4}) \\
&= \psi_\mu^\dagger \exp((X + \gamma(\theta_\mu)I) + (-X)) \quad (\because \text{指数行列の積の定理}) \\
&= \psi_\mu^\dagger \exp(\gamma(\theta_\mu)I) \quad (\because (X + \gamma(\theta_\mu)I) + (-X) = \gamma(\theta_\mu)I) \\
&= \psi_\mu^\dagger \cdot e^{\gamma(\theta_\mu)I} \quad (\because (\gamma(\theta_\mu)I)^n = (\gamma(\theta_\mu))^n I) \\
&= e^{+\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu^\dagger \quad (\because \text{単位行列とのスカラー倍の積})
\end{aligned}$$

$T_{(V')}(\psi_\mu) = e^{-\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu$ について。

Step 1': $[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}, \psi_\mu] = -\delta_{\nu+\mu,0}^M \psi_{-\nu}$ 。

$$\begin{aligned}
\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} \psi_\mu &= \psi_\nu^\dagger (-\psi_\mu \psi_{-\nu}) & (\because [\psi_{-\nu}, \psi_\mu]_+ = 0) \\
&= -\psi_\nu^\dagger \psi_\mu \psi_{-\nu} & (\because \text{スカラー倍と行列の積の結合則}) \\
&= -(\delta_{\nu+\mu,0}^M I - \psi_\mu \psi_\nu^\dagger) \psi_{-\nu} & (\because [\psi_\nu^\dagger, \psi_\mu]_+ = \delta_{\nu+\mu,0}^M I) \\
&= -\delta_{\nu+\mu,0}^M I \psi_{-\nu} + \psi_\mu \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} & (\because \text{分配則}) \\
&= -\delta_{\nu+\mu,0}^M \psi_{-\nu} + \psi_\mu \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} & (\because I \psi_{-\nu} = \psi_{-\nu})
\end{aligned}$$

(反交換関係は 主張 9.36 による)。ゆえに $[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}, \psi_\mu] = -\delta_{\nu+\mu,0}^M \psi_{-\nu}$

Step 2': $[X, \psi_\mu] = -\gamma(\theta_\mu) \psi_{\mu\circ}$

$$\begin{aligned}
[X, \psi_\mu] &= \left[\sum_{\substack{\nu \in \{1, \dots, M\} \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}} \gamma(\theta_\nu) \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}, \psi_\mu \right] & (\because X \text{ の定義}) \\
&= \sum_{\substack{\nu \in \{1, \dots, M\} \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}} \gamma(\theta_\nu) [\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}, \psi_\mu] & (\because \text{交換子の有限和とスカラー倍への分配則}) \\
&= - \sum_{\substack{\nu \in \{1, \dots, M\} \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}} \gamma(\theta_\nu) \delta_{\nu+\mu,0}^M \psi_{-\nu} & (\because \text{Step 1'})
\end{aligned}$$

$\delta_{\nu+\mu,0}^M \neq 0$ となる $\nu \in \{1, \dots, M\}$ を μ の場合分けて特定し $\psi_{-\nu} = \psi_\mu$ を確認する (周期性の計算は Step 2 と対称的で、特定される ν が和の添字集合に属することも同様) :

- $\mu \in \{1, \dots, M-1\}$: $\nu = M - \mu$ 、 $\psi_{-(M-\mu)} = \psi_{\mu-M} = \psi_\mu$ 、 $\gamma(\theta_{M-\mu}) = \gamma(\theta_\mu)$ 。
- $\mu = M$: $\nu = M$ 、 $\psi_{-M} = \psi_M$ 。
- $\mu = -k$ ($k \in \{1, \dots, M-1\}$): $\nu = k$ 、 $\psi_{-k} = \psi_\mu$ 、 $\gamma(\theta_k) = \gamma(\theta_{-k})$ 。
- $\mu = -M$: $\nu = M$ 、 $\psi_{-M} = \psi_{-M}$ 、 $\gamma(\theta_M) = \gamma(\theta_{-M})$ 。

以上より全 $\mu \in \mathcal{M}$ について $[X, \psi_\mu] = -\gamma(\theta_\mu) \psi_\mu$ 、すなわち $X \psi_\mu = \psi_\mu (X - \gamma(\theta_\mu) I)$ 。Steps 3'~5' は $\psi_\mu^\dagger$ の証明と $\gamma(\theta_\mu) \rightarrow -\gamma(\theta_\mu)$ (符号反転) のみ異なり同様に成立し、

$$\begin{aligned}
T_{(V')}(\psi_\mu) &= \exp(X) \psi_\mu \exp(-X) & (\because \text{証明冒頭の鎖}) \\
&= \psi_\mu \exp(X - \gamma(\theta_\mu) I) \exp(-X) & (\because \text{Steps 3'-4'}) \\
&= \psi_\mu \exp((X - \gamma(\theta_\mu) I) + (-X)) & (\because \text{指数行列の積の定理}) \\
&= \psi_\mu \exp(-\gamma(\theta_\mu) I) & (\because (X - \gamma(\theta_\mu) I) + (-X) = -\gamma(\theta_\mu) I) \\
&= \psi_\mu \cdot e^{-\gamma(\theta_\mu) I} & (\because (-\gamma(\theta_\mu) I)^n = (-\gamma(\theta_\mu))^n I) \\
&= e^{-\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu & (\because \text{単位行列とのスカラー倍の積})
\end{aligned}$$

□

主張 9.43 ($\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ のとき $A(\theta_\mu) = I$)。 $\mathcal{M} := \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ とする。 $\mu \in \mathcal{M}$ が $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ を満たすとき、

$$A(\theta_\mu) = I \quad (2 \times 2 \text{ 単位行列})$$

証明. $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ を満たす $\mu \in \mathcal{M}$ を固定する。以下で引く関係式は 主張 9.27、主張 9.37、主張 9.38、定義 9.20 である。

Step 1: $\gamma_2(-\theta_\mu) = 0$ 。

$$\begin{aligned}\gamma_2(-\theta_\mu) &= -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)} \quad (\because \gamma_2 \text{ の対称性 } \gamma_2(-\theta_\mu) = -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)}) \\ &= -\overline{0} \quad (\because \gamma_2(\theta_\mu) = 0) \\ &= 0 \quad (\because \overline{0} = 0, -0 = 0)\end{aligned}$$

Step 2: $\gamma_1(\theta_\mu) = 1$ 。

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta_\mu)^2 &= 1 - \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because \det A(\theta_\mu) = 1 \text{ の等式 } \gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = 1 \text{ を移項}) \\ &= 1 - 0 \cdot 0 \quad (\because \gamma_2(\theta_\mu) = 0, \text{ Step 1}) \\ &= 1 \quad (\because 0 \cdot 0 = 0, 1 - 0 = 1)\end{aligned}$$

主張 9.38 より $\gamma_1(\theta_\mu) \geq 1 > 0$ であるから、 $\gamma_1(\theta_\mu)^2 = 1$ と合わせて $\gamma_1(\theta_\mu) = 1$ を得る。

Step 3: $A(\theta_\mu) = I$ 。

$$\begin{aligned}A(\theta_\mu) &= \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta_\mu) & \gamma_2(\theta_\mu) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu) \end{pmatrix} \quad (\because \det A(\theta_\mu) = 1 \text{ の証明中の成分表示。} A(\theta_\mu) \text{ の各成分の } \gamma_1, \gamma_2 \text{ による書き換え}) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because \gamma_2(\theta_\mu) = 0, \text{ Step 1, Step 2}) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because -0 = 0) \\ &= I \quad (\because 2 \times 2 \text{ 単位行列の定義})\end{aligned}$$

である。 □

主張 9.44 ($\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ のとき $T_{(V')}$ は $\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu$ を固定する). $\mathcal{M} := \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ とする。

$\mu \in \mathcal{M}$ が $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ を満たすとき、

$$T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = \hat{Z}_\mu^{(-)}, \quad T_{(V')}(\hat{Y}_\mu) = \hat{Y}_\mu$$

証明. $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ を満たす $\mu \in \mathcal{M}$ を固定する。定義 9.41 より $V' = \exp(X)$ 、ただし

$$X := \sum_{\substack{\nu \in \{1, \dots, M\} \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}} \gamma(\theta_\nu) \left(\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} - \frac{1}{2} \right)$$

である。定義 9.41 の定義により、 X の和は最初から $\gamma_2(\theta_\nu) \neq 0$ となる $\nu \in \{1, \dots, M\}$ のみにわたる。この ν については 定義 9.34 と 主張 9.27 より $\psi_\nu^\dagger, \psi_{-\nu}$ がともに定義されるので、 X の各項は well-defined である ($\gamma_2(\theta_\nu) = 0$ となる ν ははじめから和に含まれない)。

主張 9.42 の証明冒頭と同様に $V'^{-1} = \exp(-X)$ であり、 T_g の定義 (定義 9.11) より $T_{(V')}(W) = V' W V'^{-1} = \exp(X) W \exp(-X)$ ($W \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$) である。

Step 1: $\gamma_2(\theta_\nu) = 0 \Rightarrow \gamma(\theta_\nu) = 0$ 。

$\gamma_2(\theta_\nu) = 0$ とする。主張 9.37 より $\gamma_1(\theta_\nu)^2 + \gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu) = 1$ であるから、

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta_\nu)^2 &= 1 - \gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu) \quad (\because \det A(\theta_\nu) = 1) \\ &= 1 - 0 \cdot \gamma_2(-\theta_\nu) \quad (\because \gamma_2(\theta_\nu) = 0) \\ &= 1 \quad (\because 0 \cdot \gamma_2(-\theta_\nu) = 0)\end{aligned}$$

主張 9.38 より $\gamma_1(\theta_\nu) \geq 1 > 0$ であるから $\gamma_1(\theta_\nu) = 1$ 。ここで $\gamma(\theta_\nu)$ の定義は 定義 9.39 であるから、

$$\begin{aligned}
\gamma(\theta_\nu) &= \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta_\nu)) \quad (\because \gamma(\theta_\nu) \text{ の定義}) \\
&= \operatorname{arccosh}(1) \quad (\because \gamma_1(\theta_\nu) = 1) \\
&= 0 \quad (\because \operatorname{arccosh}(1) = 0)
\end{aligned}$$

である。

Step 2: $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ かつ $\delta_{\mu\pm\nu,0}^M \neq 0$ ならば $\gamma_2(\theta_\nu) = 0$ (ゆえに $\gamma(\theta_\nu) = 0$)。

$\nu \in \{1, \dots, M\}$ とし、 $\delta_{\mu-\nu,0}^M \neq 0$ または $\delta_{\mu+\nu,0}^M \neq 0$ と仮定する。すなわち $\mu \equiv \nu \pmod{M}$ または $\mu \equiv -\nu \pmod{M}$ 。主張 9.26 より $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ は $\sin \theta_\mu = 0$ かつ $c_1 \cos \theta_\mu = s_1 c_2$ と同値である。 $\theta_\kappa = \frac{2\pi\kappa}{M}$ であるから $\mu \equiv \nu \pmod{M}$ のとき、ある $\ell \in \mathbb{Z}$ で $\nu = \mu + \ell M$ と書け $\theta_\nu = \theta_\mu + 2\pi\ell$ 、 $\mu \equiv -\nu \pmod{M}$ のときは $\theta_\nu = -\theta_\mu + 2\pi\ell$ である。

いずれの場合も、

$$\begin{aligned}
\cos \theta_\nu &= \cos \theta_\mu \quad (\because \text{三角関数の周期性と偶奇性}) \\
\sin \theta_\nu &= \pm \sin \theta_\mu \quad (\because \text{三角関数の周期性と偶奇性}) \\
&= 0 \quad (\because \sin \theta_\mu = 0) \\
c_1 \cos \theta_\nu &= c_1 \cos \theta_\mu \quad (\because \cos \theta_\nu = \cos \theta_\mu) \\
&= s_1 c_2 \quad (\because c_1 \cos \theta_\mu = s_1 c_2) \\
\gamma_2(\theta_\nu) &= 0 \quad (\because \text{主張 9.26}) \\
\gamma(\theta_\nu) &= 0 \quad (\because \text{Step 1})
\end{aligned}$$

Step 3: $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ のとき $[X, \hat{Z}_\mu^{(-)}] = O$ かつ $[X, \hat{Y}_\mu] = O$ 。

各 $\nu \in \{1, \dots, M\}$ ($\gamma_2(\theta_\nu) \neq 0$) について $c_\nu := \frac{1}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_\nu)}$ とおくと 定義 9.34 より

$$\begin{aligned}
\psi_\nu^\dagger &= c_\nu (+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)} \hat{Z}_\nu^{(-)} + \gamma_2(-\theta_\nu) \hat{Y}_\nu) \quad (\because \text{フェルミオンの定義と } c_\nu \text{ の定義}) \\
\psi_{-\nu} &= c_{-\nu} (-i\sqrt{\gamma_2(\theta_{-\nu})\gamma_2(-\theta_{-\nu})} \hat{Z}_{-\nu}^{(-)} + \gamma_2(-\theta_{-\nu}) \hat{Y}_{-\nu}) \quad (\because \text{フェルミオンの定義と } c_{-\nu} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

である。主張 8.1 と反交換子の双線型性、 $[\hat{Z}_\kappa^{(-)}, \hat{Y}_\lambda]_+ = 0$ より ($\delta_{\nu+\mu,0}^M = \delta_{\mu+\nu,0}^M$, $\delta_{-\nu+\mu,0}^M = \delta_{\mu-\nu,0}^M$)

$$\begin{aligned}
[\psi_\nu^\dagger, \hat{Z}_\mu^{(-)}]_+ &= c_\nu (+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)}) \cdot 2M\delta_{\mu+\nu,0}^M I \quad (\because \text{フェルミオンの表示、反交換子の双線型性、} [\hat{Z}_\nu^{(-)}, \hat{Y}_\mu]_+ = 0) \\
[\psi_{-\nu}, \hat{Z}_\mu^{(-)}]_+ &= c_{-\nu} (-i\sqrt{\gamma_2(\theta_{-\nu})\gamma_2(-\theta_{-\nu})}) \cdot 2M\delta_{\mu-\nu,0}^M I \quad (\because \text{フェルミオンの表示、反交換子の双線型性、} [\hat{Z}_{-\nu}^{(-)}, \hat{Y}_\mu]_+ = 0) \\
[\psi_\nu^\dagger, \hat{Y}_\mu]_+ &= c_\nu \gamma_2(-\theta_\nu) \cdot 2M\delta_{\mu+\nu,0}^M I \quad (\because \text{フェルミオンの表示、反交換子の双線型性、} [\hat{Z}_\nu^{(-)}, \hat{Y}_\mu]_+ = 0) \\
[\psi_{-\nu}, \hat{Y}_\mu]_+ &= c_{-\nu} \gamma_2(-\theta_{-\nu}) \cdot 2M\delta_{\mu-\nu,0}^M I \quad (\because \text{フェルミオンの表示、反交換子の双線型性、} [\hat{Z}_{-\nu}^{(-)}, \hat{Y}_\mu]_+ = 0)
\end{aligned}$$

$W \in \{\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu\}$ を固定する。いま $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ かつ $\gamma_2(\theta_\nu) \neq 0$ であるから、Step 2 の対偶より $\delta_{\mu+\nu,0}^M = 0$ かつ $\delta_{\mu-\nu,0}^M = 0$ 。よって上の反交換子はすべて O となる: $[\psi_\nu^\dagger, W]_+ = O$, $[\psi_{-\nu}, W]_+ = O$ 。したがって 主張 1.56 より

$$\begin{aligned}
[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}, W] &= \psi_\nu^\dagger [\psi_{-\nu}, W]_+ - [\psi_\nu^\dagger, W]_+ \psi_{-\nu} \quad (\because \text{積の交換子を反交換子で表す恒等式}) \\
&= \psi_\nu^\dagger O - O \psi_{-\nu} \quad (\because [\psi_{-\nu}, W]_+ = O, [\psi_\nu^\dagger, W]_+ = O) \\
&= O \quad (\because AO = OA = O)
\end{aligned}$$

また、

$$\begin{aligned}
[\tfrac{1}{2}I, W] &= O & (\because \text{主張 3.6}) \\
[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} - \tfrac{1}{2}I, W] &= [\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}, W] - [\tfrac{1}{2}I, W] & (\because \text{交換子の加法性}) \\
&= O - O & (\because [\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}, W] = O, [\tfrac{1}{2}I, W] = O) \\
&= O & (\because O - O = O) \\
[\gamma(\theta_\nu)(\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} - \tfrac{1}{2}I), W] &= \gamma(\theta_\nu)[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} - \tfrac{1}{2}I, W] & (\because \text{交換子の斉次性}) \\
&= \gamma(\theta_\nu)O & (\because [\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} - \tfrac{1}{2}I, W] = O) \\
&= O & (\because zO = O \ (z \in \mathbb{C})) \\
[X, W] &= \sum_{\substack{\nu=1 \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}}^M [\gamma(\theta_\nu)(\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} - \tfrac{1}{2}I), W] & (\because X \text{ の定義と交換子の加法性}) \\
&= \sum_{\substack{\nu=1 \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}}^M O & (\because \text{各 } \nu \text{ に対する直前の等式}) \\
&= O & (\because \text{零行列の有限和})
\end{aligned}$$

W は $\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu$ いずれでもよいから $[X, \hat{Z}_\mu^{(-)}] = O, [X, \hat{Y}_\mu] = O$ 。

Step 4: $[X, W] = O \Rightarrow \exp(X)W \exp(-X) = W$ 。

$[X, W] = O$ すなわち $XW = WX$ とする。帰納法で $X^n W = W X^n$ ($n \geq 0$) を示す。

$$\begin{aligned}
X^{n+1}W &= X \cdot X^n W & (\because X^{n+1} = X \cdot X^n) \\
&= X \cdot W X^n & (\because X^n W = W X^n) \\
&= (XW)X^n & (\because \text{行列積の結合則}) \\
&= (WX)X^n & (\because XW = WX) \\
&= W X^{n+1} & (\because \text{行列積の結合則と } X^{n+1} = X \cdot X^n)
\end{aligned}$$

$n = 0$ で $X^0 W = W = W X^0$ だから全 $n \geq 0$ で成立する。よって

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{n=0}^N \frac{X^n}{n!} \right) W &= \sum_{n=0}^N \frac{X^n W}{n!} & (\because \text{行列積の有限和に関する分配則}) \\
&= \sum_{n=0}^N \frac{W X^n}{n!} & (\because X^n W = W X^n) \\
&= W \left(\sum_{n=0}^N \frac{X^n}{n!} \right) & (\because \text{行列積の有限和に関する分配則})
\end{aligned}$$

$N \rightarrow \infty$ の極限で 定理 4.3・主張 3.13 より $\exp(X)W = W \exp(X)$ 。 X と $-X$ は可換だから 定理 4.5 より $\exp(X) \exp(-X) = \exp(O) = I$ (定理 4.6) であり、

$$\begin{aligned}
T_{(V')}(W) &= \exp(X)W \exp(-X) & (\because T_{(V')} \text{ の定義}) \\
&= W \exp(X) \exp(-X) & (\because \exp(X)W = W \exp(X)) \\
&= WI & (\because \exp(X) \exp(-X) = I) \\
&= W & (\because I \text{ は単位行列})
\end{aligned}$$

Step 3 より $[X, \hat{Z}_\mu^{(-)}] = O$ かつ $[X, \hat{Y}_\mu] = O$ であるから $T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = \hat{Z}_\mu^{(-)}, T_{(V')}(\hat{Y}_\mu) = \hat{Y}_\mu$ 。 $\square$

主張 9.45 ($T_{(V)}$ と $T_{(V')}$ は $\hat{Z}^{(-)}, \hat{Y}$ 上で一致する)。 $\mathcal{M} := \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ とする。すべての $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), \quad T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) = T_{(V')}(\hat{Y}_\mu)$$

証明. $\mu \in \mathcal{M}$ を固定する。 $T_{(V)}$ はその定義(定義 9.18)より 3 つの写像 $T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}, T_{(V_2)}, T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}$ の合成であり、各写像は T_g (定義 9.11) の形で 定理 1.10 より線型写像であるから、合成として $T_{(V)}$ も線型写像である。 $T_{(V')}$ は T_g の $g = V'$ の場合であり、定義 9.41 より V' は可逆であるから 定理 1.10 より線型写像である。 $\gamma_2(\theta_\mu)$ が 0 であるか否かで場合分けする。

場合 1: $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ 。このとき 定義 9.34 より $\psi_\mu^\dagger, \psi_\mu$ が定義され、

$$\begin{pmatrix} \psi_\mu^\dagger & \psi_\mu \end{pmatrix} = (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) P_\mu$$

が成り立つ。ここで P_μ は 主張 9.32 で与えられる 2×2 複素行列

$$P_\mu = \frac{1}{2\sqrt{M} \gamma_2(-\theta_\mu)} \begin{pmatrix} +i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} & -i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ \gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_2(-\theta_\mu) \end{pmatrix}$$

である。まず P_μ が可逆であることを示す。準備として、主張 9.27 より $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0 \iff \gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ 、ゆえ $\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ かつ $\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ かつ $\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \neq 0$ (主張 1.51 より $(\sqrt{z})^2 = z \neq 0$ ゆえ $\sqrt{z} \neq 0$) である。行列式は

$$\begin{aligned} \det P_\mu &= \frac{1}{(2\sqrt{M} \gamma_2(-\theta_\mu))^2} \left((+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)})\gamma_2(-\theta_\mu) - (-i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)})\gamma_2(-\theta_\mu) \right) \quad (\because P_\mu \text{ 306e5b9a7fa93068 } 2 \times 2 \text{ 884c5217306e884c52175f0f}) \\ &= \frac{1}{(2\sqrt{M} \gamma_2(-\theta_\mu))^2} \cdot 2i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because 5206914d5f8b30687b2653f7306e8a087b97) \\ &= \frac{2i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \gamma_2(-\theta_\mu)}{4M \gamma_2(-\theta_\mu)^2} \quad (\because (2\sqrt{M} \gamma_2(-\theta_\mu))^2 = 4M \gamma_2(-\theta_\mu)^2, (\sqrt{M})^2 = M \text{ is_square_of_sqrt}) \\ &= \frac{i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2M \gamma_2(-\theta_\mu)} \quad (\because \gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0 \text{ による共通因子 } 2\gamma_2(-\theta_\mu) \text{ の約分}) \end{aligned}$$

である。分子は $i \neq 0$ と $\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \neq 0$ (準備) の積なので零でなく、分母 $2M \gamma_2(-\theta_\mu)$ も零でない。よって $\det P_\mu \neq 0$ であり P_μ は可逆である。

$$P_\mu^{-1} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{pmatrix} \quad (\text{各 } q_{ij} \in \mathbb{C}) \text{ とおくと、}$$

$$\begin{aligned} (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) &= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) I \quad (\because \text{単位行列との積}) \\ &= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) (P_\mu P_\mu^{-1}) \quad (\because P_\mu P_\mu^{-1} = I) \\ &= \left((\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) P_\mu \right) P_\mu^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \\ &= \begin{pmatrix} \psi_\mu^\dagger & \psi_\mu \end{pmatrix} P_\mu^{-1} \quad (\because \text{def_fermi}) \\ &= \begin{pmatrix} q_{11}\psi_\mu^\dagger + q_{21}\psi_\mu & q_{12}\psi_\mu^\dagger + q_{22}\psi_\mu \end{pmatrix} \quad (\because 1 \times 2 \text{ 行列と } 2 \times 2 \text{ 行列の積の定義}) \end{aligned}$$

すなわち $\hat{Z}_\mu^{(-)} = q_{11}\psi_\mu^\dagger + q_{21}\psi_\mu$ 、 $\hat{Y}_\mu = q_{12}\psi_\mu^\dagger + q_{22}\psi_\mu$ である。一方、主張 9.35 と 主張 9.40 より

$$\begin{aligned} T_{(V)}(\psi_\mu^\dagger) &= \lambda_{+, \mu} \psi_\mu^\dagger \quad (\because \text{フェルミオン生成演算子への作用}) \\ &= e^{\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu^\dagger \quad (\because \lambda_{+, \mu} = e^{\gamma(\theta_\mu)}), \\ T_{(V)}(\psi_\mu) &= \lambda_{-, \mu} \psi_\mu \quad (\because \text{フェルミオン消滅演算子への作用}) \\ &= e^{-\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu \quad (\because \lambda_{-, \mu} = e^{-\gamma(\theta_\mu)}). \end{aligned}$$

であり、主張 9.42 より

$$T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) = e^{\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu^\dagger, \quad T_{(V')}(\psi_\mu) = e^{-\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu$$

である。したがって

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(\psi_\mu^\dagger) &= e^{\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu^\dagger \quad (\because \text{直前の } T_{(V)} \text{ の作用}) \\
&= T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) \quad (\because \text{直前の } T_{(V')} \text{ の作用}), \\
T_{(V)}(\psi_\mu) &= e^{-\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu \quad (\because \text{直前の } T_{(V)} \text{ の作用}) \\
&= T_{(V')}(\psi_\mu) \quad (\because \text{直前の } T_{(V')} \text{ の作用}).
\end{aligned}$$

が成り立つ。これより、

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= T_{(V)}(q_{11}\psi_\mu^\dagger + q_{21}\psi_\mu) \quad (\because \hat{Z}_\mu^{(-)} = q_{11}\psi_\mu^\dagger + q_{21}\psi_\mu) \\
&= q_{11}T_{(V)}(\psi_\mu^\dagger) + q_{21}T_{(V)}(\psi_\mu) \quad (\because T_{(V)} \text{ の線型性}) \\
&= q_{11}T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) + q_{21}T_{(V')}(\psi_\mu) \quad (\because \text{直前の二つの作用の一致}) \\
&= T_{(V')}(q_{11}\psi_\mu^\dagger + q_{21}\psi_\mu) \quad (\because T_{(V')} \text{ の線型性}) \\
&= T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) \quad (\because q_{11}\psi_\mu^\dagger + q_{21}\psi_\mu = \hat{Z}_\mu^{(-)})
\end{aligned}$$

が成り立つ。また、

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) &= T_{(V)}(q_{12}\psi_\mu^\dagger + q_{22}\psi_\mu) \quad (\because \hat{Y}_\mu = q_{12}\psi_\mu^\dagger + q_{22}\psi_\mu) \\
&= q_{12}T_{(V)}(\psi_\mu^\dagger) + q_{22}T_{(V)}(\psi_\mu) \quad (\because T_{(V)} \text{ の線型性}) \\
&= q_{12}T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) + q_{22}T_{(V')}(\psi_\mu) \quad (\because \text{直前の二つの作用の一致}) \\
&= T_{(V')}(q_{12}\psi_\mu^\dagger + q_{22}\psi_\mu) \quad (\because T_{(V')} \text{ の線型性}) \\
&= T_{(V')}(\hat{Y}_\mu) \quad (\because q_{12}\psi_\mu^\dagger + q_{22}\psi_\mu = \hat{Y}_\mu).
\end{aligned}$$

場合 2: $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ 。 $T_{(V)}$ について、主張 9.21 と 主張 9.43 より

$$\begin{aligned}
(T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{(V)}(\hat{Y}_\mu)) &= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)A(\theta_\mu) \quad (\because T_{(V)} = A(\theta_\mu) \text{ の作用}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)I \quad (\because \gamma_2(\theta_\mu) = 0 \text{ のとき } A(\theta_\mu) = I : \text{A_theta_is_identity_when_gamma2_zero}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) \quad (\because \text{単位行列との積})
\end{aligned}$$

すなわち $T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = \hat{Z}_\mu^{(-)}$ 、 $T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) = \hat{Y}_\mu$ 。したがって両者は一致する。

結論: 場合 1, 2 いずれでも $T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)})$ 、 $T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) = T_{(V')}(\hat{Y}_\mu)$ が成り立つ。 $\mu \in \mathcal{M}$ は任意であったから、主張が示された。 $\square$

主張 9.46 ($T_{(V)} = T_{(V')}$).

$$T_{(V)} = T_{(V')}$$

すなわち、任意の $x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ に対して $T_{(V)}(x) = T_{(V')}(x)$ である。

証明. Step 1: $T_{(V)}$ と $T_{(V')}$ は単位的環準同型かつ線型である。

定義 9.18 より、任意の $X \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$T_{(V)}(X) = T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \left(T_{V_2} \left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(X) \right) \right) \quad (\because \text{定義 9.18})$$

である。すなわち $T_{(V)} = T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \circ T_{V_2} \circ T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}$ である。各因子 $T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}$ 、 T_{V_2} は T_g (定義 9.11) の形であり、定義 9.18 で T_g が用いられている時点で $(V_1^{(\pm)})^{1/2}$ 、 V_2 は可逆である。

$$V := (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}$$

とおく。可逆行列の積は可逆だから V は可逆である。主張 1.55 の合成則を 2 回適用すると、

$$\begin{aligned}
T_{(V)} &= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \circ T_{V_2} \circ T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \quad (\because \text{def_T_V}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2} \circ T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \quad (\because \text{conjugation_is_ring_homomorphism}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}} \quad (\because \text{conjugation_is_ring_homomorphism}) \\
&= T_V \quad (\because V = (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2})
\end{aligned}$$

が成り立つ。よって $T_{(V)} = T_V$ であり、 V は可逆だから 主張 1.55 より $T_{(V)}$ は乗法的かつ単位的 ($T_{(V)}(I) = I$) であり、定理 1.10 より線型である。

$T_{(V')}$ は T_g (定義 9.11) の $g = V'$ の場合であり、定義 9.41 より V' は可逆である。したがって 主張 1.55 より $T_{(V')}$ は乗法的かつ単位的であり、定理 1.10 より線型である。

Step 2: $T_{(V)}$ と $T_{(V')}$ は各 Z_m, Y_m 上で一致する。

各 $m \in \{1, \dots, M\}$ について、主張 5.31 より

$$Z_m = \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(i m \frac{2\pi\mu}{M}\right) \quad (\because \text{主張 5.31})$$

$$Y_m = \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \hat{Y}_\mu \exp\left(i m \frac{2\pi\mu}{M}\right) \quad (\because \text{主張 5.31})$$

が成り立つ。 $T_{(V)}, T_{(V')}$ は線型 (Step 1) であり、主張 9.45 より各 $\mu \in \mathcal{M}$ で $T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)})$ かつ $T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) = T_{(V')}(\hat{Y}_\mu)$ であるから、

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(Z_m) &= T_{(V)}\left(\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(i m \frac{2\pi\mu}{M}\right)\right) \quad (\because \text{recover_Z_Y_from_hatZ_hatY}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \exp\left(i m \frac{2\pi\mu}{M}\right) T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) \quad (\because T_{(V)} \text{ の線型性}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \exp\left(i m \frac{2\pi\mu}{M}\right) T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) \quad (\because T_V = T_{V'} \text{ on } \text{hatZ_hatY}) \\
&= T_{(V')}\left(\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(i m \frac{2\pi\mu}{M}\right)\right) \quad (\because T_{(V')} \text{ の線型性}) \\
&= T_{(V')}(Z_m) \quad (\because \text{recover_Z_Y_from_hatZ_hatY})
\end{aligned}$$

が成り立つ。同様に、

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(Y_m) &= T_{(V)}\left(\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \hat{Y}_\mu \exp\left(i m \frac{2\pi\mu}{M}\right)\right) \quad (\because \text{recover_Z_Y_from_hatZ_hatY}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \exp\left(i m \frac{2\pi\mu}{M}\right) T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) \quad (\because T_{(V)} \text{ の線型性}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \exp\left(i m \frac{2\pi\mu}{M}\right) T_{(V')}(\hat{Y}_\mu) \quad (\because T_{(V)} = T_{(V')} \text{ on } \hat{Z} \text{ on } \hat{Y}) \\
&= T_{(V')}\left(\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \hat{Y}_\mu \exp\left(i m \frac{2\pi\mu}{M}\right)\right) \quad (\because T_{(V')} \text{ の線型性}) \\
&= T_{(V')}(Y_m) \quad (\because \text{recover_Z_Y_from_hatZ_hatY})
\end{aligned}$$

が成り立つ。よってすべての $m \in \{1, \dots, M\}$ について

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(Z_m) &= T_{(V')}(Z_m) \quad (\because \text{直前の } Z_m \text{ に対する式変形}) \\
T_{(V)}(Y_m) &= T_{(V')}(Y_m) \quad (\because \text{直前の } Y_m \text{ に対する式変形})
\end{aligned}$$

である。

Step 3: 一致する元の集合は、和・スカラー倍・積で閉じ、単位元を含む。
集合

$$\mathcal{E} := \{x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) : T_{(V)}(x) = T_{(V')}(x)\}$$

を考える。 $\mathcal{E}$ が $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の部分集合として、和・スカラー倍・積について閉じ、単位元を含むことを示す。

(加法・スカラー倍について閉じる) $x, y \in \mathcal{E}$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、 $T_{(V)}, T_{(V')}$ は線型 (Step 1) であるから

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(\alpha x + \beta y) &= \alpha T_{(V)}(x) + \beta T_{(V)}(y) \quad (\because T_{(V)} \text{ の線型性}) \\
&= \alpha T_{(V')}(x) + \beta T_{(V')}(y) \quad (\because x, y \in \mathcal{E}) \\
&= T_{(V')}(\alpha x + \beta y) \quad (\because T_{(V')} \text{ の線型性})
\end{aligned}$$

$$\alpha x + \beta y \in \mathcal{E} \quad (\because \mathcal{E} \text{ の定義と直前の等式})$$

(積について閉じる) $x, y \in \mathcal{E}$ について、 $T_{(V)}, T_{(V')}$ は乗法的 (Step 1) であるから

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(xy) &= T_{(V)}(x) T_{(V)}(y) \quad (\because T_{(V)} \text{ の乗法性, conjugation_is_ring_homomorphism}) \\
&= T_{(V')}(x) T_{(V')}(y) \quad (\because x, y \in \mathcal{E}) \\
&= T_{(V')}(xy) \quad (\because T_{(V')} \text{ の乗法性, conjugation_is_ring_homomorphism})
\end{aligned}$$

$$xy \in \mathcal{E} \quad (\because \mathcal{E} \text{ の定義と直前の等式})$$

(単位元を含む) Step 1 の単位性より

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(I) &= I \quad (\because T_{(V)} \text{ の単位性}) \\
&= T_{(V')}(I) \quad (\because T_{(V')} \text{ の単位性})
\end{aligned}$$

$$I \in \mathcal{E} \quad (\because \mathcal{E} \text{ の定義と直前の等式})$$

以上より $\mathcal{E}$ は単位元を含み、和・スカラー倍・積について閉じる $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の部分集合である。

Step 4: 結論。

Step 2 より $Z_1, \dots, Z_M, Y_1, \dots, Y_M \in \mathcal{E}$ である。 $\mathcal{E}$ は $S := \{Z_1, \dots, Z_M, Y_1, \dots, Y_M\}$ を含み、和・スカラー倍・積について閉じ、単位元を含む (Step 3)。したがって、 S を含み和・スカラー倍・積について閉じ単位元を含む最小の部分集合 $\mathcal{A}$ (主張 5.32 の $\mathcal{A}$) について $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$ である。主張 5.32 より $\mathcal{A} = \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ であるから、

$$\begin{aligned} \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) &= \mathcal{A} & (\because Z_Y_generate_algebra) \\ &\subseteq \mathcal{E} & (\because \mathcal{E} \text{ は生成元を含み、和・スカラー倍・積について閉じ、単位元を含む}) \\ &\subseteq \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) & (\because \mathcal{E} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

したがって

$$\mathcal{E} = \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \quad (\because \text{二つの包含による集合の相等})$$

である。任意の $x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$T_{(V)}(x) = T_{(V')}(x) \quad (\because x \in \mathcal{E} \text{ と } \mathcal{E} \text{ の定義})$$

なので

$$T_{(V)} = T_{(V')} \quad (\because \text{写像の相等は全ての入力での値の相等})$$

が成り立つことを意味する。 □

主張 9.47 ($V = cV'$ (定数倍を除いて一致)). ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して、

$$V = c \cdot V'$$

ここで $V := (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ (定義 9.18 で導入され、主張 9.46 の Step 1 で $T_{(V)} = T_V$ が示された行列) とする。

証明. Step 1: $W := V'^{-1}V$ は可逆である。

主張 9.46 の Step 1 より、 $V := (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ は可逆である。また 定義 9.41 より V' は可逆であり、可逆行列の逆行列 V'^{-1} も可逆である。

$$W := V'^{-1}V$$

とおく。可逆行列の積は可逆であるから W は可逆である。特に W の逆行列 W^{-1} が存在する。

左から V' を掛けると

$$\begin{aligned} V'W &= V'(V'^{-1}V) \quad (\because W = V'^{-1}V) \\ &= (V'V'^{-1})V \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} V \quad (\because V'V'^{-1} = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}) \\ &= V \quad (\because \text{単位元の性質}) \end{aligned}$$

すなわち

$$V = V'W$$

を得る。

Step 2: W はすべての $x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と可換である。

主張 9.46 より $T_{(V)} = T_{(V')}$ であり、主張 9.46 の Step 1 で示された $T_{(V)} = T_V$ と合わせると、任意の $x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned} T_V(x) &= T_{(V)}(x) \quad (\because T_V_eq_T_Vprime \text{ の Step 1: } T_{(V)} = T_V) \\ &= T_{(V')}(x) \quad (\because T_V_eq_T_Vprime : T_{(V)} = T_{(V')}) \end{aligned}$$

が成り立つ。両辺を 定理 1.10 の共役写像の定義で書き下すと、任意の x について

$$\begin{aligned} VxV^{-1} &= T_V(x) \quad (\because \text{mat_conj}) \\ &= T_{(V')}(x) \quad (\because \text{上の等式}) \\ &= V'xV'^{-1} \quad (\because \text{mat_conj}) \end{aligned}$$

すなわち

$$VxV^{-1} = V'xV'^{-1}$$

である。

ここで Step 1 の $V = V'W$ を代入する。まず逆行列について、主張 1.55 の Step 3 で確認された積の逆元の公式 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ より

$$\begin{aligned} V^{-1} &= (V'W)^{-1} \quad (\because V = V'W) \\ &= W^{-1}V'^{-1} \quad (\because (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}) \end{aligned}$$

が成り立つ。これらを上の等式 $VxV^{-1} = V'xV'^{-1}$ の左辺に代入すると、任意の x について

$$\begin{aligned} V'(WxW^{-1})V'^{-1} &= (V'W)x(W^{-1}V'^{-1}) \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \\ &= VxV^{-1} \quad (\because V = V'W, V^{-1} = W^{-1}V'^{-1}) \\ &= V'xV'^{-1} \quad (\because VxV^{-1} = V'xV'^{-1}) \end{aligned}$$

が成り立つ。両辺に左から V'^{-1} 、右から V' を掛けると、任意の x について

$$\begin{aligned} WxW^{-1} &= V'^{-1}(V'(WxW^{-1})V'^{-1})V' \quad (\because V'^{-1}V' = V'V'^{-1} = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}) \\ &= V'^{-1}(V'xV'^{-1})V' \quad (\because V'(WxW^{-1})V'^{-1} = V'xV'^{-1}) \\ &= x \quad (\because V'^{-1}V' = V'V'^{-1} = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}) \end{aligned}$$

すなわち $WxW^{-1} = x$ である。両辺に右から W を掛けると、任意の $x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned} Wx &= (WxW^{-1})W \quad (\because W^{-1}W = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}) \\ &= xW \quad (\because WxW^{-1} = x) \end{aligned}$$

が成り立つ。したがって W はすべての $x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と可換である。

Step 3: W はスカラーである。

Step 2 より W はすべての $x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と可換であるから、主張 3.7 より、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して

$$W = c \cdot I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \quad (\because \text{centralizer_is_scalar})$$

が成り立つ。

Step 4: $c \neq 0$ であること。

Step 1 より W は可逆である。仮に $c = 0$ ならば $W = 0 \cdot I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} = O$ (零行列) となるが、零行列は可逆でない (任意の A について $OA = O \neq I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$) から、 W が可逆であることに矛盾する。よって $c \neq 0$ 、すなわち $c \in \mathbb{C}^\times$ である。

Step 5: 結論。

Step 1 の $V = V'W$ に Step 3 の $W = c \cdot I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ を代入すると

$$\begin{aligned}
V &= V'W \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= V' \left(c \cdot I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) \quad (\because \text{Step 3}) \\
&= c \cdot \left(V' I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right) \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の可換性}) \\
&= c \cdot V' \quad (\because \text{単位元の性質})
\end{aligned}$$

が成り立つ。Step 4 より $c \in \mathbb{C}^\times$ であるから、求める $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して $V = c \cdot V'$ である。 $\square$

主張 9.48 ($\gamma_2(\theta_M) = \gamma_2(\theta_{-M})$, $\gamma_2(-\theta_M) = \gamma_2(-\theta_{-M})$).

$$\gamma_2(\theta_M) = \gamma_2(\theta_{-M}), \quad \gamma_2(-\theta_M) = \gamma_2(-\theta_{-M})$$

証明. $\theta_M = 2\pi$ 、 $\theta_{-M} = -2\pi$ である。したがって θ_M と θ_{-M} の指数関数・余弦・正弦の値はそれぞれ一致する。

$$\begin{aligned}
e^{i\theta_M} &= e^{2\pi i} & (\because \theta_M = 2\pi) \\
&= 1 & (\because e^{2\pi i} = 1) \\
&= e^{-2\pi i} & (\because e^{-2\pi i} = 1) \\
&= e^{i\theta_{-M}} & (\because \theta_{-M} = -2\pi), \\
\cos \theta_M &= \cos 2\pi & (\because \theta_M = 2\pi) \\
&= 1 & (\because \cos 2\pi = 1) \\
&= \cos(-2\pi) & (\because \cos(-2\pi) = 1) \\
&= \cos \theta_{-M} & (\because \theta_{-M} = -2\pi), \\
\sin \theta_M &= \sin 2\pi & (\because \theta_M = 2\pi) \\
&= 0 & (\because \sin 2\pi = 0) \\
&= \sin(-2\pi) & (\because \sin(-2\pi) = 0) \\
&= \sin \theta_{-M} & (\because \theta_{-M} = -2\pi).
\end{aligned}$$

定義 9.20 にこれらの値を代入すると、

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta_M) &= i \cdot 1 \cdot s_2^*(c_1 \cdot 1 - i \cdot 0 - s_1 c_2) \quad (\because \text{def_A_theta と上の指数関数・余弦・正弦の値}) \\
&= i s_2^*(c_1 - s_1 c_2) & (\because \text{複素数の四則演算}) \\
&= \gamma_2(\theta_{-M}) & (\because \text{def_A_theta と上の指数関数・余弦・正弦の値}), \\
\gamma_2(-\theta_M) &= i \cdot 1 \cdot s_2^*(c_1 \cdot 1 - i \cdot 0 - s_1 c_2) \quad (\because -\theta_M = -2\pi \text{ と def_A_theta}) \\
&= i s_2^*(c_1 - s_1 c_2) & (\because \text{複素数の四則演算}) \\
&= \gamma_2(-\theta_{-M}) & (\because -\theta_{-M} = 2\pi \text{ と def_A_theta}).
\end{aligned}$$

$\square$

主張 9.49 ($c_1 = s_1 c_2$ は臨界条件 $s_1 s_2 = 1$ と同値). 定義 5.8 の記号 $c_1 = \cosh 2K_1$ 、 $s_1 = \sinh 2K_1$ 、 $c_2 = \cosh 2K_2$ 、 $s_2 = \sinh 2K_2$ について、 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。このとき

$$c_1 = s_1 c_2 \iff s_1 s_2 = 1$$

すなわち $\cosh 2K_1 = \sinh 2K_1 \cosh 2K_2$ であることと、Ising 模型の臨界条件 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ であることは同値である。

この同値性から、 γ_2 の零点と Ising 模型の臨界点が対応する。実際 主張 9.26 より、 $\mu \in \mathcal{M}$ について $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となるのは $\mu = \pm M$ (すなわち $\theta_\mu = \pm 2\pi$ 、 $\cos \theta_\mu = 1$) かつ $c_2 s_1 = c_1$ の

ときに限るから、 $\gamma_2(\theta_M) = 0$ (フェルミオン ψ_M が定義 9.34 で未定義になる特異点) であることと Ising 模型の臨界点 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ であることは同値である。

証明. Step 0: 所属集合と正值性。 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $2K_1, 2K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、主張 1.4 (3) を $x = 2K_1$ 、 $x = 2K_2$ に適用して

$$\begin{aligned} c_1 &= \cosh 2K_1 \quad (\because \text{記号の定義}) \\ &> \sinh 2K_1 \quad (\because 2K_1 > 0 \text{ における } \cosh x > \sinh x) \\ &= s_1 \quad (\because \text{記号の定義}) \\ &> 0 \quad (\because 2K_1 > 0 \text{ における } \sinh x > 0) \\ c_2 &= \cosh 2K_2 \quad (\because \text{記号の定義}) \\ &> \sinh 2K_2 \quad (\because 2K_2 > 0 \text{ における } \cosh x > \sinh x) \\ &= s_2 \quad (\because \text{記号の定義}) \\ &> 0 \quad (\because 2K_2 > 0 \text{ における } \sinh x > 0) \end{aligned}$$

特に $c_1, s_1, c_2, s_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 。 また同 (2) より

$$\begin{aligned} c_1^2 &= 1 + s_1^2 \quad (\because \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \text{ を } x = 2K_1 \text{ へ適用}) \\ c_2^2 &= 1 + s_2^2 \quad (\because \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \text{ を } x = 2K_2 \text{ へ適用}) \end{aligned}$$

Step 1: ($\Rightarrow$) の証明。 $c_1 = s_1 c_2$ と仮定する。 両辺は正の実数 ($s_1 c_2 > 0$) である。 まず両辺を 2 乗して Step 0 の 2 式を代入すると

$$\begin{aligned} c_1^2 &= (s_1 c_2)^2 \quad (\because c_1 = s_1 c_2 \text{ (仮定)}) \\ &= s_1^2 c_2^2 \quad (\because \text{積の 2 乗は 2 乗の積}) \\ &= s_1^2 (1 + s_2^2) \quad (\because \text{Step 0 の } c_2^2 = 1 + s_2^2) \\ &= s_1^2 + s_1^2 s_2^2 \quad (\because \text{分配則}) \end{aligned}$$

が成り立つ。 この両辺から s_1^2 を引くと

$$\begin{aligned} (s_1 s_2)^2 &= s_1^2 s_2^2 \quad (\because \text{積の 2 乗は 2 乗の積}) \\ &= c_1^2 - s_1^2 \quad (\because \text{上の等式の両辺から } s_1^2 \text{ を引く}) \\ &= (1 + s_1^2) - s_1^2 \quad (\because \text{Step 0 の } c_1^2 = 1 + s_1^2) \\ &= 1 \quad (\because \text{加法逆元の相殺}) \end{aligned}$$

$$s_1 s_2 > 0 \wedge 1 > 0 \wedge (s_1 s_2)^2 = 1^2 \implies s_1 s_2 = 1 \quad (\because \text{正の実数の二乗の一意性、主張 1.4 (4)})$$

Step 2: ($\Leftarrow$) の証明。 $s_1 s_2 = 1$ と仮定する。 Step 0 の 2 式より

$$\begin{aligned} (s_1 c_2)^2 &= s_1^2 c_2^2 \quad (\because \text{積の 2 乗は 2 乗の積}) \\ &= s_1^2 (1 + s_2^2) \quad (\because \text{Step 0 の } c_2^2 = 1 + s_2^2) \\ &= s_1^2 + s_1^2 s_2^2 \quad (\because \text{分配則}) \\ &= s_1^2 + (s_1 s_2)^2 \quad (\because \text{積の 2 乗は 2 乗の積}) \\ &= s_1^2 + 1 \quad (\because s_1 s_2 = 1 \text{ (仮定) と } 1^2 = 1) \\ &= c_1^2 \quad (\because \text{Step 0 の } c_1^2 = 1 + s_1^2) \end{aligned}$$

$$s_1 c_2 > 0 \wedge c_1 > 0 \wedge (s_1 c_2)^2 = c_1^2 \implies s_1 c_2 = c_1 \quad (\because \text{正の実数の二乗の一意性、主張 1.4 (4)})$$

以上で $c_1 = s_1 c_2 \iff s_1 s_2 = 1$ が示された。

Step 3: γ_2 の零点と臨界点の対応 (statement 後半) の導出。主張 9.26 より、 $\mu \in \mathcal{M}$ について

$$\gamma_2(\theta_\mu) = 0 \iff \begin{cases} \mu = \pm M \\ c_1 = s_1 c_2 \end{cases}$$

である。右辺の第 2 条件 $c_1 = s_1 c_2$ は μ に依存しない。特に $\mu = M \in \mathcal{M}$ をとれば第 1 条件は自動的に満たされるから

$$\begin{aligned} \gamma_2(\theta_M) = 0 &\iff c_1 = s_1 c_2 & (\because \mu = M \text{ では第 1 条件 } \mu = \pm M \text{ が成り立つ}) \\ &\iff s_1 s_2 = 1 & (\because \text{Step 1 と Step 2}) \\ &\iff \sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1 & (\because s_1 = \sinh 2K_1, s_2 = \sinh 2K_2, \text{定義 5.8}) \end{aligned}$$

定義 9.34 において $\psi_M, \psi_M^\dagger$ は正規化因子 $1/(2\sqrt{M}\gamma_2(-\theta_M))$ を含むため $\gamma_2(\theta_M) = 0$ (主張 9.27 より $\gamma_2(-\theta_M) = 0$ と同値) のとき定義されない。よって「 ψ_M が定義されない特異点であること」と「Ising 模型の臨界点 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ であること」は同値である。

なお $c_1 \neq s_1 c_2$ のとき (すなわち $s_1 s_2 \neq 1$ のとき) は、上の同値より、すべての $\mu \in \mathcal{M}$ について $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ である。 $\square$

10 定数 c の決定と V の固有値

注意 10.1 (この章の目的). 主張 9.47 により、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して $V = cV'$ が成り立つ。しかし c の値そのものは決まっていない。この章では c を決定し、あわせて V の固有値をすべて求める。結論は

$$c = (2 \sinh 2K_2)^{M/2}, \quad V = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} V'$$

であり、 V の固有値は $\epsilon = (\epsilon_\mu)$ (各 $\epsilon_\mu \in \{0, 1\}$) でパラメトライズされた

$$\Lambda_\epsilon = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2} \right) \right)$$

である。ここで $\mathcal{I}$ は 定義 9.41 の和に現れる添字の集合である。

この章で用いる道具は、複素数を成分とする行列の積・和・スカラー倍、行列の指数関数 (定義 4.4)、および実数の $\cosh, \sinh, \operatorname{arccosh}$ だけである。行列式は使わない。

定義 10.2 (トレース tr). $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 $A = (A_{kl})_{1 \leq k, l \leq n} \in \operatorname{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して

$$\operatorname{tr}(A) := \sum_{k=1}^n A_{kk} \in \mathbb{C}$$

と定める (対角成分の有限和なので、収束の議論を要しない)。

主張 10.3 (トレースの基本性質). トレースと行列の積は 定義 10.2、定義 1.8 のものとする。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $A, B \in \operatorname{Mat}(n, \mathbb{C})$ 、 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、

- (1) $\operatorname{tr}(\alpha A + \beta B) = \alpha \operatorname{tr}(A) + \beta \operatorname{tr}(B)$ (線型性)
- (2) $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ (巡回性)
- (3) $\operatorname{tr}(I_n) = n$
- (4) $P \in \operatorname{Mat}(n, \mathbb{C})$ が可逆なら $\operatorname{tr}(PAP^{-1}) = \operatorname{tr}(A)$

証明. (1) 行列の和とスカラー倍は成分ごとに定義されるので $(\alpha A + \beta B)_{kk} = \alpha A_{kk} + \beta B_{kk}$ であり、有限和の線型性から従う。

(2) 行列の積の定義 $(AB)_{kl} = \sum_{j=1}^n A_{kj} B_{jl}$ より、

$$\begin{aligned}
 \operatorname{tr}(AB) &= \sum_{k=1}^n (AB)_{kk} && (\because \text{トレースの定義}) \\
 &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n A_{kj} B_{jk} && (\because \text{積の定義}) \\
 &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n B_{jk} A_{kj} && (\because \text{有限和の順序交換と } \mathbb{C} \text{ の積の可換性}) \\
 &= \sum_{j=1}^n (BA)_{jj} && (\because \text{積の定義}) \\
 &= \operatorname{tr}(BA) && (\because \text{トレースの定義})
 \end{aligned}$$

有限個の項の和なので、順序交換は $\mathbb{C}$ の加法の結合法則・交換法則からの有限帰納法で正当化される（収束の議論を要しない）。

(3) $(I_n)_{kk} = 1$ が n 個あるので $\operatorname{tr}(I_n) = n$ 。

(4) (2) を $A \rightarrow PA$ 、 $B \rightarrow P^{-1}$ に適用して

$$\begin{aligned}
 \operatorname{tr}(PAP^{-1}) &= \operatorname{tr}((PA)P^{-1}) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
 &= \operatorname{tr}(P^{-1}(PA)) && (\because (2) \text{ 巡回性}) \\
 &= \operatorname{tr}((P^{-1}P)A) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
 &= \operatorname{tr}(I_n A) && (\because \text{逆行列の定義 } P^{-1}P = I_n) \\
 &= \operatorname{tr}(A) && (\because \text{単位行列との積})
 \end{aligned}$$

□

主張 10.4 (冪等行列のトレースは像の次元). トレースとその相似変換不変性、行列の積は定義 10.2、主張 10.3、定義 1.8 を使う。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $Q \in \operatorname{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $Q^2 = Q$ を満たすとき、

$$\mathbb{C}^n = \operatorname{im} Q \oplus \ker Q, \quad \operatorname{tr}(Q) = \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} Q$$

が成り立つ。ここで $\operatorname{im} Q := \{Qx \mid x \in \mathbb{C}^n\}$ 、 $\ker Q := \{x \in \mathbb{C}^n \mid Qx = 0\}$ である。

証明. Step 1 (直和分解)。任意の $x \in \mathbb{C}^n$ について $x = Qx + (x - Qx)$ と書け、 $Qx \in \operatorname{im} Q$ である。 $x - Qx \in \ker Q$ は次の計算による。

$$\begin{aligned}
 Q(x - Qx) &= Qx - Q^2x && (\because \text{行列の積の分配則}) \\
 &= Qx - Qx && (\because Q^2 = Q) \\
 &= 0 && (\because \text{同じ項の差は零元 (加法逆元)})
 \end{aligned}$$

よって $\mathbb{C}^n = \operatorname{im} Q + \ker Q$ 。また $y \in \operatorname{im} Q \cap \ker Q$ とすると、 $y = Qx$ なる $x \in \mathbb{C}^n$ が取れて

$$\begin{aligned}
 y &= Qx && (\because x \text{ の取り方}) \\
 &= Q^2x && (\because Q = Q^2) \\
 &= Q(Qx) && (\because \text{行列の積の結合則}) \\
 &= Qy && (\because Qx = y) \\
 &= 0 && (\because y \in \ker Q)
 \end{aligned}$$

よって交わりは $\{0\}$ であり、和は直和である。

Step 2 (Q の適合基底での形)。 $r := \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} Q$ とおき、 $\operatorname{im} Q$ の基底 $v_1, \dots, v_r$ と $\ker Q$ の基底 $v_{r+1}, \dots, v_n$ を取る (Step 1 の直和分解より $v_1, \dots, v_n$ は $\mathbb{C}^n$ の基底)。 $j \leq r$ のとき $v_j = Qx_j$ なる $x_j \in \mathbb{C}^n$ が取れて

$$\begin{aligned} Qv_j &= Q(Qx_j) \quad (\because v_j = Qx_j) \\ &= Q^2x_j \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \\ &= Qx_j \quad (\because Q^2 = Q) \\ &= v_j \quad (\because v_j = Qx_j) \end{aligned}$$

であり、 $j > r$ のとき $Qv_j = 0$ ($v_j \in \ker Q$)。 よってこの基底に関する Q の表現行列 D は対角行列で、対角成分は 1 が r 個、 0 が $n - r$ 個である。

Step 3. 基底変換行列を P (可逆) とすると $D = P^{-1}QP$ であり、

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(Q) &= \operatorname{tr}(P^{-1}QP) \quad (\because \text{トレースの基本性質 (4): 相似変換でトレースは不変。主張 10.3}) \\ &= \operatorname{tr}(D) \quad (\because D = P^{-1}QP) \\ &= r \quad (\because D \text{ の対角成分は } 1 \text{ が } r \text{ 個、 } 0 \text{ が } n - r \text{ 個}) \end{aligned}$$

□

定義 10.5 (フェルミオン数演算子 n_μ). 定義 9.34 および 定義 9.41 と同じく

$$\mathcal{M} := \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}, \quad \mathcal{I} := \{\mu \in \{1, \dots, M\} \mid \gamma_2(\theta_\mu) \neq 0\}, \quad m := |\mathcal{I}|$$

とおく ($\mathcal{M}$ は 定義 9.34 で $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger$ の添字が走る集合、 $\mathcal{I}$ は 定義 9.41 の和に現れる添字の集合である)。 定義から $\mathcal{I} \subseteq \{1, \dots, M\} \subset \mathcal{M}$ であり、 $\mu \in \mathcal{I}$ なら $-\mu \in \{-M, \dots, -1\} \subset \mathcal{M}$ でもある。

$\mu \in \mathcal{I}$ について、主張 9.27 より $\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ すなわち $\gamma_2(\theta_{-\mu}) \neq 0$ でもあるから、定義 9.34 により $\psi_\mu^\dagger$ と $\psi_{-\mu}$ がともに定義される。そこで

$$n_\mu := \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu} \in \operatorname{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \quad (\mu \in \mathcal{I})$$

と定める。主張 9.26 より $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となる $\mu \in \{1, \dots, M\}$ は臨界条件下の $\mu = M$ に限られるので、臨界点でなければ $\mathcal{I} = \{1, \dots, M\}$ ($m = M$)、臨界点では $\mathcal{I} = \{1, \dots, M - 1\}$ ($m = M - 1$) である。

なお 定義 9.34 の $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger$ の係数に現れる平方根 $\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ は 定義 1.47 で定めた ** 単一値の写像 $\sqrt{\cdot} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ の値であり、添字 μ ごとに $\pm$ を選ぶ自由度は無い。この一意性は 主張 9.36 の反交換関係の成立そのものに効いており (同 Claim の Step 0)、以下で 主張 9.36 を添字対 (μ, μ) 、 $(\mu, -\mu)$ 、 $(\mu, -\nu)$ 、 $(-\mu, \nu)$ へ適用するときも、この単一の値をそのまま使う。

この記号のもとで 定義 9.41 の V' は

$$V' = \exp(X), \quad X := \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \left(n_\mu - \frac{1}{2} I_{\operatorname{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right)$$

と書ける。

主張 10.6 ($n_\mu^2 = n_\mu$). $\mu \in \mathcal{I}$ について、

- (1) $(\psi_\mu^\dagger)^2 = 0, \quad (\psi_{-\mu})^2 = 0$
- (2) $\psi_{-\mu} \psi_\mu^\dagger = I_{\operatorname{Mat}(2^M, \mathbb{C})} - n_\mu$

- (3) $n_\mu^2 = n_\mu$

以下、 2^M 次の単位行列 $I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ を単に I と書く。

証明. (1) 主張 9.36 の第 1 式 $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+ = 0$ において $\nu = \mu$ と取ると、反交換子の定義 $[X, Y]_+ = XY + YX$ より

$$\begin{aligned} 0 &= [\psi_\mu^\dagger, \psi_\mu^\dagger]_+ & (\because \text{反交換関係の第 1 式}) \\ &= \psi_\mu^\dagger \psi_\mu^\dagger + \psi_\mu^\dagger \psi_\mu^\dagger & (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= 2(\psi_\mu^\dagger)^2 & (\because \text{同じ項の和}) \end{aligned}$$

$2 \neq 0$ なので $(\psi_\mu^\dagger)^2 = 0$ 。同じく第 3 式 $[\psi_\mu, \psi_\nu]_+ = 0$ を $\mu = \nu = -\mu$ すなわち添字 $-\mu$ について適用して $(\psi_{-\mu})^2 = 0$ (定義 10.5 より $\mu \in \mathcal{I}$ なので $-\mu \in \mathcal{M} = \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ かつ $\gamma_2(\theta_{-\mu}) \neq 0$ であり、主張 9.36 の仮定「 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ かつ $\gamma_2(\theta_\nu) \neq 0$ なる $\mu, \nu \in \mathcal{M}$ 」を満たす)。

(2) 主張 9.36 の第 2 式 $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu]_+ = \delta_{\mu+\nu, 0}^M I$ において $\nu = -\mu$ と取る。 $\mu + (-\mu) = 0 \equiv 0 \pmod{M}$ なので 定義 5.25 より $\delta_{\mu+(-\mu), 0}^M = 1$ であり、

$$\begin{aligned} \psi_{-\mu} \psi_\mu^\dagger &= I - \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu} & (\because [\psi_\mu^\dagger, \psi_{-\mu}]_+ = I \text{ と行列の加法。主張 9.36}) \\ &= I - n_\mu & (\because \text{フェルミオン数演算子 } n_\mu \text{ の定義。定義 10.5}) \end{aligned}$$

(3) (1)(2) を使って

$$\begin{aligned} n_\mu^2 &= (\psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu})(\psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu}) & (\because \text{フェルミオン数演算子 } n_\mu \text{ の定義}) \\ &= \psi_\mu^\dagger (\psi_{-\mu} \psi_\mu^\dagger) \psi_{-\mu} & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= \psi_\mu^\dagger (I - n_\mu) \psi_{-\mu} & (\because (2)) \\ &= \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu} - \psi_\mu^\dagger n_\mu \psi_{-\mu} & (\because \text{行列の積の分配法則}) \\ &= n_\mu - \psi_\mu^\dagger (\psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu}) \psi_{-\mu} & (\because n_\mu = \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu}) \\ &= n_\mu - (\psi_\mu^\dagger)^2 (\psi_{-\mu})^2 & (\because \text{結合法則}) \\ &= n_\mu - 0 \cdot 0 & (\because (1)) \\ &= n_\mu & (\because \text{零行列との積と差}) \end{aligned}$$

□

主張 10.7 ($n_\mu n_\nu = n_\nu n_\mu$). $\mu, \nu \in \mathcal{I}$ が $\mu \neq \nu$ を満たすとき、

- (1) $\psi_\mu^\dagger n_\nu = n_\nu \psi_\mu^\dagger, \quad \psi_{-\mu} n_\nu = n_\nu \psi_{-\mu}$
- (2) $n_\mu n_\nu = n_\nu n_\mu$

証明. Step 1 (4 つの反交換関係)。 $\mu, \nu \in \mathcal{I} \subseteq \{1, \dots, M\}$ かつ $\mu \neq \nu$ なので $1 \leq |\mu - \nu| \leq M - 1$ であり、とくに $\mu - \nu \not\equiv 0 \pmod{M}$ 。よって 定義 5.25 より $\delta_{\mu-\nu, 0}^M = \delta_{-\mu+\nu, 0}^M = 0$ である。準備として、同じ次数の正方行列 X, Y について

$$\begin{aligned} [X, Y]_+ &= XY + YX & (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= YX + XY & (\because \text{行列の加法の交換法則}) \\ &= [Y, X]_+ & (\because \text{反交換子の定義}) \end{aligned}$$

が成り立つ (反交換子の対称性)。主張 9.36 を (μ, ν) 、 $(\mu, -\nu)$ 、 $(\nu, -\mu)$ 、 $(-\mu, -\nu)$ に適用すると

$$[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+ = 0 \quad (\because \text{主張 9.36 の第 1 式})$$

$$\begin{aligned} [\psi_\mu^\dagger, \psi_{-\nu}]_+ &= \delta_{\mu-\nu,0}^M I \quad (\because \text{主張 9.36 の第 2 式}) \\ &= 0 \quad (\because \delta_{\mu-\nu,0}^M = 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\psi_{-\mu}, \psi_\nu^\dagger]_+ &= \delta_{-\mu+\nu,0}^M I \quad (\because \text{主張 9.36 の第 2 式を } (\nu, -\mu) \text{ へ適用し、上の反交換子の対称性}) \\ &= 0 \quad (\because \delta_{-\mu+\nu,0}^M = 0) \end{aligned}$$

$$[\psi_{-\mu}, \psi_{-\nu}]_+ = 0 \quad (\because \text{主張 9.36 の第 3 式})$$

すなわち、 $A \in \{\psi_\mu^\dagger, \psi_{-\mu}\}$ と $B \in \{\psi_\nu^\dagger, \psi_{-\nu}\}$ のどの組み合わせでも $AB = -BA$ が成り立つ。

Step 2 ((1) の証明)。 $A \in \{\psi_\mu^\dagger, \psi_{-\mu}\}$ を取ると、Step 1 を 2 回使って

$$\begin{aligned} An_\nu &= A\psi_\nu^\dagger\psi_{-\nu} \quad (\because \text{フェルミオン数演算子 } n_\nu \text{ の定義}) \\ &= (-\psi_\nu^\dagger A)\psi_{-\nu} \quad (\because A\psi_\nu^\dagger = -\psi_\nu^\dagger A) \\ &= -\psi_\nu^\dagger(A\psi_{-\nu}) \quad (\because \text{結合法則}) \\ &= -\psi_\nu^\dagger(-\psi_{-\nu}A) \quad (\because A\psi_{-\nu} = -\psi_{-\nu}A) \\ &= \psi_\nu^\dagger\psi_{-\nu}A \quad (\because \text{符号の積 } (-1)(-1) = 1 \text{ と結合法則}) \\ &= n_\nu A \quad (\because \text{フェルミオン数演算子 } n_\nu \text{ の定義}) \end{aligned}$$

符号は $(-1)^2 = 1$ となって消える。 $A = \psi_\mu^\dagger$ と $A = \psi_{-\mu}$ の両方でこれが成り立つ。

Step 3 ((2) の証明)。 (1) を 2 回使って

$$\begin{aligned} n_\mu n_\nu &= (\psi_\mu^\dagger\psi_{-\mu})n_\nu \quad (\because \text{フェルミオン数演算子 } n_\mu \text{ の定義}) \\ &= \psi_\mu^\dagger(\psi_{-\mu}n_\nu) \quad (\because \text{結合法則}) \\ &= \psi_\mu^\dagger(n_\nu\psi_{-\mu}) \quad (\because (1) \text{ を } A = \psi_{-\mu} \text{ へ適用}) \\ &= (\psi_\mu^\dagger n_\nu)\psi_{-\mu} \quad (\because \text{結合法則}) \\ &= (n_\nu\psi_\mu^\dagger)\psi_{-\mu} \quad (\because (1) \text{ を } A = \psi_\mu^\dagger \text{ へ適用}) \\ &= n_\nu(\psi_\mu^\dagger\psi_{-\mu}) \quad (\because \text{結合法則}) \\ &= n_\nu n_\mu \quad (\because \text{フェルミオン数演算子 } n_\mu \text{ の定義}) \end{aligned}$$

□

主張 10.8 $(\text{tr}(R_{\mu_1}^{(e_1)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}) = 2^{M-k})$. $\mu \in \mathcal{I}$ と $e \in \{0, 1\}$ に対して

$$R_\mu^{(1)} := n_\mu, \quad R_\mu^{(0)} := I - n_\mu \quad \left(I = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right)$$

と書く。 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 、相異なる $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathcal{I}$ 、および $e_1, \dots, e_k \in \{0, 1\}$ について、

$$\text{tr}(R_{\mu_1}^{(e_1)} R_{\mu_2}^{(e_2)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}) = 2^{M-k}$$

($k = 0$ のときは空の積を I と読み、 $\text{tr}(I) = 2^M$ である。) とくに $\text{tr}(n_\mu) = \text{tr}(I - n_\mu) = 2^{M-1}$ であり、値は指数 $e_1, \dots, e_k$ の選び方に依らず、因子の個数 k だけで決まる。

証明. $n_\mu \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ であり $I = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ は 2^M 次の単位行列なので、トレースの基本性質より $\text{tr}(I) = 2^M$ である。 k に関する帰納法で示す。

基底段階 ($k = 0$)。

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(I) &= 2^M \quad (\because \text{トレースの基本性質 (3)。主張 10.3}) \\ &= 2^{M-0} \quad (\because M-0 = M)\end{aligned}$$

帰納段階： $k \geq 1$ とし、相異なる $k-1$ 個の添字については主張が成り立つと仮定する。相異なる $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathcal{I}$ を取り、

$$P := R_{\mu_2}^{(e_2)} R_{\mu_3}^{(e_3)} \dots R_{\mu_k}^{(e_k)}$$

とおく。 $\mu_1 \neq \mu_j$ ($j = 2, \dots, k$) なので 主張 10.7 (1) より $\psi_{\mu_1}^\dagger$ と $\psi_{-\mu_1}$ はどの n_{μ_j} とも可換である。ゆえに単位行列とも可換であることと分配法則から $I - n_{\mu_j}$ とも可換であり、したがって各 $R_{\mu_j}^{(e_j)}$ および積 P とも可換である。同じく 主張 10.7 (2) より n_{μ_1} と P は可換である。

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(n_{\mu_1} P) &= \mathrm{tr}(\psi_{\mu_1}^\dagger \psi_{-\mu_1} P) \quad (\because \text{フェルミオン数演算子 } n_{\mu_1} \text{ の定義。定義 10.5}) \\ &= \mathrm{tr}(\psi_{-\mu_1} P \psi_{\mu_1}^\dagger) \quad (\because \text{巡回性を } A = \psi_{\mu_1}^\dagger, B = \psi_{-\mu_1} P \text{ に適用。主張 10.3}) \\ &= \mathrm{tr}(P \psi_{-\mu_1} \psi_{\mu_1}^\dagger) \quad (\because \psi_{-\mu_1} \text{ と } P \text{ が可換}) \\ &= \mathrm{tr}(P(I - n_{\mu_1})) \quad (\because \text{数演算子の冪等性 (2)。主張 10.6}) \\ &= \mathrm{tr}(P - P n_{\mu_1}) \quad (\because \text{分配法則と単位行列の性質}) \\ &= \mathrm{tr}(P) - \mathrm{tr}(P n_{\mu_1}) \quad (\because \text{トレースの線型性。主張 10.3}) \\ &= \mathrm{tr}(P) - \mathrm{tr}(n_{\mu_1} P) \quad (\because n_{\mu_1} \text{ と } P \text{ が可換})\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}2 \mathrm{tr}(n_{\mu_1} P) &= \mathrm{tr}(P) \quad (\because \text{直前の等式を移項}) \\ \mathrm{tr}(n_{\mu_1} P) &= \frac{1}{2} \mathrm{tr}(P) \quad (\because \text{両辺を2で割る}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2^{M-(k-1)} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2^{M-k+1} \quad (\because M - (k-1) = M - k + 1) \\ &= 2^{M-k} \quad (\because 2^{M-k+1} = 2 \cdot 2^{M-k})\end{aligned}$$

まず $e_1 = 1$ の場合は

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(R_{\mu_1}^{(1)} P) &= \mathrm{tr}(n_{\mu_1} P) \quad (\because R_{\mu_1}^{(1)} = n_{\mu_1}) \\ &= \frac{1}{2} \mathrm{tr}(P) \quad (\because \text{直前に得た } \mathrm{tr}(n_{\mu_1} P) = \frac{1}{2} \mathrm{tr}(P)) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2^{M-(k-1)} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2^{M-k+1} \quad (\because M - (k-1) = M - k + 1) \\ &= 2^{M-k} \quad (\because 2^{M-k+1} = 2 \cdot 2^{M-k})\end{aligned}$$

である。次に $e_1 = 0$ の場合は

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}(R_{\mu_1}^{(0)}P) &= \operatorname{tr}((I - n_{\mu_1})P) \quad (\because R_{\mu_1}^{(0)} = I - n_{\mu_1}) \\
&= \operatorname{tr}(P - n_{\mu_1}P) \quad (\because \text{分配法則と単位行列の性質}) \\
&= \operatorname{tr}(P) - \operatorname{tr}(n_{\mu_1}P) \quad (\because \text{トレースの線型性。主張 10.3}) \\
&= \operatorname{tr}(P) - \frac{1}{2} \operatorname{tr}(P) \quad (\because \text{直前に得た } \operatorname{tr}(n_{\mu_1}P) = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(P)) \\
&= \frac{1}{2} \operatorname{tr}(P) \quad (\because \text{複素数の四則演算}) \\
&= \frac{1}{2} \cdot 2^{M-(k-1)} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \frac{1}{2} \cdot 2^{M-k+1} \quad (\because M - (k-1) = M - k + 1) \\
&= 2^{M-k} \quad (\because 2^{M-k+1} = 2 \cdot 2^{M-k})
\end{aligned}$$

$e_1 \in \{0, 1\}$ なので二つの場合は尽くされ、帰納段階が示された。したがって任意の $e_1, \dots, e_k \in \{0, 1\}$ について主張が成り立つ。 $\square$

主張 10.9 (数演算子の同時固有空間分解). $\epsilon = (\epsilon_\mu)_{\mu \in \mathcal{I}} \in \{0, 1\}^{\mathcal{I}}$ に対して

$$Q_\epsilon := \prod_{\mu \in \mathcal{I}} (\epsilon_\mu n_\mu + (1 - \epsilon_\mu)(I - n_\mu)) \in \operatorname{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める (因子は 主張 10.7 により互いに可換なので、積の順序は問わない)。このとき、

- (1) $Q_\epsilon Q_{\epsilon'} = 0 \quad (\epsilon \neq \epsilon'), \quad Q_\epsilon^2 = Q_\epsilon$
- (2) $\sum_{\epsilon \in \{0, 1\}^{\mathcal{I}}} Q_\epsilon = I$
- (3) $n_\nu Q_\epsilon = \epsilon_\nu Q_\epsilon \quad (\nu \in \mathcal{I})$
- (4) $\operatorname{tr}(Q_\epsilon) = 2^{M-m}, \quad \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} Q_\epsilon = 2^{M-m}$
- (5) $\mathbb{C}^{2^M} = \bigoplus_{\epsilon \in \{0, 1\}^{\mathcal{I}}} \operatorname{im} Q_\epsilon$

が成り立つ。とくに $m = M$ (臨界点でない場合) には各 $\operatorname{im} Q_\epsilon$ は 1 次元である。

証明. 以下、 $\mu \in \mathcal{I}$ と $e \in \{0, 1\}$ に対して $R_\mu^{(1)} := n_\mu$ 、 $R_\mu^{(0)} := I - n_\mu$ と書く。 $Q_\epsilon = \prod_{\mu \in \mathcal{I}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ である。

Step 0 (1 つの添字についての関係)。主張 10.6 (3) の $n_\mu^2 = n_\mu$ より

$$\begin{aligned}
R_\mu^{(1)} R_\mu^{(1)} &= n_\mu^2 \quad (\because R_\mu^{(1)} = n_\mu \text{ の定義と冪の記法}) \\
&= n_\mu \quad (\because \text{上に引いた } n_\mu^2 = n_\mu) \\
&= R_\mu^{(1)} \quad (\because R_\mu^{(1)} = n_\mu \text{ の定義}) \\
R_\mu^{(0)} R_\mu^{(0)} &= (I - n_\mu)^2 \quad (\because R_\mu^{(0)} = I - n_\mu \text{ の定義と冪の記法}) \\
&= I - 2n_\mu + n_\mu^2 \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\
&= I - 2n_\mu + n_\mu \quad (\because \text{上に引いた } n_\mu^2 = n_\mu) \\
&= I - n_\mu \quad (\because -2n_\mu + n_\mu = -n_\mu) \\
&= R_\mu^{(0)} \quad (\because R_\mu^{(0)} = I - n_\mu \text{ の定義}) \\
R_\mu^{(1)} R_\mu^{(0)} &= n_\mu(I - n_\mu) \quad (\because R_\mu^{(1)}, R_\mu^{(0)} \text{ の定義}) \\
&= n_\mu - n_\mu^2 \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\
&= n_\mu - n_\mu \quad (\because \text{上に引いた } n_\mu^2 = n_\mu) \\
&= 0 \quad (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_\mu^{(0)} R_\mu^{(1)} &= (I - n_\mu) n_\mu \quad (\because R_\mu^{(0)}, R_\mu^{(1)} \text{ の定義}) \\
&= n_\mu - n_\mu^2 \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\
&= n_\mu - n_\mu \quad (\because \text{上に引いた } n_\mu^2 = n_\mu) \\
&= 0 \quad (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} &= n_\mu + (I - n_\mu) \quad (\because R_\mu^{(1)}, R_\mu^{(0)} \text{ の定義}) \\
&= I \quad (\because n_\mu + (-n_\mu) = 0 \text{ と零元との和})
\end{aligned}$$

また $\mu \neq \nu$ のとき 主張 10.7 (2) より $n_\mu n_\nu = n_\nu n_\mu$ であり、 I は任意の行列と可換だから、 $R_\mu^{(e)}$ と $R_\nu^{(e')}$ も可換である。

Step 1 ((1) の証明)。 $\epsilon \neq \epsilon'$ なら、ある $\nu \in \mathcal{I}$ で $\epsilon_\nu \neq \epsilon'_\nu$ 。因子はすべて可換なので、 $Q_\epsilon Q_{\epsilon'}$ の中で添字 ν の 2 因子を隣接させられて

$$\begin{aligned}
Q_\epsilon Q_{\epsilon'} &= \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon'_\mu)} \right) R_\nu^{(\epsilon_\nu)} R_\nu^{(\epsilon'_\nu)} \quad (\because \text{因子の可換性により添字 } \nu \text{ の二因子を隣接させる}) \\
&= \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon'_\mu)} \right) \cdot 0 \quad (\because \epsilon_\nu \neq \epsilon'_\nu \text{ と Step 0 の直交性}) \\
&= 0 \quad (\because \text{零行列との積})
\end{aligned}$$

$\epsilon = \epsilon'$ のときは各因子が Step 0 より冪等なので

$$\begin{aligned}
Q_\epsilon^2 &= \prod_{\mu \in \mathcal{I}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \text{因子の可換性}) \\
&= \prod_{\mu \in \mathcal{I}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \text{Step 0 の冪等性を各因子へ適用}) \\
&= Q_\epsilon \quad (\because Q_\epsilon \text{ の定義})
\end{aligned}$$

Step 2 ((2) の証明)。Step 0 の $R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} = I$ を各因子に代入し、可換な有限個の因子の積を分配法則で展開すると

$$\begin{aligned}
I &= \prod_{\mu \in \mathcal{I}} (R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)}) \quad (\because \text{Step 0 の } R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} = I) \\
&= \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}} \prod_{\mu \in \mathcal{I}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \text{有限積を分配法則で展開}) \\
&= \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}} Q_\epsilon \quad (\because Q_\epsilon \text{ の定義})
\end{aligned}$$

(展開して現れる項は、各 μ について $R_\mu^{(1)}$ と $R_\mu^{(0)}$ のどちらを選ぶかの全ての選び方に 1 対 1 に対応し、その選び方の全体が $\{0,1\}^{\mathcal{I}}$ である。)

Step 3 ((3) の証明)。 $\nu \in \mathcal{I}$ を固定する。因子はすべて可換なので

$$n_\nu Q_\epsilon = \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) n_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because Q_\epsilon \text{ の定義と因子の可換性})$$

$\epsilon_\nu = 1$ なら

$$\begin{aligned}
n_\nu R_\nu^{(1)} &= n_\nu n_\nu \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義}) \\
&= n_\nu \quad (\because \text{Step 0 の冪等性}) \\
&= R_\nu^{(1)} \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義}) \\
&= \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \epsilon_\nu = 1)
\end{aligned}$$

$\epsilon_\nu = 0$ なら

$$\begin{aligned}
n_\nu R_\nu^{(0)} &= n_\nu (I - n_\nu) \quad (\because R_\nu^{(0)} \text{ の定義}) \\
&= 0 \quad (\because \text{Step 0 の直交性}) \\
&= \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \epsilon_\nu = 0)
\end{aligned}$$

いずれの場合も

$$\begin{aligned}
n_\nu Q_\epsilon &= \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) n_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because Q_\epsilon \text{ の定義と因子の可換性}) \\
&= \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \text{上の二つの場合}) \\
&= \epsilon_\nu Q_\epsilon \quad (\because Q_\epsilon \text{ の定義})
\end{aligned}$$

Step 4 ((4) の証明)。 $T := \{\mu \in \mathcal{I} \mid \epsilon_\mu = 1\}$ とおくと

$$\begin{aligned}
Q_\epsilon &= \prod_{\mu \in \mathcal{I}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because Q_\epsilon \text{ の定義}) \\
&= \left(\prod_{\mu \in T} R_\mu^{(1)} \right) \prod_{\mu \in \mathcal{I} \setminus T} R_\mu^{(0)} \quad (\because T \text{ の定義と因子の可換性}) \\
&= \left(\prod_{\mu \in T} n_\mu \right) \prod_{\mu \in \mathcal{I} \setminus T} (I - n_\mu) \quad (\because R_\mu^{(1)}, R_\mu^{(0)} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

である。第 2 の積を分配法則で展開すると

$$\prod_{\mu \in \mathcal{I} \setminus T} (I - n_\mu) = \sum_{S \subseteq \mathcal{I} \setminus T} (-1)^{|S|} \prod_{\mu \in S} n_\mu \quad (\because \text{有限積を分配法則で展開})$$

であるから、トレースの線型性 (主張 10.3 (1)) と 主張 10.8 (T と S は交わらないので $T \cup S$ の元は相異なる $|T| + |S|$ 個) より

$$\begin{aligned}
\text{tr}(Q_\epsilon) &= \sum_{S \subseteq \mathcal{I} \setminus T} (-1)^{|S|} \text{tr} \left(\prod_{\mu \in T \cup S} n_\mu \right) \quad (\because \text{上の展開とトレースの線型性}) \\
&= \sum_{S \subseteq \mathcal{I} \setminus T} (-1)^{|S|} 2^{M - |T| - |S|} \quad (\because \text{数演算子の積のトレース}) \\
&= 2^{M - |T|} \sum_{j=0}^{m - |T|} \binom{m - |T|}{j} (-1)^j 2^{-j} \quad (\because |\mathcal{I} \setminus T| = m - |T| \text{ で、大きさ } j \text{ の部分集合は } \binom{m - |T|}{j} \text{ 個}) \\
&= 2^{M - |T|} \left(1 - \frac{1}{2} \right)^{m - |T|} \quad (\because \text{二項定理}) \\
&= 2^{M - |T|} \cdot 2^{-(m - |T|)} \quad (\because 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = 2^{-1} \text{ と冪の法則}) \\
&= 2^{M - m} \quad (\because \text{同じ底の冪の積})
\end{aligned}$$

Q_ϵ は Step 1 より冪等である。したがって

$$\begin{aligned}\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} Q_\epsilon &= \operatorname{tr}(Q_\epsilon) \quad (\because \text{冪等行列のトレースは像の次元 (主張 10.4)。} Q_\epsilon \text{ は Step 1 より冪等}) \\ &= 2^{M-m} \quad (\because \text{上で計算した} \operatorname{tr}(Q_\epsilon))\end{aligned}$$

Step 5 ((5) の証明)。(2) より任意の $x \in \mathbb{C}^{2^M}$ について

$$\begin{aligned}x &= Ix \quad (\because I \text{ は単位行列}) \\ &= \left(\sum_{\epsilon} Q_\epsilon \right) x \quad (\because (2)) \\ &= \sum_{\epsilon} Q_\epsilon x \quad (\because \text{行列作用の線型性})\end{aligned}$$

であり、各 $Q_\epsilon x$ は $\operatorname{im} Q_\epsilon$ に属するので、これらの像の和は全体を張る。直和であることを見るために $\sum_{\epsilon} y_\epsilon = 0$ ($y_\epsilon \in \operatorname{im} Q_\epsilon$) とする。各 ϵ に対して $y_\epsilon = Q_\epsilon x_\epsilon$ となる $x_\epsilon \in \mathbb{C}^{2^M}$ を取る。(1) より、各 ϵ, ϵ' について

$$\begin{aligned}Q_{\epsilon'} y_\epsilon &= Q_{\epsilon'} Q_\epsilon x_\epsilon \quad (\because y_\epsilon = Q_\epsilon x_\epsilon) \\ &= \begin{cases} 0, & \epsilon \neq \epsilon', \\ Q_\epsilon x_\epsilon, & \epsilon = \epsilon' \end{cases} \quad (\because (1) \text{ の直交性と冪等性}) \\ &= \begin{cases} 0, & \epsilon \neq \epsilon', \\ y_\epsilon, & \epsilon = \epsilon' \end{cases} \quad (\because y_\epsilon = Q_\epsilon x_\epsilon)\end{aligned}$$

である。したがって各 ϵ' について

$$\begin{aligned}0 &= Q_{\epsilon'} 0 \quad (\because \text{線型写像は零ベクトルを零ベクトルへ写す}) \\ &= Q_{\epsilon'} \left(\sum_{\epsilon} y_\epsilon \right) \quad (\because \sum_{\epsilon} y_\epsilon = 0) \\ &= \sum_{\epsilon} Q_{\epsilon'} y_\epsilon \quad (\because \text{行列作用の線型性}) \\ &= y_{\epsilon'} \quad (\because (1) \text{ の直交性と冪等性})\end{aligned}$$

が成り立つので、和は直和である。

(次元の整合: $|\{0, 1\}^{\mathcal{I}}| = 2^m$ 個の空間がそれぞれ 2^{M-m} 次元で、合計 $2^m \cdot 2^{M-m} = 2^M$ となり $\mathbb{C}^{2^M}$ の次元に一致する。) $\square$

主張 10.10 (V' の固有値). $\epsilon \in \{0, 1\}^{\mathcal{I}}$ に対して

$$g(\epsilon) := \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2} \right) \in \mathbb{R}$$

とおく。このとき

$$V' Q_\epsilon = e^{g(\epsilon)} Q_\epsilon$$

が成り立つ。すなわち $\operatorname{im} Q_\epsilon$ の各元は V' の固有値 $e^{g(\epsilon)}$ の固有ベクトルであり、主張 10.9 (5) より V' は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて

$$\left\{ e^{g(\epsilon)} \text{ (重複度 } 2^{M-m}) \mid \epsilon \in \{0, 1\}^{\mathcal{I}} \right\}$$

で尽くされる (個数は重複度を込めて $2^m \cdot 2^{M-m} = 2^M$)。とくに V' の固有値はすべて正の実数である。

証明. Step 1 ($XQ_\epsilon = g(\epsilon)Q_\epsilon$)。定義 10.5 の $X = \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu)(n_\mu - \frac{1}{2}I)$ に 主張 10.9 (3) を代入して

$$\begin{aligned} XQ_\epsilon &= \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) (n_\mu Q_\epsilon - \frac{1}{2}Q_\epsilon) \quad (\because \text{定義 10.5 と行列の積の分配法則}) \\ &= \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) (\epsilon_\mu Q_\epsilon - \frac{1}{2}Q_\epsilon) \quad (\because \text{主張 10.9 (3)}) \\ &= \left(\sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2}) \right) Q_\epsilon \quad (\because \text{有限和の線型性で } Q_\epsilon \text{ を右へくくり出す}) \\ &= g(\epsilon) Q_\epsilon \quad (\because g(\epsilon) \text{ の定義}) \end{aligned}$$

Step 2 ($X^k Q_\epsilon = g(\epsilon)^k Q_\epsilon$)。 k に関する帰納法。 $k = 0$ は自明。 $X^k Q_\epsilon = g(\epsilon)^k Q_\epsilon$ を仮定すると、Step 1 より

$$\begin{aligned} X^{k+1} Q_\epsilon &= X (X^k Q_\epsilon) \quad (\because \text{冪の定義 } X^{k+1} = X X^k \text{ と行列の積の結合法則}) \\ &= X (g(\epsilon)^k Q_\epsilon) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= g(\epsilon)^k (X Q_\epsilon) \quad (\because \text{スカラー倍と行列の積の交換}) \\ &= g(\epsilon)^{k+1} Q_\epsilon \quad (\because \text{Step 1 の } X Q_\epsilon = g(\epsilon) Q_\epsilon \text{ と冪の定義}) \end{aligned}$$

Step 3 (指数関数へ)。定義 4.4 より $V' = \exp(X) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} X^k$ であり、この級数は 定理 4.3 により 定義 3.8 のノルムについて収束する。部分和を $E_K := \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} X^k$ と書くと、Step 2 と有限和の線型性から

$$\begin{aligned} E_K Q_\epsilon &= \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} X^k Q_\epsilon \quad (\because E_K \text{ の定義と行列の積の分配法則}) \\ &= \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} g(\epsilon)^k Q_\epsilon \quad (\because \text{Step 2 を各項へ適用}) \\ &= \left(\sum_{k=0}^K \frac{g(\epsilon)^k}{k!} \right) Q_\epsilon \quad (\because \text{有限和の線型性で } Q_\epsilon \text{ を右へくくり出す}) \end{aligned}$$

$K \rightarrow \infty$ とすると、左辺は 主張 3.13 より $\exp(X)Q_\epsilon = V'Q_\epsilon$ に収束し、右辺は 主張 4.1 より $e^{g(\epsilon)}Q_\epsilon$ に収束する。極限の一意性より

$$V'Q_\epsilon = e^{g(\epsilon)}Q_\epsilon$$

Step 4 (固有値の言い換え)。 $y \in \text{im } Q_\epsilon$ なら $y = Q_\epsilon x$ と書けて、主張 10.9 (1) より

$$\begin{aligned} Q_\epsilon y &= Q_\epsilon^2 x \quad (\because y = Q_\epsilon x) \\ &= Q_\epsilon x \quad (\because \text{主張 10.9 (1) の冪等性}) \\ &= y \quad (\because y = Q_\epsilon x) \end{aligned}$$

だから

$$\begin{aligned} V'y &= V'Q_\epsilon y \quad (\because \text{上の } Q_\epsilon y = y) \\ &= e^{g(\epsilon)}Q_\epsilon y \quad (\because \text{Step 3 の } V'Q_\epsilon = e^{g(\epsilon)}Q_\epsilon) \\ &= e^{g(\epsilon)}y \quad (\because \text{上の } Q_\epsilon y = y) \end{aligned}$$

主張 10.9 (5) より $\mathbb{C}^{2^M}$ は $\text{im } Q_\epsilon$ たちの直和だから、各 $\text{im } Q_\epsilon$ の基底を合わせると V' の固有ベクトルからなる $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底が得られる。したがって V' は対角化可能で、固有値は $e^{g(\epsilon)}$ が重複度 $\dim \text{im } Q_\epsilon = 2^{M-m}$ で現れるもので尽くされる。

$g(\epsilon) \in \mathbb{R}$ (定義 9.39 より $\gamma(\theta_\mu) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$) なので $e^{g(\epsilon)} > 0$ である。 $\square$

主張 10.11 ($\text{tr}(V') = \text{tr}(V'^{-1}) > 0$). V' は可逆で $V'^{-1} = \exp(-X)$ であり、

$$\text{tr}(V') = \text{tr}(V'^{-1}) = 2^{M-m} \prod_{\mu \in \mathcal{I}} 2 \cosh\left(\frac{\gamma(\theta_\mu)}{2}\right) \in \mathbb{R}_{>0}$$

証明. Step 1 (可逆性)。 X と $-X$ は可換なので

$$\begin{aligned} \exp(X) \exp(-X) &= \exp(X + (-X)) \quad (\because \text{指数行列の積の定理}) \\ &= \exp(0) \quad (\because \text{加法の逆元}) \\ &= I \quad (\because \exp(0) = I) \end{aligned}$$

定理 4.5、定理 4.6。同様に

$$\begin{aligned} \exp(-X) \exp(X) &= \exp((-X) + X) \quad (\because \text{指数行列の積の定理}) \\ &= \exp(0) \quad (\because \text{加法の逆元}) \\ &= I \quad (\because \exp(0) = I) \end{aligned}$$

だから $V' = \exp(X)$ は可逆で $V'^{-1} = \exp(-X)$ 。

Step 2 (トレースの計算)。主張 10.9 (2) と 主張 10.10、および 主張 10.3 (1) より

$$\begin{aligned} \text{tr}(V') &= \text{tr}\left(V' \sum_{\epsilon} Q_{\epsilon}\right) \quad (\because \sum_{\epsilon} Q_{\epsilon} = I) \\ &= \sum_{\epsilon} \text{tr}(V' Q_{\epsilon}) \quad (\because \text{トレースの線型性}) \\ &= \sum_{\epsilon} e^{g(\epsilon)} \text{tr}(Q_{\epsilon}) \quad (\because V' Q_{\epsilon} = e^{g(\epsilon)} Q_{\epsilon}) \\ &= 2^{M-m} \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}} e^{g(\epsilon)} \quad (\because \text{tr}(Q_{\epsilon}) = 2^{M-m}) \end{aligned}$$

Step 3 (積への分解)。 $g(\epsilon) = \sum_{\mu} \gamma(\theta_{\mu})(\epsilon_{\mu} - \frac{1}{2})$ なので、実数の指数法則より

$$e^{g(\epsilon)} = \prod_{\mu \in \mathcal{I}} \exp(\gamma(\theta_{\mu})(\epsilon_{\mu} - \frac{1}{2})) \quad (\because \text{実数の指数法則})$$

ϵ は各成分を独立に 0 か 1 から選ぶので、有限個の因子の積の展開 (Step 2 の $\sum_{\epsilon}$ と同じ 1 対 1 対応) により

$$\begin{aligned} \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}} e^{g(\epsilon)} &= \prod_{\mu \in \mathcal{I}} \left(\exp\left(-\frac{\gamma(\theta_{\mu})}{2}\right) + \exp\left(+\frac{\gamma(\theta_{\mu})}{2}\right) \right) \quad (\because \text{各 } \epsilon_{\mu} \in \{0,1\} \text{ の独立な選択による有限積の展開}) \\ &= \prod_{\mu \in \mathcal{I}} 2 \cosh\left(\frac{\gamma(\theta_{\mu})}{2}\right) \quad \left(\because \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \end{aligned}$$

Step 4 (V'^{-1} についても同じ値)。 $V'^{-1} = \exp(-X)$ であり、 $-X = \sum_{\mu} (-\gamma(\theta_{\mu}))(n_{\mu} - \frac{1}{2}I)$ だから、Step 1~3 をそのまま $\gamma(\theta_{\mu}) \rightarrow -\gamma(\theta_{\mu})$ として適用でき

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(V'^{-1}) &= 2^{M-m} \prod_{\mu \in \mathcal{I}} 2 \cosh\left(\frac{-\gamma(\theta_\mu)}{2}\right) \quad (\because \text{Steps 1-3 を } -X \text{ へ適用}) \\
&= 2^{M-m} \prod_{\mu \in \mathcal{I}} 2 \cosh\left(\frac{\gamma(\theta_\mu)}{2}\right) \quad (\because \cosh \text{ は偶関数}) \\
&= \mathrm{tr}(V') \quad (\because \text{Steps 2-3 の } \mathrm{tr}(V') \text{ の計算})
\end{aligned}$$

最後から 2 番目の等号は $\cosh$ が偶関数であること (主張 1.4) による。

Step 5 (正値性)。定義 9.39 より $\gamma(\theta_\mu) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ であり、主張 1.4 より $\cosh x \geq 1$ 。したがって

$$\begin{aligned}
2 \cosh\left(\frac{\gamma(\theta_\mu)}{2}\right) &\geq 2 \quad (\because \cosh x \geq 1) \\
&> 0 \quad (\because 2 > 0)
\end{aligned}$$

である。さらに $2^{M-m} > 0$ なので、正の因子の有限積である Step 2-3 の表示から $\mathrm{tr}(V') > 0$ を得る。□

定義 10.12 (共役転置・エルミート行列・正定値行列). 行列の積は 定義 1.8、実数の複素数への包含は 定義 1.12 を用いる。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $A = (A_{kl}) \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対し、共役転置を

$$(A^*)_{kl} := \overline{A_{lk}}$$

で定める ($\overline{}$ は 定義 6.1 の複素共役)。 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$ を $n \times 1$ 行列とみなすと $x^* A x \in \mathbb{C}$ (1×1 行列を $\mathbb{C}$ と同一視する) である。

A が $A^* = A$ を満たすとき A は **エルミート** であるという。エルミートな A がさらに

$$\forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}: \quad x^* A x \in \mathbb{R}_{>0}$$

を満たすとき A は **正定値** であるという。

成分がすべて実数で $A^\top = A$ (転置に関して対称) な行列は $\overline{A_{lk}} = A_{lk} = A_{kl}$ よりエルミートである。以下ではこれを **実対称** と呼ぶ。

主張 10.13 ($\|A^*\| = \|A\|$ と極限の共役転置). 共役転置は 定義 10.12、複素共役は 定義 6.1、行列積は 定義 1.8、複素数の積の可換性は 主張 1.35 を用いる。共役の和・積保存は 主張 6.3 の証明冒頭の成分計算による。絶対値の成分表示は 主張 1.41 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ 、 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ および $(A_N)_{N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ を同じ行列空間の列とする。このとき、

- (1) $(AB)^* = B^* A^*$, $(\alpha A + \beta B)^* = \bar{\alpha} A^* + \bar{\beta} B^*$
- (2) $\|A^*\| = \|A\|$ (ノルムは 定義 3.8 のもの)
- (3) $A_N \rightarrow A \implies A_N^* \rightarrow A^*$

証明. (1) 成分計算による。任意の成分 (k, l) について

$$\begin{aligned}
((AB)^*)_{kl} &= \overline{(AB)_{lk}} \quad (\because \text{共役転置の定義}) \\
&= \overline{\sum_j A_{lj} B_{jk}} \quad (\because \text{行列積の定義}) \\
&= \sum_j \overline{A_{lj} B_{jk}} \quad (\because \text{複素共役は和を保つ、主張 6.3 の証明冒頭}) \\
&= \sum_j \overline{A_{lj}} \overline{B_{jk}} \quad (\because \text{複素共役は積を保つ、主張 6.3 の証明冒頭}) \\
&= \sum_j \overline{B_{jk}} \overline{A_{lj}} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の可換性}) \\
&= \sum_j (B^*)_{kj} (A^*)_{jl} \quad (\because \text{共役転置の定義}) \\
&= (B^* A^*)_{kl} \quad (\because \text{行列積の定義})
\end{aligned}$$

第 2 式も同様。

(2) 任意の $A \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}
\|A^*\| &= \sqrt{\sum_{k,l} |(A^*)_{kl}|^2} \quad (\because \text{行列ノルムの定義、定義 3.8}) \\
&= \sqrt{\sum_{k,l} |\overline{A_{lk}}|^2} \quad (\because \text{共役転置の定義}) \\
&= \sqrt{\sum_{k,l} |A_{lk}|^2} \quad (\because \text{共役の成分定義と絶対値の成分表示より (この代入の展開は未記載)、定義 6.1, 主張 1.41}) \\
&= \sqrt{\sum_{k,l} |A_{kl}|^2} \quad (\because (k, l) \mapsto (l, k) \text{ は添字集合の全単射}) \\
&= \|A\| \quad (\because \text{行列ノルムの定義、定義 3.8})
\end{aligned}$$

(3) $A_N \rightarrow A$ と仮定する。このとき

$$\begin{aligned}
\|A_N^* - A^*\| &= \|(A_N - A)^*\| \quad (\because (1) \text{ の共役転置の線型性}) \\
&= \|A_N - A\| \quad (\because (2)) \\
&\rightarrow 0 \quad (\because A_N \rightarrow A \text{ の仮定})
\end{aligned}$$

□

主張 10.14 (エルミート行列の $\exp$ は正定値). 指数は 定義 4.4、指数の積と零での値は 定理 4.5 と 定理 4.6、共役転置と正定値性は 定義 10.12、行列積は 定義 1.8 による。成分の共役と積は 定義 6.1、主張 6.3 の証明冒頭、主張 1.35、絶対値の零との同値は 主張 1.41、ノルムは 定義 3.8、実数の包含は 定義 1.12、トレースは 定義 10.2 を用いる。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

- (1) $S \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ がエルミートなら $\exp(S)$ はエルミートかつ正定値
- (2) A が正定値、 B が可逆なら $B^* A B$ は正定値
- (3) A が正定値、 $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ なら αA は正定値
- (4) A が正定値なら $\text{tr}(A) \in \mathbb{R}_{>0}$

証明. (1) まずエルミート性。部分和を $E_K := \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} S^k$ と置く。任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned}
(S^k)^* &= (S^*)^k \quad (\because \text{積の共役転置を } k \text{ 回繰り返す、主張 10.13}) \\
&= S^k \quad (\because S \text{ はエルミート、すなわち } S^* = S)
\end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned}
E_K^* &= \left(\sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} S^k \right)^* \quad (\because E_K \text{ の定義}) \\
&= \sum_{k=0}^K \overline{\left(\frac{1}{k!} \right)} (S^k)^* \quad (\because \text{共役転置の線型性を和の各項へ適用、主張 10.13}) \\
&= \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} (S^k)^* \quad (\because 1/k! \in \mathbb{R} \text{ なので } \overline{1/k!} = 1/k!) \\
&= \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} S^k \quad (\because \text{上で得た } (S^k)^* = S^k) \\
&= E_K \quad (\because E_K \text{ の定義})
\end{aligned}$$

定理 4.3 より $E_K \rightarrow \exp(S)$ であり、主張 10.13 (3) より $E_K^* \rightarrow \exp(S)^*$ 。上の等式 $E_K^* = E_K$ より、同じ点列 E_K が $\exp(S)^*$ と $\exp(S)$ の両方へ収束するから、主張 3.9 (4) (極限の一意性) より $\exp(S)^* = \exp(S)$ 。

次に正定値性。 $S/2$ もエルミートなので、いま示したことから $\exp(S/2)^* = \exp(S/2)$ 。また $S/2$ は自分自身と可換なので

$$\begin{aligned}\exp(S/2) \exp(S/2) &= \exp(S/2 + S/2) \quad (\because \text{可換な行列の指数の積、定理 4.5}) \\ &= \exp(S) \quad (\because S/2 + S/2 = S)\end{aligned}$$

さらに、

$$\begin{aligned}\exp(S/2) \exp(-S/2) &= \exp(S/2 + (-S/2)) \quad (\because \text{可換な行列の指数の積}) \\ &= \exp(0) \quad (\because S/2 + (-S/2) = 0) \\ &= I \quad (\because \text{零行列の指数、定理 4.6})\end{aligned}$$

従って、 $\exp(S/2)$ は可逆である。よって $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ に対し $w := \exp(S/2)x \neq 0$ であり、

$$\begin{aligned}x^* \exp(S)x &= x^* (\exp(S/2) \exp(S/2))x \quad (\because \text{上で得た } \exp(S/2) \exp(S/2) = \exp(S)) \\ &= x^* \exp(S/2)^* \exp(S/2)x \quad (\because \text{上で示した } \exp(S/2)^* = \exp(S/2)) \\ &= (\exp(S/2)x)^* (\exp(S/2)x) \quad (\because \text{積の共役転置を } n \times 1 \text{ 行列 } x \text{ へ適用、主張 10.13}) \\ &= w^* w \quad (\because w \text{ の定義}) \\ &= \sum_{k=1}^n \overline{w_k} w_k \quad (\because \text{行列積の定義 (1} \times \text{1 成分)}) \\ &= \sum_{k=1}^n |w_k|^2 \quad (\because \overline{z} z = |z|^2) \\ &= \|w\|^2 \quad (\because \text{ベクトルノルムの定義})\end{aligned}$$

$w \neq 0$ なのでどれかの $w_k \neq 0$ であり、非負項の和が正の項を含むから $\|w\|^2 > 0$ 。よって $x^* \exp(S)x > 0$ である。

(2) 共役転置について

$$\begin{aligned}(B^* AB)^* &= B^* A^* B^{**} \quad (\because \text{積の共役転置、主張 10.13}) \\ &= B^* A^* B \quad (\because B^{**} = B) \\ &= B^* AB \quad (\because A^* = A)\end{aligned}$$

従って、エルミートである。 $x \neq 0$ なら B が可逆なので $Bx \neq 0$ であり、

$$\begin{aligned}x^* (B^* AB)x &= (Bx)^* A(Bx) \quad (\because \text{積の共役転置、主張 10.13}) \\ &> 0 \quad (\because A \text{ は正定値かつ } Bx \neq 0)\end{aligned}$$

(3) $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ なので

$$\begin{aligned}(\alpha A)^* &= \overline{\alpha} A^* \quad (\because \text{共役転置の線型性}) \\ &= \alpha A^* \quad (\because \alpha \in \mathbb{R}) \\ &= \alpha A \quad (\because A^* = A)\end{aligned}$$

よりエルミートである。また $x \neq 0$ ならば

$$\begin{aligned}x^* (\alpha A)x &= \alpha (x^* Ax) \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の結合則}) \\ &> 0 \quad (\because \alpha > 0 \text{ かつ } x^* Ax > 0)\end{aligned}$$

(4) $e_k \in \mathbb{C}^n$ を第 k 標準基底ベクトルとする。

$$\begin{aligned}A_{kk} &= e_k^* A e_k \quad (\because \text{標準基底ベクトルによる対角成分の表示}) \\ &> 0 \quad (\because A \text{ は正定値かつ } e_k \neq 0)\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(A) &= \sum_{k=1}^n A_{kk} \quad (\because \text{トレースの定義}) \\ &> 0 \quad (\because n \geq 1 \text{ かつ各 } A_{kk} > 0)\end{aligned}$$

A はエルミートなので各 A_{kk} は実数であり、よって $\mathrm{tr}(A) \in \mathbb{R}_{>0}$ である。 $\square$

主張 10.15 ($iK_1 H_1^{(\pm)}$ と $iK_2^* H_2$ は実対称). 定義 5.8 の記号のもとで、

$$S_1^{(\pm)} := iK_1 H_1^{(\pm)}, \quad S_2 := iK_2^* H_2$$

とおくと、

$$\begin{aligned}S_1^{(\pm)} &= K_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) \mp K_1 G, \quad G := \sigma_1^y \sigma_2^x \sigma_3^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y \\ S_2 &= K_2^* (\sigma_1^x + \sigma_2^x + \cdots + \sigma_M^x)\end{aligned}$$

であり ($M=2$ のとき $G = \sigma_1^y \sigma_2^y$ と読む)、 $S_1^{(\pm)}$ と S_2 はいずれも成分がすべて実数で、転置について対称である。とくに 定義 10.12 の意味でエルミートである。

証明. Step 0 (用いる 2×2 の積)。Pauli 行列の行列表示から直接成分計算して

$$\begin{aligned}\sigma^z \sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{Pauli 行列の行列表示, 主張 7.1}) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列積の成分計算}) \\ &= -i \sigma^x \quad (\because \sigma^x \text{ の行列表示}) \\ \sigma^y \sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{Pauli 行列の行列表示, 主張 7.1}) \\ &= \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列積の成分計算}) \\ &= -i \sigma^z \quad (\because \sigma^z \text{ の行列表示}) \\ \sigma^x \sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{Pauli 行列の行列表示, 主張 7.1}) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列積の成分計算}) \\ &= -i \sigma^y \quad (\because \sigma^y \text{ の行列表示})\end{aligned}$$

また 主張 7.1 より $\sigma^x \sigma^x = I$ 、相異なるサイトに置かれた σ_j^a と σ_k^b ($j \neq k$) は可換である (主張 3.2 (1) より、クロネッカー積どうしの積は各サイトごとの 2 次の行列の積になり、各サイトでは一方が $I_{\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})}$ だから)。

Step 1 (S_2 の形)。定義 5.8 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$ 、 $Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ より

$$\begin{aligned}Z_m Y_m &= (\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z) (\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y) \quad (\because Z_m, Y_m \text{ の定義}) \\ &= (\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x) (\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x) \sigma_m^z \sigma_m^y \quad (\because \sigma_m^z \text{ は } \sigma_j^x (j < m) \text{ と可換}) \\ &= \sigma_m^z \sigma_m^y \quad (\because \sigma_j^x \sigma_j^x = I) \\ &= -i \sigma_m^x \quad (\because \text{Step 0})\end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}
H_2 &= \sum_{m=1}^M Z_m Y_m \quad (\because H_2 \text{ の定義}) \\
&= \sum_{m=1}^M (-i \sigma_m^x) \quad (\because \text{上で得た } Z_m Y_m = -i \sigma_m^x) \\
&= -i \sum_{m=1}^M \sigma_m^x \quad (\because \text{スカラー倍の和の分配})
\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}
S_2 &= i K_2^* H_2 \quad (\because S_2 \text{ の定義}) \\
&= i K_2^* \left(-i \sum_{m=1}^M \sigma_m^x \right) \quad (\because \text{上で得た } H_2 \text{ の表示}) \\
&= i(-i) K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x \quad (\because \text{スカラー倍の交換}) \\
&= K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x \quad (\because i \cdot (-i) = 1)
\end{aligned}$$

Step 2 ($S_1^{(\pm)}$ の形)。 $1 \leq m \leq M-1$ に対して

$$\begin{aligned}
Y_m Z_{m+1} &= (\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y) (\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^x \sigma_{m+1}^z) \quad (\because Y_m, Z_{m+1} \text{ の定義}) \\
&= (\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x)^2 \sigma_m^y \sigma_m^x \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{相異なる因子どうしは可換}) \\
&= \sigma_m^y \sigma_m^x \sigma_{m+1}^z \quad (\because \sigma_j^x \sigma_j^x = I) \\
&= -i \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{Step 0})
\end{aligned}$$

また境界項について

$$\begin{aligned}
Y_M Z_1 &= (\sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y) \sigma_1^z \quad (\because Y_M, Z_1 \text{ の定義}) \\
&= (\sigma_1^x \sigma_1^z) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y \quad (\because \sigma_1^z \text{ は他の因子と可換}) \\
&= -i \sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y \quad (\because \text{Step 0}) \\
&= -i G \quad (\because G \text{ の定義})
\end{aligned}$$

これらと 定義 5.24 の $H_1^{(\pm)}$ の定義を使うと

$$\begin{aligned}
S_1^{(\pm)} &= i K_1 H_1^{(\pm)} \quad (\because S_1^{(\pm)} \text{ の定義}) \\
&= i K_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} \mp Y_M Z_1 \right) \quad (\because H_1^{(\pm)} \text{ の定義}) \\
&= i K_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} (-i \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) \mp (-i G) \right) \quad (\because \text{上で得た } Y_m Z_{m+1}, Y_M Z_1 \text{ の表示}) \\
&= i(-i) K_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \mp G \right) \quad (\because \text{スカラー倍の和の分配と交換}) \\
&= K_1 \sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \mp K_1 G \quad (\because i \cdot (-i) = 1 \text{ と分配則})
\end{aligned}$$

Step 3 (実対称性)。 $\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ と $\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ は成分が実で対称、 $\sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ は成分が純虚数で交代 ($(\sigma^y)^\top = -\sigma^y$) である。クロネッカー積 (定義 3.1) の成分は各因子の成分の積であり、転置は因子ごとの転置になる (主張 3.4) :

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)^\top = A_1^\top \boxtimes \cdots \boxtimes A_M^\top \quad (\cdot: \text{クロネッカー積の転置})$$

したがって、

- $\sigma_m^x : \sigma^x$ が 1 個、他は I 。成分は実、転置で不変。
- $\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z : \sigma^z$ が 2 個、他は I 。成分は実、転置で不変。
- $G : \sigma^y$ が **2 個** (第 1 因子と第 M 因子)、残りは σ^x 。純虚数成分の因子がちょうど 2 個なので、成分の積に現れる虚数単位は $i^2 = -1$ の形でまとまり、成分はすべて実数。転置は $(-1)^2 = 1$ 倍なので $G^\top = G$ 。

$K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$ なので、これらの実係数の有限和である $S_1^{(\pm)}$ 、 S_2 は成分がすべて実数で転置について対称、すなわち実対称である。定義 10.12 の最後の注意より、実対称行列はエルミートである。 $\square$

主張 10.16 (V は正定値、とくに $\text{tr}(V) > 0$)。主張 9.47 の $V := (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ について ($(V_1^{(\pm)})^{1/2} := \exp\left(\frac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)}\right) = \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)$ は主張 9.14 の proof で用いられている規約)、

$$V = (2s_2)^{M/2} \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)$$

であり、 V は可逆で正定値、 V^{-1} も正定値である。とくに

$$\text{tr}(V) \in \mathbb{R}_{>0}, \quad \text{tr}(V^{-1}) \in \mathbb{R}_{>0}$$

証明. Step 1 (表示)。

$$\begin{aligned} V &= (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2} \quad (\because V \text{ の定義}) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) V_2 \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because (V_1^{(\pm)})^{1/2} \text{ の規約}) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp(K_2^* \sum_m \sigma_m^x) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because V_2 \text{ の記号の定義}) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) (2s_2)^{M/2} \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{実対称性の Step 1: 指数の中身は } S_2. s_2 := \sinh 2K_2) \\ &= (2s_2)^{M/2} \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{スカラー行列は全行列と可換}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} VW &= (2s_2)^{M/2} \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) (2s_2)^{-M/2} \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(-S_2) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{Step 1 の表示と } W \text{ の定義}) \\ &= (2s_2)^{M/2} (2s_2)^{-M/2} \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(-S_2) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{スカラー行列は全行列と可換}) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(-S_2) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because (2s_2)^{M/2} (2s_2)^{-M/2} = 1) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)} - \frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(-S_2) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{可換行列の exp 積公式. } \frac{1}{2}S_1^{(\pm)} \text{ と } -\frac{1}{2}S_1^{(\pm)} \text{ は可換}) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(S_2) \exp(-S_2) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \exp(O) = I) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp(S_2 - S_2) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{可換行列の exp 積公式. } S_2 \text{ と } -S_2 \text{ は可換}) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \exp(O) = I) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)} - \frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{可換行列の exp 積公式. } \frac{1}{2}S_1^{(\pm)} \text{ と } -\frac{1}{2}S_1^{(\pm)} \text{ は可換}) \\ &= I \quad (\because \exp(O) = I) \end{aligned}$$

これが statement の表示である (V_2 の記号の定義は 定義 5.8、指数の中身が S_2 に等しいことは 主張 10.15 の Step 1、スカラーを前へ出す操作は 主張 3.6)。

Step 2 (各因子の性質)。主張 10.15 より $\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}$ と S_2 はエルミートである。主張 10.14 (1) より

- $B := \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)$ はエルミートかつ正定値、とくに可逆
- $A := \exp(S_2)$ は正定値

Step 3 (正定値性)。

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(S_2)\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) &= BAB \quad (\because A, B \text{ の定義}) \\ &= B^*AB \quad (\because B \text{ はエルミート: } B^* = B)\end{aligned}$$

主張 10.14 (2) より B^*AB は正定値。 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、同 (3) より $V = (2s_2)^{M/2}B^*AB$ も正定値である。

Step 4 (可逆性と V^{-1})。 $W := (2s_2)^{-M/2} \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(-S_2)\exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)$ と置く。

$$\begin{aligned}WV &= (2s_2)^{-M/2} \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(-S_2)\exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)(2s_2)^{M/2} \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(S_2)\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because W \text{ の定義と Step 1 の表示}) \\ &= (2s_2)^{-M/2}(2s_2)^{M/2} \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(-S_2)\exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(S_2)\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{スカラー行列は全行列と可換}) \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(-S_2)\exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(S_2)\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because (2s_2)^{-M/2}(2s_2)^{M/2} = 1) \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(-S_2)\exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)} + \frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(S_2)\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{可換行列の exp 積公式。 } -\frac{1}{2}S_1^{(\pm)} \text{ と } \frac{1}{2}S_1^{(\pm)} \text{ は可換}) \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(-S_2)\exp(S_2)\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \exp(O) = I) \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(-S_2 + S_2)\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{可換行列の exp 積公式。 } -S_2 \text{ と } S_2 \text{ は可換}) \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \exp(O) = I) \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)} + \frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{可換行列の exp 積公式。 } -\frac{1}{2}S_1^{(\pm)} \text{ と } \frac{1}{2}S_1^{(\pm)} \text{ は可換}) \\ &= I \quad (\because \exp(O) = I)\end{aligned}$$

(スカラーを前へ出す操作は 主張 3.6、可換行列の exp 積公式は 定理 4.5、 $\exp(O) = I$ は 定理 4.6。) 以上の二つの鎖から $VW = I$ と $WV = I$ がともに成り立つから V は可逆で、

$$V^{-1} = W = (2s_2)^{-M/2} \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)\exp(-S_2)\exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}\right)$$

である。 $-\frac{1}{2}S_1^{(\pm)}$ と $-S_2$ もエルミートなので、Step 2~3 をそのまま適用して V^{-1} も正定値である。

Step 5 (トレース)。主張 10.14 (4) より $\text{tr}(V) > 0$ 、 $\text{tr}(V^{-1}) > 0$ 。 □

主張 10.17 (符号反転共役 U)。 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、

$$E := \prod_{\substack{1 \leq m \leq M \\ m \text{ 奇数}}} \sigma_m^x, \quad F := \prod_{m=1}^M \sigma_m^z, \quad U := EF \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

とおく (積の因子は相異なるサイトに置かれた 2 次の行列のクロネッカー積なので、主張 3.2 (1) より互いに可換であり、順序は問わない)。このとき U は可逆で、複号同順に

$$U S_1^{(\pm)} U^{-1} = -S_1^{(\pm)}, \quad U S_2 U^{-1} = -S_2$$

が成り立つ。すなわち $U H_1^{(\pm)} U^{-1} = -H_1^{(\pm)}$ 、 $U H_2 U^{-1} = -H_2$ 。

証明. Step 0 (可逆性)。主張 7.1 より $\sigma^x \sigma^x = \sigma^z \sigma^z = I$ なので、各サイト m で

$$\begin{aligned}\sigma_m^x \sigma_m^x &= I \quad (\because \text{パウリ行列の積}), \\ \sigma_m^z \sigma_m^z &= I \quad (\because \text{パウリ行列の積})\end{aligned}$$

が成り立つ。したがって σ_m^x 、 σ_m^z はいずれも自分自身を逆行列にもつ可逆行列であり、可逆行列の有限積である E, F, U も可逆である。

Step 1 (1 因子ごとの共役)。 $j \neq k$ なら σ_j^a と σ_k^b は可換なので、共役 $X \mapsto F X F^{-1}$ において F のうち第 k 因子の σ_k^z だけが効く。主張 7.1 の $\sigma^z \sigma^x = -\sigma^x \sigma^z$ 、 $\sigma^y \sigma^z = -\sigma^z \sigma^y$ 、および $(\sigma^z)^{-1} = \sigma^z$ より

$$\begin{aligned}F \sigma_k^x F^{-1} &= \sigma_k^z \sigma_k^x \sigma_k^z \quad (\because k \text{ 以外のサイトの因子は } \sigma_k^x \text{ と可換}) \\ &= -\sigma_k^x \sigma_k^z \sigma_k^z \quad (\because \text{パウリ行列の積}) \\ &= -\sigma_k^x \quad (\because \text{パウリ行列の積}), \\ F \sigma_k^y F^{-1} &= \sigma_k^z \sigma_k^y \sigma_k^z \quad (\because k \text{ 以外のサイトの因子は } \sigma_k^y \text{ と可換}) \\ &= -\sigma_k^y \sigma_k^z \sigma_k^z \quad (\because \text{パウリ行列の積}) \\ &= -\sigma_k^y \quad (\because \text{パウリ行列の積}), \\ F \sigma_k^z F^{-1} &= \sigma_k^z \sigma_k^z \sigma_k^z \quad (\because k \text{ 以外のサイトの因子は } \sigma_k^z \text{ と可換}) \\ &= \sigma_k^z \quad (\because \text{パウリ行列の積})\end{aligned}$$

E は奇数番目の因子にだけ σ^x をもつ。したがって k が偶数なら全因子が σ_k^a と可換であり、 k が奇数なら第 k 因子だけを計算すればよい。

$$\begin{aligned}E \sigma_k^a E^{-1} &= \sigma_k^a \quad (\because k \text{ が偶数なら } E \text{ の全因子と可換}), \\ E \sigma_k^x E^{-1} &= \sigma_k^x \sigma_k^x \sigma_k^x \quad (\because k \text{ が奇数なら第 } k \text{ 因子だけが効く}) \\ &= \sigma_k^x \quad (\because \text{パウリ行列の積}), \\ E \sigma_k^y E^{-1} &= \sigma_k^x \sigma_k^y \sigma_k^x \quad (\because k \text{ が奇数なら第 } k \text{ 因子だけが効く}) \\ &= -\sigma_k^y \sigma_k^x \sigma_k^x \quad (\because \text{パウリ行列の積}) \\ &= -\sigma_k^y \quad (\because \text{パウリ行列の積}), \\ E \sigma_k^z E^{-1} &= \sigma_k^x \sigma_k^z \sigma_k^x \quad (\because k \text{ が奇数なら第 } k \text{ 因子だけが効く}) \\ &= -\sigma_k^z \sigma_k^x \sigma_k^x \quad (\because \text{パウリ行列の積}) \\ &= -\sigma_k^z \quad (\because \text{パウリ行列の積})\end{aligned}$$

この 2 つを合成して ($U X U^{-1} = E (F X F^{-1}) E^{-1}$)、

$$\begin{aligned}U \sigma_k^x U^{-1} &= E (F \sigma_k^x F^{-1}) E^{-1} \quad (\because U = EF) \\ &= E (-\sigma_k^x) E^{-1} \quad (\because F \text{ による共役の計算}) \\ &= -\sigma_k^x \quad (\because E \sigma_k^x E^{-1} = \sigma_k^x), \\ U \sigma_k^y U^{-1} &= E (F \sigma_k^y F^{-1}) E^{-1} \quad (\because U = EF) \\ &= -E \sigma_k^y E^{-1} \quad (\because F \text{ による共役の計算}) \\ &= \begin{cases} +\sigma_k^y & (k \text{ 奇数}) \\ -\sigma_k^y & (k \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because E \text{ による共役の場合分け}), \\ U \sigma_k^z U^{-1} &= E (F \sigma_k^z F^{-1}) E^{-1} \quad (\because U = EF) \\ &= E \sigma_k^z E^{-1} \quad (\because F \text{ による共役の計算}) \\ &= \begin{cases} -\sigma_k^z & (k \text{ 奇数}) \\ +\sigma_k^z & (k \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because E \text{ による共役の場合分け})\end{aligned}$$

以下、共役 $X \mapsto UXU^{-1}$ が $\mathbb{C}$ 線型で積を保つこと ($U(XY)U^{-1} = (UXU^{-1})(UYU^{-1})$, $U^{-1}U = I$ より) を繰り返し使う。

Step 2 (Z_m と Y_m への作用)。定義 5.8 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$, $Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ の各因子に Step 1 を適用すると、符号は因子ごとの符号の積になる。先頭の σ^x の因子は $m-1$ 個あり、Step 1 の第 1 式より各々 -1 なので寄与は $(-1)^{m-1}$ 。第 m 因子の寄与は Step 1 の第 2・第 3 式より

$$\begin{aligned} UZ_mU^{-1} &= (-1)^{m-1} \cdot \begin{cases} -1 & (m \text{ 奇数}) \\ +1 & (m \text{ 偶数}) \end{cases} Z_m \quad (\because \text{Step 1 を } Z_m \text{ の各因子に適用}) \\ &= -Z_m \quad (\because m \text{ の偶奇ごとに符号を計算}), \\ UY_mU^{-1} &= (-1)^{m-1} \cdot \begin{cases} +1 & (m \text{ 奇数}) \\ -1 & (m \text{ 偶数}) \end{cases} Y_m \quad (\because \text{Step 1 を } Y_m \text{ の各因子に適用}) \\ &= +Y_m \quad (\because m \text{ の偶奇ごとに符号を計算}) \end{aligned}$$

(m 奇数なら $(-1)^{m-1} = +1$, m 偶数なら $(-1)^{m-1} = -1$ なので、いずれの場合も積は Z_m について -1 , Y_m について $+1$ になる。 $m=1$ のときは先頭の σ^x の因子が無く $Z_1 = \sigma_1^z$, $Y_1 = \sigma_1^y$ だが、1 は奇数なので符号は同じく -1 , $+1$ である。 $**_m$ の偶奇によらない $**$ ことが要点である。)

Step 3 ($H_1^{(\pm)}$ と H_2 への作用)。定義 5.24 の $H_1^{(\pm)} = Y_1Z_2 + \cdots + Y_{M-1}Z_M \mp Y_MZ_1$ と主張 10.15 の Step 1 の $H_2 = Z_1Y_1 + \cdots + Z_MY_M$ は、どちらも Y と Z を 1 個ずつ掛けた項の係数 ± 1 の有限和である。Step 2 より各項について

$$\begin{aligned} U(Y_jZ_k)U^{-1} &= (UY_jU^{-1})(UZ_kU^{-1}) \quad (\because \text{共役は積を保つ}) \\ &= (+Y_j)(-Z_k) \quad (\because \text{Step 2}) \\ &= -Y_jZ_k \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の両立}), \\ U(Z_jY_j)U^{-1} &= (UZ_jU^{-1})(UY_jU^{-1}) \quad (\because \text{共役は積を保つ}) \\ &= (-Z_j)(+Y_j) \quad (\because \text{Step 2}) \\ &= -Z_jY_j \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の両立}) \end{aligned}$$

なので、共役の $\mathbb{C}$ 線型性より複号同順に

$$UH_1^{(\pm)}U^{-1} = -H_1^{(\pm)}, \quad UH_2U^{-1} = -H_2$$

Step 4 ($S_1^{(\pm)}, S_2$ への言い換え)。 $S_1^{(\pm)} = iK_1H_1^{(\pm)}$, $S_2 = iK_2^*H_2$ であり、スカラー倍は共役と可換なので Step 3 から

$$\begin{aligned} US_1^{(\pm)}U^{-1} &= iK_1UH_1^{(\pm)}U^{-1} \quad (\because S_1^{(\pm)} = iK_1H_1^{(\pm)} \text{ かつ共役はスカラー倍を保つ}) \\ &= -iK_1H_1^{(\pm)} \quad (\because \text{Step 3}) \\ &= -S_1^{(\pm)} \quad (\because S_1^{(\pm)} = iK_1H_1^{(\pm)}), \\ US_2U^{-1} &= iK_2^*UH_2U^{-1} \quad (\because S_2 = iK_2^*H_2 \text{ かつ共役はスカラー倍を保つ}) \\ &= -iK_2^*H_2 \quad (\because \text{Step 3}) \\ &= -S_2 \quad (\because S_2 = iK_2^*H_2) \end{aligned}$$

$K_1, K_2^* > 0$ より $iK_1, iK_2^* \neq 0$ なので、逆に S についての等式から H についての等式も従い、両者は同値である。□

主張 10.18 ($c = (2 \sinh 2K_2)^{M/2}$). 主張 9.47 の定数 $c \in \mathbb{C}^\times$ は

$$c = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} = (2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$$

である。すなわち

$$V = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} V'$$

証明. 以下 $S_1 := S_1^{(\pm)}$ (符号の選択は固定する), S_2 は主張 10.15 のもの, $\tau := \text{tr}(\exp(S_1) \exp(S_2))$ と書く。

Step 1 ($\text{tr}(V)$ と $\text{tr}(V^{-1})$ を τ で表す)。主張 10.16 Step 1 の表示と 主張 10.3 (1)(2) より

$$\begin{aligned} \text{tr}(V) &= (2s_2)^{M/2} \text{tr}(\exp(\tfrac{1}{2}S_1) \exp(S_2) \exp(\tfrac{1}{2}S_1)) \quad (\because \text{トレースの線型性}) \\ &= (2s_2)^{M/2} \text{tr}(\exp(\tfrac{1}{2}S_1) \exp(\tfrac{1}{2}S_1) \exp(S_2)) \quad (\because \text{巡回性を } A = \exp(\tfrac{1}{2}S_1) \exp(S_2), B = \exp(\tfrac{1}{2}S_1) \text{ に適用}) \\ &= (2s_2)^{M/2} \text{tr}(\exp(S_1) \exp(S_2)) \quad (\because \text{可換なので } \exp(\tfrac{1}{2}S_1)^2 = \exp(S_1)) \\ &= (2s_2)^{M/2} \tau \quad (\because \tau \text{ の定義}) \end{aligned}$$

同じ計算を 主張 10.16 Step 4 の V^{-1} の表示に適用して

$$\begin{aligned} \text{tr}(V^{-1}) &= (2s_2)^{-M/2} \text{tr}(\exp(-\tfrac{1}{2}S_1) \exp(-S_2) \exp(-\tfrac{1}{2}S_1)) \quad (\because \text{トレースの線型性}) \\ &= (2s_2)^{-M/2} \text{tr}(\exp(-\tfrac{1}{2}S_1) \exp(-\tfrac{1}{2}S_1) \exp(-S_2)) \quad (\because \text{トレースの巡回性}) \\ &= (2s_2)^{-M/2} \text{tr}(\exp(-S_1) \exp(-S_2)) \quad (\because \exp(-\tfrac{1}{2}S_1)^2 = \exp(-S_1)) \end{aligned}$$

Step 2 ($\text{tr}(\exp(-S_1) \exp(-S_2)) = \tau$)。主張 10.17 の U について、共役は行列の積とスカラー倍を保ち、有限部分和の極限とも交換する ($\|UXU^{-1} - UYU^{-1}\| = \|U(X - Y)U^{-1}\| \leq \|U\| \|U^{-1}\| \|X - Y\|$: 主張 3.10) から、 $U(S)^k U^{-1} = (USU^{-1})^k$ と定義 4.4 より

$$U \exp(S) U^{-1} = \exp(USU^{-1}) \quad (S \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}))$$

これを $S = S_1, S_2$ に適用し、主張 10.17 と 主張 10.3 (4) を使って

$$\begin{aligned} \tau &= \text{tr}(\exp(S_1) \exp(S_2)) \quad (\because \tau \text{ の定義}) \\ &= \text{tr}(U \exp(S_1) \exp(S_2) U^{-1}) \quad (\because \text{トレースは共役で不変}) \\ &= \text{tr}((U \exp(S_1) U^{-1}) (U \exp(S_2) U^{-1})) \quad (\because U^{-1}U = I) \\ &= \text{tr}(\exp(US_1 U^{-1}) \exp(US_2 U^{-1})) \quad (\because \text{上の等式 } U \exp(S) U^{-1} = \exp(USU^{-1})) \\ &= \text{tr}(\exp(-S_1) \exp(-S_2)) \quad (\because \text{符号反転共役}) \end{aligned}$$

Step 3 (c^2 の決定)。まず $V^{-1} = c^{-1}V'^{-1}$ を確かめる。主張 10.16 Step 4 より V は可逆で逆行列 V^{-1} をもち、主張 10.11 Step 1 より V' も可逆で逆行列 $V'^{-1} = \exp(-X)$ をもつ。 $c \in \mathbb{C}^\times$ すなわち $c \neq 0$ なので $c^{-1} \in \mathbb{C}$ が取れて、主張 9.47 の $V = cV'$ から

$$\begin{aligned} (c^{-1}V'^{-1})V &= (c^{-1}V'^{-1})(cV') \quad (\because V = cV') \\ &= c^{-1}c (V'^{-1}V') \quad (\because \text{スカラー倍は行列の積と可換に前へ出せる}) \\ &= 1 \cdot (V'^{-1}V') \quad (\because c^{-1}c = 1) \\ &= V'^{-1}V' \quad (\because \text{スカラー1の積}) \\ &= I \quad (\because V'^{-1} \text{ は } V' \text{ の逆行列}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V(c^{-1}V'^{-1}) &= (cV')(c^{-1}V'^{-1}) \quad (\because V = cV') \\
&= cc^{-1}(V'V'^{-1}) \quad (\because \text{スカラー倍は行列の積と可換に前へ出せる}) \\
&= 1 \cdot (V'V'^{-1}) \quad (\because cc^{-1} = 1) \\
&= V'V'^{-1} \quad (\because \text{スカラー1の積}) \\
&= I \quad (\because V'^{-1} \text{ は } V' \text{ の逆行列})
\end{aligned}$$

(スカラー倍は行列の積と可換に前へ出せる：主張 3.6。) よって $c^{-1}V'^{-1}$ は V の左逆行列でも右逆行列でもある。逆行列は存在すれば一意である ($AB = BA = I$ かつ $AC = CA = I$ なら次の鎖で一意である)。

$$\begin{aligned}
B &= BI \quad (\because \text{単位行列}) \\
&= B(AC) \quad (\because AC = I) \\
&= (BA)C \quad (\because \text{結合則}) \\
&= IC \quad (\because BA = I) \\
&= C \quad (\because \text{単位行列})
\end{aligned}$$

したがって

$$V^{-1} = c^{-1}V'^{-1}$$

が従う。したがって 主張 10.3 (1) より

$$\begin{aligned}
\text{tr}(V) &= c \text{tr}(V') \quad (\because V = cV' \text{ とトレースの線型性}), \\
\text{tr}(V^{-1}) &= c^{-1} \text{tr}(V'^{-1}) \quad (\because V^{-1} = c^{-1}V'^{-1} \text{ とトレースの線型性})
\end{aligned}$$

主張 10.11 より $\text{tr}(V') = \text{tr}(V'^{-1}) > 0$ なので、これらは 0 でなく、辺々割ることができて

$$\begin{aligned}
\frac{\text{tr}(V)}{\text{tr}(V^{-1})} &= \frac{c \text{tr}(V')}{c^{-1} \text{tr}(V'^{-1})} \quad (\because \text{直前の二つの表示}) \\
&= c^2 \frac{\text{tr}(V')}{\text{tr}(V'^{-1})} \quad (\because c \neq 0) \\
&= c^2 \quad (\because \text{tr}(V') = \text{tr}(V'^{-1}))
\end{aligned}$$

一方 Step 1・Step 2 より (主張 10.16 より $\text{tr}(V) > 0$ なので $\tau = (2s_2)^{-M/2}\text{tr}(V) \neq 0$)

$$\begin{aligned}
\frac{\text{tr}(V)}{\text{tr}(V^{-1})} &= \frac{(2s_2)^{M/2} \tau}{(2s_2)^{-M/2} \tau} \quad (\because \text{Step 1 と Step 2}) \\
&= (2s_2)^M \quad (\because \tau \neq 0 \text{ かつ指数法則})
\end{aligned}$$

よって $c^2 = (2s_2)^M$ 。

Step 4 (符号の確定)。 $c = \text{tr}(V)/\text{tr}(V')$ であり、主張 10.16 より $\text{tr}(V) \in \mathbb{R}_{>0}$ 、主張 10.11 より $\text{tr}(V') \in \mathbb{R}_{>0}$ なので $c \in \mathbb{R}_{>0}$ である。

$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ である。次の一続きで

$$\begin{aligned}
\left(c - (2s_2)^{M/2}\right) \left(c + (2s_2)^{M/2}\right) &= c^2 - \left((2s_2)^{M/2}\right)^2 \quad (\because \text{和と差の積}) \\
&= c^2 - (2s_2)^M \quad (\because \text{指数法則 } \left((2s_2)^{M/2}\right)^2 = (2s_2)^M) \\
&= (2s_2)^M - (2s_2)^M \quad (\because \text{Step 3 の } c^2 = (2s_2)^M) \\
&= 0
\end{aligned}$$

である。

$c > 0$ かつ $(2s_2)^{M/2} > 0$ より第 2 因子は正で 0 でない。よって第 1 因子が 0 であり $c = (2s_2)^{M/2}$ 。□

主張 10.19 (V の固有値). $\epsilon \in \{0, 1\}^{\mathcal{I}}$ に対して

$$\Lambda_\epsilon := (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2} \right) \right) \in \mathbb{R}_{>0}$$

とおく。このとき

- (1) $VQ_\epsilon = \Lambda_\epsilon Q_{\epsilon_0}$ とくに V は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて $\{\Lambda_\epsilon (\text{重複度 } 2^{M-m})\}_\epsilon$ で尽くされる (総個数 2^M)。
- (2) 固有値はすべて正の実数であり、最大のものは全ての $\epsilon_\mu = 1$ を取ったとき、最小のものは全ての $\epsilon_\mu = 0$ を取ったときである：

$$\Lambda_{\max} = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \right), \quad \Lambda_{\min} = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \right)$$

(したがって $\Lambda_{\max} \Lambda_{\min} = (2 \sinh 2K_2)^M = c^2$ 。)

証明. (1) 主張 10.18 より $V = (2s_2)^{M/2} V'$ であり、主張 10.10 より $V'Q_\epsilon = e^{g(\epsilon)} Q_\epsilon$ だから

$$\begin{aligned} VQ_\epsilon &= (2s_2)^{M/2} V'Q_\epsilon \quad (\because V = (2s_2)^{M/2} V') \\ &= (2s_2)^{M/2} e^{g(\epsilon)} Q_\epsilon \quad (\because V'Q_\epsilon = e^{g(\epsilon)} Q_\epsilon) \\ &= \Lambda_\epsilon Q_\epsilon \quad (\because \Lambda_\epsilon \text{ の定義}) \end{aligned}$$

対角化可能性・重複度・総個数は 主張 10.10 の Step 4 と同じ議論 (主張 10.9 (5) による直和分解) で得られる。スカラー倍は固有ベクトルを変えない。

(2) $(2s_2)^{M/2} > 0$ と $e^{g(\epsilon)} > 0$ より $\Lambda_\epsilon > 0$ 。

大小の比較。 $\Lambda_\epsilon = (2s_2)^{M/2} e^{g(\epsilon)}$ で $(2s_2)^{M/2}$ は ϵ に依らない正の定数、 $t \mapsto e^t$ は実数上の狭義単調増加関数なので、 Λ_ϵ の大小は $g(\epsilon) = \sum_{\mu} \gamma(\theta_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2})$ の大小と一致する。定義 9.39 より $\gamma(\theta_\mu) \geq 0$ なので、各項 $\gamma(\theta_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2})$ は $\epsilon_\mu = 1$ のとき $+\frac{1}{2}\gamma(\theta_\mu)$ 、 $\epsilon_\mu = 0$ のとき $-\frac{1}{2}\gamma(\theta_\mu)$ であり、前者が後者以上である。各項は独立に選べるので、和が最大になるのは全ての $\epsilon_\mu = 1$ 、最小になるのは全ての $\epsilon_\mu = 0$ のときである。それぞれ

$$\begin{aligned} g(1, \dots, 1) &= \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \left(1 - \frac{1}{2} \right) \quad (\because g \text{ の定義に } \epsilon_\mu = 1 \text{ を代入}) \\ &= \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \cdot \frac{1}{2} \quad (\because 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \quad (\because \text{和の線型性}) \\ g(0, \dots, 0) &= \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \left(0 - \frac{1}{2} \right) \quad (\because g \text{ の定義に } \epsilon_\mu = 0 \text{ を代入}) \\ &= \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \quad (\because 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \quad (\because \text{和の線型性}) \end{aligned}$$

を代入して statement の $\Lambda_{\max}, \Lambda_{\min}$ を得る。積は次の鎖で求まる。

$$\begin{aligned}
\Lambda_{\max}\Lambda_{\min} &= (2s_2)^{M/2}e^{g(1,\dots,1)}(2s_2)^{M/2}e^{g(0,\dots,0)} \quad (\because \Lambda_{\max}, \Lambda_{\min} \text{ の表式}) \\
&= \left((2s_2)^{M/2}(2s_2)^{M/2}\right) \left(e^{g(1,\dots,1)}e^{g(0,\dots,0)}\right) \quad (\because \text{積の可換則と結合則}) \\
&= (2s_2)^M \left(e^{g(1,\dots,1)}e^{g(0,\dots,0)}\right) \quad (\because \text{冪の法則}) \\
&= (2s_2)^M e^{g(1,\dots,1)+g(0,\dots,0)} \quad (\because \text{指数法則}) \\
&= (2s_2)^M e^0 \quad (\because g(1,\dots,1) + g(0,\dots,0) = 0) \\
&= (2s_2)^M \quad (\because e^0 = 1)
\end{aligned}$$

□

11 分配関数の転送行列とパウリ行列表示の同一視

注意 11.1 (この章の目的と記号の対応). 定義 2.3 は転送行列 V_1, V_2 を ** 成分 ** で定義し、主張 2.4 は分配関数をそのトレースで表した。一方 定義 5.8 は同じ名前の V_1, V_2 を ** パウリ行列 ** で定義し、以降の章はすべてそちらを使っている。 ** 両者が同じ行列であることは、これまで本文のどこでも示されていない。 ** この章でそれを示す。これが無いと、固有値をいくら求めても分配関数へ戻れない。

まず記号を対応させる。定義 2.2 の格子は $\{1, \dots, M\} \times \{1, \dots, N\}$ で、第 1 引数 (添字 i) 方向の結合定数が J 、第 2 引数 (添字 j) 方向の結合定数が J' であった。定義 2.3 の $\mathfrak{M} = \text{Map}(\{1, \dots, N\}, \{-1, 1\})$ は ** 第 2 引数方向の 1 列ぶんの配置 ** であり、転送行列はこの長さ N の鎖の上に作用する。トレースの冪 M は転送の回数である。

一方 定義 5.8 以降の章では、鎖の長さが M と書かれている $(\text{Mat}(2^M, \mathbb{C}), \sigma_1^z \sigma_2^z + \dots + \sigma_M^z \sigma_1^z)$ 。すなわち ** 001 章の N と 004 章以降の M が同じもの ** (鎖の長さ) であり、001 章の M (転送の回数) に対応する記号は 004 章以降には無い。

この章では 004 章以降の記号系に合わせ、 ** 鎖の長さを M 、転送の回数を N_{row} と書く **。すなわち 定義 2.2 と 定義 2.3 の主張を引用するときは、そこでの N を M に、そこでの M を N_{row} に読み替える。この読み替えは記号の付け替えだけであり、主張の内容は変えない。

結合定数の対応は

$$K_1 = J', \quad K_2 = J$$

である。根拠は次のとおり。定義 2.3 の V_1 の指数には $J' \mu(j) \mu(j+1)$ 、すなわち ** 同一の鎖の隣接サイトどうし ** の積が現れる。定義 5.8 の $V_1 = \exp(K_1(\sigma_1^z \sigma_2^z + \dots + \sigma_M^z \sigma_1^z))$ も同一の鎖の隣接サイトどうしである。 V_2 はどちらも ** 隣り合う 2 本の鎖の同じサイトどうし ** ($J \mu(j) \mu'(j)$) を結ぶ。役割が一致するのはこの組み合わせに限る。

この章の結論は、主張 11.7 までで 2 つの V_1, V_2 が同一の行列だと分かり、主張 11.17 で

$$Z(J, J') = \text{tr} \left(P^{(+)} \left(V^{(+)} \right)^{N_{\text{row}}} \right) + \text{tr} \left(P^{(-)} \left(V^{(-)} \right)^{N_{\text{row}}} \right)$$

が得られることである ($V^{(\pm)} := (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ は 主張 9.47 の V 、 $P^{(\pm)}$ は ε の固有空間への射影子)。右辺は 主張 10.19 で固有値が分かっているので、これで分配関数が固有値の言葉で書ける。

定義 11.2 (スピン配置と標準基底の同一視). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 2.3 の $\mathfrak{M} = \text{Map}(\{1, \dots, M\}, \{-1, 1\})$ とする。ここでは、転送行列の定義で鎖の長さを表していた N を M と書き換えている。この記号の付け替え以外は、同じスピン配置の集合である。また、定義 5.12 の多重添字 $\mathcal{I} = \{1, 2\}^M$ ・基底 $f_I = e_{i_1} \boxtimes \dots \boxtimes e_{i_M} \in \mathcal{F} = \mathbb{C}^{2^M}$ について、写像 $\iota: \mathfrak{M} \rightarrow \mathcal{I}$ を

$$\iota(\mu) := (i_1, \dots, i_M), \quad i_m := \begin{cases} 1 & (\mu(m) = +1) \\ 2 & (\mu(m) = -1) \end{cases}$$

で定める。 $\{-1, 1\} \rightarrow \{1, 2\}$ の対応 $+1 \mapsto 1$, $-1 \mapsto 2$ は全単射なので、 ι は全単射である（成分ごとに全単射だから）。

定義 2.3 は「行・列の番号 $\{1, \dots, 2^M\}$ と $\mathfrak{M}$ の間の全単射をひとつ固定して同一視する。以下の議論は、この全単射の取り方に依らない」と述べていた。* 以下ではその全単射として ι を（および 定義 5.12 による $\mathcal{I}$ と行・列番号の対応を）取る。* すなわち $V_1, V_2 \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の成分を

$$(V_a)_{\mu, \mu'} := (V_a)_{\iota(\mu), \iota(\mu')} \quad (a = 1, 2)$$

と読む。取り方に依らないと述べられているので、この選択で一般性を失わない。

主張 11.3 (σ_m^z の基底 $f_{\iota(\mu)}$ への作用). $\mu \in \mathfrak{M}$, $m \in \{1, \dots, M\}$ について、

$$\sigma_m^z f_{\iota(\mu)} = \mu(m) f_{\iota(\mu)}$$

が成り立つ。とくに $m, m' \in \{1, \dots, M\}$ について $\sigma_m^z \sigma_{m'}^z f_{\iota(\mu)} = \mu(m) \mu(m') f_{\iota(\mu)}$ であり、これらはすべて基底 $(f_I)_{I \in \mathcal{I}}$ に関して対角行列である。

証明. 主張 7.1 の $\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ と 定義 5.12 の $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ より、 $\mathbb{C}^2$ の中で

$$\begin{aligned} \sigma^z e_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義の代入}) \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列と列ベクトルの積}) \\ &= e_1 \quad (\because e_1 \text{ の定義}), \\ \sigma^z e_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義の代入}) \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列と列ベクトルの積}) \\ &= -e_2 \quad (\because e_2 \text{ の定義}). \end{aligned}$$

である。定義 11.2 の ι は $\mu(m) = +1$ のとき $i_m = 1$ 、 $\mu(m) = -1$ のとき $i_m = 2$ と定めたから、いずれの場合も $\sigma^z e_{i_m} = \mu(m) e_{i_m}$ と言で書ける。

定義 5.1 の $\sigma_m^z = I \boxtimes \dots \boxtimes \sigma^z \boxtimes \dots \boxtimes I$ (第 m 因子だけが σ^z) より

主張 3.2 (クロネッカー積の積は因子ごとの積) と 主張 3.3 を順に用いると

$$\begin{aligned} \sigma_m^z f_{\iota(\mu)} &= (I \boxtimes \dots \boxtimes \sigma^z \boxtimes \dots \boxtimes I) f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{サイト演算子 } \sigma_m^z \text{ の定義}) \\ &= (I \boxtimes \dots \boxtimes \sigma^z \boxtimes \dots \boxtimes I) (e_{i_1} \boxtimes \dots \boxtimes e_{i_m} \boxtimes \dots \boxtimes e_{i_M}) \quad (\because \text{配位基底同型の定義}) \\ &= (I e_{i_1}) \boxtimes \dots \boxtimes (\sigma^z e_{i_m}) \boxtimes \dots \boxtimes (I e_{i_M}) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\ &= e_{i_1} \boxtimes \dots \boxtimes (\sigma^z e_{i_m}) \boxtimes \dots \boxtimes e_{i_M} \quad (\because \text{恒等行列の作用}) \\ &= e_{i_1} \boxtimes \dots \boxtimes (\mu(m) e_{i_m}) \boxtimes \dots \boxtimes e_{i_M} \quad (\because \sigma^z e_{i_m} = \mu(m) e_{i_m}) \\ &= \mu(m) (e_{i_1} \boxtimes \dots \boxtimes e_{i_M}) \quad (\because \text{クロネッカー積の多重線型性}) \\ &= \mu(m) f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{配位基底同型の定義}) \end{aligned}$$

積については、いま示した作用を 2 回用いると

$$\begin{aligned}
\sigma_m^z \sigma_{m'}^z f_{\iota(\mu)} &= \sigma_m^z (\mu(m') f_{\iota(\mu)}) \quad (\because \sigma_{m'}^z f_{\iota(\mu)} = \mu(m') f_{\iota(\mu)}) \\
&= \mu(m') \sigma_m^z f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{行列作用の線型性}) \\
&= \mu(m') (\mu(m) f_{\iota(\mu)}) \quad (\because \sigma_m^z f_{\iota(\mu)} = \mu(m) f_{\iota(\mu)}) \\
&= (\mu(m') \mu(m)) f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{スカラー倍の結合律}) \\
&= \mu(m) \mu(m') f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{複素数の乗法の交換律}).
\end{aligned}$$

基底 $(f_I)_{I \in \mathcal{I}}$ の各元が固有ベクトルなので、これらの行列は基底 (f_I) に関して対角行列である。 $\square$

主張 11.4 (対角行列の指数関数). 行列の成分積は 定義 1.8、複素成分の演算は 主張 1.35、実数係数の包含は 定義 1.12、非負平方根は 定義 1.6 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 $D \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$ が対角行列 ($k \neq l \Rightarrow D_{kl} = 0$) で対角成分を $d_k := D_{kk}$ とすると、

$$\exp(D)_{kl} = \begin{cases} e^{d_k} & (k = l) \\ 0 & (k \neq l) \end{cases}$$

すなわち $\exp(D)$ も対角行列で、対角成分は e^{d_k} である。

証明. Step 1 (冪). 対角行列 D, D' の積の成分を計算する。 $k \neq l$ の場合:

$$\begin{aligned}
(DD')_{kl} &= \sum_{j=1}^n D_{kj} D'_{jl} \quad (\because \text{行列積の成分の定義}) \\
&= D_{kk} D'_{kl} \quad (\because j \neq k \text{ の項は } D_{kj} = 0) \\
&= 0 \quad (\because k \neq l \text{ より } D'_{kl} = 0).
\end{aligned}$$

$k = l$ の場合:

$$\begin{aligned}
(DD')_{kk} &= \sum_{j=1}^n D_{kj} D'_{jk} \quad (\because \text{行列積の成分の定義}) \\
&= D_{kk} D'_{kk} \quad (\because j \neq k \text{ の項は } D_{kj} = 0).
\end{aligned}$$

よって対角行列どうしの積は対角行列で、対角成分は成分ごとの積である。ゆえに $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について帰納法により D^p は対角行列で $(D^p)_{kk} = d_k^p$ ($p = 0$ のときは $D^0 = I$ で $d_k^0 = 1$)。

Step 2 (部分和). 定義 4.4 の部分和 $E_K := \sum_{p=0}^K \frac{1}{p!} D^p$ は、有限個の対角行列の線型結合なので対角行列で、成分は次のとおりである。

$$\begin{aligned}
(E_K)_{kk} &= \sum_{p=0}^K \frac{1}{p!} (D^p)_{kk} \quad (\because \text{行列の和とスカラー倍は成分ごと}) \\
&= \sum_{p=0}^K \frac{d_k^p}{p!} \quad (\because \text{Step 1 より } (D^p)_{kk} = d_k^p), \\
(E_K)_{kl} &= \sum_{p=0}^K \frac{1}{p!} (D^p)_{kl} \quad (\because \text{行列の和とスカラー倍は成分ごと}) \\
&= 0 \quad (\because \text{Step 1 より } k \neq l \text{ では } (D^p)_{kl} = 0).
\end{aligned}$$

Step 3 (極限). 定理 4.3 より $E_K \rightarrow \exp(D)$ (定義 3.8 のノルムについて)。任意の (k, l) について

$$\begin{aligned}
|(E_K)_{kl} - \exp(D)_{kl}| &= |(E_K - \exp(D))_{kl}| \quad (\because \text{行列の差は成分ごと}) \\
&\leq \|E_K - \exp(D)\| \quad (\because \|A\| = \sqrt{\sum_{k,l} |A_{kl}|^2} \text{ の非負実数の有限和の 1 項}) \\
&\rightarrow 0 \quad (\because E_K \rightarrow \exp(D)).
\end{aligned}$$

すなわち成分ごとに収束する。 $k \neq l$ では左側が常に 0 なので $\exp(D)_{kl} = 0$ 。 $k = l$ では主張 4.1 (複素数の場合も同じ級数) より $\sum_{p=0}^K d_k^p/p! \rightarrow e^{d_k}$ なので $\exp(D)_{kk} = e^{d_k}$ 。□

主張 11.5 (V_1 の成分定義とパウリ表示の一致). $K_1 = J' \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。定義 2.3 の成分で定義された V_1 と 定義 5.8 のパウリ行列で定義された V_1 は、定義 11.2 の同一視のもとで同一の行列である。すなわち任意の $\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ について

$$\left(\exp \left(K_1 \sum_{m=1}^M \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) \right)_{\iota(\mu), \iota(\mu')} = \delta_{\mu=\mu'} \exp \left(\sum_{m=1}^M J' \mu(m) \mu(m+1) \right)$$

(両辺とも $\sigma_{M+1}^z := \sigma_1^z$ 、 $\mu(M+1) := \mu(1)$ と周期的に延長したうえでの式である。)

証明. Step 1. $D := \sum_{m=1}^M \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ とおく。 $\sigma_{M+1}^z = \sigma_1^z$ なので、周期端を分けると $D = \sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z + \sigma_M^z \sigma_1^z$ である。主張 11.3 を、前半の和では $1 \leq m \leq M-1$ の $(m, m+1)$ に、周期端では $(M, 1)$ に適用できる。したがって各 $\mu \in \mathfrak{M}$ について

$$\begin{aligned}
D f_{\iota(\mu)} &= \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z + \sigma_M^z \sigma_1^z \right) f_{\iota(\mu)} \quad (\because D \text{ の定義と } \sigma_{M+1}^z = \sigma_1^z) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z f_{\iota(\mu)}) + \sigma_M^z \sigma_1^z f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{行列の有限和とベクトルの積の分配則}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} (\mu(m) \mu(m+1) f_{\iota(\mu)}) + \mu(M) \mu(1) f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{前半には } (m, m+1), \text{ 周期端には } (M, 1) \text{ の } \sigma^z \text{ 作用公式}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M-1} \mu(m) \mu(m+1) + \mu(M) \mu(1) \right) f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{スカラー倍の有限和の括り出し (分配則)}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^M \mu(m) \mu(m+1) \right) f_{\iota(\mu)} \quad (\because \mu(M+1) = \mu(1))
\end{aligned}$$

であるから、 D は基底 $(f_I)_{I \in \mathcal{I}}$ に関して対角行列であり、その $\iota(\mu)$ 番目の対角成分は $d_{\iota(\mu)} = \sum_{m=1}^M \mu(m) \mu(m+1)$ である。 $K_1 D$ も対角行列で対角成分は $K_1 d_{\iota(\mu)}$ 。

Step 2. 主張 11.4 を $K_1 D$ に適用すると $\exp(K_1 D)$ は対角行列である。さらに 定義 11.2 より ι は全単射なので、成分を主張の右辺まで一続きに計算できる。

$$\begin{aligned}
(\exp(K_1 D))_{\iota(\mu), \iota(\mu')} &= \begin{cases} \exp \left(K_1 \sum_{m=1}^M \mu(m) \mu(m+1) \right) & (\iota(\mu) = \iota(\mu')) \\ 0 & (\iota(\mu) \neq \iota(\mu')) \end{cases} \quad (\because \text{対角行列の指数関数と Step 1 の対角成分}) \\
&= \delta_{\mu=\mu'} \exp \left(K_1 \sum_{m=1}^M \mu(m) \mu(m+1) \right) \quad (\because \iota \text{ の単射性より } \iota(\mu) = \iota(\mu') \iff \mu = \mu') \\
&= \delta_{\mu=\mu'} \exp \left(\sum_{m=1}^M J' \mu(m) \mu(m+1) \right) \quad (\because K_1 = J').
\end{aligned}$$

□

主張 11.6 (2×2 の転送行列の恒等式). $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、定義 5.8 の $K_2^* = -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2)$ 、 $s_2 = \sinh 2K_2$ を用いる。 $A \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ を

$$A := \begin{pmatrix} e^{K_2} & e^{-K_2} \\ e^{-K_2} & e^{K_2} \end{pmatrix}$$

(すなわち $A_{ij} = \exp(K_2 \varsigma_i \varsigma_j)$ 、 $\varsigma_1 := +1$ 、 $\varsigma_2 := -1$) と定めると、

$$A = (2s_2)^{1/2} \exp(K_2^* \sigma^x)$$

が成り立つ。ここで $(2s_2)^{1/2}$ は正の実数 $2s_2$ の非負平方根 (定義 1.6) である。

証明. Step 1 ($\exp(t\sigma^x)$ の閉じた形)。主張 7.1 より $\sigma^x \sigma^x = I$ である。したがって $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned} (\sigma^x)^{2p} &= ((\sigma^x)^2)^p \quad (\because \text{行列の冪の指数法則}) \\ &= I^p \quad (\because (\sigma^x)^2 = I) \\ &= I \quad (\because \text{単位行列の自然数冪}), \\ (\sigma^x)^{2p+1} &= (\sigma^x)^{2p} \sigma^x \quad (\because \text{行列の冪の加法則}) \\ &= I \sigma^x \quad (\because (\sigma^x)^{2p} = I) \\ &= \sigma^x \quad (\because \text{単位行列の作用}) \end{aligned}$$

である。よって $t \in \mathbb{R}$ について 定義 4.4 の級数を偶数項と奇数項に分けると

$$\begin{aligned} \exp(t\sigma^x) &= \left(\sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{2p}}{(2p)!} \right) I + \left(\sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{2p+1}}{(2p+1)!} \right) \sigma^x \quad (\because \text{絶対収束する指数級数を偶数項と奇数項へ分割し、} (\sigma^x)^{2p} = I, (\sigma^x)^{2p+1} = \sigma^x \text{ を適用}) \\ &= \cosh(t) I + \sinh(t) \sigma^x \quad (\because \cosh, \sinh \text{ のテイラー展開}) \end{aligned}$$

(級数の分割は 定理 4.3 の絶対収束と 主張 4.1 による。最後の等号は 主張 1.4 の $\cosh, \sinh$ のテイラー展開。) したがって

$$\begin{aligned} (2s_2)^{1/2} \exp(K_2^* \sigma^x) &= (2s_2)^{1/2} (\cosh(K_2^*) I + \sinh(K_2^*) \sigma^x) \quad (\because \text{上の閉じた形に } t = K_2^* \text{ を代入}) \\ &= \begin{pmatrix} (2s_2)^{1/2} \cosh K_2^* & (2s_2)^{1/2} \sinh K_2^* \\ (2s_2)^{1/2} \sinh K_2^* & (2s_2)^{1/2} \cosh K_2^* \end{pmatrix} \quad (\because I, \sigma^x \text{ の成分を書き下し、スカラー倍を各成分へ掛ける}) \end{aligned}$$

なので、示すべきは次の 2 つの等式である。

$$(2s_2)^{1/2} \cosh K_2^* = e^{K_2}, \quad (2s_2)^{1/2} \sinh K_2^* = e^{-K_2}$$

Step 2 ($\cosh K_2^*, \sinh K_2^*$ を K_2 で書く)。定義 5.8 の $K_2^* = -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2)$ より $\log(\tanh K_2) = -2K_2^*$ である。よって

$$\begin{aligned} e^{-2K_2^*} &= e^{\log(\tanh K_2)} \quad (\because \log(\tanh K_2) = -2K_2^* \text{ を指数へ代入}) \\ &= \tanh K_2 \quad (\because \exp \text{ と } \log \text{ は互いに逆写像}) \end{aligned}$$

以後 $t := \tanh K_2$ と置く。

$K_2 > 0$ より $0 < t < 1$ である (主張 1.4 の $\cosh x > \sinh x > 0$ ($x > 0$))。また

$$\begin{aligned} e^{-K_2^*} &= \left(e^{-2K_2^*} \right)^{1/2} \quad (\because \text{指数法則 } e^{-2K_2^*} = (e^{-K_2^*})^2 \text{ と } e^{-K_2^*} > 0 \text{ の正の平方根}) \\ &= t^{1/2} \quad (\because e^{-2K_2^*} = t), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
e^{K_2^*} &= \frac{1}{e^{-K_2^*}} \quad (\because \text{指数法則 } e^{K_2^*} e^{-K_2^*} = 1) \\
&= \frac{1}{t^{1/2}} \quad (\because e^{-K_2^*} = t^{1/2}) \\
&= t^{-1/2} \quad (\because \text{負冪の定義 } t^{-1/2} = 1/t^{1/2})
\end{aligned}$$

である。よって

$$\begin{aligned}
\cosh K_2^* &= \frac{e^{K_2^*} + e^{-K_2^*}}{2} \quad (\because \cosh \text{ の定義 } \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}) \\
&= \frac{t^{-1/2} + t^{1/2}}{2} \quad (\because e^{K_2^*} = t^{-1/2}, e^{-K_2^*} = t^{1/2}) \\
&= \frac{1+t}{2t^{1/2}} \quad (\because \text{分子・分母に } t^{1/2} \text{ を掛ける}), \\
\sinh K_2^* &= \frac{e^{K_2^*} - e^{-K_2^*}}{2} \quad (\because \sinh \text{ の定義 } \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}) \\
&= \frac{t^{-1/2} - t^{1/2}}{2} \quad (\because e^{K_2^*} = t^{-1/2}, e^{-K_2^*} = t^{1/2}) \\
&= \frac{1-t}{2t^{1/2}} \quad (\because \text{分子・分母に } t^{1/2} \text{ を掛ける}).
\end{aligned}$$

さらに $t = \tanh K_2 = \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}$ なので

$$\begin{aligned}
1+t &= 1 + \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2} \quad (\because t = \tanh K_2 = \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}) \\
&= \frac{\cosh K_2 + \sinh K_2}{\cosh K_2} \quad (\because \text{通分}) \\
&= \frac{e^{K_2}}{\cosh K_2} \quad (\because \cosh x + \sinh x = e^x), \\
1-t &= 1 - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2} \quad (\because t = \tanh K_2 = \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}) \\
&= \frac{\cosh K_2 - \sinh K_2}{\cosh K_2} \quad (\because \text{通分}) \\
&= \frac{e^{-K_2}}{\cosh K_2} \quad (\because \cosh x - \sinh x = e^{-x}).
\end{aligned}$$

($\cosh x \pm \sinh x = e^{\pm x}$ は主張 1.4 による。)

Step 3 (前因子)。まず

$$\begin{aligned}
2s_2 &= 2 \sinh 2K_2 \quad (\because s_2 = \sinh 2K_2 \text{ の代入}) \\
&= 2(2 \sinh K_2 \cosh K_2) \quad (\because \text{倍角公式 } \sinh 2K_2 = 2 \sinh K_2 \cosh K_2) \\
&= 4 \sinh K_2 \cosh K_2 \quad (\because \text{数の積の結合則})
\end{aligned}$$

である (倍角公式は主張 1.4 による)。 $\sinh K_2, \cosh K_2 > 0$ なので

$$\begin{aligned}
(2s_2)^{1/2} &= (4 \sinh K_2 \cosh K_2)^{1/2} \quad (\because 2s_2 = 4 \sinh K_2 \cosh K_2 \text{ の代入}) \\
&= 4^{1/2} (\sinh K_2 \cosh K_2)^{1/2} \quad (\because \text{非負実数の平方根は積を保つ}) \\
&= 2 (\sinh K_2 \cosh K_2)^{1/2} \quad (\because 4^{1/2} = 2) \\
t^{1/2} &= \left(\frac{\sinh K_2}{\cosh K_2} \right)^{1/2} \quad (\because t = \tanh K_2 = \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2} \text{ の代入})
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
\frac{(2s_2)^{1/2}}{2t^{1/2}} &= \frac{2(\sinh K_2 \cosh K_2)^{1/2}}{2} \left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} \right)^{1/2} \quad (\because \text{直前の 2 式の代入}) \\
&= (\sinh K_2 \cosh K_2)^{1/2} \left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} \right)^{1/2} \quad (\because \text{約分} \frac{2}{2} = 1) \\
&= \left(\sinh K_2 \cosh K_2 \cdot \frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} \right)^{1/2} \quad (\because \text{非負実数の平方根は積を保つ}) \\
&= (\cosh^2 K_2)^{1/2} \quad (\because \text{約分} \frac{\sinh K_2}{\sinh K_2} = 1) \\
&= \cosh K_2 \quad (\because \cosh K_2 > 0)
\end{aligned}$$

Step 4 (結論)。Step 2・Step 3 を合わせて

$$\begin{aligned}
(2s_2)^{1/2} \cosh K_2^* &= (2s_2)^{1/2} \frac{1+t}{2t^{1/2}} \quad (\because \text{Step 2 の } \cosh K_2^* \text{ の式}) \\
&= \frac{(2s_2)^{1/2}}{2t^{1/2}} (1+t) \quad (\because \text{積の並べ替え}) \\
&= \cosh K_2 \cdot (1+t) \quad (\because \text{Step 3 の前因子の式}) \\
&= \cosh K_2 \cdot \frac{e^{K_2}}{\cosh K_2} \quad (\because \text{Step 2 の } 1+t \text{ の式}) \\
&= e^{K_2} \quad (\because \text{約分} \frac{\cosh K_2}{\cosh K_2} = 1), \\
(2s_2)^{1/2} \sinh K_2^* &= (2s_2)^{1/2} \frac{1-t}{2t^{1/2}} \quad (\because \text{Step 2 の } \sinh K_2^* \text{ の式}) \\
&= \frac{(2s_2)^{1/2}}{2t^{1/2}} (1-t) \quad (\because \text{積の並べ替え}) \\
&= \cosh K_2 \cdot (1-t) \quad (\because \text{Step 3 の前因子の式}) \\
&= \cosh K_2 \cdot \frac{e^{-K_2}}{\cosh K_2} \quad (\because \text{Step 2 の } 1-t \text{ の式}) \\
&= e^{-K_2} \quad (\because \text{約分} \frac{\cosh K_2}{\cosh K_2} = 1).
\end{aligned}$$

これで主張の 2 式が示された。 □

主張 11.7 (V_2 の成分定義とパウリ表示の一致). $K_2 = J \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。定義 2.3 の成分で定義された V_2 と 定義 5.8 のパウリ行列で定義された V_2 は、定義 11.2 の同一視のもとで同一の行列である。すなわち任意の $\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ について

$$\left((2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x \right) \right)_{\iota(\mu), \iota(\mu')} = \exp \left(\sum_{m=1}^M J \mu(m) \mu'(m) \right)$$

証明. Step 1 (右辺を因子ごとの積に分ける)。実数の指数法則より

$$\exp \left(\sum_{m=1}^M K_2 \mu(m) \mu'(m) \right) = \prod_{m=1}^M \exp(K_2 \mu(m) \mu'(m)) \quad (\because \text{実数の指数法則を有限和へ繰り返し適用})$$

主張 11.6 の $A(A_{ij} = \exp(K_2 \varsigma_i \varsigma_j), \varsigma_1 = +1, \varsigma_2 = -1)$ を使うと、定義 11.2 の $\iota(\mu) = (i_1, \dots, i_M)$ 、 $\iota(\mu') = (j_1, \dots, j_M)$ について $\varsigma_{i_m} = \mu(m)$ 、 $\varsigma_{j_m} = \mu'(m)$ なので

$$\exp(K_2 \mu(m) \mu'(m)) = A_{i_m j_m} \quad (\because A \text{ の成分定義と } \varsigma_{i_m} = \mu(m), \varsigma_{j_m} = \mu'(m))$$

すなわち

$$\begin{aligned} \exp\left(\sum_{m=1}^M K_2 \mu(m) \mu'(m)\right) &= \prod_{m=1}^M A_{i_m j_m} \quad (\because \text{直前の成分の等式を有限積の全因子へ同時適用}) \\ &= \left(\underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_M \right)_{\iota(\mu), \iota(\mu')} \quad (\because \text{クロネッカー積の成分の定義}) \end{aligned}$$

最後の等号は 定義 3.1 (2) のクロネッカー積の成分の定義（成分は因子ごとの成分の積）である。

Step 2 (A のクロネッカー冪を書き換える)。主張 11.6 より $A = (2s_2)^{1/2} \exp(K_2^* \sigma^x)$ なので、主張 3.3（各因子についての線型性）よりスカラーを M 個の因子から前へ出せて

$$\begin{aligned} \underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_M &= \left((2s_2)^{1/2} \right)^M \underbrace{\exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x)}_M \quad (\because A = (2s_2)^{1/2} \exp(K_2^* \sigma^x) \text{ とクロネッカー積の多重線型性}) \\ &= (2s_2)^{M/2} \underbrace{\exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x)}_M \quad (\because ((2s_2)^{1/2})^M = (2s_2)^{M/2}) \end{aligned}$$

Step 3 (1 因子の $\exp$ をサイト演算子の $\exp$ にする)。 $m \in \{1, \dots, M\}$ を固定する。定義 5.8 の $\sigma_m^x = I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes I$ (第 m 因子だけが σ^x) について、主張 3.2 (1) を繰り返し使うと $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ で

$$(\sigma_m^x)^p = I \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x)^p \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{クロネッカー積の積の法則と } I^p = I)$$

であり ($I \cdot I = I$ なので他の因子は I のまま)、部分和と 主張 3.3 の線型性、および 定義 3.1 (2) の成分表示による成分ごとの収束（主張 11.4 の Step 3 と同じ評価 $|A_{kl}| \leq \|A\|$ ）から

$$\exp(K_2^* \sigma_m^x) = I \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{指数級数の部分和へ直前の冪の等式を適用し、成分ごとの極限を取る})$$

Step 4 (積にまとめる)。相異なる $m \neq m'$ について σ_m^x と $\sigma_{m'}^x$ は可換である（主張 3.2 (1) より、積はどちらの順でも「第 m 因子と第 m' 因子が σ^x 、他が I 」になる）。よって 定理 4.5 を繰り返し適用して

$$\exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x\right) = \prod_{m=1}^M \exp(K_2^* \sigma_m^x) \quad (\because \text{互いに可換な行列の指数の積の定理を有限和へ繰り返し適用})$$

右辺に Step 3 を代入し、主張 3.2 (1) で因子ごとの積にまとめると、第 m 因子だけが $\exp(K_2^* \sigma^x)$ で他が I の行列を $m = 1, \dots, M$ について掛け合わせることになるので

$$\prod_{m=1}^M \exp(K_2^* \sigma_m^x) = \underbrace{\exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x)}_M \quad (\because \text{Step 3 の表示とクロネッカー積の積の法則})$$

Step 5 (結論)。Step 2 と Step 4 を合わせると

$$\underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_M = (2s_2)^{M/2} \exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x\right) \quad (\because \text{Step 2 の表示へ Step 4 の二つの等式を代入})$$

であり、これと Step 1 を合わせて、 $K_2 = J$ のもとで主張の等式を得る。 $\square$

主張 11.8 (分配関数をパウリ行列表示の転送行列で書く). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ (鎖の長さ)、 $N_{\text{row}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ (転送の回数)、 $J, J' \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、 $K_1 := J'$ 、 $K_2 := J$ とおく。定義 2.2 の分配関数 (そこでの M を N_{row} 、 N を M と読み替える) は、定義 5.8 のパウリ行列表示の $V_1, V_2 \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を用いて

$$Z(J, J') = \text{tr}((V_1 V_2)^{N_{\text{row}}})$$

と書ける。

証明. 主張 2.4 は、定義 2.3 の $**$ 成分で定義された $** V_1, V_2 \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を扱う。これらを $V_1^{\text{comp}}, V_2^{\text{comp}}$ と書き、パウリ行列表示の行列を $V_1^{\text{Pauli}}, V_2^{\text{Pauli}}$ と書く。主張 11.5 と 主張 11.7 により、定義 11.2 の全単射が与える行列番号について $V_1^{\text{comp}} = V_1^{\text{Pauli}}$ および $V_2^{\text{comp}} = V_2^{\text{Pauli}}$ が成り立つ (すべての (μ, μ') 成分が一致し、 ι が全単射なのですべての行・列番号の組を尽くす)。

$$\begin{aligned} Z(J, J') &= \text{tr}\left((V_1^{\text{comp}} V_2^{\text{comp}})^{N_{\text{row}}}\right) \quad (\because \text{分配関数の転送行列表示}) \\ &= \text{tr}\left((V_1^{\text{Pauli}} V_2^{\text{comp}})^{N_{\text{row}}}\right) \quad (\because V_1 \text{ の成分定義とパウリ表示の一致}) \\ &= \text{tr}\left((V_1^{\text{Pauli}} V_2^{\text{Pauli}})^{N_{\text{row}}}\right) \quad (\because V_2 \text{ の成分定義とパウリ表示の一致}) \end{aligned}$$

(定義 2.3 が「全単射の取り方に依らない」と述べていたので、定義 11.2 で ι を選んだことによる一般性の喪失は無い。実際、別の全単射を取ると V_1, V_2 はともに同じ置換行列 P による $PV_a P^{-1}$ に置き換わるだけで、主張 10.3 (4) よりトレースは変わらない。) $\square$

定義 11.9 (ε の固有空間への射影子 $P^{(\pm)}$). 定義 5.8 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について (複号同順)

$$P^{(\pm)} := \frac{1}{2} (I \pm \varepsilon) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。ここで $I := I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ である。

主張 11.10 ($P^{(\pm)}$ の性質). 定義 11.9 の二つの行列は、互いに補い合い、主張 5.20 の二つの固有空間へそれぞれ写す行列である。すなわち、次の三組の等式が成り立つ。

- (1) $(P^{(\pm)})^2 = P^{(\pm)}, \quad P^{(+)} P^{(-)} = P^{(-)} P^{(+)} = 0$
- (2) $P^{(+)} + P^{(-)} = I$
- (3) $\text{im } P^{(\pm)} = \mathcal{F}^{(\pm)}$ (主張 5.20 の $\mathcal{F}^{(\pm)}$)

証明. (1) 主張 5.21 の $\varepsilon^2 = I$ と 定義 11.9 を使う。まず、

$$\begin{aligned}
\left(P^{(\pm)}\right)^2 &= \frac{1}{4}(I \pm \varepsilon)(I \pm \varepsilon) \quad (\because \text{定義 11.9}) \\
&= \frac{1}{4}(I \pm \varepsilon \pm \varepsilon + \varepsilon^2) \quad (\because \text{分配法則と } I\varepsilon = \varepsilon I = \varepsilon) \\
&= \frac{1}{4}(I \pm 2\varepsilon + \varepsilon^2) \quad (\because \text{同類項をまとめる}) \\
&= \frac{1}{4}(2I \pm 2\varepsilon) \quad (\because \text{主張 5.21 の } \varepsilon^2 = I) \\
&= \frac{1}{2}(I \pm \varepsilon) \quad (\because \text{スカラー倍を整理する}) \\
&= P^{(\pm)} \quad (\because \text{定義 11.9}), \\
P^{(+)}P^{(-)} &= \frac{1}{4}(I + \varepsilon)(I - \varepsilon) \quad (\because \text{定義 11.9}) \\
&= \frac{1}{4}(I - I\varepsilon + \varepsilon I - \varepsilon^2) \quad (\because \text{分配法則}) \\
&= \frac{1}{4}(I - \varepsilon^2) \quad (\because I\varepsilon = \varepsilon I = \varepsilon) \\
&= \frac{1}{4}(I - I) \quad (\because \text{主張 5.21 の } \varepsilon^2 = I) \\
&= 0 \quad (\because I - I = 0), \\
P^{(-)}P^{(+)} &= \frac{1}{4}(I - \varepsilon)(I + \varepsilon) \quad (\because \text{定義 11.9}) \\
&= \frac{1}{4}(I + I\varepsilon - \varepsilon I - \varepsilon^2) \quad (\because \text{分配法則}) \\
&= \frac{1}{4}(I - \varepsilon^2) \quad (\because I\varepsilon = \varepsilon I = \varepsilon) \\
&= \frac{1}{4}(I - I) \quad (\because \text{主張 5.21 の } \varepsilon^2 = I) \\
&= 0 \quad (\because I - I = 0)
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
P^{(+)} + P^{(-)} &= \frac{1}{2}(I + \varepsilon) + \frac{1}{2}(I - \varepsilon) \quad (\because \text{定義 11.9}) \\
&= \frac{1}{2}(I + \varepsilon + I - \varepsilon) \quad (\because \text{スカラー倍の分配法則}) \\
&= \frac{1}{2}(2I) \quad (\because \text{同類項をまとめる}) \\
&= I \quad (\because \text{スカラー倍を整理する})
\end{aligned}$$

(3) 主張 5.20 より $\mathcal{F}^{(\pm)} = \{f \in \mathcal{F} \mid \varepsilon f = \pm f\}$ (定義 5.12 の同一視のもとで εf は行列とベクトルの積)。

($\subseteq$) $y \in \text{im } P^{(\pm)}$ とすると、ある $x \in \mathcal{F}$ について $y = P^{(\pm)}x$ と書ける。まず

$$\begin{aligned}
P^{(\pm)}y &= P^{(\pm)}P^{(\pm)}x \quad (\because y = P^{(\pm)}x) \\
&= \left(P^{(\pm)}\right)^2 x \quad (\because \text{積の冪の表記}) \\
&= P^{(\pm)}x \quad (\because (1) \text{ の冪等性}) \\
&= y \quad (\because y = P^{(\pm)}x)
\end{aligned}$$

である。よって (複号同順)

$$\begin{aligned}
\varepsilon y &= \varepsilon P^{(\pm)}y \quad (\because \text{上の等式 } y = P^{(\pm)}y) \\
&= \varepsilon \cdot \frac{1}{2}(I \pm \varepsilon)y \quad (\because \text{定義 11.9}) \\
&= \frac{1}{2}(\varepsilon I \pm \varepsilon^2)y \quad (\because \text{分配法則}) \\
&= \frac{1}{2}(\varepsilon \pm \varepsilon^2)y \quad (\because \varepsilon I = \varepsilon) \\
&= \frac{1}{2}(\varepsilon \pm I)y \quad (\because \text{主張 5.21 の } \varepsilon^2 = I) \\
&= \pm \frac{1}{2}(I \pm \varepsilon)y \quad (\because \text{複号同順の符号の整理。上の符号では } \frac{1}{2}(\varepsilon + I) = +\frac{1}{2}(I + \varepsilon)、\text{下の符号では } \frac{1}{2}(\varepsilon - I) = -\frac{1}{2}(I - \varepsilon)) \\
&= \pm P^{(\pm)}y \quad (\because \text{定義 11.9}) \\
&= \pm y \quad (\because \text{上の等式 } y = P^{(\pm)}y)
\end{aligned}$$

よって 主張 5.20 により $y \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ 。

($\supseteq$) $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ すなわち (主張 5.20 により) $\varepsilon f = \pm f$ とすると

$$\begin{aligned}
P^{(\pm)}f &= \frac{1}{2}(I \pm \varepsilon)f \quad (\because \text{定義 11.9}) \\
&= \frac{1}{2}(If \pm \varepsilon f) \quad (\because \text{分配法則}) \\
&= \frac{1}{2}(f \pm \varepsilon f) \quad (\because If = f) \\
&= \frac{1}{2}(f \pm (\pm f)) \quad (\because \text{仮定 } \varepsilon f = \pm f) \\
&= \frac{1}{2}(f + f) \quad (\because \text{複号同順により } \pm(\pm f) = f) \\
&= \frac{1}{2}(2f) \quad (\because \text{同類項をまとめる}) \\
&= f \quad (\because \text{スカラー倍を整理する})
\end{aligned}$$

よって $f = P^{(\pm)}f \in \text{im } P^{(\pm)}$ 。 □

定義 11.11 ($V_1^{(\pm)}$ の平方根として用いる行列). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし (複号同順)、定義 5.24 の $V_1^{(\pm)}$ に対して

$$\left(V_1^{(\pm)}\right)^{1/2} := \exp\left(\frac{1}{2}iK_1(Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M-1}Z_M \mp Y_MZ_1)\right) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。

主張 11.12 ($V_1^{(\pm)}$ の半指数行列の二乗). 定義 11.11 の行列について、

$$\left(\left(V_1^{(\pm)}\right)^{1/2}\right)^2 = V_1^{(\pm)}$$

が成り立つ。

証明. $G^{(\pm)} := Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M-1}Z_M \mp Y_MZ_1$ とおく。

$$\begin{aligned}
\left(\left(V_1^{(\pm)}\right)^{1/2}\right)^2 &= \exp\left(\frac{1}{2}iK_1G^{(\pm)}\right) \exp\left(\frac{1}{2}iK_1G^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{定義 11.11}) \\
&= \exp\left(iK_1G^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{定理 4.5 と同じ行列どうしの可換性}) \\
&= V_1^{(\pm)} \quad (\because \text{定義 5.24}).
\end{aligned}$$

□

主張 11.13 (ε は $V_1, V_2, V_1^{(\pm)}$ と可換). ε は 定義 5.8 の V_1, V_2 および 定義 5.24 の $V_1^{(\pm)}$ 、さらに 定義 11.11 の $(V_1^{(\pm)})^{1/2}$ と可換である。この行列が実際に平方根であることは 主張 11.12 で示した。

証明. Step 1 (サイト演算子との関係). 主張 7.1 より $\sigma^x\sigma^x = I, \sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z, \sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y$ 。相異なるサイトに置かれた因子どうしは可換 (主張 3.2 (1)) なので、 $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ について

$$\begin{aligned}
\varepsilon \sigma_k^x &= \sigma_k^x \varepsilon \quad (\because \sigma^x\sigma^x = I \text{ と、相異なるサイトの因子の可換性}) \\
\varepsilon \sigma_k^z &= -\sigma_k^z \varepsilon \quad (\because \sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z \text{ と、相異なるサイトの因子の可換性}) \\
\varepsilon \sigma_k^y &= -\sigma_k^y \varepsilon \quad (\because \sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y \text{ と、相異なるサイトの因子の可換性}) \quad (k \in \{1, \dots, M\})
\end{aligned}$$

(ε のうち第 k 因子の σ^x だけが σ_k^a と非可換になりうる。)

Step 2 (V_2 との可換性). $R := K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x$ と置くと、次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
\varepsilon R &= K_2^* \sum_{m=1}^M \varepsilon \sigma_m^x \quad (\because \text{スカラー倍との可換性と、行列積の有限和への分配}) \\
&= K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x \varepsilon \quad (\because \text{Step 1 の } \varepsilon \sigma_k^x = \sigma_k^x \varepsilon \text{ を全項へ同時適用}) \\
&= R \varepsilon \quad (\because \text{行列積の有限和への分配とスカラー倍との可換性})
\end{aligned}$$

可換なら冪とも可換 ($\varepsilon R^p = R^p \varepsilon$ が p についての帰納法で従う) ので、定義 4.4 の部分和とも可換であり、主張 3.13 による極限との交換から次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
\varepsilon \exp(R) &= \varepsilon \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=0}^n \frac{R^p}{p!} \quad (\because \exp \text{ の定義}) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=0}^n \frac{\varepsilon R^p}{p!} \quad (\because \text{行列積の連続性と有限和への分配}) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=0}^n \frac{R^p \varepsilon}{p!} \quad (\because \varepsilon R^p = R^p \varepsilon) \\
&= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=0}^n \frac{R^p}{p!} \right) \varepsilon \quad (\because \text{有限和への分配と行列積の連続性}) \\
&= \exp(R) \varepsilon \quad (\because \exp \text{ の定義})
\end{aligned}$$

スカラー $(2 \sinh 2K_2)^{M/2}$ は 主張 3.6 より任意の行列と可換なので、次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
\varepsilon V_2 &= \varepsilon \left((2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp(R) \right) \quad (\because V_2 \text{ の定義と } R \text{ の定義}) \\
&= (2 \sinh 2K_2)^{M/2} (\varepsilon \exp(R)) \quad (\because \text{スカラー倍との可換性}) \\
&= (2 \sinh 2K_2)^{M/2} (\exp(R) \varepsilon) \quad (\because \text{上の } \varepsilon \exp(R) = \exp(R) \varepsilon) \\
&= \left((2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp(R) \right) \varepsilon \quad (\because \text{スカラー倍との可換性}) \\
&= V_2 \varepsilon \quad (\because V_2 \text{ の定義と } R \text{ の定義})
\end{aligned}$$

Step 3 (V_1 との可換性)。Step 1 より次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
\varepsilon \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z &= (-1)^2 \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \varepsilon \quad (\because \sigma^z \text{ が二個なので、Step 1 の反可換性を二回適用}) \\
&= \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \varepsilon \quad (\because (-1)^2 = 1)
\end{aligned}$$

$D = \sum_{m=1}^M \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ と置くと、次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
\varepsilon D &= \sum_{m=1}^M \varepsilon \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{行列積の有限和への分配}) \\
&= \sum_{m=1}^M \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \varepsilon \quad (\because \text{上の } \varepsilon \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z = \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \varepsilon \text{ を全項へ同時適用}) \\
&= D \varepsilon \quad (\because \text{行列積の有限和への分配})
\end{aligned}$$

よって Step 2 と同じ冪・有限和・極限の議論で $\varepsilon \exp(K_1 D) = \exp(K_1 D) \varepsilon$ である。したがって

$$\begin{aligned}
\varepsilon V_1 &= \varepsilon \exp(K_1 D) \quad (\because V_1 \text{ の定義}) \\
&= \exp(K_1 D) \varepsilon \quad (\because \varepsilon \text{ と } \exp(K_1 D) \text{ の可換性}) \\
&= V_1 \varepsilon \quad (\because V_1 \text{ の定義})
\end{aligned}$$

Step 4 ($V_1^{(\pm)}$ との可換性)。定義 5.8 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$ 、 $Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ について、Step 1 より ε は σ_j^x と可換、 $\sigma_m^z \cdot \sigma_m^y$ とは反可換なので

$$\begin{aligned}
\varepsilon Z_m &= -Z_m \varepsilon \quad (\because \sigma_j^x \text{ との可換性と } \sigma_m^z \text{ との反可換性}) \\
\varepsilon Y_m &= -Y_m \varepsilon \quad (\because \sigma_j^x \text{ との可換性と } \sigma_m^y \text{ との反可換性})
\end{aligned}$$

よって次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
\varepsilon (Y_m Z_{m'}) &= (-1)^2 (Y_m Z_{m'}) \varepsilon \quad (\because \varepsilon \text{ と } Y_m, Z_{m'} \text{ の反可換性を一回ずつ適用}) \\
&= (Y_m Z_{m'}) \varepsilon \quad (\because (-1)^2 = 1)
\end{aligned}$$

$G^{(\pm)}$ を次のように定める。

$$G^{(\pm)} := Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \cdots + Y_{M-1} Z_M \mp Y_M Z_1$$

これは各項が $Y \cdot Z$ の形なので、次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
\varepsilon G^{(\pm)} &= \sum_{m=1}^{M-1} \varepsilon (Y_m Z_{m+1}) \mp \varepsilon (Y_M Z_1) \quad (\because \text{行列積の有限和への分配}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} (Y_m Z_{m+1}) \varepsilon \mp (Y_M Z_1) \varepsilon \quad (\because \text{上の } \varepsilon (Y_m Z_{m'}) = (Y_m Z_{m'}) \varepsilon \text{ を全項へ同時適用}) \\
&= G^{(\pm)} \varepsilon \quad (\because \text{行列積の有限和への分配})
\end{aligned}$$

Step 2 と同じ議論で ε は $\exp(iK_1 G^{(\pm)}) = V_1^{(\pm)}$ とともに $\exp(\frac{1}{2}iK_1 G^{(\pm)}) = (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ とともに可換である。□

主張 11.14 ($P^{(\pm)}$ は転送行列と可換)。定義 11.9 の $P^{(\pm)}$ は主張 11.13 の $V_1, V_2, V_1^{(\pm)}, (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ のすべてと可換である。

証明. $X \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を $\varepsilon X = X \varepsilon$ を満たす行列とする(主張 11.13 より $V_1, V_2, V_1^{(\pm)}, (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ がこれにあたる)。次の鎖を得る (複号同順)。

$$\begin{aligned}
P^{(\pm)} X &= \frac{1}{2} (I \pm \varepsilon) X \quad (\because \text{定義 11.9 の } P^{(\pm)} \text{ の定義}) \\
&= \frac{1}{2} (IX \pm \varepsilon X) \quad (\because \text{分配法則}) \\
&= \frac{1}{2} (X \pm \varepsilon X) \quad (\because IX = X) \\
&= \frac{1}{2} (X \pm X \varepsilon) \quad (\because \text{仮定 } \varepsilon X = X \varepsilon) \\
&= \frac{1}{2} (XI \pm X \varepsilon) \quad (\because X = XI) \\
&= X \cdot \frac{1}{2} (I \pm \varepsilon) \quad (\because \text{分配法則とスカラー倍との可換性}) \\
&= X P^{(\pm)} \quad (\because \text{定義 11.9 の } P^{(\pm)} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

よって ε と可換な行列は $P^{(\pm)}$ とともに可換である。□

主張 11.15 (セクター上での V_1 の置き換え)。定義 5.24 の記号のもとで (複号同順)

$$V_1 P^{(\pm)} = V_1^{(\pm)} P^{(\pm)}$$

証明. 固有空間上では、

$$(V_1)|_{\mathcal{F}^{(\pm)}} = (V_1^{(\pm)})|_{\mathcal{F}^{(\pm)}} \quad (\because \text{主張 5.23 と定義 5.12 の同一視})$$

すなわち任意の $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ について次を主張している。

$$V_1 f = V_1^{(\pm)} f \quad (\because V_1|_{\mathcal{F}^{(\pm)}} = V_1^{(\pm)}|_{\mathcal{F}^{(\pm)}})$$

任意の $x \in \mathcal{F}$ について $P^{(\pm)}x \in \text{im } P^{(\pm)} = \mathcal{F}^{(\pm)}$ なので、次の鎖を得る。

$$\begin{aligned} (V_1 P^{(\pm)})x &= V_1 (P^{(\pm)}x) \quad (\because \text{行列積の作用}) \\ &= V_1^{(\pm)} (P^{(\pm)}x) \quad (\because \text{主張 11.10 と上の制限の等式}) \\ &= (V_1^{(\pm)} P^{(\pm)})x \quad (\because \text{行列積の作用}) \end{aligned}$$

この等式が任意の x について成り立つ。行列は $\mathcal{F} = \mathbb{C}^{2^M}$ のすべてのベクトルへの作用で決まるので、

$$V_1 P^{(\pm)} = V_1^{(\pm)} P^{(\pm)} \quad (\because \text{すべての } x \in \mathcal{F} \text{ への作用が等しい})$$

である。 □

主張 11.16 (セクター上での置き換えを転送行列の積の冪へ反復). (複号同順)

$$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ について } (V_1 V_2)^n P^{(\pm)} = (V_1^{(\pm)} V_2)^n P^{(\pm)}$$

証明. $P := P^{(\pm)}$ と略記する。主張 11.14 より P は $V_1, V_2, V_1^{(\pm)}$ のすべてと可換であり、主張 11.10 (2) より $P^2 = P$ である。 n についての帰納法で示す。

$n = 0$ のときは両辺とも P で成立。 $(V_1 V_2)^n P = (V_1^{(\pm)} V_2)^n P$ を仮定する。主張 11.15 と合わせると、

$$\begin{aligned} (V_1 V_2)^{n+1} P &= V_1 V_2 (V_1 V_2)^n P \quad (\because \text{冪の定義}) \\ &= V_1 V_2 (V_1 V_2)^n P P \quad (\because P^2 = P) \\ &= V_1 V_2 P (V_1 V_2)^n P \quad (\because P \text{ は } V_1, V_2 \text{ と可換なので } (V_1 V_2)^n \text{ と可換}) \\ &= V_1 P V_2 (V_1 V_2)^n P \quad (\because P \text{ は } V_2 \text{ と可換}) \\ &= V_1^{(\pm)} P V_2 (V_1 V_2)^n P \quad (\because \text{セクター上での } V_1 \text{ の置き換え}) \\ &= V_1^{(\pm)} V_2 P (V_1 V_2)^n P \quad (\because P \text{ は } V_2 \text{ と可換}) \\ &= V_1^{(\pm)} V_2 (V_1 V_2)^n P P \quad (\because P \text{ は } V_1, V_2 \text{ と可換なので } (V_1 V_2)^n \text{ と可換}) \\ &= V_1^{(\pm)} V_2 (V_1 V_2)^n P \quad (\because P^2 = P) \\ &= V_1^{(\pm)} V_2 (V_1^{(\pm)} V_2)^n P \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= (V_1^{(\pm)} V_2)^{n+1} P \quad (\because \text{冪の定義}) \end{aligned}$$

□

主張 11.17 (分配関数の偶奇セクター分解). 主張 11.8 と同じ設定のもと、主張 9.47 の

$$V^{(\pm)} := (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}, \quad (V_1^{(\pm)})^{1/2} := \exp\left(\frac{1}{2} i K_1 H_1^{(\pm)}\right)$$

について

$$Z(J, J') = \text{tr} \left(P^{(+)} \left(V^{(+)} \right)^{N_{\text{row}}} \right) + \text{tr} \left(P^{(-)} \left(V^{(-)} \right)^{N_{\text{row}}} \right)$$

が成り立つ。定義 11.9 の $P^{(\pm)} = \frac{1}{2}(I \pm \varepsilon)$ を代入すれば

$$Z(J, J') = \frac{1}{2} \left(\text{tr} \left((V^{(+)})^{N_{\text{row}}} \right) + \text{tr} \left(\varepsilon (V^{(+)})^{N_{\text{row}}} \right) + \text{tr} \left((V^{(-)})^{N_{\text{row}}} \right) - \text{tr} \left(\varepsilon (V^{(-)})^{N_{\text{row}}} \right) \right)$$

とも書ける。 $V^{(\pm)}$ の固有値は 主張 10.19 で決まっているので、これで分配関数が固有値の言葉で書けたことになる。

証明. Step 1 (トレースをセクターに分ける)。主張 11.10 (3) の $P^{(+)} + P^{(-)} = I$ と 主張 10.3 (1) の線型性より、任意の $X \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned} \text{tr}(X) &= \text{tr}(IX) \quad (\because \text{単位行列の作用}) \\ &= \text{tr} \left(\left(P^{(+)} + P^{(-)} \right) X \right) \quad (\because P^{(+)} + P^{(-)} = I) \\ &= \text{tr} \left(P^{(+)} X \right) + \text{tr} \left(P^{(-)} X \right) \quad (\because \text{トレースの線型性}) \end{aligned}$$

これを 主張 11.8 の $X = (V_1 V_2)^{N_{\text{row}}}$ に適用して

$$Z(J, J') = \text{tr} \left(P^{(+)} (V_1 V_2)^{N_{\text{row}}} \right) + \text{tr} \left(P^{(-)} (V_1 V_2)^{N_{\text{row}}} \right) \quad (\because \text{分配関数の Pauli 表示と上のトレース分解})$$

Step 2 (各セクターで V_1 を $V_1^{(\pm)}$ に置き換える)。主張 11.16 より (複号同順)

$$\text{tr} \left(P^{(\pm)} (V_1 V_2)^{N_{\text{row}}} \right) = \text{tr} \left(P^{(\pm)} \left(V_1^{(\pm)} V_2 \right)^{N_{\text{row}}} \right) \quad (\because \text{セクター内での } V_1 \text{ の置換})$$

($P^{(\pm)}$ は V_1, V_2 と可換なので $P^{(\pm)} (V_1 V_2)^n = (V_1 V_2)^n P^{(\pm)}$ であり、主張 11.16 をそのまま使える。)

Step 3 (対称化)。 $B := \left(V_1^{(\pm)} \right)^{1/2}$ と略記する。定理 4.5 と同じ行列どうしの可換性より次の鎖を得る。

$$\begin{aligned} BB &= \exp \left(\frac{1}{2} i K_1 H_1^{(\pm)} \right) \exp \left(\frac{1}{2} i K_1 H_1^{(\pm)} \right) \quad (\because B \text{ の定義}) \\ &= \exp \left(i K_1 H_1^{(\pm)} \right) \quad (\because \text{可換する行列の指数関数の積}) \\ &= V_1^{(\pm)} \quad (\because V_1^{(\pm)} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$n := N_{\text{row}} \geq 1$ として

$$\begin{aligned} \left(V^{(\pm)} \right)^n &= (B V_2 B)^n \quad (\because V^{(\pm)} \text{ の定義}) \\ &= B \underbrace{(V_2 B B)(V_2 B B) \cdots (V_2 B B)}_{n-1 \text{ 個}} V_2 B \quad (\because \text{行列積の結合法則}) \\ &= B \left(V_2 V_1^{(\pm)} \right)^{n-1} V_2 B \quad (\because BB = V_1^{(\pm)}) \end{aligned}$$

(結合法則で括り直し、隣接する $BB = V_1^{(\pm)}$ をまとめた。) よって 主張 10.3 (2) の巡回性と、主張 11.14 による $P^{(\pm)}$ と B の可換性から

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}\left(P^{(\pm)}\left(V^{(\pm)}\right)^n\right) &= \operatorname{tr}\left(P^{(\pm)} B\left(V_2 V_1^{(\pm)}\right)^{n-1} V_2 B\right) \quad (\because \text{直前の鎖で得た } \left(V^{(\pm)}\right)^n \text{ の表示を代入}) \\
&= \operatorname{tr}\left(B P^{(\pm)} B\left(V_2 V_1^{(\pm)}\right)^{n-1} V_2\right) \quad (\because \text{巡回性で右端の } B \text{ を左へ}) \\
&= \operatorname{tr}\left(P^{(\pm)} B B\left(V_2 V_1^{(\pm)}\right)^{n-1} V_2\right) \quad (\because P^{(\pm)} \text{ と } B \text{ は可換}) \\
&= \operatorname{tr}\left(P^{(\pm)} V_1^{(\pm)}\left(V_2 V_1^{(\pm)}\right)^{n-1} V_2\right) \quad (\because B B = V_1^{(\pm)}) \\
&= \operatorname{tr}\left(P^{(\pm)}\left(V_1^{(\pm)} V_2\right)^n\right) \quad (\because \text{行列積の結合法則})
\end{aligned}$$

Step 4 (結論)。Step 1~3 を合わせて

$$Z(J, J') = \operatorname{tr}\left(P^{(+)}\left(V^{(+)}\right)^{N_{\text{row}}}\right) + \operatorname{tr}\left(P^{(-)}\left(V^{(-)}\right)^{N_{\text{row}}}\right) \quad (\because \text{Step 1-3})$$

さらに 定義 11.9 の射影子の定義と 主張 10.3 (1) の線型性により、次の鎖で statement の 4 項の形を得る。

$$\begin{aligned}
Z(J, J') &= \operatorname{tr}\left(\frac{1}{2}(I + \varepsilon)\left(V^{(+)}\right)^{N_{\text{row}}}\right) + \operatorname{tr}\left(\frac{1}{2}(I - \varepsilon)\left(V^{(-)}\right)^{N_{\text{row}}}\right) \quad (\because P^{(\pm)} = \frac{1}{2}(I \pm \varepsilon)) \\
&= \frac{1}{2}\left(\operatorname{tr}\left(\left(V^{(+)}\right)^{N_{\text{row}}}\right) + \operatorname{tr}\left(\varepsilon\left(V^{(+)}\right)^{N_{\text{row}}}\right) + \operatorname{tr}\left(\left(V^{(-)}\right)^{N_{\text{row}}}\right) - \operatorname{tr}\left(\varepsilon\left(V^{(-)}\right)^{N_{\text{row}}}\right)\right) \quad (\because \text{トレースの線型性})
\end{aligned}$$

□

12 転送行列の最大固有値と分配関数の挟み撃ち

注意 12.1 (この章の目的). 主張 11.8 により $Z(J, J') = \operatorname{tr}\left((V_1 V_2)^{N_{\text{row}}}\right)$ である。熱力学極限を取るには、この N_{row} 乗のトレースを ** 最大固有値ひとつ ** で挟み撃ちしたい。この章でそれを行う。

得られる評価は、 $W := V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}$ 、 $c(M) := \sup\{x^\top W x \mid x \in \mathbb{R}^{2^M}, \|x\| = 1\}$ として

$$c(M)^{N_{\text{row}}} \leq Z(J, J') \leq 2^M c(M)^{N_{\text{row}}}$$

である。** この章では固有値の存在 (対角化可能性・スペクトル定理) を一切使わない。 ** $c(M)$ は上限として定義され、必要な不等式はすべて半正定値双線型形式に対する Cauchy-Schwarz の不等式から出る。有限次元の実対称行列が対角化できること自体は正しいが、その証明は本文にまだ無く、また挟み撃ちには不要だからである。

あわせて、 W が ε の偶奇セクターを保つこと、および $c(M) = \max(c_+(M), c_-(M))$ (各セクターでの上限) を示す。

定義 12.2 ($V_1^{1/2} := \exp(\frac{1}{2}K_1 D)$). 定義 5.8 の $V_1 = \exp(K_1 D)$ ($D := \sum_{m=1}^M \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$, $\sigma_{M+1}^z := \sigma_1^z$) について

$$V_1^{1/2} := \exp\left(\frac{1}{2}K_1 D\right) \in \operatorname{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。定理 4.5 より $V_1^{1/2} V_1^{1/2} = \exp(K_1 D) = V_1$ であり、記号 $V_1^{1/2}$ はこの意味での平方根である ($\frac{1}{2}K_1 D$ は自分自身と可換)。

定義 12.3 (対称化転送行列 W). 定義 12.2 の $V_1^{1/2}$ と 定義 5.8 の V_2 を用いて

$$W := V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} \in \operatorname{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。

主張 12.4 ($Z = \text{tr}(W^{N_{\text{row}}})$). 主張 11.8 と同じ設定のもと、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$\text{tr}((V_1 V_2)^n) = \text{tr}(W^n)$$

が成り立つ。とくに $Z(J, J') = \text{tr}(W^{N_{\text{row}}})$ 。

証明. $B := V_1^{1/2}$ と略記する。定義 12.2 より $BB = V_1$ であり、定義 12.3 より $W = BV_2 B$ である。トレースの巡回性は 主張 10.3 (2) のものである。次の等式鎖を得る。

$$\begin{aligned} \text{tr}((V_1 V_2)^n) &= \text{tr} \left(V_1 \underbrace{(V_2 V_1)(V_2 V_1) \cdots (V_2 V_1)}_{n-1 \text{ 個}} V_2 \right) \quad (\because \text{行列の積の結合法則で括り直す}) \\ &= \text{tr} \left(V_1 (V_2 V_1)^{n-1} V_2 \right) \quad (\because \text{冪の定義}) \\ &= \text{tr} \left(B B (V_2 V_1)^{n-1} V_2 \right) \quad (\because V_1 = BB) \\ &= \text{tr} \left(B (V_2 V_1)^{n-1} V_2 B \right) \quad (\because \text{巡回性 } \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) \text{ を } A = B, B = B(V_2 V_1)^{n-1} V_2 \text{ に適用}) \\ &= \text{tr} \left(B \underbrace{(V_2 BB)(V_2 BB) \cdots (V_2 BB)}_{n-1 \text{ 個}} V_2 B \right) \quad (\because V_1 = BB \text{ と冪の定義}) \\ &= \text{tr}((BV_2 B)^n) \quad (\because \text{行列の積の結合法則で括り直す}) \\ &= \text{tr}(W^n) \quad (\because W = BV_2 B) \end{aligned}$$

□

主張 12.5 (W は実対称正定値). W は成分がすべて実数で転置について対称であり、定義 10.12 の意味で正定値である。とくに W は可逆である。

証明. Step 1 ($K_1 D$ と S_2 は実対称). $\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ は 主張 10.15 の Step 3 で見たとおり、成分が実で転置について対称である (σ^z が 2 個、他は単位行列のクロネッカー積)。実係数 K_1 の有限和なので $K_1 D$ も実対称。主張 10.15 の Step 1 より S_2 も実対称である。その表示は

$$\begin{aligned} S_2 &= iK_2^* H_2 \quad (\because S_2 \text{ の定義}) \\ &= K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x \quad (\because \text{実対称性の主張の Step 1}) \end{aligned}$$

Step 2 (指数関数)。定義 10.12 の最後の注意より実対称行列はエルミートなので、主張 10.14 (1) より $B := \exp(\frac{1}{2} K_1 D)$ と $A := \exp(S_2)$ はいずれもエルミートかつ正定値である。この B は 定義 12.2 で定めた $V_1^{1/2}$ そのものである。さらに実対称行列の冪は実対称で、定義 4.4 の級数の部分和は実対称、主張 10.13 (3) と同じ議論 (転置もノルムを保つ) から極限も実対称。よって B, A は ** 実 ** 対称正定値である。

Step 3 (合同変換)。定義 5.8 より $V_2 = (2s_2)^{M/2} A$ (主張 10.15 Step 1) であり、 B がエルミートなので $B^* = B$ 。よって

$$\begin{aligned} W &= B V_2 B \quad (\because W = BV_2 B \text{ の定義定義 12.3}) \\ &= B((2s_2)^{M/2} A) B \quad (\because V_2 = (2s_2)^{M/2} A) \\ &= (2s_2)^{M/2} B A B \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の結合則}) \\ &= (2s_2)^{M/2} B^* A B \quad (\because B^* = B) \end{aligned}$$

主張 10.14 (2) より $B^* A B$ は正定値、 $K_2 > 0$ より $(2s_2)^{M/2} > 0$ なので同 (3) より W は正定値である。実対称性は次の転置の計算から従う。

$$\begin{aligned}
W^\top &= (BV_2B)^\top \quad (\because W = BV_2B \text{ の定義定義 12.3}) \\
&= B^\top V_2^\top B^\top \quad (\because \text{転置の積の法則 } (ABC)^\top = C^\top B^\top A^\top) \\
&= BV_2B \quad (\because B^\top = B, V_2^\top = V_2) \\
&= W \quad (\because W = BV_2B \text{ の定義定義 12.3})
\end{aligned}$$

可逆性： $Wx = 0$ と仮定すると、次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
x^\top Wx &= x^\top (Wx) \quad (\because \text{行列積の結合則}) \\
&= x^\top 0 \quad (\because Wx = 0) \\
&= 0 \quad (\because \text{零ベクトルとの積})
\end{aligned}$$

正定値性より $x = 0$ 。よって W の核は $\{0\}$ であり W は可逆。 $\square$

主張 12.6 (W の成分はすべて正)。定義 11.2 の同一視のもとで、定義 12.3 で定めた W のすべての成分は正の実数である：

$$W_{\iota(\mu), \iota(\mu')} > 0 \quad (\mu, \mu' \in \mathfrak{M})$$

証明. Step 1 ($V_1^{1/2}$ は正の対角行列)。以下、周期端では $\mu(M+1) := \mu(1)$ と書く。定義 12.2 の定義と主張 11.3 より $Df_{\iota(\mu)} = (\sum_m \mu(m)\mu(m+1))f_{\iota(\mu)}$ なので $\frac{1}{2}K_1D$ は対角行列である。主張 11.4 と 主張 1.4 に記録した実指数関数の正値性より

$$\left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu), \iota(\mu')} = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{2}K_1 \sum_{m=1}^M \mu(m)\mu(m+1)\right) > 0 & (\mu = \mu') \\ 0 & (\mu \neq \mu') \end{cases}$$

Step 2 (V_2 の成分は正)。主張 11.7 より $(V_2)_{\iota(\mu), \iota(\mu')} = \exp(\sum_m K_2 \mu(m)\mu'(m))$ である。指数は実数なので、主張 1.4 に記録した実指数関数の正値性より、この値は正である。

Step 3。

$$\begin{aligned}
W_{\iota(\mu), \iota(\mu')} &= \left(V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu), \iota(\mu')} \quad (\because W = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}) \\
&= \sum_{j=1}^{2^M} \sum_{k=1}^{2^M} \left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu), j} (V_2)_{j, k} \left(V_1^{1/2}\right)_{k, \iota(\mu')} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} \left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu), \iota(\mu)} (V_2)_{\iota(\mu), k} \left(V_1^{1/2}\right)_{k, \iota(\mu')} \quad (\because \text{Step 1 の対角性で } j \neq \iota(\mu) \text{ の項は0}) \\
&= \left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu), \iota(\mu)} (V_2)_{\iota(\mu), \iota(\mu')} \left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu'), \iota(\mu')} \quad (\because \text{Step 1 の対角性で } k \neq \iota(\mu') \text{ の項は0})
\end{aligned}$$

3 つの因子はいずれも正の実数なので、積も正である。 $\square$

主張 12.7 (半正定値双線型形式の Cauchy-Schwarz の不等式)。成分積は 定義 1.8 の式を実数成分について用い、複素数への包含は 定義 1.12 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 、 $P \in \text{Mat}(n, \mathbb{R})$ が対称かつ半正定値 ($\forall x \in \mathbb{R}^n : x^\top P x \geq 0$) とする。このとき任意の $x, y \in \mathbb{R}^n$ について

$$(y^\top P x)^2 \leq (x^\top P x) (y^\top P y)$$

証明. $t \in \mathbb{R}$ について $q(t) := (y + tx)^\top P(y + tx)$ と置く。半正定値性により、すべての $t \in \mathbb{R}$ について $0 \leq q(t)$ である。対称性を使って展開すると

$$\begin{aligned} q(t) &= (y + tx)^\top P(y + tx) & (\because q(t) \text{ の定義}) \\ &= y^\top Py + t y^\top Px + t x^\top Py + t^2 x^\top Px & (\because \text{転置} \cdot \text{行列積の分配法則}) \\ &= y^\top Py + 2t y^\top Px + t^2 x^\top Px & (\because P^\top = P \text{ より } x^\top Py = y^\top Px) \\ &= (x^\top Px)t^2 + 2(y^\top Px)t + y^\top Py & (\because \mathbb{R} \text{ の加法と乗法の可換則}) \end{aligned}$$

(i) $a := x^\top Px > 0$ のとき。 $b := y^\top Px$ と置き、 $t = -b/a$ を上の式へ代入すると

$$\begin{aligned} 0 &\leq q(-b/a) & (\because P \text{ の半正定値性}) \\ &= a \left(-\frac{b}{a} \right)^2 + 2b \left(-\frac{b}{a} \right) + y^\top Py & (\because \text{上の } q(t) \text{ の表示へ } t = -b/a \text{ を代入}) \\ &= \frac{b^2}{a} - \frac{2b^2}{a} + y^\top Py & (\because a > 0 \text{ より } a \neq 0) \\ &= y^\top Py - \frac{b^2}{a} & (\because \mathbb{R} \text{ の四則演算}) \\ &\quad \frac{b^2}{a} \leq y^\top Py & (\because 0 \leq y^\top Py - b^2/a \text{ の移項}) \\ &\quad b^2 \leq a(y^\top Py) & (\because a > 0 \text{ を両辺へ掛ける}) \end{aligned}$$

(ii) $a = 0$ のとき。 $b := y^\top Px$ と置くと、すべての $t \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned} q(t) &= 2bt + y^\top Py & (\because \text{上の } q(t) \text{ の表示と } a = 0) \\ 0 &\leq q(t) & (\because P \text{ の半正定値性}) \end{aligned}$$

$b \neq 0$ と仮定し、 $t_0 := -(y^\top Py + 1)/(2b)$ と置くと

$$\begin{aligned} q(t_0) &= 2b \left(-\frac{y^\top Py + 1}{2b} \right) + y^\top Py & (\because q(t) = 2bt + y^\top Py \text{ へ } t = t_0 \text{ を代入}) \\ &= -(y^\top Py + 1) + y^\top Py & (\because b \neq 0) \\ &= -1 & (\because \mathbb{R} \text{ の四則演算}) \\ &< 0 & (\because -1 < 0) \end{aligned}$$

これは半正定値性と矛盾するので $b = 0$ である。したがって

$$\begin{aligned} (y^\top Px)^2 &= b^2 & (\because b = y^\top Px) \\ &= 0 & (\because b = 0) \\ &= (x^\top Px)(y^\top Py) & (\because a = x^\top Px = 0) \end{aligned}$$

□

定義 12.8 $(c(M) := \sup_{\|x\|=1} x^\top Wx)$. W は主張 12.5 より実行列とみなせるので、

$$\mathcal{R} := \left\{ x^\top Wx \mid x \in \mathbb{R}^{2^M}, \|x\| = 1 \right\} \subseteq \mathbb{R}_{>0}$$

とおく。 $\mathcal{R}$ は空でない ($\|e_1\| = 1$ なので e_1 を取れる)。上に有界であることは、成分の有限和として次のように評価できる。 $\|x\| = 1$ とすると、各 i について

$$\begin{aligned}
|x_i|^2 &\leq \sum_{k=1}^{2^M} |x_k|^2 \quad (\because \text{非負の項の有限和は各項以上}) \\
&= \|x\|^2 \quad (\because \text{ノルムの定義定義 3.8}) \\
&= 1 \quad (\because \|x\| = 1)
\end{aligned}$$

であるから $|x_i| \leq 1$ である。これを成分表示へ入れると

$$\begin{aligned}
|x^\top W x| &= \left| \sum_{i=1}^{2^M} \sum_{j=1}^{2^M} x_i W_{ij} x_j \right| \quad (\because \text{行列積の成分表示}) \\
&\leq \sum_{i=1}^{2^M} \sum_{j=1}^{2^M} |x_i| |W_{ij}| |x_j| \quad (\because \text{有限和の三角不等式と積の絶対値}) \\
&\leq \sum_{i=1}^{2^M} \sum_{j=1}^{2^M} |W_{ij}| \quad (\because |x_i| \leq 1, |x_j| \leq 1)
\end{aligned}$$

となり、右辺は x によらない有限個の実数の和である。よって $\mathcal{R}$ は上に有界である。ここで実数の上限

$$c(M) := \sup \mathcal{R} \in \mathbb{R}_{>0}$$

が定まる。****** ここが実数へ脱出する箇所である。****** $\mathcal{R}$ は一般に有限集合でも可算集合でもなく、上限の存在は「空でなく上に有界な実数の集合は上限をもつ」という $\mathbb{R}$ の性質による。有理数の範囲では同じ主張は成り立たない。定義から

$$x^\top W x \leq c(M) \|x\|^2 \quad (\forall x \in \mathbb{R}^{2^M})$$

が成り立つ ($x \neq 0$ なら $x/\|x\|$ に適用し、 $x = 0$ なら両辺 0)。

****** 上限が達成されること (最大固有値の存在) はここでは主張しない。****** 以下の評価は上限としての $c(M)$ だけで足りる。

主張 12.9 ($\|Wx\| \leq c(M) \|x\|$). $\forall x \in \mathbb{R}^{2^M}$ について $\|Wx\| \leq c(M) \|x\|$ 。したがって $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\|W^k x\| \leq c(M)^k \|x\|$ 。

証明. $c := c(M)$ と略記する。 $x \in \mathbb{R}^{2^M}$ を取り、 $y := Wx$ とおく。まず

$$\begin{aligned}
\|Wx\|^2 &= (Wx)^\top (Wx) \quad (\because \text{ノルムの定義定義 3.8 と実成分なので } \|v\|^2 = v^\top v) \\
&= y^\top (Wx) \quad (\because y = Wx \text{ の置き換え (左因子)})
\end{aligned}$$

である。 W は実対称かつ正定値、とくに半正定値である (主張 12.5) から、

$$\begin{aligned}
\|Wx\|^4 &= (\|Wx\|^2)^2 \quad (\because \text{冪の指数法則}) \\
&= (y^\top Wx)^2 \quad (\because \text{上の式変形}) \\
&\leq (x^\top Wx) (y^\top Wy) \quad (\because \text{半正定値の Cauchy-Schwarz 主張 12.7 を } P = W, y = Wx \text{ に適用}) \\
&\leq (c\|x\|^2) (y^\top Wy) \quad (\because \text{上限の評価 定義 12.8 の } x^\top Wx \leq c\|x\|^2 \text{ と } 0 \leq y^\top Wy \text{ (半正定値性)}) \\
&\leq (c\|x\|^2) (c\|y\|^2) \quad (\because \text{上限の評価 定義 12.8 の } y^\top Wy \leq c\|y\|^2 \text{ と } 0 \leq c\|x\|^2) \\
&= c^2 \|x\|^2 \|Wx\|^2 \quad (\because y = Wx \text{ と } \mathbb{R} \text{ の乗法の可換則・結合則})
\end{aligned}$$

$\|Wx\| = 0$ のときは左辺が 0、右辺が $c\|x\| \geq 0$ なので主張が成り立つ。以下 $\|Wx\| > 0$ とする。

$$\begin{aligned}\|Wx\|^4 &\leq c^2\|x\|^2\|Wx\|^2 \implies \|Wx\|^2 \leq c^2\|x\|^2 \quad (\because \text{両辺を } \|Wx\|^2 > 0 \text{ で割る}) \\ &\implies \|Wx\| \leq c\|x\| \quad (\because \|Wx\| \geq 0, c\|x\| \geq 0 \text{ と平方の単調性})\end{aligned}$$

冪についての主張は k に関する帰納法で示す。 $k = 0$ のときは $\|W^0x\| = \|x\| = c^0\|x\|$ である。 k で成り立つとすると

$$\begin{aligned}\|W^{k+1}x\| &= \|W(W^kx)\| \quad (\because \text{行列の冪の定義と結合則}) \\ &\leq c\|W^kx\| \quad (\because \text{いま示した評価を } W^kx \text{ に適用}) \\ &\leq c \cdot c^k\|x\| \quad (\because \text{帰納法の仮定と } c > 0) \\ &= c^{k+1}\|x\| \quad (\because \text{冪の指数法則})\end{aligned}$$

□

主張 12.10 ($\text{tr}(W^n) \leq 2^M c(M)^n$). $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$\text{tr}(W^n) \leq 2^M c(M)^n$$

証明. $c := c(M)$ 、 $d := 2^M$ と略記し、 $e_1, \dots, e_d$ を標準基底とする。 W は実対称なので（主張 12.5）、その冪 W^n も実対称である。標準基底を用いるトレースの表示は、次の一続きの等式で得られる。

$$\begin{aligned}\text{tr}(W^n) &= \sum_{k=1}^d (W^n)_{kk} \quad (\because \text{トレースの定義}) \\ &= \sum_{k=1}^d e_k^\top W^n e_k \quad (\because \text{標準基底 } e_k \text{ による対角成分の表示 } (W^n)_{kk} = e_k^\top W^n e_k)\end{aligned}$$

まず $n = 2a$ が偶数の場合。各 k について

$$\begin{aligned}e_k^\top W^{2a} e_k &= (W^a e_k)^\top (W^a e_k) \quad (\because W^{2a} = W^a W^a \text{ (冪の指数法則) と } (W^a)^\top = W^a \text{ (} W \text{ は実対称)}) \\ &= \|W^a e_k\|^2 \quad (\because \text{ノルムの定義}) \\ &\leq (c^a \|e_k\|)^2 \quad (\because \text{作用素ノルムのレイリー上限評価の } a \text{ 回の適用と、非負の両辺の二乗は順序を保つ}) \\ &= c^{2a} \|e_k\|^2 \quad (\because \text{積の冪は冪の積}) \\ &= c^n \quad (\because \|e_k\| = 1 \text{ と } n = 2a)\end{aligned}$$

である（レイリー上限評価は 主張 12.9）。次に $n = 2a + 1$ が奇数なら

$$\begin{aligned}e_k^\top W^{2a+1} e_k &= (W^a e_k)^\top W (W^a e_k) \quad (\because W^{2a+1} = W^a W W^a \text{ (冪の指数法則) と } (W^a)^\top = W^a \text{ (} W \text{ は実対称)}) \\ &\leq c \|W^a e_k\|^2 \quad (\because \text{レイリー商の上限 } c \text{ の定義}) \\ &\leq c (c^a \|e_k\|)^2 \quad (\because \text{作用素ノルムのレイリー上限評価の } a \text{ 回の適用と、非負量による乗法は順序を保つ}) \\ &= c \cdot c^{2a} \|e_k\|^2 \quad (\because \text{積の冪は冪の積}) \\ &= c^{2a+1} \quad (\because \|e_k\| = 1 \text{ と冪の指数法則}) \\ &= c^n \quad (\because n = 2a + 1)\end{aligned}$$

(1 つ目の不等号は 定義 12.8)。いずれの場合も $e_k^\top W^n e_k \leq c^n$ である。これを標準基底の全体にわたって足すと

$$\begin{aligned}
\text{tr}(W^n) &= \sum_{k=1}^d e_k^\top W^n e_k \quad (\because \text{冒頭のトレースの標準基底表示}) \\
&\leq \sum_{k=1}^d c^n \quad (\because \text{各 } k \text{ の評価 } e_k^\top W^n e_k \leq c^n \text{ と、項ごとの不等式の有限和は順序を保つ}) \\
&= d c^n \quad (\because \text{同じ項 } c^n \text{ を } d \text{ 個足した和}) \\
&= 2^M c^n \quad (\because d = 2^M \text{ (冒頭の略記)})
\end{aligned}$$

となり、上からの評価を得る。 $\square$

主張 12.11 (モーメント列の正值性と対数凸性). 定義 12.3 の W は主張 12.5 より実対称正定値である。単位ベクトル $x \in \mathbb{R}^{2^M}$ ($\|x\| = 1$) を固定し、 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $m_k := x^\top W^k x$ とおく。このとき全ての k について $m_k > 0$ であり、

$$m_k^2 \leq m_{k-1} m_{k+1} \quad (k \in \mathbb{Z}_{\geq 1})$$

が成り立つ。

証明. 単位ベクトル x を固定し $m_k := x^\top W^k x$ ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) とおく。 W は正定値なので $m_k > 0$ である ($k = 2a$ なら $m_k = \|W^a x\|^2 > 0$ 、 $k = 2a + 1$ なら $m_k = (W^a x)^\top W (W^a x) > 0$ 。いずれも W が可逆なので $W^a x \neq 0$)。

主張 12.7 を $P = W$ 、 $x \rightarrow W^a x$ 、 $y \rightarrow W^b x$ として使うと

$$\begin{aligned}
(m_{a+b+1})^2 &= (x^\top W^{a+b+1} x)^2 & (\because m_k = x^\top W^k x \text{ の定義}) \\
&= \left((W^b x)^\top W (W^a x) \right)^2 & (\because W^{a+b+1} = W^b W W^a \text{ (冪の指数法則) と } (W^b)^\top = W^b \text{ (} W \text{ は実対称)}) \\
&\leq (W^a x)^\top W (W^a x) \left((W^b x)^\top W (W^b x) \right) & (\because \text{半正定値双線型形式の Cauchy-Schwarz の不等式を } P = W \text{ として適用}) \\
&= (x^\top W^{2a+1} x) (x^\top W^{2b+1} x) & (\because (W^a)^\top = W^a, (W^b)^\top = W^b \text{ と冪の指数法則}) \\
&= m_{2a+1} m_{2b+1} & (\because m_k = x^\top W^k x \text{ の定義を両因子へ適用})
\end{aligned}$$

同様に 主張 12.7 を $P = I$ (半正定値) として使うと

$$\begin{aligned}
(m_{a+b})^2 &= (x^\top W^{a+b} x)^2 & (\because m_k = x^\top W^k x \text{ の定義}) \\
&= (x^\top W^b W^a x)^2 & (\because \text{冪の指数法則}) \\
&= \left((W^b x)^\top (W^a x) \right)^2 & (\because (W^b)^\top = W^b \text{ (} W \text{ は実対称)}) \\
&\leq \|W^a x\|^2 \|W^b x\|^2 & (\because \text{半正定値双線型形式の Cauchy-Schwarz の不等式を } P = I \text{ として適用}) \\
&= (W^a x)^\top (W^a x) \left((W^b x)^\top (W^b x) \right) & (\because \text{ユークリッドノルムの定義}) \\
&= (x^\top W^a W^a x) (x^\top W^b W^b x) & (\because (W^a)^\top = W^a \text{ かつ } (W^b)^\top = W^b \text{ (} W \text{ は実対称)}) \\
&= (x^\top W^{2a} x) (x^\top W^{2b} x) & (\because \text{冪の指数法則を両因子へ適用}) \\
&= m_{2a} m_{2b} & (\because m_k = x^\top W^k x \text{ の定義を両因子へ適用})
\end{aligned}$$

この 2 式から、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$m_k^2 \leq m_{k-1} m_{k+1} \quad (k \in \mathbb{Z}_{\geq 1})$$

が従う。 k の偶奇でどちらの式を使うかを分け、いずれの場合も $a := \lfloor (k-1)/2 \rfloor$ 、 $b := a+1$ と取る。

$k = 2p + 1$ (奇数、 $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) の場合は $(a, b) = (p, p + 1)$ と取る。このとき

$$\begin{aligned} m_k^2 &= (m_{a+b})^2 & (\because k = 2p + 1 = a + b) \\ &\leq m_{2a} m_{2b} & (\because P = I \text{ 版の不等式}) \\ &= m_{2p} m_{2p+2} & (\because a = p, b = p + 1) \\ &= m_{k-1} m_{k+1} & (\because k = 2p + 1) \end{aligned}$$

$k = 2p + 2$ (偶数、 $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) の場合も $(a, b) = (p, p + 1)$ と取る。このとき

$$\begin{aligned} m_k^2 &= (m_{a+b+1})^2 & (\because k = 2p + 2 = a + b + 1) \\ &\leq m_{2a+1} m_{2b+1} & (\because P = W \text{ 版の不等式}) \\ &= m_{2p+1} m_{2p+3} & (\because a = p, b = p + 1) \\ &= m_{k-1} m_{k+1} & (\because k = 2p + 2) \end{aligned}$$

(添字の確認。奇数の場合は

$$\begin{aligned} a + b &= p + (p + 1) & (\because a = p, b = p + 1) \\ &= 2p + 1 & (\because \mathbb{Z} \text{ の加法}) \\ &= k & (\because k = 2p + 1) \\ 2a &= 2p & (\because a = p) \\ &= k - 1 & (\because k = 2p + 1 \text{ の両辺から } 1 \text{ を引く}) \\ 2b &= 2(p + 1) & (\because b = p + 1) \\ &= 2p + 2 & (\because \mathbb{Z} \text{ の分配則}) \\ &= k + 1 & (\because k = 2p + 1 \text{ の両辺へ } 1 \text{ を足す}) \end{aligned}$$

であり、偶数の場合は

$$\begin{aligned} a + b + 1 &= p + (p + 1) + 1 & (\because a = p, b = p + 1) \\ &= 2p + 2 & (\because \mathbb{Z} \text{ の加法}) \\ &= k & (\because k = 2p + 2) \\ 2a + 1 &= 2p + 1 & (\because a = p) \\ &= k - 1 & (\because k = 2p + 2 \text{ の両辺から } 1 \text{ を引く}) \\ 2b + 1 &= 2(p + 1) + 1 & (\because b = p + 1) \\ &= 2p + 3 & (\because \mathbb{Z} \text{ の分配則と加法}) \\ &= k + 1 & (\because k = 2p + 2 \text{ の両辺へ } 1 \text{ を足す}) \end{aligned}$$

である。また $k \geq 1$ より奇数の場合 $p = (k - 1)/2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 、偶数の場合は $k \geq 2$ なので $p = (k - 2)/2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ であり、どちらも $p = \lfloor (k - 1)/2 \rfloor = a$ 。現れる指数はすべて $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ に収まるので、 m_j はいずれも定義済みである。□

主張 12.12 $(c(M)^n \leq \text{tr}(W^n) \leq 2^M c(M)^n)$. $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$c(M)^n \leq \text{tr}(W^n) \leq 2^M c(M)^n$$

証明. まず、任意の $k \geq 1$ について

$$\begin{aligned} \frac{m_k}{m_{k-1}} &= \frac{m_k^2}{m_{k-1} m_k} & (\because \text{分子と分母に } m_k > 0 \text{ を掛けた (主張 12.11 の正値性)}) \\ &\leq \frac{m_{k-1} m_{k+1}}{m_{k-1} m_k} & (\because \text{対数凸性主張 12.11 と、正の分母での商は順序を保つ}) \\ &= \frac{m_{k+1}}{m_k} & (\because m_{k-1} > 0 \text{ の約分}) \end{aligned}$$

であり、比 m_{k+1}/m_k は k について単調非減少である。したがって

$$\begin{aligned}
m_n &= m_0 \cdot \frac{m_1}{m_0} \cdot \frac{m_2}{m_1} \cdots \frac{m_n}{m_{n-1}} \quad (\because \text{望遠鏡積 (分母は主張 12.11 の正值性により零でない)}) \\
&= \frac{m_1}{m_0} \cdot \frac{m_2}{m_1} \cdots \frac{m_n}{m_{n-1}} \quad (\because m_0 = x^\top W^0 x = \|x\|^2 = 1 \text{ (} x \text{ は単位ベクトル)}) \\
&\geq \left(\frac{m_1}{m_0} \right)^n \quad (\because \text{各 } j \text{ で } \frac{m_j}{m_{j-1}} \geq \frac{m_1}{m_0} \text{ (上の単調非減少を } j-1 \text{ 回適用) と、} \\
&\quad \text{正の項どうしの積は順序を保つ}) \\
&= (x^\top W x)^n \quad (\because m_1 = x^\top W x \text{ と } m_0 = 1)
\end{aligned}$$

一方、 W^n は正定値 (W が正定値なので、 n が偶数なら $y^\top W^n y = \|W^{n/2} y\|^2$ 、奇数なら $(W^{(n-1)/2} y)^\top W (W^{(n-1)/2} y)$ がいずれも $y \neq 0$ で正) であり、半正定値行列 A については

$$\begin{aligned}
x^\top A x &= |x^\top A x| \quad (\because A \text{ は半正定値なので } 0 \leq x^\top A x) \\
&= \left| \sum_{k,l=1}^d x_k x_l A_{kl} \right| \quad (\because \text{行列の積の成分表示}) \\
&\leq \sum_{k,l=1}^d |x_k| |x_l| |A_{kl}| \quad (\because \text{有限和の三角不等式}) \\
&\leq \sum_{k,l=1}^d |x_k| |x_l| \sqrt{A_{kk} A_{ll}} \quad (\because \text{半正定値の Cauchy-Schwarz 主張 12.7 を } P = A, x = e_k, y = e_l \text{ に適用して } |A_{kl}| \leq \sqrt{A_{kk} A_{ll}}) \\
&= \sum_{k,l=1}^d |x_k| |x_l| \sqrt{A_{kk}} \sqrt{A_{ll}} \quad (\because A_{kk}, A_{ll} \geq 0 \text{ と平方根の積の法則}) \\
&= \left(\sum_{k=1}^d |x_k| \sqrt{A_{kk}} \right)^2 \quad (\because \text{有限和の分配則}) \\
&\leq \left(\sum_{k=1}^d x_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^d A_{kk} \right) \quad (\because \text{半正定値の Cauchy-Schwarz 主張 12.7 を } P = I \text{ と} \\
&\quad \text{二つのベクトル } (|x_k|)_k, (\sqrt{A_{kk}})_k \text{ に適用}) \\
&= \|x\|^2 \operatorname{tr}(A) \quad (\because \text{ノルムとトレースの定義}).
\end{aligned}$$

この評価を $A = W^n$ と単位ベクトル x に適用すると

$$\begin{aligned}
m_n &= x^\top W^n x \quad (\because m_n = x^\top W^n x \text{ の定義}) \\
&\leq \|x\|^2 \operatorname{tr}(W^n) \quad (\because \text{上の評価を半正定値行列 } A = W^n \text{ へ適用}) \\
&= \operatorname{tr}(W^n) \quad (\because \|x\| = 1 \text{ (} x \text{ は単位ベクトル)})
\end{aligned}$$

である。以上を合わせると、任意の単位ベクトル x について

$$(x^\top W x)^n \leq m_n \leq \operatorname{tr}(W^n)$$

である。左辺の x についての上限を取ると

$$\begin{aligned}
c^n &= \left(\sup_{\|x\|=1} x^\top W x \right)^n \quad (\because c \text{ の定義}) \\
&= \sup_{\|x\|=1} (x^\top W x)^n \quad (\because t \mapsto t^n \text{ は } \mathbb{R}_{>0} \text{ 上で単調増加なので、上限と可換}) \\
&\leq \operatorname{tr}(W^n) \quad (\because \text{各単位ベクトル } x \text{ で } (x^\top W x)^n \leq \operatorname{tr}(W^n) \text{ (上の鎖) なので} \\
&\quad \operatorname{tr}(W^n) \text{ は上界であり、上限は最小の上界})
\end{aligned}$$

であり、 $c^n \leq \text{tr}(W^n)$ を得る (c の定義は 定義 12.8)。上からの評価 $\text{tr}(W^n) \leq 2^M c^n$ は 主張 12.10 である。二つを合わせて主張を得る。 $\square$

主張 12.13 (分配関数の挟み撃ち). 主張 11.8 と同じ設定のもと、 $N_{\text{row}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$c(M)^{N_{\text{row}}} \leq Z(J, J') \leq 2^M c(M)^{N_{\text{row}}}$$

証明.

$$\begin{aligned} Z(J, J') &= \text{tr}(W^{N_{\text{row}}}) \quad (\because \text{主張 12.4}) \\ &\geq c(M)^{N_{\text{row}}} \quad (\because \text{主張 12.12 の下からの評価を } n = N_{\text{row}} \text{ に適用}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z(J, J') &= \text{tr}(W^{N_{\text{row}}}) \quad (\because \text{主張 12.4}) \\ &\leq 2^M c(M)^{N_{\text{row}}} \quad (\because \text{主張 12.12 の上からの評価を } n = N_{\text{row}} \text{ に適用}) \end{aligned}$$

この二つを合わせて主張を得る。 $\square$

定義 12.14 ($c_{\pm}(M) := \sup \mathcal{R}_{\pm}$ (セクターごとの上限)). 定義 11.9 の $P^{(\pm)}$ と 主張 5.20 の $\mathcal{F}^{(\pm)}$ について、

$$\mathcal{R}_{\pm} := \left\{ x^{\top} W x \mid x \in \mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}, \|x\| = 1 \right\}, \quad c_{\pm}(M) := \sup \mathcal{R}_{\pm}$$

とおく (複号同順)。この上限が定まること、すなわち $\mathcal{R}_{\pm}$ が空でなく上に有界であることを先に確かめる。上に有界なのは $\mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M} \subseteq \mathbb{R}^{2^M}$ より $\mathcal{R}_{\pm} \subseteq \mathcal{R}$ (定義 12.8 の $\mathcal{R}$) であり、 $\mathcal{R}$ が成分の絶対値の有限和 $\sum_{i,j} |W_{ij}|$ で上に有界だからである (定義 12.8 の有界性の評価)。空でないことは、 $\mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルを具体的に作れることから従う。

主張 7.1 の $\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ について

$$a_{\pm} := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \sigma^x a_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \pm 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \pm a_{\pm}$$

とおき (右の等式は 2×2 行列と 2 次元数ベクトルの積の計算そのもの)、定義 3.1 (1) の数ベクトルのクロネッカー積で

$$x^{(+)} := \overbrace{a_+ \boxtimes a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+}^M, \quad x^{(-)} := a_- \boxtimes \overbrace{a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+}^{M-1} \in \mathbb{R}^{2^M}$$

と定める (定義 3.1 (1) より成分は各因子の成分の積だから、 $x^{(\pm)}$ の各成分は $\pm 2^{-M/2}$ という実数であり、とくに $x^{(\pm)} \in \mathbb{R}^{2^M}$)。主張 5.20 の $\varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x$ と 主張 3.2 (3) より

$$\begin{aligned} \varepsilon x^{(+)} &= (\sigma^x a_+) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x a_+) = a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+ = x^{(+)} \\ \varepsilon x^{(-)} &= (\sigma^x a_-) \boxtimes (\sigma^x a_+) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x a_+) = (-a_-) \boxtimes a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+ = -x^{(-)} \end{aligned}$$

(最後の等号は 定義 3.1 (1) の成分表示において第 1 因子の成分だけが -1 倍されることによる)。よって 主張 5.20 より $x^{(\pm)} \in \mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ である。さらに $x^{(\pm)}$ の 2^M 個の成分はすべて絶対値 $2^{-M/2}$ なので

$$\|x^{(\pm)}\|^2 = \sum_{I \in \mathcal{I}_M} \left(2^{-M/2} \right)^2 = 2^M \cdot 2^{-M} = 1$$

($\mathcal{I}_M$ は 定義 3.1 の添字集合で $\#\mathcal{I}_M = 2^M$)。したがって $(x^{(\pm)})^{\top} W x^{(\pm)} \in \mathcal{R}_{\pm}$ で $\mathcal{R}_{\pm} \neq \emptyset$ であり、上限 $c_{\pm}(M) \in \mathbb{R}$ が定まる。以上のもとで、

以上により、二つのセクターの上限 $c_+(M)$ と $c_-(M)$ が定まった。

主張 12.15 ($\varepsilon W = W\varepsilon$). 定義 12.3 の W は全スピン反転行列 ε と可換である。したがって W は 主張 5.20 の二つの固有空間 $\mathcal{F}^{(\pm)}$ をそれぞれ保つ。

証明. 主張 11.13 の Step 3 で ε が $D = \sum_m \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ と可換であることを示した。同 Step 2 と同じ議論（可換なら冪とも可換、部分和とも可換、極限とも可換）で ε は $V_1^{1/2} = \exp(\frac{1}{2}K_1 D)$ と可換であり、同 Step 2 より V_2 とも可換である。よって次の等式鎖を得る。

$$\begin{aligned}\varepsilon W &= \varepsilon V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} \quad (\because W = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}) \\ &= V_1^{1/2} \varepsilon V_2 V_1^{1/2} \quad (\because \varepsilon V_1^{1/2} = V_1^{1/2} \varepsilon) \\ &= V_1^{1/2} V_2 \varepsilon V_1^{1/2} \quad (\because \varepsilon V_2 = V_2 \varepsilon) \\ &= V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} \varepsilon \quad (\because \varepsilon V_1^{1/2} = V_1^{1/2} \varepsilon) \\ &= W \varepsilon \quad (\because W = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}).\end{aligned}$$

$f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ とすると、主張 5.20 より $\varepsilon f = \pm f$ であり、

$$\begin{aligned}\varepsilon(Wf) &= (\varepsilon W)f \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \\ &= (W\varepsilon)f \quad (\because \text{上の等式鎖 } \varepsilon W = W\varepsilon) \\ &= W(\varepsilon f) \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \\ &= W(\pm f) \quad (\because \varepsilon f = \pm f) \\ &= \pm(Wf) \quad (\because \text{スカラー倍は行列の作用と交換する})\end{aligned}$$

なので $Wf \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ (主張 5.20)。 □

主張 12.16 ($WP^{(\pm)} = V^{(\pm)}P^{(\pm)}$). 定義 12.3 の W 、定義 11.9 の $P^{(\pm)}$ 、主張 11.17 の $V^{(\pm)}$ について、複号同順で次が成り立つ。

$$WP^{(\pm)} = V^{(\pm)}P^{(\pm)}$$

証明. $B := V_1^{1/2}$ は 定義 12.2、 $C := (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ は 定義 11.11 の行列とし、 $P := P^{(\pm)}$ と略記する。主張 5.23 に結合定数 $K_1/2$ を代入すると、任意の $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ について $Bf = Cf$ を得る。主張 11.10 より任意の $x \in \mathbb{C}^{2^M}$ に対して $Px \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ なので、

$$\begin{aligned}(BP)x &= B(Px) \quad (\because \text{行列積の結合則}) \\ &= C(Px) \quad (\because \text{主張 5.23 に } K_1/2 \text{ と } Px \text{ を代入}) \\ &= (CP)x \quad (\because \text{行列積の結合則}).\end{aligned}$$

すべての数ベクトルへの作用が等しいため $BP = CP$ である。主張 11.14 の $PC = CP$ と $PV_2 = V_2P$ を用いると、

$$\begin{aligned}WP &= BV_2BP \quad (\because \text{定義 12.3}) \\ &= BV_2CP \quad (\because BP = CP) \\ &= BV_2PC \quad (\because \text{主張 11.14 の } CP = PC) \\ &= BPV_2C \quad (\because \text{主張 11.14 の } V_2P = PV_2) \\ &= CPV_2C \quad (\because BP = CP) \\ &= CV_2PC \quad (\because \text{主張 11.14 の } PV_2 = V_2P) \\ &= CV_2CP \quad (\because \text{主張 11.14 の } PC = CP) \\ &= V^{(\pm)}P \quad (\because \text{主張 11.17 の } V^{(\pm)} \text{ の定義}).\end{aligned}$$

□

主張 12.17 ($c(M) = \max(c_+(M), c_-(M))$). 定義 12.8 の $c(M)$ と 定義 12.14 の $c_\pm(M)$ について、次が成り立つ。

$$c(M) = \max(c_+(M), c_-(M))$$

証明. 主張 11.10 (2)(3) より、任意の $x \in \mathbb{R}^{2M}$ は $x = x_+ + x_-$ ($x_\pm := P^{(\pm)}x \in \mathcal{F}^{(\pm)}$) と分解される。主張 5.21 の証明で得た $\varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x$ と、主張 7.1 の σ^x の成分表示、主張 3.4 より、

$$\begin{aligned}\varepsilon^\top &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)^\top \quad (\because \text{主張 5.21 の証明で得た表示}) \\ &= (\sigma^x)^\top \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x)^\top \quad (\because \text{主張 3.4}) \\ &= \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x \quad (\because \text{主張 7.1 の } \sigma^x \text{ の成分表示}) \\ &= \varepsilon \quad (\because \text{主張 5.21 の証明で得た表示}).\end{aligned}$$

したがって ε は実対称である。さらに、定義 11.9 から $P^{(\pm)}$ も実対称である。実際、

$$\begin{aligned}\left(P^{(\pm)}\right)^\top &= \left(\frac{1}{2}(I \pm \varepsilon)\right)^\top \quad (\because \text{定義 11.9}) \\ &= \frac{1}{2}\left(I^\top \pm \varepsilon^\top\right) \quad (\because \text{転置は和と実数倍を保つ}) \\ &= \frac{1}{2}(I \pm \varepsilon) \quad (\because I^\top = I, \varepsilon^\top = \varepsilon) \\ &= P^{(\pm)} \quad (\because \text{定義 11.9}).\end{aligned}$$

また I と ε は実行列なので、定義 11.9 の $P^{(\pm)}$ も実行列である。したがって $x \in \mathbb{R}^{2M}$ から $x_\pm = P^{(\pm)}x \in \mathbb{R}^{2M}$ であり、先に示したセクターへの所属と合わせて $x_\pm \in \mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2M}$ である。

ここで任意の $u_+ \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2M}$ と $u_- \in \mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2M}$ を取る。主張 11.10 (1)(3) より $P^{(+)}u_+ = u_+$ 、 $P^{(-)}u_- = u_-$ だから、

$$\begin{aligned}u_+^\top u_- &= \left(P^{(+)}u_+\right)^\top \left(P^{(-)}u_-\right) \quad (\because P^{(+)}u_+ = u_+, P^{(-)}u_- = u_-) \\ &= u_+^\top \left(P^{(+)}\right)^\top P^{(-)}u_- \quad (\because \text{転置の積の法則を一回適用する}) \\ &= u_+^\top P^{(+)}P^{(-)}u_- \quad (\because (P^{(+)})^\top = P^{(+)}) \\ &= u_+^\top 0 u_- \quad (\because \text{主張 11.10 (1) の } P^{(+)}P^{(-)} = 0) \\ &= 0 \quad (\because \text{零行列の作用})\end{aligned}$$

したがって二つのセクターの実ベクトルは直交する。特に $x_+^\top x_- = x_-^\top x_+ = 0$ である。定義 3.8 の数ベクトルのノルムを使うと、

$$\begin{aligned}\|x\|^2 &= x^\top x \quad (\because \text{定義 3.8 の数ベクトルのノルムの定義}) \\ &= (x_+ + x_-)^\top (x_+ + x_-) \quad (\because x = x_+ + x_- \text{ を左右へ代入}) \\ &= x_+^\top x_+ + x_+^\top x_- + x_-^\top x_+ + x_-^\top x_- \quad (\because \text{転置と内積の分配則}) \\ &= x_+^\top x_+ + x_-^\top x_- \quad (\because x_+^\top x_- = x_-^\top x_+ = 0) \\ &= \|x_+\|^2 + \|x_-\|^2 \quad (\because \text{ノルムの定義}).\end{aligned}$$

また 主張 12.15 より $Wx_\pm \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ である。また 主張 12.5 より W は実行列なので、 $Wx_\pm \in \mathbb{R}^{2M}$ でもある。したがって、上で示した実ベクトル間の直交性から交叉項が消えて

$$\begin{aligned}
x^\top Wx &= (x_+ + x_-)^\top W(x_+ + x_-) \quad (\because x = x_+ + x_- \text{ を左右へ代入する}) \\
&= (x_+ + x_-)^\top (Wx_+ + Wx_-) \quad (\because \text{行列の作用の分配則}) \\
&= x_+^\top Wx_+ + x_+^\top Wx_- + x_-^\top Wx_+ + x_-^\top Wx_- \quad (\because \text{転置と内積の分配則}) \\
&= x_+^\top Wx_+ + 0 + 0 + x_-^\top Wx_- \quad (\because x_+, Wx_+ \in \mathcal{F}^{(+)} \text{ と } x_-, Wx_- \in \mathcal{F}^{(-)} \text{ の直交性}) \\
&= x_+^\top Wx_+ + x_-^\top Wx_- \quad (\because \text{零は加法単位元})
\end{aligned}$$

$c_\pm := c_\pm(M)$ と略記する。任意の $y \in \mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ について、 $y = 0$ なら $y^\top W y = c_\pm \|y\|^2 = 0$ である。 $y \neq 0$ なら 主張 3.9 (1) より $\|y\| > 0$ であり、 $\hat{y} := y/\|y\|$ と定める。主張 5.20 と 主張 3.9 (2) より、

$$\begin{aligned}
\varepsilon \hat{y} &= \varepsilon \left(\frac{1}{\|y\|} y \right) \quad (\because \hat{y} \text{ の定義}) \\
&= \frac{1}{\|y\|} \varepsilon y \quad (\because \text{行列の作用は実数倍を保つ}) \\
&= \frac{1}{\|y\|} (\pm y) \quad (\because y \in \mathcal{F}^{(\pm)} \text{ と 主張 5.20}) \\
&= \pm \hat{y} \quad (\because \hat{y} \text{ の定義}), \\
\|\hat{y}\| &= \left\| \frac{1}{\|y\|} y \right\| \quad (\because \hat{y} \text{ の定義}) \\
&= \left| \frac{1}{\|y\|} \right| \|y\| \quad (\because \text{主張 3.9 (2)}) \\
&= \frac{1}{\|y\|} \|y\| \quad (\because \|y\| > 0 \text{ なので } 1/\|y\| > 0) \\
&= 1 \quad (\because \|y\| > 0).
\end{aligned}$$

$\|y\| > 0$ だから $1/\|y\| \in \mathbb{R}$ である。また $y \in \mathbb{R}^{2^M}$ であり、実数ベクトル全体は実数倍について閉じている。よって $\hat{y} = (1/\|y\|)y \in \mathbb{R}^{2^M}$ である。上の計算と合わせると、 $\hat{y}$ は同じセクターの単位ベクトルである。したがって 定義 12.14 より

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\|y\|^2} y^\top W y &= \left(\frac{1}{\|y\|} \right)^2 y^\top W y \quad (\because (1/a)^2 = 1/a^2) \\
&= \frac{1}{\|y\|} y^\top \left(\frac{1}{\|y\|} W y \right) \quad (\because \text{実数倍の結合則}) \\
&= \frac{1}{\|y\|} y^\top W \left(\frac{1}{\|y\|} y \right) \quad (\because \text{行列の作用は実数倍を保つ}) \\
&= \left(\frac{1}{\|y\|} y \right)^\top W \left(\frac{1}{\|y\|} y \right) \quad (\because \text{転置は実数倍を保つ}) \\
&= \hat{y}^\top W \hat{y} \quad (\because \hat{y} = (1/\|y\|)y \text{ を左右へ代入}) \\
&\leq c_\pm \quad (\because \|\hat{y}\| = 1 \text{ なのでセクター上限の定義を適用}) \\
y^\top W y &\leq c_\pm \|y\|^2 \quad (\because \|y\|^2 > 0 \text{ を両辺へ掛ける}).
\end{aligned}$$

零の場合と非零の場合を合わせると、各符号について $y^\top W y \leq c_\pm \|y\|^2$ が任意のセクターベクトルで成り立つ。これを $y = x_\pm$ へ適用する。 $\|x\| = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
x^\top W x &= x_+^\top W x_+ + x_-^\top W x_- \quad (\because \text{上の交叉項の消去}) \\
&\leq c_+ \|x_+\|^2 + x_-^\top W x_- \quad (\because x_+^\top W x_+ \leq c_+ \|x_+\|^2 \text{ を第一項へ適用する}) \\
&\leq c_+ \|x_+\|^2 + c_- \|x_-\|^2 \quad (\because x_-^\top W x_- \leq c_- \|x_-\|^2 \text{ を第二項へ適用する}) \\
&\leq \max(c_+, c_-) \|x_+\|^2 + \max(c_+, c_-) \|x_-\|^2 \quad (\because c_\pm \leq \max(c_+, c_-) \text{ と } \|x_\pm\|^2 \geq 0 \text{ の積の単調性}) \\
&= \max(c_+, c_-) (\|x_+\|^2 + \|x_-\|^2) \quad (\because \text{分配則}) \\
&= \max(c_+, c_-) \|x\|^2 \quad (\because \|x\|^2 = \|x_+\|^2 + \|x_-\|^2 \text{ を上で示した}) \\
&= \max(c_+, c_-) \quad (\because \|x\| = 1)
\end{aligned}$$

上限を取って $c(M) \leq \max(c_+, c_-)$ 。逆に、 $\mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2M}$ の単位ベクトルは $\mathbb{R}^{2M}$ の単位ベクトルでもあるので $\mathcal{R}_\pm \subseteq \mathcal{R}$ である（空でないことと上に有界であることは定義 12.14）。したがって

$$\begin{aligned}
c_\pm &= \sup \mathcal{R}_\pm \quad (\because c_\pm \text{ の定義}) \\
&\leq \sup \mathcal{R} \quad (\because \mathcal{R}_\pm \subseteq \mathcal{R} \text{ と上限の単調性}) \\
&= c(M) \quad (\because c(M) \text{ の定義})
\end{aligned}$$

両方の符号について成り立つので、

$$\begin{aligned}
\max(c_+, c_-) &\leq c(M) \quad (\because c_+ \leq c(M) \text{ かつ } c_- \leq c(M)) \\
&\leq \max(c_+, c_-) \quad (\because \text{上で示したレイリー商の上界})
\end{aligned}$$

よって等号が成り立つ。 □

13 自由エネルギーと熱力学極限

注意 13.1 (実数解析へ移行するのはこの章のこの箇所だけである)。ここまでの章はすべて、複素数を成分とする有限サイズの行列の積・和・スカラー倍と、行列の指数関数（定義 4.4：ノルムについて収束する級数）だけで書かれてきた。実数の極限は使ったが、積分は一度も使っていない。

**** この章の 定理 13.5 が、自由エネルギーの表式（定理 19.19）を得るまでに実数解析（Riemann 積分）へ移行する唯一の箇所である。 **** そこで **** 積分について **** 外部から持ち込む事実は次の 2 つだけであり、この表式を得るまでの他の箇所では使わない。

- (R1) ****Heine–Cantor****：有界閉区間 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上の連続関数は一様連続である。すなわち $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ が存在して $|s - t| \leq \delta \Rightarrow |g(s) - g(t)| \leq \epsilon$ 。
- (R2) **** 連続関数の Riemann 可積分性 ****： $[a, b]$ 上の連続関数 g は Riemann 積分可能で、積分は区間についての加法性 $\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c$ と評価 $\left| \int_a^b g \right| \leq (b - a) \sup_{[a, b]} |g|$ 、および定数の積分 $\int_a^b \lambda dt = \lambda(b - a)$ を満たす。

**** 積分とは別に、被積分関数の連続性を示すところでもう 1 種類の外部事実を使う。 **** 主張 13.3 の証明は、 $\gamma = \operatorname{arccosh} \circ \gamma_1$ を初等関数の合成として書いて連続性を導くので、次を認める必要がある。

- (R0) **** 初等関数の連続性 ****： $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は連続、 $\sqrt{\cdot} : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ は連続、 $\log : \mathbb{R}_{> 0} \rightarrow \mathbb{R}$ は連続であり、連続関数の四則（分母が 0 にならない範囲）と合成は連続である。

(R0) は Riemann 積分とは独立の事実であり、(R1)(R2) には含まれない。これも有限の代数計算では代用できないので、外部事実として明示的に数える。この章で持ち込む実数解析の事実は (R0)(R1)(R2) の 3 種類でちょうど尽きている。

移行が必要になる理由も明示しておく。主張 12.13 と 主張 13.4 により、鎖の長さ M を固定したままの量 $\frac{1}{M} \log c(M)$ までは有限の行列計算で到達する。しかし $M \rightarrow \infty$ で現れるのは $\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \gamma(\theta_\mu)$ という ** 点の個数が増えていく有限和 ** であり、その極限を閉じた式で書くには「等間隔の点での値の平均が積分に収束する」という実数解析の事実が要る。ここだけは有限の代数計算では代用できない。

** 表式を得た後の章 E (臨界点と比熱の対数発散) では、得られた積分を微分するために外部事実を追加で持ち込む。** 追加分は 注意 21.1 に (R3)~(R6) として列挙しており、この章の (R0)(R1)(R2) とは独立に管理する。

主張 13.2 ($\gamma_1(\theta) \geq \cosh(2K_1 - 2K_2^*) \geq 1$ ($\forall \theta \in \mathbb{R}$)). 定義 9.20 の $\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta$ を ** すべての実数 ** θ について考える (主張 9.38 は $\theta = \theta_\mu$ の場合の主張だが、以下の評価は任意の実数 θ で成り立つ)。このとき

$$\gamma_1(\theta) \geq \cosh(2K_1 - 2K_2^*) \geq 1 \quad (\forall \theta \in \mathbb{R})$$

とくに $\gamma(\theta) := \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta)) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が ** すべての実数 ** θ について定まる (定義 9.39 の $\gamma(\theta_\mu)$ の拡張)。

証明. 準備として、定義 5.8 より $K_1, K_2^* > 0$ なので $s_1 = \sinh 2K_1 > 0$, $s_2^* = \sinh 2K_2^* > 0$, したがって $s_1 s_2^* > 0$ である。このとき

$$\begin{aligned} \gamma_1(\theta) &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta && (\because \gamma_1(\theta) \text{ の定義}) \\ &\geq c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cdot 1 && (\because \cos \theta \leq 1 \text{ と } s_1 s_2^* > 0. \text{ 負号つきの項なので向きが変わる}) \\ &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* && (\because \mathbb{R} \text{ では } 1 \text{ は積の単位元}) \\ &= \cosh(2K_1 - 2K_2^*) && (\because \text{加法定理 } \cosh(x - y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y \text{ を } x = 2K_1, y = 2K_2^* \text{ に適用}) \\ &\geq 1 && (\because \cosh \text{ は実数で } 1 \text{ 以上}) \end{aligned}$$

である (引いたブロックは 定義 9.20、定義 5.8、主張 1.4)。 $\operatorname{arccosh}$ は $[1, \infty)$ 上で定義された $(\cosh|_{[0, \infty)})$ の逆写像としての) 実数値関数なので $\gamma(\theta)$ が定まり、値は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に属する。□

主張 13.3 (γ は $\mathbb{R}$ 上で連続)。主張 13.2 の $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ は連続であり、周期 2π をもつ： $\gamma(\theta + 2\pi) = \gamma(\theta)$ 。

定理 13.5 を適用するために使うのは ** 連続性だけ ** である。周期 2π をもつことは γ の性質として併せて述べておく (積分区間を $[0, 2\pi]$ に取れば十分であることの根拠にはなるが、定理 13.5 の仮定には入っていない)。

証明. Step 1 (γ_1 の連続性と周期性)。 $\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta$ は定数と $\cos$ の 1 次式である。 $\cos$ は $\mathbb{R}$ 上連続 (注意 13.1 の (R0)) で周期 2π をもつので、 γ_1 も連続で周期 2π をもつ。

Step 2 ($\operatorname{arccosh}$ の連続性)。 $y \geq 1$ とし、準備として

$$u := \log \left(y + \sqrt{y^2 - 1} \right)$$

とおく。このとき

$$\begin{aligned}
e^u &= y + \sqrt{y^2 - 1} & (\because \log \text{ と } \exp \text{ は正の実数上で互いに逆写像}), \\
e^{-u} &= \frac{1}{e^u} & (\because \text{指数法則 } e^{-u} \cdot e^u = e^0 = 1) \\
&= \frac{1}{y + \sqrt{y^2 - 1}} & (\because \text{上の } e^u \text{ の表示}) \\
&= y - \sqrt{y^2 - 1} & (\because \text{分母の有理化と } y^2 - (y^2 - 1) = 1), \\
\cosh u &= \frac{e^u + e^{-u}}{2} & (\because \cosh \text{ の定義}) \\
&= \frac{y + \sqrt{y^2 - 1} + y - \sqrt{y^2 - 1}}{2} & (\because \text{上の } e^u, e^{-u} \text{ の表示}) \\
&= y & (\because \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u &= \log(y + \sqrt{y^2 - 1}) & (\because u \text{ の定義}) \\
&\geq \log 1 & (\because y \geq 1, \sqrt{y^2 - 1} \geq 0, \log \text{ の単調性}) \\
&= 0 & (\because \log 1 = 0).
\end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned}
\operatorname{arccosh}(y) &= u & (\because \operatorname{arccosh} \text{ は } \cosh|_{[0, \infty)} \text{ の逆写像}) \\
&= \log(y + \sqrt{y^2 - 1}) & (\because u \text{ の定義}).
\end{aligned}$$

$y \mapsto y^2 - 1$ は連続で $[1, \infty)$ 上非負、非負実数の平方根は連続、 $y + \sqrt{y^2 - 1} \geq 1 > 0$ 上で $\log$ は連続である (いずれも 注意 13.1 の (R0))。よって合成として $\operatorname{arccosh}$ は $[1, \infty)$ 上連続である。

Step 3. 主張 13.2 より $\gamma_1(\mathbb{R}) \subseteq [1, \infty)$ なので、連続写像の合成 $\gamma = \operatorname{arccosh} \circ \gamma_1$ は $\mathbb{R}$ 上連続である。周期性は γ_1 の周期性から従う。 $\square$

主張 13.4 ($N_{\text{row}} \rightarrow \infty$ の極限). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ を固定する。主張 12.13 の $c(M)$ について、極限

$$\lim_{N_{\text{row}} \rightarrow \infty} \frac{1}{M N_{\text{row}}} \log Z(J, J') = \frac{1}{M} \log c(M)$$

が存在する。すなわち、行数 N_{row} についての極限は $c(M)$ だけで決まる。

証明. $Z := Z(J, J')$ 、 $c := c(M)$ 、 $N := N_{\text{row}}$ と略記する。定義 2.2 より $Z \in \mathbb{R}_{>0}$ 、定義 12.8 より $c > 0$ なので、両者の $\log$ が定まる。

主張 12.13 の挟み込みから始めて、一続きに変形する。

$$\begin{aligned}
c^N &\leq Z \leq 2^M c^N & (\because \text{分配関数の挟み込み}) \\
\Rightarrow \log(c^N) &\leq \log Z \leq \log(2^M c^N) & (\because \log \text{ は } \mathbb{R}_{>0} \text{ 上で狭義単調増加}) \\
\Rightarrow N \log c &\leq \log Z \leq \log(2^M c^N) & (\because \log(c^N) = N \log c) \\
\Rightarrow N \log c &\leq \log Z \leq \log(2^M) + \log(c^N) & (\because \log(ab) = \log a + \log b) \\
\Rightarrow N \log c &\leq \log Z \leq M \log 2 + \log(c^N) & (\because \log(2^M) = M \log 2) \\
\Rightarrow N \log c &\leq \log Z \leq M \log 2 + N \log c & (\because \log(c^N) = N \log c) \\
\Rightarrow \frac{1}{M} \log c &\leq \frac{1}{MN} \log Z \leq \frac{1}{M} \log c + \frac{\log 2}{N} & (\because \text{各辺を } MN > 0 \text{ で割る。正の数で割っても不等号は保たれる}) \\
\Rightarrow \left| \frac{1}{MN} \log Z - \frac{1}{M} \log c \right| &\leq \frac{\log 2}{N} & (\because \text{上下の評価が中心 } \frac{1}{M} \log c \text{ からの差を } \frac{\log 2}{N} \text{ で挟む。 } \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}$$

右辺は $N \rightarrow \infty$ で 0 に収束する ($\log 2$ は N に依らない定数)。よって主張の極限が存在して値は $\frac{1}{M} \log c(M)$ である。

** この段階では実数解析へ移行していない **: 使ったのは有限個の実数の不等式、 $\log$ の単調性と乗法から加法への変換、および実数列 $(\log 2)/N \rightarrow 0$ だけである。□

定理 13.5 (等間隔点の平均は積分に収束する). 以下では、有界閉区間上の連続実関数は一様連続であることを外部前提として用いる。

また、有界閉区間上の連続実関数の Riemann 可積分性、積分の線型性と区間加法性、定数の積分、および積分の絶対値が区間の長さに関数の絶対値の上限の積以下であることを、積分の基本性質として用いる。

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とし、 $\delta \in [0, 1]$ を固定する (** 周期性は仮定しない **). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対して

$$t_{\mu}^{(M)} := \frac{2\pi(\mu - \delta)}{M} \quad (\mu = 1, \dots, M)$$

とおく。このとき

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M g(t_{\mu}^{(M)}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t) dt$$

が成り立つ。より詳しく、 g の $[0, 2\pi]$ 上の連続度を

$$\omega(h) := \sup \{ |g(s) - g(t)| \mid s, t \in [0, 2\pi], |s - t| \leq h \}$$

とおくと

$$\left| \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M g(t_{\mu}^{(M)}) - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t) dt \right| \leq \omega\left(\frac{2\pi}{M}\right)$$

であり、一様連続性より $\omega(h) \rightarrow 0$ ($h \rightarrow +0$) なので右辺は 0 に収束する。

とくに $\delta = 0$ (整数点 $2\pi\mu/M$) と $\delta = 1/2$ (半整数点 $2\pi(\mu - \frac{1}{2})/M$) のどちらでも、極限は同じ値である。

証明. Step 0 (設定). g は $\mathbb{R}$ 上連続なので、とくに有界閉区間 $[0, 2\pi]$ 上で連続であり、積分の基本性質より $\int_0^{2\pi} g(t) dt$ が定まる。 M を固定し

$$I_{\mu} := \left[\frac{2\pi(\mu - 1)}{M}, \frac{2\pi\mu}{M} \right] \quad (\mu = 1, \dots, M)$$

とおく。これらは $[0, 2\pi]$ を長さ $2\pi/M$ の M 個の区間に分割したものであり、積分の基本性質の区間加法性より

$$\int_0^{2\pi} g(t) dt = \sum_{\mu=1}^M \int_{I_{\mu}} g(t) dt$$

Step 1 (代表点が区間に入ること). $\delta \in [0, 1]$ より $0 \leq 1 - \delta \leq 1$ である。 $2\pi/M > 0$ を用いると、準備として

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{2\pi}{M}(1 - \delta) \quad (\because 0 \leq 1 - \delta \text{ の両辺に正の } 2\pi/M \text{ を掛ける}), \\ \frac{2\pi}{M}(1 - \delta) &\leq \frac{2\pi}{M} \quad (\because 1 - \delta \leq 1 \text{ の両辺に正の } 2\pi/M \text{ を掛ける}) \end{aligned}$$

を得る。これらを使い、代表点の両側を一続きに評価する。

$$\begin{aligned}
\frac{2\pi(\mu-1)}{M} &= \frac{2\pi(\mu-1)}{M} + 0 & (\because \mathbb{R} \text{ の加法単位元}) \\
&\leq \frac{2\pi(\mu-1)}{M} + \frac{2\pi}{M}(1-\delta) & (\because \text{準備の第一の不等式の両辺に } 2\pi(\mu-1)/M \text{ を足す}) \\
&= \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M} & (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\leq \frac{2\pi(\mu-1)}{M} + \frac{2\pi}{M} & (\because \text{準備の第二の不等式の両辺に } 2\pi(\mu-1)/M \text{ を足す}) \\
&= \frac{2\pi\mu}{M} & (\because \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}$$

すなわち $t_\mu^{(M)} \in I_\mu$ 。したがって $t \in I_\mu$ なら $|t - t_\mu^{(M)}| \leq \frac{2\pi}{M}$ (同じ長さ $2\pi/M$ の区間に属する 2 点の距離)。

Step 2 (各区間での誤差)。 μ を固定する。積分の基本性質の定数の積分より $\int_{I_\mu} g(t_\mu^{(M)}) dt = \frac{2\pi}{M} g(t_\mu^{(M)})$ である。各区間での誤差を一続きに評価する。

$$\begin{aligned}
&\left| \int_{I_\mu} g(t) dt - \frac{2\pi}{M} g(t_\mu^{(M)}) \right| \\
&= \left| \int_{I_\mu} g(t) dt - \int_{I_\mu} g(t_\mu^{(M)}) dt \right| & (\because \text{積分の基本性質の定数の積分}) \\
&= \left| \int_{I_\mu} (g(t) - g(t_\mu^{(M)})) dt \right| & (\because \text{積分の線型性}) \\
&\leq \frac{2\pi}{M} \sup_{t \in I_\mu} |g(t) - g(t_\mu^{(M)})| & \left(\because \left| \int_I h \right| \leq |I| \sup_I |h| \right) \\
&\leq \frac{2\pi}{M} \omega\left(\frac{2\pi}{M}\right) & (\because \text{Step 1 と } \omega \text{ の定義}).
\end{aligned}$$

Step 3 (総和)。全区間にわたる誤差を一続きに評価する。

$$\begin{aligned}
&\left| \int_0^{2\pi} g(t) dt - \frac{2\pi}{M} \sum_{\mu=1}^M g(t_\mu^{(M)}) \right| \\
&= \left| \sum_{\mu=1}^M \int_{I_\mu} g(t) dt - \sum_{\mu=1}^M \frac{2\pi}{M} g(t_\mu^{(M)}) \right| & (\because \text{Step 0 の区間加法性}) \\
&= \left| \sum_{\mu=1}^M \left(\int_{I_\mu} g(t) dt - \frac{2\pi}{M} g(t_\mu^{(M)}) \right) \right| & (\because \text{和の差は差の和}) \\
&\leq \sum_{\mu=1}^M \left| \int_{I_\mu} g(t) dt - \frac{2\pi}{M} g(t_\mu^{(M)}) \right| & (\because \text{三角不等式}) \\
&\leq \sum_{\mu=1}^M \frac{2\pi}{M} \omega\left(\frac{2\pi}{M}\right) & (\because \text{Step 2 の評価}) \\
&= 2\pi \omega\left(\frac{2\pi}{M}\right) & (\because \mu \text{ に依らない同一の項の } M \text{ 個の和}).
\end{aligned}$$

両辺を $2\pi > 0$ で割ると statement の評価を得る。

Step 4 (収束)。一様連続性を $[0, 2\pi]$ 上の連続関数 g に適用する。任意の $\epsilon > 0$ に対して $\delta_0 > 0$ が存在して、 $s, t \in [0, 2\pi]$ 、 $|s - t| \leq \delta_0$ なら $|g(s) - g(t)| \leq \epsilon$ である。これは $h \leq \delta_0$ なら $\omega(h) \leq \epsilon$ を意味する。 $M > 2\pi/\delta_0$ なら $2\pi/M < \delta_0$ なので $\omega(2\pi/M) \leq \epsilon$ 。

したがって Step 3 の評価より、 $M > 2\pi/\delta_0$ なる M について

$$\left| \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M g(t_\mu^{(M)}) - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t) dt \right| \leq \epsilon$$

$\epsilon > 0$ は任意だったので、主張の極限が成り立つ。

(証明で g について使ったのは、有界閉区間 $[0, 2\pi]$ 上の連続性だけである。 $\delta = 0$ のとき代表点 $t_M^{(M)} = 2\pi$ は区間 I_M の右端、 $\delta = 1$ のとき $t_1^{(M)} = 0$ は I_1 の左端であり、どちらも $[0, 2\pi]$ に属するので Step 2 の評価がそのまま通る。 $g(2\pi)$ と $g(0)$ を比べる必要はどこにも生じない。) $\square$

定理 13.6 (Onsager の自由エネルギーの表式). $\delta \in [0, 1)$ を固定し、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ について

$$\Theta_M^{(\delta)} := \left\{ \frac{2\pi(\mu - \delta)}{M} \mid \mu = 1, \dots, M \right\}, \quad \Lambda_M^{(\delta)} := (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta_M^{(\delta)}} \gamma(\theta) \right)$$

とおく (主張 10.19 の $\Lambda_{\max}$ は $\delta = 0$ の場合にあたる)。このとき

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(\delta)} = \frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta) d\theta$$

が成り立つ。* 右辺は δ に依らない。* ここで

$$\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh} (\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos \theta)$$

であり (定義 9.20、主張 13.2)、これが Onsager の自由エネルギーの表式である。

証明. $\Lambda := \Lambda_M^{(\delta)}$ の $\log$ を取る。 $2 \sinh 2K_2 > 0$ ($K_2 > 0$) と $\exp$ の正値性より $\Lambda > 0$ なので $\log \Lambda$ が定まり、一続きに

$$\begin{aligned} \log \Lambda_M^{(\delta)} &= \log \left((2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta_M^{(\delta)}} \gamma(\theta) \right) \right) && (\because \Lambda_M^{(\delta)} \text{ の定義}) \\ &= \log \left((2 \sinh 2K_2)^{M/2} \right) + \log \left(\exp \left(\frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta_M^{(\delta)}} \gamma(\theta) \right) \right) && (\because \text{積の対数 } \log(ab) = \log a + \log b) \\ &= \frac{M}{2} \log (2 \sinh 2K_2) + \log \left(\exp \left(\frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta_M^{(\delta)}} \gamma(\theta) \right) \right) && (\because \text{冪の対数 } \log(x^r) = r \log x) \\ &= \frac{M}{2} \log (2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta_M^{(\delta)}} \gamma(\theta) && (\because \log(e^y) = y) \end{aligned}$$

を得る。

ここで集合 $\Theta_M^{(\delta)}$ 上の和を添字 μ についての和に書き換える。写像 $\mu \mapsto \frac{2\pi(\mu - \delta)}{M}$ は $\{1, \dots, M\}$ 上単射である。実際、 $\mu, \nu \in \{1, \dots, M\}$ と $\mu \neq \nu$ を仮定すると、一続きに

$$\begin{aligned} \frac{2\pi(\mu - \delta)}{M} - \frac{2\pi(\nu - \delta)}{M} &= \frac{2\pi(\mu - \nu)}{M} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &\neq 0 \quad \left(\because \frac{2\pi}{M} > 0 \text{ かつ } \mu - \nu \neq 0 \right) \end{aligned}$$

を得る。よって $\Theta_M^{(\delta)}$ はちょうど M 個の元をもち、一続きに

$$\sum_{\theta \in \Theta_M^{(\delta)}} \gamma(\theta) = \sum_{\mu=1}^M \gamma\left(\frac{2\pi(\mu - \delta)}{M}\right) \quad \left(\because \mu \mapsto \frac{2\pi(\mu - \delta)}{M} \text{ は } \{1, \dots, M\} \text{ から } \Theta_M^{(\delta)} \text{ への全単射} \right)$$

を得る。また、 $M > 0$ なので、一続きに

$$\begin{aligned} \frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(\delta)} &= \frac{1}{M} \left(\frac{M}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta_M^{(\delta)}} \gamma(\theta) \right) \quad (\because \text{上で得た } \log \Lambda_M^{(\delta)} \text{ の表示を代入}) \\ &= \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{2M} \sum_{\theta \in \Theta_M^{(\delta)}} \gamma(\theta) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &= \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{2M} \sum_{\mu=1}^M \gamma\left(\frac{2\pi(\mu - \delta)}{M}\right) \quad (\because \text{上で得た添字の取り替え}) \\ &= \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \gamma\left(\frac{2\pi(\mu - \delta)}{M}\right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

第 1 項は M に依らない定数である。第 2 項について、主張 13.3 より γ は $\mathbb{R}$ 上連続であり、 $\delta \in [0, 1) \subset [0, 1]$ なので、定理 13.5 を $g = \gamma$ として適用でき

$$\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \gamma\left(\frac{2\pi(\mu - \delta)}{M}\right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta) d\theta$$

を得る。よって、一続きに

$$\begin{aligned} \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(\delta)} &= \lim_{M \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \gamma\left(\frac{2\pi(\mu - \delta)}{M}\right) \right) \quad (\because \text{上で得た } \frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(\delta)} \text{ の表示を代入}) \\ &= \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \lim_{M \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \gamma\left(\frac{2\pi(\mu - \delta)}{M}\right) \right) \quad (\because \text{収束する実数列に定数を加えた列は収束し、極限に定数が加わる}) \\ &= \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{2} \cdot \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \gamma\left(\frac{2\pi(\mu - \delta)}{M}\right) \quad (\because \text{収束する実数列の定数倍は収束し、極限が定数倍になる}) \\ &= \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta) d\theta \quad (\because \text{上の収束 (等間隔点の平均は積分に収束する)}) \\ &= \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta) d\theta \quad \left(\because \mathbb{R} \text{ の四則 } \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{4\pi} \right) \end{aligned}$$

が成り立ち、主張の式を得る (第 2 行・第 3 行の極限法則が適用できるのは、第 4 行で引いた定理 13.5 の収束が第 2 項の収束を与えるからである)。定理 13.5 の極限が δ に依らないので、右辺も δ に依らない。□

注意 13.7 (厳密解に残っている入力：偶セクターの固有値). ここまでで得られたものを並べると、分配関数から自由エネルギーまでの経路は次のようになっている。

- 主張 11.8 : $Z = \text{tr}((V_1 V_2)^{N_{\text{row}}})$

- 主張 12.13: $c(M)^{N_{\text{row}}} \leq Z \leq 2^M c(M)^{N_{\text{row}}}$
- 主張 13.4: $\frac{1}{MN_{\text{row}}} \log Z \rightarrow \frac{1}{M} \log c(M)$
- 主張 12.17: $c(M) = \max(c_+(M), c_-(M))$
- 定理 13.6: $\frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(\delta)} \rightarrow \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma \quad (\delta \text{ に依らない})$

** 残っている入力は 1 つだけである ** (これは 013 章から 018 章で証明され、定理 19.18 で解消された。最終的な結論は 定理 19.19): $c_+(M)$ (ε の固有値 $+1$ のセクターでの上限) が $\Lambda_M^{(1/2)}$ に等しいこと、すなわち $V^{(+)}$ の固有値が ** 半整数運動量 ** $2\pi(\mu - \frac{1}{2})/M$ で与えられることである。

本文にこれが無い理由は具体的である。定義 5.27 の $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ は第 1 項に符号 $\mp$ を持つ。主張 9.1 の (C) $[H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}] = -2\hat{Y}_\mu$ は、 $[H_2, Z_j] = -2Y_j$ を各項に適用して係数どうしを比べる形で示されるが、 $\hat{Z}_\mu^{(+)}$ では第 1 項の符号だけが反転しているため右辺が $-2\hat{Y}_\mu$ にならない。したがって 008 章以降の議論は $\hat{Z}_\mu^{(-)}$ (整数運動量) に対してのみ成立しており、 $V^{(+)}$ には適用できない。

偶セクターを扱うには、符号を第 1 項に置く代わりに ** 位相に繰り込んだ **

$$\check{Z}_\mu := \sum_{j=1}^M Z_j e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}, \quad \check{Y}_\mu := \sum_{j=1}^M Y_j e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}, \quad \tilde{\theta}_\mu := \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$$

を用いればよい。この $\check{Z}, \check{Y}$ については 主張 9.1 の (A)~(D) が $H_1^{(+)}, H_2$ に対して成り立ち (主張 14.7)、反交換関係の対は $\nu = M + 1 - \mu$ になる (主張 14.8)。** この道筋は 013 章から 018 章で本文として実行済みであり、以降の証明の根拠として使ってよい。 ** 到達点は 定理 19.18 の $c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$ と 定理 19.19 である。

14 偶セクターの半整数運動量モード

注意 14.1 (この章の目的). 注意 13.7 で述べたとおり、Onsager の自由エネルギーを本文で閉じるために残っている入力は 1 つだけである: $V^{(+)}$ の固有値が ** 半整数運動量 ** で与えられること。この章はその土台を据える。

まず 主張 14.2 で、004 章以降の $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ が $(-)$ セクターにしか使えない理由を ** 等式として ** 確定させる。次に、符号を第 1 項に置く代わりに位相へ繰り込んだモード

$$\check{Z}_\mu := \sum_{j=1}^M Z_j e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}, \quad \check{Y}_\mu := \sum_{j=1}^M Y_j e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}, \quad \tilde{\theta}_\mu := \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$$

を導入し、これらが $H_1^{(+)}, H_2$ に対して 主張 9.1 と ** 同じ形 ** の交換関係を満たすこと、および 主張 8.1 に対応する反交換関係を満たすことを示す。

働く仕組みは 1 つの等式に集約される: $e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} = -1$ (** 反周期性 **). $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ では境界の符号を第 1 項に置いていたのに対し、 $\check{Z}$ では位相 $e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}$ が $j = M$ から $j = 0$ へ回るときに自動的に符号を出す。この違いが、 H_2 との交換関係が壊れるか壊れないかを分ける。

** この章で扱うのはここまでである。 ** これらの関係式から $V^{(+)}$ の固有値を導くには、008 章・009 章と同じ道筋 (T_V の作用 $\rightarrow A(\theta)$ の対角化 $\rightarrow$ フェルミオン $\rightarrow V = cV' \rightarrow$ 固有値) を半整数運動量で辿る必要があり、その分量は 008 章と 009 章の合計に相当する。進め方は ‘docs/tasks/free-energy-roadmap/task-dependency-graph.md’ の章 C' に記した。

主張 14.2 (008 章の議論が $(-)$ セクター専用である理由). 定義 5.27 の $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ と 定義 5.8 の H_2 について、 $\mu \in \mathcal{M}$ で

$$\left[H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] = -2\hat{Y}_\mu, \quad \left[H_2, \hat{Z}_\mu^{(+)} \right] = -2\hat{Y}_\mu + 4e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} Y_1$$

が成り立つ。とくに $Y_1 \neq 0$ なので $**[H_2, \hat{Z}_\mu^{(+)}] \neq -2\hat{Y}_\mu**$ である。

主張 9.1 の (C) は $\hat{Z}_\mu^{(-)}$ についての主張であり、008 章以降の議論 (主張 9.2 の (h2.z-) 以下すべて) はこの (C) を土台にしている。したがって $**008$ 章以降は $(-)$ セクター専用であり、 $V^{(+)}$ にはそのまま適用できない。 $**$

証明. Step 1 (サイトごとの交換関係)。 $H_2 = \sum_{m=1}^M Z_m Y_m$ と 主張 7.3 から、 $j \in \{1, \dots, M\}$ について

$$[H_2, Z_j] = -2Y_j$$

を示す。 $m \neq j$ の項について、主張 7.3 より $Z_m Z_j = -Z_j Z_m$ 、 $Y_m Z_j = -Z_j Y_m$ なので

$$\begin{aligned} (Z_m Y_m) Z_j &= Z_m (Y_m Z_j) & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= Z_m (-Z_j Y_m) & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (m \neq j)) \\ &= -(Z_m Z_j) Y_m & (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\ &= -(-Z_j Z_m) Y_m & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (m \neq j)) \\ &= Z_j (Z_m Y_m) & (\because -(-1) = 1 \text{ の符号の消去と行列の積の結合法則}) \end{aligned}$$

すなわち $[Z_m Y_m, Z_j] = 0$ (符号が 2 回反転して戻る)。 $m = j$ の項は、 $Y_j Z_j = -Z_j Y_j$ と $Z_j Z_j = I$ (主張 7.3 で $\mu = \nu = j$ とすると $2Z_j^2 = 2I$) より

$$\begin{aligned} [Z_j Y_j, Z_j] &= (Z_j Y_j) Z_j - Z_j (Z_j Y_j) & (\because \text{交換子の定義}) \\ &= Z_j (Y_j Z_j) - (Z_j Z_j) Y_j & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= Z_j (-Z_j Y_j) - (Z_j Z_j) Y_j & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Y_j Z_j = -Z_j Y_j)) \\ &= -(Z_j Z_j) Y_j - (Z_j Z_j) Y_j & (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\ &= -I Y_j - I Y_j & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Z_j Z_j = I)) \\ &= -2Y_j & (\because I Y_j = Y_j (\text{単位行列}) \text{ と同じ行列の和}) \end{aligned}$$

交換子は第 2 引数について線型なので、和をとって $[H_2, Z_j] = -2Y_j$ 。

Step 2 ($(-)$ の場合)。定義 5.27 より $\hat{Z}_\mu^{(-)} = \sum_{j=1}^M Z_j e^{-i\frac{2\pi j\mu}{M}}$ ($j = 1$ の係数は $-(-1) = +1$) である。交換子の線型性と Step 1 より

$$\begin{aligned} \left[H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)} \right] &= \left[H_2, \sum_{j=1}^M e^{-i\frac{2\pi j\mu}{M}} Z_j \right] & (\because \text{def_hatZ_hatY}) \\ &= \sum_{j=1}^M e^{-i\frac{2\pi j\mu}{M}} [H_2, Z_j] & (\because \text{交換子の第 2 引数についての C 線型性}) \\ &= \sum_{j=1}^M e^{-i\frac{2\pi j\mu}{M}} (-2Y_j) & (\because \text{Step 1}) \\ &= -2 \sum_{j=1}^M e^{-i\frac{2\pi j\mu}{M}} Y_j & (\because \text{スカラー倍を有限和の外へ出す (分配律)}) \\ &= -2\hat{Y}_\mu & (\because \text{def_hatZ_hatY}) \end{aligned}$$

(最初と最後の等号で使ったのは 定義 5.27 の $\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu$ の定義である。)

Step 3 ((+) の場合)。定義 5.27 より $\hat{Z}_\mu^{(+)}$ は $j = 1$ の係数だけが -1 なので

$$\hat{Z}_\mu^{(+)} = \hat{Z}_\mu^{(-)} - 2e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} Z_1$$

($j = 1$ の係数が $+1$ から -1 へ変わる分を引いた)。交換子の線型性と Step 1・Step 2 より

$$\begin{aligned} [H_2, \hat{Z}_\mu^{(+)}] &= [H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)} - 2e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} Z_1] && (\because \text{直前の displayMath}) \\ &= [H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}] - 2e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} [H_2, Z_1] && (\because \text{交換子の第 2 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\ &= -2\hat{Y}_\mu - 2e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} [H_2, Z_1] && (\because \text{Step 2}) \\ &= -2\hat{Y}_\mu - 2e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} (-2Y_1) && (\because \text{Step 1 を } j = 1 \text{ に適用}) \\ &= -2\hat{Y}_\mu + 4e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} Y_1 && (\because (-2) \cdot (-2) = 4 \text{ のスカラーの計算}) \end{aligned}$$

Step 4 ($Y_1 \neq 0$)。定義 5.8 より $Y_1 = \sigma_1^y$ であり、主張 7.1 の $\sigma^y \sigma^y = I$ より Y_1 は可逆、とくに $Y_1 \neq 0$ 。また $e^{-i2\pi\mu/M} \neq 0$ なので $4e^{-i2\pi\mu/M} Y_1 \neq 0$ であり、2 つの交換子は一致しない。□

主張 14.3 (半整数運動量の指数和)。 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、 $\mu \in \mathbb{Z}$ について

$$\tilde{\theta}_\mu := \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M} \in \mathbb{R}$$

とおく (ここで $\mu \in \mathbb{Z}$ としているのは ** 記号 $\tilde{\theta}_\mu$ の定義域 ** であって、主張を述べる添字の範囲ではない。主張の範囲は 定義 14.5 で $\tilde{M} = \{1, \dots, M\}$ に絞る。下の指数和も μ を 1 から M まで、すなわち $\tilde{M}$ 全体にわたって取っている)。このとき $k \in \mathbb{Z}$ について

$$\sum_{\mu=1}^M e^{ik\tilde{\theta}_\mu} = \begin{cases} M(-1)^l & (k = lM, l \in \mathbb{Z}) \\ 0 & (k \not\equiv 0 \pmod{M}) \end{cases}$$

とくに $|k| < M$ かつ $k \neq 0$ なら和は 0、 $k = 0$ なら M である。

証明. $\tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi\mu}{M} - \frac{\pi}{M}$ である。以下、指数法則 $e^{z+w} = e^z e^w$ ($z, w \in \mathbb{C}$) としては 定理 4.5 を $n = 1$ すなわち $\text{Mat}(1, \mathbb{C}) = \mathbb{C}$ に適用したものを使う ($\mathbb{C}$ の積は可換なので仮定は満たされる)。これより

$$\begin{aligned} \sum_{\mu=1}^M e^{ik\tilde{\theta}_\mu} &= \sum_{\mu=1}^M e^{ik(\frac{2\pi\mu}{M} - \frac{\pi}{M})} && (\because \tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi\mu}{M} - \frac{\pi}{M}) \\ &= \sum_{\mu=1}^M e^{i\frac{2\pi\mu k}{M}} e^{-i\frac{\pi k}{M}} && (\because \text{theorem_exp_product } (n = 1)) \\ &= e^{-i\frac{\pi k}{M}} \sum_{\mu=1}^M e^{i\frac{2\pi\mu k}{M}} && (\because \text{有限和から } \mu \text{ に依らない因子をくくり出す (分配律)}) \end{aligned}$$

主張 5.26 より右端の和は $M\delta_{(k,0)}^M$ である (定義 5.25)。

$k \not\equiv 0 \pmod{M}$ のときは $\delta_{(k,0)}^M = 0$ なので和は 0。

$k = lM$ ($l \in \mathbb{Z}$) のときは $\delta_{(k,0)}^M = 1$ であり、前因子は

$$\begin{aligned}
e^{-i\frac{\pi k}{M}} &= e^{-i\frac{\pi lM}{M}} & (\because k = lM) \\
&= e^{-i\pi l} & (\because M \geq 2 \text{ なので } M \neq 0, \text{ 分数の約分}) \\
&= \cos(\pi l) - i \sin(\pi l) & (\because \text{euler_formula_cos_sin}) \\
&= (-1)^l & (\because l \in \mathbb{Z} \text{ に対し } \cos(\pi l) = (-1)^l, \sin(\pi l) = 0)
\end{aligned}$$

($e^{-i\pi l} = \cos(\pi l) - i \sin(\pi l)$ は 定理 1.54 による。) よって和は $M(-1)^l$ 。 $\square$

定義 14.4 ($\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ (半整数運動量モード)). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}, \mu \in \mathbb{Z}$ とし、主張 14.3 の $\tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$ を用いて

$$\check{Z}_\mu := \sum_{j=1}^M Z_j e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}, \quad \check{Y}_\mu := \sum_{j=1}^M Y_j e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める (Z_j, Y_j は 定義 5.8 のもの)。定義 5.27 の $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ と違い、** 係数に例外項が無い ** (すべての j で係数は $e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}$)。

** 定義域を $\mu \in \mathbb{Z}$ としているのは、下の (2) (添字の周期性) を述べるためである。* 主張を述べる添字の範囲は 定義 14.5 の $\check{M} = \{1, \dots, M\}$ に絞る。以降 $\mu \in \mathbb{Z}$ 全体で述べるのは、この (2) と 主張 17.3 の 2 つだけである。

次の 3 つの性質を後で繰り返し使う。

- (1) 反周期性: $e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} = -1$
- (2) 添字の周期性: $\check{Z}_{\mu+M} = \check{Z}_\mu, \quad \check{Y}_{\mu+M} = \check{Y}_\mu$
- (3) 共役添字: $\tilde{\theta}_{1-\mu} = -\tilde{\theta}_\mu$

証明. (1) まず指数の角度を計算する。

$$\begin{aligned}
M\tilde{\theta}_\mu &= 2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right) & (\because \tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi}{M}\left(\mu - \frac{1}{2}\right)) \\
&= 2\pi\mu - \pi & (\because \mathbb{R} \text{ の分配則})
\end{aligned}$$

この等式と 定理 1.54 より

$$\begin{aligned}
e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} &= e^{-i(2\pi\mu - \pi)} & (\because M\tilde{\theta}_\mu = 2\pi\mu - \pi) \\
&= e^{-2\pi i\mu} e^{i\pi} & (\because \text{定理 4.5 } (n=1)) \\
&= (\cos(2\pi\mu) - i \sin(2\pi\mu)) (\cos \pi + i \sin \pi) & (\because \text{定理 1.54 を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= (1 - i \cdot 0) (-1 + i \cdot 0) & (\because \cos(2\pi\mu) = 1, \sin(2\pi\mu) = 0, \cos \pi = -1, \sin \pi = 0 \text{ } (\mu \in \mathbb{Z})) \\
&= 1 \cdot (-1) & (\because i \cdot 0 = 0 \text{ と加法の単位元}) \\
&= -1 & (\because \text{積の単位元})
\end{aligned}$$

(2) まず添字をずらした角度を計算する。

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{\mu+M} &= \frac{2\pi\left(\mu + M - \frac{1}{2}\right)}{M} & (\because \tilde{\theta}_\mu \text{ の定義に } \mu + M \text{ を代入}) \\
&= \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right) + 2\pi M}{M} & (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\
&= \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M} + 2\pi & (\because \mathbb{R} \text{ の分数の加法と } \frac{2\pi M}{M} = 2\pi) \\
&= \tilde{\theta}_\mu + 2\pi & (\because \tilde{\theta}_\mu \text{ の定義})
\end{aligned}$$

$j \in \mathbb{Z}$ について

$$\begin{aligned}
e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu+M}} &= e^{-ij(\tilde{\theta}_{\mu}+2\pi)} & (\because \tilde{\theta}_{\mu+M} = \tilde{\theta}_{\mu} + 2\pi) \\
&= e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}} e^{-2\pi ij} & (\because \text{定理 4.5 } (n=1)) \\
&= e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}} (\cos(2\pi j) - i \sin(2\pi j)) & (\because \text{定理 1.54}) \\
&= e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}} & (\because j \in \mathbb{Z} \text{ より } \cos(2\pi j) = 1, \sin(2\pi j) = 0)
\end{aligned}$$

係数がすべて一致するので、一続きに

$$\begin{aligned}
\check{Z}_{\mu+M} &= \sum_{j=1}^M Z_j e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu+M}} & (\because \check{Z}_{\mu+M} \text{ の定義}) \\
&= \sum_{j=1}^M Z_j e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}} & (\because \text{上で得た } e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu+M}} = e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}} \text{ を全項へ同時適用}) \\
&= \check{Z}_{\mu} & (\because \check{Z}_{\mu} \text{ の定義}), \\
\check{Y}_{\mu+M} &= \sum_{j=1}^M Y_j e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu+M}} & (\because \check{Y}_{\mu+M} \text{ の定義}) \\
&= \sum_{j=1}^M Y_j e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}} & (\because \text{上で得た } e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu+M}} = e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}} \text{ を全項へ同時適用}) \\
&= \check{Y}_{\mu} & (\because \check{Y}_{\mu} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

(3) 共役添字について、一続きに

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{1-\mu} &= \frac{2\pi(1-\mu-\frac{1}{2})}{M} & (\because \tilde{\theta}_{1-\mu} \text{ の定義}) \\
&= \frac{2\pi(\frac{1}{2}-\mu)}{M} & (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= -\frac{2\pi(\mu-\frac{1}{2})}{M} & (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= -\tilde{\theta}_{\mu} & (\because \tilde{\theta}_{\mu} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

□

定義 14.5 ($\check{\mathcal{M}}$ (半整数運動量の添字集合)). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 14.4 の $\tilde{\theta}_{\mu}$ ($\mu \in \mathbb{Z}$ について定義されている) を用いる。

$$\check{\mathcal{M}} := \{1, 2, \dots, M\} \subset \mathbb{Z}$$

と定める。008 章で整数運動量の添字集合が 定義 5.27 の $\mathcal{M} = \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ だったのに対応する、** 半整数運動量側の添字集合 ** である。

** 以降、013 章から 017 章までのすべての主張は $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ について述べる。 ** $\mu \in \mathbb{Z}$ 全体で述べるのは、記号 $\tilde{\theta}_{\mu}, \check{Z}_{\mu}, \check{Y}_{\mu}, \check{\psi}_{\mu}$ の ** 定義域 ** と、添字の周期性を述べる 2 つの主張 定義 14.4 (2) と 主張 17.3 だけである。これら 2 つは、計算の途中で $\check{\mathcal{M}}$ の外に現れた添字を $\check{\mathcal{M}}$ の中へ引き戻すための橋渡しなので、 $\mathbb{Z}$ で述べる必要がある。

次の 5 つの性質を後で繰り返し使う。

- (1) 相異なる M 個の運動量： $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}, \mu \neq \nu \implies \tilde{\theta}_{\mu} \neq \tilde{\theta}_{\nu}, \quad 0 < \tilde{\theta}_{\mu} < 2\pi$
- (2) 共役添字の閉性： $\mu \in \check{\mathcal{M}} \implies M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$

- (3) 共役添字の言い換え： $(M+1-\mu) - (1-\mu) = M$, すなわち $1-\mu \equiv M+1-\mu \pmod{M}$
- (4) 自己共役点： $\mu \in \check{M}$, $M+1-\mu = \mu \iff M$ が奇数かつ $\mu = \frac{M+1}{2}$ 。このとき $\tilde{\theta}_\mu = \pi$ 。
- (5) 対の判定： $\mu, \nu \in \check{M} \implies (\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}) \iff \nu = M+1-\mu$ 。したがって $\mu, \nu \in \check{M}$ では $\delta_{(\mu+\nu, 1)}^M = \delta_{\nu, M+1-\mu}$ である（右辺は通常のクロネッカーのデルタ、すなわち $\nu = M+1-\mu$ のとき 1、そうでないとき 0）。

(5) は、 $\check{M}$ へ範囲を絞ったことで ** 合同式が消える ** ことを述べている。主張 14.8 以降で対を指定するのに合同式が要らなくなるのはこのためである。

証明. (1) 主張 14.3 より $\tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$ である。

$$\begin{aligned}\tilde{\theta}_\nu - \tilde{\theta}_\mu &= \frac{2\pi(\nu - \frac{1}{2})}{M} - \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M} \quad (\because \text{主張 14.3 の } \tilde{\theta} \text{ の定義}) \\ &= \frac{2\pi}{M}(\nu - \mu) \quad (\because \text{通分と分配法則})\end{aligned}$$

であり $\frac{2\pi}{M} > 0$ なので、 $\mu \neq \nu$ なら $\tilde{\theta}_\mu \neq \tilde{\theta}_\nu$ 。また同じ式は $\mu \mapsto \tilde{\theta}_\mu$ が狭義単調増加であることを与えるので、 $1 \leq \mu \leq M$ では

$$\begin{aligned}\tilde{\theta}_1 &= \frac{2\pi(1 - \frac{1}{2})}{M} \quad (\because \text{主張 14.3 の } \tilde{\theta} \text{ の定義}) \\ &= \frac{\pi}{M} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &\leq \tilde{\theta}_\mu \quad (\because 1 \leq \mu \text{ と } \mu \mapsto \tilde{\theta}_\mu \text{ の単調増加}) \\ &\leq \tilde{\theta}_M \quad (\because \mu \leq M \text{ と } \mu \mapsto \tilde{\theta}_\mu \text{ の単調増加}) \\ &= \frac{2\pi(M - \frac{1}{2})}{M} \quad (\because \text{主張 14.3 の } \tilde{\theta} \text{ の定義}) \\ &= 2\pi - \frac{\pi}{M} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\end{aligned}$$

であり、 $M \geq 2$ より $0 < \frac{\pi}{M}$ かつ $2\pi - \frac{\pi}{M} < 2\pi$ なので $0 < \tilde{\theta}_\mu < 2\pi$ 。

(2) $1 \leq \mu \leq M$ の各辺に -1 を掛けると $-M \leq -\mu \leq -1$ 、さらに $M+1$ を足すと $1 \leq M+1-\mu \leq M$ 。 $M+1-\mu \in \mathbb{Z}$ なので $M+1-\mu \in \check{M}$ 。

(3) $(M+1-\mu) - (1-\mu) = M$ は展開するだけである。定義 5.25 の合同の意味により、差が M の倍数であることが $1-\mu \equiv M+1-\mu \pmod{M}$ である。

(4) $M+1-\mu = \mu$ は $M+1 = 2\mu$ と同値であり、これは $\mu = \frac{M+1}{2}$ と同値である。 $\mu \in \mathbb{Z}$ なので $M+1$ は偶数、すなわち M は奇数でなければならない。逆に M が奇数なら $\frac{M+1}{2} \in \mathbb{Z}$ であり、 $M \geq 2$ と併せて $1 \leq \frac{M+1}{2} \leq M$ （右の不等式は $M+1 \leq 2M \iff 1 \leq M$ ）なので $\frac{M+1}{2} \in \check{M}$ 。このとき

$$\begin{aligned}\tilde{\theta}_{\frac{M+1}{2}} &= \frac{2\pi(\frac{M+1}{2} - \frac{1}{2})}{M} \quad (\because \text{主張 14.3 の } \tilde{\theta} \text{ の定義}) \\ &= \frac{2\pi \cdot \frac{M}{2}}{M} \quad (\because \frac{M+1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{M}{2}) \\ &= \pi \quad (\because \text{約分})\end{aligned}$$

(5) $(\Leftarrow) \nu = M+1-\mu$ なら $\mu + \nu = M+1$ なので $(\mu + \nu) - 1 = M$ 、すなわち $\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}$ 。

($\Rightarrow$) $1 \leq \mu \leq M$ と $1 \leq \nu \leq M$ を足すと $2 \leq \mu + \nu \leq 2M$ 、よって $1 \leq \mu + \nu - 1 \leq 2M - 1$ 。仮定 $\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}$ は $\mu + \nu - 1$ が M の倍数であることを意味する (定義 5.25 の合同の意味)。

M の倍数 lM ($l \in \mathbb{Z}$) が $1 \leq lM \leq 2M - 1$ を満たすのは $l = 1$ のときに限る ($l \leq 0$ なら $lM \leq 0 < 1$ 、 $l \geq 2$ なら $lM \geq 2M > 2M - 1$)。よって $\mu + \nu - 1 = M$ すなわち $\nu = M + 1 - \mu$ 。

デルタの等式は、定義 5.25 より $\delta_{(\mu+\nu, 1)}^M = 1 \iff \mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}$ であり、いま示した同値によりこれが $\nu = M + 1 - \mu$ と同値だからである。□

主張 14.6 ($\check{\mathcal{M}}$ の内側で共役添字を取る). $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について

- (1) $\tilde{\theta}_{M+1-\mu} = 2\pi - \tilde{\theta}_\mu$
- (2) $e^{-ij\tilde{\theta}_{M+1-\mu}} = e^{ij\tilde{\theta}_\mu} \quad (j \in \mathbb{Z})$
- (3) $\check{Z}_{M+1-\mu} = \check{Z}_{1-\mu}, \quad \check{Y}_{M+1-\mu} = \check{Y}_{1-\mu}$

が成り立つ。とくに (3) により、定義 14.4 (3) の共役添字 $1 - \mu$ (これは $\mu \geq 2$ では $\check{\mathcal{M}}$ の外に出る) を、つねに $\check{\mathcal{M}}$ の元である $M + 1 - \mu$ で置き換えてよい。*013 章から 017 章では以降つねにそうする。*

(2) は定義 14.4 (3) の $\tilde{\theta}_{1-\mu} = -\tilde{\theta}_\mu$ が果たしていた役割を、 $\check{\mathcal{M}}$ の内側で果たす (位相としては $\tilde{\theta}_{M+1-\mu}$ は $-\tilde{\theta}_\mu$ と 2π しか変わらない)。

証明. (1) 主張 14.3 の $\tilde{\theta}$ の定義より

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}_{M+1-\mu} &= \frac{2\pi(M+1-\mu-\frac{1}{2})}{M} \quad (\because \text{主張 14.3 の } \tilde{\theta} \text{ の定義}) \\ &= \frac{2\pi(M-(\mu-\frac{1}{2}))}{M} \quad (\because M+1-\mu-\frac{1}{2} = M-(\mu-\frac{1}{2})) \\ &= 2\pi - \frac{2\pi(\mu-\frac{1}{2})}{M} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\ &= 2\pi - \tilde{\theta}_\mu \quad (\because \text{主張 14.3 の } \tilde{\theta} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

(2) $j \in \mathbb{Z}$ について、(1) と指数法則より

$$\begin{aligned} e^{-ij\tilde{\theta}_{M+1-\mu}} &= e^{-ij(2\pi-\tilde{\theta}_\mu)} \quad (\because \text{直前の (1)}) \\ &= e^{-2\pi ij} e^{ij\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{定理 4.5 } (n=1)) \\ &= (\cos(2\pi j) - i\sin(2\pi j)) e^{ij\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{定理 1.54}) \\ &= e^{ij\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because j \in \mathbb{Z} \text{ より } \cos(2\pi j) = 1, \sin(2\pi j) = 0) \end{aligned}$$

ここで指数法則の $n = 1$ は $\text{Mat}(1, \mathbb{C}) = \mathbb{C}$ における適用である。

(3) 定義 14.4 (2) (添字の周期性) を添字 $1 - \mu \in \mathbb{Z}$ に適用すると

$$\begin{aligned} \check{Z}_{M+1-\mu} &= \check{Z}_{(1-\mu)+M} \quad (\because (1-\mu) + M = M+1-\mu) \\ &= \check{Z}_{1-\mu} \quad (\because \text{定義 14.4 (2)}), \\ \check{Y}_{M+1-\mu} &= \check{Y}_{(1-\mu)+M} \quad (\because (1-\mu) + M = M+1-\mu) \\ &= \check{Y}_{1-\mu} \quad (\because \text{定義 14.4 (2)}). \end{aligned}$$

この適用では、添字の周期性を $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字 $1 - \mu$ に用いている。添字の周期性を $\mu \in \mathbb{Z}$ で述べたことが、この橋渡しを可能にする。□

主張 14.7 ($H_1^{(+)}, H_2$ と $\check{Z}, \check{Y}$ の交換関係). $\mu \in \check{M}$ (定義 14.5) について ($H_1^{(+)}$ は 定義 5.24 の $H_1^{(\pm)}$ で上の符号を取ったもの、すなわち $H_1^{(+)} = Y_1 Z_2 + \cdots + Y_{M-1} Z_M - Y_M Z_1$)、

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad [H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu] &= 2 e^{-i\tilde{\theta}_\mu} \check{Y}_\mu, & \text{(B)} \quad [H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu] &= -2 e^{i\tilde{\theta}_\mu} \check{Z}_\mu, \\ \text{(C)} \quad [H_2, \check{Z}_\mu] &= -2 \check{Y}_\mu, & \text{(D)} \quad [H_2, \check{Y}_\mu] &= 2 \check{Z}_\mu \end{aligned}$$

が成り立つ。これは 主張 9.1 の (A)~(D) と ** 同じ形 ** であり、 θ_μ が $\tilde{\theta}_\mu$ に、 $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu$ が $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ に置き換わっただけである。

証明. Step 1 (サイトごとの交換関係)。主張 7.3 の関係式 (相異なる添字の Z, Y は反可換、同じ添字では $Z_j Z_j = Y_j Y_j = I$ かつ $Z_j Y_j = -Y_j Z_j$) から、次を示す。

$$\begin{aligned} [H_2, Z_j] &= -2Y_j, & [H_2, Y_j] &= 2Z_j, \\ [H_1^{(+)}, Z_j] &= 2Y_{j-1}^b, & [H_1^{(+)}, Y_j] &= -2Z_{j+1}^b \end{aligned}$$

ここで ** 反周期的な延長 **

$$Y_0^b := -Y_M, \quad Y_j^b := Y_j \ (1 \leq j \leq M), \quad Z_{M+1}^b := -Z_1, \quad Z_j^b := Z_j \ (1 \leq j \leq M)$$

を用いた (定義 5.8 の $Z_{M+1} := Z_1$ という ** 周期的 ** な規約とは符号が逆である点に注意)。

$[H_2, Z_j] = -2Y_j$ は 主張 14.2 の Step 1 で示した。 $[H_2, Y_j] = 2Z_j$ も同様に、 $m \neq j$ の項は 2 回の符号反転で消え、 $m = j$ の項は

$$\begin{aligned} [Z_j Y_j, Y_j] &= (Z_j Y_j) Y_j - Y_j (Z_j Y_j) \quad (\because \text{交換子の定義}) \\ &= Z_j (Y_j Y_j) - (Y_j Z_j) Y_j \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= Z_j I - (Y_j Z_j) Y_j \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Y_j Y_j = I)) \\ &= Z_j - (-Z_j Y_j) Y_j \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Y_j Z_j = -Z_j Y_j)) \\ &= Z_j + Z_j (Y_j Y_j) \quad (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\ &= Z_j + Z_j I \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Y_j Y_j = I)) \\ &= Z_j + Z_j \quad (\because \text{単位行列の性質 } Z_j I = Z_j) \\ &= 2Z_j \quad (\because \text{同類項をまとめる}) \end{aligned}$$

($Y_j Y_j = I$ と $Y_j Z_j = -Z_j Y_j$ はいずれも 主張 7.3 による。)

$H_1^{(+)}$ については、各項 $Y_m Z_{m+1}$ ($1 \leq m \leq M-1$) と境界項 $-Y_M Z_1$ を個別に見る。 $Y_m Z_{m+1}$ と Z_j について、 $j \neq m+1$ なら Z_j は Y_m とも Z_{m+1} とも反可換なので 2 回の符号反転で可換になり交換子は 0。 $j = m+1$ なら

$$\begin{aligned} [Y_m Z_{m+1}, Z_{m+1}] &= (Y_m Z_{m+1}) Z_{m+1} - Z_{m+1} (Y_m Z_{m+1}) \quad (\because \text{交換子の定義}) \\ &= Y_m (Z_{m+1} Z_{m+1}) - (Z_{m+1} Y_m) Z_{m+1} \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= Y_m I - (Z_{m+1} Y_m) Z_{m+1} \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Z_{m+1} Z_{m+1} = I)) \\ &= Y_m - (-Y_m Z_{m+1}) Z_{m+1} \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Z_{m+1} Y_m = -Y_m Z_{m+1})) \\ &= Y_m + Y_m (Z_{m+1} Z_{m+1}) \quad (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\ &= Y_m + Y_m I \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Z_{m+1} Z_{m+1} = I)) \\ &= Y_m + Y_m \quad (\because \text{単位行列の性質 } Y_m I = Y_m) \\ &= 2Y_m \quad (\because \text{同類項をまとめる}) \end{aligned}$$

($Z_{m+1} Z_{m+1} = I$ と $Z_{m+1} Y_m = -Y_m Z_{m+1}$ はいずれも 主張 7.3 による。) したがって $2 \leq j \leq M$ では $m = j-1$ の項だけが残って $[H_1^{(+)}, Z_j] = 2Y_{j-1}$ 。 $j = 1$ では境界項だけが残る

$$\begin{aligned}
[-Y_M Z_1, Z_1] &= -[Y_M Z_1, Z_1] & (\because \text{交換子の第 1 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= -((Y_M Z_1) Z_1 - Z_1 (Y_M Z_1)) & (\because \text{交換子の定義}) \\
&= -(Y_M (Z_1 Z_1) - (Z_1 Y_M) Z_1) & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= -(Y_M I - (Z_1 Y_M) Z_1) & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Z_1 Z_1 = I)) \\
&= -(Y_M - (-Y_M Z_1) Z_1) & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Z_1 Y_M = -Y_M Z_1)) \\
&= -(Y_M + Y_M (Z_1 Z_1)) & (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -(Y_M + Y_M I) & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Z_1 Z_1 = I)) \\
&= -(Y_M + Y_M) & (\because \text{単位行列の性質 } Y_M I = Y_M) \\
&= -2Y_M & (\because \text{同類項をまとめる}) \\
&= 2(-Y_M) & (\because \text{スカラー倍の符号の整理 } -2Y_M = 2(-Y_M)) \\
&= 2Y_0^\flat & (\because Y_0^\flat := -Y_M)
\end{aligned}$$

であるから、両方の場合が $[H_1^{(+)}, Z_j] = 2Y_{j-1}^\flat$ にまとまる。

同様に $Y_m Z_{m+1}$ と Y_j については $j = m$ の項だけが残る

$$\begin{aligned}
[Y_m Z_{m+1}, Y_m] &= (Y_m Z_{m+1}) Y_m - Y_m (Y_m Z_{m+1}) & (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Y_m (Z_{m+1} Y_m) - (Y_m Y_m) Z_{m+1} & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Y_m (-Y_m Z_{m+1}) - (Y_m Y_m) Z_{m+1} & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Z_{m+1} Y_m = -Y_m Z_{m+1})) \\
&= -(Y_m Y_m) Z_{m+1} - (Y_m Y_m) Z_{m+1} & (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -I Z_{m+1} - I Z_{m+1} & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Y_m Y_m = I)) \\
&= -2Z_{m+1} & (\because \text{単位行列の性質 } I Z_{m+1} = Z_{m+1} \text{ と同類項をまとめる})
\end{aligned}$$

(用いた関係式はいずれも 主張 7.3 による。) なので $1 \leq j \leq M-1$ では $[H_1^{(+)}, Y_j] = -2Z_{j+1}$ 。
 $j = M$ では境界項だけが残る

$$\begin{aligned}
[-Y_M Z_1, Y_M] &= -[Y_M Z_1, Y_M] & (\because \text{交換子の第 1 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= -((Y_M Z_1) Y_M - Y_M (Y_M Z_1)) & (\because \text{交換子の定義}) \\
&= -(Y_M (Z_1 Y_M) - (Y_M Y_M) Z_1) & (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= -(Y_M (-Y_M Z_1) - (Y_M Y_M) Z_1) & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Z_1 Y_M = -Y_M Z_1)) \\
&= -(-(Y_M Y_M) Z_1 - (Y_M Y_M) Z_1) & (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -(-I Z_1 - I Z_1) & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (Y_M Y_M = I)) \\
&= -(-Z_1 - Z_1) & (\because \text{単位行列の性質 } I Z_1 = Z_1) \\
&= -(-2Z_1) & (\because \text{同類項をまとめる}) \\
&= 2Z_1 & (\because \text{スカラー倍の符号の整理 } -(-2Z_1) = 2Z_1) \\
&= -2(-Z_1) & (\because \text{スカラー倍の符号の整理 } 2Z_1 = -2(-Z_1)) \\
&= -2Z_{M+1}^\flat & (\because Z_{M+1}^\flat := -Z_1)
\end{aligned}$$

であるから $[H_1^{(+)}, Y_j] = -2Z_{j+1}^\flat$ にまとまる。

Step 2 ((C)(D))。交換子は第 2 引数について $\mathbb{C}$ 線型なので、Step 1 の第 1 式と 定義 14.4 より

$$\begin{aligned}
[H_2, \check{Z}_\mu] &= \left[H_2, \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j \right] \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} [H_2, Z_j] \quad (\because \text{交換子の第 2 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} (-2Y_j) \quad (\because \text{Step 1 の第 1 式}) \\
&= -2 \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Y_j \\
&= -2\check{Y}_\mu \quad (\because \text{def_half_integer_modes})
\end{aligned}$$

(最初と最後の等号は 定義 14.4 の $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の定義による。) Step 1 の第 2 式 $[H_2, Y_j] = 2Z_j$ からも、一続きに

$$\begin{aligned}
[H_2, \check{Y}_\mu] &= \left[H_2, \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Y_j \right] \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} [H_2, Y_j] \quad (\because \text{交換子の第 2 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \cdot 2Z_j \quad (\because \text{Step 1 の第 2 式}) \\
&= 2 \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j \quad (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す}) \\
&= 2\check{Z}_\mu \quad (\because \text{def_half_integer_modes})
\end{aligned}$$

を得る。

Step 3 ((A))。主計算に先立ち、添字を $l := j - 1$ と置き換える ($j = 1, \dots, M$ が $l = 0, \dots, M - 1$ に 1 対 1 で対応する)。また、定義 14.4 (1) の $e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} = -1$ と $Y_0^\flat = -Y_M$ より、境界の二項は一続きに

$$\begin{aligned}
e^{-i \cdot 0 \cdot \tilde{\theta}_\mu} Y_0^\flat &= 1 \cdot Y_0^\flat \quad (\because e^0 = 1) \\
&= 1 \cdot (-Y_M) \quad (\because Y_0^\flat := -Y_M) \\
&= (-1) Y_M \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} Y_M \quad (\because \text{def_half_integer_modes (1)}) \\
&= e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} Y_M^\flat \quad (\because Y_M^\flat := Y_M \text{ (} 1 \leq M \leq M \text{)})
\end{aligned}$$

となる。この境界項の等式と Step 1 の第 3 式、交換子の線型性を使うと、主張の左辺から一続きに

$$\begin{aligned}
[H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu] &= \left[H_1^{(+)}, \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j \right] \quad (\because \text{定義 14.4}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} [H_1^{(+)}, Z_j] \quad (\because \text{交換子の第 2 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \cdot 2Y_{j-1}^\flat \quad (\because \text{Step 1 の第 3 式}) \\
&= 2 \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Y_{j-1}^\flat \quad (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す}) \\
&= 2 \sum_{l=0}^{M-1} e^{-i(l+1)\tilde{\theta}_\mu} Y_l^\flat \quad (\because \text{有限和の添字の付け替え } l = j - 1) \\
&= 2 \sum_{l=0}^{M-1} e^{-i\tilde{\theta}_\mu} e^{-il\tilde{\theta}_\mu} Y_l^\flat \quad (\because \text{定理 4.5 } (n = 1)) \\
&= 2 e^{-i\tilde{\theta}_\mu} \sum_{l=0}^{M-1} e^{-il\tilde{\theta}_\mu} Y_l^\flat \quad (\because \text{分配則}) \\
&= 2 e^{-i\tilde{\theta}_\mu} \sum_{l=1}^M e^{-il\tilde{\theta}_\mu} Y_l^\flat \quad (\because \text{直前の displayMath による } l = 0 \text{ の項と } l = M \text{ の項の入れ替え}) \\
&= 2 e^{-i\tilde{\theta}_\mu} \sum_{l=1}^M e^{-il\tilde{\theta}_\mu} Y_l \quad (\because 1 \leq l \leq M \text{ では } Y_l^\flat = Y_l) \\
&= 2 e^{-i\tilde{\theta}_\mu} \check{Y}_\mu \quad (\because \text{定義 14.4})
\end{aligned}$$

Step 4 ((B)). 主計算に先立ち、添字を $l := j+1$ と置き換える ($j = 1, \dots, M$ が $l = 2, \dots, M+1$ に 1 対 1 で対応する)。また、定義 14.4 (1) の $e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} = -1$ と $Z_{M+1}^\flat = -Z_1$ より、境界の二項は一続きに

$$\begin{aligned}
e^{-i(M+1)\tilde{\theta}_\mu} Z_{M+1}^\flat &= e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} e^{-i\tilde{\theta}_\mu} Z_{M+1}^\flat \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n = 1)) \\
&= e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} e^{-i\tilde{\theta}_\mu} (-Z_1) \quad (\because Z_{M+1}^\flat := -Z_1) \\
&= (-1) e^{-i\tilde{\theta}_\mu} (-Z_1) \quad (\because \text{def_half_integer_modes } (1)) \\
&= e^{-i\tilde{\theta}_\mu} Z_1 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= e^{-i \cdot 1 \cdot \tilde{\theta}_\mu} Z_1^\flat \quad (\because Z_1^\flat := Z_1)
\end{aligned}$$

となる。この境界項の等式と Step 1 の第 4 式、交換子の線型性を使うと、主張の左辺から一続きに

$$\begin{aligned}
[H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu] &= \left[H_1^{(+)}, \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Y_j \right] \quad (\because \text{定義 14.4}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} [H_1^{(+)}, Y_j] \quad (\because \text{交換子の第 2 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} (-2Z_{j+1}^b) \quad (\because \text{Step 1 の第 4 式}) \\
&= -2 \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_{j+1}^b \quad (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す}) \\
&= -2 \sum_{l=2}^{M+1} e^{-i(l-1)\tilde{\theta}_\mu} Z_l^b \quad (\because \text{有限和の添字の付け替え } l = j+1) \\
&= -2 \sum_{l=2}^{M+1} e^{i\tilde{\theta}_\mu} e^{-il\tilde{\theta}_\mu} Z_l^b \quad (\because \text{定理 4.5 } (n=1)) \\
&= -2 e^{i\tilde{\theta}_\mu} \sum_{l=2}^{M+1} e^{-il\tilde{\theta}_\mu} Z_l^b \quad (\because \text{分配則}) \\
&= -2 e^{i\tilde{\theta}_\mu} \sum_{l=1}^M e^{-il\tilde{\theta}_\mu} Z_l^b \quad (\because \text{直前の displayMath による } l = M+1 \text{ の項と } l=1 \text{ の項の入れ替え}) \\
&= -2 e^{i\tilde{\theta}_\mu} \sum_{l=1}^M e^{-il\tilde{\theta}_\mu} Z_l \quad (\because 1 \leq l \leq M \text{ では } Z_l^b = Z_l) \\
&= -2 e^{i\tilde{\theta}_\mu} \check{Z}_\mu \quad (\because \text{定義 14.4})
\end{aligned}$$

□

主張 14.8 ($\check{Z}, \check{Y}$ の反交換関係). $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について

$$[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ = 2M \delta_{\nu, M+1-\mu} I, \quad [\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ = 0, \quad [\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ = 2M \delta_{\nu, M+1-\mu} I$$

が成り立つ。ここで $I := I_{\text{Mat}(2M, \mathbb{C})}$ 、 $\delta_{\nu, M+1-\mu}$ は通常クロネッカーのデルタ ($\nu = M+1-\mu$ のとき 1、そうでないとき 0) である。

** 対になる添字に合同式が現れない ** のは、添字の範囲を $\check{\mathcal{M}}$ に絞ったからである：定義 14.5 (5) により $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ では $\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}$ と $\nu = M+1-\mu$ が同値である。

主張 8.1 では対になる添字が $\nu = -\mu$ だったのに対し、ここでは $\nu = M+1-\mu$ である。これは 主張 14.6 の共役添字が $-\mu$ ではなく $M+1-\mu$ であることに対応する。

証明. 反交換子は両引数について $\mathbb{C}$ 双線型 ($[\alpha X, \beta W]_+ = \alpha\beta[X, W]_+$) なので、定義 14.4、主張 7.3、定理 4.5、主張 5.26、定義 5.25、定義 14.5 (5) を順に使うと、第 1 式は主張の左辺から一続きに

$$\begin{aligned}
[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ &= \left[\sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j, \sum_{k=1}^M e^{-ik\tilde{\theta}_\nu} Z_k \right]_+ & (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} e^{-ik\tilde{\theta}_\nu} [Z_j, Z_k]_+ & (\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} e^{-ik\tilde{\theta}_\nu} \cdot 2I \delta_{(j,k)}^M & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}) \\
&= 2I \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} e^{-ij\tilde{\theta}_\nu} & (\because 1 \leq j, k \leq M \text{ では } \delta_{(j,k)}^M = 1 \iff j = k) \\
&= 2I \sum_{j=1}^M e^{-ij(\tilde{\theta}_\mu + \tilde{\theta}_\nu)} & (\because \text{theorem_exp_product } (n = 1)) \\
&= 2I \sum_{j=1}^M \exp\left(\frac{2\pi i j (- (\mu + \nu - 1))}{M}\right) & (\because \tilde{\theta}_\mu + \tilde{\theta}_\nu = \frac{2\pi(\mu + \nu - 1)}{M}) \\
&= 2MI \delta_{(-(\mu + \nu - 1), 0)}^M & (\because \text{exp_sum}) \\
&= 2MI \delta_{(\mu + \nu, 1)}^M & (\because \text{def_delta_M}) \\
&= 2M \delta_{\nu, M+1-\mu} I & (\because \text{def_check_index_set (5)} (\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}))
\end{aligned}$$

第 2 式は、定義 14.4 と 主張 7.3 の $[Z_j, Y_k]_+ = 0$ を使うと、一続きに

$$\begin{aligned}
[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ &= \left[\sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j, \sum_{k=1}^M e^{-ik\tilde{\theta}_\nu} Y_k \right]_+ & (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} e^{-ik\tilde{\theta}_\nu} [Z_j, Y_k]_+ & (\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} e^{-ik\tilde{\theta}_\nu} \cdot 0 & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}) \\
&= 0 & (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

第 3 式も、定義 14.4、主張 7.3 の $[Y_j, Y_k]_+ = 2I \delta_{(j,k)}^M$ と、第 1 式で使った 定理 4.5、主張 5.26、定義 5.25、定義 14.5 (5) を順に使うと、一続きに

$$\begin{aligned}
[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ &= \left[\sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Y_j, \sum_{k=1}^M e^{-ik\tilde{\theta}_\nu} Y_k \right]_+ & (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} e^{-ik\tilde{\theta}_\nu} [Y_j, Y_k]_+ & (\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} e^{-ik\tilde{\theta}_\nu} \cdot 2I \delta_{(j,k)}^M & (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}) \\
&= 2I \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} e^{-ij\tilde{\theta}_\nu} & (\because 1 \leq j, k \leq M \text{ では } \delta_{(j,k)}^M = 1 \iff j = k) \\
&= 2I \sum_{j=1}^M e^{-ij(\tilde{\theta}_\mu + \tilde{\theta}_\nu)} & (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= 2I \sum_{j=1}^M \exp\left(\frac{2\pi i j (-(\mu + \nu - 1))}{M}\right) & (\because \tilde{\theta}_\mu + \tilde{\theta}_\nu = \frac{2\pi(\mu + \nu - 1)}{M}) \\
&= 2MI \delta_{(-(\mu + \nu - 1), 0)}^M & (\because \text{exp_sum}) \\
&= 2MI \delta_{(\mu + \nu, 1)}^M & (\because \text{def_delta_M}) \\
&= 2M \delta_{\nu, M+1-\mu} I & (\because \text{def_check_index_set (5) } (\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}))
\end{aligned}$$

□

主張 14.9 ($\check{Z}, \check{Y}$ から Z_j, Y_j を復元する). $j \in \{1, \dots, M\}$ について

$$Z_j = \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Z}_\mu e^{ij\tilde{\theta}_\mu}, \quad Y_j = \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Y}_\mu e^{ij\tilde{\theta}_\mu}$$

が成り立つ。とくに $\check{Z}_1, \dots, \check{Z}_M, \check{Y}_1, \dots, \check{Y}_M$ は主張 5.32 の Z_j, Y_j を生成するので、 $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を (単位的 $\mathbb{C}$ 代数として) 生成する。

証明. 準備として、 $j, k \in \{1, \dots, M\}$ のとき $|j - k| \leq M - 1 < M$ なので、主張 14.3 を指数の整数 $j - k$ に適用する。まず $j = k$ のときは

$$\begin{aligned}
j - k &= 0 & (\because j = k \text{ と } \mathbb{Z} \text{ の減法}) \\
&= 0 \cdot M & (\because \mathbb{Z} \text{ の乗法})
\end{aligned}$$

であり、 $(-1)^0 = 1$ 、 $j \neq k$ のときは $|j - k| < M$ かつ $j - k \neq 0$ なので $j - k \not\equiv 0 \pmod{M}$ である。したがって

$$\sum_{\mu=1}^M e^{i(j-k)\tilde{\theta}_\mu} = \begin{cases} M & (j = k) \\ 0 & (j \neq k) \end{cases}$$

である。第 1 式は、定義 14.4 と 定理 4.5 と準備の等式を順に使うと、一続きに

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Z}_{\mu} e^{ij\tilde{\theta}_{\mu}} &= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \left(\sum_{k=1}^M Z_k e^{-ik\tilde{\theta}_{\mu}} \right) e^{ij\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \sum_{k=1}^M Z_k e^{-ik\tilde{\theta}_{\mu}} e^{ij\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{有限和への分配}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \sum_{k=1}^M Z_k e^{i(j-k)\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M Z_k \sum_{\mu=1}^M e^{i(j-k)\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{有限和の順序交換}) \\
&= \frac{1}{M} \cdot Z_j \cdot M \quad (\because \text{準備の等式により } k=j \text{ の項だけが残る}) \\
&= Z_j \quad (\because M \neq 0 \text{ なのでスカラー } \frac{1}{M} \text{ と } M \text{ が相殺する})
\end{aligned}$$

第 2 式も、定義 14.4 の $\check{Y}_{\mu}$ の定義から同じ根拠の並びで、一続きに

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Y}_{\mu} e^{ij\tilde{\theta}_{\mu}} &= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \left(\sum_{k=1}^M Y_k e^{-ik\tilde{\theta}_{\mu}} \right) e^{ij\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \sum_{k=1}^M Y_k e^{-ik\tilde{\theta}_{\mu}} e^{ij\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{有限和への分配}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \sum_{k=1}^M Y_k e^{i(j-k)\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M Y_k \sum_{\mu=1}^M e^{i(j-k)\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{有限和の順序交換}) \\
&= \frac{1}{M} \cdot Y_j \cdot M \quad (\because \text{準備の等式により } k=j \text{ の項だけが残る}) \\
&= Y_j \quad (\because M \neq 0 \text{ なのでスカラー } \frac{1}{M} \text{ と } M \text{ が相殺する})
\end{aligned}$$

生成性については、主張 5.32 が Z_j, Y_j の生成性を主張しており、いま示した式は各 Z_j, Y_j が $\check{Z}_{\mu}, \check{Y}_{\mu}$ の $\mathbb{C}$ 線型結合であることを与えるので、 $\check{Z}, \check{Y}$ の生成する部分代数は Z_j, Y_j をすべて含み、したがって全体に一致する。□

主張 14.10 ($H_1^{(+)}, H_2$ を $\check{Z}, \check{Y}$ で表す).

$$H_1^{(+)} = \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Y}_{\mu} \check{Z}_{M+1-\mu} e^{-i\tilde{\theta}_{\mu}}, \quad H_2 = \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Z}_{M+1-\mu} \check{Y}_{\mu}$$

が成り立つ (主張 5.29 の半整数運動量版。共役添字が $-\mu$ から $M+1-\mu$ に変わっている)。和の添字 μ も共役添字 $M+1-\mu$ も 定義 14.5 (2) により $\check{M}$ の中にとどまる。

証明. まず 定義 14.4 と 主張 14.6 (2) から $\check{Z}_{M+1-\mu}$ の表示を用意する。

$$\begin{aligned}
\check{Z}_{M+1-\mu} &= \sum_{k=1}^M Z_k e^{-ik\tilde{\theta}_{M+1-\mu}} \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{k=1}^M Z_k e^{ik\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{conjugate_index_of_check_Z_Y (2)})
\end{aligned}$$

次に $1 \leq j, k \leq M$ より $|k - j| < M$ なので、主張 14.3 より内側の和は $k = j$ のとき M 、そうでないとき 0 である。これと 定義 14.4、定理 4.5、定義 5.8 を順に使うと、

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Z}_{M+1-\mu} \check{Y}_\mu &= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \left(\sum_{k=1}^M Z_k e^{ik\tilde{\theta}_\mu} \right) \left(\sum_{j=1}^M Y_j e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \right) \quad (\because \text{準備した } \check{Z}_{M+1-\mu} \text{ の表示と def_half_integer_modes}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \sum_{k=1}^M \sum_{j=1}^M Z_k Y_j e^{ik\tilde{\theta}_\mu} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{積を二重和へ分配}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \sum_{k=1}^M \sum_{j=1}^M Z_k Y_j e^{i(k-j)\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \sum_{j=1}^M Z_k Y_j \sum_{\mu=1}^M e^{i(k-j)\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{有限和の順序交換}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M Z_j Y_j \cdot M \quad (\because \text{antiperiodic_exp_sum}) \\
&= \sum_{j=1}^M Z_j Y_j \quad (\because \text{スカラー } \frac{1}{M} \text{ と } M \text{ の相殺}) \\
&= H_2 \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols})
\end{aligned}$$

もう一方の式の準備として、 $1 \leq j, k \leq M$ より $j - k + 1$ は $2 - M$ 以上 M 以下である。主張 14.3 より、内側の和が 0 でないのは $j - k + 1 = lM$ のときに限り、この範囲では $l = 0$ と $l = 1$ だけが可能である。

- $l = 0$ 、すなわち $k = j + 1$ ($k \leq M$ より $1 \leq j \leq M - 1$)。このとき内側の和は $M(-1)^0 = M$ 。
- $l = 1$ 、すなわち $j - k + 1 = M$ 。 $1 \leq j, k \leq M$ でこれを満たすのは $j = M, k = 1$ のみ。このとき内側の和は $M(-1)^1 = -M$ 。

したがって、定義 14.4、定理 4.5、定義 5.24 を順に使うと、

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Y}_\mu \check{Z}_{M+1-\mu} e^{-i\tilde{\theta}_\mu} &= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \left(\sum_{j=1}^M Y_j e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \right) \left(\sum_{k=1}^M Z_k e^{ik\tilde{\theta}_\mu} \right) e^{-i\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{def_half_integer_modes と準備した } \check{Z}_{M+1-\mu} \text{ の表示}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M Y_j Z_k e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} e^{ik\tilde{\theta}_\mu} e^{-i\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{積を二重和へ分配}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M Y_j Z_k e^{-i(j-k+1)\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M Y_j Z_k \sum_{\mu=1}^M e^{-i(j-k+1)\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{有限和の順序交換}) \\
&= \frac{1}{M} \left(\sum_{j=1}^{M-1} Y_j Z_{j+1} \cdot M + Y_M Z_1 \cdot (-M) \right) \quad (\because \text{antiperiodic_exp_sum と直上の 2 つの場合分け}) \\
&= \sum_{j=1}^{M-1} Y_j Z_{j+1} - Y_M Z_1 \quad (\because \text{スカラー } \frac{1}{M} \text{ の分配と } \frac{1}{M} \cdot M = 1, \frac{1}{M} \cdot (-M) = -1 \text{ の相殺}) \\
&= H_1^{(+)} \quad (\because \text{def_V1_pm})
\end{aligned}$$

□

15 偶セクターの転送行列の共役作用

注意 15.1 (この章の目的と、008 章との関係). 主張 14.7 で、半整数運動量モード $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ が $H_1^{(+)}, H_2$ に対して満たす交換関係 (A)~(D) を得た。この章では、そこから

$$\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu), T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) A(\tilde{\theta}_\mu), \quad A(\tilde{\theta}_\mu) = B_1(\tilde{\theta}_\mu) B_2 B_1(\tilde{\theta}_\mu)$$

まで到達する。ここで $V^{(+)} := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ であり、 $A(\theta)$ は定義 9.20 の ($\theta \in \mathbb{C}$ について定義された) 行列である。

**008 章との関係。 ** 008 章は同じ道筋を整数運動量 $\theta_\mu = 2\pi\mu/M$ と $\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu$ について述べている。主張 14.2 で確定させたとおり 008 章の議論は (-) セクター専用なので、そこで扱われている V は実質 $\left(V_1^{(-)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(-)}\right)^{1/2}$ である。混同を避けるため、この章では $V^{(+)}, T_{(V^{(+)})}$ という別の記号を用い、必要な主張はすべてこの章で立て直す。

** 同じ代数計算で通る理由。 ** 008 章の主張 9.2 から主張 9.21 までの各証明は、1 重の交換子の公式 (A)~(D) と、交換子の双線型性・指数関数の共役の級数展開・ $e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1$ だけを使っており、 θ_μ に固有の性質 ($e^{-iM\theta_\mu} = +1$ 、添字集合 $\mathcal{M}$ の形、主張 5.30 の M 周期性) を使っていない。 θ_μ に固有の性質が使われていたのは 1 重の交換子 (A)~(D) を導く段階 (主張 9.1) だけであり、そこは主張 14.7 が半整数運動量について独立に済ませてある。したがってこの章の各主張は、008 章の対応する証明と同じ代数計算を $\tilde{\theta}_\mu, \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ について繰り返すことで得られる。

** 添字の量化について。 ** 定義 14.4 は $\mu \in \mathbb{Z}$ について定義されているが、定義 14.4 (2) の添字周期性 $\check{Z}_{\mu+M} = \check{Z}_\mu$ により本質的に相異なる添字は M 個である。 ** この章の主張はすべて 定義 14.5 の $\mu \in \check{\mathcal{M}} = \{1, \dots, M\}$ について述べる。 ** これは 008 章の $\mathcal{M} = \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ に対応する、半整数運動量側の必要最小の有限集合である。

定義 15.2 (偶セクターの生成子 $H_1^{(+)}$). 定義 5.28 の生成子で上の符号を取ったものを

$$H_1^{(+)} := Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \dots + Y_{M-1} Z_M - Y_M Z_1$$

と書く。

定義 15.3 ($V_1^{(+)}$ の平方根として用いる行列). 定義 15.2 の $H_1^{(+)}$ を用い、 $1/2$ 乗として用いる行列を

$$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} := \exp\left(\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}\right) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

定義 15.4 (偶セクターの転送行列 $V^{(+)}$). 定義 15.3 の $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と 定義 5.8 の $V_2 = (2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^* H_2)$ を用いて

$$V^{(+)} := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

主張 15.5 ($\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ の可逆性). 定義 15.3 で定めた $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は可逆である。すなわち、定義 9.7 の $R^\times$ の元である。

証明. $\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)} \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ である。逆行列を一続きに計算すると、

$$\begin{aligned} \left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)^{-1} &= \exp\left(\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}\right)^{-1} \quad (\because \text{定義 15.3}) \\ &= \exp\left(-\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}\right) \quad (\because \text{定理 6.6 (3)}) \end{aligned}$$

したがって $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は可逆である。 □

主張 15.6 (V_2 の可逆性). 定義 5.8 で定めた V_2 は可逆である。すなわち、定義 9.7 の $R^\times$ の元である。

証明. 定理 6.6 (3) を $iK_2^*H_2 \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ に適用すると、 $\exp(iK_2^*H_2)$ は可逆である。

定義 5.8 より $K_2 > 0$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ である。定義 9.7 (iv) より

$$(2s_2)^{M/2}I \in R^\times$$

定義 5.28 の指数表示により

$$V_2 = (2s_2)^{M/2}I \cdot \exp(iK_2^*H_2)$$

定義 9.7 (ii) をこの積へ適用すると、 $V_2 \in R^\times$ である。 $\square$

主張 15.7 ($V^{(+)}$ の可逆性). 定義 15.4 で定めた $V^{(+)}$ は可逆である。すなわち、定義 9.7 の $R^\times$ の元である。

証明. 主張 15.5 と 主張 15.6 により、 $(V_1^{(+)})^{1/2}$ と V_2 は可逆である。

定義 9.7 (ii) より

$$(V_1^{(+)})^{1/2} V_2 \in R^\times, \quad R = \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

主張 15.5 と 定義 9.7 (ii) より

$$(V_1^{(+)})^{1/2} V_2 (V_1^{(+)})^{1/2} \in R^\times$$

定義 15.4 より

$$V^{(+)} \in R^\times$$

$\square$

定義 15.8 (偶セクターの共役写像 $T_{(V^{(+)})}$). 定義 15.4 で $V^{(+)}$ を作る三つの因子は、主張 15.5 と 主張 15.6 により可逆である。そこで 定義 9.11 の $T_g(X) = gXg^{-1}$ を用いて

$$T_{(V^{(+)})}(X) := T_{(V_1^{(+)})^{1/2}} \left(T_{V_2} \left(T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(X) \right) \right) \quad (X \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}))$$

主張 15.9 ($(V_1^{(+)})^{1/2}$ の平方根性). 定義 15.3 で定めた $(V_1^{(+)})^{1/2}$ は $V_1^{(+)}$ の平方根である。

$$\left((V_1^{(+)})^{1/2} \right)^2 = V_1^{(+)}$$

証明. 定理 4.5 を $X = Y = \frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}$ に適用する (X は自分自身と可換)。すると定義 5.24 の上符号の定義と合わせて

$$\begin{aligned} \left((V_1^{(+)})^{1/2} \right)^2 &= \left(\exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \right)^2 \quad (\because \text{def_V1_plus_square_root}) \\ &= \exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)} + \frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \quad (\because \text{可換な指数行列の積の定理}) \\ &= \exp\left(iK_1H_1^{(+)}\right) \quad (\because \text{同類項 } \frac{i}{2}K_1H_1^{(+)} \text{ の加法}) \\ &= V_1^{(+)} \quad (\because \text{def_V1_pm の上符号の定義}) \end{aligned}$$

$\square$

主張 15.10 ($T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$). 定義 15.8 で合成として定めた $T_{(V^{(+)})}$ は、定義 15.4 の $V^{(+)}$ による共役そのものに一致する。

$$T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$$

証明. 主張 15.5 と 主張 15.6 により、 $(V_1^{(+)})^{1/2}$ と V_2 は可逆である。また 定義 9.7 (ii) より、 $(V_1^{(+)})^{1/2} V_2$ も可逆である。したがって、主張 1.55 の合成則 $T_g \circ T_h = T_{gh}$ を、まず $g = (V_1^{(+)})^{1/2}$ 、 $h = V_2$ に、次に $g = (V_1^{(+)})^{1/2} V_2$ 、 $h = (V_1^{(+)})^{1/2}$ に適用できる。よって、

$$\begin{aligned} T_{(V^{(+)})} &= T_{(V_1^{(+)})^{1/2} \circ T_{V_2} \circ T_{(V_1^{(+)})^{1/2}} \quad (\because \text{定義 15.8}) \\ &= T_{(V_1^{(+)})^{1/2} V_2} \circ T_{(V_1^{(+)})^{1/2}} \quad (\because \text{主張 1.55 の合成則}) \\ &= T_{(V_1^{(+)})^{1/2} V_2 (V_1^{(+)})^{1/2}} \quad (\because \text{主張 1.55 の合成則}) \\ &= T_{V^{(+)}} \quad (\because \text{定義 15.4}) \end{aligned}$$

ここで合成則は最初に左の 2 つへ、次にその結果と残りの 1 つへ適用した。合成の順序は $T_{(V^{(+)})}(X) = T_{(V_1^{(+)})^{1/2}} \left(T_{V_2} \left(T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(X) \right) \right)$ の定義どおりである。 $\square$

主張 15.11 ($\check{Z}, \check{Y}$ についての n 重交換子). $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \mu \in \check{M}$ (定義 14.5) とする。 $H_1^{(+)}, H_2, \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ はすべて $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元であり (定義 14.4、定義 5.24、定義 5.8)、 $K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$ はスカラー、 $[X, W] := XW - WX$ は交換子である。主張 9.2 と同じく、 $X \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を固定するごとに n 重の交換子を

$$\underbrace{[X, \dots, [X, W] \dots]}_n := \underbrace{\text{ad}_X \circ \dots \circ \text{ad}_X}_n(W), \quad \text{ad}_X(W) := [X, W]$$

と定める ($n = 0$ のときは恒等写像、すなわち値は W そのもの)。以下、 $\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記する。
(h1.z)

$$\underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \dots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu] \dots]}_n = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}} \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h1.y)

$$\underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \dots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu] \dots]}_n = \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}} \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.z)

$$\underbrace{[K_2^* H_2, \dots, [K_2^* H_2, \check{Z}_\mu] \dots]}_n = \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.y)

$$\underbrace{[K_2^* H_2, \dots, [K_2^* H_2, \check{Y}_\mu] \dots]}_n = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

証明. 証明はすべて $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に関する帰納法であり、用いるのは主張 14.7 の 1 重の交換子の公式

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad [H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu] &= 2e^{-i\tilde{\theta}} \check{Y}_\mu, & \text{(B)} \quad [H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu] &= -2e^{i\tilde{\theta}} \check{Z}_\mu, \\ \text{(C)} \quad [H_2, \check{Z}_\mu] &= -2\check{Y}_\mu, & \text{(D)} \quad [H_2, \check{Y}_\mu] &= 2\check{Z}_\mu \end{aligned}$$

と、交換子の第 1 引数・第 2 引数についての $\mathbb{C}$ 双線型性

$$[\alpha X, \beta W] = \alpha\beta [X, W] \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C}, X, W \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}))$$

だけである。後者は、スカラー倍が積と可換なこと（主張 3.6）を使って次のように得られる。

$$\begin{aligned} [\alpha X, \beta W] &= (\alpha X)(\beta W) - (\beta W)(\alpha X) \quad (\because \text{交換子の定義}) \\ &= \alpha\beta XW - \alpha\beta WX \quad (\because \text{スカラー倍が積と可換であること}) \\ &= \alpha\beta (XW - WX) \quad (\because \text{分配則}) \\ &= \alpha\beta [X, W] \quad (\because \text{交換子の定義}) \end{aligned}$$

また $e^{-i\tilde{\theta}}e^{i\tilde{\theta}} = 1$ を使う。各主張の右辺は n の偶奇で場合分けされているので、帰納段階は「 n 偶数 $\rightarrow n+1$ 奇数」「 n 奇数 $\rightarrow n+1$ 偶数」の 2 通りを別々に示す。

(h1.z) の証明。 $C_n := \underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \dots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu] \dots]}_n$ とおくと、定義より $C_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, C_n]$

が $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について成り立つ。

基底段階 ($n = 0$ 、偶数) では、

$$\begin{aligned} C_0 &= \check{Z}_\mu \quad (\because 0 \text{ 重交換子は恒等写像}) \\ &= (-1)^0 (2K_1)^0 \check{Z}_\mu \quad (\because (-1)^0 = 1 \text{ かつ } (2K_1)^0 = 1) \end{aligned}$$

となり、偶数側の右辺と一致する。

帰納段階 1 (n 偶数 $\rightarrow n+1$ 奇数) : $C_n = (-1)^{n/2} (2K_1)^n \check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned} C_{n+1} &= [K_1 H_1^{(+)}, (-1)^{n/2} (2K_1)^n \check{Z}_\mu] \quad (\because C_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, C_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\ &= K_1 \cdot (-1)^{n/2} (2K_1)^n [H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_1 \cdot (-1)^{n/2} (2K_1)^n \cdot 2e^{-i\tilde{\theta}} \check{Y}_\mu \quad (\because \text{(A)}) \\ &= (-1)^{n/2} (2K_1)^{n+1} e^{-i\tilde{\theta}} \check{Y}_\mu \quad (\because \text{スカラー倍の交換と } K_1 \cdot (2K_1)^n \cdot 2 = (2K_1)^{n+1}) \end{aligned}$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号は $(-1)^{((n+1)-1)/2} = (-1)^{n/2}$ であり、係数 $(2K_1)^{n+1}$ と位相因子 $e^{-i\tilde{\theta}}$ も一致する。

帰納段階 2 (n 奇数 $\rightarrow n+1$ 偶数) : $C_n = (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}} \check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned} C_{n+1} &= [K_1 H_1^{(+)}, (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}} \check{Y}_\mu] \quad (\because C_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, C_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\ &= K_1 \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}} [H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_1 \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}} \cdot (-2e^{i\tilde{\theta}} \check{Z}_\mu) \quad (\because \text{(B)}) \\ &= (-1) \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^{n+1} \overbrace{e^{-i\tilde{\theta}} e^{i\tilde{\theta}}}^{=1} \check{Z}_\mu \quad (\because \text{スカラー倍の交換と } K_1 \cdot (2K_1)^n \cdot (-2) = (-1)(2K_1)^{n+1}) \\ &= (-1)^{(n-1)/2+1} (2K_1)^{n+1} \check{Z}_\mu \quad (\because e^{-i\tilde{\theta}} e^{i\tilde{\theta}} = 1 \text{ と } (-1) \cdot (-1)^{(n-1)/2} = (-1)^{(n-1)/2+1}) \\ &= (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^{n+1} \check{Z}_\mu \quad (\because \frac{n-1}{2} + 1 = \frac{n+1}{2}) \end{aligned}$$

最後の等号は $\frac{n-1}{2}+1 = \frac{n+1}{2}$ による。 $n+1$ は偶数なので偶数側の右辺 $(-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\check{Z}_\mu$ と一致する (位相因子は $e^{-i\tilde{\theta}}e^{i\tilde{\theta}} = 1$ により消える)。以上で (h1.z) が成り立つ。

(h1.y) の証明。 $D_n := \underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \dots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu] \dots]}_n$ とおく。 $D_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, D_n]$ 。基底段階 ($n = 0$, 偶数) では、

$$\begin{aligned} D_0 &= \check{Y}_\mu \quad (\because 0 \text{ 重交換子は恒等写像}) \\ &= (-1)^0 (2K_1)^0 \check{Y}_\mu \quad (\because (-1)^0 = 1 \text{ かつ } (2K_1)^0 = 1) \end{aligned}$$

となり、偶数側の右辺と一致する。

帰納段階 1 (n 偶数 $\rightarrow n+1$ 奇数) : $D_n = (-1)^{n/2} (2K_1)^n \check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned} D_{n+1} &= [K_1 H_1^{(+)}, (-1)^{n/2} (2K_1)^n \check{Y}_\mu] \quad (\because D_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, D_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\ &= K_1 \cdot (-1)^{n/2} (2K_1)^n [H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_1 \cdot (-1)^{n/2} (2K_1)^n \cdot (-2e^{i\tilde{\theta}} \check{Z}_\mu) \quad (\because \text{(B)}) \\ &= (-1)^{n/2+1} (2K_1)^{n+1} e^{i\tilde{\theta}} \check{Z}_\mu \quad (\because \text{スカラー倍の交換と } K_1 \cdot (2K_1)^n \cdot (-2) = (-1)(2K_1)^{n+1}) \end{aligned}$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号は $(-1)^{((n+1)+1)/2} = (-1)^{n/2+1}$ であり一致する。

帰納段階 2 (n 奇数 $\rightarrow n+1$ 偶数) : $D_n = (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}} \check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned} D_{n+1} &= [K_1 H_1^{(+)}, (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}} \check{Z}_\mu] \quad (\because D_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, D_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\ &= K_1 \cdot (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}} [H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_1 \cdot (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}} \cdot 2e^{-i\tilde{\theta}} \check{Y}_\mu \quad (\because \text{(A)}) \\ &= (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^{n+1} \overbrace{e^{i\tilde{\theta}} e^{-i\tilde{\theta}}}^{=1} \check{Y}_\mu \quad (\because \text{スカラー倍の交換と } K_1 \cdot (2K_1)^n \cdot 2 = (2K_1)^{n+1}) \\ &= (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^{n+1} \check{Y}_\mu \quad (\because e^{i\tilde{\theta}} e^{-i\tilde{\theta}} = 1) \end{aligned}$$

$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号 $(-1)^{(n+1)/2}$ と一致する。以上で (h1.y) が成り立つ。

(h2.z) の証明。 $E_n := \underbrace{[K_2^* H_2, \dots, [K_2^* H_2, \check{Z}_\mu] \dots]}_n$ とおく。 $E_{n+1} = [K_2^* H_2, E_n]$ 。この場合は

(C), (D) の右辺に $e^{\pm i\tilde{\theta}}$ が現れないので位相因子は出てこない。基底段階 ($n = 0$, 偶数) では、

$$\begin{aligned} E_0 &= \check{Z}_\mu \quad (\because 0 \text{ 重交換子は恒等写像}) \\ &= (-1)^0 (2K_2^*)^0 \check{Z}_\mu \quad (\because (-1)^0 = 1 \text{ かつ } (2K_2^*)^0 = 1) \end{aligned}$$

となり、偶数側の右辺と一致する。

帰納段階 1 (n 偶数 $\rightarrow n+1$ 奇数) : $E_n = (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned} E_{n+1} &= [K_2^* H_2, (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu] \quad (\because E_{n+1} = [K_2^* H_2, E_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n [H_2, \check{Z}_\mu] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \cdot (-2\check{Y}_\mu) \quad (\because \text{(C)}) \\ &= (-1)^{n/2} (-1) (2K_2^*)^n (2K_2^*) \check{Y}_\mu \quad (\because \text{スカラー倍の交換と結合。 } K_2^* \cdot (-2) = (-1)(2K_2^*)) \\ &= (-1)^{n/2+1} (2K_2^*)^{n+1} \check{Y}_\mu \quad (\because \text{冪の指数法則を } (-1) \text{ と } 2K_2^* \text{ の両方へ適用}) \end{aligned}$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号 $(-1)^{((n+1)+1)/2} = (-1)^{n/2+1}$ と一致する。

帰納段階 2 (n 奇数 $\rightarrow n+1$ 偶数) : $E_n = (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n \check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned} E_{n+1} &= \left[K_2^* H_2, (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu \right] \quad (\because E_{n+1} = [K_2^* H_2, E_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n [H_2, \check{Y}_\mu] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \cdot 2 \check{Z}_\mu \quad (\because (D)) \\ &= (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n (2K_2^*) \check{Z}_\mu \quad (\because \text{スカラー倍の交換と結合}) \\ &= (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^{n+1} \check{Z}_\mu \quad (\because \text{冪の指数法則}) \end{aligned}$$

$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号 $(-1)^{(n+1)/2}$ と一致する。以上で (h2.z) が成り立つ。

(h2.y) の証明。 $F_n := \underbrace{[K_2^* H_2, \dots, [K_2^* H_2, \check{Y}_\mu] \dots]}_n$ とおく。 $F_{n+1} = [K_2^* H_2, F_n]$ 。基底段階

($n=0$, 偶数) では、

$$\begin{aligned} F_0 &= \check{Y}_\mu \quad (\because 0 \text{ 重交換子は恒等写像}) \\ &= (-1)^0 (2K_2^*)^0 \check{Y}_\mu \quad (\because (-1)^0 = 1 \text{ かつ } (2K_2^*)^0 = 1) \end{aligned}$$

となり、偶数側の右辺と一致する。

帰納段階 1 (n 偶数 $\rightarrow n+1$ 奇数) : $F_n = (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned} F_{n+1} &= \left[K_2^* H_2, (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu \right] \quad (\because F_{n+1} = [K_2^* H_2, F_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n [H_2, \check{Y}_\mu] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \cdot 2 \check{Z}_\mu \quad (\because (D)) \\ &= (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n (2K_2^*) \check{Z}_\mu \quad (\because \text{スカラー倍の交換と結合}) \\ &= (-1)^{n/2} (2K_2^*)^{n+1} \check{Z}_\mu \quad (\because \text{冪の指数法則}) \end{aligned}$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号 $(-1)^{((n+1)-1)/2} = (-1)^{n/2}$ と一致する。

帰納段階 2 (n 奇数 $\rightarrow n+1$ 偶数) : $F_n = (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned} F_{n+1} &= \left[K_2^* H_2, (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu \right] \quad (\because F_{n+1} = [K_2^* H_2, F_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n [H_2, \check{Z}_\mu] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \cdot (-2 \check{Y}_\mu) \quad (\because (C)) \\ &= (-1)^{(n-1)/2} (-1) (2K_2^*)^n (2K_2^*) \check{Y}_\mu \quad (\because \text{スカラー倍の交換と結合。 } K_2^* \cdot (-2) = (-1)(2K_2^*)) \\ &= (-1)^{(n-1)/2+1} (2K_2^*)^{n+1} \check{Y}_\mu \quad (\because \text{冪の指数法則を } (-1) \text{ と } 2K_2^* \text{ の両方へ適用}) \\ &= (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^{n+1} \check{Y}_\mu \quad (\because \frac{n-1}{2} + 1 = \frac{n+1}{2}) \end{aligned}$$

$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号 $(-1)^{(n+1)/2}$ と一致する。以上で (h2.y) が成り立つ。 $\square$

主張 15.12 ($\check{Z}, \check{Y}$ についての $\cosh, \sinh$ の展開係数への変換). $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) とし、 $\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記する。

(h1.z)

$$\underbrace{\left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}, \dots, \left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu \right] \dots \right]}_n = \begin{cases} i K_1^n e^{-i\tilde{\theta}} \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h1.y)

$$\underbrace{\left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)} , \dots , \left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)} , \check{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n = \begin{cases} -i K_1^n e^{i\tilde{\theta}} \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.z)

$$\underbrace{\left[i K_2^* H_2 , \dots , \left[i K_2^* H_2 , \check{Z}_\mu \right] \dots \right]}_n = \begin{cases} -i (2 K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2 K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.y)

$$\underbrace{\left[i K_2^* H_2 , \dots , \left[i K_2^* H_2 , \check{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n = \begin{cases} i (2 K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2 K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

証明. まず 4 式すべてで用いる 2 つの補題を用意する (主張 9.3 の proof の補題 1・補題 2 と同一の主張であり、 $\check{Z}, \check{Y}$ とは無関係に $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の任意の元について成り立つ)。

補題 1 (生成子のスカラー倍) : $\alpha \in \mathbb{C}$ 、 $X, W \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 、 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\underbrace{[\alpha X, \dots, [\alpha X, W] \dots]}_n = \alpha^n \underbrace{[X, \dots, [X, W] \dots]}_n$$

が成り立つ。実際、交換子の第 1 引数についての $\mathbb{C}$ 線型性より、任意の W について次の一続きが成り立つ。

$$\begin{aligned} \text{ad}_{\alpha X}(W) &= [\alpha X, W] \quad (\because \text{ad の定義}) \\ &= \alpha [X, W] \quad (\because \text{交換子の第 1 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\ &= \alpha \text{ad}_X(W) \quad (\because \text{ad の定義}) \end{aligned}$$

任意の W で成り立つので、線型写像として $\text{ad}_{\alpha X} = \alpha \text{ad}_X$ である。したがって、

$$\begin{aligned} \text{ad}_{\alpha X}^n &= (\alpha \text{ad}_X)^n \quad (\because \text{ad}_{\alpha X} = \alpha \text{ad}_X) \\ &= \alpha^n \text{ad}_X^n \quad (\because \text{ad}_X \text{ は } \mathbb{C} \text{ 線型であり、合成の各段からスカラーを前へ出せる}) \end{aligned}$$

$n = 0$ のときは両辺とも恒等写像で $\alpha^0 = 1$ により成立する。

補題 2 (虚数単位の冪) : $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$i^n = \begin{cases} i(-1)^{(n-1)/2} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

が成り立つ。実際 $i^2 = -1$ を使う。

$$\begin{aligned} i^n &= (i^2)^{n/2} \quad (\because n \text{ が偶数なら } n = 2(n/2)) \\ &= (-1)^{n/2} \quad (\because i^2 = -1) \end{aligned} \quad (n \text{ が偶数})$$

$$\begin{aligned} i^n &= i(i^2)^{(n-1)/2} \quad (\because n \text{ が奇数なら } n = 1 + 2((n-1)/2)) \\ &= i(-1)^{(n-1)/2} \quad (\because i^2 = -1) \end{aligned} \quad (n \text{ が奇数})$$

いずれの指数も整数である。

(h1.z) について、補題 1 を $\alpha = \frac{i}{2}$ 、 $X = K_1 H_1^{(+)}$ 、 $W = \check{Z}_\mu$ として使い、主張 15.11 (h1.z) を代入する。

$$\begin{aligned}
\underbrace{\left[\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \dots, \left[\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu\right] \dots\right]}_n &= \left(\frac{i}{2}\right)^n \underbrace{\left[K_1H_1^{(+)}, \dots, \left[K_1H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu\right] \dots\right]}_n \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= \left(\frac{i}{2}\right)^n \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\theta} \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{nesting_of_commutator_of_H_and_check_Z (h1.z)}) \\
&= \begin{cases} i^n 2^{-n} 2^n (-1)^{(n-1)/2} K_1^n e^{-i\theta} \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ i^n 2^{-n} 2^n (-1)^{n/2} K_1^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{冪の指数法則を商 } \left(\frac{i}{2}\right)^n = i^n 2^{-n} \text{ と積 } (2K_1)^n = 2^n K_1^n \text{ の両方へ適用し、スカラーを並べ替えた}) \\
&= \begin{cases} i^n (-1)^{(n-1)/2} K_1^n e^{-i\theta} \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ i^n (-1)^{n/2} K_1^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because 2^{-n} 2^n = 2^0 = 1) \\
&= \begin{cases} i (-1)^{(n-1)/2} (-1)^{(n-1)/2} K_1^n e^{-i\theta} \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (-1)^{n/2} K_1^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i (-1)^{n-1} K_1^n e^{-i\theta} \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n K_1^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \frac{n-1}{2} + \frac{n-1}{2} = n-1, \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n\right) \\
&= \begin{cases} i K_1^n e^{-i\theta} \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n \text{ 奇数なら } (-1)^{n-1} = 1, n \text{ 偶数なら } (-1)^n = 1)
\end{aligned}$$

最後の等号は、 n が奇数なら $n-1$ が偶数で $(-1)^{n-1} = 1$ 、 n が偶数なら $(-1)^n = 1$ による。
(h1.y) について、補題 1 を $\alpha = \frac{i}{2}$ 、 $X = K_1H_1^{(+)}$ 、 $W = \check{Y}_\mu$ として使い、主張 15.11 (h1.y) を代入する。

$$\begin{aligned}
\underbrace{\left[\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \dots, \left[\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu\right] \dots\right]}_n &= \left(\frac{i}{2}\right)^n \underbrace{\left[K_1H_1^{(+)}, \dots, \left[K_1H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu\right] \dots\right]}_n \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= \left(\frac{i}{2}\right)^n \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\theta} \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{nesting_of_commutator_of_H_and_check_Z (h1.y)}) \\
&= \begin{cases} i^n 2^{-n} 2^n (-1)^{(n+1)/2} K_1^n e^{i\theta} \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ i^n 2^{-n} 2^n (-1)^{n/2} K_1^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{冪の指数法則を商 } \left(\frac{i}{2}\right)^n = i^n 2^{-n} \text{ と積 } (2K_1)^n = 2^n K_1^n \text{ の両方へ適用し、スカラーを並べ替えた}) \\
&= \begin{cases} i^n (-1)^{(n+1)/2} K_1^n e^{i\theta} \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ i^n (-1)^{n/2} K_1^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because 2^{-n} 2^n = 2^0 = 1) \\
&= \begin{cases} i (-1)^{(n-1)/2} (-1)^{(n+1)/2} K_1^n e^{i\theta} \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (-1)^{n/2} K_1^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i (-1)^n K_1^n e^{i\theta} \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n K_1^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \frac{n-1}{2} + \frac{n+1}{2} = n\right) \\
&= \begin{cases} -i K_1^n e^{i\theta} \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n \text{ 奇数なら } (-1)^n = -1, n \text{ 偶数なら } (-1)^n = 1)
\end{aligned}$$

最後の等号は、 n が奇数なら $(-1)^n = -1$ 、偶数なら $(-1)^n = 1$ による。
(h2.z) について、補題 1 を $\alpha = i$ 、 $X = K_2^*H_2$ 、 $W = \check{Z}_\mu$ として使う。今回は $\alpha = i$ なので 2 の冪が現れず、 $(2K_2^*)^n$ はそのまま残る。代入する n 重交換子は 主張 15.11 (h2.z) である。

$$\begin{aligned}
\underbrace{\left[iK_2^*H_2, \dots, \left[iK_2^*H_2, \check{Z}_\mu\right] \dots\right]}_n &= i^n \underbrace{\left[K_2^*H_2, \dots, \left[K_2^*H_2, \check{Z}_\mu\right] \dots\right]}_n \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= i^n \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{nesting_of_commutator_of_H_and_check_Z (h2.z)}) \\
&= \begin{cases} i (-1)^{(n-1)/2} (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i (-1)^n (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \frac{n-1}{2} + \frac{n+1}{2} = n, \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n\right) \\
&= \begin{cases} -i (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n \text{ 奇数なら } (-1)^n = -1, n \text{ 偶数なら } (-1)^n = 1)
\end{aligned}$$

(h2.y) について、補題 1 を $\alpha = i$ 、 $X = K_2^*H_2$ 、 $W = \check{Y}_\mu$ として使い、主張 15.11 (h2.y) を代入する。

$$\begin{aligned}
\underbrace{[iK_2^*H_2, \dots, [iK_2^*H_2, \check{Y}_\mu] \dots]}_n &= i^n \underbrace{[K_2^*H_2, \dots, [K_2^*H_2, \check{Y}_\mu] \dots]}_n \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= i^n \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{nesting_of_commutator_of_H_and_check_Z (h2.y)}) \\
&= \begin{cases} i(-1)^{(n-1)/2} (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i(-1)^{n-1} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \frac{n-1}{2} + \frac{n-1}{2} = n-1, \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n \right) \\
&= \begin{cases} i(2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n \text{ 奇数なら } (-1)^{n-1} = 1, n \text{ 偶数なら } (-1)^n = 1)
\end{aligned}$$

以上 4 式が、主張 15.11 の各式に補題 1・補題 2 を適用して得られた。 $\square$

主張 15.13 ($\check{Z}, \check{Y}$ についてのテイラー係数の抽出). $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) とし $\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記する。次の 4 つの級数は $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ において収束し (定理 6.6 (1))、それぞれ次に等しい。
(h1.z)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)} , \dots , \left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)} , \check{Z}_\mu \right] \dots \right]}_n = \cosh(K_1) \check{Z}_\mu + i e^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \check{Y}_\mu$$

(h1.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)} , \dots , \left[\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)} , \check{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n = -i e^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \check{Z}_\mu + \cosh(K_1) \check{Y}_\mu$$

(h2.z)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[iK_2^* H_2 , \dots , [iK_2^* H_2, \check{Z}_\mu] \dots \right]}_n = \cosh(2K_2^*) \check{Z}_\mu - i \sinh(2K_2^*) \check{Y}_\mu$$

(h2.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[iK_2^* H_2 , \dots , [iK_2^* H_2, \check{Y}_\mu] \dots \right]}_n = i \sinh(2K_2^*) \check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*) \check{Y}_\mu$$

証明. 各級数を 主張 15.12 により偶数項・奇数項に分け、 $\sinh, \cosh$ のテイラー展開

$$\sinh x = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{x^n}{n!}, \quad \cosh x = \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{x^n}{n!}$$

を用いる。(h1.z) について、主張 15.12 の (h1.z) を用いる。

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!} \check{Z}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{cases} i K_1^n e^{-i\tilde{\theta}} \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{展開係数への変換 (h1.z)}) \\
&= \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \left(\frac{1}{n!} K_1^n \check{Z}_\mu \right) + \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \left(\frac{1}{n!} i K_1^n e^{-i\tilde{\theta}} \check{Y}_\mu \right) \quad (\because n=0 \text{ 項を偶数側の和へ吸収し、偶数項と奇数項に分けた}) \\
&= \left(\sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{1}{n!} K_1^n \right) \check{Z}_\mu + i e^{-i\tilde{\theta}} \left(\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{1}{n!} K_1^n \right) \check{Y}_\mu \quad (\because \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu, i e^{-i\tilde{\theta}} \text{ が } n \text{ に依らないので和の外へ出した}) \\
&= \cosh(K_1) \check{Z}_\mu + i e^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \check{Y}_\mu \quad (\because \sinh, \cosh \text{ のテイラー展開})
\end{aligned}$$

1 行目で $n = 0$ 項を分けて書いたが、主張 15.12 (h1.z) の偶数側は $n = 0$ でも $K_1^0 \check{Z}_\mu = \check{Z}_\mu = \frac{1}{0!} \check{Z}_\mu$ と一致するので、2 行目では $n = 0$ 項を偶数側の和へ吸収した（以下の 3 式でも同様）。
 3 行目では $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ と $ie^{-i\bar{\theta}}$ が n に依らないので和の外へ出した。
 (h1.y) について、主張 15.12 の (h1.y) を用いる。

$$\begin{aligned}
 (\text{左辺}) &= \frac{1}{0!} \check{Y}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{cases} -i K_1^n e^{i\bar{\theta}} \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{展開係数への変換 (h1.y)}) \\
 &= \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \left(\frac{1}{n!} K_1^n \check{Y}_\mu \right) + \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \left(\frac{1}{n!} (-i) K_1^n e^{i\bar{\theta}} \check{Z}_\mu \right) \quad (\because n = 0 \text{ 項を偶数側の和へ吸収し、偶数項と奇数項に分けた}) \\
 &= \left(\sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{1}{n!} K_1^n \right) \check{Y}_\mu - i e^{i\bar{\theta}} \left(\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{1}{n!} K_1^n \right) \check{Z}_\mu \quad (\because \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu, -i e^{i\bar{\theta}} \text{ が } n \text{ に依らないので和の外へ出した}) \\
 &= \cosh(K_1) \check{Y}_\mu - i e^{i\bar{\theta}} \sinh(K_1) \check{Z}_\mu \quad (\because \sinh, \cosh \text{ のテイラー展開}) \\
 &= -i e^{i\bar{\theta}} \sinh(K_1) \check{Z}_\mu + \cosh(K_1) \check{Y}_\mu \quad (\because \text{行列加法の可換則})
 \end{aligned}$$

(h2.z) について、主張 15.12 の (h2.z) を用いる。

$$\begin{aligned}
 (\text{左辺}) &= \frac{1}{0!} \check{Z}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{cases} -i (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{展開係数への変換 (h2.z)}) \\
 &= \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \left(\frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu \right) + \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \left(\frac{1}{n!} (-i) (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu \right) \quad (\because n = 0 \text{ 項を偶数側の和へ吸収し、偶数項と奇数項に分けた}) \\
 &= \left(\sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \right) \check{Z}_\mu - i \left(\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \right) \check{Y}_\mu \quad (\because \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu, -i \text{ が } n \text{ に依らないので和の外へ出した}) \\
 &= \cosh(2K_2^*) \check{Z}_\mu - i \sinh(2K_2^*) \check{Y}_\mu \quad (\because \sinh, \cosh \text{ のテイラー展開})
 \end{aligned}$$

(h2.y) について、主張 15.12 の (h2.y) を用いる。

$$\begin{aligned}
 (\text{左辺}) &= \frac{1}{0!} \check{Y}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{cases} i (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{展開係数への変換 (h2.y)}) \\
 &= \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \left(\frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu \right) + \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \left(\frac{1}{n!} i (2K_2^*)^n \check{Z}_\mu \right) \quad (\because n = 0 \text{ 項を偶数側の和へ吸収し、偶数項と奇数項に分けた}) \\
 &= \left(\sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \right) \check{Y}_\mu + i \left(\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{1}{n!} (2K_2^*)^n \right) \check{Z}_\mu \quad (\because \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu, i \text{ が } n \text{ に依らないので和の外へ出した}) \\
 &= \cosh(2K_2^*) \check{Y}_\mu + i \sinh(2K_2^*) \check{Z}_\mu \quad (\because \sinh, \cosh \text{ のテイラー展開}) \\
 &= i \sinh(2K_2^*) \check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*) \check{Y}_\mu \quad (\because \text{行列加法の可換則})
 \end{aligned}$$

以上 4 式がいずれも statement の右辺と一致する。 □

主張 15.14 ($T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}, T_{V_2}$ の $\check{Z}, \check{Y}$ への作用). $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について ($\bar{\theta} := \bar{\theta}_\mu$),

$$\begin{aligned}
T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Z}_\mu) &= \cosh(K_1)\check{Z}_\mu + ie^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1)\check{Y}_\mu = (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ ie^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \end{pmatrix} \\
T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Y}_\mu) &= -ie^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1)\check{Z}_\mu + \cosh(K_1)\check{Y}_\mu = (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \begin{pmatrix} -ie^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \\
T_{V_2}(\check{Z}_\mu) &= \cosh(2K_2^*)\check{Z}_\mu - i \sinh(2K_2^*)\check{Y}_\mu = (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) \\ -i \sinh(2K_2^*) \end{pmatrix} \\
T_{V_2}(\check{Y}_\mu) &= i \sinh(2K_2^*)\check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*)\check{Y}_\mu = (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \begin{pmatrix} i \sinh(2K_2^*) \\ \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

ここで行ベクトルと列ベクトルの積は $(A, B) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} := aA + bB$ ($A, B \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 、 $a, b \in \mathbb{C}$) とする。

証明. $T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Z}_\mu)$ について、定義 9.11、定義 15.3 の定義、定理 6.6 (3) の $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ 、主張 9.6、主張 15.13 を順に用いる。

$$\begin{aligned}
T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Z}_\mu) &= (V_1^{(+)})^{1/2} \check{Z}_\mu \left((V_1^{(+)})^{1/2} \right)^{-1} \quad (\because \text{def_T_g}) \\
&= \exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \check{Z}_\mu \left(\exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \right)^{-1} \quad \left(\because \text{def_V1_plus_square_root} : (V_1^{(+)})^{1/2} := \exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \right) \\
&= \exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \check{Z}_\mu \exp\left(-\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \quad (\because \text{matrix_exp_conjugation (3)} : \exp(X)^{-1} = \exp(-X)) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \dots, \left[\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu \right] \dots \right]}_n \quad (\because \text{exp_X_Y_exp_X}) \\
&= \cosh(K_1)\check{Z}_\mu + ie^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{extract_taylor_coefficient_of_check_Z_Y (h1.z)})
\end{aligned}$$

$T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Y}_\mu)$ については、作用させる元が $\check{Z}_\mu$ から $\check{Y}_\mu$ へ変わるだけで共役の展開はまったく同じ手順であり、最後に 主張 15.13 の (h1.y) を使う。

$$\begin{aligned}
T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Y}_\mu) &= (V_1^{(+)})^{1/2} \check{Y}_\mu \left((V_1^{(+)})^{1/2} \right)^{-1} \quad (\because \text{def_T_g}) \\
&= \exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \check{Y}_\mu \left(\exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \right)^{-1} \quad \left(\because \text{def_V1_plus_square_root} : (V_1^{(+)})^{1/2} := \exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \right) \\
&= \exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \check{Y}_\mu \exp\left(-\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \quad (\because \text{matrix_exp_conjugation (3)} : \exp(X)^{-1} = \exp(-X)) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \dots, \left[\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu \right] \dots \right]}_n \quad (\because \text{exp_X_Y_exp_X}) \\
&= -ie^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1)\check{Z}_\mu + \cosh(K_1)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{extract_taylor_coefficient_of_check_Z_Y (h1.y)})
\end{aligned}$$

T_{V_2} については、定義 5.8 の $V_2 = (2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^*H_2)$ の前因子 $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ が共役で打ち消し合う。実際 主張 3.6 より $(2s_2)^{M/2}I$ は任意の元と可換であり、定義 9.7 (ii)(iv) より $V_2^{-1} = ((2s_2)^{M/2})^{-1} \exp(-iK_2^*H_2)$ である (定義 9.11 と 主張 9.6 も以下で使う)。よって

$$\begin{aligned}
T_{V_2}(\check{Z}_\mu) &= V_2 \check{Z}_\mu V_2^{-1} \quad (\because \text{def_T_g}) \\
&= (2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^*H_2) \check{Z}_\mu \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} \exp(-iK_2^*H_2) \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols の } V_2 \text{ と直前の } V_2^{-1} \text{ の表示}) \\
&= (2s_2)^{M/2} \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} \exp(iK_2^*H_2) \check{Z}_\mu \exp(-iK_2^*H_2) \quad (\because \text{scalar_identity_commutes (スカラー - } \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} \text{ を左端へ移す)}) \\
&= \exp(iK_2^*H_2) \check{Z}_\mu \exp(-iK_2^*H_2) \quad (\because (2s_2)^{M/2} \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} = 1) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[iK_2^*H_2, \dots, \left[iK_2^*H_2, \check{Z}_\mu \right] \dots \right]}_n \quad (\because \text{exp_X_Y_exp_X}) \\
&= \cosh(2K_2^*)\check{Z}_\mu - i \sinh(2K_2^*)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{extract_taylor_coefficient_of_check_Z_Y (h2.z)})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
T_{V_2}(\check{Y}_\mu) &= V_2 \check{Y}_\mu V_2^{-1} \quad (\because \text{def_T_g}) \\
&= (2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^* H_2) \check{Y}_\mu \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} \exp(-iK_2^* H_2) \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols の } V_2 \text{ と直前の } V_2^{-1} \text{ の表示}) \\
&= (2s_2)^{M/2} \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} \exp(iK_2^* H_2) \check{Y}_\mu \exp(-iK_2^* H_2) \quad (\because \text{scalar_identity_commutes (スカラー } \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} \text{ を左端へ移す)}) \\
&= \exp(iK_2^* H_2) \check{Y}_\mu \exp(-iK_2^* H_2) \quad (\because (2s_2)^{M/2} \left((2s_2)^{M/2} \right)^{-1} = 1) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{[iK_2^* H_2, \dots, [iK_2^* H_2, \check{Y}_\mu] \dots]}_n \quad (\because \text{exp_X_Y_exp_X}) \\
&= i \sinh(2K_2^*) \check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*) \check{Y}_\mu \quad (\because \text{extract_taylor_coefficient_of_check_Z_Y (h2.y)})
\end{aligned}$$

最後に、行ベクトルと列ベクトルの積の定義 $(A, B) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = aA + bB$ により、上の 4 式はいずれも statement の行列表示に書き換えられる。□

主張 15.15 ($(V_1^{(+)})^{1/2}$ による共役写像の $\mathbb{C}$ 線型性). 定義 14.4 と 定義 14.5 の記号を用いる。 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $a, b \in \mathbb{C}$ について、

$$T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu) = aT_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Z}_\mu) + bT_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Y}_\mu)$$

証明. 主張 15.5 より $(V_1^{(+)})^{1/2} \in R^\times$ である。したがって 主張 9.17 で $g = (V_1^{(+)})^{1/2}$ 、 $X = \check{Z}_\mu$ 、 $W = \check{Y}_\mu$ と置けば、

$$T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu) = aT_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Z}_\mu) + bT_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Y}_\mu) \quad (\because \text{主張 9.17}).$$

□

主張 15.16 (V_2 による共役写像の $\mathbb{C}$ 線型性). 定義 14.4 と 定義 14.5 の記号を用いる。 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $a, b \in \mathbb{C}$ について、

$$T_{V_2}(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu) = aT_{V_2}(\check{Z}_\mu) + bT_{V_2}(\check{Y}_\mu)$$

証明. 主張 15.6 より $V_2 \in R^\times$ である。したがって 主張 9.17 で $g = V_2$ 、 $X = \check{Z}_\mu$ 、 $W = \check{Y}_\mu$ と置けば主張を得る。□

定義 15.17 ($B_1(\theta), B_2$ の定義). $\theta \in \mathbb{R}$ について、

$$B_1(\theta) := \begin{pmatrix} \cosh K_1 & -ie^{i\theta} \sinh K_1 \\ ie^{-i\theta} \sinh K_1 & \cosh K_1 \end{pmatrix}, \quad B_2 := \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) & i \sinh(2K_2^*) \\ -i \sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix}$$

と定める (いずれも $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ の元。 K_1, K_2^* は 定義 5.8 の記号)。主張 9.22 の $B_1(\theta_\mu), B_2$ は $\theta = \theta_\mu$ とした場合であり、この定義はそれを $\theta \in \mathbb{R}$ 一般へ広げたものである。

主張 15.18 ($T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}, T_{V_2}$ の $(\check{Z}, \check{Y})$ への直積作用). $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について、

$$\left(T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Z}_\mu), T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Y}_\mu) \right) = (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) B_1(\check{\theta}_\mu)$$

$$(T_{V_2}(\check{Z}_\mu), T_{V_2}(\check{Y}_\mu)) = (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) B_2$$

ここで B_1, B_2 は 定義 15.17 のものであり、行ベクトルと 2×2 行列の積は列ごとの $(A, B) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = aA + bB$ を 2 列並べたもの、すなわち

$$(A, B) \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} := (pA + rB, qA + sB)$$

とする。

証明. 主張 15.14 の 4 式の列ベクトル表示を、 $\check{Z}_\mu$ 分・ $\check{Y}_\mu$ 分の順に 2 列並べる。 $\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と書くとして V_1 分は

$$\begin{aligned} & \left(T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Z}_\mu), T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Y}_\mu) \right) \\ &= \left((\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \begin{pmatrix} \cosh(K_1) & \\ ie^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) & \end{pmatrix}, (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \begin{pmatrix} -ie^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \right) \quad (\because T_actions_on_check_Z_Y \text{ を 2 列へ同時適用}) \\ &= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \begin{pmatrix} \cosh(K_1) & -ie^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \\ ie^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) & \cosh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{statement の行ベクトルと行列の積の定義}) \\ &= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) B_1(\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{def_B1_theta_B2}) \end{aligned}$$

V_2 分も同様に、

$$\begin{aligned} (T_{V_2}(\check{Z}_\mu), T_{V_2}(\check{Y}_\mu)) &= \left((\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) & \\ -i \sinh(2K_2^*) & \end{pmatrix}, (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \begin{pmatrix} i \sinh(2K_2^*) \\ \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix} \right) \quad (\because T_actions_on_check_Z_Y \text{ を 2 列へ同時適用}) \\ &= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) & i \sinh(2K_2^*) \\ -i \sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix} \quad (\because \text{statement の行ベクトルと行列の積の定義}) \\ &= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) B_2 \quad (\because \text{def_B1_theta_B2}) \end{aligned}$$

並べた 2 列がそれぞれ 定義 15.17 の $B_1(\tilde{\theta}_\mu)$ 、 B_2 の第 1 列・第 2 列に一致している。 $\square$

主張 15.19 ($A(\theta) = B_1(\theta)B_2B_1(\theta)$ ($\theta \in \mathbb{R}$ 一般)). $\theta \in \mathbb{R}$ について、定義 15.17 の $B_1(\theta)$ 、 B_2 と 定義 9.20 の $A(\theta)$ の間に

$$B_1(\theta) B_2 B_1(\theta) = A(\theta)$$

が成り立つ。とくに $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ ($\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5)) とすれば $B_1(\tilde{\theta}_\mu)B_2B_1(\tilde{\theta}_\mu) = A(\tilde{\theta}_\mu)$ である。

証明. 以下、記号を

$$a := \cosh K_1 \in \mathbb{R}, \quad b := \sinh K_1 \in \mathbb{R}, \quad C := \cosh 2K_2^* = c_2^* \in \mathbb{R}, \quad S := \sinh 2K_2^* = s_2^* \in \mathbb{R}$$

と略記する ($c_1, s_1, c_2, c_2^*, s_2^*$ は 定義 5.8 の記号)。主張 1.4 による倍角公式から従う次の三本の等式

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= \cosh^2 K_1 + \sinh^2 K_1 \quad (\because a, b \text{ の定義}) \\ &= \cosh 2K_1 \quad (\because \text{主張 1.4 の倍角公式}) \\ &= c_1 \quad (\because \text{定義 5.8 の記号の定義}) \\ 2ab &= 2 \cosh K_1 \sinh K_1 \quad (\because a, b \text{ の定義}) \\ &= \sinh 2K_1 \quad (\because \text{主張 1.4 の倍角公式}) \\ &= s_1 \quad (\because \text{定義 5.8 の記号の定義}) \\ a^2 - b^2 &= \cosh^2 K_1 - \sinh^2 K_1 \quad (\because a, b \text{ の定義}) \\ &= 1 \quad (\because \text{主張 1.4}) \end{aligned}$$

を後で用いる。また複素指数の指数法則 $e^z e^w = e^{z+w}$ としては 定理 4.5 を $n = 1$ に適用したものを使う。この記号で $B_1(\theta) = \begin{pmatrix} a & -ie^{i\theta}b \\ ie^{-i\theta}b & a \end{pmatrix}$ 、 $B_2 = \begin{pmatrix} C & iS \\ -iS & C \end{pmatrix}$ である。

Step 1: $N := B_2 B_1(\theta)$ を成分ごとに計算する (行列の積は 定義 1.8)。

$$\begin{aligned} N_{11} &= C \cdot a + (iS) \cdot (ie^{-i\theta}b) \quad (\because \text{定義 1.8}) \\ &= Ca - Sbe^{-i\theta} \quad (\because i \cdot i = -1 \text{ と複素数の四則}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_{12} &= C \cdot (-ie^{i\theta}b) + (iS) \cdot a \quad (\because \text{定義 1.8}) \\ &= i(Sa - Cbe^{i\theta}) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の分配則と四則}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_{21} &= (-iS) \cdot a + C \cdot (ie^{-i\theta}b) \quad (\because \text{定義 1.8}) \\ &= i(Cbe^{-i\theta} - Sa) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の分配則と四則}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_{22} &= (-iS) \cdot (-ie^{i\theta}b) + C \cdot a \quad (\because \text{定義 1.8}) \\ &= Ca - Sbe^{i\theta} \quad (\because (-i) \cdot (-i) = -1 \text{ と複素数の四則}) \end{aligned}$$

Step 2: $P := B_1(\theta) N = B_1(\theta) B_2 B_1(\theta)$ の (1,1) 成分。

$$\begin{aligned} P_{11} &= a N_{11} + (-ie^{i\theta}b) N_{21} \quad (\because \text{mat_mult}) \\ &= a(Ca - Sbe^{-i\theta}) + (-ie^{i\theta}b) \cdot i(Cbe^{-i\theta} - Sa) \quad (\because \text{Step 1 の } N_{11}, N_{21}) \\ &= Ca^2 - Sab e^{-i\theta} + e^{i\theta}b(Cbe^{-i\theta} - Sa) \quad (\because -i \cdot i = 1) \\ &= Ca^2 - Sab e^{-i\theta} + Cb^2 - Sab e^{i\theta} \quad (\because e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1, \text{ theorem_exp_product } (n=1)) \\ &= C(a^2 + b^2) - Sab(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \\ &= Cc_1 - Sab(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \quad (\because \text{倍角公式 } a^2 + b^2 = c_1) \\ &= Cc_1 - S \cdot \frac{s_1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \quad (\because \text{倍角公式 } 2ab = s_1) \\ &= Cc_1 - S \cdot \frac{s_1}{2} \cdot 2 \cos \theta \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin より } e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta) \\ &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta \quad (\because C := c_2^*, S := s_2^*) \end{aligned}$$

($e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$ は 定理 1.54 による。) これは 定義 9.20 の $A(\theta)$ の (1,1) 成分に一致する。

Step 3: P の (2,2) 成分。

$$\begin{aligned} P_{22} &= (ie^{-i\theta}b) N_{12} + a N_{22} \quad (\because \text{mat_mult}) \\ &= (ie^{-i\theta}b) \cdot i(Sa - Cbe^{i\theta}) + a(Ca - Sbe^{i\theta}) \quad (\because \text{Step 1 の } N_{12}, N_{22}) \\ &= -e^{-i\theta}b(Sa - Cbe^{i\theta}) + Ca^2 - Sab e^{i\theta} \quad (\because i \cdot i = -1) \\ &= -Sab e^{-i\theta} + Cb^2 + Ca^2 - Sab e^{i\theta} \quad (\because e^{-i\theta} e^{i\theta} = 1, \text{ theorem_exp_product } (n=1)) \\ &= C(a^2 + b^2) - Sab(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \\ &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta \quad (\because P_{11} \text{ の計算の最後の 4 段と同じ}) \end{aligned}$$

これは $A(\theta)$ の (2,2) 成分に一致する ((1,1) 成分と同一の式)。

Step 4: P の (1,2) 成分。準備として、補助的な等式

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 e^{2i\theta} &= e^{i\theta} (a^2 e^{-i\theta} + b^2 e^{i\theta}) \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n = 1)) \\
&= e^{i\theta} (a^2 (\cos \theta - i \sin \theta) + b^2 (\cos \theta + i \sin \theta)) \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= e^{i\theta} ((a^2 + b^2) \cos \theta - i (a^2 - b^2) \sin \theta) \\
&= e^{i\theta} (c_1 \cos \theta - i (a^2 - b^2) \sin \theta) \quad (\because \text{倍角公式 } a^2 + b^2 = c_1) \\
&= e^{i\theta} (c_1 \cos \theta - i \sin \theta) \quad (\because a^2 - b^2 = 1)
\end{aligned}$$

を置く (定理 4.5、定理 1.54)。また $c_2^* = s_2^* c_2$ は主張 9.19 による。これらを用いて

$$\begin{aligned}
P_{12} &= a N_{12} + (-i e^{i\theta} b) N_{22} \quad (\because \text{mat_mult}) \\
&= a \cdot i (Sa - Cb e^{i\theta}) + (-i e^{i\theta} b) (Ca - Sb e^{i\theta}) \quad (\because \text{Step 1 の } N_{12}, N_{22}) \\
&= i [Sa^2 - Cab e^{i\theta}] + i [-Cab e^{i\theta} + Sb^2 e^{2i\theta}] \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n = 1) (e^{i\theta} e^{i\theta} = e^{2i\theta})) \\
&= i [S (a^2 + b^2 e^{2i\theta}) - 2Cab e^{i\theta}] \\
&= i [S e^{i\theta} (c_1 \cos \theta - i \sin \theta) - 2Cab e^{i\theta}] \quad (\because \text{準備の補助的な等式}) \\
&= i [S e^{i\theta} (c_1 \cos \theta - i \sin \theta) - C s_1 e^{i\theta}] \quad (\because \text{倍角公式 } 2ab = s_1) \\
&= i e^{i\theta} [s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta) - c_2^* s_1] \quad (\because C := c_2^*, S := s_2^*) \\
&= i e^{i\theta} [s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta) - s_2^* c_2 s_1] \quad (\because \text{duality_c2_star_eq_s2_star_c2 : } c_2^* = s_2^* c_2) \\
&= i e^{i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2)
\end{aligned}$$

得られた P_{12} は定義 9.20 の $A(\theta)$ の (1,2) 成分に一致する。

Step 5: P の (2,1) 成分。

$$\begin{aligned}
P_{21} &= (i e^{-i\theta} b) N_{11} + a N_{21} \quad (\because \text{mat_mult}) \\
&= (i e^{-i\theta} b) (Ca - Sb e^{-i\theta}) + a \cdot i (Cb e^{-i\theta} - Sa) \quad (\because \text{Step 1 の } N_{11}, N_{21}) \\
&= i [Cab e^{-i\theta} - Sb^2 e^{-2i\theta}] + i [Cab e^{-i\theta} - Sa^2] \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n = 1) (e^{-i\theta} e^{-i\theta} = e^{-2i\theta})) \\
&= -i [S (a^2 + b^2 e^{-2i\theta}) - 2Cab e^{-i\theta}]
\end{aligned}$$

準備として、Step 4 の補助的な等式と同形の等式

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 e^{-2i\theta} &= e^{-i\theta} (a^2 e^{i\theta} + b^2 e^{-i\theta}) \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n = 1)) \\
&= e^{-i\theta} (a^2 (\cos \theta + i \sin \theta) + b^2 (\cos \theta - i \sin \theta)) \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= e^{-i\theta} ((a^2 + b^2) \cos \theta + i (a^2 - b^2) \sin \theta) \\
&= e^{-i\theta} (c_1 \cos \theta + i (a^2 - b^2) \sin \theta) \quad (\because \text{倍角公式 } a^2 + b^2 = c_1) \\
&= e^{-i\theta} (c_1 \cos \theta + i \sin \theta) \quad (\because a^2 - b^2 = 1)
\end{aligned}$$

を置く (定理 4.5、定理 1.54)。また $c_2^* = s_2^* c_2$ は主張 9.19 による。これらを用いて、直前の P_{21} の表示から一続きに

$$\begin{aligned}
P_{21} &= -i \left[S \left(a^2 + b^2 e^{-2i\theta} \right) - 2Cab e^{-i\theta} \right] \quad (\because \text{直前の } P_{21} \text{ の表示}) \\
&= -i \left[S e^{-i\theta} (c_1 \cos \theta + i \sin \theta) - 2Cab e^{-i\theta} \right] \quad (\because \text{準備の補助的な等式}) \\
&= -i \left[S e^{-i\theta} (c_1 \cos \theta + i \sin \theta) - C s_1 e^{-i\theta} \right] \quad (\because \text{倍角公式 } 2ab = s_1) \\
&= -i e^{-i\theta} [s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta) - c_2^* s_1] \quad (\because C := c_2^*, S := s_2^*) \\
&= -i e^{-i\theta} [s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta) - s_2^* c_2 s_1] \quad (\because \text{duality_c2_star_eq_s2_star_c2 : } c_2^* = s_2^* c_2) \\
&= -i e^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2)
\end{aligned}$$

これは 定義 9.20 の $A(\theta)$ の (2,1) 成分に一致する。

Step 6: Step 2~5 により $P = B_1(\theta)B_2B_1(\theta)$ の 4 成分すべてが $A(\theta)$ の対応成分に一致するので $B_1(\theta)B_2B_1(\theta) = A(\theta)$ 。 $\theta \in \mathbb{R}$ は任意だったから、定義 14.4 の $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ を代入して後半を得る。 $\square$

主張 15.20 ($T_{(V^{(+)})}$ の $\check{Z}, \check{Y}$ への作用). $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について、

$$(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu), T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)) = (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) A(\tilde{\theta}_\mu), \quad \tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$$

が成り立つ ($T_{(V^{(+)})}$ は 定義 15.8、 $A(\theta)$ は 定義 9.20)。

証明. 以下 $\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記し、定義 15.17 の $B_1(\tilde{\theta}), B_2$ を用いる。

(z) $T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu)$ について、定義 15.8 の定義、主張 15.14、主張 15.16、主張 15.15、主張 15.18 を順に用いる。

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu) &= T_{(V_1^{(+)})}^{1/2} \left(T_{V_2} \left(T_{(V_1^{(+)})}^{1/2}(\check{Z}_\mu) \right) \right) \quad (\because \text{def_T_V_plus}) \\
&= T_{(V_1^{(+)})}^{1/2} \left(T_{V_2} \left(\cosh(K_1) \check{Z}_\mu + i e^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \check{Y}_\mu \right) \right) \quad (\because \text{T_actions_on_check_Z_Y}) \\
&= T_{(V_1^{(+)})}^{1/2} \left((T_{V_2}(\check{Z}_\mu), T_{V_2}(\check{Y}_\mu)) \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ i e^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \end{pmatrix} \right) \quad (\because \text{主張 15.16}) \\
&= T_{(V_1^{(+)})}^{1/2} \left((\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) B_2 \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ i e^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \end{pmatrix} \right) \quad (\because \text{calc_of_TxT_check_Z_Y}) \\
&= \left(T_{(V_1^{(+)})}^{1/2}(\check{Z}_\mu), T_{(V_1^{(+)})}^{1/2}(\check{Y}_\mu) \right) B_2 \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ i e^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 15.15}) \\
&= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) B_1(\tilde{\theta}) B_2 \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ i e^{-i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{calc_of_TxT_check_Z_Y})
\end{aligned}$$

(3 行目・5 行目の線型性は、 B_2 や列ベクトルの成分がスカラーであり、 $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の $\mathbb{C}$ 線型結合に T を掛ける形になっていることによる。)

(y) $T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)$ についても同様に、

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu) &= T_{(V_1^{(+)})^{1/2}} \left(T_{V_2} \left(T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Y}_\mu) \right) \right) \quad (\because \text{def_T_V_plus}) \\
&= T_{(V_1^{(+)})^{1/2}} \left(T_{V_2} \left(-ie^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \check{Z}_\mu + \cosh(K_1) \check{Y}_\mu \right) \right) \quad (\because \text{T_actions_on_check_Z_Y}) \\
&= T_{(V_1^{(+)})^{1/2}} \left((T_{V_2}(\check{Z}_\mu), T_{V_2}(\check{Y}_\mu)) \begin{pmatrix} -ie^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \right) \quad (\because \text{主張 15.16}) \\
&= T_{(V_1^{(+)})^{1/2}} \left((\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) B_2 \begin{pmatrix} -ie^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \right) \quad (\because \text{calc_of_TxT_check_Z_Y}) \\
&= \left(T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Z}_\mu), T_{(V_1^{(+)})^{1/2}}(\check{Y}_\mu) \right) B_2 \begin{pmatrix} -ie^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 15.15}) \\
&= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) B_1(\tilde{\theta}) B_2 \begin{pmatrix} -ie^{i\tilde{\theta}} \sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{calc_of_TxT_check_Z_Y})
\end{aligned}$$

(z) と (y) で得た 2 つの列ベクトルは、定義 15.17 より $B_1(\tilde{\theta})$ の第 1 列・第 2 列そのものである。2 列を並べ、主張 15.19 を $\theta = \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ として適用すると、主張の左辺から一続きに

$$\begin{aligned}
\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu), T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu) \right) &= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) B_1(\tilde{\theta}) B_2 B_1(\tilde{\theta}) \quad (\because (z), (y) \text{ の鎖と def_B1_theta_B2}) \\
&= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) A(\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{factorization_of_A_theta_general})
\end{aligned}$$

□

16 半整数運動量における $A(\tilde{\theta})$ の対角化

注意 16.1 (この章の目的と、整数運動量との違い). 定義 14.4 の半整数運動量 $\tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$ における 定義 9.20 の $A(\tilde{\theta}_\mu)$ を対角化する。

008 章は同じことを整数運動量 $\theta_\mu = \frac{2\pi\mu}{M}$ について行っているが、そこでは 主張 9.26 の示すとおり $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ になる場合 ($\mu = \pm M$ かつ $c_1 = s_1 c_2$ 、すなわち臨界点) があり、そこでは 主張 9.43 の $A(\theta_\mu) = I$ として別扱いが要る。* 半整数運動量では、この例外が起こらない * (主張 16.3)。したがってこの章の主張はすべて $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ と $\mu \in \tilde{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について * 場合分けなし * で述べられる。

この違いは後段で効く。整数運動量では臨界点で $\gamma(\theta_M) = 0$ となり最大固有値が縮退しうるのに対し、半整数運動量では $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ が常に成り立つ (主張 16.10)。

* この章で扱うのは $A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化までである。* フェルミオン $\check{\psi}$ の導入から先へは進まない。

定義 16.2 ($\gamma_1(\theta), \gamma_2(\theta)$ ($\theta \in \mathbb{R}$)). 定義 5.8 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、 $\theta \in \mathbb{R}$ について

$$\gamma_1(\theta) := c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta \in \mathbb{R}, \quad \gamma_2(\theta) := i e^{i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2) \in \mathbb{C}$$

と定める。このとき 定義 9.20 の $A(\theta)$ は

$$A(\theta) = \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta) & \gamma_2(\theta) \\ -\gamma_2(-\theta) & \gamma_1(\theta) \end{pmatrix}$$

と書ける。

証明. 定義 9.20 の (1, 1) 成分と (2, 2) 成分は $c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta = \gamma_1(\theta)$ 、(1, 2) 成分は $i e^{i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2) = \gamma_2(\theta)$ であり、定義そのものである。

(2, 1) 成分については、 $\cos(-\theta) = \cos \theta$ 、 $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ より

$$\begin{aligned}\gamma_2(-\theta) &= i e^{i(-\theta)} s_2^* (c_1 \cos(-\theta) - i \sin(-\theta) - s_1 c_2) \quad (\because \text{本ブロックの } \gamma_2 \text{ の定義式を } \theta \rightarrow -\theta \text{ として適用}) \\ &= i e^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin(-\theta) - s_1 c_2) \quad (\because \cos(-\theta) = \cos \theta) \\ &= i e^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2) \quad (\because \sin(-\theta) = -\sin \theta)\end{aligned}$$

であるから $-\gamma_2(-\theta) = -i e^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2)$ となり、定義 9.20 の (2, 1) 成分に一致する。□

主張 16.3 ($\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ (例外なし)) . 定義 5.8 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 14.4 の $\tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$ について、** すべての $\mu \in \tilde{M}$ (定義 14.5) と、すべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ (臨界点 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ を含む) について **

$$\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。負の運動量側の非零性は、後で共役関係から導く。

これは整数運動量との決定的な違いである。主張 9.26 では $\mu = \pm M$ かつ $c_1 = s_1 c_2$ のとき $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となり、008 章・009 章はそこを例外として別扱いしなければならなかった。** 半整数運動量では、その例外処理が不要になる。*

証明. Step 0 (正值性)。主張 9.26 の Step 0 と同じ議論により、 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ から $K_2^* = -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2) > 0$ が従い、

$$c_1 = \cosh 2K_1 > 0, \quad s_1 = \sinh 2K_1 > 0, \quad c_2 = \cosh 2K_2 > 0, \quad s_2^* = \sinh 2K_2^* > 0$$

が成り立つ。

Step 1 (零点の必要条件)。定義 16.2 より $\gamma_2(\theta) = (i e^{i\theta} s_2^*) w(\theta)$ 、 $w(\theta) := c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2$ である。 $|i e^{i\theta} s_2^*| = s_2^* > 0$ (主張 1.41 と 定理 1.54) なので第 1 因子は $0_{\mathbb{C}}$ でなく、 $\mathbb{C}$ は体 (主張 1.35) ゆえ零因子を持たないから

$$\begin{aligned}\gamma_2(\theta) = 0_{\mathbb{C}} &\iff (i e^{i\theta} s_2^*) w(\theta) = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \gamma_1, \gamma_2 \text{ の定義}) \\ &\iff w(\theta) = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because i e^{i\theta} s_2^* \neq 0 \text{ と、体 } \mathbb{C} \text{ が零因子を持たないこと}) \\ &\iff \begin{cases} \sin \theta = 0 \\ c_1 \cos \theta = s_1 c_2 \end{cases} \quad (\because \text{複素数の定義の成分表示 (実部と虚部が共に0)})\end{aligned}$$

(定義 1.11 の成分表示で $w(\theta) = (c_1 \cos \theta - s_1 c_2, -\sin \theta) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ であり、零元は $(0, 0)$ である。ここまでは 主張 9.26 の Step 1・Step 2 と同じ計算で、 θ が整数運動量か半整数運動量かに依存していない。)

Step 2 ($\sin \tilde{\theta}_\mu = 0$ が要求すること)。 $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ とする。実数 t に対する $\sin t = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z} : t = k\pi$ と 定義 14.4 の $\tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$ より

$$\begin{aligned}\sin \tilde{\theta}_\mu = 0 &\iff \exists k \in \mathbb{Z} : \tilde{\theta}_\mu = k\pi \quad (\because \sin t = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z} : t = k\pi) \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z} : \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M} = k\pi \quad (\because \tilde{\theta}_\mu \text{ の定義}) \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z} : \frac{2(\mu - \frac{1}{2})}{M} = k \quad (\because \text{両辺を } \pi > 0 \text{ で割る}) \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z} : 2(\mu - \frac{1}{2}) = kM \quad (\because \text{両辺を } M \neq 0 \text{ 倍する}) \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z} : 2\mu - 1 = kM \quad (\because \text{分配則 } 2(\mu - \frac{1}{2}) = 2\mu - 1)\end{aligned}$$

ここが整数運動量との分かれ目である：** 左辺 $2\mu - 1$ は奇数 ** なので、 kM も奇数でなければならず、したがって k は奇数である (k が偶数なら kM は偶数)。

Step 3 (そのとき $\cos \tilde{\theta}_\mu = -1$)。Step 2 の $\tilde{\theta}_\mu = k\pi$ と k が奇数であることから、

$$\begin{aligned}\cos \tilde{\theta}_\mu &= \cos(k\pi) \quad (\because \text{Step 2 の } \tilde{\theta}_\mu = k\pi) \\ &= (-1)^k \quad (\because k \in \mathbb{Z} \text{ に対し } \cos(k\pi) = (-1)^k) \\ &= -1 \quad (\because \text{Step 2 より } k \text{ は奇数})\end{aligned}$$

Step 4 (矛盾)。Step 1 の第 2 式に Step 3 を代入すると

$$\begin{aligned}s_1 c_2 &= c_1 \cos \tilde{\theta}_\mu \quad (\because \text{Step 1 の連立条件の第 2 式}) \\ &= c_1 \cdot (-1) \quad (\because \text{Step 3 の } \cos \tilde{\theta}_\mu = -1) \\ &= -c_1 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の積の符号規則 } a \cdot (-1) = -a)\end{aligned}$$

が要求される。しかし Step 0 より $s_1 c_2 > 0$ かつ $-c_1 < 0$ であり、これは矛盾である。よって Step 1 の連立条件は成り立たず、 $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0_{\mathbb{C}}$ 。

(主張 9.26 では $\sin \theta_\mu = 0$ から $\cos \theta_\mu = +1$ ($\mu = \pm M$) と $\cos \theta_\mu = -1$ ($\mu = \pm M/2$) の 2 つの場合が生じ、矛盾で消せるのは後者だけだった。半整数運動量では $2\mu - 1$ が奇数であることにより $\cos \tilde{\theta}_\mu = +1$ の場合が最初から起こらない。) $\square$

主張 16.4 ($\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = \overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}$ とその帰結). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について、

$$(1) \quad \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = \overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}, \quad (2) \quad \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|^2 < 0$$

が成り立つ。とくに $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ は ** 負の実数 ** であり (主張 16.3 より狭義に負)、

$$(3) \quad \arg^{[0, 2\pi)}\left(\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right) = \pi, \quad (4) \quad \sqrt{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| > 0$$

$$(5) \quad \sqrt{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = i \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$$

も成り立つ ($\sqrt{\cdot}$ は 定義 1.47 の、偏角を $[0, 2\pi)$ で取る一価の写像)。また $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ 。

証明. (1) $\theta := \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ と略記する (定義 14.4 より $\tilde{\theta}_\mu$ は ** 実数 ** であり、以下の共役の計算はこの実数性を使う)。定義 16.2 の証明中で確かめたとおり

$$\gamma_2(-\theta) = i e^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2) \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta})$$

である。一方 $\overline{\gamma_2(\theta)}$ を 1 段ずつ計算する。用いるのは、複素共役が積を保つこと $\overline{zw} = \bar{z} \bar{w}$ 、和を保つこと $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$ 、実数が共役で不変であること、および $\bar{i} = -i$ である (定義 1.11 の成分表示から従う)。 c_1, c_2, s_1, s_2^* が実数であることは 定義 5.8、 $\cos \theta, \sin \theta$ が実数であることは $\theta \in \mathbb{R}$ による。

$$\begin{aligned}
\overline{\gamma_2(\theta)} &= \overline{i e^{i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2)} \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta}) \\
&= \bar{i} e^{i\theta} \overline{s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2)} \quad (\because \text{複素共役が積を保つこと}) \\
&= (-i) e^{i\theta} \overline{s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2)} \quad (\because \bar{i} = -i) \\
&= (-i) e^{-i\theta} \overline{s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2)} \quad (\because \theta \in \mathbb{R} \text{ と euler_formula_cos_sin より } \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}) \\
&= (-i) e^{-i\theta} s_2^* \overline{(c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2)} \quad (\because s_2^* \in \mathbb{R}) \\
&= (-i) e^{-i\theta} s_2^* (\overline{c_1 \cos \theta} - \overline{i \sin \theta} - \overline{s_1 c_2}) \quad (\because \text{複素共役が和・差を保つこと}) \\
&= (-i) e^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2) \quad (\because c_1 \cos \theta, \sin \theta, s_1 c_2 \in \mathbb{R} \text{ と } \bar{i} = -i) \\
&= -\left(i e^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta + i \sin \theta - s_1 c_2)\right) \quad (\because \text{複素数の四則}) \\
&= -\gamma_2(-\theta) \quad (\because \text{上の } \gamma_2(-\theta) \text{ の表示})
\end{aligned}$$

$(\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta})$ は定理 1.54 の $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ と $\theta \in \mathbb{R}$ 、すなわち $\cos \theta, \sin \theta$ が実数であることから従う。 $**\theta$ が実数であるという前提をここで使っている。 $**$) 上の補助的な等式から、主張 (1) の左辺より

$$\gamma_2(-\theta) = -\overline{\gamma_2(\theta)} \quad (\because \overline{\gamma_2(\theta)} = -\gamma_2(-\theta) \text{ と複素数の四則})$$

を得る。これは 主張 9.27 と同じ計算であり、 θ が実数でありさえすれば成り立つ（整数運動量であることを使っていない）。

(2) (1) と $z\bar{z} = |z|^2$ (主張 1.41) より

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= \gamma_2(\theta) \left(-\overline{\gamma_2(\theta)}\right) \quad (\because (1)) \\
&= -\gamma_2(\theta)\overline{\gamma_2(\theta)} \\
&= -|\gamma_2(\theta)|^2 \quad (\because \text{abs_basic_properties } (z\bar{z} = |z|^2))
\end{aligned}$$

主張 16.3 より $\gamma_2(\theta) \neq 0$ なので $|\gamma_2(\theta)|^2 > 0$ 、したがってこの値は狭義に負の実数である。また (1) より $\gamma_2(-\theta) = -\overline{\gamma_2(\theta)} \neq 0$ (複素共役は 0 を 0 にしか写さない)。

(3) 負の実数の偏角は π である。すなわち $r := |\gamma_2(\theta)|^2 > 0$ として $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = -r = r e^{i\pi}$ であり、 $\pi \in [0, 2\pi)$ だから $\arg^{[0, 2\pi)}(-r) = \pi$ (主張 1.28 の一意性)。これは 主張 9.28 の半整数運動量版である。

(4) $-\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = |\gamma_2(\theta)|^2$ は $**$ 正 $**$ の実数なので $\arg^{[0, 2\pi)} = 0$ であり、定義 1.47 より

$$\begin{aligned}
\sqrt{-\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)} &= \sqrt{|\gamma_2(\theta)|^2} e^{i \cdot 0/2} \quad (\because \text{def_sqrt_cc を絶対値 } |\gamma_2(\theta)|^2, \text{ 偏角 } 0 \text{ に適用}) \\
&= \sqrt{|\gamma_2(\theta)|^2} \quad (\because e^{i \cdot 0} = 1) \\
&= |\gamma_2(\theta)| \quad (\because \text{sqrt_nonnegative_existence_uniqueness と } |\gamma_2(\theta)| \geq 0) \\
&> 0 \quad (\because \text{gamma_2_theta_tilde_nonzero})
\end{aligned}$$

(絶対値の非負平方根は 主張 1.5、正值性は 主張 16.3 による。)

(5) (3) より $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)$ は絶対値 $|\gamma_2(\theta)|^2$ 、偏角 π なので、定義 1.47 より

$$\begin{aligned}
\sqrt{\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)} &= \sqrt{|\gamma_2(\theta)|^2} e^{i\pi/2} \quad (\because \text{def_sqrt_cc を絶対値 } |\gamma_2(\theta)|^2, \text{ 偏角 } \pi \text{ に適用}) \\
&= |\gamma_2(\theta)| e^{i\pi/2} \quad (\because \text{sqrt_nonnegative_existence_uniqueness}) \\
&= |\gamma_2(\theta)| \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right) \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin}) \\
&= i |\gamma_2(\theta)| \quad (\because \cos \frac{\pi}{2} = 0, \sin \frac{\pi}{2} = 1 \text{ と複素数の四則})
\end{aligned}$$

(非負平方根は 主張 1.5 による。)

□

主張 16.5 ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ の固有値と固有ベクトル). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について、 $A(\tilde{\theta}_\mu)$ の固有値は

$$\lambda_{\pm, \mu} := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \pm |\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)| \in \mathbb{R}$$

の 2 つであり (主張 16.4 (4) により根号は正の実数、したがって $\lambda_{+, \mu} \neq \lambda_{-, \mu}$)、対応する固有ベクトルは $c \in \mathbb{C}^\times$ として

$$v_{\pm, \mu} = c \begin{pmatrix} \pm i \sqrt{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \\ \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} \mp |\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)| \\ \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \end{pmatrix}$$

である。主張 9.31 と違い、 $\gamma_2 = 0$ の場合分けは ** 起こらない ** (主張 16.3)。

証明. 以下 $\theta := \tilde{\theta}_\mu$, $g_1 := \gamma_1(\theta) \in \mathbb{R}$, $a := \gamma_2(\theta) \in \mathbb{C}$, $b := \gamma_2(-\theta) \in \mathbb{C}$, $r := |a| \in \mathbb{R}_{>0}$ と略記する (主張 16.3 より $a \neq 0$ なので $r > 0$)。主張 16.4 より $b = -\bar{a}$, $ab = -r^2$, $\sqrt{-ab} = r$, $\sqrt{ab} = ir$ である。

Step 1 (固有値がこの 2 つに限ること)。定義 16.2 より $A(\theta) = \begin{pmatrix} g_1 & a \\ -b & g_1 \end{pmatrix}$ なので、 $\lambda \in \mathbb{C}$ が固有値であることは $\det(A(\theta) - \lambda I) = 0$ と同値であり、
準備として、因数分解の恒等式を確かめる。

$$\begin{aligned} (\lambda - (g_1 + r))(\lambda - (g_1 - r)) &= \lambda^2 - (g_1 - r)\lambda - (g_1 + r)\lambda + (g_1 + r)(g_1 - r) \quad (\because \text{分配則}) \\ &= \lambda^2 - 2g_1\lambda + (g_1 + r)(g_1 - r) \quad (\because \text{同類項の統合}) \\ &= \lambda^2 - 2g_1\lambda + (g_1^2 - g_1r + rg_1 - r^2) \quad (\because \text{分配則}) \\ &= \lambda^2 - 2g_1\lambda + (g_1^2 - r^2) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則と加法逆元}) \end{aligned}$$

そこで

$$\begin{aligned} \det(A(\theta) - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} g_1 - \lambda & a \\ -b & g_1 - \lambda \end{pmatrix} \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta}) \\ &= (g_1 - \lambda)(g_1 - \lambda) - a \cdot (-b) \quad (\because 2 \times 2 \text{ 行列の行列式の定義}) \\ &= (g_1 - \lambda)(g_1 - \lambda) + ab \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } (-a \cdot (-b) = ab)) \\ &= g_1^2 - g_1\lambda - \lambda g_1 + \lambda^2 + ab \quad (\because \text{分配則}) \\ &= g_1^2 - g_1\lambda - g_1\lambda + \lambda^2 + ab \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則}) \\ &= g_1^2 - 2g_1\lambda + \lambda^2 + ab \quad (\because \text{同類項の統合}) \\ &= \lambda^2 - 2g_1\lambda + (g_1^2 + ab) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の交換則と結合則}) \\ &= \lambda^2 - 2g_1\lambda + (g_1^2 - r^2) \quad (\because \text{準備の略記 } ab = -r^2) \\ &= (\lambda - (g_1 + r))(\lambda - (g_1 - r)) \quad (\because \text{準備の因数分解の恒等式}) \end{aligned}$$

である。 $\mathbb{C}$ は体 (主張 1.35) ゆえ零因子を持たないから、この積が 0 になるのは $\lambda = g_1 \pm r$ のときに限る。主張 16.4 (4) の $\sqrt{-ab} = r$ より、これは statement の $\lambda_{\pm, \mu}$ に一致する。 $r > 0$ なので $\lambda_{+, \mu} - \lambda_{-, \mu} = 2r \neq 0$ 。

Step 2 ($v_{\pm, \mu}$ が固有ベクトルであること)。主張 16.4 (5) より $\pm i\sqrt{ab} = \pm i \cdot ir = \mp r$ なので、statement の 2 つの表示は一致する。 $c = 1$ として $v_{\pm} := (\mp r, b)^T$ を代入すると、 $b = -\bar{a}$ と $a\bar{a} = r^2$ より第 1 成分は

$$\begin{aligned}
(A(\theta)v_{\pm})_1 &= g_1(\mp r) + a b \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta と行列とベクトルの積の定義}) \\
&= \mp g_1 r + a(-\bar{a}) \quad (\because \text{relation_of_gamma_2_theta_tilde (1) } (b = -\bar{a})) \\
&= \mp g_1 r - r^2 \quad (\because \text{abs_basic_properties } (a\bar{a} = |a|^2 = r^2)) \\
&= (g_1 \pm r)(\mp r) \quad (\because \text{分配則 } ((g_1 \pm r)(\mp r) = \mp g_1 r - r^2)) \\
&= \lambda_{\pm, \mu} (v_{\pm})_1 \quad (\because \lambda_{\pm, \mu} = g_1 \pm r, (v_{\pm})_1 = \mp r)
\end{aligned}$$

第 2 成分は 主張 16.4 (1) の $b = -\bar{a}$ 、すなわち $-b = \bar{a}$ より

$$\begin{aligned}
(A(\theta)v_{\pm})_2 &= (-b)(\mp r) + g_1 b \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta と行列とベクトルの積の定義}) \\
&= \bar{a}(\mp r) + g_1(-\bar{a}) \quad (\because \text{relation_of_gamma_2_theta_tilde (1) } (-b = \bar{a}) \text{ を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= (\mp r - g_1)\bar{a} \quad (\because \text{分配則で } \bar{a} \text{ を括り出す}) \\
&= (g_1 \pm r)(-\bar{a}) \quad (\because \mp r - g_1 = -(g_1 \pm r)) \\
&= \lambda_{\pm, \mu} (v_{\pm})_2 \quad (\because \lambda_{\pm, \mu} = g_1 \pm r, (v_{\pm})_2 = b = -\bar{a})
\end{aligned}$$

よって $A(\theta)v_{\pm} = \lambda_{\pm, \mu}v_{\pm}$ 。 $b \neq 0$ (主張 16.4) より $v_{\pm} \neq 0$ であり、これは固有ベクトルである。 $c \in \mathbb{C}^{\times}$ 倍しても固有ベクトルであることは次による。

$$\begin{aligned}
A(\theta)(cv) &= c A(\theta)v \quad (\because \text{行列とベクトルの積の各成分の分配則 (スカラー倍は積の外へ出る)}) \\
&= c(\lambda v) \quad (\because \text{上で示した } A(\theta)v = \lambda v \text{ の代入}) \\
&= \lambda(cv) \quad (\because \text{複素数の積の可換性と、ベクトルのスカラー倍の結合})
\end{aligned}$$

Step 3 (固有空間がこれで尽きること)。 $\lambda_{+, \mu} \neq \lambda_{-, \mu}$ なので $A(\theta) - \lambda_{\pm, \mu}I \neq 0$ であり (差を取ると $(\lambda_{-, \mu} - \lambda_{+, \mu})I \neq 0$)、その行列式は 0 なので階数は 1、したがって各固有空間は 1 次元である。ゆえに固有ベクトルは $v_{\pm, \mu}$ の $\mathbb{C}^{\times}$ 倍に限る。 $\square$

主張 16.6 ($A(\tilde{\theta}_{\mu})$ の対角化 $(\check{P}_{\mu}, \check{D}_{\mu})$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について、主張 16.5 の任意定数を $c = \frac{1}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu})}$ と選んで

$$\check{P}_{\mu} := \begin{pmatrix} \frac{-|\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu})|}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu})} & \frac{+|\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu})|}{2\sqrt{M}\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu})} \\ \frac{1}{2\sqrt{M}} & \frac{1}{2\sqrt{M}} \end{pmatrix}, \quad \check{D}_{\mu} := \begin{pmatrix} \lambda_{+, \mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-, \mu} \end{pmatrix}$$

とおく。このとき

$$\det \check{P}_{\mu} = \frac{-|\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu})|}{2M\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu})} \neq 0_{\mathbb{C}}, \quad A(\tilde{\theta}_{\mu}) = \check{P}_{\mu} \check{D}_{\mu} \check{P}_{\mu}^{-1}$$

が成り立つ。主張 9.32 と違い $\gamma_2 = 0$ の場合分けは不要である。

証明. 主張 16.5 の記号 $a := \gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu})$ 、 $b := \gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu})$ 、 $r := |a|$ を使う。

Step 1 (各成分が定まること)。主張 16.3 と 主張 16.4 より $a \neq 0$ かつ $b \neq 0$ 。また $M \geq 2$ より $\sqrt{M} > 0$ (主張 1.5)。よって分母 $2\sqrt{M}b \neq 0$ であり、 $c := \frac{1}{2\sqrt{M}b} \in \mathbb{C}^{\times}$ が定まって $\check{P}_{\mu}$ の 4 成分はすべて定まる。

Step 2 (2 つの列が固有ベクトルであること)。主張 16.5 の $v_{\pm, \mu} = c(\mp r, b)^{\top}$ に上の c を代入すると、第 2 成分は次の鎖で定まる。

$$\begin{aligned}
cb &= \frac{1}{2\sqrt{M}b} b \quad (\because c \text{ の定義}) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{M}} \quad (\because b \neq 0 \text{ と } \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

したがって $v_{+,\mu}, v_{-,\mu}$ はそれぞれ $\check{P}_\mu$ の第 1 列・第 2 列に一致する。行列の積を列ごとに見れば

$$\begin{aligned}
A(\tilde{\theta}_\mu) \check{P}_\mu &= \begin{pmatrix} A(\tilde{\theta}_\mu)v_{+,\mu} & A(\tilde{\theta}_\mu)v_{-,\mu} \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積を列ごとに見た}) \\
&= (\lambda_{+,\mu}v_{+,\mu} \quad \lambda_{-,\mu}v_{-,\mu}) \quad (\because \text{eigenvector_of_A_theta_tilde を 2 列へ同時適用}) \\
&= \check{P}_\mu \check{D}_\mu \quad (\because \check{D}_\mu = \text{diag}(\lambda_{+,\mu}, \lambda_{-,\mu}) \text{ の右乗が列ごとのスカラー倍})
\end{aligned}$$

Step 3 ($\det \check{P}_\mu$)。 2×2 行列の行列式の定義より

$$\begin{aligned}
\det \check{P}_\mu &= \frac{-r}{2\sqrt{M}b} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M}} - \frac{+r}{2\sqrt{M}b} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M}} \quad (\because 2 \times 2 \text{ 行列の行列式の定義}) \\
&= \frac{-r}{4Mb} - \frac{+r}{4Mb} \quad \left(\because (2\sqrt{M})^2 = 4M \right) \\
&= \frac{-r}{4Mb} + \frac{-r}{4Mb} \quad (\because -\frac{+r}{4Mb} = \frac{-r}{4Mb} \circ \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= 2 \cdot \frac{-r}{4Mb} \quad (\because \text{同類項の統合}) \\
&= \frac{-r}{2Mb} \quad (\because 2M \neq 0 \text{ と } \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

$r > 0$ 、 $2M \neq 0$ 、 $b \neq 0$ と $\mathbb{C}$ が零因子を持たないこと (主張 1.35) から $\det \check{P}_\mu \neq 0_{\mathbb{C}}$ 。

Step 4 (対角化)。 $\det \check{P}_\mu \neq 0$ より $\check{P}_\mu^{-1}$ が存在するので、Step 2 の両辺に右から掛けて次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
A(\tilde{\theta}_\mu) &= A(\tilde{\theta}_\mu) (\check{P}_\mu \check{P}_\mu^{-1}) \quad (\because \check{P}_\mu \check{P}_\mu^{-1} = I \text{ と積の単位元}) \\
&= (A(\tilde{\theta}_\mu) \check{P}_\mu) \check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \\
&= (\check{P}_\mu \check{D}_\mu) \check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \check{P}_\mu \check{D}_\mu \check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合則})
\end{aligned}$$

□

主張 16.7 ($\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1$)。定義 5.8 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について、

$$\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1, \quad \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 + \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = 1, \quad \lambda_{+,\mu} \lambda_{-,\mu} = 1$$

が成り立つ。とくに 主張 16.4 (2) と合わせて

$$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 = 1 + \left| \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \right|^2$$

証明. 以下 $\theta := \tilde{\theta}_\mu$ 、 $u := \cos \theta \in \mathbb{R}$ 、 $v := \sin \theta \in \mathbb{R}$ ($u^2 + v^2 = 1$) と略記する。主張 9.37 の証明と同じ計算だが、そこで θ_μ について書かれていた各段は $\theta \in \mathbb{R}$ についての恒等式であり、 θ が整数運動量であることをどこにも使っていない。ここでは $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ としてそのまま辿る。

Step 0: 使う 3 つの関係式。

$$(i) \ c_1^2 - s_1^2 = 1, \quad (ii) \ (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1, \quad (iii) \ c_2 s_2^* = c_2^*$$

(i) は $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ (主張 1.4) を $x = 2K_1$ に、(ii) は $x = 2K_2^*$ に適用したもの、(iii) は 主張 9.19 である。

Step 1: 行列式。定義 16.2 より

$$\begin{aligned}\det A(\theta) &= \det \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta) & \gamma_2(\theta) \\ -\gamma_2(-\theta) & \gamma_1(\theta) \end{pmatrix} \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta}) \\ &= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) - \gamma_2(\theta)(-\gamma_2(-\theta)) \quad (\because 2 \times 2 \text{ 行列の行列式の定義}) \\ &= \gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積と加法逆元})\end{aligned}$$

これで第 1 の量と第 2 の量が等しいことが言えた。残りはこの値が 1 であることである。

Step 2: $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)$ の実部表示。定義 16.2 より

$$\gamma_2(\theta) = i e^{i\theta} s_2^* ((c_1 u - s_1 c_2) - iv), \quad \gamma_2(-\theta) = i e^{-i\theta} s_2^* ((c_1 u - s_1 c_2) + iv)$$

$i \cdot i = -1$ である。また、定理 4.5 ($n = 1$ に適用する) と 定理 4.6 より

$$\begin{aligned}e^{i\theta} e^{-i\theta} &= e^{i\theta + (-i\theta)} \quad (\because \text{可換な指数の積公式を } n = 1 \text{ に適用}) \\ &= e^0 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法 } i\theta + (-i\theta) = 0) \\ &= 1 \quad (\because e^0 = 1)\end{aligned}$$

である。さらに $(a_0 - iv)(a_0 + iv) = a_0^2 + v^2$ ($a_0 := c_1 u - s_1 c_2 \in \mathbb{R}$) より

$$\begin{aligned}\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= (i \cdot i) (e^{i\theta} e^{-i\theta}) (s_2^*)^2 (a_0 - iv)(a_0 + iv) \quad (\because \text{直前の 2 式と } \mathbb{C} \text{ の積の可換性}) \\ &= (-1) \cdot 1 \cdot (s_2^*)^2 (a_0 - iv)(a_0 + iv) \quad (\because i \cdot i = -1 \text{ と直前の式変形 } e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1) \\ &= -(s_2^*)^2 (a_0^2 + v^2) \quad (\because (a_0 - iv)(a_0 + iv) = a_0^2 + v^2) \\ &= -(s_2^*)^2 ((c_1 u - s_1 c_2)^2 + v^2) \quad (\because a_0 := c_1 u - s_1 c_2) \\ &= -(s_2^*)^2 ((c_1 u - s_1 c_2)^2 + 1 - u^2) \quad (\because u^2 + v^2 = 1)\end{aligned}$$

Step 3: 展開。 $\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* u$ より

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta)^2 &= (c_1 c_2^* - s_1 s_2^* u)^2 \quad (\because \text{直前の表示の代入}) \\ &= c_1^2 (c_2^*)^2 - 2c_1 c_2^* s_1 s_2^* u + s_1^2 (s_2^*)^2 u^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則による展開})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= -(s_2^*)^2 (c_1^2 u^2 - 2c_1 s_1 c_2 u + s_1^2 c_2^2 + 1 - u^2) \quad (\because \text{Step 2 の最終式で } (c_1 u - s_1 c_2)^2 \text{ を分配則で展開}) \\ &= -c_1^2 (s_2^*)^2 u^2 + 2c_1 s_1 c_2 (s_2^*)^2 u - s_1^2 c_2^2 (s_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則})\end{aligned}$$

Step 4: (iii) による c_2 の消去。

$$\begin{aligned}2c_1 s_1 c_2 (s_2^*)^2 u &= 2c_1 s_1 (c_2 s_2^*) s_2^* u \quad (\because \mathbb{R} \text{ の積の結合律と可換律}) \\ &= 2c_1 s_1 c_2^* s_2^* u \quad (\because \text{(iii) } (c_2 s_2^* = c_2^*)) \\ s_1^2 c_2^2 (s_2^*)^2 &= s_1^2 (c_2 s_2^*)^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の積の結合律と可換律}) \\ &= s_1^2 (c_2^*)^2 \quad (\because \text{(iii) } (c_2 s_2^* = c_2^*))\end{aligned}$$

これを代入して Step 3 の 2 式を足すと

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= (c_1^2 (c_2^*)^2 - 2c_1 c_2^* s_1 s_2^* u + s_1^2 (s_2^*)^2 u^2) \\ &\quad + (-c_1^2 (s_2^*)^2 u^2 + 2c_1 s_1 c_2^* s_2^* u - s_1^2 (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2) \quad (\because \text{Step 3 の 2 式と Step 4 の代入}) \\ &= (c_1^2 - s_1^2) (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2 (s_1^2 - c_1^2 + 1) \quad (\because u \text{ の 1 次項の相殺と同類項の整理})\end{aligned}$$

(u の 1 次の項が相殺した。これが (iii) を使った箇所である。)

Step 5: (i)(ii) による結論。(i) より $s_1^2 - c_1^2 + 1 = 0$ なので u^2 の項は消え、同じく (i) より第 1 項は $(c_2^*)^2$ 。よって (ii) より

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= (c_1^2 - s_1^2)(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2 \cdot 0 \quad (\because (i) (s_1^2 - c_1^2 + 1 = 0)) \\ &= 1 \cdot (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 \quad (\because (i) (c_1^2 - s_1^2 = 1)) \\ &= 1 \quad (\because (ii) ((c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1))\end{aligned}$$

Step 1 と合わせて $\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1$ 。

Step 6: 固有値の積。主張 16.5 の $\lambda_{\pm, \mu} = \gamma_1(\theta) \pm r$ ($r = |\gamma_2(\theta)|$) と 主張 16.4 (2) の $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = -r^2$ より

$$\begin{aligned}\lambda_{+, \mu}\lambda_{-, \mu} &= (\gamma_1(\theta) + r)(\gamma_1(\theta) - r) \quad (\because \text{eigenvector of } A_{\text{theta_tilde}}) \\ &= \gamma_1(\theta)^2 - r^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則による平方差}) \\ &= \gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) \quad (\because \text{relation of } \gamma_2_{\text{theta_tilde}}(2)) \\ &= 1 \quad (\because \text{Step 5})\end{aligned}$$

最後に、 $\gamma_1(\theta)^2 = 1 + r^2$ を示す。主張の左辺より

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta)^2 &= \gamma_1(\theta)^2 + (\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) + r^2) \quad (\because \text{上で引いた } \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = \overline{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)} \text{ とその帰結 (2) より } \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) + r^2 = 0_{\mathbb{C}}) \\ &= (\gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)) + r^2 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の結合法則}) \\ &= 1 + r^2 \quad (\because \text{Step 5})\end{aligned}$$

を得る。 $r = |\gamma_2(\theta)|$ (Step 6) なので、これが主張の最後の等式である。 $\square$

主張 16.8 ($\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, $\mu \in \check{M}$ (定義 14.5) について、

$$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \geq 1, \quad \text{さらに} \quad \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$$

が成り立つ。主張 9.38 は整数運動量について ≥ 1 しか述べられない (臨界点の $\mu = \pm M$ で等号が起こる) が、半整数運動量では 主張 16.3 により ** 狭義の不等号 ** が成り立つ。これは後段で最大固有値の一意性に使う。

証明. Step 1 ($\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 0$)。 $x \in \mathbb{R}$ について $\cosh x - \sinh x = e^{-x} > 0$ (主張 1.4) なので $c_1 > s_1 > 0$, $c_2^* > s_2^* > 0$ ($K_1, K_2^* > 0$ より $s_1, s_2^* > 0$)。また $\cos \tilde{\theta}_\mu \leq 1$ である。定義 16.2 の定義から

$$\begin{aligned}\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \tilde{\theta}_\mu \quad (\because \gamma_1 \text{ の定義}) \\ &\geq c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \quad (\because \cos \tilde{\theta}_\mu \leq 1 \text{ かつ } s_1 s_2^* > 0) \\ &> s_1 s_2^* - s_1 s_2^* \quad (\because c_1 > s_1 > 0, c_2^* > s_2^* > 0 \text{ より } c_1 c_2^* > s_1 s_2^*) \\ &= 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\end{aligned}$$

Step 2 ($\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 > 1$)。主張の左辺から 主張 16.7 と 主張 16.3 を順に引くと

$$\begin{aligned}\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 &= 1 + \left| \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \right|^2 \quad (\because \det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1 \text{ と固有値の積}) \\ &> 1 + 0 \quad (\because \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0 \text{ より } \left| \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \right|^2 > 0) \\ &= 1 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\end{aligned}$$

Step 3 (結論)。 $t := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ と置く。Step 2 より $t^2 > 1$ である。一方、 $t \leq 1$ と仮定すると

$$\begin{aligned}
t^2 &= t \cdot t \quad (\because \text{平方の定義}) \\
&\leq 1 \cdot t \quad (\because t \leq 1 \text{ の両辺に } 0 < t \text{ を掛ける}) \\
&\leq 1 \cdot 1 \quad (\because t \leq 1 \text{ の両辺に } 0 < 1 \text{ を掛ける}) \\
&= 1 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の乗法単位元})
\end{aligned}$$

となり Step 2 の $t^2 > 1$ と矛盾する。したがって $t > 1$ 、すなわち $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$ である。さらに $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \geq 1$ は狭義不等式から従う。 $\square$

定義 16.9 ($\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ の定義). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について、主張 16.8 の $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \geq 1$ により well-defined であり、

$$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) := \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める。ここで $\operatorname{arccosh}(y)$ ($y \geq 1$) は $\cosh t = y$ を満たす唯一の $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である ($\cosh$ は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上で狭義単調増加なので一意)。

さらに 主張 16.8 の $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$ より

$$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$$

である ($\gamma(\tilde{\theta}_\mu) = 0$ なら $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) = \cosh 0 = 1$ となり矛盾する)。定義 9.39 の整数運動量版では $\gamma(\theta_\mu) \geq 0$ しか言えない。

主張 16.10 ($\lambda_{\pm, \mu} = e^{\pm \gamma(\tilde{\theta}_\mu)}$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について、

$$\lambda_{+, \mu} = e^{+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}, \quad \lambda_{-, \mu} = e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}$$

が成り立つ。とくに $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ なので

$$\lambda_{+, \mu} > 1 > \lambda_{-, \mu} > 0$$

であり、2 つの固有値は ** 必ず分離している ** (主張 9.40 の整数運動量版では臨界点の $\mu = \pm M$ で $\lambda_+ = \lambda_- = 1$ が起こりうる)。

証明. $g_1 := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$ 、 $r := |\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)| > 0$ 、 $\gamma := \gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ と略記する (定義 16.9)。

Step 1 ($\sinh \gamma = r$)。定義 16.9 より $\cosh \gamma = g_1$ であり、主張 1.4 の $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ と主張 16.7 の $g_1^2 = 1 + r^2$ から

$$\begin{aligned}
(\sinh \gamma)^2 &= (\cosh \gamma)^2 - 1 \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties } (\cosh^2 - \sinh^2 = 1)) \\
&= g_1^2 - 1 \quad (\because \text{def_gamma_theta_tilde_mu } (\cosh \gamma = g_1)) \\
&= (1 + r^2) - 1 \quad (\because \text{det_A_theta_tilde } (g_1^2 = 1 + r^2)) \\
&= r^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

$\gamma > 0$ より $\sinh \gamma = \frac{1}{2}(e^\gamma - e^{-\gamma}) > 0$ であり、 $r > 0$ でもあるから、非負の平方根の一意性 (主張 1.5) より $\sinh \gamma = r$ 。

Step 2 (結論)。 $e^{\pm \gamma} = \cosh \gamma \pm \sinh \gamma$ (主張 1.4) と Step 1 より

$$\begin{aligned}
e^{+\gamma} &= \cosh \gamma + \sinh \gamma \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties}) \\
&= g_1 + \sinh \gamma \quad (\because \text{def_gamma_theta_tilde_mu } (\cosh \gamma = g_1)) \\
&= g_1 + r \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \lambda_{+, \mu} \quad (\because \text{eigenvector_of_A_theta_tilde}) \\
e^{-\gamma} &= \cosh \gamma - \sinh \gamma \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties}) \\
&= g_1 - \sinh \gamma \quad (\because \text{def_gamma_theta_tilde_mu } (\cosh \gamma = g_1)) \\
&= g_1 - r \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \lambda_{-, \mu} \quad (\because \text{eigenvector_of_A_theta_tilde})
\end{aligned}$$

($\lambda_{\pm, \mu} = g_1 \pm r$ は主張 16.5.)

Step 3 (分離)。 $\gamma > 0$ と実指数関数の狭義単調増加性より

$$\begin{aligned} e^\gamma &> e^0 \quad (\because \gamma > 0 \text{ と実指数関数の狭義単調増加性}) \\ e^0 &= 1 \quad (\because e^0 = 1) \\ 1 &= e^0 > e^{-\gamma} \quad (\because 0 > -\gamma \text{ と実指数関数の狭義単調増加性}) \\ e^{-\gamma} &> 0 \quad (\because \text{実指数関数の正值性}) \end{aligned}$$

□

17 半整数運動量のフェルミオンと $V^{(+)} = c \check{V}'$

注意 17.1 (この章の目的と、008 章との違い). 主張 15.20 で $(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu), T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)) = (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) A(\tilde{\theta}_\mu)$ を、主張 16.6 で $A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu \check{D}_\mu \check{P}_\mu^{-1}$ を得た。この章では、 $\check{P}_\mu$ の列で $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ を組み替えた ** 半整数運動量のフェルミオン ** $\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger$ を導入し、

$$\check{V}' := \exp \left(\sum_{\mu \in \check{M}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} - \frac{1}{2} I \right) \right)$$

とおいたとき、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ について $V^{(+)} = c \check{V}'$ が成り立つこと (主張 17.10) まで到達する。 c の値の決定は次章で扱う。

**008 章との違いは、場合分けが一つも要らないことである。* 008 章では $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となる μ (臨界点の $\mu = \pm M$) でフェルミオン $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger$ が定義できず、定義 9.34 の定義域の限定、定義 9.41 の和の範囲の限定、主張 9.43・主張 9.44 による例外処理、主張 9.45 の「場合 2」が必要だった。半整数運動量では主張 16.3 により $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ が ** すべての $\mu \in \check{M}$ (定義 14.5) とすべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ について ** 成り立つので、これらはすべて不要になる。

** 平方根の分枝の議論も要らない。* 008 章の主張 9.36 は、 ψ の係数に現れる $\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ が μ と ν で同じ分枝を取ることを Step 0 で確かめる必要があった。半整数運動量では主張 16.4 (4)(5) により根号が $|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)| \in \mathbb{R}_{>0}$ と $i|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)|$ に確定しているので、主張 16.6 の $\check{P}_\mu$ の成分は最初から実の絶対値だけで書かれており、分枝の問題が生じない。

** 対になる添字は μ と $M+1-\mu$ である。* 主張 14.6 の $\tilde{\theta}_{M+1-\mu} = 2\pi - \tilde{\theta}_\mu$ と主張 14.8 の $\nu = M+1-\mu$ に対応する。008 章の $-\mu$ をそのまま写してはならない。定義 14.5 (2) により $M+1-\mu$ は $\check{M}$ の中にとどまるので、** この章では $\check{M}$ の外の添字が現れない。*

定義 17.2 ($\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger$ (半整数運動量のフェルミオン))。 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $\mu \in \check{M}$ (定義 14.5) とする。主張 16.6 の $\check{P}_\mu$ を用いて $\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を

$$(\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu) := (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \check{P}_\mu$$

すなわち ($a := \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ 、 $b := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ 、 $r := |a| \in \mathbb{R}_{>0}$ と略記して)

$$\check{\psi}_\mu^\dagger := \frac{-r}{2\sqrt{M}b} \check{Z}_\mu + \frac{1}{2\sqrt{M}} \check{Y}_\mu, \quad \check{\psi}_\mu := \frac{+r}{2\sqrt{M}b} \check{Z}_\mu + \frac{1}{2\sqrt{M}} \check{Y}_\mu$$

と定める (行ベクトルと 2×2 行列の積は主張 15.18 の $(A, B) \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = (pA+rB, qA+sB)$)。

** この定義は $\mu \in \check{M}$ のすべてについて意味をもつ。* 主張 16.3 より $a \neq 0$ すなわち $r > 0$ 、主張 16.4 より $b \neq 0$ であり、 $M \geq 2$ より $\sqrt{M} > 0$ なので分母 $2\sqrt{M}b$ は 0 でない (主張 16.6 の Step 1)。定義 9.34 が $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる μ にしか定義できなかったのと同じ、** 除外される μ は無い **。

† は転置共役を表す記号ではなく、2つの元を区別する添え字の一部として使う (定義 9.34 と同じ扱い)。

主張 17.3 (γ_1, γ_2 の周期性と共役添字 $M+1-\mu$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。次が成り立つ。

- (1) ** γ_1, γ_2 の 2π 周期性 ** ($\theta \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$) : $\gamma_1(\theta + 2k\pi) = \gamma_1(\theta)$, $\gamma_2(\theta + 2k\pi) = \gamma_2(\theta)$ 。
- (2) ** 添字の M 周期性 ** ($\mu, k \in \mathbb{Z}$) : $\tilde{\theta}_{\mu+kM} = \tilde{\theta}_\mu + 2k\pi$, したがって $\gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu+kM}) = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$, $\gamma_2(\pm\tilde{\theta}_{\mu+kM}) = \gamma_2(\pm\tilde{\theta}_\mu)$ 。
- (3) ** 共役添字 ** ($\mu \in \check{\mathcal{M}}$) : $\gamma_2(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$, $\gamma_2(-\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$, $\gamma_1(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$, $\gamma(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$, $\check{P}_{M+1-\mu}$ は $\check{P}_\mu$ の $\gamma_2(\pm\tilde{\theta}_\mu)$ を入れ替えたもの。

** この主張の (2) だけは $\mu \in \mathbb{Z}$ で量化する。 ** 定義 14.5 が述べたとおり、013 章から 017 章で $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字を扱うのは、定義 14.4 (2) とこの (2) の 2箇所だけである。(2) は γ_1, γ_2 が $\theta \in \mathbb{R}$ の関数 (定義 16.2) であることによって意味をもつ主張であり、 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ や $\check{\psi}_\mu$ (これらは $\check{\mathcal{M}}$ 上でしか定義していない) には言及していない。

証明. (1) 実数 t について $\cos(t + 2k\pi) = \cos t$, $\sin(t + 2k\pi) = \sin t$ であり、定理 1.54 より

$$\begin{aligned} e^{i(t+2k\pi)} &= \cos(t + 2k\pi) + i \sin(t + 2k\pi) \quad (\because \text{Euler の公式}) \\ &= \cos t + i \sin t \quad (\because \cos, \sin \text{ の } 2\pi \text{ 周期性}) \\ &= e^{it} \quad (\because \text{Euler の公式}) \end{aligned}$$

である。定義 16.2 の $\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta$ と $\gamma_2(\theta) = ie^{i\theta} s_2^* (c_1 \cos \theta - i \sin \theta - s_1 c_2)$ は $\cos \theta, \sin \theta, e^{i\theta}$ のみを通じて θ に依存するから、(1) が従う。

(2) 主張 14.3 の $\tilde{\theta}$ の定義より

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}_{\mu+kM} &= \frac{2\pi(\mu + kM - \frac{1}{2})}{M} \quad (\because \tilde{\theta} \text{ の定義}) \\ &= \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2}) + 2\pi kM}{M} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\ &= \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M} + \frac{2\pi kM}{M} \quad (\because \text{分数の和 (分母 } M \neq 0 \text{)}) \\ &= \tilde{\theta}_\mu + \frac{2\pi kM}{M} \quad (\because \tilde{\theta} \text{ の定義}) \\ &= \tilde{\theta}_\mu + 2k\pi \quad (\because M \neq 0 \text{ による約分}) \end{aligned}$$

これを (1) に $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ として使えば $\gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu+kM}) = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$ と $\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu+kM}) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ 。また $-\tilde{\theta}_{\mu+kM} = -\tilde{\theta}_\mu + 2(-k)\pi$ なので (1) を $\theta = -\tilde{\theta}_\mu$, $k \rightarrow -k$ として使えば $\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu+kM}) = \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ 。

(3) 主張 14.6 (1) より $\tilde{\theta}_{M+1-\mu} = 2\pi - \tilde{\theta}_\mu = (-\tilde{\theta}_\mu) + 2\pi$ である。よって (1) を $\theta = -\tilde{\theta}_\mu$, $k = 1$ として使うと

$$\begin{aligned} \gamma_2(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) &= \gamma_2\left((- \tilde{\theta}_\mu) + 2\pi\right) \quad (\because \text{主張 14.6 (1)}) \\ &= \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{本ブロックの (1) (} k = 1 \text{)}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-\tilde{\theta}_{M+1-\mu} &= -(2\pi - \tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{主張 14.6 (1)}) \\
&= -2\pi + \tilde{\theta}_\mu \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\
&= \tilde{\theta}_\mu + 2(-1)\pi \quad (\because \mathbb{R} \text{ の加法の可換則と } -2\pi = 2(-1)\pi), \\
\gamma_2(-\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) &= \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu + 2(-1)\pi) \quad (\because \text{上の等式}) \\
&= \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{本ブロック(1)}), \\
\gamma_1(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) &= \gamma_1((-\tilde{\theta}_\mu) + 2\pi) \quad (\because \text{主張 14.6 (1)}) \\
&= \gamma_1(-\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{本ブロック(1)}) \\
&= \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \cos(-t) = \cos t \text{ と定義 16.2 の } \gamma_1 \text{ の定義})
\end{aligned}$$

定義 14.5 (2) より $M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので 定義 16.9 の $\gamma(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}))$ が定義されており、これは γ_1 の値だけで決まるので $\gamma(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ 。

主張 16.6 の $\check{P}_\mu$ の成分は $|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)|$ 、 $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ 、 M だけで書かれているので、上の 2 式を代入すれば $\check{P}_{M+1-\mu}$ の成分が $|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)|$ と $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ で書けることが分かる。 $\square$

主張 17.4 ($\check{\psi}$ の反交換関係). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について

$$[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger]_+ = 0, \quad [\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu]_+ = \delta_{\nu, M+1-\mu} I, \quad [\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu]_+ = 0$$

が成り立つ ($I := I_{\operatorname{Mat}(2M, \mathbb{C})}$ 、 $\delta_{\nu, M+1-\mu}$ は主張 14.8 と同じ通常のクロネッカーのデルタ)。主張 9.36 では対になる添字が $\nu = -\mu$ だったのに対し、ここでは $\nu = M+1-\mu$ である。定義 14.5 (5) により、この対の条件は合同式なしで書ける。

証明. 以下 $a_\mu := \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ 、 $b_\mu := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ 、 $r_\mu := |a_\mu| \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $c_\mu := \frac{1}{2\sqrt{M}b_\mu} \in \mathbb{C}^\times$ と略記する (主張 16.3 と 主張 16.4 より $a_\mu \neq 0$ 、 $b_\mu \neq 0$)。定義 17.2 は

$$\check{\psi}_\mu^\dagger = c_\mu (-r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu), \quad \check{\psi}_\mu = c_\mu (+r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu)$$

と書ける。また 主張 14.8 より

$$[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ = 2M \delta I, \quad [\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ = [\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ = 0, \quad [\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ = 2M \delta I, \quad \delta := \delta_{\nu, M+1-\mu}$$

である ($[\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ = [\check{Z}_\nu, \check{Y}_\mu]_+ = 0$ は反交換子の対称性による)。

Step 1 ($\delta \neq 0$ のときの係数の関係)。 $\delta = \delta_{\nu, M+1-\mu} = 1$ とは $\nu = M+1-\mu$ そのものである ($\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ に絞ったので合同式を解く必要がない。定義 14.5 (5))。このとき 主張 17.3 (3) より

$$\begin{aligned}
a_\nu &= \gamma_2(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) \quad (\because a_\nu := \gamma_2(\tilde{\theta}_\nu), \nu = M+1-\mu) \\
&= \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{主張 17.3 (3)}) \\
&= b_\mu \quad (\because b_\mu \text{ の略記}), \\
b_\nu &= \gamma_2(-\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) \quad (\because b_\nu := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu), \nu = M+1-\mu) \\
&= \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{主張 17.3 (3)}) \\
&= a_\mu \quad (\because a_\mu \text{ の略記})
\end{aligned}$$

であり、主張 16.4 (1) の $b_\mu = -\overline{a_\mu}$ と $|\overline{z}| = |z|$ (主張 1.41) より

$$\begin{aligned}
r_\nu &= |a_\nu| \quad (\because r_\nu := |a_\nu|) \\
&= |b_\mu| \quad (\because \text{上の } a_\nu = b_\mu) \\
&= |-\overline{a_\mu}| \quad (\because \text{主張 16.4 (1)}) \\
&= |\overline{a_\mu}| \quad (\because \text{主張 1.41 } (| -z| = |z|)) \\
&= |a_\mu| \quad (\because \text{主張 1.41 } (|\bar{z}| = |z|)) \\
&= r_\mu \quad (\because r_\mu := |a_\mu|)
\end{aligned}$$

である。以下この共通の値を $r := r_\mu = r_\nu > 0$ と書く。さらに 主張 16.4 (2) より

$$\begin{aligned}
b_\mu b_\nu &= b_\mu a_\mu \quad (\because \text{上の } b_\nu = a_\mu) \\
&= a_\mu b_\mu \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則}) \\
&= -r^2 \quad (\because \text{主張 16.4 (2)}), \\
c_\mu c_\nu &= \frac{1}{2\sqrt{M} b_\mu} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M} b_\nu} \quad (\because c_\mu := \frac{1}{2\sqrt{M} b_\mu}) \\
&= \frac{1}{4M b_\mu b_\nu} \quad \left(\because \left(2\sqrt{M} \right)^2 = 4M \right) \\
&= \frac{1}{4M (-r^2)} \quad (\because \text{上の } b_\mu b_\nu = -r^2) \\
&= \frac{-1}{4Mr^2} \quad (\because \text{負号を分子へ移す } (\mathbb{C} \text{ の四則}))
\end{aligned}$$

($r > 0$ なので分母は 0 でない)。** ここが 008 章との差である。** 主張 9.36 では係数に平方根 $\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ が入るため、 μ と ν で同じ分枝が選ばれることを別途示す必要があった。ここでの r_μ は複素数の絶対値、すなわち非負の実数として一意に定まる量なので、 $r_\nu = r_\mu$ は上の絶対値の計算だけで従い、分枝の議論は生じない。

Step 2 (第 1 式)。反交換子 $[X, W]_+ := XW + WX$ は両引数について $\mathbb{C}$ 双線型である。実際

$$\begin{aligned}
[\alpha X, \beta W]_+ &= (\alpha X)(\beta W) + (\beta W)(\alpha X) \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= \alpha\beta XW + \beta\alpha WX \quad (\because \text{主張 3.6 を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= \alpha\beta XW + \alpha\beta WX \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則}) \\
&= \alpha\beta (XW + WX) \quad (\because \text{分配則による括り出し})
\end{aligned}$$

であり、和についての加法性も行列の積の分配法則から従う。これを使って

$$\begin{aligned}
[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger]_+ &= [c_\mu (-r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu), c_\nu (-r_\nu \check{Z}_\nu + b_\nu \check{Y}_\nu)]_+ \quad (\because \text{定義 17.2}) \\
&= c_\mu c_\nu \left((-r_\mu)(-r_\nu) [\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ + (-r_\mu) b_\nu [\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ \right. \\
&\quad \left. + b_\mu (-r_\nu) [\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ + b_\mu b_\nu [\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ \right) \quad (\because \text{反交換子の } \mathbb{C} \text{ 双線型性}) \\
&= c_\mu c_\nu \left((-r_\mu)(-r_\nu) \cdot 2M \delta I + (-r_\mu) b_\nu \cdot 0 \right. \\
&\quad \left. + b_\mu (-r_\nu) \cdot 0 + b_\mu b_\nu \cdot 2M \delta I \right) \quad (\because \text{主張 14.8 を 4 箇所へ同時適用}) \\
&= c_\mu c_\nu ((-r_\mu)(-r_\nu) \cdot 2M \delta I + b_\mu b_\nu \cdot 2M \delta I) \quad (\because 0 \text{ 行列の項の消去 (2 箇所へ同時適用)}) \\
&= c_\mu c_\nu (r_\mu r_\nu \cdot 2M \delta I + b_\mu b_\nu \cdot 2M \delta I) \quad (\because (-x)(-y) = xy \text{ } (\mathbb{R} \text{ の四則})) \\
&= c_\mu c_\nu (r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu) \cdot 2M \delta I \quad (\because \text{分配則による } 2M \delta I \text{ の括り出し})
\end{aligned}$$

$\delta = 0$ なら全体が 0。 $\delta \neq 0$ なら Step 1 より $r_\mu r_\nu = r^2$ 、 $b_\mu b_\nu = -r^2$ なので括弧は $r^2 - r^2 = 0$ 。いずれの場合も $[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger]_+ = 0$ 。

Step 3 (第 3 式)。第 1 式と同じ定義・双線型性・反交換関係を各行で適用すると

$$\begin{aligned}
[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu]_+ &= [c_\mu (r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu), c_\nu (r_\nu \check{Z}_\nu + b_\nu \check{Y}_\nu)]_+ \quad (\because \text{定義 17.2}) \\
&= c_\mu c_\nu \left(r_\mu r_\nu [\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ + r_\mu b_\nu [\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ \right. \\
&\quad \left. + b_\mu r_\nu [\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ + b_\mu b_\nu [\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ \right) \quad (\because \text{反交換子の } \mathbb{C} \text{ 双線型性}) \\
&= c_\mu c_\nu (r_\mu r_\nu \cdot 2M \delta I + r_\mu b_\nu \cdot 0 + b_\mu r_\nu \cdot 0 + b_\mu b_\nu \cdot 2M \delta I) \quad (\because \text{主張 14.8 を 4 箇所へ同時適用}) \\
&= c_\mu c_\nu (r_\mu r_\nu \cdot 2M \delta I + b_\mu b_\nu \cdot 2M \delta I) \quad (\because 0 \text{ 行列の項の消去 (2 箇所へ同時適用)}) \\
&= c_\mu c_\nu (r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu) \cdot 2M \delta I \quad (\because \text{分配則による } 2M \delta I \text{ の括り出し})
\end{aligned}$$

$\delta = 0$ なら全体が 0。 $\delta \neq 0$ なら Step 1 より括弧が $r^2 - r^2 = 0$ 。したがって $[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu]_+ = 0$ 。

Step 4 (第 2 式)。定義・双線型性・反交換関係を各行で適用すると

$$\begin{aligned}
[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu]_+ &= [e_\mu (-r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu), c_\nu (r_\nu \check{Z}_\nu + b_\nu \check{Y}_\nu)]_+ \quad (\because \text{定義 17.2}) \\
&= c_\mu c_\nu \left((-r_\mu) r_\nu [\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ + (-r_\mu) b_\nu [\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ \right. \\
&\quad \left. + b_\mu r_\nu [\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ + b_\mu b_\nu [\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu]_+ \right) \quad (\because \text{反交換子の } \mathbb{C} \text{ 双線型性}) \\
&= c_\mu c_\nu \left((-r_\mu) r_\nu \cdot 2M \delta I + (-r_\mu) b_\nu \cdot 0 + b_\mu r_\nu \cdot 0 + b_\mu b_\nu \cdot 2M \delta I \right) \quad (\because \text{主張 14.8 を 4 箇所へ同時適用}) \\
&= c_\mu c_\nu ((-r_\mu) r_\nu \cdot 2M \delta I + b_\mu b_\nu \cdot 2M \delta I) \quad (\because 0 \text{ 行列の項の消去 (2 箇所へ同時適用)}) \\
&= c_\mu c_\nu (-r_\mu r_\nu \cdot 2M \delta I + b_\mu b_\nu \cdot 2M \delta I) \quad (\because (-x)y = -xy \text{ (} \mathbb{R} \text{ の四則)}) \\
&= c_\mu c_\nu (-r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu) \cdot 2M \delta I \quad (\because \text{分配則による } 2M \delta I \text{ の括り出し})
\end{aligned}$$

$\delta = 0$ なら全体が 0 であり、 $\delta_{\nu, M+1-\mu} I = 0$ と一致する。 $\delta \neq 0$ (すなわち $\delta = 1$) なら Step 1 より

$$\begin{aligned}
[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu]_+ &= \frac{-1}{4Mr^2} (-r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu) \cdot 2M \delta I \quad (\because \text{Step 1 } (c_\mu c_\nu = \frac{-1}{4Mr^2})) \\
&= \frac{-1}{4Mr^2} (-r^2 + (-r^2)) \cdot 2M I \quad (\because \text{Step 1 } (r_\mu r_\nu = r^2, b_\mu b_\nu = -r^2), \delta = 1) \\
&= \frac{-1}{4Mr^2} \cdot (-2r^2) \cdot 2M I \quad (\because -r^2 + (-r^2) = -2r^2 \text{ (同類項の統合)}) \\
&= \frac{(-1) \cdot (-2r^2) \cdot 2M}{4Mr^2} I \quad (\because \text{分数の積 (} \mathbb{R} \text{ の四則)}) \\
&= \frac{4Mr^2}{4Mr^2} I \quad (\because (-1)(-2r^2) = 2r^2 \text{ と乗法の可換則}) \\
&= I \quad (\because M \geq 2, r > 0 \text{ より } 4Mr^2 \neq 0 \text{ の約分})
\end{aligned}$$

であり、 $\delta_{\nu, M+1-\mu} I = I$ と一致する。 □

主張 17.5 ($V^{(+)}$ と $\check{\psi}$ の交換関係)。 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について

$$T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu^\dagger) = e^{+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} \check{\psi}_\mu^\dagger, \quad T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu) = e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} \check{\psi}_\mu$$

が成り立つ ($T_{(V^{(+)})}$ は 定義 15.8、 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ は 定義 16.9)。主張 9.35 と違い $\gamma_2 = 0$ による定義域の限定は無い。

証明. 以下、行ベクトルと 2×2 行列の積は 主張 15.18 のものとする。まず、 $A_0, B_0 \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と $G, H \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ について

$$((A_0, B_0) G) H = (A_0, B_0) (GH) \quad (\because \text{行列の積の結合法則})$$

が成り立つ (結合律)。実際 $G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$, $H = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}$ とすると、左辺の第 l 列は $\sum_{k=1}^2 h_{kl} (g_{1k} A_0 + g_{2k} B_0)$ 、右辺の第 l 列は $(\sum_k g_{1k} h_{kl}) A_0 + (\sum_k g_{2k} h_{kl}) B_0$ であり、 $\mathbb{C}$ 上のスカラー倍の分配律により両者は一致する。

Step 1 ($T_{(V^{(+)})}$ の線型性を行ベクトルへ持ち上げる)。主張 15.7 と 主張 15.10 より $V^{(+)} \in R^\times$ かつ $T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$ なので、主張 9.17 の一般形 ($g \in R^\times$ について $T_g(aX + bW) = aT_g(X) + bT_g(W)$) が使える。よって $G \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned} T_{(V^{(+)})}((A_0, B_0)G) &:= (T_{(V^{(+)})}(g_{11}A_0 + g_{21}B_0), T_{(V^{(+)})}(g_{12}A_0 + g_{22}B_0)) \quad (\because \text{行ベクトルへの作用の定め方}) \\ &= (g_{11}T_{(V^{(+)})}(A_0) + g_{21}T_{(V^{(+)})}(B_0), g_{12}T_{(V^{(+)})}(A_0) + g_{22}T_{(V^{(+)})}(B_0)) \quad (\because T_{(V^{(+)})} \text{ の線型性を 2 列へ同時適用}) \\ &= (T_{(V^{(+)})}(A_0), T_{(V^{(+)})}(B_0))G \quad (\because \text{行ベクトルと } 2 \times 2 \text{ 行列の積の定義}) \end{aligned}$$

が成り立つ (G の成分は A_0, B_0 に依らない複素数なので、線型性の係数として使える)。

Step 2 (計算)。定義 17.2、Step 1、主張 15.20、主張 16.6 を順に使う。

$$\begin{aligned} (T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu^\dagger), T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu)) &= T_{(V^{(+)})}((\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \check{P}_\mu) \quad (\because \check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger \text{ の定義}) \\ &= (T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu), T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)) \check{P}_\mu \quad (\because \text{Step 1}) \\ &= ((\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) A(\tilde{\theta}_\mu)) \check{P}_\mu \quad (\because T_{(V^{(+)})} \text{ の } \check{Z}, \check{Y} \text{ への作用}) \\ &= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) (A(\tilde{\theta}_\mu) \check{P}_\mu) \quad (\because \text{行ベクトルと行列の積の結合法則}) \\ &= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) (\check{P}_\mu \check{D}_\mu \check{P}_\mu^{-1} \check{P}_\mu) \quad (\because A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu \check{D}_\mu \check{P}_\mu^{-1}) \\ &= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) (\check{P}_\mu \check{D}_\mu) \quad (\because \check{P}_\mu^{-1} \check{P}_\mu = I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}) \\ &= ((\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \check{P}_\mu) \check{D}_\mu \quad (\because \text{行ベクトルと行列の積の結合法則}) \\ &= (\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu) \check{D}_\mu \quad (\because \check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger \text{ の定義}) \\ &= (\lambda_{+, \mu} \check{\psi}_\mu^\dagger, \lambda_{-, \mu} \check{\psi}_\mu) \quad (\because \check{D}_\mu \text{ は対角成分 } \lambda_{+, \mu}, \lambda_{-, \mu} \text{ の対角行列}) \end{aligned}$$

両辺の第 1 列・第 2 列を比べ、主張 16.10 を各列へ代入すると

$$\begin{aligned} T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu^\dagger) &= \lambda_{+, \mu} \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{上の行ベクトルの等式の第 1 列}) \\ &= e^{+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \lambda_{+, \mu} = e^{+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}), \\ T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu) &= \lambda_{-, \mu} \check{\psi}_\mu \quad (\because \text{上の行ベクトルの等式の第 2 列}) \\ &= e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} \check{\psi}_\mu \quad (\because \lambda_{-, \mu} = e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}) \end{aligned}$$

□

定義 17.6 ($\check{V}'$ の定義). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、

$$\check{X} := \sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} - \frac{1}{2} I \right) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}), \quad \check{V}' := \exp(\check{X})$$

と定める ($I := I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$)。次が成り立つ。

- (1) ** 和の範囲に例外は要らない。 ** 定義 14.5 (2) より $\mu \in \check{\mathcal{M}} \implies M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、定義 17.2 により $\check{\psi}_\mu^\dagger$ と $\check{\psi}_{M+1-\mu}$ はともに定義されており、 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ のすべての項が意味をもつ。

- (2) $\check{V}'$ は可逆であり $(\check{V}')^{-1} = \exp(-\check{X})$ 。したがって定義 9.11 の $T_{(\check{V}')} (W) := \check{V}' W (\check{V}')^{-1}$ が定義される。

定義 9.41 が和を $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \{1, \dots, M\}$ に限定し、除外した μ を主張 9.44 で別扱いしていたのと同じ、ここでは $\mu = 1, \dots, M$ が例外なく走る。

証明. (1) 主張 16.3 はすべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ について $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ を与えるので、定義 17.2 の分母 $2\sqrt{M} \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ は 0 でない。定義 14.5 (2) より $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ に対して $M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、 $\check{\psi}_{M+1-\mu}$ も同じ理由で定義されている。 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$ はスカラーなので各項は $\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元であり、有限和 $\check{X}$ も同様である。

(2) 定理 6.6 (3) より、任意の $X \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について $\exp(X)$ は可逆で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ である。 $X = \check{X}$ とすればよい。□

主張 17.7 ($T_{(\check{V}')} \check{\psi}$ への作用). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について

$$T_{(\check{V}')}(\check{\psi}_\mu^\dagger) = e^{+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} \check{\psi}_\mu^\dagger, \quad T_{(\check{V}')}(\check{\psi}_\mu) = e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} \check{\psi}_\mu$$

証明. 定義 17.6 の $\check{X}$, $\check{V}' = \exp(\check{X})$, $(\check{V}')^{-1} = \exp(-\check{X})$ を用いる。すなわち $T_{(\check{V}')} (W) = \exp(\check{X}) W \exp(-\check{X})$ である。

Step 1 (1 項ぶんの交換子、 $\check{\psi}_\mu^\dagger$ 側)。 $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について

$$[\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu}, \check{\psi}_\mu^\dagger] = \delta_{\mu, \nu} \check{\psi}_\nu^\dagger$$

を示す。主張 17.4 を $(\mu, M+1-\nu)$ の対に適用すると

$$\begin{aligned} [\check{\psi}_{M+1-\nu}, \check{\psi}_\mu^\dagger]_+ &= [\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_{M+1-\nu}]_+ \quad (\because \text{反交換子の対称性}) \\ &= \delta_{M+1-\nu, M+1-\mu} I \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係}) \\ &= \delta_{\mu, \nu} I \quad (\because M+1-\nu = M+1-\mu \iff \mu = \nu) \end{aligned}$$

である (定義 14.5 (2) より $M+1-\nu \in \check{\mathcal{M}}$ なので 主張 17.4 が適用できる)。また 主張 17.4 より $[\check{\psi}_\nu^\dagger, \check{\psi}_\mu^\dagger]_+ = 0$ であるから、

$$\begin{aligned} \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \check{\psi}_\mu^\dagger &= \check{\psi}_\nu^\dagger (\check{\psi}_{M+1-\nu} \check{\psi}_\mu^\dagger) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= \check{\psi}_\nu^\dagger (\delta_{\mu, \nu} I - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu}) \quad (\because \text{直前の反交換子の等式 } ([\check{\psi}_{M+1-\nu}, \check{\psi}_\mu^\dagger]_+ = \delta_{\mu, \nu} I)) \\ &= \delta_{\mu, \nu} \check{\psi}_\nu^\dagger - \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{行列の積の分配法則と結合法則}) \\ &= \delta_{\mu, \nu} \check{\psi}_\nu^\dagger + \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係 } ([\check{\psi}_\nu^\dagger, \check{\psi}_\mu^\dagger]_+ = 0)) \end{aligned}$$

となる。よって

$$\begin{aligned} [\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu}, \check{\psi}_\mu^\dagger] &= \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \check{\psi}_\mu^\dagger - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{交換子の定義}) \\ &= (\delta_{\mu, \nu} \check{\psi}_\nu^\dagger + \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu}) - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{直前の式変形}) \\ &= \delta_{\mu, \nu} \check{\psi}_\nu^\dagger \quad (\because \text{同類項の統合}) \end{aligned}$$

となり、上の式を得る。* $\check{\mathcal{M}}$ へ絞ったことで、合同式 $(1-\nu) + \mu \equiv 1 \pmod{M}$ を $\mu \equiv \nu$ に書き換える段が要らなくなっている。*

Step 2 ($[\check{X}, \check{\psi}_\mu^\dagger] = \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \check{\psi}_\mu^\dagger$)。定義 17.6 の $\check{X}$ の定義を代入する。 $\frac{1}{2}I$ は任意の元と可換 (主張 3.6) なので交換子に寄与せず、交換子は第 1 引数について $\mathbb{C}$ 線型だから、Step 1 より

$$\begin{aligned}
[\check{X}, \check{\psi}_\mu^\dagger] &= \left[\sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left(\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} - \frac{1}{2} I \right), \check{\psi}_\mu^\dagger \right] \quad (\because \check{X} \text{ の定義}) \\
&= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left[\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} - \frac{1}{2} I, \check{\psi}_\mu^\dagger \right] \quad (\because \text{交換子の第 1 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left[\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu}, \check{\psi}_\mu^\dagger \right] \quad (\because \text{スカラー行列は任意の元と可換なので } \left[\frac{1}{2} I, \check{\psi}_\mu^\dagger \right] = 0) \\
&= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \delta_{\mu, \nu} \check{\psi}_\nu^\dagger \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \mu \in \check{\mathcal{M}} \text{ なので } \nu = \mu \text{ の項だけが残る})
\end{aligned}$$

である。移項すると

$$\begin{aligned}
\check{X} \check{\psi}_\mu^\dagger &= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{X} + [\check{X}, \check{\psi}_\mu^\dagger] \quad (\because \text{交換子の定義}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{直前の式変形}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{X} + \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right) \quad (\because \text{単位行列は乗法の単位元、スカラー倍は行列の積と可換}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right) \quad (\because \text{行列の積の分配法則})
\end{aligned}$$

(008 章の主張 9.42 が μ の符号で 3 通りに場合分けしていたのは添字集合が $\mathcal{M} = \{-M, \dots, -1, 1, \dots, M\}$ だったためである。ここでは μ も和の添字 ν も同じ $\check{\mathcal{M}}$ を走るの、残る項が $\nu = \mu$ ただ 1 つであることが直ちに分かり、合同式を解く段も場合分けも要らない。定義 14.5 へ範囲を絞ったことの効果である。)

Step 3 (帰納法)。 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\check{X}^n \check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^n$ が成り立つ。 $n = 0$ では両辺 $\check{\psi}_\mu^\dagger$ で一致し、

$$\begin{aligned}
\check{X}^{n+1} \check{\psi}_\mu^\dagger &= \check{X} \left(\check{X}^n \check{\psi}_\mu^\dagger \right) \quad (\because \text{冪の定義と行列の積の結合法則}) \\
&= \check{X} \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^n \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right) \left(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^n \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^{n+1} \quad (\because \text{冪の定義})
\end{aligned}$$

Step 4 (指数関数へ)。Step 3 より各 N について

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{n=0}^N \frac{\check{X}^n}{n!} \right) \check{\psi}_\mu^\dagger &= \sum_{n=0}^N \frac{\check{X}^n \check{\psi}_\mu^\dagger}{n!} \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= \sum_{n=0}^N \frac{\check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^n}{n!} \quad (\because \text{Step 3 を各項へ同時適用}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \sum_{n=0}^N \frac{\left(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^n}{n!} \quad (\because \text{行列の積の分配法則})
\end{aligned}$$

であり、定理 4.3 より両辺の部分和は $N \rightarrow \infty$ で収束する。行列の積は連続 (主張 3.13) だから極限をとって

$$\exp(\check{X}) \check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger \exp(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu)I)$$

Step 5 (結論)。準備として、 $c \in \mathbb{R}$ について

$$\exp(cI) = e^c I \quad (\because (cI)^n = c^n I \ (n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}) \text{ と } \exp \text{ の級数定義})$$

である。 $\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu)I$ と $-\check{X}$ は可換 (主張 3.6 と $\check{X}(-\check{X}) = (-\check{X})\check{X}$) だから 定理 4.5 が使えて

$$\begin{aligned} T_{(\check{V}')}(\check{\psi}_\mu^\dagger) &= \exp(\check{X}) \check{\psi}_\mu^\dagger \exp(-\check{X}) \quad (\because \text{証明冒頭の } T_{(\check{V}')} \text{ の表示}) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \exp(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu)I) \exp(-\check{X}) \quad (\because \text{Step 4}) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \exp(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I) \quad (\because \text{可換な指数の積の法則}) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger (e^{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} I) \quad (\because \text{準備の等式 } \exp(cI) = e^c I) \\ &= e^{+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{単位行列は乗法の単位元、スカラー倍は行列の積と可換}) \end{aligned}$$

Step 1' ($\check{\psi}_\mu$ 側)。主張 17.4 の $[\check{\psi}_{M+1-\nu}, \check{\psi}_\mu]_+ = 0$ と $[\check{\psi}_\nu^\dagger, \check{\psi}_\mu]_+ = \delta_{\mu, M+1-\nu} I$ より ($\nu \in \check{\mathcal{M}}$ 、定義 14.5 (2) より $M+1-\nu \in \check{\mathcal{M}}$)

$$\begin{aligned} \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \check{\psi}_\mu &= \check{\psi}_\nu^\dagger (\check{\psi}_{M+1-\nu} \check{\psi}_\mu) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= \check{\psi}_\nu^\dagger (-\check{\psi}_\mu \check{\psi}_{M+1-\nu}) \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係 } ([\check{\psi}_{M+1-\nu}, \check{\psi}_\mu]_+ = 0)) \\ &= -(\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_\mu) \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{行列の積の結合法則とスカラー倍}) \\ &= -(\delta_{\mu, M+1-\nu} I - \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\nu^\dagger) \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係 } ([\check{\psi}_\nu^\dagger, \check{\psi}_\mu]_+ = \delta_{\mu, M+1-\nu} I)) \\ &= -\delta_{\mu, M+1-\nu} \check{\psi}_{M+1-\nu} + \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{行列の積の分配法則と結合法則}) \end{aligned}$$

となる。よって

$$\begin{aligned} [\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu}, \check{\psi}_\mu] &= \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \check{\psi}_\mu - \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{交換子の定義}) \\ &= (-\delta_{\mu, M+1-\nu} \check{\psi}_{M+1-\nu} + \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu}) - \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{直前の式変形}) \\ &= -\delta_{\mu, M+1-\nu} \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{同類項の統合}) \end{aligned}$$

Step 2' ($[\check{X}, \check{\psi}_\mu] = -\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \check{\psi}_\mu$)。Step 2 と同様に、定義 17.6 の $\check{X}$ を代入し、交換子の第 1 引数についての線型性と 主張 3.6 ($\frac{1}{2}I$ は交換子に寄与しない) を使うと

$$\begin{aligned} [\check{X}, \check{\psi}_\mu] &= \left[\sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left(\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} - \frac{1}{2} I \right), \check{\psi}_\mu \right] \quad (\because \check{X} \text{ の定義}) \\ &= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left[\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} - \frac{1}{2} I, \check{\psi}_\mu \right] \quad (\because \text{交換子の第 1 引数についての } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\ &= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left[\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu}, \check{\psi}_\mu \right] \quad (\because \text{スカラー行列は任意の元と可換なので } [\frac{1}{2} I, \check{\psi}_\mu] = 0) \\ &= -\sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \delta_{\mu, M+1-\nu} \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{Step 1'}) \end{aligned}$$

$\nu \in \check{\mathcal{M}}$ のうち $\delta_{\mu, M+1-\nu} = 1$ すなわち $M+1-\nu = \mu$ を満たすものは $\nu = M+1-\mu$ ただ 1 つであり、定義 14.5 (2) よりこれは $\check{\mathcal{M}}$ に属する (** 合同式を解く段が消えている **)。この ν に対して $M+1-\nu = \mu$ なので $\check{\psi}_{M+1-\nu} = \check{\psi}_\mu$ である (γ の共役添字での不変性は 主張 17.3 (3))。よって

$$\begin{aligned} [\check{X}, \check{\psi}_\mu] &= -\gamma(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) \check{\psi}_\mu \quad (\because \nu = M+1-\mu \text{ の項だけが残る、} \check{\psi}_{M+1-\nu} = \check{\psi}_\mu) \\ &= -\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \check{\psi}_\mu \quad (\because \gamma \text{ の共役添字での不変性 (3)}) \end{aligned}$$

である。移項すると

$$\begin{aligned} \check{X} \check{\psi}_\mu &= \check{\psi}_\mu \check{X} + [\check{X}, \check{\psi}_\mu] \quad (\because \text{交換子の定義}) \\ &= \check{\psi}_\mu \check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \check{\psi}_\mu \quad (\because \text{直前の式変形}) \\ &= \check{\psi}_\mu \check{X} - \check{\psi}_\mu \left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right) \quad (\because \text{単位行列は乗法の単位元、スカラー倍は行列の積と可換}) \\ &= \check{\psi}_\mu \left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right) \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \end{aligned}$$

Step 3' (帰納法)。 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\check{X}^n \check{\psi}_\mu = \check{\psi}_\mu \left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^n$ が成り立つ。 $n = 0$ では両辺 $\check{\psi}_\mu$ で一致し、

$$\begin{aligned} \check{X}^{n+1} \check{\psi}_\mu &= \check{X} \left(\check{X}^n \check{\psi}_\mu \right) \quad (\because \text{冪の定義と行列の積の結合法則}) \\ &= \check{X} \check{\psi}_\mu \left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^n \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= \check{\psi}_\mu \left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right) \left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^n \quad (\because \text{Step 2'}) \\ &= \check{\psi}_\mu \left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^{n+1} \quad (\because \text{冪の定義}) \end{aligned}$$

Step 4' (指数関数へ)。 Step 3' より各 N について

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=0}^N \frac{\check{X}^n}{n!} \right) \check{\psi}_\mu &= \sum_{n=0}^N \frac{\check{X}^n \check{\psi}_\mu}{n!} \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\ &= \sum_{n=0}^N \frac{\check{\psi}_\mu \left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^n}{n!} \quad (\because \text{Step 3' を各項へ同時適用}) \\ &= \check{\psi}_\mu \sum_{n=0}^N \frac{\left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I \right)^n}{n!} \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \end{aligned}$$

であり、定理 4.3 より両辺の部分和は $N \rightarrow \infty$ で収束する。行列の積は連続 (主張 3.13) だから極限をとって

$$\exp(\check{X}) \check{\psi}_\mu = \check{\psi}_\mu \exp\left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\right)$$

Step 5' (結論)。 $\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I$ と $-\check{X}$ は可換 (主張 3.6 と $\check{X}(-\check{X}) = (-\check{X})\check{X}$) だから 定理 4.5 が使えて

$$\begin{aligned}
T_{(\check{V}')}(\check{\psi}_\mu) &= \exp(\check{X}) \check{\psi}_\mu \exp(-\check{X}) \quad (\because \text{証明冒頭の } T_{(\check{V}')} \text{ の表示}) \\
&= \check{\psi}_\mu \exp\left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right) \exp(-\check{X}) \quad (\because \text{Step 4'}) \\
&= \check{\psi}_\mu \exp\left(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right) \quad (\because \text{可換な指数の積の法則}) \\
&= \check{\psi}_\mu \left(e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}I\right) \quad (\because \text{準備の等式 } \exp(cI) = e^c I) \\
&= e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} \check{\psi}_\mu \quad (\because \text{単位行列は乗法の単位元、スカラー倍は行列の積と可換})
\end{aligned}$$

□

主張 17.8 ($T_{(V^{(+)})}$ と $T_{(\check{V}')}$ は $\check{Z}, \check{Y}$ 上で一致する). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。すべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について

$$T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu) = T_{(\check{V}')}(\check{Z}_\mu), \quad T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu) = T_{(\check{V}')}(\check{Y}_\mu)$$

が成り立つ。主張 9.45 と違い $\gamma_2 = 0$ による場合分け (同ブロックの「場合 2」) は不要である。

証明. $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ を固定する。主張 15.7 と 主張 15.10 より $V^{(+)} \in R^\times$ 、定義 17.6 (2) より $\check{V}'$ も可逆なので、定理 1.10 より $T_{(V^{(+)})}$ と $T_{(\check{V}')}$ はともに $\mathbb{C}$ 線型写像である。

Step 1 ($\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ をフェルミオンで書く)。主張 16.6 より $\det \check{P}_\mu \neq 0$ なので $\check{P}_\mu^{-1}$ が存在する。その成分を $\check{P}_\mu^{-1} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{pmatrix}$ ($q_{ij} \in \mathbb{C}$) とおくと、主張 17.5 の proof で確かめた結合律と 定義 17.2 より

$$\begin{aligned}
(\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) &= (\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) (\check{P}_\mu \check{P}_\mu^{-1}) \quad (\because \check{P}_\mu \check{P}_\mu^{-1} = I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}) \\
&= ((\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu) \check{P}_\mu) \check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{行ベクトルと } 2 \times 2 \text{ 行列の積の結合則}) \\
&= (\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu) \check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu \text{ の定義})
\end{aligned}$$

すなわち

$$\begin{aligned}
\check{Z}_\mu &= q_{11} \check{\psi}_\mu^\dagger + q_{21} \check{\psi}_\mu \quad (\because \text{行ベクトルと } 2 \times 2 \text{ 行列の積の定義}), \\
\check{Y}_\mu &= q_{12} \check{\psi}_\mu^\dagger + q_{22} \check{\psi}_\mu \quad (\because \text{行ベクトルと } 2 \times 2 \text{ 行列の積の定義})
\end{aligned}$$

Step 2 (フェルミオン上での一致)。主張 17.5 と 主張 17.7 より、いずれも $e^{\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}$ 倍であるから

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu^\dagger) &= e^{+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because V^{(+)} \text{ と } \check{\psi} \text{ の交換関係}) \\
&= T_{(\check{V}')}(\check{\psi}_\mu^\dagger) \quad (\because T_{(\check{V}')} \text{ の } \check{\psi} \text{ への作用}), \\
T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu) &= e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)} \check{\psi}_\mu \quad (\because V^{(+)} \text{ と } \check{\psi} \text{ の交換関係}) \\
&= T_{(\check{V}')}(\check{\psi}_\mu) \quad (\because T_{(\check{V}')} \text{ の } \check{\psi} \text{ への作用})
\end{aligned}$$

Step 3 (線型性で移す)。Step 1・Step 2 と線型性より

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu) &= T_{(V^{(+)})}(q_{11}\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{21}\check{\psi}_\mu) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= q_{11}T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu^\dagger) + q_{21}T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu) \quad (\because T_{(V^{(+)})} \text{ の線型性}) \\
&= q_{11}T_{(\check{V}')}(\check{\psi}_\mu^\dagger) + q_{21}T_{(\check{V}')}(\check{\psi}_\mu) \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= T_{(\check{V}')} (q_{11}\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{21}\check{\psi}_\mu) \quad (\because T_{(\check{V}')} \text{ の線型性}) \\
&= T_{(\check{V}')}(\check{Z}_\mu) \quad (\because \text{Step 1})
\end{aligned}$$

$\check{Y}_\mu$ については

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu) &= T_{(V^{(+)})}(q_{12}\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{22}\check{\psi}_\mu) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= q_{12}T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu^\dagger) + q_{22}T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu) \quad (\because T_{(V^{(+)})} \text{ の線型性}) \\
&= q_{12}T_{(\check{V}')}(\check{\psi}_\mu^\dagger) + q_{22}T_{(\check{V}')}(\check{\psi}_\mu) \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= T_{(\check{V}')} (q_{12}\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{22}\check{\psi}_\mu) \quad (\because T_{(\check{V}')} \text{ の線型性}) \\
&= T_{(\check{V}')}(\check{Y}_\mu) \quad (\because \text{Step 1})
\end{aligned}$$

□

主張 17.9 ($T_{(V^{(+)})} = T_{(\check{V}')}).$ $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。すべての $x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$T_{(V^{(+)})}(x) = T_{(\check{V}')} (x)$$

が成り立つ。

証明. Step 1 (両者は単位的環準同型かつ線型)。主張 15.7 と 主張 15.10 より $V^{(+)} \in R^\times$ かつ $T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$ 、定義 17.6 (2) より $\check{V}'$ は可逆で $T_{(\check{V}')} = T_{\check{V}'}$ である。可逆元による共役は主張 1.55 より乗法的かつ単位的 ($T_g(I) = I$) であり、定理 1.10 より線型である。

Step 2 (各 Z_m, Y_m 上で一致)。主張 14.9 より $m \in \{1, \dots, M\}$ について

$$Z_m = \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Z}_\mu e^{im\tilde{\theta}_\mu}, \quad Y_m = \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Y}_\mu e^{im\tilde{\theta}_\mu}$$

である。 $e^{im\tilde{\theta}_\mu}/M \in \mathbb{C}$ はスカラーなので、この復元公式と、Step 1 の線型性と、主張 17.8 (以下「 $\check{Z}, \check{Y}$ 上の一一致」と呼ぶ) より

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(Z_m) &= T_{(V^{(+)})} \left(\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Z}_\mu e^{im\tilde{\theta}_\mu} \right) \quad (\because \text{復元公式}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M e^{im\tilde{\theta}_\mu} T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M e^{im\tilde{\theta}_\mu} T_{(\check{V}')}(\check{Z}_\mu) \quad (\because \check{Z}, \check{Y} \text{ 上の一一致}) \\
&= T_{(\check{V}')} \left(\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Z}_\mu e^{im\tilde{\theta}_\mu} \right) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= T_{(\check{V}')} (Z_m) \quad (\because \text{復元公式})
\end{aligned}$$

Y_m についても

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(Y_m) &= T_{(V^{(+)})} \left(\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Y}_\mu e^{im\tilde{\theta}_\mu} \right) \quad (\because \text{復元公式}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M e^{im\tilde{\theta}_\mu} T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M e^{im\tilde{\theta}_\mu} T_{(\check{V}')}(\check{Y}_\mu) \quad (\because \check{Z}, \check{Y} \text{ 上の一致}) \\
&= T_{(\check{V}')} \left(\frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^M \check{Y}_\mu e^{im\tilde{\theta}_\mu} \right) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= T_{(\check{V}')} (Y_m) \quad (\because \text{復元公式})
\end{aligned}$$

であるから $T_{(V^{(+)})}(Y_m) = T_{(\check{V}')} (Y_m)$ 。

Step 3 (一致する元の集合)。

$$\mathcal{E} := \left\{ x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) : T_{(V^{(+)})}(x) = T_{(\check{V}')} (x) \right\}$$

とおく。 $x, y \in \mathcal{E}$ 、 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、 Step 1 の線型性から

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\alpha x + \beta y) &= \alpha T_{(V^{(+)})}(x) + \beta T_{(V^{(+)})}(y) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= \alpha T_{(\check{V}')} (x) + \beta T_{(\check{V}')} (y) \quad (\because x, y \in \mathcal{E}) \\
&= T_{(\check{V}')} (\alpha x + \beta y) \quad (\because \text{Step 1 の線型性})
\end{aligned}$$

ゆえ $\alpha x + \beta y \in \mathcal{E}$ 。 Step 1 の乗法性 (主張 1.55) から

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(xy) &= T_{(V^{(+)})}(x) T_{(V^{(+)})}(y) \quad (\because \text{共役は環準同型 (乗法的)}) \\
&= T_{(\check{V}')} (x) T_{(\check{V}')} (y) \quad (\because x, y \in \mathcal{E}) \\
&= T_{(\check{V}')} (xy) \quad (\because \text{共役は環準同型 (乗法的)})
\end{aligned}$$

ゆえ $xy \in \mathcal{E}$ 。 また Step 1 の単位性より $T_{(V^{(+)})}(I) = I = T_{(\check{V}')} (I)$ なので $I \in \mathcal{E}$ 。 すなわち $\mathcal{E}$ は単位元を含み、和・スカラー倍・積について閉じる。

Step 4 (結論)。 Step 2 より $S := \{Z_1, \dots, Z_M, Y_1, \dots, Y_M\} \subseteq \mathcal{E}$ である。 主張 5.32 の $\mathcal{A}$ (S を含み和・スカラー倍・積で閉じ単位元を含む最小の部分集合) について Step 3 より $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$ であり、主張 5.32 より $\mathcal{A} = \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ であるから

$$\text{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = \mathcal{A} \subseteq \mathcal{E} \subseteq \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

すなわち $\mathcal{E} = \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 。これが statement である。 $\square$

主張 17.10 ($V^{(+)} = c \check{V}'$ (定数倍を除いて一致))。 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。 ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して

$$V^{(+)} = c \check{V}'$$

が成り立つ ($V^{(+)}$ は定義 15.4、 $\check{V}'$ は定義 17.6)。 c の値の決定はここでは行わない。 $**$

証明. Step 1 ($W := (\check{V}')^{-1} V^{(+)}$ は可逆)。 主張 15.7 より $V^{(+)}$ は可逆、定義 17.6 (2) より $\check{V}'$ は可逆であり、可逆行列の逆行列も可逆である (定義 9.7)。可逆行列の積は可逆なので W は可逆であり、

$$\begin{aligned}
\check{V}'W &= \check{V}' \left((\check{V}')^{-1} V^{(+)} \right) \quad (\because W := (\check{V}')^{-1} V^{(+)}) \\
&= \left(\check{V}' (\check{V}')^{-1} \right) V^{(+)} \quad (\because \text{行列の積の結合律}) \\
&= I V^{(+)} \quad (\because \text{可逆元の定義}) \\
&= V^{(+)} \quad (\because \text{行列積の単位元})
\end{aligned}$$

Step 2 (W はすべての元と可換)。主張 17.9、主張 15.10、定義 17.6 (2)、定義 9.11 より、任意の $x \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}
V^{(+)} x \left(V^{(+)} \right)^{-1} &= T_{(V^{(+)})}(x) \quad (\because \text{転送行列が定める共役作用}) \\
&= T_{(\check{V}')} (x) \quad (\because \text{二つの共役作用の一致}) \\
&= \check{V}' x (\check{V}')^{-1} \quad (\because \text{転送行列が定める共役作用})
\end{aligned}$$

である。主張 1.55 の $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ より Step 1 の $V^{(+)} = \check{V}'W$ から $(V^{(+)})^{-1} = W^{-1}(\check{V}')^{-1}$ である。したがって、左辺は

$$\begin{aligned}
V^{(+)} x \left(V^{(+)} \right)^{-1} &= (\check{V}'W) x \left(W^{-1} (\check{V}')^{-1} \right) \quad (\because \text{Step 1 と積の逆元の公式}) \\
&= \check{V}' (W x W^{-1}) (\check{V}')^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合律})
\end{aligned}$$

と書ける。したがって $\check{V}' (W x W^{-1}) (\check{V}')^{-1} = \check{V}' x (\check{V}')^{-1}$ である。可逆な $\check{V}'$ と W を順に消去すると、

$$\begin{aligned}
\check{V}' (W x W^{-1}) (\check{V}')^{-1} &= \check{V}' x (\check{V}')^{-1} \quad (\because \text{上の二つの共役作用の一致}) \\
W x W^{-1} &= x \quad (\because \check{V}' \text{ の可逆性}) \\
W x &= x W \quad (\because W \text{ の可逆性})
\end{aligned}$$

Step 3 (スカラーであること)。Step 2 と 主張 3.7 より、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して $W = cI$ 。

Step 4 ($c \neq 0$)。仮に $c = 0$ なら $W = O$ (零行列) だが、任意の A について $OA = O \neq I$ なので O は可逆でなく、Step 1 に矛盾する。よって $c \in \mathbb{C}^\times$ 。

Step 5 (結論)。Step 1 と Step 3、およびスカラー行列との積の可換性 (主張 3.6) より

$$\begin{aligned}
V^{(+)} &= \check{V}'W \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \check{V}'(cI) \quad (\because \text{Step 3}) \\
&= c(\check{V}'I) \quad (\because \text{スカラー行列との積の可換性}) \\
&= c\check{V}' \quad (\because \text{行列積の単位元 } \check{V}'I = \check{V}')
\end{aligned}$$

□

18 定数 c の決定と $V^{(+)}$ の固有値

注意 18.1 (この章の目的と、009 章との違い)。主張 17.10 により、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して $V^{(+)} = c\check{V}'$ が成り立つ。しかし c の値そのものは決まっていない。この章では c を決定し、あわせて $V^{(+)}$ の固有値をすべて求める。結論は

$$c = (2 \sinh 2K_2)^{M/2}, \quad V^{(+)} = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \check{V}'$$

であり、 $V^{(+)}$ の固有値は $\epsilon = (\epsilon_\mu)_{\mu=1}^M$ (各 $\epsilon_\mu \in \{0, 1\}$) でパラメトライズされた

$$\check{\Lambda}_\epsilon = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2} \right) \right)$$

であり、その最大値は定理 13.6 の $\Lambda_M^{(\delta)}$ で $\delta = \frac{1}{2}$ と取ったもの $\Lambda_M^{(1/2)}$ に一致し、しかも ** 単純固有値 ** である。

** 道筋は主張 10.19 までの 009 章と同じである。 ** トレース (定義 10.2、主張 10.3、主張 10.4)、エルミート性と正定値性 (定義 10.12、主張 10.13、主張 10.14)、および符号反転共役 (主張 10.15、主張 10.17) は 009 章で $(\pm)$ の両符号について述べてあるので、** 再定義せずそのまま引く **。この章で新しく書くのは、半整数運動量に固有の部分だけである。

009 章との差は次の 3 点で、いずれも主張 16.3 ($\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ が例外なく成り立つこと) と定義 16.9 ($\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$) から来る。

- (a) 添字の集合が $\check{\mathcal{M}} = \{1, \dots, M\}$ (定義 14.5) の全部になる。009 章の定義 10.5 は $\mathcal{I} = \{\mu \mid \gamma_2(\theta_\mu) \neq 0\}$ に限定され、臨界点では $m = |\mathcal{I}| = M - 1$ だった (主張 9.26)。
- (b) 同時固有空間が ** すべて 1 次元 ** になる。009 章の主張 10.9 (4) の次元 2^{M-m} は $m = M$ により 1 になり、主張 10.11 の前因子 2^{M-m} も消える。
- (c) ** 最大固有値が単純になる。 ** 009 章では臨界点で $\gamma(\theta_M) = 0$ となりうるので $\Lambda_{\max}$ の単純性は言えない (定義 9.39 は $\gamma(\theta_\mu) \geq 0$ しか与えない)。半整数運動量では狭義に $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ なので単純性が従う。

** 対になる添字は μ と $M + 1 - \mu$ である ** (主張 14.6、主張 17.4)。009 章の $-\mu$ をそのまま写してはならない。定義 14.5 (2) により $M + 1 - \mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ の中にとどまるので、** この章の主張はすべて $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ について述べられ、 $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は現れない。 **

この章で用いる道具は、複素数を成分とする行列の積・和・スカラー倍、行列の指数関数 (定義 4.4)、および実数の $\cosh, \sinh, \operatorname{arccosh}$ だけである。行列式は使わない。

定義 18.2 (数演算子 $\check{n}_\mu$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) とする。定義 14.5 (2) より $M + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、定義 17.2 により $\check{\psi}_\mu^\dagger$ と $\check{\psi}_{M+1-\mu}$ は ** ともに定義されている **。そこで

$$\check{n}_\mu := \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \in \operatorname{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \quad (\mu \in \check{\mathcal{M}})$$

と定める。以下、 2^M 次の単位行列 $I_{\operatorname{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ を単に I と書く。次が成り立つ。

- (1) 共役添字の対応 $\mu \mapsto M + 1 - \mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ 上の対合である： $M + 1 - (M + 1 - \mu) = \mu$ 。したがって $\check{n}_\mu$ は $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ の M 個で尽き、 $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は要らない。
- (2) 定義 17.6 の $\check{X}$ と $\check{V}'$ はこの記号で

$$\check{X} = \sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2} I \right), \quad \check{V}' = \exp(\check{X})$$

と書ける。009 章の定義 10.5 が $n_\mu = \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu}$ を $\mathcal{I} = \{\mu \in \{1, \dots, M\} \mid \gamma_2(\theta_\mu) \neq 0\}$ の上でしか定義できず、臨界点では $m := |\mathcal{I}| = M - 1$ だったのと違い、** ここでは $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ が例外なく走る ** (主張 16.3)。009 章の記号でいえば $m = M$ の場合に当たる。

証明. (1) $M + 1 - (M + 1 - \mu) = \mu$ は展開するだけである。定義 14.5 (2) より $\mu \mapsto M + 1 - \mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ から $\check{\mathcal{M}}$ への写像であり、いま示したとおり 2 回施すと恒等写像になるので全単射 (対合) である。したがって $\check{n}_\mu$ ($\mu \in \check{\mathcal{M}}$) を作るのに $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は現れない。

(2) 定義 17.6 の $\check{X} = \sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} - \frac{1}{2} I \right)$ の各項の第 1 因子が定義により $\check{n}_\mu$ である。 $\square$

主張 18.3 ($\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$). $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) について、

- (1) $(\check{\psi}_\mu^\dagger)^2 = 0, \quad (\check{\psi}_{M+1-\mu})^2 = 0$
- (2) $\check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger = I - \check{n}_\mu$
- (3) $\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$

証明. (1) 反交換関係の第 1 式 $[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu]_+ = 0$ において $\nu = \mu$ と取ると、反交換子の定義 $[X, W]_+ = XW + WX$ より

$$\begin{aligned} 0 &= [\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu]_+ \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 1 式で } \nu = \mu. \text{ 主張 17.4}) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu + \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= 2 (\check{\psi}_\mu^\dagger)^2 \quad (\because \text{同じ項の和}) \end{aligned}$$

$2 \neq 0$ なので、直前の鎖の両辺を 2 で割ると

$$\begin{aligned} (\check{\psi}_\mu^\dagger)^2 &= \frac{1}{2} 2 (\check{\psi}_\mu^\dagger)^2 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\ &= \frac{1}{2} 0 \quad (\because \text{直前の鎖}) \\ &= 0 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

第 3 式 $[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu]_+ = 0$ で両方の添字を $M+1-\mu$ と取る。上と同じ三段を省略せず書くと

$$\begin{aligned} 0 &= [\check{\psi}_{M+1-\mu}, \check{\psi}_{M+1-\mu}]_+ \quad (\because M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}} \text{ は添字集合の対称性. 定義 14.5. } \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 3 式. 主張 17.4}) \\ &= \check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_{M+1-\mu} + \check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= 2 (\check{\psi}_{M+1-\mu})^2 \quad (\because \text{同じ項の和}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\check{\psi}_{M+1-\mu})^2 &= \frac{1}{2} 2 (\check{\psi}_{M+1-\mu})^2 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\ &= \frac{1}{2} 0 \quad (\because \text{直前の鎖}) \\ &= 0 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

(2) 反交換関係の第 2 式 $[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu]_+ = \delta_{\nu, M+1-\mu} I$ において $\nu = M+1-\mu$ と取る。このとき $\delta_{M+1-\mu, M+1-\mu} = 1$ なので ($\mathcal{M}$ へ絞ったので合同式の計算が要らない)、

$$\begin{aligned} \check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger &= (\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} + \check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger) - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\ &= I - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 2 式. 主張 17.4}) \\ &= I - \check{n}_\mu \quad (\because \text{数演算子の定義. 定義 18.2}) \end{aligned}$$

(3) (1)(2) を使って

$$\begin{aligned}
\check{n}_\mu^2 &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \right) \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \right) \quad (\because \text{数演算子の定義。定義 18.2}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger \right) \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger (I - \check{n}_\mu) \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because (2)) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\mu \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= \check{n}_\mu - \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \right) \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \check{n}_\mu = \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \text{。 定義 18.2}) \\
&= \check{n}_\mu - \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \right)^2 \left(\check{\psi}_{M+1-\mu} \right)^2 \quad (\because \text{結合法則}) \\
&= \check{n}_\mu - 0 \cdot 0 \quad (\because (1)) \\
&= \check{n}_\mu \quad (\because \text{零元との積と減法})
\end{aligned}$$

□

主張 18.4 $(\check{n}_\mu \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{n}_\mu)$. $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ が $\mu \neq \nu$ を満たすとき、

- (1) $\check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{\psi}_\mu^\dagger, \quad \check{\psi}_{M+1-\mu} \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{\psi}_{M+1-\mu}$
- (2) $\check{n}_\mu \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{n}_\mu$

証明. Step 1 (4つの反交換関係)。 $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ かつ $\mu \neq \nu$ である。定義 14.5 (2) より $M+1-\mu, M+1-\nu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、主張 17.4 を (μ, ν) 、 $(\mu, M+1-\nu)$ 、 $(\nu, M+1-\mu)$ 、 $(M+1-\mu, M+1-\nu)$ の4通りに適用できる。まず対の条件を見る：

$$\begin{aligned}
\delta_{M+1-\nu, M+1-\mu} &= \delta_{\mu, \nu} \quad (\because M+1-\nu = M+1-\mu \iff \mu = \nu) \\
&= 0 \quad (\because \mu \neq \nu)
\end{aligned}$$

である。**009 章および以前の版で必要だった合同式の書き換え $(\mu + (1-\nu) \equiv 1 \pmod{M} \iff \mu - \nu \equiv 0 \pmod{M})$ は、添字を $\check{\mathcal{M}}$ に絞ったことで不要になっている ** (定義 14.5 (5))。したがって

$$\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger \right]_+ &= 0 \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 1 式。主張 17.4}), \\
\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_{M+1-\nu} \right]_+ &= \delta_{M+1-\nu, M+1-\mu} I \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 2 式。主張 17.4}) \\
&= 0 \quad (\because \text{直前の } \delta \text{ の計算 } \delta_{M+1-\nu, M+1-\mu} = 0), \\
\left[\check{\psi}_{M+1-\mu}, \check{\psi}_\nu^\dagger \right]_+ &= \delta_{M+1-\mu, M+1-\nu} I \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 2 式を添字 } (\nu, M+1-\mu) \text{ へ適用し、反交換子が引数の順序に依らないこと } [X, W]_+ = XW + WX = [W, X]_+ \text{。主張 17.4}) \\
&= 0 \quad (\because \text{直前の } \delta \text{ の計算と } \delta_{M+1-\mu, M+1-\nu} = \delta_{M+1-\nu, M+1-\mu} \text{ (対の条件の対称性)}), \\
\left[\check{\psi}_{M+1-\mu}, \check{\psi}_{M+1-\nu} \right]_+ &= 0 \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 3 式。主張 17.4})
\end{aligned}$$

すなわち、 $A \in \{\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_{M+1-\mu}\}$ と $B \in \{\check{\psi}_\nu^\dagger, \check{\psi}_{M+1-\nu}\}$ のどの組み合わせでも $AB = -BA$ が成り立つ。

Step 2 ((1) の証明)。 $A \in \{\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_{M+1-\mu}\}$ を取ると、数演算子の定義 (定義 18.2) を開き、Step 1 を 2 回使って

$$\begin{aligned}
A \check{n}_\nu &= A \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{数演算子の定義}) \\
&= \left(-\check{\psi}_\nu^\dagger A \right) \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{Step 1 の } A \check{\psi}_\nu^\dagger = -\check{\psi}_\nu^\dagger A) \\
&= -\check{\psi}_\nu^\dagger (A \check{\psi}_{M+1-\nu}) \quad (\because \text{結合法則}) \\
&= -\check{\psi}_\nu^\dagger (-\check{\psi}_{M+1-\nu} A) \quad (\because \text{Step 1 の } A \check{\psi}_{M+1-\nu} = -\check{\psi}_{M+1-\nu} A) \\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\nu} A \quad (\because (-1)^2 = 1) \\
&= \check{n}_\nu A \quad (\because \text{数演算子の定義})
\end{aligned}$$

符号は $(-1)^2 = 1$ となって消える。 $A = \check{\psi}_\mu^\dagger$ と $A = \check{\psi}_{M+1-\mu}$ の両方でこれが成り立つ。

Step 3 ((2) の証明)。数演算子の定義 (定義 18.2) を開き、(1) を 2 回使って

$$\begin{aligned}
\check{n}_\mu \check{n}_\nu &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \right) \check{n}_\nu \quad (\because \text{数演算子の定義}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M+1-\mu} \check{n}_\nu \right) \quad (\because \text{結合法則}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{n}_\nu \check{\psi}_{M+1-\mu} \right) \quad (\because (1) \text{ を } A = \check{\psi}_{M+1-\mu} \text{ に適用}) \\
&= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\nu \right) \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{結合法則}) \\
&= \left(\check{n}_\nu \check{\psi}_\mu^\dagger \right) \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because (1) \text{ を } A = \check{\psi}_\mu^\dagger \text{ に適用}) \\
&= \check{n}_\nu \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \right) \quad (\because \text{結合法則}) \\
&= \check{n}_\nu \check{n}_\mu \quad (\because \text{数演算子の定義})
\end{aligned}$$

□

主張 18.5 $(\text{tr}(R_{\mu_1}^{(e_1)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}) = 2^{M-k} \quad (R_\mu^{(1)} = \check{n}_\mu, R_\mu^{(0)} = I - \check{n}_\mu)). \mu \in \check{\mathcal{M}} \text{ と } e \in \{0, 1\} \text{ に対して}$

$$R_\mu^{(1)} := \check{n}_\mu, \quad R_\mu^{(0)} := I - \check{n}_\mu \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と書く (定義 18.2)。このとき、 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 、相異なる $\mu_1, \dots, \mu_k \in \check{\mathcal{M}}$ 、および $e_1, \dots, e_k \in \{0, 1\}$ について、

$$\text{tr}(R_{\mu_1}^{(e_1)} R_{\mu_2}^{(e_2)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}) = 2^{M-k}$$

($k = 0$ のときは空の積を I と読み、 $\text{tr}(I) = 2^M$ である。) とくに $e_1 = \cdots = e_k = 1$ と取れば $\text{tr}(\check{n}_{\mu_1} \cdots \check{n}_{\mu_k}) = 2^{M-k}$ であり、 $\text{tr}(\check{n}_\mu) = 2^{M-1}$ 、 $k = M$ のとき $\text{tr}(\check{n}_1 \cdots \check{n}_M) = 1$ 。

** 因子として $\check{n}_\mu$ と $I - \check{n}_\mu$ の混在を許しているのが要点である。** これにより 主張 18.6 の $\text{tr}(\check{Q}_\epsilon) = 1$ が、 $\prod_{\mu \notin T} (I - \check{n}_\mu)$ を部分集合の和へ展開して二項定理で足し上げる、という手順を経ずに直接得られる ($k = M$ の場合)。

証明. $\check{n}_\mu \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ であり I は 2^M 次の単位行列なので、主張 10.3 (3) より $\text{tr}(I) = 2^M$ である (トレースは 定義 10.2)。 k に関する帰納法で示す。

基底段階 ($k = 0$) では、空の積が単位行列であることから

$$\begin{aligned}
\text{tr}(I) &= 2^M \quad (\because \text{トレースの基本性質 (3)。主張 10.3}) \\
&= 2^{M-0} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

したがって主張が成立する。

帰納段階: $k \geq 1$ とし、相異なる $k - 1$ 個の添字 (と任意の e の選び方) については主張が成り立つと仮定する。相異なる $\mu_1, \dots, \mu_k \in \check{\mathcal{M}}$ と $e_1, \dots, e_k \in \{0, 1\}$ を取り、

$$P := R_{\mu_2}^{(e_2)} R_{\mu_3}^{(e_3)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}$$

とおく。 $\mu_1 \neq \mu_j$ ($j = 2, \dots, k$) なので 主張 18.4 (1) より $\check{\psi}_{\mu_1}^\dagger$ と $\check{\psi}_{M+1-\mu_1}$ はどの $\check{n}_{\mu_j}$ とも可換であり、 I は任意の行列と可換だから (主張 3.6)、 $R_{\mu_j}^{(e_j)} \in \{\check{n}_{\mu_j}, I - \check{n}_{\mu_j}\}$ ととも可換である。したがって積 P ととも可換である。同じく (2) と 主張 3.6 より $\check{n}_{\mu_1}$ と P は可換である。

まず $2 \text{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) = \text{tr}(P)$ を示す。途中で使う 主張 18.3 の第 2 式は $\check{\psi}_{M+1-\mu_1} \check{\psi}_{\mu_1}^\dagger = I - \check{n}_{\mu_1}$ である。

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) &= \mathrm{tr}(\check{\psi}_{\mu_1}^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu_1} P) \quad (\because \text{数演算子の定義。定義 18.2}) \\
&= \mathrm{tr}(\check{\psi}_{M+1-\mu_1} P \check{\psi}_{\mu_1}^\dagger) \quad (\because \text{トレースの巡回性を } A = \check{\psi}_{\mu_1}^\dagger, B = \check{\psi}_{M+1-\mu_1} P \text{ に適用。主張 10.3}) \\
&= \mathrm{tr}(P \check{\psi}_{M+1-\mu_1} \check{\psi}_{\mu_1}^\dagger) \quad (\because \check{\psi}_{M+1-\mu_1} \text{ と } P \text{ の可換性 (上で確認)}) \\
&= \mathrm{tr}(P(I - \check{n}_{\mu_1})) \quad (\because \text{数演算子の冪等性の第 2 式。主張 18.3}) \\
&= \mathrm{tr}(P) - \mathrm{tr}(P \check{n}_{\mu_1}) \quad (\because \text{分配則とトレースの線型性。主張 10.3}) \\
&= \mathrm{tr}(P) - \mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) \quad (\because \check{n}_{\mu_1} \text{ と } P \text{ が可換})
\end{aligned}$$

直前の鎖を移項し、2 で割ると

$$\begin{aligned}
2 \mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) &= \mathrm{tr}(P) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) &= \frac{1}{2} \mathrm{tr}(P) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

となる。これから e_1 が 1 でも 0 でも同じ値になる：

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(R_{\mu_1}^{(1)} P) &= \mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) \quad (\because R_{\mu_1}^{(1)} = \check{n}_{\mu_1}) \\
&= \frac{1}{2} \mathrm{tr}(P) \quad (\because \text{直前の鎖}), \\
\mathrm{tr}(R_{\mu_1}^{(0)} P) &= \mathrm{tr}((I - \check{n}_{\mu_1}) P) \quad (\because R_{\mu_1}^{(0)} = I - \check{n}_{\mu_1}) \\
&= \mathrm{tr}(P) - \mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) \quad (\because \text{分配則とトレースの線型性}) \\
&= \mathrm{tr}(P) - \frac{1}{2} \mathrm{tr}(P) \quad (\because \text{直前の鎖}) \\
&= \frac{1}{2} \mathrm{tr}(P) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

帰納法の仮定から $\mathrm{tr}(P) = 2^{M-(k-1)}$ なので、いずれの場合も

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(R_{\mu_1}^{(e_1)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}) &= \frac{1}{2} \mathrm{tr}(P) \quad (\because \text{直前の二場合}) \\
&= \frac{1}{2} \cdot 2^{M-k+1} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= 2^{M-k} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

(主張 18.4 (2) と 主張 3.6 より $R_\mu^{(e)}$ たちは互いに可換で積の順序に依らないので、どの因子を μ_1 の位置に置いてもよく、一般の相異なる添字列についても同じ結論を得る。) $\square$

主張 18.6 (数演算子の同時固有空間分解 (各空間は 1 次元)). $\epsilon = (\epsilon_\mu)_{\mu=1}^M \in \{0, 1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対して

$$\check{Q}_\epsilon := \prod_{\mu=1}^M \left(\epsilon_\mu \check{n}_\mu + (1 - \epsilon_\mu)(I - \check{n}_\mu) \right) \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める (因子は 主張 18.4 により互いに可換なので、積の順序は問わない)。このとき、

- (1) $\check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'} = 0 \quad (\epsilon \neq \epsilon'), \quad \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon$
- (2) $\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{Q}_\epsilon = I$
- (3) $\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \check{n}_\nu = \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\nu \in \check{\mathcal{M}})$
- (4) $\mathrm{tr}(\check{Q}_\epsilon) = 1, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{im} \check{Q}_\epsilon = 1$
- (5) $\mathbb{C}^{2^M} = \bigoplus_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \mathrm{im} \check{Q}_\epsilon$

が成り立つ。すなわち $\mathbb{C}^{2^M}$ は 2^M 個の 1 次元部分空間の直和に分解される。009 章の主張 10.9 (4) の次元 2^{M-m} は臨界点で 2 になりえたが、半整数運動量では $m = M$ なので ** 常に 1 次元 ** である (定義 18.2)。

証明. 以下、主張 18.5 と同じ記号を使う： $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $e \in \{0, 1\}$ に対して $R_\mu^{(1)} := \check{n}_\mu$ 、 $R_\mu^{(0)} := I - \check{n}_\mu$ 。 $\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ である。

Step 0 (1 つの添字についての関係)。主張 18.3 (3) の $\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$ と、単位行列が任意の行列と可換であること (主張 3.6) を使う。まず 2 つの冪等性：

$$\begin{aligned} R_\mu^{(1)} R_\mu^{(1)} &= \check{n}_\mu \check{n}_\mu \quad (\because R_\mu^{(1)} \text{ の定義 (冒頭)}) \\ &= \check{n}_\mu \quad (\because \text{数演算子の冪等性 (3)}) \\ &= R_\mu^{(1)} \quad (\because R_\mu^{(1)} \text{ の定義 (冒頭)}) \\ R_\mu^{(0)} R_\mu^{(0)} &= (I - \check{n}_\mu)(I - \check{n}_\mu) \quad (\because R_\mu^{(0)} \text{ の定義 (冒頭)}) \\ &= I - \check{n}_\mu - \check{n}_\mu + \check{n}_\mu \check{n}_\mu \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\ &= I - \check{n}_\mu - \check{n}_\mu + \check{n}_\mu \quad (\because \text{数演算子の冪等性 (3)}) \\ &= I - \check{n}_\mu \quad (\because \text{行列の加法 (同じ項の消去)}) \\ &= R_\mu^{(0)} \quad (\because R_\mu^{(0)} \text{ の定義 (冒頭)}) \end{aligned}$$

次に異なる上付き添字の積が両順序とも零であること：

$$\begin{aligned} R_\mu^{(1)} R_\mu^{(0)} &= \check{n}_\mu (I - \check{n}_\mu) \quad (\because R_\mu^{(1)}, R_\mu^{(0)} \text{ の定義 (冒頭)}) \\ &= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \check{n}_\mu \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\ &= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \quad (\because \text{数演算子の冪等性 (3)}) \\ &= 0 \quad (\because \text{行列の加法逆元}) \\ R_\mu^{(0)} R_\mu^{(1)} &= (I - \check{n}_\mu) \check{n}_\mu \quad (\because R_\mu^{(0)}, R_\mu^{(1)} \text{ の定義 (冒頭)}) \\ &= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \check{n}_\mu \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\ &= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \quad (\because \text{数演算子の冪等性 (3)}) \\ &= 0 \quad (\because \text{行列の加法逆元}) \end{aligned}$$

最後に和が単位行列であること：

$$\begin{aligned} R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} &= \check{n}_\mu + (I - \check{n}_\mu) \quad (\because R_\mu^{(1)}, R_\mu^{(0)} \text{ の定義 (冒頭)}) \\ &= I \quad (\because \text{行列の加法 (加法逆元と単位元)}) \end{aligned}$$

また $\mu \neq \nu$ のとき 主張 18.4 (2) より $\check{n}_\mu \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{n}_\mu$ であり、 I は任意の行列と可換だから (主張 3.6)、 $R_\mu^{(e)}$ と $R_\nu^{(e')}$ も可換である。

Step 1 ((1) の証明)。 $\epsilon \neq \epsilon'$ なら、ある $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ で $\epsilon_\nu \neq \epsilon'_\nu$ 。因子はすべて可換なので、 $\check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'}$ の中で添字 ν の 2 因子を隣接させられて

$$\begin{aligned} \check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'} &= \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon'_\mu)} \right) R_\nu^{(\epsilon_\nu)} R_\nu^{(\epsilon'_\nu)} \quad (\because \text{因子の可換性により添字 } \nu \text{ の二因子を末尾へ寄せる}) \\ &= \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon'_\mu)} \right) \cdot 0 \quad (\because \epsilon_\nu \neq \epsilon'_\nu \text{ と Step 0 の異なる上付き添字の積}) \\ &= 0 \quad (\because \text{零行列は行列積の零元}) \end{aligned}$$

$\epsilon = \epsilon'$ のときは各因子が Step 0 より冪等なので、

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon^2 &= \left(\prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \left(\prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義}) \\
&= \prod_{\mu=1}^M \left(R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \quad (\because \text{異なる添字の因子の可換性}) \\
&= \prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \text{Step 0 の二つの冪等性を各因子へ同時に適用}) \\
&= \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義})
\end{aligned}$$

Step 2 ((2) の証明)。主張の左辺から始める：

$$\begin{aligned}
\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{Q}_\epsilon &= \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義 (冒頭)}) \\
&= \prod_{\mu=1}^M \left(R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} \right) \quad (\because \text{可換な有限個の因子の積の分配法則による展開}) \\
&= \prod_{\mu=1}^M I \quad (\because \text{Step 0 の和が単位行列であることを各因子へ同時に適用}) \\
&= I \quad (\because \text{単位行列の有限積は単位行列})
\end{aligned}$$

(展開して現れる項は、各 μ について $R_\mu^{(1)}$ と $R_\mu^{(0)}$ のどちらを選ぶかの全ての選び方に 1 対 1 に対応し、その選び方の全体が $\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ (要素数 2^M) である。)

Step 3 ((3) の証明)。 $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ を固定する。因子はすべて可換なので、主張の左辺は

$$\begin{aligned}
\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon &= \check{n}_\nu \prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義}) \\
&= \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \check{n}_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \text{異なる添字の因子の可換性})
\end{aligned}$$

$\epsilon_\nu = 1$ の場合は

$$\begin{aligned}
\check{n}_\nu R_\nu^{(1)} &= \check{n}_\nu \check{n}_\nu \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義 (冒頭)}) \\
&= \check{n}_\nu \quad (\because \text{数演算子の冪等性 (3)}) \\
&= R_\nu^{(1)} \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義 (冒頭)}) \\
&= \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \epsilon_\nu = 1 \text{ と単位元の積})
\end{aligned}$$

$\epsilon_\nu = 0$ の場合は

$$\begin{aligned}
\check{n}_\nu R_\nu^{(0)} &= \check{n}_\nu (I - \check{n}_\nu) \quad (\because R_\nu^{(0)} \text{ の定義 (冒頭)}) \\
&= \check{n}_\nu - \check{n}_\nu \check{n}_\nu \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\
&= \check{n}_\nu - \check{n}_\nu \quad (\because \text{数演算子の冪等性 (3)}) \\
&= 0 \quad (\because \text{行列の加法逆元}) \\
&= \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \epsilon_\nu = 0 \text{ と零元の積})
\end{aligned}$$

したがって、どちらの場合も

$$\begin{aligned}\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon &= \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \text{直前の二つの場合}) \\ &= \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義とスカラーの分配})\end{aligned}$$

** 左右どちらから掛けても同じである。 ** 実際 $\check{n}_\nu$ は $\check{Q}_\epsilon$ のどの因子 $R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ とも可換である ($\mu \neq \nu$ なら Step 0 の可換性、 $\mu = \nu$ なら $\check{n}_\nu$ と $\check{n}_\nu$ または $I - \check{n}_\nu$ の可換性で、後者は主張 3.6 による) から、

$$\begin{aligned}\check{Q}_\epsilon \check{n}_\nu &= \check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{n}_\nu \text{ と } \check{Q}_\epsilon \text{ の全因子の可換性}) \\ &= \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{直前の結果})\end{aligned}$$

Step 4 ((4) の証明)。 $\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ は、相異なる M 個の添字 $1, \dots, M \in \check{\mathcal{M}}$ についての $R_\mu^{(\epsilon)}$ の積そのものなので、主張 18.5 を $k = M, (\mu_1, \dots, \mu_M) = (1, \dots, M), (e_1, \dots, e_M) = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_M)$ として適用でき、

$$\begin{aligned}\text{tr}(\check{Q}_\epsilon) &= 2^{M-M} \quad (\because \text{数演算子の積のトレース (上の適用)}) \\ &= 2^0 \quad (\because M - M = 0) \\ &= 1 \quad (\because \text{冪の零乗})\end{aligned}$$

を得る ($\check{\mathcal{M}} = \{1, \dots, M\}$ の元をすべて使い切っているので指数が 0 になる。ここが 009 章と分かれる点である)。

$\check{Q}_\epsilon$ は Step 1 より冪等なので、

$$\begin{aligned}\dim_{\mathbb{C}} \text{im } \check{Q}_\epsilon &= \text{tr}(\check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{冪等行列のトレースは像の次元 (主張 10.4)。} \check{Q}_\epsilon \text{ は Step 1 より冪等}) \\ &= 1 \quad (\because \text{上で計算した } \text{tr}(\check{Q}_\epsilon))\end{aligned}$$

009 章の同じ計算が 2^{M-m} を与えるところで、 $m = M$ により $2^{M-M} = 1$ になっている。

Step 5 ((5) の証明)。(2) より任意の $x \in \mathbb{C}^{2^M}$ について

$$\begin{aligned}x &= Ix \quad (\because \text{単位行列の作用}) \\ &= \left(\sum_{\epsilon} \check{Q}_\epsilon \right) x \quad (\because \text{Step 2 の射影子の和}) \\ &= \sum_{\epsilon} \check{Q}_\epsilon x \quad (\because \text{行列の作用の分配法則})\end{aligned}$$

である。各項 $\check{Q}_\epsilon x$ は $\text{im } \check{Q}_\epsilon$ に属するから和は全体を張る。直和であることを見るために $\sum_{\epsilon} y_{\epsilon} = 0$ ($y_{\epsilon} \in \text{im } \check{Q}_{\epsilon}$) とする。任意の ϵ' を固定する。Step 1 より、 $\epsilon \neq \epsilon'$ なら $\check{Q}_{\epsilon'} y_{\epsilon} = 0$ であり、 $y_{\epsilon'} \in \text{im } \check{Q}_{\epsilon'}$ と冪等性から $\check{Q}_{\epsilon'} y_{\epsilon'} = y_{\epsilon'}$ である。したがって

$$\begin{aligned}y_{\epsilon'} &= \sum_{\epsilon} \check{Q}_{\epsilon'} y_{\epsilon} \quad (\because \text{Step 1 の直交性と冪等性}) \\ &= \check{Q}_{\epsilon'} \left(\sum_{\epsilon} y_{\epsilon} \right) \quad (\because \text{行列の作用の分配法則}) \\ &= \check{Q}_{\epsilon'} 0 \quad (\because \sum_{\epsilon} y_{\epsilon} = 0) \\ &= 0 \quad (\because \text{零ベクトルへの行列の作用})\end{aligned}$$

が各 ϵ' について成り立ち、直和である。

(次元の整合： $|\{0, 1\}^{\check{\mathcal{M}}}| = 2^M$ 個の空間がそれぞれ 1 次元で、合計 2^M となり $\mathbb{C}^{2^M}$ の次元に一致する。) □

主張 18.7 ($\check{V}'$ の固有値). $\epsilon \in \{0, 1\}^{\check{M}}$ に対して

$$\check{g}(\epsilon) := \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2}) \in \mathbb{R}$$

とおく (定義 16.9)。このとき

$$\check{V}' \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \check{V}' = e^{\check{g}(\epsilon)} \check{Q}_\epsilon$$

が成り立つ。すなわち $\text{im } \check{Q}_\epsilon$ の各元は $\check{V}'$ の固有値 $e^{\check{g}(\epsilon)}$ の固有ベクトルであり、主張 18.6 (5) より $\check{V}'$ は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて

$$\left\{ e^{\check{g}(\epsilon)} \mid \epsilon \in \{0, 1\}^{\check{M}} \right\} \quad (\text{各 } \epsilon \text{ が重複度 } 1 \text{ を与え、総個数 } 2^{\check{M}})$$

で尽くされる。とくに $\check{V}'$ の固有値はすべて正の実数である。

**「固有値がすべて相異なる」ことは主張しない。* 主張 17.3 (3) より $\gamma(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ なので、 ϵ の成分を $\mu \leftrightarrow M+1-\mu$ で入れ替えても $\check{g}(\epsilon)$ は変わらない。したがって相異なる ϵ が同じ固有値を与えることは実際に起こる。* 単純性を主張するのは最大固有値だけである ** (定理 18.16)。

証明. Step 1 ($\check{X}\check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$)。定義 18.2 (2) の $\check{X} = \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I)$ に 主張 18.6 (3) を代入して

$$\begin{aligned} \check{X}\check{Q}_\epsilon &= \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\check{n}_\mu \check{Q}_\epsilon - \frac{1}{2}\check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\ &= \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon - \frac{1}{2}\check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{同時固有空間分解 (3)}) \\ &= \left(\sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2}) \right) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{有限和のくくり出し}) \\ &= \check{g}(\epsilon) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{g} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

同じ計算を 主張 18.6 (3) の右から掛ける形 $\check{Q}_\epsilon \check{n}_\mu = \epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon$ に対して行えば $\check{Q}_\epsilon \check{X} = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ も得られる。とくに $\check{X}\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \check{X}$ (両者が同じ $\check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ に等しい) である。

Step 2 ($\check{X}^k \check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon$)。 k に関する帰納法。 $k=0$ は自明。 $\check{X}^k \check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon$ を仮定すると

$$\begin{aligned} \check{X}^{k+1} \check{Q}_\epsilon &= \check{X} (\check{X}^k \check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{行列の冪の定義と積の結合法則}) \\ &= \check{X} (\check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= \check{g}(\epsilon)^k (\check{X} \check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{スカラー倍と行列の積の交換}) \\ &= \check{g}(\epsilon)^k (\check{g}(\epsilon) \check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{Step 1}) \\ &= \check{g}(\epsilon)^{k+1} \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{スカラー倍の結合法則}) \end{aligned}$$

Step 3 (指数関数へ)。定義 4.4 より $\check{V}' = \exp(\check{X}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \check{X}^k$ であり、この級数は 定理 4.3 により 定義 3.8 のノルムについて収束する。部分和を $E_K := \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} \check{X}^k$ と書くと、Step 2 と有限和の線型性から

$$\begin{aligned}
E_K \check{Q}_\epsilon &= \left(\sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} \check{X}^k \right) \check{Q}_\epsilon \quad (\because E_K \text{ の定義}) \\
&= \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} \left(\check{X}^k \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{有限和と行列積の分配法則}) \\
&= \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} \left(\check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \left(\sum_{k=0}^K \frac{\check{g}(\epsilon)^k}{k!} \right) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{有限和からの共通因子のくくり出し})
\end{aligned}$$

$K \rightarrow \infty$ の極限を取る。行列積の連続性 (主張 3.13) と実指数級数の収束 (主張 4.1) により

$$\begin{aligned}
\check{V}' \check{Q}_\epsilon &= \left(\lim_{K \rightarrow \infty} E_K \right) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{V}' = \exp(\check{X}) \text{ は部分和 } E_K \text{ の極限。上の級数表示}) \\
&= \lim_{K \rightarrow \infty} (E_K \check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{行列積の連続性}) \\
&= \lim_{K \rightarrow \infty} \left(\left(\sum_{k=0}^K \frac{\check{g}(\epsilon)^k}{k!} \right) \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{上の部分和の鎖}) \\
&= e^{\check{g}(\epsilon)} \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{実指数級数の収束と極限の一意性})
\end{aligned}$$

Step 3' (右から掛ける形)。Step 1 の $\check{Q}_\epsilon \check{X} = \check{g}(\epsilon) \check{Q}_\epsilon$ から、 k に関する帰納法を行う。 $k=0$ は単位行列の右単位元により成り立つ。 $\check{Q}_\epsilon \check{X}^k = \check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon$ を仮定すると

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon \check{X}^{k+1} &= \left(\check{Q}_\epsilon \check{X}^k \right) \check{X} \quad (\because \text{行列の冪の定義と積の結合法則}) \\
&= \left(\check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon \right) \check{X} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^k (\check{Q}_\epsilon \check{X}) \quad (\because \text{スカラー倍と行列の積の交換}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^k (\check{g}(\epsilon) \check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{Step 1 の右から掛ける形}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^{k+1} \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{スカラー倍の結合法則})
\end{aligned}$$

したがって全ての $k \in \mathbb{N}$ でこの等式が成り立つ。Step 3 と同じ部分 E_K について

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon E_K &= \check{Q}_\epsilon \left(\sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} \check{X}^k \right) \quad (\because E_K \text{ の定義}) \\
&= \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} \left(\check{Q}_\epsilon \check{X}^k \right) \quad (\because \text{有限和と行列積の分配法則}) \\
&= \sum_{k=0}^K \frac{1}{k!} \left(\check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{上の帰納法}) \\
&= \left(\sum_{k=0}^K \frac{\check{g}(\epsilon)^k}{k!} \right) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{有限和からの共通因子のくくり出し})
\end{aligned}$$

$K \rightarrow \infty$ の極限を取る。行列積の連続性 (主張 3.13) と実指数級数の収束 (主張 4.1) により

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon \check{V}' &= \check{Q}_\epsilon \left(\lim_{K \rightarrow \infty} E_K \right) \quad (\because \check{V}' = \exp(\check{X}) \text{ は部分和 } E_K \text{ の極限。Step 3 の級数表示}) \\
&= \lim_{K \rightarrow \infty} (\check{Q}_\epsilon E_K) \quad (\because \text{行列積の連続性}) \\
&= \lim_{K \rightarrow \infty} \left(\left(\sum_{k=0}^K \frac{\check{g}(\epsilon)^k}{k!} \right) \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{上の部分和の鎖}) \\
&= e^{\check{g}(\epsilon)} \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{実指数級数の収束と極限の一意性}) \\
&= \check{V}' \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{Step 3})
\end{aligned}$$

を得る。** この左からの形 ($\check{Q}_\epsilon$ を固有方程式の両辺に左から掛ける使い方) が 定理 18.16 (3) で必要になる。 **

Step 4 (固有値の言い換え)。 $y \in \text{im } \check{Q}_\epsilon$ なら $y = \check{Q}_\epsilon x$ と書いて

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon y &= \check{Q}_\epsilon (\check{Q}_\epsilon x) \quad (\because y = \check{Q}_\epsilon x \text{ と書いた}) \\
&= \check{Q}_\epsilon^2 x \quad (\because \text{行列積の結合法則}) \\
&= \check{Q}_\epsilon x \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (1) の冪等性}) \\
&= y \quad (\because y = \check{Q}_\epsilon x \text{ と書いた})
\end{aligned}$$

である (冪等性は 主張 18.6 (1))。だから

$$\begin{aligned}
\check{V}' y &= \check{V}' (\check{Q}_\epsilon y) \quad (\because \text{上の等式 } \check{Q}_\epsilon y = y) \\
&= e^{\check{g}(\epsilon)} \check{Q}_\epsilon y \quad (\because \text{Step 3}) \\
&= e^{\check{g}(\epsilon)} y \quad (\because \text{上の等式 } \check{Q}_\epsilon y = y)
\end{aligned}$$

主張 18.6 (5) より $\mathbb{C}^{2^M}$ は $\text{im } \check{Q}_\epsilon$ たちの直和だから、各 $\text{im } \check{Q}_\epsilon$ の基底 (1 次元なので 1 本) を合わせると $\check{V}'$ の固有ベクトルからなる $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底が得られる。したがって $\check{V}'$ は対角化可能で、固有値は $e^{\check{g}(\epsilon)}$ が各 ϵ について 1 つずつ現れるもので尽くされる (総個数 2^M)。

$\check{g}(\epsilon) \in \mathbb{R}$ (定義 16.9 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}_{>0}$) なので $e^{\check{g}(\epsilon)} > 0$ である。 $\square$

主張 18.8 ($\text{tr}(\check{V}') = \text{tr}((\check{V}')^{-1}) > 0$). $\check{V}'$ は可逆で $(\check{V}')^{-1} = \exp(-\check{X})$ であり (定義 17.6 (2))、

$$\text{tr}(\check{V}') = \text{tr}((\check{V}')^{-1}) = \prod_{\mu=1}^M 2 \cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \in \mathbb{R}_{>0}$$

が成り立つ。009 章の 主張 10.11 にあった前因子 2^{M-m} は $m = M$ なので 1 であり、ここには現れない。

証明. Step 1 (トレースの計算)。主張 18.6 (2)(4) と 主張 18.7、および 主張 10.3 (1) より

$$\begin{aligned}
\text{tr}(\check{V}') &= \text{tr}\left(\check{V}' \sum_{\epsilon} \check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \sum_{\epsilon} \check{Q}_\epsilon = I) \\
&= \sum_{\epsilon} \text{tr}(\check{V}' \check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{トレースの線型性}) \\
&= \sum_{\epsilon} e^{\check{g}(\epsilon)} \text{tr}(\check{Q}_\epsilon) \quad (\because \check{V}' \check{Q}_\epsilon = e^{\check{g}(\epsilon)} \check{Q}_\epsilon) \\
&= \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{M}}} e^{\check{g}(\epsilon)} \quad (\because \text{tr}(\check{Q}_\epsilon) = 1)
\end{aligned}$$

Step 2 (積への分解)。 $\check{g}(\epsilon) = \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2})$ なので、実数の指数法則より

$$e^{\check{g}(\epsilon)} = \prod_{\mu=1}^M \exp\left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2}\right)\right) \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1))$$

ϵ は各成分を独立に 0 か 1 から選ぶので、有限個の因子の積の展開 (Step 1 の $\sum_\epsilon$ と同じ 1 対 1 対応) により

$$\begin{aligned} \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{M}}} e^{\check{g}(\epsilon)} &= \prod_{\mu=1}^M \left(\exp\left(-\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) + \exp\left(+\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \right) \quad (\because \text{直前の積表示と、有限個の因子の積の展開}) \\ &= \prod_{\mu=1}^M 2 \cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \quad \left(\because \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) \end{aligned}$$

Step 3($(\check{V}')^{-1}$ についても同じ値)。 $(\check{V}')^{-1} = \exp(-\check{X})$ であり、 $-\check{X} = \sum_{\mu=1}^M \left(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right) (\tilde{n}_\mu - \frac{1}{2}I)$ だから、Step 1~2 をそのまま $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \rightarrow -\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ として適用でき (主張 18.7 の Step 1~4 も符号を替えるだけで通る)

$$\begin{aligned} \text{tr}\left((\check{V}')^{-1}\right) &= \prod_{\mu=1}^M 2 \cosh\left(\frac{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \quad (\because \text{Step 1-2 を } \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \mapsto -\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \text{ として適用}) \\ &= \prod_{\mu=1}^M 2 \cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \quad (\because \cosh \text{ は偶関数}) \\ &= \text{tr}(\check{V}') \quad (\because \text{Step 1-2 の } \check{V}' \text{ のトレース表示}) \end{aligned}$$

Step 4 (正値性)。定義 16.9 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、主張 1.4 より各 μ について次の鎖を得る。

$$\begin{aligned} 2 \cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) &\geq 2 \quad (\because \cosh x \geq 1) \\ &> 0 \quad (\because 2 > 0) \end{aligned}$$

したがって正数の有限積と Step 1-2 のトレース表示により

$$\begin{aligned} \text{tr}(\check{V}') &= \prod_{\mu=1}^M 2 \cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \quad (\because \text{Step 1-2}) \\ &> 0 \quad (\because \text{正数の有限積は正}) \end{aligned}$$

□

主張 18.9 ($V^{(+)}$ は正定値). 主張 10.15 の $S_1^{(\pm)} := iK_1 H_1^{(\pm)}$ 、 $S_2 := iK_2^* H_2$ について、** 上の符号を取ったもの $S_1^{(+)}$ を使う **。定義 15.4 の $V^{(+)} = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は

$$V^{(+)} = (2s_2)^{M/2} \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right)$$

と書ける ($s_2 = \sinh 2K_2$ は 定義 5.8)。このとき $V^{(+)}$ は正定値 (定義 10.12 の意味) である。

証明. Step 1 (表示)。二つの因子を順に書き直す (定義 15.4、定義 15.3、定義 5.8、主張 10.15)。

$$\begin{aligned}\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} &= \exp\left(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \quad (\because \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \text{ の定義}) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \quad (\because S_1^{(+)} = iK_1H_1^{(+)})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_2 &= (2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^*H_2) \quad (\because V_2 \text{ の表示}) \\ &= (2s_2)^{M/2} \exp(S_2) \quad (\because S_2 = iK_2^*H_2)\end{aligned}$$

$(2s_2)^{M/2}$ はスカラーなので 主張 3.6 により前へ出せて statement の表示を得る。

Step 2 (各因子の性質)。主張 10.15 は $S_1^{(\pm)}$ を ** 複号のいずれについても ** 実対称としているので、 $S_1^{(+)}$ も実対称、したがって 定義 10.12 の最後の注意よりエルミートである。 $\frac{1}{2}S_1^{(+)}$ と S_2 もエルミート (実係数倍) であり、主張 10.14 (1) より

- $B := \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right)$ はエルミートかつ正定値、とくに可逆
- $A := \exp(S_2)$ は正定値

Step 3 (正定値性)。 B がエルミートなので $B^* = B$ であり、

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) &= BAB \quad (\because B, A \text{ の定義 (Step 2)}) \\ &= B^*AB \quad (\because B^* = B)\end{aligned}$$

主張 10.14 (2) より B^*AB は正定値。 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、同 (3) より $V^{(+)} = (2s_2)^{M/2} B^*AB$ も正定値である。□

主張 18.10 ($V^{(+)}$ は可逆であり、左右逆は明示できる)。主張 18.9 の表示に対して、次の行列を置く：

$$R^{(+)} := (2s_2)^{-M/2} \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \exp(-S_2) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}).$$

このとき左右の積はそれぞれ

$$V^{(+)}R^{(+)} = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}, \quad R^{(+)}V^{(+)} = I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$$

である。したがって $V^{(+)}$ は可逆であり、

$$\left(V^{(+)}\right)^{-1} = R^{(+)} = (2s_2)^{-M/2} \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \exp(-S_2) \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right).$$

証明. Step 1(指数行列どうしの左右逆)。 $E_+ := \exp(\frac{1}{2}S_1^{(+)})$ 、 $E_- := \exp(-\frac{1}{2}S_1^{(+)})$ 、 $A_+ := \exp(S_2)$ 、 $A_- := \exp(-S_2)$ と置く。各指数の行列とその反数は可換するので、定理 4.5 と 定理 4.6 を一行ずつ使うと、

$$\begin{aligned}
E_+E_- &= \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)} - \frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) & (\because \text{定理 4.5}) \\
&= \exp(O) & \left(\because \frac{1}{2}S_1^{(+)} - \frac{1}{2}S_1^{(+)} = O\right) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because \text{定理 4.6}), \\
E_-E_+ &= \exp\left(-\frac{1}{2}S_1^{(+)} + \frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) & (\because \text{定理 4.5}) \\
&= \exp(O) & \left(\because -\frac{1}{2}S_1^{(+)} + \frac{1}{2}S_1^{(+)} = O\right) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because \text{定理 4.6}), \\
A_+A_- &= \exp(S_2 - S_2) & (\because \text{定理 4.5}) \\
&= \exp(O) & (\because S_2 - S_2 = O) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because \text{定理 4.6}), \\
A_-A_+ &= \exp(-S_2 + S_2) & (\because \text{定理 4.5}) \\
&= \exp(O) & (\because -S_2 + S_2 = O) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because \text{定理 4.6}).
\end{aligned}$$

Step 2 (右側の候補を掛ける)。 $a := (2s_2)^{M/2}$ と置く。 $s_2 > 0$ なので $a > 0$ であり、正の実数の冪の指数法則から $a^{-1} = (2s_2)^{-M/2}$ である。スカラー倍した単位行列は全行列と可換する (主張 3.6) ので、結合法則と Step 1 を使って

$$\begin{aligned}
V^{(+)}R^{(+)} &= (aE_+A_+E_+)(a^{-1}E_-A_-E_-) & (\because V^{(+)} \text{ と } R^{(+)} \text{ の表示}) \\
&= aa^{-1}E_+A_+E_+E_-A_-E_- & (\because \text{主張 3.6 とスカラー倍の結合法則}) \\
&= E_+A_+E_+E_-A_-E_- & (\because aa^{-1} = 1) \\
&= E_+A_+(E_+E_-)A_-E_- & (\because \text{行列積の結合法則}) \\
&= E_+A_+IA_-E_- & (\because \text{Step 1 の第一の左右逆}) \\
&= E_+A_+A_-E_- & (\because \text{単位行列}) \\
&= E_+(A_+A_-)E_- & (\because \text{行列積の結合法則}) \\
&= E_+IE_- & (\because \text{Step 1 の第三の左右逆}) \\
&= E_+E_- & (\because \text{単位行列}) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because \text{Step 1 の第一の左右逆}).
\end{aligned}$$

Step 3 (左側の候補を掛ける)。Step 1 の残る二つの左右逆を使うと

$$\begin{aligned}
R^{(+)}V^{(+)} &= (a^{-1}E_-A_-E_-)(aE_+A_+E_+) & (\because R^{(+)} \text{ と } V^{(+)} \text{ の表示}) \\
&= a^{-1}aE_-A_-E_-E_+A_+E_+ & (\because \text{主張 3.6 とスカラー倍の結合法則}) \\
&= E_-A_-E_-E_+A_+E_+ & (\because a^{-1}a = 1) \\
&= E_-A_-(E_-E_+)A_+E_+ & (\because \text{行列積の結合法則}) \\
&= E_-A_-IA_+E_+ & (\because \text{Step 1 の第二の左右逆}) \\
&= E_-A_-A_+E_+ & (\because \text{単位行列}) \\
&= E_-(A_-A_+)E_+ & (\because \text{行列積の結合法則}) \\
&= E_-IE_+ & (\because \text{Step 1 の第四の左右逆}) \\
&= E_-E_+ & (\because \text{単位行列}) \\
&= I_{\text{Mat}(2^M, \mathbb{C})} & (\because \text{Step 1 の第二の左右逆}).
\end{aligned}$$

したがって $R^{(+)}$ は $V^{(+)}$ の右逆かつ左逆であり、statement の逆行列の明示式を得る。 $\square$

主張 18.11 ($(V^{(+)})^{-1}$ は正定値). 主張 18.10 で明示した $(V^{(+)})^{-1}$ は正定値 (定義 10.12 の意味) である。

証明. 主張 10.15 より $-\frac{1}{2}S_1^{(+)}$ と $-S_2$ は実対称、したがってエルミートである。主張 10.14 (1) より

- $B_- := \exp(-\frac{1}{2}S_1^{(+)})$ はエルミートかつ正定値
- $A_- := \exp(-S_2)$ は正定値

$C_- := \exp(\frac{1}{2}S_1^{(+)})$ と置く。二つの指数の中の行列は、

$$\begin{aligned} (-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) (\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) &= -\tfrac{1}{4}(S_1^{(+)})^2 \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の結合則}) \\ &= (\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) (-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) \quad (\because \text{スカラーの積は可換}) \end{aligned}$$

のように可換である。したがって 定理 4.5 と 定理 4.6 より、

$$\begin{aligned} B_- C_- &= \exp(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) \exp(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) \quad (\because B_-, C_- \text{ の定義}) \\ &= \exp\left((-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) + (\tfrac{1}{2}S_1^{(+)})\right) \quad (\because \text{可換な行列の指数関数の積公式}) \\ &= \exp(0) \quad (\because (-\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2})S_1^{(+)} = 0) \\ &= I \quad (\because \exp(0) = I), \\ C_- B_- &= \exp(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) \exp(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) \quad (\because C_-, B_- \text{ の定義}) \\ &= \exp\left((\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) + (-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)})\right) \quad (\because \text{可換な行列の指数関数の積公式}) \\ &= \exp(0) \quad (\because (\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2})S_1^{(+)} = 0) \\ &= I \quad (\because \exp(0) = I). \end{aligned}$$

よって B_- は可逆であり、その逆行列は C_- である。

B_- がエルミートなので $B_-^* = B_-$ であり、

$$\begin{aligned} \exp(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) \exp(-S_2) \exp(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) &= B_- A_- B_- \quad (\because B_-, A_- \text{ の定義}) \\ &= B_-^* A_- B_- \quad (\because B_-^* = B_-) \end{aligned}$$

主張 10.14 (2) より $B_-^* A_- B_-$ は正定値である。 $s_2 > 0$ より $(2s_2)^{-M/2} > 0$ であるから、同 (3) より $(2s_2)^{-M/2} B_-^* A_- B_-$ は正定値である。

主張 18.10 の明示式と $B_-^* = B_-$ より、

$$\begin{aligned} (V^{(+)})^{-1} &= (2s_2)^{-M/2} \exp(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) \exp(-S_2) \exp(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}) \quad (\because \text{逆行列の明示式}) \\ &= (2s_2)^{-M/2} B_- A_- B_- \quad (\because B_-, A_- \text{ の定義}) \\ &= (2s_2)^{-M/2} B_-^* A_- B_- \quad (\because B_-^* = B_-). \end{aligned}$$

したがって $(V^{(+)})^{-1}$ も正定値である。 $\square$

主張 18.12 ($\text{tr}(V^{(+)})$ は正).

$$\text{tr}(V^{(+)}) \in \mathbb{R}_{>0}.$$

証明. 主張 18.9 と 主張 10.14 (4) より $\text{tr}(V^{(+)}) > 0$ である。 $\square$

主張 18.13 ($\text{tr}\left((V^{(+)})^{-1}\right)$ は正).

$$\text{tr}\left((V^{(+)})^{-1}\right) \in \mathbb{R}_{>0}.$$

証明. 主張 18.11 と 主張 10.14 (4) より $\text{tr}((V^{(+)})^{-1}) > 0$ である。 $\square$

主張 18.14 ($c = (2 \sinh 2K_2)^{M/2}$). 主張 17.10 の定数 $c \in \mathbb{C}^\times$ は

$$c = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} = (2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$$

である。すなわち

$$V^{(+)} = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \check{V}'$$

証明. 以下 $S_1 := S_1^{(+)} = iK_1 H_1^{(+)}$ 、 $S_2 = iK_2^* H_2$ (主張 10.15)、 $\tau := \text{tr}(\exp(S_1) \exp(S_2))$ と書く。

Step 1 ($\text{tr}(V^{(+)})$ と $\text{tr}\left((V^{(+)})^{-1}\right)$ を τ で表す)。主張 18.9 の表示と 主張 10.3 (1)(2) より

$$\begin{aligned} \text{tr}(V^{(+)}) &= (2s_2)^{M/2} \text{tr}(\exp(\tfrac{1}{2}S_1) \exp(S_2) \exp(\tfrac{1}{2}S_1)) \quad (\because \text{トレースの線型性}) \\ &= (2s_2)^{M/2} \text{tr}(\exp(\tfrac{1}{2}S_1) \exp(\tfrac{1}{2}S_1) \exp(S_2)) \quad (\because \text{巡回性を } A = \exp(\tfrac{1}{2}S_1) \exp(S_2), B = \exp(\tfrac{1}{2}S_1) \text{ に適用}) \\ &= (2s_2)^{M/2} \text{tr}(\exp(S_1) \exp(S_2)) \quad (\because \text{可換なので } \exp(\tfrac{1}{2}S_1)^2 = \exp(S_1)) \\ &= (2s_2)^{M/2} \tau \quad (\because \tau := \text{tr}(\exp(S_1) \exp(S_2))) \end{aligned}$$

同じ計算を 主張 18.10 の $(V^{(+)})^{-1}$ の表示に適用して

$$\text{tr}\left((V^{(+)})^{-1}\right) = (2s_2)^{-M/2} \text{tr}(\exp(-S_1) \exp(-S_2))$$

Step 2 ($\text{tr}(\exp(-S_1) \exp(-S_2)) = \tau$)。主張 10.17 の U は ** 複号同順に ** $US_1^{(\pm)}U^{-1} = -S_1^{(\pm)}$ 、 $US_2U^{-1} = -S_2$ を与えるので、上の符号を取って $US_1U^{-1} = -S_1$ が使える。共役は行列の積とスカラー倍を保ち、有限部分和の極限とも交換する ($\|UXU^{-1} - UWU^{-1}\| = \|U(X - W)U^{-1}\| \leq \|U\| \|U^{-1}\| \|X - W\|$: 主張 3.10) から、 $US^kU^{-1} = (USU^{-1})^k$ と 定義 4.4 より

$$U \exp(S) U^{-1} = \exp(USU^{-1}) \quad (S \in \text{Mat}(2^M, \mathbb{C}))$$

これを $S = S_1, S_2$ に適用し、主張 10.3 (4) を使って

$$\begin{aligned} \tau &= \text{tr}(\exp(S_1) \exp(S_2)) \\ &= \text{tr}(U \exp(S_1) \exp(S_2) U^{-1}) \quad (\because \text{トレースは共役で不変}) \\ &= \text{tr}((U \exp(S_1) U^{-1}) (U \exp(S_2) U^{-1})) \quad (\because U^{-1}U = I) \\ &= \text{tr}(\exp(US_1U^{-1}) \exp(US_2U^{-1})) \\ &= \text{tr}(\exp(-S_1) \exp(-S_2)) \quad (\because \text{符号反転共役}) \end{aligned}$$

Step 3 (c^2 の決定)。主張 17.10 の $V^{(+)} = c\check{V}'$ から $(V^{(+)})^{-1} = c^{-1}(\check{V}')^{-1}$ であり、主張 10.3 (1) より

$$\text{tr}(V^{(+)}) = c \text{tr}(\check{V}'), \quad \text{tr}\left((V^{(+)})^{-1}\right) = c^{-1} \text{tr}((\check{V}')^{-1})$$

主張 18.8 より $\text{tr}(\check{V}') = \text{tr}((\check{V}')^{-1}) > 0$ なので、これらは 0 でなく、辺々割ることができて

$$\begin{aligned}
\frac{\operatorname{tr}(V^{(+)})}{\operatorname{tr}\left((V^{(+)})^{-1}\right)} &= \frac{c \operatorname{tr}(\check{V}')}{c^{-1} \operatorname{tr}\left((\check{V}')^{-1}\right)} \quad (\because \text{Step 3 の二つのトレース表示}) \\
&= c^2 \frac{\operatorname{tr}(\check{V}')}{\operatorname{tr}\left((\check{V}')^{-1}\right)} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= c^2 \quad \left(\because \operatorname{tr}(\check{V}') = \operatorname{tr}\left((\check{V}')^{-1}\right) > 0 \right)
\end{aligned}$$

一方 Step 1・Step 2 より (主張 18.12 より $\operatorname{tr}(V^{(+)}) > 0$ なので $\tau = (2s_2)^{-M/2} \operatorname{tr}(V^{(+)}) \neq 0$)

$$\begin{aligned}
\frac{\operatorname{tr}(V^{(+)})}{\operatorname{tr}\left((V^{(+)})^{-1}\right)} &= \frac{(2s_2)^{M/2} \tau}{(2s_2)^{-M/2} \tau} \quad (\because \text{Step 1} \cdot \text{Step 2}) \\
&= (2s_2)^M \quad (\because \tau \neq 0 \text{ と } \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

よって $c^2 = (2s_2)^M$ 。

Step 4 (符号の確定)。Step 3 の第 1 式より $c = \operatorname{tr}(V^{(+)}) / \operatorname{tr}(\check{V}')$ であり、主張 18.12 より $\operatorname{tr}(V^{(+)}) \in \mathbb{R}_{>0}$ 、主張 18.8 より $\operatorname{tr}(\check{V}') \in \mathbb{R}_{>0}$ なので $c \in \mathbb{R}_{>0}$ である。

$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ である。

$$\begin{aligned}
c^2 &= (2s_2)^M \quad (\because \text{Step 3}) \\
&= \left((2s_2)^{M/2} \right)^2 \quad (\because \text{正の実数の冪の指数法則 } (a^{M/2})^2 = a^M)
\end{aligned}$$

と合わせると

$$(c - (2s_2)^{M/2}) (c + (2s_2)^{M/2}) = 0$$

$c > 0$ かつ $(2s_2)^{M/2} > 0$ より第 2 因子は正で 0 でない。 $\mathbb{C}$ は体 (主張 1.35) ゆえ零因子を持たないから第 1 因子が 0 であり、 $c = (2s_2)^{M/2}$ 。□

定理 18.15 ($V^{(+)}$ の固有値). $\epsilon \in \{0, 1\}^{\check{M}}$ に対して

$$\check{\Lambda}_\epsilon := (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2}) \right) \in \mathbb{R}_{>0}$$

とおく。このとき

- (1) $V^{(+)} \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon V^{(+)} = \check{\Lambda}_\epsilon \check{Q}_\epsilon$ (左右どちらから掛けても同じ)。とくに $V^{(+)}$ は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて $\{\check{\Lambda}_\epsilon\}_\epsilon$ (各 ϵ が 1 つずつ、総個数 2^M) で尽くされる。
- (2) 固有値はすべて正の実数であり、最大のものは全ての $\epsilon_\mu = 1$ を取ったとき、最小のものは全ての $\epsilon_\mu = 0$ を取ったときである：

$$\check{\Lambda}_{\max} = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \right), \quad \check{\Lambda}_{\min} = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \right)$$

(したがって $\check{\Lambda}_{\max} \check{\Lambda}_{\min} = (2 \sinh 2K_2)^M = c^2$ 。)

証明. (1) 主張 18.14 より $V^{(+)} = (2s_2)^{M/2} \check{V}'$ であり、主張 18.7 より $\check{V}' \check{Q}_\epsilon = e^{\check{g}(\epsilon)} \check{Q}_\epsilon$ だから

$$\begin{aligned} V^{(+)} \check{Q}_\epsilon &= (2s_2)^{M/2} \check{V}' \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{定数 } c \text{ の決定}) \\ &= (2s_2)^{M/2} e^{\check{g}(\epsilon)} \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{V}' \text{ の固有値}) \\ &= \check{\Lambda}_\epsilon \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義}) \end{aligned}$$

同じ式変形を 主張 18.7 の Step 3' の $\check{Q}_\epsilon \check{V}' = e^{\check{g}(\epsilon)} \check{Q}_\epsilon$ に対して行い (スカラー $(2s_2)^{M/2}$ は 主張 3.6 により左右どちらへも出せる)、 $\check{Q}_\epsilon V^{(+)} = \check{\Lambda}_\epsilon \check{Q}_\epsilon$ も得る。

対角化可能性・重複度・総個数は 主張 18.7 の Step 4 と同じ議論 (主張 18.6 (5) による直和分解) で得られる。スカラー倍は固有ベクトルを変えない。

(2) $(2s_2)^{M/2} > 0$ と $e^{\check{g}(\epsilon)} > 0$ より $\check{\Lambda}_\epsilon > 0$ 。

大小の比較。 $\check{\Lambda}_\epsilon = (2s_2)^{M/2} e^{\check{g}(\epsilon)}$ で $(2s_2)^{M/2}$ は ϵ に依らない正の定数、 $t \mapsto e^t$ は実数上の狭義単調増加関数なので、 $\check{\Lambda}_\epsilon$ の大小は $\check{g}(\epsilon) = \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2})$ の大小と一致する。定義 16.9 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ なので、各項 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2})$ は $\epsilon_\mu = 1$ のとき $+\frac{1}{2}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ 、 $\epsilon_\mu = 0$ のとき $-\frac{1}{2}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ であり、前者が後者より ** 狭義に ** 大きい。各項は独立に選べるので、和が最大になるのは全ての $\epsilon_\mu = 1$ 、最小になるのは全ての $\epsilon_\mu = 0$ のときである。それぞれ

$$\check{g}(1, \dots, 1) = \frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu), \quad \check{g}(0, \dots, 0) = -\frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$$

を代入して statement の $\check{\Lambda}_{\max}, \check{\Lambda}_{\min}$ を得る。さらに

$$\begin{aligned} \check{\Lambda}_{\max} \check{\Lambda}_{\min} &= (2s_2)^M \quad (\because \text{指数部分が互いに打ち消し合う}) \\ &= c^2 \quad (\because \text{定数 } c \text{ の決定。主張 18.14}) \end{aligned}$$

□

定理 18.16 ($\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)}$ であり単純固有値). 定理 13.6 の $\Lambda_M^{(\delta)}$ について、次が成り立つ。

- (1) $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)}$ 。すなわち $V^{(+)}$ の最大固有値は $\delta = \frac{1}{2}$ (半整数運動量) に対応する。
- (2) $\epsilon \neq (1, \dots, 1) \implies \check{\Lambda}_\epsilon < \check{\Lambda}_{\max}$ (狭義の不等号)。
- (3) したがって $\check{\Lambda}_{\max}$ は $V^{(+)}$ の ** 単純固有値 ** である: $\left\{ x \in \mathbb{C}^{2^M} \mid V^{(+)} x = \check{\Lambda}_{\max} x \right\} = \text{im } \check{Q}_{(1, \dots, 1)}$ であり、この空間の次元は 1 である。

009 章の 主張 10.19 の $\Lambda_{\max}$ は $\delta = 0$ (整数運動量) に対応するもので、そちらでは臨界点で $\gamma(\theta_M) = 0$ となりうるため単純性は言えない。半整数運動量では 定義 16.9 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ が ** すべての μ 、すべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ (臨界点を含む) で ** 成り立つので、単純性が従う。

証明. (1) 定理 13.6 の $\delta = \frac{1}{2}$ の場合の定義は

$$\Theta_M^{(1/2)} = \left\{ \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M} \mid \mu = 1, \dots, M \right\}, \quad \Lambda_M^{(1/2)} = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta_M^{(1/2)}} \gamma(\theta) \right)$$

である。定義 14.4 の $\tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$ より $\Theta_M^{(1/2)} = \{ \tilde{\theta}_\mu \mid \mu = 1, \dots, M \}$ である。

この M 個の値は互いに相異なる。実際 $\mu, \nu \in \check{M}$ 、 $\mu \neq \nu$ なら $\tilde{\theta}_\mu - \tilde{\theta}_\nu = \frac{2\pi(\mu - \nu)}{M}$ で $1 \leq |\mu - \nu| \leq M - 1$ だから $0 < |\tilde{\theta}_\mu - \tilde{\theta}_\nu| < 2\pi$ であり、とくに $\tilde{\theta}_\mu \neq \tilde{\theta}_\nu$ 。よって集合 $\Theta_M^{(1/2)}$ はちょうど M 個の元をもち、

$$\sum_{\theta \in \Theta_M^{(1/2)}} \gamma(\theta) = \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$$

である。ここで左辺の γ は主張 13.2 の $\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta))$ ($\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta$) であり、右辺の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ は定義 16.9 の $\operatorname{arccosh}(\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu))$ である。定義 16.2 の γ_1 は主張 13.2 のものと同じ式なので、 $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ において両者は同じ実数である。したがって定理 18.15 の $\check{\Lambda}_{\max}$ の表式と比べて $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)}$ 。

(2) $\epsilon \neq (1, \dots, 1)$ とすると、ある $\mu_0 \in \check{\mathcal{M}}$ で $\epsilon_{\mu_0} = 0$ である。主張 18.7 の $\check{g}$ について

$$\begin{aligned} \check{g}(1, \dots, 1) - \check{g}(\epsilon) &= \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) (1 - \epsilon_\mu) \quad (\because \text{主張 18.7 の } \check{g} \text{ の定義と分配法則}) \\ &\geq \gamma(\tilde{\theta}_{\mu_0}) (1 - \epsilon_{\mu_0}) \quad (\because \text{各項は } \gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0 \text{ と } 1 - \epsilon_\mu \in \{0, 1\} \text{ より } \geq 0. \mu = \mu_0 \text{ の項だけを残す}) \\ &= \gamma(\tilde{\theta}_{\mu_0}) \quad (\because \epsilon_{\mu_0} = 0) \\ &> 0 \quad (\because \text{定義 16.9}) \end{aligned}$$

である。よって $\check{g}(\epsilon) < \check{g}(1, \dots, 1)$ であり、

$$\begin{aligned} \check{\Lambda}_\epsilon &= (2s_2)^{M/2} e^{\check{g}(\epsilon)} \quad (\because \text{定理 18.15 の } \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義と主張 18.7 の } \check{g} \text{ の定義}) \\ &< (2s_2)^{M/2} e^{\check{g}(1, \dots, 1)} \quad (\because \check{g}(\epsilon) < \check{g}(1, \dots, 1), t \mapsto e^t \text{ は狭義単調増加、}(2s_2)^{M/2} > 0) \\ &= \check{\Lambda}_{\max} \quad (\because \text{定理 18.15 (2)}) \end{aligned}$$

($\check{\Lambda}_{\max} = \check{\Lambda}_{(1, \dots, 1)}$ は定理 18.15 (2)。)

(3) $x \in \mathbb{C}^{2^M}$ が $V^{(+)}x = \check{\Lambda}_{\max}x$ を満たすとする。 $\epsilon' \in \{0, 1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ を任意に取り、この固有方程式の両辺に ** 左から $\check{Q}_{\epsilon'}$ を掛ける **。定理 18.15 (1) の左から掛ける形 $\check{Q}_{\epsilon'}V^{(+)} = \check{\Lambda}_{\epsilon'}\check{Q}_{\epsilon'}$ を使うと

$$\begin{aligned} \check{\Lambda}_{\epsilon'}(\check{Q}_{\epsilon'}x) &= (\check{Q}_{\epsilon'}V^{(+)})x \quad (\because \text{定理 18.15 (1)}) \\ &= \check{Q}_{\epsilon'}(V^{(+)}x) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= \check{\Lambda}_{\max}(\check{Q}_{\epsilon'}x) \quad (\because V^{(+)}x = \check{\Lambda}_{\max}x) \end{aligned}$$

すなわち $(\check{\Lambda}_{\epsilon'} - \check{\Lambda}_{\max})\check{Q}_{\epsilon'}x = 0$ 。(2) より $\epsilon' \neq (1, \dots, 1)$ のとき $\check{\Lambda}_{\epsilon'} - \check{\Lambda}_{\max} \neq 0$ であり、これは 0 でない複素数なので割ることができて $\check{Q}_{\epsilon'}x = 0$ 。したがって主張 18.6 (2) の $x = \sum_{\epsilon} \check{Q}_{\epsilon}x$ において $\epsilon \neq (1, \dots, 1)$ の項がすべて消え、

$$\begin{aligned} x &= \sum_{\epsilon} \check{Q}_{\epsilon}x \quad (\because \text{主張 18.6 (2)}) \\ &= \check{Q}_{(1, \dots, 1)}x \quad (\because \epsilon \neq (1, \dots, 1) \text{ の項は } \check{Q}_{\epsilon}x = 0) \end{aligned}$$

とくに $x \in \operatorname{im} \check{Q}_{(1, \dots, 1)}$ である。逆に $\operatorname{im} \check{Q}_{(1, \dots, 1)}$ の各元が固有値 $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルであることは定理 18.15 (1) と主張 18.7 の Step 4 と同じ計算で従う。よって固有空間は $\operatorname{im} \check{Q}_{(1, \dots, 1)}$ に一致し、主張 18.6 (4) よりその次元は 1 である。□

19 $c_+(M)$ の決定と Onsager の自由エネルギー

注意 19.1 (この章の目的と、残っている 1 点). 定理 18.16 により $V^{(+)}$ の最大固有値 $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)}$ は ** 単純 ** である。一方主張 12.17 の $c_+(M)$ は $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトル

ルにわたる上限であり、同 (2) の $WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$ により $\mathcal{F}^{(+)}$ の上では W と $V^{(+)}$ が一致する。したがって

$$c_+(M) \leq \check{\Lambda}_{\max}$$

は容易である。* 難所は逆向きの不等号 *、すなわち $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルが $\mathcal{F}^{(-)}$ 側に落ちていないこと (ε の固有値が $+1$ であること) である。 $V^{(+)}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ 全体の上の行列であり、その 2^M 個の固有値のうち半分は $\mathcal{F}^{(-)}$ に属する固有ベクトルに対応する。最大固有値がどちらの側に落ちるかは、固有値の値 $\check{\Lambda}_\epsilon$ からは読み取れない。

この章の筋は次のとおりである (ε は定義 5.8 の $\sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ 、 $\epsilon \in \{0, 1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ は主張 18.6 の添字である。* 字体が違うだけの別物なので注意する *)。

- (i) ε は Z_j, Y_j と反可換なので $\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu$ とも反可換であり、したがって $\check{n}_\mu$ とは * 可換 * である (主張 19.2)。
- (ii) $\text{im } \check{Q}_\epsilon$ は 1 次元なので $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon$ ($\eta_\epsilon \in \{+1, -1\}$)。しかも $\check{\psi}_\mu^\dagger$ が ϵ_μ を 0 から 1 へ移し、かつ ε と反可換なので、成分を 1 つ変えるたびに η の符号が反転する (主張 19.3)。
- (iii) したがって $\text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) = \eta_{(1, \dots, 1)} (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \prod_{\mu=1}^M 2 \sinh\left(\frac{\gamma(\check{\theta}_\mu)}{2}\right)$ であり、右辺の η 以外は * 正 * である (主張 19.4)。
- (iv) 一方 $\text{tr}(\varepsilon V^{(+)})$ は転送行列の側で * 直接計算できる * : $\text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) = (2e^{-K_2} \cosh K_1)^M + (2e^{K_2} \sinh K_1)^M > 0$ (定理 19.15)。使うのは 1 次元開鎖のスピン和だけである。
- (v) 両者を比べて $\eta_{(1, \dots, 1)} = +1$ 、すなわち最大固有ベクトルは $\mathcal{F}^{(+)}$ に属する (定理 19.16)。

そのうえで $c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$ (定理 19.18) を示し、定理 13.6 と合わせて注意 13.7 の「残っている入力」を解消する (定理 19.19)。

この章で用いる道具は、複素数を成分とする行列の積・和・スカラー倍、行列の指数関数 (定義 4.4)、トレース (定義 10.2)、有限個の実数の和と積、および $\cosh, \sinh, \log$ だけである。積分が現れるのは定理 13.5 を引く最後の主張だけで、そこが注意 13.1 を使って有限和の極限を積分として計算する。

主張 19.2 (ε は $\check{Z}, \check{Y}, \check{\psi}$ と反可換). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) とする。定義 5.8 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ について次が成り立つ。

- (1) $\varepsilon Z_j = -Z_j \varepsilon, \quad \varepsilon Y_j = -Y_j \varepsilon \quad (j \in \{1, \dots, M\})$
- (2) $\varepsilon \check{Z}_\mu = -\check{Z}_\mu \varepsilon, \quad \varepsilon \check{Y}_\mu = -\check{Y}_\mu \varepsilon$
- (3) $\varepsilon \check{\psi}_\mu^\dagger = -\check{\psi}_\mu^\dagger \varepsilon, \quad \varepsilon \check{\psi}_\mu = -\check{\psi}_\mu \varepsilon$
- (4) $\varepsilon \check{n}_\mu = \check{n}_\mu \varepsilon, \quad \varepsilon \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \varepsilon \quad (\epsilon \in \{0, 1\}^{\check{\mathcal{M}}})$

($\check{n}_\mu$ は定義 18.2、 $\check{Q}_\epsilon$ は主張 18.6。)

証明. (1) 主張 11.13 の Step 1 で

$$\varepsilon \sigma_k^x = \sigma_k^x \varepsilon, \quad \varepsilon \sigma_k^z = -\sigma_k^z \varepsilon, \quad \varepsilon \sigma_k^y = -\sigma_k^y \varepsilon \quad (k \in \{1, \dots, M\})$$

が示されている。定義 5.8 の $Z_j = \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z$ に、これを左から順に通す。

$$\begin{aligned}
\varepsilon Z_j &= \varepsilon \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\
&= \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \varepsilon \sigma_j^z \quad (\because \text{epsilon_commutes_with_transfer_matrices の Step 1 の } \varepsilon \sigma_k^x = \sigma_k^x \varepsilon \text{ を } j-1 \text{ 箇所へ同時適用}) \\
&= \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x (-\sigma_j^z \varepsilon) \quad (\because \text{同 Step 1 の } \varepsilon \sigma_k^z = -\sigma_k^z \varepsilon) \\
&= -(\sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z) \varepsilon \quad (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -Z_j \varepsilon \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols})
\end{aligned}$$

$Y_j = \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^y$ についても、最後から 2 番目の段で $\varepsilon \sigma_j^y = -\sigma_j^y \varepsilon$ を使うだけで同じ計算が通る。

(2) 定義 14.4 の $\check{Z}_\mu = \sum_{j=1}^M Z_j e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}$ は Z_j の $\mathbb{C}$ 係数の有限和である。行列の積は各因子について $\mathbb{C}$ 線型なので

$$\begin{aligned}
\varepsilon \check{Z}_\mu &= \varepsilon \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} (\varepsilon Z_j) \quad (\because \text{積の } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} (-Z_j \varepsilon) \quad (\because (1) \text{ を } M \text{ 個の項へ同時適用}) \\
&= -\left(\sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j \right) \varepsilon \quad (\because \text{積の } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= -\check{Z}_\mu \varepsilon \quad (\because \text{def_half_integer_modes})
\end{aligned}$$

$\check{Y}_\mu$ も同じ計算 (1) の Y_j の側を使う) である。

(3) 定義 17.2 より $\check{\psi}_\mu^\dagger$ と $\check{\psi}_\mu$ はいずれも $\check{Z}_\mu$ と $\check{Y}_\mu$ の $\mathbb{C}$ 係数の 1 次結合である。(2) を両方の項へ同時に適用すればよい： $\check{\psi}_\mu^\dagger = p\check{Z}_\mu + q\check{Y}_\mu$ ($p, q \in \mathbb{C}$) と書くと

$$\begin{aligned}
\varepsilon \check{\psi}_\mu^\dagger &= p(\varepsilon \check{Z}_\mu) + q(\varepsilon \check{Y}_\mu) \quad (\because \text{def_check_fermi と積の } \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= -p\check{Z}_\mu \varepsilon - q\check{Y}_\mu \varepsilon \quad (\because (2) \text{ を } 2 \text{ 箇所へ同時適用}) \\
&= -\check{\psi}_\mu^\dagger \varepsilon \quad (\because \text{def_check_fermi と積の } \mathbb{C} \text{ 線型性})
\end{aligned}$$

(4) 定義 14.5 (2) より $M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので (3) を $\check{\psi}_{M+1-\mu}$ にも適用できる。定義 18.2 の $\check{n}_\mu = \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu}$ について

$$\begin{aligned}
\varepsilon \check{n}_\mu &= \varepsilon \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{def_check_number_operator}) \\
&= \left(-\check{\psi}_\mu^\dagger \varepsilon \right) \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because (3)) \\
&= -\check{\psi}_\mu^\dagger (\varepsilon \check{\psi}_{M+1-\mu}) \quad (\because \text{結合法則}) \\
&= -\check{\psi}_\mu^\dagger (-\check{\psi}_{M+1-\mu} \varepsilon) \quad (\because (3) \text{ を添字 } M+1-\mu \text{ へ適用}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \varepsilon \quad (\because (-1)^2 = 1) \\
&= \check{n}_\mu \varepsilon \quad (\because \text{def_check_number_operator})
\end{aligned}$$

主張 18.6 の $\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^M (\epsilon_\mu \check{n}_\mu + (1 - \epsilon_\mu)(I - \check{n}_\mu))$ は $\check{n}_\mu$ たちと I から積と $\mathbb{C}$ 係数の和だけで作られている。 ε は各 $\check{n}_\mu$ と可換、 I と可換 (主張 3.6) なので、積・和をとっても可換性は保たれ $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \varepsilon$ 。□

主張 19.3 ($\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon$ と符号の反転則). $\epsilon \in \{0, 1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対し $|\epsilon| := \#\{\mu \in \check{\mathcal{M}} \mid \epsilon_\mu = 1\}$ とおく。次が成り立つ。

- (1) $\exists! \eta_\epsilon \in \{+1, -1\} : \varepsilon \check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon$
- (2) $\epsilon_\mu = 0 \implies \eta_{\epsilon[\mu \rightarrow 1]} = -\eta_\epsilon$ 。ここで $\epsilon[\mu \rightarrow 1]$ は ϵ の第 μ 成分だけを 1 に取り替えたもの。
- (3) $\eta_\epsilon = \eta_{(1, \dots, 1)} (-1)^{M-|\epsilon|}$
- (4) $\varepsilon = \eta_{(1, \dots, 1)} (-1)^M \prod_{\mu=1}^M (I - 2\check{n}_\mu)$

** この段階では $\eta_{(1, \dots, 1)}$ の値は決まっていない。** それを決めるのが 定理 19.15 と 定理 19.16 である。

証明. (1) 主張 18.6 (4) より $\dim_{\mathbb{C}} \text{im } \check{Q}_\epsilon = 1$ なので、 $\text{im } \check{Q}_\epsilon = \mathbb{C}q$ なる $q \neq 0$ が取れる。 $q \in \text{im } \check{Q}_\epsilon$ なので $q = \check{Q}_\epsilon x$ なる x が取れる。まず $\check{Q}_\epsilon q = q$ を確かめる。

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon q &= \check{Q}_\epsilon (\check{Q}_\epsilon x) \quad (\because q = \check{Q}_\epsilon x \text{ の置き方}) \\
&= \check{Q}_\epsilon^2 x \quad (\because \text{行列積の結合則}) \\
&= \check{Q}_\epsilon x \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (1) の冪等性 } \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon) \\
&= q \quad (\because q = \check{Q}_\epsilon x \text{ の置き方})
\end{aligned}$$

次に 主張 19.2 (4) より $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \varepsilon$ だから

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon (\varepsilon q) &= \varepsilon (\check{Q}_\epsilon q) \quad (\because \text{epsilon_anticommutes_with_check_Z_Y (4) と行列積の結合則}) \\
&= \varepsilon q \quad (\because \text{上で示した } \check{Q}_\epsilon q = q)
\end{aligned}$$

よって $\varepsilon q \in \text{im } \check{Q}_\epsilon = \mathbb{C}q$ であり、 $\varepsilon q = \eta q$ なる $\eta \in \mathbb{C}$ が一意に定まる ($q \neq 0$)。次の式変形で $\eta^2 = 1$ を示す。

$$\begin{aligned}
q &= Iq \quad (\because \text{恒等行列の定義}) \\
&= \varepsilon^2 q \quad (\because \text{epsilon_projector_properties (1) の } \varepsilon^2 = I) \\
&= \varepsilon (\varepsilon q) \quad (\because \text{行列積の結合則}) \\
&= \varepsilon (\eta q) \quad (\because \varepsilon q = \eta q \text{ の置き方}) \\
&= \eta (\varepsilon q) \quad (\because \eta \in \mathbb{C} \text{ と行列のスカラー倍の定義}) \\
&= \eta (\eta q) \quad (\because \varepsilon q = \eta q \text{ の置き方}) \\
&= \eta^2 q \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積と行列のスカラー倍の結合則})
\end{aligned}$$

主張 11.10 (1) と上の式変形、および $q \neq 0$ より $\eta^2 = 1$ 。したがって $\eta \in \{+1, -1\}$ ($\mathbb{C}$ は体なので $(\eta - 1)(\eta + 1) = 0$ から)。

任意の x について $\check{Q}_\epsilon x \in \mathbb{C}q$ だから $\varepsilon \check{Q}_\epsilon x = \eta \check{Q}_\epsilon x$ であり、行列としても $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \eta \check{Q}_\epsilon$ 。この η を η_ϵ と書く。

(2) $\epsilon_\mu = 0$ とし、 $\text{im } \check{Q}_\epsilon$ の 0 でない元を 1 つ取って q とする。主張 18.6 (1) の冪等性より $\check{Q}_\epsilon q = q$ である。(1) より

$$\begin{aligned}
\varepsilon q &= \varepsilon \check{Q}_\epsilon q \quad (\because \check{Q}_\epsilon q = q) \\
&= \eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon q \quad (\because (1)) \\
&= \eta_\epsilon q \quad (\because \check{Q}_\epsilon q = q)
\end{aligned}$$

である。** 以下で使うのは $q \neq 0$ と $\check{Q}_\epsilon q = q$ だけであり、 $\text{im } \check{Q}_\epsilon$ や $\text{im } \check{Q}_{\epsilon[\mu \rightarrow 1]}$ が 1 次元であることは使わない ** (1 次元性が要るのは (1) の η_ϵ の存在を出すところだけである)。

Step 1 ($\check{\psi}_\mu^\dagger q \neq 0$)。 $\epsilon_\mu = 0$ なので 主張 18.6 (3) より $\check{n}_\mu q = \check{n}_\mu \check{Q}_\epsilon q = \epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon q = 0$ である。主張 18.3 (2) の $\check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger = I - \check{n}_\mu$ を q に施すと

$$\begin{aligned}\check{\psi}_{M+1-\mu} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q \right) &= (I - \check{n}_\mu) q \quad (\because \text{check_number_operator_idempotent (2)}) \\ &= q - 0 \quad (\because \check{n}_\mu q = 0) \\ &= q \quad (\because \text{零ベクトルの減法})\end{aligned}$$

したがって $\check{\psi}_\mu^\dagger q = 0$ なら左辺が 0 になり $q = 0$ となって矛盾する。よって $\check{\psi}_\mu^\dagger q \neq 0$ 。

Step 2 ($\check{\psi}_\mu^\dagger q \in \text{im } \check{Q}_{\epsilon[\mu \rightarrow 1]}$)。まず $\check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger$ を示す。

$$\begin{aligned}\check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger \right) \quad (\because \text{def_check_number_operator と結合法則}) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger (I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{check_number_operator_idempotent (2)}) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{分配法則と def_check_number_operator}) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger - 0 \quad (\because \text{check_number_operator_idempotent (1) の } (\check{\psi}_\mu^\dagger)^2 = 0)\end{aligned}$$

次に $\nu \in \check{M}$ 、 $\nu \neq \mu$ については 主張 18.4 (1) より $\check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{\psi}_\mu^\dagger$ である。主張 18.6 の証明中の記号 $R_\nu^{(1)} = \check{n}_\nu$ 、 $R_\nu^{(0)} = I - \check{n}_\nu$ を使うと、 $\epsilon' := \epsilon[\mu \rightarrow 1]$ について

$$\begin{aligned}\check{Q}_{\epsilon'} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q \right) &= \left(\prod_{\nu \neq \mu} R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \right) \check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger q \quad (\because \text{因子は可換, check_number_operators_commute (2)}) \\ &= \left(\prod_{\nu \neq \mu} R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \right) \check{\psi}_\mu^\dagger q \quad (\because \text{Step 2 冒頭の } \check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\prod_{\nu \neq \mu} R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \right) q \quad (\because \text{check_number_operators_commute (1) を } M-1 \text{ 箇所へ同時適用}) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger q \quad \left(\because R_\mu^{(0)} q = (I - \check{n}_\mu) q = q \text{ より } \left(\prod_{\nu \neq \mu} R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \right) q = \check{Q}_\epsilon q = q \right)\end{aligned}$$

よって $\check{\psi}_\mu^\dagger q \in \text{im } \check{Q}_{\epsilon'}$ であり、Step 1 よりこれは 0 でないから、1 次元の $\text{im } \check{Q}_{\epsilon'}$ の生成元である。

Step 3 (符号)。主張 19.2 (3) より

$$\begin{aligned}\varepsilon \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q \right) &= -\check{\psi}_\mu^\dagger (\varepsilon q) \quad (\because \text{epsilon_anticommutes_with_check_Z_Y (3)}) \\ &= -\check{\psi}_\mu^\dagger (\eta_\epsilon q) \quad (\because (1)) \\ &= (-\eta_\epsilon) \check{\psi}_\mu^\dagger q\end{aligned}$$

Step 2 より $\check{\psi}_\mu^\dagger q$ は $\text{im } \check{Q}_{\epsilon'}$ の生成元なので、(1) の一意性から $\eta_{\epsilon'} = -\eta_\epsilon$ 。

(3) ϵ から出発して、 $\epsilon_\mu = 0$ である $M - |\epsilon|$ 個の添字 μ を 1 つずつ 1 に取り替えていくと $(1, \dots, 1)$ に至る。(2) を各段で使うと符号が 1 回ずつ反転するので

$$\eta_{(1, \dots, 1)} = (-1)^{M-|\epsilon|} \eta_\epsilon$$

両辺に $(-1)^{M-|\epsilon|}$ を掛け、 $((-1)^{M-|\epsilon|})^2 = 1$ を使えば (3) を得る。

(4) 主張 18.6 (3) より $\check{n}_\mu \check{Q}_\epsilon = \epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon$ なので

$$\begin{aligned}
\left(\prod_{\mu=1}^M (I - 2\tilde{n}_\mu) \right) \check{Q}_\epsilon &= \left(\prod_{\mu=1}^M (1 - 2\epsilon_\mu) \right) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (3)}) \\
&= (-1)^{|\epsilon|} \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because 1 - 2\epsilon_\mu = \begin{cases} -1 & (\epsilon_\mu = 1) \\ +1 & (\epsilon_\mu = 0) \end{cases} \right)
\end{aligned}$$

一方 (1)(3) より

$$\begin{aligned}
\varepsilon \check{Q}_\epsilon &= \eta_{(1,\dots,1)} (-1)^{M-|\epsilon|} \check{Q}_\epsilon \quad (\because (1) \text{ と } (3)) \\
&= \eta_{(1,\dots,1)} (-1)^M (-1)^{|\epsilon|} \check{Q}_\epsilon \quad (\because (-1)^{-|\epsilon|} = (-1)^{|\epsilon|})
\end{aligned}$$

したがって 2 つの行列 ε と $\eta_{(1,\dots,1)} (-1)^M \prod_{\mu} (I - 2\tilde{n}_\mu)$ は、すべての $\check{Q}_\epsilon$ に右から掛けた結果が一致する。主張 18.6 (2) の $\sum_{\epsilon} \check{Q}_\epsilon = I$ を掛ければ (4) を得る。□

主張 19.4 ($\text{tr}(\varepsilon V^{(+)})$ を $\eta_{(1,\dots,1)}$ で表す). 主張 19.3 の $\eta_{(1,\dots,1)}$ と 定義 16.9 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ について

$$\text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) = \eta_{(1,\dots,1)} (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \prod_{\mu=1}^M 2 \sinh \left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2} \right)$$

が成り立つ。定義 16.9 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ と $K_2 > 0$ より右辺の $\eta_{(1,\dots,1)}$ 以外の因子はすべて ** 正の実数 ** なので、

$$\eta_{(1,\dots,1)} = +1 \iff \text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) > 0$$

である。

証明. Step 1 (トレースの分解)。主張 18.6 (2) の $\sum_{\epsilon} \check{Q}_\epsilon = I$ 、定理 18.15 (1) の $V^{(+)} \check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon \check{Q}_\epsilon$ 、主張 19.3 (1) の $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon$ 、および 主張 18.6 (4) の $\text{tr}(\check{Q}_\epsilon) = 1$ を使う。

$$\begin{aligned}
\text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) &= \text{tr} \left(\varepsilon V^{(+)} \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{M}}} \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (2)}) \\
&= \sum_{\epsilon} \text{tr}(\varepsilon V^{(+)} \check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{trace_basic_properties (1) の線型性}) \\
&= \sum_{\epsilon} \check{\Lambda}_\epsilon \text{tr}(\varepsilon \check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{eigenvalues_of_V_plus (1)}) \\
&= \sum_{\epsilon} \check{\Lambda}_\epsilon \eta_\epsilon \text{tr}(\check{Q}_\epsilon) \quad (\because \text{epsilon_eigenvalue_on_check_Q (1)}) \\
&= \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{M}}} \eta_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (4)})
\end{aligned}$$

Step 2 (積への分解)。主張 19.3 (3) より $\eta_\epsilon = \eta_{(1,\dots,1)} (-1)^{M-|\epsilon|}$ であり、定理 18.15 の $\check{\Lambda}_\epsilon = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2}) \right)$ である。 $(-1)^{M-|\epsilon|} = \prod_{\mu=1}^M (-1)^{1-\epsilon_\mu}$ ($\sum_{\mu} (1 - \epsilon_\mu) = M - |\epsilon|$) と 定理 4.5 ($n = 1$ 、すなわち実数の指数法則) を使うと

$$\eta_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon = \eta_{(1,\dots,1)} (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \prod_{\mu=1}^M \left((-1)^{1-\epsilon_\mu} \exp \left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu) (\epsilon_\mu - \frac{1}{2}) \right) \right)$$

ϵ は各成分を独立に 0 か 1 から選ぶので、主張 18.8 の Step 2 と同じ 1 対 1 対応（有限個の因子の積の展開）により

$$\begin{aligned}\sum_{\epsilon} \eta_{\epsilon} \tilde{\Lambda}_{\epsilon} &= \eta_{(1, \dots, 1)} (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \prod_{\mu=1}^M \left(-\exp\left(-\frac{\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\right) + \exp\left(+\frac{\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\right) \right) \quad (\because \text{有限個の因子の積の展開}) \\ &= \eta_{(1, \dots, 1)} (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \prod_{\mu=1}^M 2 \sinh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\right) \quad \left(\because \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)\end{aligned}$$

($\epsilon_{\mu} = 0$ の項が $(-1)^1 e^{-\gamma/2}$ 、 $\epsilon_{\mu} = 1$ の項が $(-1)^0 e^{+\gamma/2}$ である。) Step 1 と合わせて主張の等式を得る。

Step 3 (符号)。 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $2 \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2 \sinh 2K_2)^{M/2} > 0$ 。定義 16.9 より $\gamma(\tilde{\theta}_{\mu}) > 0$ であり $\sinh$ は $\mathbb{R}_{>0}$ 上で正の値を取る (主張 1.4) ので各因子 $2 \sinh(\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})/2) > 0$ 。よって $\text{tr}(\varepsilon V^{(+)})$ の符号は $\eta_{(1, \dots, 1)}$ の符号に一致し、 $\eta_{(1, \dots, 1)} \in \{+1, -1\}$ なので主張の同値が従う。□

定義 19.5 (開鎖項 D_0)。 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 5.8 のサイト作用素を用いて、開鎖項を

$$D_0 := \sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$$

と定める。

定義 19.6 (周期境界項 G)。 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 5.8 のサイト作用素を用いて、周期境界項を

$$G := \sigma_M^z \sigma_1^z$$

と定める。

主張 19.7 ($iH_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z + \varepsilon \sigma_M^z \sigma_1^z$)。 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 15.2 の $H_1^{(+)} = Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \dots + Y_{M-1} Z_M - Y_M Z_1$ 、定義 19.5 の開鎖項 D_0 、定義 19.6 の周期境界項 G について

$$iH_1^{(+)} = D_0 + \varepsilon G$$

証明. 以下、主張 7.1 と 主張 5.10 の Step 0 で確かめられている 1 サイトの積

$$\sigma^y \sigma^x = -i \sigma^z, \quad \sigma^x \sigma^z = -i \sigma^y, \quad \sigma^x \sigma^x = I_{\text{Mat}(2, \mathbb{C})}$$

を使う ($\sigma^x \sigma^z = -i \sigma^y$ は $\sigma^z \sigma^y = -i \sigma^x$ と同じく 2 次の成分計算 (定義 1.8) で確かめられる: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$)。また 主張 3.2 (1) より ** 相異なるサイトに置かれた因子どうしは可換 ** である。

まず $1 \leq m \leq M-1$ とする。定義 5.8 より $Y_m = \sigma_1^x \dots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ 、 $Z_{m+1} = \sigma_1^x \dots \sigma_m^x \sigma_{m+1}^z$ である。

$$\begin{aligned}Y_m Z_{m+1} &= (\sigma_1^x \dots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y) (\sigma_1^x \dots \sigma_m^x \sigma_{m+1}^z) \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\ &= (\sigma_1^x \sigma_1^x) \dots (\sigma_{m-1}^x \sigma_{m-1}^x) (\sigma_m^y \sigma_m^x) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換, kronecker_product_rule (1)}) \\ &= (\sigma_m^y \sigma_m^x) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I \text{ を } m-1 \text{ 箇所へ同時適用}) \\ &= (-i \sigma_m^z) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \sigma^y \sigma^x = -i \sigma^z) \\ &= -i \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の結合法則})\end{aligned}$$

両辺に i を掛けて $iY_m Z_{m+1} = \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ ($i \cdot (-i) = 1$)。

次に境界項を計算する。 $Y_M = \sigma_1^x \dots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y$ 、 $Z_1 = \sigma_1^z$ である。まず左辺を計算する。

$$\begin{aligned}
Y_M Z_1 &= (\sigma_1^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y) \sigma_1^z \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\
&= (\sigma_1^x \sigma_1^z) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換}) \\
&= (-i \sigma_1^y) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y \quad (\because \sigma^x \sigma^z = -i \sigma^y) \\
&= -i \sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の結合律})
\end{aligned}$$

次に右辺を計算する。

$$\begin{aligned}
\varepsilon \sigma_M^z \sigma_1^z &= (\sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_M^x) \sigma_M^z \sigma_1^z \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols の } \varepsilon) \\
&= (\sigma_1^x \sigma_1^z) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x (\sigma_M^x \sigma_M^z) \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換}) \\
&= (-i \sigma_1^y) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x (-i \sigma_M^y) \quad (\because \sigma^x \sigma^z = -i \sigma^y \text{ を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= -\sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y \quad (\because (-i)^2 = -1)
\end{aligned}$$

上の 2 つの計算結果を突き合わせる。

$$\begin{aligned}
-i Y_M Z_1 &= -i (-i \sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y) \quad (\because \text{直前の } Y_M Z_1 \text{ の計算}) \\
&= -\sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y \quad (\because (-i)^2 = -1) \\
&= \varepsilon \sigma_M^z \sigma_1^z \quad (\because \text{直前の } \varepsilon \sigma_M^z \sigma_1^z \text{ の計算})
\end{aligned}$$

最後に 定義 15.2 の $H_1^{(+)}$ に直前の二つの計算を一つずつ適用する。

$$\begin{aligned}
i H_1^{(+)} &= i \left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} - Y_M Z_1 \right) \quad (\because \text{def_H1_plus}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} (i Y_m Z_{m+1}) + (-i Y_M Z_1) \quad (\because \text{スカラー倍の分配法則}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z + (-i Y_M Z_1) \quad (\because \text{直前に示した内部辺の等式を有限和へ適用}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z + \varepsilon \sigma_M^z \sigma_1^z \quad (\because \text{直前に示した境界項の等式}) \\
&= D_0 + \varepsilon \sigma_M^z \sigma_1^z \quad (\because \text{def_D0_open_chain_operator}) \\
&= D_0 + \varepsilon G \quad (\because \text{def_G_boundary_operator})
\end{aligned}$$

□

主張 19.8 (ε, D_0, G の二つずつの可換性). 定義 19.5 の D_0 と 定義 19.6 の G は ε と二つずつ可換である。すなわち

$$\varepsilon D_0 = D_0 \varepsilon, \quad \varepsilon G = G \varepsilon, \quad D_0 G = G D_0$$

証明. 主張 11.13 の Step 1 より、各 $k \in \{1, \dots, M\}$ について $\varepsilon \sigma_k^z = -\sigma_k^z \varepsilon$ である。各 $m \in \{1, \dots, M-1\}$ に対して二回の反可換移動を一回ずつ行くと

$$\begin{aligned}
\varepsilon (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) &= (\varepsilon \sigma_m^z) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{行列の積の結合律}) \\
&= (-\sigma_m^z \varepsilon) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \varepsilon \sigma_m^z = -\sigma_m^z \varepsilon) \\
&= -\sigma_m^z (\varepsilon \sigma_{m+1}^z) \quad (\because \text{行列の積の結合律}) \\
&= -\sigma_m^z (-\sigma_{m+1}^z \varepsilon) \quad (\because \varepsilon \sigma_{m+1}^z = -\sigma_{m+1}^z \varepsilon) \\
&= \sigma_m^z (\sigma_{m+1}^z \varepsilon) \quad (\because (-1)(-1) = 1) \\
&= (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) \varepsilon \quad (\because \text{行列の積の結合律}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon D_0 &= \varepsilon \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) \quad (\because \text{def_D0_open_chain_operator}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} \varepsilon (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) \quad (\because \text{行列積の有限和への分配法則}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) \varepsilon \quad (\because \text{直前の各 } m \text{ の等式}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) \varepsilon \quad (\because \text{行列積の有限和への分配法則}) \\
&= D_0 \varepsilon \quad (\because \text{def_D0_open_chain_operator}).
\end{aligned}$$

境界の二サイトについても同じ二回の反可換移動を行う。

$$\begin{aligned}
\varepsilon G &= \varepsilon (\sigma_M^z \sigma_1^z) \quad (\because \text{def_G_boundary_operator}) \\
&= (\varepsilon \sigma_M^z) \sigma_1^z \quad (\because \text{行列の積の結合律}) \\
&= (-\sigma_M^z \varepsilon) \sigma_1^z \quad (\because \varepsilon \sigma_M^z = -\sigma_M^z \varepsilon) \\
&= -\sigma_M^z (\varepsilon \sigma_1^z) \quad (\because \text{行列の積の結合律}) \\
&= -\sigma_M^z (-\sigma_1^z \varepsilon) \quad (\because \varepsilon \sigma_1^z = -\sigma_1^z \varepsilon) \\
&= \sigma_M^z (\sigma_1^z \varepsilon) \quad (\because (-1)(-1) = 1) \\
&= (\sigma_M^z \sigma_1^z) \varepsilon \quad (\because \text{行列の積の結合律}) \\
&= G \varepsilon \quad (\because \text{def_G_boundary_operator}).
\end{aligned}$$

主張 3.2 (1) より、相異なるサイトの因子は可換し、同じサイトに現れる因子はいずれも σ^z なので、各サイトの因子を並べ替えると、各 $m \in \{1, \dots, M-1\}$ について

$$\begin{aligned}
(\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) G &= (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) (\sigma_M^z \sigma_1^z) \quad (\because \text{def_G_boundary_operator}) \\
&= (\sigma_M^z \sigma_1^z) (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) \quad (\because \text{kroncker_product_rule (1) を各サイトへ適用}) \\
&= G (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) \quad (\because \text{def_G_boundary_operator}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_0 G &= \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) G \quad (\because \text{def_D0_open_chain_operator}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) G \quad (\because \text{行列積の有限和への分配法則}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} G (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) \quad (\because \text{直前の各 } m \text{ の等式}) \\
&= G \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) \quad (\because \text{行列積の有限和への分配法則}) \\
&= G D_0 \quad (\because \text{def_D0_open_chain_operator}).
\end{aligned}$$

□

主張 19.9 (εG の二乗). 定義 19.6 で定めた G について

$$(\varepsilon G)^2 = I$$

証明. 主張 19.8 の $\varepsilon G = G\varepsilon$ 、主張 11.10 (1) の $\varepsilon^2 = I$ 、および 主張 7.1 と 主張 3.2 による $(\sigma_k^z)^2 = I$ を一行ずつ用いる。

$$\begin{aligned}
(\varepsilon G)^2 &= \varepsilon G \varepsilon G & (\because \text{二乗の定義}) \\
&= \varepsilon^2 G^2 & (\because \text{epsilon_D0_G_pairwise_commute の } \varepsilon G = G\varepsilon) \\
&= I G^2 & (\because \text{epsilon_projector_properties (1) の } \varepsilon^2 = I) \\
&= I(\sigma_M^z)^2(\sigma_1^z)^2 & (\because G = \sigma_M^z \sigma_1^z \text{ と異なるサイトの因子の可換性}) \\
&= I \cdot I \cdot I & (\because \text{pauli_matrix_products の } (\sigma^z)^2 = I) \\
&= I & (\because \text{単位行列の積})
\end{aligned}$$

□

主張 19.10 (D_0, G の配置基底上の対角作用). 定義 11.2 の基底 $f_{\iota(s)}$ ($s \in \mathfrak{M}$) に対し、定義 19.5 の D_0 と 定義 19.6 の G は次のように作用する。

$$D_0 f_{\iota(s)} = \left(\sum_{m=1}^{M-1} s(m)s(m+1) \right) f_{\iota(s)}, \quad G f_{\iota(s)} = s(M)s(1) f_{\iota(s)}$$

ここでスピン配置を s と書くのは、 μ をモードの添字に使うためである。

証明. 主張 11.3 より、各 $m \in \{1, \dots, M-1\}$ について一サイトずつ作用させると

$$\begin{aligned}
(\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) f_{\iota(s)} &= \sigma_m^z (s(m+1) f_{\iota(s)}) & (\because \text{sigma_z_diagonal_action を } m+1 \text{ に適用}) \\
&= s(m+1) \sigma_m^z f_{\iota(s)} & (\because \text{行列作用の複素線型性}) \\
&= s(m+1) (s(m) f_{\iota(s)}) & (\because \text{sigma_z_diagonal_action を } m \text{ に適用}) \\
&= (s(m+1)s(m)) f_{\iota(s)} & (\because \text{スカラー倍の結合律}) \\
&= s(m)s(m+1) f_{\iota(s)} & (\because \text{実数の積の交換律}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_0 f_{\iota(s)} &= \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) f_{\iota(s)} & (\because \text{def_D0_open_chain_operator}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) f_{\iota(s)} & (\because \text{行列作用の有限和への分配法則}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} s(m)s(m+1) f_{\iota(s)} & (\because \text{直前の各 } m \text{ の等式}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M-1} s(m)s(m+1) \right) f_{\iota(s)} & (\because \text{ベクトルの有限和の分配法則}).
\end{aligned}$$

境界項にも同じ一サイト作用を二回適用する。

$$\begin{aligned}
G f_{\iota(s)} &= (\sigma_M^z \sigma_1^z) f_{\iota(s)} & (\because \text{def_G_boundary_operator}) \\
&= \sigma_M^z (s(1) f_{\iota(s)}) & (\because \text{sigma_z_diagonal_action を } 1 \text{ に適用}) \\
&= s(1) \sigma_M^z f_{\iota(s)} & (\because \text{行列作用の複素線型性}) \\
&= s(1) (s(M) f_{\iota(s)}) & (\because \text{sigma_z_diagonal_action を } M \text{ に適用}) \\
&= (s(1)s(M)) f_{\iota(s)} & (\because \text{スカラー倍の結合律}) \\
&= s(M)s(1) f_{\iota(s)} & (\because \text{実数の積の交換律}).
\end{aligned}$$

□

定義 19.11 (1 次元開鎖のスピン配置とエネルギー). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 2.3 で行の長さに使った N をここでは M と書き替え、 $\mathfrak{M} = \text{Map}(\{1, \dots, M\}, \{-1, 1\})$ とする。各 $s \in \mathfrak{M}$ に対して、1 次元開鎖のエネルギーを

$$E(s) := \sum_{m=1}^{M-1} s(m) s(m+1) \in \mathbb{Z} \quad (s \in \mathfrak{M})$$

と定める。

主張 19.12 (端点因子のない 1 次元開鎖のスピン和). 定義 19.11 の記号を用い、 $K \in \mathbb{R}$ とする。このとき

$$\sum_{s \in \mathfrak{M}} e^{KE(s)} = 2 (2 \cosh K)^{M-1}$$

が成り立つ。(指数評価による $\mathbb{R}$ 脱出) ここでは実数値の指数関数を用いる。

証明. Step 1 (変数変換)。写像

$$\Phi : \mathfrak{M} \longrightarrow \{-1, 1\} \times \{-1, 1\}^{M-1}, \quad \Phi(s) := (s(1); t_1, \dots, t_{M-1}), \quad t_m := s(m)s(m+1)$$

は全単射である。実際、 $(s(1); t_1, \dots, t_{M-1})$ が与えられれば $s(m+1) = s(m)t_m$ により $s(2), \dots, s(M)$ が順に一意に定まり $(s(m)s(m) = 1$ なので $t_m = s(m)s(m+1)$ と同値)、逆にこの手続きで作った s は $\Phi(s)$ として元の組を与えるからである。両側の集合はともに 2^M 個の元をもつ。

Step 2 (スピン和の計算)。 $E(s) = \sum_{m=1}^{M-1} t_m$ なので、定理 4.5 ($n = 1$ 、実数の指数法則) より $e^{KE(s)} = \prod_{m=1}^{M-1} e^{Kt_m}$ である。Step 1 の全単射で和を書き換えると

定義 1.1 より、最後から二つ目の等号が成り立つ。

$$\begin{aligned} \sum_{s \in \mathfrak{M}} e^{KE(s)} &= \sum_{s(1) \in \{-1, 1\}} \sum_{t_1, \dots, t_{M-1} \in \{-1, 1\}} \prod_{m=1}^{M-1} e^{Kt_m} \quad (\because \text{Step 1 の全単射}) \\ &= \left(\sum_{s(1) \in \{-1, 1\}} 1 \right) \prod_{m=1}^{M-1} \left(\sum_{t_m \in \{-1, 1\}} e^{Kt_m} \right) \quad (\because \text{有限個の因子の積の展開 (各 } t_m \text{ は独立に走る)}) \\ &= 2 \prod_{m=1}^{M-1} (e^K + e^{-K}) \quad (\because \text{二元集合 } \{-1, 1\} \text{ 上の二つの有限和を計算}) \\ &= 2 \prod_{m=1}^{M-1} (2 \cosh K) \quad (\because \text{双曲線余弦の定義}) \\ &= 2 (2 \cosh K)^{M-1} \quad (\because \text{同じ因子 } 2 \cosh K \text{ の } M-1 \text{ 個の積}) \end{aligned}$$

□

主張 19.13 (両端のスピン積を掛けた 1 次元開鎖のスピン和). 定義 19.11 の記号を用い、 $K \in \mathbb{R}$ とする。このとき

$$\sum_{s \in \mathfrak{M}} s(M)s(1)e^{KE(s)} = 2 (2 \sinh K)^{M-1}$$

が成り立つ。(指数評価による $\mathbb{R}$ 脱出) ここでは実数値の指数関数を用いる。

証明. Step 1 (変数変換)。写像

$$\Phi: \mathfrak{M} \longrightarrow \{-1, 1\} \times \{-1, 1\}^{M-1}, \quad \Phi(s) := (s(1); t_1, \dots, t_{M-1}), \quad t_m := s(m)s(m+1)$$

は全単射である。実際、 $(s(1); t_1, \dots, t_{M-1})$ から漸化式 $s(m+1) = s(m)t_m$ によって $s(2), \dots, s(M)$ が一意に復元され、この復元は $t_m = s(m)s(m+1)$ の逆写像になる。

Step 2 (端点因子の書き替え)。 $s(m)s(m) = 1$ を繰り返し使おうと

$$\begin{aligned} \prod_{m=1}^{M-1} t_m &= \prod_{m=1}^{M-1} s(m)s(m+1) && (\because t_m := s(m)s(m+1)) \\ &= s(1) \left(\prod_{m=2}^{M-1} s(m)s(m) \right) s(M) && (\because \mathbb{R} \text{ の乗法の可換性と結合性}) \\ &= s(1) \left(\prod_{m=2}^{M-1} 1 \right) s(M) && (\because s(m)s(m) = 1 \text{ を各 } m \text{ へ同時適用}) \\ &= s(1)s(M) && (\because \text{有限積の単位元}) \end{aligned}$$

である (隣接する因子が対になって 1 になる)。また 定理 4.5 ($n = 1$ 、実数の指数法則) より $e^{KE(s)} = \prod_{m=1}^{M-1} e^{Kt_m}$ である。したがって

定義 1.1 より、最後から二つ目の等号が成り立つ。

$$\begin{aligned} \sum_{s \in \mathfrak{M}} s(M)s(1)e^{KE(s)} &= \sum_{s(1) \in \{-1, 1\}} \sum_{t_1, \dots, t_{M-1} \in \{-1, 1\}} \left(\prod_{m=1}^{M-1} t_m \right) \prod_{m=1}^{M-1} e^{Kt_m} && (\because \text{Step 1 の全単射と直前の等式}) \\ &= \left(\sum_{s(1) \in \{-1, 1\}} 1 \right) \prod_{m=1}^{M-1} \left(\sum_{t_m \in \{-1, 1\}} t_m e^{Kt_m} \right) && (\because \text{有限個の因子の積の展開}) \\ &= 2 \prod_{m=1}^{M-1} (e^K - e^{-K}) && (\because \text{二元集合 } \{-1, 1\} \text{ 上の二つの有限和を計算}) \\ &= 2 \prod_{m=1}^{M-1} (2 \sinh K) && (\because \text{双曲線正弦の定義}) \\ &= 2 (2 \sinh K)^{M-1} && (\because \text{同じ因子 } 2 \sinh K \text{ の } M-1 \text{ 個の積}) \end{aligned}$$

□

主張 19.14 (1 次元開鎖の二つのスピン和の正值性). 定義 19.11 の $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ を使い、 $K \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。このとき 主張 19.12 と 主張 19.13 の二つのスピン和は、ともに正の実数である。

証明.

$$\begin{aligned} \sum_{s \in \mathfrak{M}} e^{KE(s)} &= 2 (2 \cosh K)^{M-1} && (\because \text{主張 19.12}) \\ &> 0 && (\because \text{主張 1.4, } \cosh K > 0, M-1 \in \mathbb{Z}_{>0}) \\ \sum_{s \in \mathfrak{M}} s(M)s(1)e^{KE(s)} &= 2 (2 \sinh K)^{M-1} && (\because \text{主張 19.13}) \\ &> 0 && (\because \text{主張 1.4, } \sinh K > 0, M-1 \in \mathbb{Z}_{>0}) \end{aligned}$$

□

定理 19.15 ($\text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) = (2e^{-K_2} \cosh K_1)^M + (2e^{K_2} \sinh K_1)^M > 0$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 15.4 の $V^{(+)} = (V_1^{(+)})^{1/2} V_2 (V_1^{(+)})^{1/2}$ について

$$\text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) = (2e^{-K_2} \cosh K_1)^M + (2e^{K_2} \sinh K_1)^M \in \mathbb{R}_{>0}$$

が成り立つ。** この計算には $\check{Z}, \check{Y}, \check{\psi}$ も半整数運動量も現れない。** 転送行列を配置の基底 (定義 11.2) で見て、1 次元開鎖のスピン和 (主張 19.12、主張 19.13) を実行するだけである。

証明. 以下 $B := (V_1^{(+)})^{1/2} = \exp\left(\frac{1}{2}iK_1 H_1^{(+)}\right)$ (定義 15.3) と略記し、定義 19.5 の D_0 と 定義 19.6 の G を用い、両者と 主張 19.7 の等式で $iH_1^{(+)} = D_0 + \varepsilon G$ へ書き換える。

Step 1 (ε を外へ出す)。主張 11.13 より ε は $B = (V_1^{(+)})^{1/2}$ とも $V_1^{(+)}$ とも V_2 とも可換である。主張 10.3 (2) の巡回性と合わせて

$$\begin{aligned} \text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) &= \text{tr}(\varepsilon B V_2 B) \quad (\because \text{def_V_plus}) \\ &= \text{tr}(B \varepsilon V_2 B) \quad (\because \text{epsilon_commutes_with_transfer_matrices の } \varepsilon B = B \varepsilon) \\ &= \text{tr}(\varepsilon V_2 B B) \quad (\because \text{trace_basic_properties (2) の巡回性を } A = B, B' = \varepsilon V_2 B \text{ に適用}) \\ &= \text{tr}(\varepsilon V_2 V_1^{(+)}) \quad (\because \text{theorem_exp_product より } BB = V_1^{(+)}) \\ &= \text{tr}(V_1^{(+)} \varepsilon V_2) \quad (\because \text{trace_basic_properties (2) の巡回性}) \\ &= \text{tr}(\varepsilon V_1^{(+)} V_2) \quad (\because \text{epsilon_commutes_with_transfer_matrices より } V_1^{(+)} \varepsilon = \varepsilon V_1^{(+)}) \end{aligned}$$

Step 2 ($\varepsilon V_1^{(+)}$ を対角行列と ε で書く)。定義 5.24 より $V_1^{(+)} = \exp(iK_1 H_1^{(+)})$ であり、主張 19.7 より $iK_1 H_1^{(+)} = K_1 D_0 + K_1 \varepsilon G$ である。主張 19.8 より $K_1 D_0$ と $K_1 \varepsilon G$ は可換なので 定理 4.5 が使えて

$$V_1^{(+)} = \exp(K_1 D_0) \exp(K_1 \varepsilon G) \quad (\because \text{theorem_exp_product})$$

主張 19.9 の $(\varepsilon G)^2 = I$ より、定義 4.4 の級数を偶数次と奇数次に分けると

$$\begin{aligned} \exp(K_1 \varepsilon G) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{K_1^k}{k!} (\varepsilon G)^k \quad (\because \text{def_exp}) \\ &= \left(\sum_{k \text{ 偶}} \frac{K_1^k}{k!} \right) I + \left(\sum_{k \text{ 奇}} \frac{K_1^k}{k!} \right) \varepsilon G \quad (\because (\varepsilon G)^2 = I \text{ より } (\varepsilon G)^k = I \text{ または } \varepsilon G) \\ &= \cosh(K_1) I + \sinh(K_1) \varepsilon G \quad \left(\because \cosh K_1 = \sum_{k \text{ 偶}} \frac{K_1^k}{k!}, \sinh K_1 = \sum_{k \text{ 奇}} \frac{K_1^k}{k!} \right) \end{aligned}$$

(級数を偶奇に分けて足し直せることは、実数の絶対収束級数の項の並べ替えによる。主張 4.1 より $\sum K_1^k/k!$ は絶対収束する。) 左から ε を掛け、 ε が $\exp(K_1 D_0)$ と可換 (主張 19.8 より $\varepsilon D_0 = D_0 \varepsilon$ 、よって級数の部分和とも可換、極限とも可換) であることを使うと

$$\begin{aligned} \varepsilon V_1^{(+)} &= \varepsilon \exp(K_1 D_0) \exp(K_1 \varepsilon G) \quad (\because \text{この Step の最初の式 } V_1^{(+)} = \exp(K_1 D_0) \exp(K_1 \varepsilon G)) \\ &= \exp(K_1 D_0) \varepsilon \exp(K_1 \varepsilon G) \quad (\because \text{直前の可換性 } \varepsilon \exp(K_1 D_0) = \exp(K_1 D_0) \varepsilon) \\ &= \exp(K_1 D_0) \varepsilon (\cosh(K_1) I + \sinh(K_1) \varepsilon G) \quad (\because \text{直前の } \exp(K_1 \varepsilon G) \text{ の表示}) \\ &= \exp(K_1 D_0) (\cosh(K_1) \varepsilon + \sinh(K_1) \varepsilon^2 G) \quad (\because \text{行列の積の分配則}) \\ &= \exp(K_1 D_0) (\cosh(K_1) \varepsilon + \sinh(K_1) G) \quad (\because \varepsilon^2 = I) \end{aligned}$$

Step 3 (成分の読み取り)。定義 11.2 の同一視のもとで基底を $f_{\iota(s)}$ ($s \in \mathfrak{M}$) とする。次の 3 つを読み取る。

- (a) 主張 19.10 と 主張 11.4 より $\exp(K_1 D_0)$ は対角行列で $(\exp(K_1 D_0))_{\iota(s), \iota(s)} = e^{K_1 E(s)}$ ($E(s) = \sum_{m=1}^{M-1} s(m)s(m+1)$ は 定義 19.11 のもの)。同じく G は対角行列で $G_{\iota(s), \iota(s)} = s(M)s(1)$ 。
- (b) $\varepsilon f_{\iota(s)} = f_{\iota(-s)}$ 。ここで $(-s)(m) := -s(m)$ 。
- (c) 主張 11.7 より $(V_2)_{\iota(s), \iota(s')} = \exp\left(K_2 \sum_{m=1}^M s(m)s'(m)\right)$ 。とくに $(V_2)_{\iota(s), \iota(s)} = e^{MK_2}$ 、 $(V_2)_{\iota(-s), \iota(s)} = e^{-MK_2}$ 。

(b) の理由：定義 5.12 の基底は $f_I = e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M}$ で、主張 3.2 より σ_m^x は第 m 因子にだけ σ^x を作用させる。 $\sigma^x e_1 = e_2$ 、 $\sigma^x e_2 = e_1$ なので $\sigma_m^x f_I$ は第 m 成分だけを入れ替える。 $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ はすべての成分を入れ替えるので、定義 11.2 の ι ($+1 \mapsto 1$ 、 $-1 \mapsto 2$) のもとで $\varepsilon f_{\iota(s)} = f_{\iota(-s)}$ である。(c) の 2 つの特別な場合は $\sum_m s(m)s(m) = M$ と $\sum_m (-s(m))s(m) = -M$ による。

Step 4 (トレースの計算)。定義 10.2 より $\text{tr}(X) = \sum_{s \in \mathfrak{M}} X_{\iota(s), \iota(s)}$ である。Step 2 の表示を Step 1 に代入し、主張 10.3 (1) の線型性で 2 項に分ける。

$$\text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) = \cosh(K_1) \text{tr}(\exp(K_1 D_0) \varepsilon V_2) + \sinh(K_1) \text{tr}(\exp(K_1 D_0) G V_2)$$

第 1 項の対角成分は、(a) の対角性と (b)(c) より

$$\begin{aligned} (\exp(K_1 D_0) \varepsilon V_2)_{\iota(s), \iota(s)} &= e^{K_1 E(s)} (\varepsilon V_2)_{\iota(s), \iota(s)} \quad (\because \text{(a) の対角性}) \\ &= e^{K_1 E(s)} (V_2)_{\iota(-s), \iota(s)} \quad (\because \text{(b), } \varepsilon \text{ は行番号 } \iota(s) \text{ を } \iota(-s) \text{ に移す置換行列}) \\ &= e^{K_1 E(s)} e^{-MK_2} \quad (\because \text{(c)}) \end{aligned}$$

第 2 項の対角成分は同様に

$$\begin{aligned} (\exp(K_1 D_0) G V_2)_{\iota(s), \iota(s)} &= e^{K_1 E(s)} (G V_2)_{\iota(s), \iota(s)} \quad (\because \text{(a) の } \exp(K_1 D_0) \text{ の対角性}) \\ &= e^{K_1 E(s)} s(M)s(1) (V_2)_{\iota(s), \iota(s)} \quad (\because \text{(a) の } G \text{ の対角性}) \\ &= e^{K_1 E(s)} s(M)s(1) e^{MK_2} \quad (\because \text{(c)}) \end{aligned}$$

$s \in \mathfrak{M}$ について足し、主張 19.12 と 主張 19.13 を $K = K_1$ として適用すると

$$\begin{aligned} \text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) &= \cosh(K_1) e^{-MK_2} \sum_{s \in \mathfrak{M}} e^{K_1 E(s)} + \sinh(K_1) e^{MK_2} \sum_{s \in \mathfrak{M}} s(M)s(1) e^{K_1 E(s)} \quad (\because \text{def_trace と直前の 2 式}) \\ &= \cosh(K_1) e^{-MK_2} \cdot 2(2 \cosh K_1)^{M-1} + \sinh(K_1) e^{MK_2} \cdot 2(2 \sinh K_1)^{M-1} \quad (\because \text{二つの 1 次元開鎖のスピン和公式}) \\ &= 2^M e^{-MK_2} (\cosh K_1)^M + 2^M e^{MK_2} (\sinh K_1)^M \quad (\because 2 \cdot 2^{M-1} = 2^M) \\ &= (2e^{-K_2} \cosh K_1)^M + (2e^{K_2} \sinh K_1)^M \end{aligned}$$

Step 5 (正値性)。主張 19.14 を $K = K_1$ として適用すると、Step 4 の最初の等号に現れる二つのスピン和はともに正である。また 主張 1.4 から $\cosh K_1 > 0$ 、 $\sinh K_1 > 0$ 。また $e^{\pm K_2} > 0$ 。したがって、その等号の二項はともに正であり、和も正である。□

定理 19.16 (ε の固有値は $+1$, $\text{im } \check{Q}_{(1, \dots, 1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 19.3 の η_ϵ について次が成り立つ。

- (1) $\eta_{(1, \dots, 1)} = +1$

- (2) $\eta_\epsilon = (-1)^{M-|\epsilon|} = (-1)^{M+|\epsilon|}$ 、すなわち $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = (-1)^{M+|\epsilon|} \check{Q}_\epsilon$ 。
- (3) $\varepsilon = (-1)^M \prod_{\mu=1}^M (I - 2\check{n}_\mu)$
- (4) $\text{im } \check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$ (主張 5.20 の $\mathcal{F}^{(+)}$)。すなわち $**V^{(+)}$ の最大固有値 $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルは偶セクターに属する $**$ 。

証明. (1) 定理 19.15 より $\text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) > 0$ である。主張 19.4 の最後の同値

$$\eta_{(1,\dots,1)} = +1 \iff \text{tr}(\varepsilon V^{(+)}) > 0$$

により $\eta_{(1,\dots,1)} = +1$ 。

- (2) 主張 19.3 (3) に (1) を代入して $\eta_\epsilon = (-1)^{M-|\epsilon|}$ 。 $(-1)^{-|\epsilon|} = (-1)^{|\epsilon|}$ ($(-1)^{|\epsilon|}(-1)^{|\epsilon|} = 1$ より) なので $(-1)^{M-|\epsilon|} = (-1)^{M+|\epsilon|}$ 。
- (3) 主張 19.3 (4) に (1) を代入する。
- (4) $|(1,\dots,1)| = M$ なので (2) を一段ずつ適用すると

$$\begin{aligned} \varepsilon \check{Q}_{(1,\dots,1)} &= (-1)^{M+|(1,\dots,1)|} \check{Q}_{(1,\dots,1)} \quad (\because (2)) \\ &= (-1)^{2M} \check{Q}_{(1,\dots,1)} \quad (\because |(1,\dots,1)| = M) \\ &= \check{Q}_{(1,\dots,1)} \quad (\because (-1)^{2M} = 1) \end{aligned}$$

$y \in \text{im } \check{Q}_{(1,\dots,1)}$ を取ると、主張 18.6 (1) の冪等性より $y = \check{Q}_{(1,\dots,1)} y$ であり

$$\begin{aligned} \varepsilon y &= \varepsilon \check{Q}_{(1,\dots,1)} y \quad (\because y = \check{Q}_{(1,\dots,1)} y) \\ &= \check{Q}_{(1,\dots,1)} y \quad (\because \text{直前の } \varepsilon \check{Q}_{(1,\dots,1)} = \check{Q}_{(1,\dots,1)}) \\ &= y \quad (\because y = \check{Q}_{(1,\dots,1)} y) \end{aligned}$$

したがって $y \in \mathcal{F}^{(+)}$ 。定理 18.16 (3) より $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有空間はちょうど $\text{im } \check{Q}_{(1,\dots,1)}$ なので、主張の言い換えが成り立つ。 $\square$

主張 19.17 ($\check{n}_\mu, \check{Q}_\epsilon$ はエルミート)。 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 、 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ とする。 X^* を定義 10.12 の転置共役とすると、

- (1) $Z_j^* = Z_j, \quad Y_j^* = Y_j \quad (j \in \{1, \dots, M\})$
- (2) $\check{Z}_\mu^* = \check{Z}_{M+1-\mu}, \quad \check{Y}_\mu^* = \check{Y}_{M+1-\mu}$
- (3) $(\check{\psi}_\mu^\dagger)^* = \check{\psi}_{M+1-\mu}$
- (4) $\check{n}_\mu^* = \check{n}_\mu, \quad \check{Q}_\epsilon^* = \check{Q}_\epsilon \quad (\epsilon \in \{0, 1\}^{\check{\mathcal{M}}})$

が成り立つ。とくに $\check{Q}_\epsilon$ はエルミートな冪等行列なので、任意の $x \in \mathbb{C}^{2^M}$ について

$$x^* \check{Q}_\epsilon x = x^* \check{Q}_\epsilon^* \check{Q}_\epsilon x = \|\check{Q}_\epsilon x\|^2 \geq 0$$

である。

証明. (1) 主張 5.9 の証明で用いた Pauli 行列の成分表示より $(\sigma^x)^* = \sigma^x$ 、 $(\sigma^y)^* = \sigma^y$ 、 $(\sigma^z)^* = \sigma^z$ である (σ^y は転置で (1, 2) 成分 $-i$ と (2, 1) 成分 i が入れ替わり、複素共役でさらに符号が戻る)。主張 3.2 (2) の成分の定義より $(A_1 \boxtimes \dots \boxtimes A_M)^* = A_1^* \boxtimes \dots \boxtimes A_M^*$ なので $(\sigma_k^a)^* = \sigma_k^a$ ($a \in \{x, y, z\}$)。

$(XW)^* = W^* X^*$ と、相異なるサイトの因子が可換であること (主張 3.2 (1)) から

$$\begin{aligned}
Z_j^* &= (\sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z)^* \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\
&= (\sigma_j^z)^* (\sigma_{j-1}^x)^* \cdots (\sigma_1^x)^* \quad (\because (XW)^* = W^* X^*) \\
&= \sigma_j^z \sigma_{j-1}^x \cdots \sigma_1^x \quad (\because \text{直前の段落}) \\
&= \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換}) \\
&= Z_j
\end{aligned}$$

Y_j も同じ計算である。

(2) 主張 14.6 (2) より $e^{-ij\tilde{\theta}_{M+1-\mu}} = e^{ij\tilde{\theta}_\mu}$ である。 $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ なので定理 1.54 より $\overline{e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}} = e^{ij\tilde{\theta}_\mu}$ であり、

$$\begin{aligned}
\tilde{Z}_\mu^* &= \left(\sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j \right)^* \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^M \overline{e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}} Z_j^* \quad (\because \text{転置共役は和を保ち、スカラー倍を複素共役つきで保つ}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j \quad (\because (1) \text{ と } \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}) \\
&= \sum_{j=1}^M e^{-ij\tilde{\theta}_{M+1-\mu}} Z_j \quad (\because \text{conjugate_index_of_check_Z_Y (2)}) \\
&= \tilde{Z}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{def_half_integer_modes})
\end{aligned}$$

$\tilde{Y}_\mu$ も同じ計算である (定義 14.5 (2) より $M+1-\mu \in \tilde{\mathcal{M}}$ なので右辺は定義されている)。

$$(3) \text{ 定義 17.2 より、 } \nu := M+1-\mu, \quad \beta := \frac{1}{2\sqrt{M}} \in \mathbb{R}_{>0}, \quad \alpha_\mu := \frac{-|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)|}{2\sqrt{M} \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \text{ とおくと}$$

$$\check{\psi}_\mu^\dagger = \alpha_\mu \check{Z}_\mu + \beta \check{Y}_\mu, \quad \check{\psi}_\nu = -\alpha_\nu \check{Z}_\nu + \beta \check{Y}_\nu$$

である。まず $\overline{\alpha_\mu} = -\alpha_\nu$ を示す。主張 16.4 (1) の $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}$ より $|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)| = |\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)|$ であり、主張 17.3 (3) より $\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu) = \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ 、 $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ である。よって $r := |\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)| = |\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu)| \in \mathbb{R}_{>0}$ (主張 16.3) と書いて

$$\begin{aligned}
\overline{\alpha_\mu} &= \overline{\left(\frac{-r}{2\sqrt{M} \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \right)} \quad (\because \alpha_\mu \text{ の定義}) \\
&= \frac{-r}{2\sqrt{M} \overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}} \quad \left(\because r, 2\sqrt{M} \in \mathbb{R} \text{ と } \overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1} \right) \\
&= \frac{-r}{2\sqrt{M} (-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu))} \quad \left(\because \text{relation_of_gamma_2_theta_tilde (1) を } \overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = -\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \text{ の形で使う} \right) \\
&= \frac{r}{2\sqrt{M} \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)} \\
&= \frac{r}{2\sqrt{M} \gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu)} \quad (\because \text{periodicity_of_check_fermi (3)}) \\
&= -\alpha_\nu \quad (\because \alpha_\nu \text{ の定義と } |\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu)| = r)
\end{aligned}$$

(3 段目で使った $\overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = -\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ は、主張 16.4 (1) の両辺の複素共役を取り $\bar{\bar{z}} = z$ を使ったものである。) これを使うと

$$\begin{aligned}
(\check{\psi}_\mu^\dagger)^* &= (\alpha_\mu \check{Z}_\mu + \beta \check{Y}_\mu)^* \quad (\because \text{def_check_fermi}) \\
&= \overline{\alpha_\mu} \check{Z}_\mu^* + \overline{\beta} \check{Y}_\mu^* \quad (\because \text{転置共役の線型性 (複素共役つき)}) \\
&= \overline{\alpha_\mu} \check{Z}_\nu + \beta \check{Y}_\nu \quad (\because (2) \text{ と } \beta \in \mathbb{R}) \\
&= -\alpha_\nu \check{Z}_\nu + \beta \check{Y}_\nu \quad (\because \overline{\alpha_\mu} = -\alpha_\nu) \\
&= \check{\psi}_\nu \quad (\because \text{def_check_fermi})
\end{aligned}$$

(4) (3) の両辺の転置共役を取り $(X^*)^* = X$ を使うと $(\check{\psi}_{M+1-\mu})^* = \check{\psi}_\mu^\dagger$ である。よって

$$\begin{aligned}
\check{n}_\mu^* &= (\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu})^* \quad (\because \text{def_check_fermi}) \\
&= (\check{\psi}_{M+1-\mu})^* (\check{\psi}_\mu^\dagger)^* \quad (\because (XW)^* = W^* X^*) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because (3) \text{ とその転置共役}) \\
&= \check{n}_\mu \quad (\because \text{def_check_fermi})
\end{aligned}$$

主張 18.6 の $\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ ($R_\mu^{(1)} = \check{n}_\mu$, $R_\mu^{(0)} = I - \check{n}_\mu$) について、各因子はエルミートで ($I^* = I$)、主張 18.4 (2) より互いに可換なので

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon^* &= (R_1^{(\epsilon_1)} \cdots R_M^{(\epsilon_M)})^* \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition}) \\
&= (R_M^{(\epsilon_M)})^* \cdots (R_1^{(\epsilon_1)})^* \quad (\because (XW)^* = W^* X^* \text{ の反復適用}) \\
&= R_M^{(\epsilon_M)} \cdots R_1^{(\epsilon_1)} \quad (\because \check{n}_\mu^* = \check{n}_\mu \text{ と } I^* = I) \\
&= R_1^{(\epsilon_1)} \cdots R_M^{(\epsilon_M)} \quad (\because \text{因子の可換性。check_number_operators_commute (2)}) \\
&= \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition})
\end{aligned}$$

主張 18.6 (1) の $\check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon$ と合わせると

$$\begin{aligned}
x^* \check{Q}_\epsilon x &= x^* \check{Q}_\epsilon^* \check{Q}_\epsilon x \quad (\because \check{Q}_\epsilon^* = \check{Q}_\epsilon \text{ と } \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon) \\
&= (\check{Q}_\epsilon x)^* (\check{Q}_\epsilon x) \quad (\because (XW)^* = W^* X^*) \\
&= \|\check{Q}_\epsilon x\|^2 \quad (\because \text{複素ベクトルのノルムの定義}) \\
&\geq 0 \quad (\because \text{実数の平方和は非負})
\end{aligned}$$

□

定理 19.18 ($c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 12.14 の

$$c_+(M) = \sup \left\{ x^\top W x \mid x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2M}, \|x\| = 1 \right\}$$

と 定理 13.6 の $\Lambda_M^{(1/2)}$ について

$$c_+(M) = \check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)} = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \right)$$

が成り立つ。* 上限は達成される * (最大値である)。

証明. Step 0 ($\mathcal{F}^{(+)}$ の上で W と $V^{(+)}$ が一致すること)。 $x \in \mathcal{F}^{(+)}$ なら、主張 11.10 (4) と 定義 11.9 より

$$\begin{aligned}
P^{(+)}x &= \frac{1}{2}(x + \varepsilon x) \quad (\because \text{def_epsilon_projectors の } P^{(+)} \text{ の定義}) \\
&= \frac{1}{2}(x + x) \quad (\because x \in \mathcal{F}^{(+)} \text{ より } \varepsilon x = x(\text{def_eigenspaces_of_epsilon の固有空間})) \\
&= x \quad (\because \text{スカラー倍を整理する})
\end{aligned}$$

である。したがって 主張 12.16 の $WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$ より

$$\begin{aligned}
Wx &= WP^{(+)}x \quad (\because \text{直前の } P^{(+)}x = x) \\
&= V^{(+)}P^{(+)}x \quad (\because \text{主張 12.16 の } WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}) \quad \left(x \in \mathcal{F}^{(+)}\right) \\
&= V^{(+)}x \quad (\because \text{直前の } P^{(+)}x = x)
\end{aligned}$$

Step 1 ($c_+(M) \leq \check{\Lambda}_{\max}$)。 $x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ 、 $\|x\| = 1$ とする。 x は実ベクトルなので $x^\top = x^*$ である。 主張 18.6 (2) と 定理 18.15 (1) より

$$\begin{aligned}
x^\top Wx &= x^*V^{(+)}x \quad (\because \text{Step 0 と } x^\top = x^*) \\
&= x^*V^{(+)}\left(\sum_{\epsilon} \check{Q}_{\epsilon}\right)x \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (2)}) \\
&= \sum_{\epsilon} \check{\Lambda}_{\epsilon} x^* \check{Q}_{\epsilon} x \quad (\because \text{eigenvalues_of_V_plus (1)}) \\
&= \sum_{\epsilon} \check{\Lambda}_{\epsilon} \|\check{Q}_{\epsilon}x\|^2 \quad (\because \text{check_number_operator_is_hermitian (4)})
\end{aligned}$$

定理 18.15 (2) より $0 < \check{\Lambda}_{\epsilon} \leq \check{\Lambda}_{\max}$ であり、各 $\|\check{Q}_{\epsilon}x\|^2 \geq 0$ なので

$$\begin{aligned}
x^\top Wx &\leq \check{\Lambda}_{\max} \sum_{\epsilon} \|\check{Q}_{\epsilon}x\|^2 \quad (\because 0 < \check{\Lambda}_{\epsilon} \leq \check{\Lambda}_{\max} \text{ と } \|\check{Q}_{\epsilon}x\|^2 \geq 0) \\
&= \check{\Lambda}_{\max} \sum_{\epsilon} x^* \check{Q}_{\epsilon} x \quad (\because \check{Q}_{\epsilon} \text{ はエルミートな冪等行列}(\text{check_number_operator_is_hermitian (4)})) \\
&= \check{\Lambda}_{\max} x^* \left(\sum_{\epsilon} \check{Q}_{\epsilon}\right)x \quad (\because \text{有限和に対する行列積の分配則}) \\
&= \check{\Lambda}_{\max} x^* x \quad \left(\because \sum_{\epsilon} \check{Q}_{\epsilon} = I(\text{check_joint_eigenspace_decomposition (2)})\right) \\
&= \check{\Lambda}_{\max} \|x\|^2 \quad (\because \text{複素ベクトルのノルムの定義}) \\
&= \check{\Lambda}_{\max} \quad (\because \|x\| = 1)
\end{aligned}$$

x は任意だったので $c_+(M) \leq \check{\Lambda}_{\max}$ 。

Step 2 (実の最大固有ベクトルの存在)。 主張 18.6 (4) より $\text{im } \check{Q}_{(1,\dots,1)}$ は 1 次元なので、生成元 $q \neq 0$ を取る。 定理 18.15 (1) より $V^{(+)}q = \check{\Lambda}_{\max}q$ である。

$V^{(+)}$ の成分は実である。実際 主張 18.9 の表示 $V^{(+)} = (2s_2)^{M/2} \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right)$ において、主張 10.15 より $S_1^{(+)}, S_2$ は実対称であり、主張 12.5 の Step 2 と同じ議論 (実対称行列の冪は実対称、定義 4.4 の部分和も実対称、主張 10.13 (3) と同様に転置もノルムを保つので極限も実対称) により $\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right)$ と $\exp(S_2)$ は実対称、 $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ なので $V^{(+)}$ も実行列である。

したがって $\overline{V^{(+)}q} = V^{(+)}\bar{q}$ であり、 $\check{\Lambda}_{\max} \in \mathbb{R}$ (定理 18.15) なので $V^{(+)}\bar{q} = \check{\Lambda}_{\max}\bar{q}$ 。 定理 18.16 (3) より固有空間は 1 次元の $\text{im } \check{Q}_{(1,\dots,1)} = \mathbb{C}q$ なので、ある $z \in \mathbb{C}$ で $\bar{q} = zq$ と書ける。

ここで $p := q + \bar{q} = (1+z)q$ 、 $p' := i(q - \bar{q}) = i(1-z)q$ とおくと、 $\bar{p} = p$ 、 $\bar{p'} = \bar{i}(\bar{q} - q) = (-i)(\bar{q} - q) = p'$ なので p, p' はいずれも実ベクトルである。 $1+z$ と $i(1-z)$ が同時に 0 にな

ることではない ($z = -1$ かつ $z = 1$ は不可能) ので、 p と p' の少なくとも一方は 0 でない。それを v とすると $v \in \mathbb{C}q \setminus \{0\}$ かつ $v \in \mathbb{R}^{2^M}$ である。 $x_0 := v/\|v\|$ とおく。

Step 3 ($c_+(M) \geq \check{\Lambda}_{\max}$)。 $x_0 \in \mathbb{C}q = \text{im } \check{Q}_{(1,\dots,1)}$ なので 定理 19.16 (4) より $x_0 \in \mathcal{F}^{(+)}$ であり、 x_0 は実で $\|x_0\| = 1$ である。Step 0 と 定理 18.15 (1) より

$$x_0^\top W x_0 = x_0^\top V^{(+)} x_0 = x_0^\top (\check{\Lambda}_{\max} x_0) = \check{\Lambda}_{\max} x_0^\top x_0 = \check{\Lambda}_{\max}$$

したがって $c_+(M)$ を定める集合は $\check{\Lambda}_{\max}$ を要素にもち、 $c_+(M) \geq \check{\Lambda}_{\max}$ 。Step 1 と合わせて $c_+(M) = \check{\Lambda}_{\max}$ であり、上限は x_0 で達成される。

最後に 定理 18.16 (1) の $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)}$ を代入すれば主張の等式を得る。 $\square$

定理 19.19 (2 次元 Ising 模型の厳密解 (Onsager の自由エネルギー))。主張 11.8 と同じ設定 ($K_1 = J' > 0$ 、 $K_2 = J > 0$) のもとで、

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \lim_{N_{\text{row}} \rightarrow \infty} \frac{1}{M N_{\text{row}}} \log Z(J, J') = \frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta) d\theta$$

が成り立つ。ここで

$$\gamma(\theta) = \text{arccosh}(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos \theta)$$

であり (主張 13.2)、これが Onsager の自由エネルギーの表式である。

とくに 注意 13.7 が「残っている入力」として挙げていた $c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$ は 定理 19.18 で証明された。

証明. Step 1 (N_{row} の極限)。主張 13.4 より、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ を固定すると

$$\lim_{N_{\text{row}} \rightarrow \infty} \frac{1}{M N_{\text{row}}} \log Z(J, J') = \frac{1}{M} \log c(M)$$

である。以下 $c(M)$ の $M \rightarrow \infty$ の挙動を調べる。

Step 2 (下からの評価 $c(M) \geq \Lambda_M^{(1/2)}$)。主張 12.17 (3) と 定理 19.18 より

$$\begin{aligned} c(M) &= \max(c_+(M), c_-(M)) \quad (\because \text{主張 12.17 (3)}) \\ &\geq c_+(M) \quad (\because \text{二つの実数の最大値の定義}) \\ &= \Lambda_M^{(1/2)} \quad (\because \text{定理 19.18}) \end{aligned}$$

Step 3 (上からの評価 $c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$)。 $x \in \mathbb{R}^{2^M}$ 、 $\|x\| = 1$ を任意に取る。成分ごとの絶対値を取ったベクトルを u ($u_k := |x_k|$) とし、 $v := u + \varepsilon u$ とおく。

主張 12.6 より W の成分はすべて正なので、

$$u^\top W u = \sum_{k,l} |x_k| |x_l| W_{kl} \geq \left| \sum_{k,l} x_k x_l W_{kl} \right| \geq x^\top W x \quad (\because \text{三角不等式と } W_{kl} > 0)$$

である。また ε は各基底ベクトルを別の基底ベクトルへ写す置換行列 (定理 19.15 の証明 Step 3 の (b)) なので、 $u \geq 0$ なら $\varepsilon u \geq 0$ であり、

$$\begin{aligned} \|\varepsilon u\| &= \|u\| \quad (\because \varepsilon \text{ は置換行列であり、成分の並べ替えは二乗和を変えない}) \\ &= \|x\| \quad (\because u_k = |x_k| \text{ であり、ノルムは成分の絶対値だけで決まる}) \\ &= 1 \quad (\because \|x\| = 1 \text{ (Step 3 の } x \text{ の取り方)}) \end{aligned}$$

である。さらに $\varepsilon^\top = \varepsilon$ (主張 12.17 の証明 (3) で確かめられている)。

•

$$\begin{aligned}
\varepsilon v &= \varepsilon(u + \varepsilon u) & (\because v = u + \varepsilon u) \\
&= \varepsilon u + \varepsilon^2 u & (\because \text{行列の分配則}) \\
&= \varepsilon u + u & (\because \varepsilon^2 = I) \\
&= v & (\because v = u + \varepsilon u)
\end{aligned}$$

より $v \in \mathcal{F}^{(+)}$ (主張 11.10 (1))。また v は実である。

• $v \geq u \geq 0$ かつ $u \neq 0$ より $v \neq 0$ 。

•

$$\begin{aligned}
\|v\|^2 &= \|u\|^2 + 2u^\top \varepsilon u + \|\varepsilon u\|^2 & (\because v = u + \varepsilon u \text{ の展開と } \varepsilon^\top = \varepsilon) \\
&= 2 + 2u^\top \varepsilon u & (\because \|u\| = \|\varepsilon u\| = 1) \\
&\leq 4 & (\because \text{Cauchy-Schwarz より } u^\top \varepsilon u \leq \|u\| \|\varepsilon u\| = 1)
\end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned}
v^\top W v &= u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u + (\varepsilon u)^\top W (\varepsilon u) & (\because v = u + \varepsilon u \text{ の展開と } W^\top = W) \\
&= u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u + u^\top \varepsilon W \varepsilon u & (\because \varepsilon^\top = \varepsilon) \\
&= u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u + u^\top W \varepsilon^2 u & (\because \varepsilon W = W \varepsilon. \text{ 主張 12.15}) \\
&= 2u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u & (\because \varepsilon^2 = I) \\
&\geq 2u^\top W u & (\because u, \varepsilon u \geq 0 \text{ と } W_{kl} > 0 \text{ より } u^\top W \varepsilon u \geq 0)
\end{aligned}$$

$\hat{v} := v/\|v\|$ は $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2M}$ の単位ベクトルなので 定理 19.18 より

$$\begin{aligned}
\Lambda_M^{(1/2)} &= c_+(M) & (\because \text{定理 19.18}) \\
&\geq \hat{v}^\top W \hat{v} & (\because c_+(M) \text{ は } \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2M} \text{ の単位ベクトル上の上限. 定義 12.14}) \\
&= \frac{v^\top W v}{\|v\|^2} & (\because \hat{v} = v/\|v\| \text{ の代入と二次形式の斉次性}) \\
&\geq \frac{2u^\top W u}{\|v\|^2} & (\because v^\top W v \geq 2u^\top W u \text{ (上の式変形) と } \|v\|^2 > 0) \\
&\geq \frac{2u^\top W u}{4} & (\because \|v\|^2 \leq 4 \text{ (上の式変形) と } u^\top W u \geq 0 (u \geq 0, W_{kl} > 0)) \\
&= \frac{u^\top W u}{2} & (\because \mathbb{R} \text{ の約分}) \\
&\geq \frac{x^\top W x}{2} & (\because u^\top W u \geq x^\top W x \text{ (上の三角不等式)})
\end{aligned}$$

x は任意だったので、上限を取って $c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$ 。

Step 4 (挟み撃ち)。Step 2・Step 3 より $\Lambda_M^{(1/2)} \leq c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$ であり、すべて正の実数なので $\log$ の単調性から

$$\frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(1/2)} \leq \frac{1}{M} \log c(M) \leq \frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(1/2)} + \frac{\log 2}{M}$$

$(\log 2)/M \rightarrow 0$ なので、定理 13.6 を $\delta = \frac{1}{2}$ として適用すると

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \log c(M) = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(1/2)} = \frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta) d\theta$$

Step 1 と合わせて主張の 2 重極限の値が定まる。

** 実数解析 (Riemann 積分) を使ったのは 定理 13.5 を経由する最後の等号だけである
 ** (注意 13.1)。それ以外の段はすべて有限サイズの複素行列の積・和・トレースと、有限個の実数の不等式で書かれている。□

20 最大固有値はどちらのセクターから来るか： $c(M) = c_+(M)$

注意 20.1 (この章の目的). 主張 12.17 (3) により $c(M) = \max(c_+(M), c_-(M))$ である。定理 19.19 はこの $\max$ の値を決めずに、 $\Lambda_M^{(1/2)} \leq c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$ という ** 粗い挟み撃ち ** で自由エネルギーを出した (係数 2 は $(\log 2)/M \rightarrow 0$ で消えるので表式には影響しない)。

この章では、その $\max$ がどちらから来るかを確定させる：

$$c_-(M) \leq c_+(M), \quad \text{したがって} \quad c(M) = c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$$

** 自由エネルギーの表式そのものにこの結果は不要である。 ** それでもこれを示すのは、 W の最大固有値が ε の固有値 $+1$ のセクター (偶セクター) から来る、という描像を本文で確定させるためである。

筋は短い。 ε は標準基底のベクトルを別の標準基底のベクトルへ写す $0/1$ の ** 置換行列 ** である (主張 20.2)。そこで奇セクターの実ベクトル $x \in \mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ に対し、成分ごとに絶対値を取ったベクトル u ($u_k := |x_k|$) を作ると、符号がそろって u は ** 偶セクターに移る ** (主張 20.3)。しかも W の成分がすべて正である (主張 12.6。この議論で実際に効くのは $W_{kl} \geq 0$ という ** 非負性だけ ** である) ため、絶対値を取ると二次形式の値は ** 減らない **。よって $c_+(M) \geq u^\top W u \geq x^\top W x$ となり、 x について上限を取れば $c_+(M) \geq c_-(M)$ を得る (定理 20.4)。

この章で使う道具は、実行列の成分計算、有限個の実数の和・積・絶対値と三角不等式、および実数の上限だけである。 ** 実数解析 (積分・連続極限) へは移行しない ** (注意 13.1 の移行点は 定理 19.19 の最後の等号だけのままである)。

なお、示すのは $c_-(M) \leq c_+(M)$ という ** 不等号だけ ** であり、 $c_-(M)$ の値そのものには立ち入らない。

主張 20.2 (ε は不動点をもたない対合の置換行列). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 11.2 の同一視のもとで $\mathbb{C}^{2^M}$ の標準基底を $e_1, \dots, e_{2^M}$ とする。 $k \in \{1, \dots, 2^M\}$ に対応するスピン配置を $s_k \in \mathfrak{M}$ (定義 2.3 の $\mathfrak{M} = \text{Map}(\{1, \dots, M\}, \{-1, 1\})$)。すなわち $e_k = f_{\iota(s_k)}$ と書き、写像 $\pi : \{1, \dots, 2^M\} \rightarrow \{1, \dots, 2^M\}$ を

$$\pi(k) := (\text{スピン配置 } -s_k \text{ に対応する番号}), \quad (-s_k)(m) := -s_k(m) \quad (m \in \{1, \dots, M\})$$

で定める。定義 5.8 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ について次が成り立つ。

- (1) $\varepsilon e_k = e_{\pi(k)}$ ($k \in \{1, \dots, 2^M\}$)。とくに ε の成分は $\varepsilon_{l,k} = \begin{cases} 1 & (l = \pi(k)) \\ 0 & (l \neq \pi(k)) \end{cases}$ であり、
 ** ε は成分がすべて 0 または 1 の置換行列 ** である (各行・各列にちょうど 1 個の 1 がある)。
- (2) $\pi(\pi(k)) = k$, $\pi(k) \neq k$ ($k \in \{1, \dots, 2^M\}$) (π は不動点をもたない対合)。
- (3) $(\varepsilon x)_k = x_{\pi(k)}$ ($x \in \mathbb{C}^{2^M}$, $k \in \{1, \dots, 2^M\}$)

- (4) $x_0 := \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 - e_{\pi(1)}) \in \mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$, $\|x_0\| = 1$ (主張 5.20 の $\mathcal{F}^{(-)}$). ** とくに $\mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ は単位ベクトルを含む。 **

証明. (1) 定理 19.15 の証明 Step 3 の (b) で $\varepsilon f_{\iota(s)} = f_{\iota(-s)}$ ($s \in \mathfrak{M}$) が示されている。 $e_k = f_{\iota(s_k)}$ と π の定義より $f_{\iota(-s_k)} = e_{\pi(k)}$ なので $\varepsilon e_k = e_{\pi(k)}$ である。

ε の第 k 列は εe_k そのものだから、成分は $\varepsilon_{l,k} = \delta_{l,\pi(k)}$ ($l = \pi(k)$ のとき 1、そうでなければ 0) である。よって各列にちょうど 1 個の 1 がある。 $s \mapsto -s$ は $\mathfrak{M}$ からそれ自身への全単射 (2) で示す $\pi \circ \pi = \text{id}$ が逆写像を与える) なので π も全単射であり、各行にもちょうど 1 個の 1 がある。

(2) $-(-s_k) = s_k$ なので、 π の定義から $\pi(\pi(k))$ は s_k に対応する番号、すなわち k である。また $s_k(1) \in \{-1, 1\}$ より $-s_k(1) \neq s_k(1)$ なので $-s_k \neq s_k$ 、番号の対応は全単射だから $\pi(k) \neq k$ 。

(3) 行列とベクトルの積の定義に (1) の成分表示を入れる。

$$\begin{aligned} (\varepsilon x)_k &= \sum_{l=1}^{2^M} \varepsilon_{k,l} x_l \quad (\because \text{行列とベクトルの積の定義}) \\ &= \sum_{l=1}^{2^M} \delta_{k,\pi(l)} x_l \quad (\because (1) \text{ の成分表示}) \\ &= x_{\pi^{-1}(k)} \quad (\because \pi \text{ は全単射なので } \pi(l) = k \text{ となる } l \text{ がちょうど 1 つ}) \\ &= x_{\pi(k)} \quad (\because (2) \text{ より } \pi \circ \pi = \text{id}, \text{ すなわち } \pi^{-1} = \pi) \end{aligned}$$

(4) (2) より $\pi(1) \neq 1$ なので e_1 と $e_{\pi(1)}$ は相異なる標準基底ベクトルであり、 $\|x_0\|^2 = \frac{1}{2}(1+1) = 1$ 。成分は実数なので $x_0 \in \mathbb{R}^{2^M}$ 。さらに

$$\begin{aligned} \varepsilon x_0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\varepsilon e_1 - \varepsilon e_{\pi(1)}) \quad (\because \text{行列の積の線型性}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e_{\pi(1)} - e_{\pi(\pi(1))}) \quad (\because (1) \text{ を 2 箇所へ同時適用}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e_{\pi(1)} - e_1) \quad (\because (2) \text{ の } \pi(\pi(1)) = 1) \\ &= -x_0 \quad (\because x_0 \text{ の定義と実数の符号の分配}) \end{aligned}$$

なので 主張 5.20 より $x_0 \in \mathcal{F}^{(-)}$ 。 □

主張 20.3 ($x \in \mathcal{F}^{(-)} \implies u := (|x_k|)_k \in \mathcal{F}^{(+)}$, $u^\top W u \geq x^\top W x$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 12.3 の W を考える (主張 12.5 より W は実行列とみなせる)。 $x \in \mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ (主張 5.20) に対し、

$$u \in \mathbb{R}^{2^M}, \quad u_k := |x_k| \quad (k \in \{1, \dots, 2^M\})$$

と定める。このとき次が成り立つ。

- (1) $\varepsilon u = u$ 、すなわち $u \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$
- (2) $\|u\| = \|x\|$
- (3) $u^\top W u \geq |x^\top W x| \geq x^\top W x$

証明. (1) $x \in \mathcal{F}^{(-)}$ なので 主張 5.20 より $\varepsilon x = -x$ である。主張 20.2 (3) をこの等式の第 k 成分に適用すると

$$\begin{aligned}
x_{\pi(k)} &= (\varepsilon x)_k & (\because \text{epsilon_is_sign_flip_permutation (3)}) \\
&= (-x)_k & (\because \varepsilon x = -x) \\
&= -x_k & (k \in \{1, \dots, 2^M\}) \quad (\because \text{スカラー倍の成分表示})
\end{aligned}$$

を得る。同じ 主張 20.2 (3) を u に適用して

$$\begin{aligned}
(\varepsilon u)_k &= u_{\pi(k)} & (\because \text{epsilon_is_sign_flip_permutation (3)}) \\
&= |x_{\pi(k)}| & (\because u \text{ の定義}) \\
&= |-x_k| & (\because \text{直前の } x_{\pi(k)} = -x_k) \\
&= |x_k| & (\because \text{実数の絶対値は符号を落とす}) \\
&= u_k & (\because u \text{ の定義})
\end{aligned}$$

すべての k で成分が一致するので $\varepsilon u = u$ であり、主張 5.20 より $u \in \mathcal{F}^{(+)}$ 。成分 $|x_k|$ は実数なので $u \in \mathbb{R}^{2^M}$ 。

(2) ノルムの定義から成分ごとに計算する。

$$\begin{aligned}
\|u\|^2 &= \sum_{k=1}^{2^M} u_k^2 & (\because \text{ノルムの定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} |x_k|^2 & (\because u \text{ の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} x_k^2 & (\because |a|^2 = a^2 \ (a \in \mathbb{R})) \\
&= \|x\|^2 & (\because \text{ノルムの定義})
\end{aligned}$$

$\|u\| \geq 0$ 、 $\|x\| \geq 0$ なので平方根を取って $\|u\| = \|x\|$ 。

(3) 主張 12.6 より $W_{kl} > 0$ (すべての k, l) であり、とくに $W_{kl} \geq 0$ である。以下で使うのはこの ** 非負性だけ ** で、 $W_{kl} > 0$ が真に必要な箇所はない ($W_{kl} \geq 0$ のとき $|x_k x_l W_{kl}| = |x_k| |x_l| W_{kl}$ が成り立つ)。二次形式を成分で書き下す。

$$\begin{aligned}
u^\top W u &= \sum_{k=1}^{2^M} \sum_{l=1}^{2^M} u_k u_l W_{kl} & (\because \text{行列とベクトルの積と内積の成分表示}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} \sum_{l=1}^{2^M} |x_k| |x_l| W_{kl} & (\because u \text{ の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M} \sum_{l=1}^{2^M} |x_k x_l W_{kl}| & (\because W_{kl} \geq 0 \text{ なので } |x_k x_l W_{kl}| = |x_k| |x_l| W_{kl}) \\
&\geq \left| \sum_{k=1}^{2^M} \sum_{l=1}^{2^M} x_k x_l W_{kl} \right| & (\because \text{有限個の実数についての三角不等式}) \\
&= \left| x^\top W x \right| & (\because \text{行列とベクトルの積と内積の成分表示}) \\
&\geq x^\top W x & (\because |a| \geq a \ (a \in \mathbb{R}))
\end{aligned}$$

□

定理 20.4 ($c_-(M) \leq c_+(M)$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 12.14 の

$$c_{\pm}(M) = \sup \left\{ x^{\top} W x \mid x \in \mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}, \|x\| = 1 \right\}$$

について $c_{-}(M)$ と $c_{+}(M)$ はともに実数として定まり（右辺の集合は空でなく上に有界）、

$$c_{-}(M) \leq c_{+}(M)$$

が成り立つ。

証明. Step 1（上限が定まること）。 $\mathcal{R}_{\pm} := \left\{ x^{\top} W x \mid x \in \mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}, \|x\| = 1 \right\}$ とおく。主張 20.2 (4) の x_0 により $\mathcal{R}_{-} \neq \emptyset$ である。 $\mathcal{R}_{+}$ については $v := e_1 + e_{\pi(1)}$ を取る。第 1 成分が 1 以上なので $v \neq 0$ であり、主張 20.2 (1) と $\pi(\pi(1)) = 1$ （同 (2)）から $\varepsilon v = e_{\pi(1)} + e_1 = v$ なので $y_0 := v/\|v\|$ は $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルであり、 $\mathcal{R}_{+} \neq \emptyset$ である。

（ $\mathcal{R}_{+} \neq \emptyset$ に使ったのは 主張 20.2 (2) のうち $\pi \circ \pi = \text{id}$ の部分だけで、 $\pi(k) \neq k$ （不動点をもたないこと）は使っていない。 $\pi(1) = 1$ であれば $v = 2e_1$ となるだけで、上の議論はそのまま通る。不動点をもたないことが本質的に効くのは $\mathcal{R}_{-} \neq \emptyset$ の側、すなわち同 (4) の $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 - e_{\pi(1)})$ が非零であるところである。）

また $\mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルは $\mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルでもあるから $\mathcal{R}_{\pm} \subseteq \mathcal{R}$ （定義 12.8 の $\mathcal{R}$ ）であり、同じところで示されている $\mathcal{R}$ の上界 $\|W\|$ が $\mathcal{R}_{\pm}$ の上界にもなる。空でなく上に有界な実数集合は上限をもつので、 $c_{\pm}(M) \in \mathbb{R}$ が定まる。

Step 2（各点での比較）。 $x \in \mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ 、 $\|x\| = 1$ を任意に取り、主張 20.3 の u （ $u_k = |x_k|$ ）を対応させる。

$$x^{\top} W x \leq u^{\top} W u \quad (\because \text{abs_vector_moves_to_even_sector (3)})$$

$$\leq c_{+}(M) \quad (\because \text{abs_vector_moves_to_even_sector (1)(2) より } u \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}, \|u\| = \|x\| = 1 \text{ なので } u^{\top} W u \in \mathcal{R}_{+})$$

Step 3（上限を取る）。Step 2 より $c_{+}(M)$ は $\mathcal{R}_{-}$ の上界である。 $c_{-}(M) = \sup \mathcal{R}_{-}$ は $\mathcal{R}_{-}$ の上界のうち最小のものだから $c_{-}(M) \leq c_{+}(M)$ 。

（Step 2・Step 3 が使っているのは 主張 20.2 (3) の成分表示（主張 20.3 を通して）と W の成分の非負性だけである。 π が不動点をもたないことは ** 不等式の証明そのものには効いていない **。それが要るのは Step 1 で $\mathcal{R}_{-}$ が空でない、すなわち $c_{-}(M)$ が上限として意味をもつことを言う箇所だけである。）□

定理 20.5 ($c(M) = c_{+}(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ 、 $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 12.8 の $c(M)$ 、主張 12.17 の $c_{\pm}(M)$ 、定理 13.6 の $\Lambda_M^{(1/2)}$ について

$$c(M) = c_{+}(M) = \Lambda_M^{(1/2)} = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_{\mu}) \right)$$

が成り立つ（ $\tilde{\theta}_{\mu}$ は 定義 14.4 の半整数運動量、 γ は 定義 16.9）。** 上限 $c(M)$ は達成され、しかもそれを達成する単位ベクトルは偶セクター $\mathcal{F}^{(+)}$ の中に取れる。 **

証明. Step 1（ $c(M) = c_{+}(M)$ ）。主張 12.17 (3) と 定理 20.4 より

$$\begin{aligned} c(M) &= \max(c_{+}(M), c_{-}(M)) \quad (\because \text{sector_decomposition_of_rayleigh_sup (3)}) \\ &= c_{+}(M) \quad (\because \text{c_minus_le_c_plus の } c_{-}(M) \leq c_{+}(M)) \end{aligned}$$

Step 2（値の代入）。定理 19.18 より $c_{+}(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$ なので、Step 1 と合わせて $c(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$ 。右辺の閉じた表示は 定理 13.6 の $\delta = \frac{1}{2}$ の場合である。

Step 3（達成されること）。定理 19.18 の証明 Step 3 で、 $x_0 \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ 、 $\|x_0\| = 1$ かつ $x_0^{\top} W x_0 = c_{+}(M)$ を満たす x_0 が構成されている。この x_0 は $\mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルでもあるから、Step 1 より $x_0^{\top} W x_0 = c(M)$ であり、定義 12.8 の上限は x_0 で達成される。□

注意 20.6 (Onsager の厳密解の証明で使った粗い評価との関係). 定理 19.19 の証明 Step 3 は、主張 12.6 から $c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$ という ** 粗い上からの評価 ** を出し、Step 2 の $c(M) \geq \Lambda_M^{(1/2)}$ と合わせて

$$\Lambda_M^{(1/2)} \leq c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$$

としていた。定理 20.5 により、この挟み撃ちは ** 左側の等号 **

$$c(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$$

へ改善される。すなわち係数 2 は不要である。

** それでも 定理 19.19 の証明はそのままにしてある。 ** 理由は 2 つある。

- 第一に、定理 19.19 は文書順でこの章より ** 前 ** にあるので、そこで 定理 20.5 を引くと「先に読んだ定理が後の章の定理に依存する」という参照の逆流が起きる。本文は先頭から順に読めば各段が既出のものだけで正当化される形を保つ。
- 第二に、自由エネルギーの表式にとって係数 2 は無害である。 $\frac{1}{M} \log$ を取ると差は $(\log 2)/M$ で、 $M \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。

この章が加えているのは、表式そのものではなく ** 最大固有値の所在 ** である： W の Rayleigh 商の上限は偶セクター $\mathcal{F}^{(+)}$ の中で達成され、奇セクターはそれを超えない。

なお、この章は $c_-(M)$ の ** 値 ** については何も述べていない。 $c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$ と対をなす $c_-(M) = \Lambda_M^{(0)}$ は ** 一般には成り立たない ** (定理 19.19 の注記に記録した高温側の反例がある)。奇セクターについては、 $V^{(-)}$ の最大固有値の固有ベクトルがどちらのセクターに落ちるかを 定理 19.16 と同じようには決められない。この章の主張は $c_-(M) \leq c_+(M)$ という ** 不等号だけ ** であり、それには $c_-(M)$ の値は要らない。

21 臨界点と比熱の対数発散

注意 21.1 (この章で新たに持ち込む実数解析の事実 ((R3)~(R6))). 注意 13.1 は、自由エネルギーの表式 定理 19.19 を得るまでに実数解析へ移行する箇所が 定理 13.5 1 つだけであり、外部から持ち込む事実が (R1) Heine–Cantor と (R2) 連続関数の Riemann 可積分性の 2 つだけであることを述べた。

** この章は、その表式を出発点として積分の微分を扱うので、外部事実を追加で持ち込む。 ** 追加するのは次の 4 つだけであり、他では使わない。

- (R3) ** 積分の線型性と単調性 ** : $[a, b]$ 上の連続関数 g, h と $\lambda, \nu \in \mathbb{R}$ について $\int_a^b (\lambda g + \nu h) = \lambda \int_a^b g + \nu \int_a^b h$ 、および $g \leq h$ (各点で) ならば $\int_a^b g \leq \int_a^b h$ 。
- (R4) ** 微分積分学の基本定理 ** : F が $[a, b]$ 上微分可能で $F' = g$ が連続なら $\int_a^b g(t) dt = F(b) - F(a)$ 。
- (R5) ** 積分記号下の微分 (Leibniz の規則) ** : $g(t, x)$ と $\frac{\partial g}{\partial x}(t, x)$ が $[a, b] \times [x_1, x_2]$ 上で (2 変数の関数として) 連続なら、 $x \mapsto \int_a^b g(t, x) dt$ は $[x_1, x_2]$ 上微分可能で $\frac{d}{dx} \int_a^b g(t, x) dt = \int_a^b \frac{\partial g}{\partial x}(t, x) dt$ 。
- (R6) ** 置換積分 ** : $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が微分可能で u' が連続、 g が $u([a, b])$ を含む区間上で連続なら $\int_a^b g(u(t))u'(t) dt = \int_{u(a)}^{u(b)} g(s) ds$ 。

どの段でどれを使うかは次のとおりである。

- (R3) は主張 21.12 と 定理 21.13 の各不等式（被積分関数の各点評価を積分へ持ち上げる段）で使う。
- (R4) は主張 21.11（閉じた形の積分値の計算）と主張 21.10、主張 21.8（増分の評価）で使う。
- (R5) は定理 21.13 で $\frac{d^2}{d\kappa^2} \int_0^{2\pi} \gamma d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2} d\theta$ とする段でだけ使う（2 回適用する）。
- (R6) は定理 21.13 の証明で $\int_0^{2\pi} = 2 \int_0^\pi$ （ $\theta \mapsto 2\pi - \theta$ による折り返し）とする段でだけ使う。

** これ以外の解析的道具（広義積分、一樣収束、優収束、実解析性、平均値の定理）は使わない。 ** とくに本章に現れる積分はすべて有界閉区間上の連続関数の積分であり、広義積分は現れない（被積分関数が発散するのは $\kappa = 0$ のときだけで、本章の評価はすべて $\kappa \neq 0$ のもとで行う）。

また本章には $\cosh 0.2$ のような具体的な数値の評価が現れる。これらは初等関数の数値評価であり、示した桁までの不等式として使う（数値検証は `sagemath/check/055_claim_critical_point/` に置いた）。

主張 21.2 ($\cosh, \sinh$ の加法定理・半角公式と $\operatorname{arcsinh}$). 非負実数の平方根は 定義 1.6 を使う。

主張 1.4 の $\cosh, \sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ について次が成り立つ。

- (1) $x, y \in \mathbb{R}$ について $\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y, \sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$ 。
- (2) $x \in \mathbb{R}$ について $\cosh x = 1 + 2 \sinh^2(\frac{x}{2}), \sinh x = 2 \sinh(\frac{x}{2}) \cosh(\frac{x}{2})$ 。
- (3) $\sinh$ は $\mathbb{R}$ 上狭義単調増加である。
- (4) $y \in \mathbb{R}$ について $\operatorname{arcsinh}(y) := \log(y + \sqrt{y^2 + 1})$ が定まり、 $\sinh(\operatorname{arcsinh}(y)) = y$ 。したがって (3) と合わせて $u \in \mathbb{R}$ について $\sinh u = y \iff u = \operatorname{arcsinh}(y)$ 。さらに $\operatorname{arcsinh}$ は微分可能で $\operatorname{arcsinh}'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}}$ 。
- (5) $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について $t \leq \sinh t \leq t \cosh t$ 。

証明. (1) の証明. 主張 1.4 の定義と $\exp(a) \exp(b) = \exp(a + b)$ より

$$\begin{aligned} \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y &= \frac{(e^x + e^{-x})(e^y + e^{-y})}{4} + \frac{(e^x - e^{-x})(e^y - e^{-y})}{4} && (\because \cosh_sinh_basic_properties \text{ の定義}) \\ &= \frac{(e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-x-y}) + (e^{x+y} - e^{x-y} - e^{-x+y} + e^{-x-y})}{4} && (\because \exp(a) \exp(b) = \exp(a + b)) \\ &= \frac{2e^{x+y} + 2e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{-(x+y)}}{2} \\ &= \cosh(x + y) && (\because \cosh_sinh_basic_properties \text{ の定義}) \end{aligned}$$

y を $-y$ に置き換えると ($\cosh(-y) = \cosh y, \sinh(-y) = -\sinh y$ は定義から直ちに従う) $\cosh(x - y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y$ を得る。 $\sinh$ についても同じ計算（2 つの積の差を取る）で従う。

(2) の証明. (1) で $x = y = \frac{x}{2}$ とすると

$$\begin{aligned} \cosh x &= \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) && (\because \cosh_addition_and_half_angle (1)) \\ &= \left(1 + \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right)\right) + \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) && (\because \cosh_sinh_basic_properties (2)) \\ &= 1 + 2 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \end{aligned}$$

$\sinh x = 2 \sinh(\frac{x}{2}) \cosh(\frac{x}{2})$ も (1) の $\sinh$ の加法定理で $x = y = \frac{x}{2}$ とすれば従う。

(3) の証明。 $x < y$ とする。主張 1.4 で用いた $\exp$ の狭義単調増加性より $e^x < e^y$ かつ $e^{-x} > e^{-y}$ 。よって

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} < \frac{e^y - e^{-y}}{2} = \sinh y$$

(4) の証明。 $\sqrt{y^2 + 1} > \sqrt{y^2} = |y| \geq -y$ より $y + \sqrt{y^2 + 1} > 0$ なので $u := \log(y + \sqrt{y^2 + 1})$ が定まる。このとき

$$\begin{aligned} e^{-u} &= \frac{1}{y + \sqrt{y^2 + 1}} \\ &= \frac{\sqrt{y^2 + 1} - y}{(\sqrt{y^2 + 1} + y)(\sqrt{y^2 + 1} - y)} \quad (\because \text{分母の有理化}) \\ &= \frac{\sqrt{y^2 + 1} - y}{(y^2 + 1) - y^2} \\ &= \sqrt{y^2 + 1} - y \end{aligned}$$

であるから

$$\sinh u = \frac{e^u - e^{-u}}{2} = \frac{(y + \sqrt{y^2 + 1}) - (\sqrt{y^2 + 1} - y)}{2} = y$$

(3) より $\sinh$ は単射なので $\sinh u = y \iff u = \operatorname{arcsinh}(y)$ 。微分は

$$\begin{aligned} \operatorname{arcsinh}'(y) &= \frac{1}{y + \sqrt{y^2 + 1}} \cdot \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 + 1}}\right) \quad (\because \log \text{ と } \sqrt{} \text{ の微分} \cdot \text{合成関数の微分}) \\ &= \frac{1}{y + \sqrt{y^2 + 1}} \cdot \frac{\sqrt{y^2 + 1} + y}{\sqrt{y^2 + 1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}} \end{aligned}$$

(5) の証明。主張 1.4 (3) より $u > 0$ で $\sinh u > 0$ であり、 $\cosh' = \sinh$ 、 $\sinh' = \cosh$ は定義から直ちに従う。(R4) を $F = \sinh$ に適用すると

$$\sinh t = \sinh t - \sinh 0 = \int_0^t \cosh u \, du \quad (t \in \mathbb{R}_{\geq 0})$$

同様に $\cosh u = 1 + \int_0^u \sinh v \, dv$ であり、 $v \in [0, u]$ で $\sinh v \geq 0$ なので (R3) の単調性より $\cosh u \geq 1$ かつ $\cosh$ は $[0, \infty)$ 上で単調増加である。よって $u \in [0, t]$ で $1 \leq \cosh u \leq \cosh t$ であり、(R3) の単調性を $\int_0^t$ に適用して

$$t = \int_0^t 1 \, du \leq \int_0^t \cosh u \, du = \sinh t \leq \int_0^t \cosh t \, du = t \cosh t$$

□

定義 21.3 ($\kappa := 2K_1 - 2K_2^*$). 定義 5.8 の記号のもとで、 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して

$$\kappa := 2K_1 - 2K_2^* \in \mathbb{R}$$

と定める。

定義 21.4 ($A := \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^*$). 定義 5.8 の記号のもとで、 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して

$$A := s_1 s_2^*$$

と定める。記号の定義を代入すれば一続きである。

$$\begin{aligned} A &= s_1 s_2^* & (\because A \text{ の定義}) \\ &= \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* & (\because \text{def_transfer_matrix_symbols の } s_1 = \sinh 2K_1, s_2^* = \sinh 2K_2^*) \end{aligned}$$

さらに $A \in \mathbb{R}_{>0}$ である。定義 5.8 の $K_1, K_2^* > 0$ と 主張 1.4 (3) から $s_1 > 0$ かつ $s_2^* > 0$ であり、正の実数の積は正だからである。

主張 21.5 ($\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) = \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$). 定義 21.3 の κ 、定義 21.4 の A と 主張 13.2 の γ_1, γ について、** すべての実数 ** θ で次の 3 つが成り立つ。

$$\begin{aligned} \gamma_1(\theta) &= \cosh \gamma(\theta) = \cosh \kappa + 2A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) &= \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \gamma(\theta) &= 2 \operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right) \end{aligned}$$

とくに $\gamma(\theta)$ は κ と A だけで決まり、 κ については偶関数である (κ を $-\kappa$ に置き換えても値が変わらない)。

証明. Step 1 (γ_1 の書き換え)。定義 9.20 の $\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta$ から出発する。

$$\begin{aligned} \gamma_1(\theta) &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos \theta & (\because \text{def_A_theta}) \\ &= (c_1 c_2^* - s_1 s_2^*) + s_1 s_2^* (1 - \cos \theta) \\ &= \cosh(2K_1 - 2K_2^*) + s_1 s_2^* (1 - \cos \theta) & (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (1) を } x = 2K_1, y = 2K_2^* \text{ に適用}) \\ &= \cosh \kappa + A (1 - \cos \theta) & (\because \text{def_kappa_and_A}) \\ &= \cosh \kappa + 2A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) & (\because \text{倍角公式 } \cos 2t = 1 - 2 \sin^2 t \text{ を } t = \frac{\theta}{2} \text{ に適用}) \end{aligned}$$

主張 13.2 より $\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta)) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が定まり $\cosh \gamma(\theta) = \gamma_1(\theta)$ であるから、1 番目の式が従う。

Step 2 (半角の形へ)。主張 21.2 (2) を $x = \gamma(\theta)$ と $x = \kappa$ の両方に適用すると

$$\begin{aligned} 1 + 2 \sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) &= \cosh \gamma(\theta) & (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)}) \\ &= \cosh \kappa + 2A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) & (\because \text{Step 1}) \\ &= 1 + 2 \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + 2A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) & (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)}) \end{aligned}$$

両辺から 1 を引いて 2 で割ると 2 番目の式を得る。

Step 3 ($\operatorname{arcsinh}$ の形へ)。 $S := \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \geq 0$ とおく。 $\gamma(\theta) \geq 0$ より $\frac{\gamma(\theta)}{2} \geq 0$ であり、主張 1.4 (3) と $\sinh 0 = 0$ より $\sinh\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) \geq 0$ 。Step 2 より $\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) = S$ なので、非負実数の平方根の一意性 (主張 1.5) から

$$\sinh\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) = \sqrt{S}$$

主張 21.2 (4) を $u = \frac{\gamma(\theta)}{2}$ 、 $y = \sqrt{S}$ に適用して $\frac{\gamma(\theta)}{2} = \operatorname{arcsinh}(\sqrt{S})$ 、すなわち 3 番目の式を得る。

偶関数性は $\sinh^2(\frac{-\kappa}{2}) = (-\sinh(\frac{\kappa}{2}))^2 = \sinh^2(\frac{\kappa}{2})$ から従う。 $\square$

主張 21.6 ($\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1 \iff K_1 = K_2^* \iff \kappa = 0$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ について、次の 3 条件は同値である。

- (1) $s_1 s_2 = \sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ (Ising 模型の臨界条件)
- (2) $K_1 = K_2^*$
- (3) 定義 21.3 の $\kappa = 2K_1 - 2K_2^*$ が 0 に等しい

主張 9.49 は同じ条件 (1) が $c_1 = s_1 c_2$ と同値であることを示している。したがって本主張と合わせて、 $\kappa = 0$ と $c_1 = s_1 c_2$ も同値である。

証明. (1) $\iff$ (2) の証明。定義 5.8 の K_2^* の定義より $\sinh(2K_2) \sinh(2K_2^*) = 1$ であり、主張 1.4 (3) より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので

$$\sinh 2K_2^* = \frac{1}{s_2}$$

したがって

$$\begin{aligned} s_1 s_2 = 1 &\iff \sinh 2K_1 = \frac{1}{s_2} && (\because s_2 > 0 \text{ で両辺を割る}) \\ &\iff \sinh 2K_1 = \sinh 2K_2^* \\ &\iff 2K_1 = 2K_2^* && (\because \cosh_addition_and_half_angle (3) : \sinh \text{ は狭義単調増加ゆえ単射}) \\ &\iff K_1 = K_2^* \end{aligned}$$

(2) $\iff$ (3) は $\kappa = 2K_1 - 2K_2^* = 2(K_1 - K_2^*)$ より明らかである。 $\square$

主張 21.7 (等方な場合 $K_1 = K_2 = K$ では $A = 1$)。以下、** 等方な場合 ** $K_1 = K_2 = K \in \mathbb{R}_{>0}$ を考える。このとき 定義 21.4 の A について

$$A = 1$$

が成り立ち、主張 21.5 は

$$\gamma(\theta) = 2 \operatorname{arcsinh} \left(\sqrt{\sinh^2 \left(\frac{\kappa}{2} \right) + \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)} \right), \quad \kappa = \kappa(K) := 2K - 2K^*$$

となる。すなわち ** 等方な場合、 γ は κ 1 つだけを通じて K に依存する。 **

証明. $K_1 = K_2 = K$ のとき $K_2^* = K^*$ であり、定義 5.8 の K^* の定義そのものが $\sinh(2K) \sinh(2K^*) = 1$ である。よって

$$\begin{aligned} A &= s_1 s_2^* && (\because \text{定義 21.4}) \\ &= \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* && (\because \text{定義 5.8 の記号の定義}) \\ &= \sinh 2K \sinh 2K^* && (\because K_1 = K_2 = K, K_2^* = K^*) \\ &= 1 && (\because \text{定義 5.8 の } K^* \text{ の定義}) \end{aligned}$$

これを 主張 21.5 の 3 番目の式へ代入すれば主張の表示を得る。 $\square$

主張 21.8 ($\kappa(K)$ の基本性質と臨界点 K_c)。主張 21.7 の $\kappa(K) = 2K - 2K^*$ について次が成り立つ。ここで ** 臨界点 ** K_c を $\sinh 2K_c = 1$ で定める (主張 21.2 (4) より $2K_c = \operatorname{arcsinh}(1) = \log(1 + \sqrt{2})$ と一意に定まる)。

- (1) κ は $\mathbb{R}_{>0}$ 上微分可能で $\kappa'(K) = 2 + \frac{2}{\sinh 2K} > 0$ 、とくに狭義単調増加。
- (2) $\kappa(K_c) = 0$ であり、 $\kappa(K) = 0 \iff K = K_c \iff \sinh^2 2K = 1$ (等方な場合の臨界条件)。
- (3) $\kappa''(K) = -\frac{4 \cosh 2K}{\sinh^2 2K}$ 。
- (4) $|K - K_c| \leq \frac{1}{10}$ なる K について $0.7353 \leq \sinh 2K \leq 1.3048$ 、 $3.53 \leq \kappa'(K) \leq 4.72$ 、 $|\kappa''(K)| \leq 9.19$ 、 $|(\kappa'^2)'(K)| \leq 87$ 。
- (5) $|K - K_c| \leq \frac{1}{10}$ なる K について $3.53|K - K_c| \leq |\kappa(K)| \leq 4.72|K - K_c| \leq 0.472$ 、および $|\kappa'(K)^2 - 16| \leq 24.7|\kappa(K)|$ 。

証明. (1) の証明。定義 5.8 より $K^* = -\frac{1}{2} \log(\tanh K)$ なので

$$\begin{aligned}
 \frac{dK^*}{dK} &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\tanh K} \cdot \frac{d}{dK} \tanh K \quad (\because \log \text{ の微分と合成関数の微分}) \\
 &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{\cosh K}{\sinh K} \cdot \frac{1}{\cosh^2 K} \quad (\because (\tanh)' = 1/\cosh^2) \\
 &= -\frac{1}{2 \sinh K \cosh K} \\
 &= -\frac{1}{\sinh 2K} \quad (\because \cosh_addition_and_half_angle (2) \text{ を } x = 2K \text{ に適用})
 \end{aligned}$$

よって $\kappa'(K) = 2 - 2 \frac{dK^*}{dK} = 2 + \frac{2}{\sinh 2K}$ 。主張 1.4 (3) より $K > 0$ で $\sinh 2K > 0$ なので $\kappa'(K) > 2 > 0$ 。

(2) の証明。 $\sinh 2K_c = 1$ のとき $s_1 s_2 = \sinh^2 2K_c = 1$ なので、主張 21.6 の (1) $\iff$ (3) より $\kappa(K_c) = 0$ 。逆に $\kappa(K) = 0$ なら同じ同値から $\sinh^2 2K = 1$ 、 $\sinh 2K > 0$ より $\sinh 2K = 1 = \sinh 2K_c$ 、主張 21.2 (3) の単射性より $K = K_c$ 。

(3) の証明。(1) の式を微分して

$$\kappa''(K) = \frac{d}{dK} \left(2 + \frac{2}{\sinh 2K} \right) = -\frac{2}{\sinh^2 2K} \cdot 2 \cosh 2K = -\frac{4 \cosh 2K}{\sinh^2 2K}$$

(4) の証明。 $\sinh 2K_c = 1$ と主張 1.4 (2) より $\cosh 2K_c = \sqrt{2}$ ($\cosh > 0$)。主張 21.2 (1) を $x = 2K_c$ 、 $y = 2(K - K_c) \in [-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}]$ に適用すると

$$\begin{aligned}
 \sinh 2K &= \sinh(2K_c + 2(K - K_c)) \\
 &= \sinh 2K_c \cosh(2(K - K_c)) + \cosh 2K_c \sinh(2(K - K_c)) \quad (\because \cosh_addition_and_half_angle (1)) \\
 &= \cosh(2(K - K_c)) + \sqrt{2} \sinh(2(K - K_c)) \quad (\because \sinh 2K_c = 1, \cosh 2K_c = \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

主張 21.2 (3) より $\sinh$ は狭義単調増加なので、 $2K_c - 0.2 \leq 2K \leq 2K_c + 0.2$ のもとで $\sinh(2K_c - 0.2) \leq \sinh 2K \leq \sinh(2K_c + 0.2)$ であり、上の加法定理の式 ($2(K - K_c) = \pm 0.2$) から

$$\sinh(2K_c \pm 0.2) = \cosh 0.2 \pm \sqrt{2} \sinh 0.2$$

数値評価 $1.02006 \leq \cosh 0.2 \leq 1.02007$ 、 $0.201336 \leq \sinh 0.2 \leq 0.201337$ 、 $1.414213 \leq \sqrt{2} \leq 1.414214$ を使うと

$$\begin{aligned}
 \sinh 2K &\geq \cosh 0.2 - \sqrt{2} \sinh 0.2 \geq 1.02006 - 1.414214 \cdot 0.201337 \geq 0.7353 \quad (\because \cosh_addition_and_half_angle (3) : \sinh \text{ の単調性と上の数値評価}) \\
 \sinh 2K &\leq \cosh 0.2 + \sqrt{2} \sinh 0.2 \leq 1.02007 + 1.414214 \cdot 0.201337 \leq 1.3048 \quad (\because \text{同上})
 \end{aligned}$$

したがって $\kappa'(K) = 2 + \frac{2}{\sinh 2K}$ は

$$2 + \frac{2}{1.3048} \leq \kappa'(K) \leq 2 + \frac{2}{0.7353}, \quad \text{すなわち} \quad 3.53 \leq \kappa'(K) \leq 4.72$$

κ'' については、 $t \mapsto \frac{4 \cosh t}{\sinh^2 t}$ が $t > 0$ で狭義単調減少であること

$$\frac{d}{dt} \frac{\cosh t}{\sinh^2 t} = \frac{\sinh^2 t \cdot \sinh t - \cosh t \cdot 2 \sinh t \cosh t}{\sinh^4 t} = \frac{\sinh^2 t - 2 \cosh^2 t}{\sinh^3 t} < 0 \quad (\because \sinh^2 t < \cosh^2 t < 2 \cosh^2 t, \sinh t > 0)$$

より、 $2K \geq 2K_c - 0.2$ での最大値をとればよい。 $\sinh(2K_c - 0.2) \geq 0.7353$ と $\cosh(2K_c - 0.2) = \sqrt{2} \cosh 0.2 - \sinh 0.2 \leq 1.414214 \cdot 1.02007 - 0.201336 \leq 1.2413$ より

$$|\kappa''(K)| = \frac{4 \cosh 2K}{\sinh^2 2K} \leq \frac{4 \cdot 1.2413}{0.7353^2} \leq 9.19$$

最後に $(\kappa'^2)' = 2\kappa'\kappa''$ なので $\left|(\kappa'^2)'\right| \leq 2 \cdot 4.72 \cdot 9.19 \leq 87$ 。

(5) の証明。(R4) を $F = \kappa$ に適用すると $\kappa(K) = \kappa(K) - \kappa(K_c) = \int_{K_c}^K \kappa'(t) dt$ であり、(4) より積分区間上で $3.53 \leq \kappa'(t) \leq 4.72$ なので、(R3) の単調性より

$$3.53 |K - K_c| \leq |\kappa(K)| \leq 4.72 |K - K_c| \leq 4.72 \cdot \frac{1}{10} = 0.472$$

同様に (R4) を $F = \kappa'^2$ に適用する。ここで

$$\begin{aligned} \kappa'(K_c) &= 2 + \frac{2}{\sinh 2K_c} \quad (\because (1) \text{ の } \kappa' \text{ の表示を } K = K_c \text{ で読む}) \\ &= 2 + \frac{2}{1} \quad (\because \sinh 2K_c = 1. \text{ 本主張の } K_c \text{ の定義}) \\ &= 4 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

に注意すると

$$|\kappa'(K)^2 - 16| = \left| \int_{K_c}^K (\kappa'^2)'(t) dt \right| \leq 87 |K - K_c| \leq 87 \cdot \frac{|\kappa(K)|}{3.53} \leq 24.7 |\kappa(K)|$$

□

主張 21.9 ($\frac{\partial \gamma}{\partial \kappa} = \frac{\sinh \kappa}{\sinh \gamma}$, $\left| \frac{\partial \gamma}{\partial \kappa} \right| \leq 1$). 主張 21.7 の等方な場合について、 $(\theta, \kappa) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ の関数

$$S(\theta, \kappa) := \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad \gamma(\theta, \kappa) := 2 \operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{S(\theta, \kappa)}\right)$$

を考える。このとき次が成り立つ。

- (1) $\sinh\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{S}$, $\cosh\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{1+S}$, $\sinh \gamma = 2\sqrt{S(1+S)}$, $\cosh \gamma = 1 + 2S$ 。
- (2) $\kappa \neq 0$ のとき $S > 0$ であり、 γ は κ について 2 回微分可能で $\frac{\partial \gamma}{\partial \kappa} = \frac{\sinh \kappa}{\sinh \gamma}$, $\frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2} = \frac{\cosh \kappa}{\sinh \gamma} - \frac{\sinh^2 \kappa \cosh \gamma}{\sinh^3 \gamma}$ 。
- (3) $\kappa \neq 0$ のとき $\left| \frac{\partial \gamma}{\partial \kappa} \right| \leq 1$ 。
- (4) $0 < \kappa_1 \leq \kappa_2$ のとき、 γ , $\frac{\partial \gamma}{\partial \kappa}$, $\frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2}$ はいずれも $[0, 2\pi] \times [\kappa_1, \kappa_2]$ 上の連続関数である。

証明. (1) の証明。主張 21.5 の Step 3 と同じ議論 ($\gamma \geq 0$ ゆえ $\sinh(\frac{\gamma}{2}) \geq 0$) で $\sinh(\frac{\gamma}{2}) = \sqrt{S}$ 。
主張 1.4 (2) と $\cosh > 0$ より $\cosh(\frac{\gamma}{2}) = \sqrt{1+S}$ 。残りは

$$\begin{aligned}\sinh \gamma &= 2 \sinh\left(\frac{\gamma}{2}\right) \cosh\left(\frac{\gamma}{2}\right) \quad (\because \cosh_addition_and_half_angle (2)) \\ &= 2\sqrt{S}\sqrt{1+S} \\ &= 2\sqrt{S(1+S)} \\ \cosh \gamma &= 1 + 2 \sinh^2\left(\frac{\gamma}{2}\right) \quad (\because \cosh_addition_and_half_angle (2)) \\ &= 1 + 2S \quad (\because \text{本主張 (1) の } \sinh(\frac{\gamma}{2}) = \sqrt{S})\end{aligned}$$

(2) の証明。 $\kappa \neq 0$ なら 主張 1.4 (3) より $\sinh^2(\frac{\kappa}{2}) > 0$ なので $S \geq \sinh^2(\frac{\kappa}{2}) > 0$ 。 θ を固定して κ で微分する。まず

$$\begin{aligned}\frac{\partial S}{\partial \kappa} &= 2 \sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \cdot \cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \quad (\because (\sinh)' = \cosh \text{ と合成関数の微分}) \\ &= \sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \sinh \kappa \quad (\because \cosh_addition_and_half_angle (2))\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}\frac{\partial \gamma}{\partial \kappa} &= 2 \cdot \operatorname{arcsinh}'(\sqrt{S}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{S}} \cdot \frac{\partial S}{\partial \kappa} \quad (\because \text{合成関数の微分と } (\sqrt{\cdot})' = \frac{1}{2\sqrt{\cdot}}) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{S+1}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{S}} \cdot \frac{1}{2} \sinh \kappa \quad (\because \cosh_addition_and_half_angle (4)) \\ &= \frac{\sinh \kappa}{2\sqrt{S(1+S)}} \\ &= \frac{\sinh \kappa}{\sinh \gamma} \quad (\because \text{本主張 (1)})\end{aligned}$$

もう一度微分すると

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2} &= \frac{\cosh \kappa \cdot \sinh \gamma - \sinh \kappa \cdot \cosh \gamma \cdot \frac{\partial \gamma}{\partial \kappa}}{\sinh^2 \gamma} \quad (\because \text{商の微分と } (\sinh)' = \cosh) \\ &= \frac{\cosh \kappa}{\sinh \gamma} - \frac{\sinh \kappa \cosh \gamma}{\sinh^2 \gamma} \cdot \frac{\sinh \kappa}{\sinh \gamma} \quad (\because \text{直前の式}) \\ &= \frac{\cosh \kappa}{\sinh \gamma} - \frac{\sinh^2 \kappa \cosh \gamma}{\sinh^3 \gamma}\end{aligned}$$

(3) の証明。 $S \geq \sinh^2(\frac{\kappa}{2})$ と $1+S \geq 1 + \sinh^2(\frac{\kappa}{2}) = \cosh^2(\frac{\kappa}{2})$ (主張 1.4 (2)) より

$$\begin{aligned}\sinh \gamma &= 2\sqrt{S(1+S)} \quad (\because \text{本主張 (1)}) \\ &\geq 2\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) \cosh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)} \quad (\because S \geq \sinh^2(\frac{\kappa}{2}), 1+S \geq \cosh^2(\frac{\kappa}{2})) \\ &= 2 \left| \sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \right| \cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \quad (\because \cosh > 0) \\ &= |\sinh \kappa| \quad (\because \cosh_addition_and_half_angle (2))\end{aligned}$$

$\sinh \gamma > 0$ ($S > 0$ より) なので $\left| \frac{\partial \gamma}{\partial \kappa} \right| = \frac{|\sinh \kappa|}{\sinh \gamma} \leq 1$ 。

(4) の証明。 $(\theta, \kappa) \in [0, 2\pi] \times [\kappa_1, \kappa_2]$ では $S(\theta, \kappa) \geq \sinh^2(\frac{\kappa_1}{2}) > 0$ である。 S は $\sinh, \sin$ の連続関数の和・積として連続、 $\sqrt{\cdot}$ は $[\sinh^2(\frac{\kappa_1}{2}), \infty)$ 上連続、 $\operatorname{arcsinh}$ は連続なので γ は連続。

(2) の 2 つの式はいずれも $\sinh \gamma \geq 2\sqrt{S} > 0$ を分母にもつ連続関数の四則で書けているので連続である。□

主張 21.10 ($0 \leq \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} \leq \frac{\theta^3}{48}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$)). 正弦・余弦は定義 1.22、定義 1.25 のものを用いる。

$c_0 := 1 - \frac{\pi^2}{24}$ とおく ($0.5887 \leq c_0 \leq 0.5888$)。 $\theta \in [0, \pi]$ について次が成り立つ。

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} \leq \frac{\theta^3}{48} \\ c_0 \frac{\theta}{2} &\leq \sin \frac{\theta}{2} \leq \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

証明. Step 1. $t \geq 0$ について $1 - \cos v \geq 0$ なので、(R4) を $F(t) = t - \sin t$ ($F' = 1 - \cos$ は連続) に適用し (R3) の単調性を使うと

$$\begin{aligned} t - \sin t &= \int_0^t (1 - \cos v) dv \quad (\because \text{(R4) を } F(t) = t - \sin t \text{ に適用}) \\ &\geq \int_0^t 0 dv \quad (\because 1 - \cos v \geq 0 \text{ と (R3) の単調性}) \\ &= 0 \quad (\because \text{零関数の積分}) \end{aligned}$$

Step 2. Step 1 より $u \geq 0$ で $u - \sin u \geq 0$ なので、(R4) を $F(t) = \sin t - t + \frac{t^3}{6}$ の導関数 $F'(t) = \cos t - 1 + \frac{t^2}{2}$ に対して 2 段階に使う。まず

$$\begin{aligned} \cos t - 1 + \frac{t^2}{2} &= \int_0^t (u - \sin u) du \quad (\because \text{(R4) と } (\cos t - 1 + t^2/2)' = t - \sin t) \\ &\geq \int_0^t 0 du \quad (\because \text{Step 1 と (R3) の単調性}) \quad (t \geq 0) \\ &= 0 \quad (\because \text{零関数の積分}) \end{aligned}$$

次に、これを被積分関数として

$$\begin{aligned} \sin t - t + \frac{t^3}{6} &= \int_0^t \left(\cos v - 1 + \frac{v^2}{2} \right) dv \quad (\because \text{(R4) と } (\sin t - t + t^3/6)' = \cos t - 1 + t^2/2) \\ &\geq \int_0^t 0 dv \quad (\because \text{直前の非負性と (R3) の単調性}) \quad (t \geq 0) \\ &= 0 \quad (\because \text{零関数の積分}) \end{aligned}$$

すなわち $t \geq 0$ で $t - \frac{t^3}{6} \leq \sin t \leq t$ 。

Step 3. $t = \frac{\theta}{2}$ とおくと $\theta \in [0, \pi]$ より $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ であり、Step 2 から

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} \quad (\because \text{Step 1 を } t = \theta/2 \text{ に適用}) \\ &\leq \frac{1}{6} \left(\frac{\theta}{2} \right)^3 \quad (\because \text{Step 2 を } t = \theta/2 \text{ に適用}) \\ &= \frac{\theta^3}{48} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

また

$$\begin{aligned}
\sin \frac{\theta}{2} &\geq \frac{\theta}{2} - \frac{1}{6} \left(\frac{\theta}{2} \right)^3 & (\because \text{Step 2}) \\
&= \frac{\theta}{2} \left(1 - \frac{1}{6} \left(\frac{\theta}{2} \right)^2 \right) & (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\
&\geq \frac{\theta}{2} \left(1 - \frac{1}{6} \cdot \frac{\pi^2}{4} \right) & (\because 0 \leq \frac{\theta}{2} \leq \frac{\pi}{2}) \\
&= c_0 \frac{\theta}{2} & (\because c_0 = 1 - \pi^2/24 \text{ の定義と } \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

c_0 の数値評価は $9.8696 \leq \pi^2 \leq 9.8697$ より $1 - \frac{9.8697}{24} \leq c_0 \leq 1 - \frac{9.8696}{24}$ すなわち $0.5887 \leq c_0 \leq 0.5888$ 。 $\square$

主張 21.11 ($\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \theta^2/4}} = 2 \operatorname{arcsinh}(\frac{\pi}{2\delta})$). 非負実数の平方根は 定義 1.6 を用いる。

$\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ と $a \in \mathbb{R}_{>0}$ について次が成り立つ。

- (1) $\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \theta^2/4}} = 2 \operatorname{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)$
- (2) $y \in \mathbb{R}_{>0}$ について $\log(2y) \leq \operatorname{arcsinh}(y) \leq \log(2y) + \frac{1}{4y^2}$ 。とくに (1) と合わせて $2 \log \frac{\pi}{\delta} \leq \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \theta^2/4}} \leq 2 \log \frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2}$ 。
- (3) $\int_0^\pi \frac{d\theta}{(\delta^2 + a^2\theta^2/4)^{3/2}} \leq \frac{2}{a\delta^2}$

証明. (1) の証明。 $F(\theta) := 2 \operatorname{arcsinh}\left(\frac{\theta}{2\delta}\right)$ とおくと

$$\begin{aligned}
F'(\theta) &= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\theta}{2\delta}\right)^2 + 1}} \cdot \frac{1}{2\delta} & (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (4) と合成関数の微分}) \\
&= \frac{1}{\delta} \cdot \frac{2\delta}{\sqrt{\theta^2 + 4\delta^2}} & (\because \delta > 0 \text{ より } \sqrt{\frac{\theta^2 + 4\delta^2}{4\delta^2}} = \frac{\sqrt{\theta^2 + 4\delta^2}}{2\delta}) \\
&= \frac{2}{\sqrt{\theta^2 + 4\delta^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{\delta^2 + \theta^2/4}}
\end{aligned}$$

F' は $[0, \pi]$ 上連続 (分母は $\geq \delta > 0$) なので (R4) より

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \theta^2/4}} = F(\pi) - F(0) = 2 \operatorname{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right) - 0$$

(2) の証明。主張 21.2 (4) の $\operatorname{arcsinh}(y) = \log(y + \sqrt{y^2 + 1})$ について、 $y > 0$ のとき

$$2y \leq y + \sqrt{y^2 + 1} \leq 2y + \frac{1}{2y}$$

が成り立つ (左は $\sqrt{y^2 + 1} \geq y$ 、右は $\left(y + \frac{1}{2y}\right)^2 = y^2 + 1 + \frac{1}{4y^2} \geq y^2 + 1$ と両辺の正値性から $\sqrt{y^2 + 1} \leq y + \frac{1}{2y}$)。 $\log$ は狭義単調増加なので

$$\operatorname{arcsinh}(y) \leq \log\left(2y + \frac{1}{2y}\right) \quad (\because \text{直前の不等式と } \log \text{ の狭義単調増加性})$$

$$= \log(2y) + \log\left(1 + \frac{1}{4y^2}\right) \quad (\because \log(ab) = \log a + \log b)$$

$$\leq \log(2y) + \frac{1}{4y^2} \quad (\because \log(1+x) \leq x)$$

($\log(1+x) \leq x$ は (R4) より $x - \log(1+x) = \int_0^x \left(1 - \frac{1}{1+v}\right) dv \geq 0$ ($x \geq 0$) から従う。) $y = \frac{\pi}{2\delta}$ を (1) へ代入すると $\log(2y) = \log \frac{\pi}{\delta}$ 、 $\frac{1}{4y^2} = \frac{\delta^2}{\pi^2}$ なので、両辺を 2 倍して主張の評価を得る。

(3) の証明。 $G(\theta) := \frac{\theta}{\delta^2 \sqrt{\delta^2 + a^2 \theta^2 / 4}}$ とおくと

$$\begin{aligned} G'(\theta) &= \frac{\sqrt{\delta^2 + \frac{a^2 \theta^2}{4}} - \theta \cdot \frac{a^2 \theta / 4}{\sqrt{\delta^2 + \frac{a^2 \theta^2}{4}}}}{\delta^2 \left(\delta^2 + \frac{a^2 \theta^2}{4}\right)} \quad (\because \text{商の微分}) \\ &= \frac{\left(\delta^2 + \frac{a^2 \theta^2}{4}\right) - \frac{a^2 \theta^2}{4}}{\delta^2 \left(\delta^2 + \frac{a^2 \theta^2}{4}\right)^{3/2}} \\ &= \frac{1}{\left(\delta^2 + \frac{a^2 \theta^2}{4}\right)^{3/2}} \end{aligned}$$

G' は $[0, \pi]$ 上連続なので (R4) より

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{d\theta}{\left(\delta^2 + \frac{a^2 \theta^2}{4}\right)^{3/2}} &= G(\pi) - G(0) \\ &= \frac{\pi}{\delta^2 \sqrt{\delta^2 + \frac{a^2 \pi^2}{4}}} \\ &\leq \frac{\pi}{\delta^2 \cdot \frac{a\pi}{2}} \quad (\because \sqrt{\delta^2 + \frac{a^2 \pi^2}{4}} \geq \sqrt{\frac{a^2 \pi^2}{4}} = \frac{a\pi}{2}) \\ &= \frac{2}{a\delta^2} \end{aligned}$$

□

主張 21.12 ($2 \log \frac{\pi}{\delta} \leq \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \sin^2(\theta/2)}} \leq 2 \log \frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$). 平方根と正弦は 定義 1.6、定義 1.22 を用いる。

主張 21.10 の $c_0 = 1 - \frac{\pi^2}{24}$ を用いて

$$B := \frac{\pi^2}{12 c_0 (1 + c_0)}$$

とおく ($B \leq 0.88$)。このとき $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ について

$$2 \log \frac{\pi}{\delta} \leq \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \sin^2(\theta/2)}} \leq 2 \log \frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$$

** これが対数発散の源である。 ** 右辺・左辺の差は $\delta \rightarrow +0$ で有界に留まるので、この積分は $2 \log \frac{1}{\delta}$ との差が有界に留まる。

証明. Step 0 (積分が定まること)。 $\delta > 0$ なので被積分関数は $[0, \pi]$ 上連続 (分母は $\geq \delta > 0$) である。以下 $p := \frac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 、 $s := \sin p$ 、 $D_1 := \sqrt{\delta^2 + p^2}$ 、 $D_2 := \sqrt{\delta^2 + s^2}$ と略記する。

Step 1 (下からの評価)。主張 21.10 より $s \leq p$ なので $D_2 \leq D_1$ 、したがって各点で $\frac{1}{D_2} \geq \frac{1}{D_1}$ 。(R3) の単調性と 主張 21.11 (2) より

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{D_2} \geq \int_0^\pi \frac{d\theta}{D_1} = \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \theta^2/4}} \geq 2 \log \frac{\pi}{\delta}$$

Step 2 (差の各点評価)。 $p \in (0, \frac{\pi}{2}]$ について

$$\begin{aligned} \frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} &= \frac{D_1 - D_2}{D_1 D_2} \\ &= \frac{D_1^2 - D_2^2}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} \quad (\because D_1 - D_2 = \frac{D_1^2 - D_2^2}{D_1 + D_2}, D_1 + D_2 > 0) \\ &= \frac{p^2 - s^2}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} \quad (\because D_1^2 - D_2^2 = (\delta^2 + p^2) - (\delta^2 + s^2) = p^2 - s^2) \\ &= \frac{(p-s)(p+s)}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} \end{aligned}$$

分子は 主張 21.10 の $0 \leq p-s \leq \frac{p^3}{6}$ と $p+s \leq 2p$ より $(p-s)(p+s) \leq \frac{p^3}{6} \cdot 2p = \frac{p^4}{3}$ 。分母は $D_1 \geq p$ 、 $D_2 \geq s \geq c_0 p$ (主張 21.10) より

$$D_1 D_2 (D_1 + D_2) \geq p \cdot c_0 p \cdot (p + c_0 p) = c_0 (1 + c_0) p^3$$

したがって

$$0 \leq \frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} \leq \frac{p^4/3}{c_0(1+c_0)p^3} = \frac{p}{3c_0(1+c_0)} = \frac{\theta}{6c_0(1+c_0)}$$

($p=0$ では $\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} = 0$ なので、この評価は $[0, \frac{\pi}{2}]$ 全体で成り立つ。)

Step 3 (積分して足す)。(R3) の単調性と (R4) より

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \left(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} \right) d\theta &\leq \int_0^\pi \frac{\theta}{6c_0(1+c_0)} d\theta \quad (\because \text{Step 2 と (R3)}) \\ &= \frac{1}{6c_0(1+c_0)} \cdot \frac{\pi^2}{2} \quad (\because \text{(R4) を } F(\theta) = \frac{\theta^2}{2} \text{ に適用}) \\ &= \frac{\pi^2}{12c_0(1+c_0)} \\ &= B \end{aligned}$$

よって (R3) の線型性と 主張 21.11 (2) より

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{D_2} = \int_0^\pi \frac{d\theta}{D_1} + \int_0^\pi \left(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} \right) d\theta \leq \left(2 \log \frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2} \right) + B$$

数値評価は 主張 21.10 の $c_0 \geq 0.5887$ より $12c_0(1+c_0) \geq 12 \cdot 0.5887 \cdot 1.5887 \geq 11.22$ 、 $B \leq \frac{9.8697}{11.22} \leq 0.88$ 。□

定理 21.13 ($\left| G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{|\kappa|} \right| \leq \frac{6}{5} \quad (0 < |\kappa| \leq \frac{1}{2})$)。主張 21.9 の $\gamma(\theta, \kappa)$ に対して

$$G(\kappa) := \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta, \kappa) d\theta$$

とおく (定理 19.19 の自由エネルギーの積分項そのものであり、等方な場合 主張 21.7 より κ だけの関数になる)。このとき $0 < |\kappa| \leq \frac{1}{2}$ なる κ について G は 2 回微分可能で

$$|G'(\kappa)| \leq \frac{1}{2}, \quad \left| G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{|\kappa|} \right| \leq \frac{6}{5}$$

が成り立つ。とくに $G''(\kappa) \rightarrow +\infty$ ($\kappa \rightarrow 0$) であり、その発散は $\frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{|\kappa|}$ と有界な差しかもたない ** 対数発散 ** である。

証明. Step 0 ($\kappa > 0$ としてよいこと)。主張 21.5 より $\gamma(\theta, -\kappa) = \gamma(\theta, \kappa)$ なので、被積分関数が一致することから $G(-\kappa) = G(\kappa)$ (すべての実数 κ)。ここから $\kappa < 0$ の場合を $\kappa > 0$ の場合に帰着できることを、合成関数の微分で明示しておく。 $\kappa < 0$ のとき $-\kappa > 0$ なので、後述の Step 1 により G は $-\kappa$ で 2 回微分可能である。 $G(\kappa) = G(-\kappa)$ の右辺は $\kappa \mapsto -\kappa$ と G の合成なので、合成関数の微分より G は κ でも微分可能で $G'(\kappa) = -G'(-\kappa)$ 。この等式の右辺をもう一度 κ で微分すると、同じく合成関数の微分より $-(-1)G''(-\kappa) = G''(-\kappa)$ なので $G''(\kappa) = G''(-\kappa)$ 。したがって $G''(-\kappa) = G''(\kappa)$ かつ $|G'(-\kappa)| = |G'(\kappa)|$ 。 $\log \frac{1}{|\kappa|}$ も偶関数なので、以下 $0 < \kappa \leq \frac{1}{2}$ とする。 $\delta := \sinh(\frac{\kappa}{2}) > 0$ とおくと 主張 21.2 (3)(5) より $0 < \delta \leq \sinh \frac{1}{4} \leq 0.2527$ 。

Step 1 (微分と積分の交換)。主張 21.9 (4) より γ と $\partial_\kappa \gamma$ と $\partial_\kappa^2 \gamma$ は $[0, 2\pi] \times [\kappa_1, \kappa_2]$ ($0 < \kappa_1 \leq \kappa \leq \kappa_2$) 上連続なので、(R5) を 2 回適用して

$$G'(\kappa) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial \gamma}{\partial \kappa} d\theta, \quad G''(\kappa) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2} d\theta$$

主張 21.9 (3) の $|\partial_\kappa \gamma| \leq 1$ と (R3) より $|G'(\kappa)| \leq \frac{1}{4\pi} \cdot 2\pi \cdot 1 = \frac{1}{2}$ 。

Step 2 (半区間への折り返し)。 $\sin(\frac{2\pi-\theta}{2}) = \sin(\pi - \frac{\theta}{2}) = \sin \frac{\theta}{2}$ なので、 $\partial_\kappa^2 \gamma$ は $\theta \mapsto 2\pi - \theta$ で不変である。(R6) を $u(t) = 2\pi - t$ に適用すると $\int_\pi^{2\pi} = \int_0^\pi$ となるので

$$G''(\kappa) = \frac{1}{4\pi} \left(\int_0^\pi + \int_\pi^{2\pi} \right) \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2} d\theta$$

Step 3 (2 つの項に分ける)。主張 21.9 (1)(2) より $\sinh \gamma = 2\sqrt{S(1+S)}$ 、 $\cosh \gamma = 1 + 2S$ 、 $S = \delta^2 + \sin^2(\frac{\theta}{2})$ なので

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2} d\theta &= \int_0^\pi \left(\frac{\cosh \kappa}{\sinh \gamma} - \frac{\sinh^2 \kappa \cosh \gamma}{\sinh^3 \gamma} \right) d\theta \quad (\because \text{gamma_derivatives_in_kappa (2)}) \\ &= \frac{\cosh \kappa}{2} J - T \quad (\because \text{(R3) の線型性}) \\ J &:= \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S(1+S)}}, \quad T := \int_0^\pi \frac{\sinh^2 \kappa \cosh \gamma}{\sinh^3 \gamma} d\theta \end{aligned}$$

Step 4 (J の評価)。まず各点で

$$\begin{aligned}
0 &\leq \frac{1}{\sqrt{S}} - \frac{1}{\sqrt{S(1+S)}} = \frac{1}{\sqrt{S}} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+S}}\right) \quad (\because 1+S \geq 1 \text{ より } \sqrt{1+S} \geq 1) \\
&= \frac{1}{\sqrt{S}} \cdot \frac{\sqrt{1+S}-1}{\sqrt{1+S}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{S}} \cdot \frac{S}{\sqrt{1+S}(\sqrt{1+S}+1)} \quad (\because \sqrt{1+S}-1 = \frac{S}{\sqrt{1+S}+1}) \\
&\leq \frac{1}{\sqrt{S}} \cdot \frac{S}{2} \quad (\because \sqrt{1+S} \geq 1 \text{ より分母} \geq 2) \\
&= \frac{\sqrt{S}}{2} \\
&\leq \frac{\sqrt{\delta^2+1}}{2} \quad (\because \sin^2 \leq 1) \\
&= \frac{\cosh(\frac{\kappa}{2})}{2} \quad (\because \cosh_sinh_basic_properties (2))
\end{aligned}$$

この各点評価は ** 符号のついた片側の評価 ** である。(R3) の単調性を $[0, \pi]$ 上で使うと

$$0 \leq \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} - J \leq \frac{\pi}{2} \cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)$$

主張 21.12 を $\delta = \sinh(\frac{\kappa}{2})$ に適用すると $\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} = 2 \log \frac{\pi}{\delta} + R_0$ ($0 \leq R_0 \leq \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$) なので、 $R := J - 2 \log \frac{\pi}{\delta}$ とおくと $R = R_0 - \left(\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} - J\right)$ であり、** 上界は R_0 だけから、下界は直前の評価だけから来る ** (両者を足す必要はない) :

$$J = 2 \log \frac{\pi}{\delta} + R, \quad -\frac{\pi}{2} \cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \leq R \leq \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$$

したがって $|R| \leq \max \left\{ \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B, \frac{\pi}{2} \cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \right\}$ である。 $\kappa \leq \frac{1}{2}$ のとき $\cosh(\frac{\kappa}{2}) \leq \cosh \frac{1}{4} \leq 1.0315$ 、 $\delta \leq 0.2527$ 、 $9.8696 \leq \pi^2$ 、 $\pi \leq 3.1416$ なので

$$|R| \leq \max \left\{ \frac{2 \cdot 0.2527^2}{9.8696} + 0.88, \frac{3.1416}{2} \cdot 1.0315 \right\} \leq \max \{0.0130 + 0.88, 1.6203\} \leq 1.621$$

Step 5 (T の評価)。主張 21.9 (1) より $\frac{\cosh \gamma}{\sinh^3 \gamma} = \frac{1+2S}{8(S(1+S))^{3/2}}$ であり、 $1+2S \leq 2(1+S)$ と $(1+S)^{3/2} \geq 1+S$ より

$$\begin{aligned}
0 &\leq \frac{\cosh \gamma}{\sinh^3 \gamma} = \frac{1+2S}{8S^{3/2}(1+S)^{3/2}} \quad (\because \text{gamma_derivatives_in_kappa (1)}) \\
&\leq \frac{2(1+S)}{8S^{3/2}(1+S)} \quad (\because 1+2S \leq 2(1+S) \text{ と } (1+S)^{3/2} \geq 1+S) \\
&= \frac{1}{4S^{3/2}}
\end{aligned}$$

主張 21.10 より $\sin(\frac{\theta}{2}) \geq c_0 \frac{\theta}{2}$ なので $S \geq \delta^2 + \frac{c_0^2 \theta^2}{4}$ 、したがって (R3) と 主張 21.11 (3) ($a = c_0$) より

$$\begin{aligned}
T &\leq \frac{\sinh^2 \kappa}{4} \int_0^\pi \frac{d\theta}{S^{3/2}} \quad (\because \text{直前の各点評価と (R3) の単調性}) \\
&\leq \frac{\sinh^2 \kappa}{4} \int_0^\pi \frac{d\theta}{\left(\delta^2 + \frac{c_0^2 \theta^2}{4}\right)^{3/2}} \quad (\because \text{(R3) の単調性}) \\
&\leq \frac{\sinh^2 \kappa}{4} \cdot \frac{2}{c_0 \delta^2} \quad (\because \text{closed_form_log_integral (3)}) \\
&= \frac{4\delta^2 \cosh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{4} \cdot \frac{2}{c_0 \delta^2} \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2) : } \sinh \kappa = 2\delta \cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)) \\
&= \frac{2 \cosh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{c_0} \\
&\leq \frac{2 \cdot 1.0315^2}{0.5887} \quad (\because \kappa \leq \frac{1}{2} \text{ と elementary_sine_bounds の } c_0 \geq 0.5887) \\
&\leq 3.614
\end{aligned}$$

Step 6 ($\log \frac{\pi}{\delta}$ を $\log \frac{1}{\kappa}$ に直す)。主張 21.2 (5) を $t = \frac{\kappa}{2}$ に適用すると $\frac{\kappa}{2} \leq \delta \leq \frac{\kappa}{2} \cosh \frac{\kappa}{2}$ なので

$$\frac{2}{\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)} \leq \frac{\kappa}{\delta} \leq 2, \quad \text{すなわち} \quad -\log \cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \leq \log \frac{\kappa}{\delta} - \log 2 \leq 0$$

$\rho := \log \frac{\kappa}{\delta} - \log 2$ とおくと $\log \frac{\pi}{\delta} = \log \frac{1}{\kappa} + \log(2\pi) + \rho$ であり、 $|\rho| \leq \log \cosh \frac{1}{4} \leq 0.0310$ 。よって

$$\cosh \kappa \log \frac{\pi}{\delta} - \log \frac{1}{\kappa} = (\cosh \kappa - 1) \log \frac{1}{\kappa} + \cosh \kappa (\log(2\pi) + \rho)$$

右辺第 1 項は、主張 21.2 (2)(5) より $\cosh \kappa - 1 = 2 \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) \leq 2 \left(\frac{\kappa}{2} \cosh \frac{1}{4}\right)^2 \leq 0.532 \kappa^2$ であり、 $\kappa^2 \log \frac{1}{\kappa}$ は $(0, \frac{1}{2}]$ 上単調増加 (導関数 $\kappa (2 \log \frac{1}{\kappa} - 1) > 0$) で最大値は $\frac{1}{4} \log 2 \leq 0.1733$ なので

$$0 \leq (\cosh \kappa - 1) \log \frac{1}{\kappa} \leq 0.532 \cdot 0.1733 \leq 0.093$$

第 2 項は $\cosh \kappa \leq \cosh \frac{1}{2} \leq 1.1277$ 、 $\log(2\pi) \leq 1.8380$ より

$$|\cosh \kappa (\log(2\pi) + \rho)| \leq 1.1277 (1.8380 + 0.0310) \leq 2.108$$

以上を合わせると

$$\left| \cosh \kappa \log \frac{\pi}{\delta} - \log \frac{1}{\kappa} \right| \leq 0.093 + 2.108 = 2.201$$

Step 7 (総合)。Step 2~6 より

$$\begin{aligned}
2\pi G''(\kappa) &= \frac{\cosh \kappa}{2} J - T \quad (\because \text{Step 2, Step 3}) \\
&= \frac{\cosh \kappa}{2} \left(2 \log \frac{\pi}{\delta} + R \right) - T \quad (\because \text{Step 4}) \\
&= \cosh \kappa \log \frac{\pi}{\delta} + \frac{\cosh \kappa}{2} R - T
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
\left| 2\pi G''(\kappa) - \log \frac{1}{\kappa} \right| &\leq \left| \cosh \kappa \log \frac{\pi}{\delta} - \log \frac{1}{\kappa} \right| + \frac{\cosh \kappa}{2} |R| + |T| \quad (\because \text{三角不等式}) \\
&\leq 2.201 + \frac{1.1277}{2} \cdot 1.621 + 3.614 \quad (\because \text{Step 4, Step 5, Step 6}) \\
&\leq 2.201 + 0.915 + 3.614 \\
&= 6.730
\end{aligned}$$

$2\pi \geq 6.2831$ で割ると

$$\left| G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{\kappa} \right| \leq \frac{6.730}{6.2831} \leq 1.08 \leq \frac{6}{5}$$

最後に $\kappa \rightarrow 0$ で $\log \frac{1}{|\kappa|} \rightarrow +\infty$ なので $G''(\kappa) \geq \frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{|\kappa|} - \frac{6}{5} \rightarrow +\infty$. $\square$

定理 21.14 ($\left| \frac{d^2 f}{dK^2} - \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|\kappa(K)|} \right| \leq 45$). 定理 19.19 の自由エネルギーを、等方な場合 $K_1 = K_2 = K \in \mathbb{R}_{>0}$ について

$$f(K) := \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K) + G(\kappa(K))$$

と書く (定理 21.13 の G と 主張 21.8 の $\kappa(K)$)。このとき $0 < |K - K_c| \leq \frac{1}{10}$ なる K について f は 2 回微分可能で

$$\left| \frac{d^2 f}{dK^2}(K) - \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|\kappa(K)|} \right| \leq 45$$

が成り立つ。さらに 主張 21.8 (5) より $3.53|K - K_c| \leq |\kappa(K)| \leq 4.72|K - K_c|$ なので

$$\left| \frac{d^2 f}{dK^2}(K) - \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} \right| \leq 49$$

も成り立つ。とくに

$$\frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} - 49 \leq \frac{d^2 f}{dK^2}(K) \leq \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} + 49$$

であり、** 臨界点 $K \rightarrow K_c$ ($\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ 、主張 21.6) で $\frac{d^2 f}{dK^2} \rightarrow +\infty$ が係数 $\frac{8}{\pi}$ の対数発散として起こる ** :

$$\lim_{K \rightarrow K_c} \frac{\frac{d^2 f}{dK^2}(K)}{\log \frac{1}{|K - K_c|}} = \frac{8}{\pi}$$

証明. Step 1 (f が主張の形に書けること)。定理 19.19 の自由エネルギーは $\frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta) d\theta$ であり、 $K_1 = K_2 = K$ のとき 主張 21.7 より $\gamma(\theta) = \gamma(\theta, \kappa(K))$ (主張 21.9 の記法) なので、積分項は $G(\kappa(K))$ に一致する。

Step 2 (第 1 項の 2 階微分)。 $\sinh 2K > 0$ なので

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dK} \left(\frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K) \right) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cosh 2K}{\sinh 2K} \quad (\because \log \text{ の微分と } (\sinh)' = \cosh) \\
&= \frac{\cosh 2K}{\sinh 2K} \\
\frac{d^2}{dK^2} \left(\frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K) \right) &= \frac{2 \sinh 2K \cdot \sinh 2K - \cosh 2K \cdot 2 \cosh 2K}{\sinh^2 2K} \quad (\because \text{商の微分}) \\
&= \frac{2 (\sinh^2 2K - \cosh^2 2K)}{\sinh^2 2K} \\
&= -\frac{2}{\sinh^2 2K} \quad (\because \cosh_sinh_basic_properties (2))
\end{aligned}$$

主張 21.8 (4) の $\sinh 2K \geq 0.7353$ より

$$\left| \frac{d^2}{dK^2} \left(\frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K) \right) \right| \leq \frac{2}{0.7353^2} \leq 3.70$$

Step 3 (第 2 項の 2 階微分)。 $0 < |K - K_c| \leq \frac{1}{10}$ のとき 主張 21.8 (2)(5) より $0 < |\kappa(K)| \leq 0.472 \leq \frac{1}{2}$ なので、定理 21.13 が適用できる。合成関数の微分より

$$\frac{d^2}{dK^2} G(\kappa(K)) = G''(\kappa(K)) \kappa'(K)^2 + G'(\kappa(K)) \kappa''(K)$$

第 2 項は 定理 21.13 の $|G'| \leq \frac{1}{2}$ と 主張 21.8 (4) の $|\kappa''| \leq 9.19$ より

$$|G'(\kappa(K)) \kappa''(K)| \leq \frac{9.19}{2} \leq 4.60$$

Step 4 (κ'^2 を 16 に置き換える誤差)。主張 21.8 (5) の $|\kappa'(K)^2 - 16| \leq 24.7|\kappa|$ と 定理 21.13 より

$$\begin{aligned}
|(\kappa'(K)^2 - 16) G''(\kappa)| &\leq 24.7 |\kappa| \left(\frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{|\kappa|} + \frac{6}{5} \right) \quad (\because \text{second_derivative_log_divergence}) \\
&= 24.7 \left(\frac{1}{2\pi} |\kappa| \log \frac{1}{|\kappa|} + \frac{6}{5} |\kappa| \right) \\
&\leq 24.7 \left(\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{e} + \frac{6}{5} \cdot 0.472 \right) \quad (\because |\kappa| \leq 0.472 \text{ と下記の } |\kappa| \log \frac{1}{|\kappa|} \leq \frac{1}{e}) \\
&\leq 24.7 (0.0586 + 0.5664) \\
&\leq 15.44
\end{aligned}$$

ここで $x \log \frac{1}{x}$ は $(0, 1]$ 上 $x = \frac{1}{e}$ で最大値 $\frac{1}{e}$ をとる (導関数 $\log \frac{1}{x} - 1$ の符号)。

Step 5 (主要項)。定理 21.13 より

$$\left| 16 G''(\kappa) - \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|\kappa|} \right| = 16 \left| G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{|\kappa|} \right| \leq 16 \cdot \frac{6}{5} = 19.2$$

Step 6 (総合)。Step 2~5 と三角不等式より

$$\begin{aligned}
\left| \frac{d^2 f}{dK^2} - \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|\kappa|} \right| &\leq \left| \frac{d^2}{dK^2} \left(\frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K) \right) \right| + |G' \kappa''| + |(\kappa'^2 - 16) G''| + \left| 16 G'' - \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|\kappa|} \right| \\
&\leq 3.70 + 4.60 + 15.44 + 19.2 \\
&= 42.94 \\
&\leq 45
\end{aligned}$$

Step 7 ($|K - K_c|$ による表示)。主張 21.8 (5) より $3.53 \leq \frac{|\kappa|}{|K - K_c|} \leq 4.72$ なので、 $\log$ の単調性より

$$\left| \log \frac{1}{|\kappa|} - \log \frac{1}{|K - K_c|} \right| = \left| \log \frac{|\kappa|}{|K - K_c|} \right| \leq \log 4.72 \leq 1.5518$$

したがって

$$\left| \frac{d^2 f}{dK^2} - \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} \right| \leq 45 + \frac{8}{\pi} \cdot 1.5518 \leq 45 + 3.96 \leq 49$$

Step 8 (極限)。 $K \rightarrow K_c$ のとき $\log \frac{1}{|K - K_c|} \rightarrow +\infty$ なので、Step 7 の評価の各辺を $\log \frac{1}{|K - K_c|} > 0$ で割ると

$$\left| \frac{\frac{d^2 f}{dK^2}}{\log \frac{1}{|K - K_c|}} - \frac{8}{\pi} \right| \leq \frac{49}{\log \frac{1}{|K - K_c|}} \xrightarrow{K \rightarrow K_c} 0$$

($|K - K_c| < e^{-1}$ なら分母は正である。) これが主張の極限であり、同時に $\frac{d^2 f}{dK^2} \rightarrow +\infty$ を与える。 $\square$

注意 21.15 (物理的な比熱 C との対応: $C = k_B K^2 \frac{d^2 f}{dK^2}$)。定理 21.14 は結合定数 K についての 2 階微分の発散を述べている。物理でいう比熱は温度についての 2 階微分だが、両者は次のように比例する。

定義 2.2 の $Z(J, J')$ において、等方な場合の結合定数を

$$K = \beta \mathcal{J}, \quad \beta := \frac{1}{k_B T}$$

と書く ($\mathcal{J}$ は相互作用の強さ、 T は絶対温度、 k_B は Boltzmann 定数。 $\mathcal{J}, k_B, T \in \mathbb{R}_{>0}$)。1 サイトあたりの内部エネルギー u と比熱 C は

$$u := -\frac{\partial}{\partial \beta} f(K), \quad C := \frac{\partial u}{\partial T}$$

で定義される (f は定理 21.14 の 1 サイトあたりの $\log Z$ の極限)。このとき

$$\begin{aligned} u &= -\mathcal{J} \frac{df}{dK} \quad (\because \frac{dK}{d\beta} = \mathcal{J} \text{ と合成関数の微分}) \\ \frac{\partial u}{\partial \beta} &= -\mathcal{J}^2 \frac{d^2 f}{dK^2} \quad (\because \text{もう一度 } \frac{dK}{d\beta} = \mathcal{J} \text{ を適用}) \\ \frac{d\beta}{dT} &= -\frac{1}{k_B T^2} = -k_B \beta^2 \quad (\because \beta = \frac{1}{k_B T} \text{ の微分}) \\ C &= \frac{\partial u}{\partial \beta} \cdot \frac{d\beta}{dT} \quad (\because \text{合成関数の微分}) = \left(-\mathcal{J}^2 \frac{d^2 f}{dK^2} \right) (-k_B \beta^2) = k_B (\beta \mathcal{J})^2 \frac{d^2 f}{dK^2} = k_B K^2 \frac{d^2 f}{dK^2} \end{aligned}$$

** したがって比熱 C は $\frac{d^2 f}{dK^2}$ の正の定数倍 (臨界点の近傍では $k_B K^2 \rightarrow k_B K_c^2 > 0$) であり、定理 21.14 はそのまま比熱の対数発散

$$C = k_B K^2 \frac{d^2 f}{dK^2} = k_B K^2 \left(\frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} + O \right), \quad |O| \leq 49$$

を意味する。 $**K = \beta\mathcal{J}$ は T の狭義単調減少関数なので、 $K \rightarrow K_c$ と $T \rightarrow T_c := \frac{\mathcal{J}}{k_B K_c}$ は同じことである。

なお $2K_c = \log(1 + \sqrt{2})$ (主張 21.8) なので $\frac{\mathcal{J}}{k_B T_c} = K_c = \frac{\log(1 + \sqrt{2})}{2}$ であり、これが Onsager の臨界温度である。