2 次元 Ising 模型の厳密解

目次

0 この論文について **3**
- 0.1 分配関数 5
- 0.2 固有値問題 5
- 0.3 熱力学極限 7
- 0.4 臨界点 7

I 数学的道具立て **7**

1 計算公式 **7**

2 線型空間の一般論 **67**

3 線型写像の exp **123**

4 行列と線型写像の対応と、対角行列の指数関数 **145**

5 $\exp(X)Y\exp(-X)=\exp(\mathrm{ad}(X))(Y)$ **の証明** **154**

6 Pauli 行列の積と、クロネッカー積の反交換 **171**

7 $\sinh,\cosh$ **のテイラー展開、可逆行列と共役写像**T_g **179**

8 トレース・エルミート行列・正定値性 **181**

9 半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式 **197**

10 等間隔点の平均の積分への収束 **199**

11 $\cosh,\sinh$ **の加法定理と、正弦およびそれを含む積分の評価** **205**

II 分配関数 **229**

12 転送行列による表示 **229**

13 ε **の固有値** $+1$ **の固有空間への射影と Jordan–Wigner 表示** **252**

III 固有値問題 **280**

14 離散 Fourier 変換による2×2 **行列**$A(\tilde{\theta}_\mu)$ **への帰着** **280**

15 $A(\tilde{\theta}_\mu)$ **の対角化と**$V^{(+)}$ **の指数表示** **334**

16 $V^{(+)}$ の固有値 **394**

17 $V^{(+)}$ の最大固有値に属する固有ベクトル **452**

IV　熱力学極限 **486**

18 $N \to \infty$ の極限と最大固有値$c(M)$ **486**

19 $M \to \infty$ の極限と閉形式 **505**

V　臨界点 **529**

20 臨界点K_c と$\frac{d^2 f}{dK^2}$ の対数発散 **529**

0　この論文について

概要 0.1 (この論文のゴール)**.** この論文のゴールは、二次元格子イジング模型の自由エネルギーの閉形式を解析し臨界点を厳密に得るというオンサーガーが 1944 年に示した方法を、数学的に一切の飛躍なく厳密に示すことである。

原著も含めほとんどの論文・解説書・教科書は、計算の過程や証明に何らかの物理的直感を前提とした飛躍があり、理論物理の世界においては基本的な結果であるにもかかわらず、数学者にとっては理解しづらいものになってしまっていた。

この論文では、計算対象を物理用語を使わず数学的対象として正確に定義し、計算の過程もできる限り飛ばさずに記述するよう努めた。そのため、興味関心と気骨さえあれば、高校生でも理解することが可能な内容になっている。代わりに長大な論文になってしまっていることをご容赦いただきたい。

また、全ての計算過程は、SageMath による数値計算による検証と、Lean による形式検証により、その精度を担保している。計算ミスは限りなく 0 に近いと自負しているので、安心して重要な部分だけを飛ばし読みしていただきたい。

オンサーガーの方法の手順は次の三つである。

- 2 次元 Ising 模型の分配関数 Z を用いて、この系の自由エネルギー $\log Z$ を表す（格子点 1 個あたりでは $\frac{1}{M_{\mathrm{col}}N_{\mathrm{row}}}\log Z$）。
- その熱力学極限（格子サイズ $M_{\mathrm{col}}, N_{\mathrm{row}} \to \infty$）における閉形式を表示する（Onsager の厳密解）。
- 閉形式を解析することで、臨界点を計算する。

閉形式は次である。


$$\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty}\frac{1}{M_{\mathrm{col}}N_{\mathrm{row}}}\log Z = \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta,$$

$$\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}\left(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta\right)$$

臨界点は次の条件で与えられる（$K_1 = K_2 = K$ のときは $\sinh 2K_c = 1$）。

$$\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$$

概要 0.2 (部と章の並び)**.** 数学的道具立てより後の章どうしの依存を次の図に示す。枠は部を、矢印は「矢印の元の章を、矢印の先の章が使う」を表す。ほかの矢印を辿って届く依存の矢印は省いた。数学的道具立てはすべての章が使うので、図には入れていない。



分配関数の二章と、固有値問題の初めの三章は一列に並ぶ。$V^{(+)}$ の固有値の章のあとで、流れは二つに分かれる。一つは $V^{(+)}$ の最大固有値に属する固有ベクトルの章であり、もう一つは $N \to \infty$ の極限の章である（W が実対称で正定値であることの証明が、$V^{(+)}$ の固有値の章で示す、$iK_1 H_1^{(+)}$ と $iK_2^* H_2$ が実対称であることを使う）。二つの流れは $M \to \infty$ の極限の章で合流する。

この論文は、数学的道具立てを先に置き、そのあとに分配関数・固有値問題・熱力学極限・臨界点の四つの部を置く。部と章の並びは次のとおりである。

- 数学的道具立て：計算公式、線型空間の一般論、線型写像の exp、行列と線型写像の対応と、対角行列の指数関数、$\exp(X)Y\exp(-X)=\exp(\mathrm{ad}(X))(Y)$ の証明、Pauli 行列の積と、クロネッカー積の反交換、$\sinh,\cosh$ のテイラー展開、可逆行列と共役写像 T_g、トレース・エルミート行列・正定値性、半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式、等間隔点の平均の積分への収束、$\cosh,\sinh$ の加法定理と、正弦およびそれを含む積分の評価
- 分配関数：転送行列による表示、ε の固有値 $+1$ の固有空間への射影と Jordan–Wigner 表示
- 固有値問題：離散 Fourier 変換による 2×2 行列 $A(\tilde{\theta}_\mu)$ への帰着、$A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化と $V^{(+)}$ の指数表示、$V^{(+)}$ の固有値、$V^{(+)}$ の最大固有値に属する固有ベクトル
- 熱力学極限：$N\to\infty$ の極限と最大固有値 $c(M)$、$M\to\infty$ の極限と閉形式
- 臨界点：臨界点 K_c と $\frac{d^2f}{dK^2}$ の対数発散

数学的道具立てより後の各章は、一つのゴールの式で終わる。以下に各章のゴールの式を挙げる。記号の定義はそれぞれの章で与える。ここでは $M:=M_{\mathrm{col}}$、$N:=N_{\mathrm{row}}$ と略記する。$T_{(V^{(+)})}$ は本文では三つの因子による共役の合成として定め、$V^{(+)}$ による共役 $X\mapsto V^{(+)}X\left(V^{(+)}\right)^{-1}$ と一致することを離散 Fourier 変換の章で示す。

0.1 分配関数

概要 0.3 (転送行列による表示)**.** 分配関数 Z が、Pauli 行列から作った $2^M\times 2^M$ 複素行列の積の N 乗のトレースで書けることを示す式である。

この章のゴールの式は次である（転送行列 V_1,V_2 による表示 $Z=\mathrm{tr}\left((V_1V_2)^N\right)$ に、V_1,V_2 の Pauli 行列による表示を代入した式)。

$$Z=\mathrm{tr}\left(\left(\exp\left(K_1\sum_{m=1}^{M}\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z\right)(2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(K_2^*\sum_{m=1}^{M}\sigma_m^x\right)\right)^N\right)$$

概要 0.4 (ε の固有値 $+1$ の固有空間への射影と Jordan–Wigner 表示)**.** ε の固有値 $+1$ の固有空間の上では、W が行列 $H_1^{(+)},H_2$ の指数関数の積 $V^{(+)}$ と一致することを示す式である。

この章のゴールの式は次である。

$$WP^{(+)}=V^{(+)}P^{(+)},\qquad P^{(+)}=\tfrac{1}{2}\left(I+\varepsilon\right),\qquad \varepsilon=\sigma_1^x\cdots\sigma_M^x,\qquad \mathcal{F}^{(+)}=\left\{x\in\mathbb{C}^{2^M}\;\middle|\;\varepsilon x=x\right\}=\mathrm{im}\,P^{(+)},$$

$$V^{(+)}=\exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)\left(2\sinh 2K_2\right)^{M/2}\exp\left(iK_2^*H_2\right)\exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right),$$

ここに現れる行列 $H_1^{(+)},H_2$ は次である。

$$H_1^{(+)}=\sum_{m=1}^{M-1}Y_mZ_{m+1}-Y_MZ_1,\qquad H_2=\sum_{m=1}^{M}Z_mY_m$$

0.2 固有値問題

概要 0.5 (離散 Fourier 変換による2×2 行列$A(\tilde{\theta}_\mu)$ への帰着)**.** $V^{(+)}$ による共役が、離散 Fourier 変換した行列の組 $(\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu)$ を 2×2 行列 $A(\tilde{\theta}_\mu)$ で写すことを示し、問題を M 個の 2×2 行列に帰着する式である。

この章のゴールの式は次である（$\mu\in\check{\mathcal{M}}=\{1,\dots,M\}$)。

$$\left(V^{(+)}\check{Z}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1},\ V^{(+)}\check{Y}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1}\right)=\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right)=\left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right)A(\tilde{\theta}_\mu)=\left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right)B_1(\tilde{\theta}_\mu)\,B_2\,B_1(\tilde{\theta}_\mu)$$

ここに現れる記号は次である。

$$\tilde{\theta}_\mu=\frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M},\qquad \check{Z}_\mu=\sum_{j=1}^{M}Z_j\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu),\qquad \check{Y}_\mu=\sum_{j=1}^{M}Y_j\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)$$

概要 0.6 ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化と$V^{(+)}$ の指数表示)**.** $A(\tilde{\theta}_\mu)$ の固有値が $\exp(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$ であることから、$V^{(+)}$ を定数倍を除いて行列 $\check{n}_\mu$ と単位行列の一次結合の指数関数で書けることを示す式である。

この章のゴールの式は次である（$\mu\in\check{\mathcal{M}}$。$\check{P}_\mu\in\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ は本文で成分を与える可逆行列で、$c\in\mathbb{C}^\times$ の値は次の章で決める)。

$$A(\tilde{\theta}_\mu)=\check{P}_\mu\begin{pmatrix}\lambda_{+,\mu}&0\\0&\lambda_{-,\mu}\end{pmatrix}\check{P}_\mu^{-1},\qquad \lambda_{\pm,\mu}=\exp\left(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right),$$

$$\gamma(\theta)=\operatorname{arccosh}\left(\cosh 2K_1\cosh 2K_2^*-\sinh 2K_1\sinh 2K_2^*\cos\theta\right),$$

$$\left(\check{\psi}_\mu^\dagger,\ \check{\psi}_\mu\right)=\left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right)\check{P}_\mu,\qquad \check{n}_\mu=\check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M+1-\mu},$$

$$V^{(+)}=c\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu-\tfrac{1}{2}I\right)\right)$$

概要 0.7 ($V^{(+)}$ の固有値)**.** 定数 c を決めて $V^{(+)}$ の固有値をすべて求め、最大の固有値は $\epsilon=(1,\dots,1)$ のときの $\Lambda_M^{(1/2)}$ だけであることを示す式である。

この章のゴールの式は次である（$\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$。前の章の c の値を一つ目の式で決める)。

$$V^{(+)}=(2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu-\tfrac{1}{2}I\right)\right),\qquad V^{(+)}\check{Q}_\epsilon=\check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon,$$

$$\max_\epsilon\check{\Lambda}_\epsilon=\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}=\Lambda_M^{(1/2)}=(2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right),\qquad \epsilon\neq(1,\dots,1)\Longrightarrow\check{\Lambda}_\epsilon<\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$$

ここに現れる記号は次である。

$$\check{Q}_\epsilon=\prod_{\mu=1}^{M}\left(\epsilon_\mu\check{n}_\mu+(1-\epsilon_\mu)\left(I-\check{n}_\mu\right)\right),\qquad \check{\Lambda}_\epsilon=(2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(\sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\right)\right)$$

概要 0.8 ($V^{(+)}$ の最大固有値に属する固有ベクトル)**.** $\mathrm{tr}(\varepsilon V^{(+)})>0$ から、最大の固有値に属する固有ベクトルが ε の固有値 $+1$ の固有空間 $\mathcal{F}^{(+)}$ に入ることを示す式である。

この章のゴールの式は次である。

$$\mathrm{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right)=\left(2\exp(-K_2)\cosh K_1\right)^M+\left(2\exp(K_2)\sinh K_1\right)^M>0\implies\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}\subseteq\mathcal{F}^{(+)}$$

ここに現れる記号は次である。

$$\varepsilon=\sigma_1^x\cdots\sigma_M^x,\qquad \check{Q}_{(1,\dots,1)}=\prod_{\mu=1}^{M}\check{n}_\mu,\qquad \mathcal{F}^{(+)}=\left\{x\in\mathbb{C}^{2^M}\ \middle|\ \varepsilon x=x\right\}$$

0.3 熱力学極限

概要 0.9 ($N \to \infty$ の極限と最大固有値$c(M)$)**.** Z を W の二次形式の上限 $c(M)$ で上下から挟み、$N \to \infty$ で $\frac{1}{MN}\log Z$ が $\frac{1}{M}\log c(M)$ に収束することを示す式である。

この章のゴールの式は次である。

$$W = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}, \qquad c(M) = \sup\left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^{2^M},\ \|x\| = 1 \right\},$$

$$c(M)^N \le Z \le 2^M c(M)^N, \qquad \lim_{N\to\infty} \frac{1}{MN}\log Z = \frac{1}{M}\log c(M)$$

概要 0.10 ($M \to \infty$ の極限と閉形式)**.** $c(M)$ を $\Lambda_M^{(1/2)}$ とその 2 倍で挟み、$M \to \infty$ で $\frac{1}{MN}\log Z$ の極限が積分で書いた閉形式になることを示す式である。

この章のゴールの式は次である。

$$c_+(M) = \sup\left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M},\ \|x\| = 1 \right\} = \Lambda_M^{(1/2)}, \qquad \Lambda_M^{(1/2)} \le c(M) \le 2\Lambda_M^{(1/2)},$$

$$\lim_{M\to\infty}\lim_{N\to\infty} \frac{1}{MN}\log Z = \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta$$

0.4 臨界点

概要 0.11 (臨界点K_c と $\frac{d^2 f}{dK^2}$ の対数発散)**.** 閉形式 $f(K)$ の二階導関数が、$\sinh 2K_c = 1$ で定まる K_c に近づくと $\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|}$ との差を 49 以内に保って発散することを示す式である。

この章のゴールの式は次である（$K_1 = K_2 = K$、$f(K)$ は前の章のゴールの式の極限の右辺、$0 < |K - K_c| \le \frac{1}{10}$)。

$$\sinh 2K_c = 1, \qquad \left| \frac{d^2 f}{dK^2}(K) - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|} \right| \le 49$$

部 I
数学的道具立て

1 計算公式

定義 1.1 (集合と代数構造の記号)**.** 自然数・整数・実数の集合そのものはこの論文では構成せず、既知の集合としてそれぞれ $\mathbf{N}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{R}$ と書く。演算を持たない集合の記号と、演算を持つ代数構造の記号を区別する。

$$\begin{aligned}
\mathbb{N} &:= (\mathbf{N}, +_{\mathbb{N}}, \cdot_{\mathbb{N}}, 0_{\mathbb{N}}, 1_{\mathbb{N}}, \le_{\mathbb{N}}), \\
\mathbb{Z} &:= (\mathbf{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}}, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}, \le_{\mathbb{Z}}), \\
\mathbb{R} &:= (\mathbf{R}, +_{\mathbb{R}}, \cdot_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \le_{\mathbb{R}}).
\end{aligned}$$

各演算と順序の所属は次のとおりである。

$$\begin{aligned}
&+_{\mathbb{N}}, \cdot_{\mathbb{N}} : \mathbf{N} \times \mathbf{N} \to \mathbf{N}, \\
&+_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}} : \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}, \\
&+_{\mathbb{R}}, \cdot_{\mathbb{R}} : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}, \\
&\quad \le_{\mathbb{N}} \subset \mathbf{N} \times \mathbf{N}, \qquad \le_{\mathbb{Z}} \subset \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}, \qquad \le_{\mathbb{R}} \subset \mathbf{R} \times \mathbf{R}.
\end{aligned}$$

$\mathbb{N}$ は自然数の半環、$\mathbb{Z}$ は整数環、$\mathbb{R}$ は順序体を表す。たとえば $n \in \mathbb{Z}$ は厳密には $n \in \mathbf{Z}$ の略記であり、計算式中の $a+b$ は所属が $a, b \in \mathbf{Z}$ なら $a +_{\mathbb{Z}} b$、所属が $a, b \in \mathbf{R}$ なら $a +_{\mathbb{R}} b$ の略記とする。積、零元、単位元についても同様に、所属する代数構造の添字を省略した略記である。

$\mathbb{Z}_{\geq k}$、$\mathbb{R}_{\geq 0}$ などは代数構造そのものではなく、その台集合から順序条件で切り出した部分集合の略記とする。たとえば

$$\mathbb{Z}_{\geq k} := \{n \in \mathbf{Z} \mid k \leq_{\mathbb{Z}} n\}, \qquad \mathbb{R}_{\geq 0} := \{x \in \mathbf{R} \mid 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} x\}.$$

複素数の台集合と演算を持つ構造 $\mathbb{C}$ はここでは定義せず、後の 定義 1.12 で $\mathbf{R}^2$ に加法と乗法を入れて定義する。

主張 1.2 (正の実数の二乗の一意性)**.** $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ について

$$a^2 = b^2 \iff a = b$$

証明. 両方向を別々に示すので、ここは一続きの式にしない。

$$a = b \Longrightarrow a^2 = b^2 \quad (\because \text{ 等しい実数を二乗しても等しい})$$

逆に $a^2 = b^2$ とする。

$$\begin{aligned}
(a-b)(a+b) &= a^2 - b^2 && (\because \text{ 2 乗の差の因数分解}) \\
&= 0 && (\because \ a^2 = b^2) \\
a > 0 \ \wedge \ b > 0 &\Longrightarrow a + b > 0 && (\because \text{ 正の実数の和は正}) \\
&\Longrightarrow a + b \neq 0 && (\because \text{ 正の実数は0 でない}) \\
(a-b)(a+b) = 0 \ \wedge \ a + b \neq 0 &\Longrightarrow a - b = 0 && (\because \ \mathbb{R} \text{ は整域}) \\
&\Longrightarrow a = b && (\because \text{ 両辺に} b \text{ を加える})
\end{aligned}$$

□

主張 1.3 (非負実数の平方根の存在と一意性)**.** $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について、

$$y \in \mathbb{R}_{\geq 0} \ \wedge \ y^2 = x$$

を満たす y がただ一つ存在する。

証明. ここで初めて非可算集合 $\mathbb{R}$ の完備性（上限性質）へ移行する。すなわち、以下では $\mathbb{R}$ が「上に有界で空でない部分集合が必ず上限（最小上界）をもつ順序体」であるという性質を使う。有理数体 $\mathbb{Q}$ はこの性質をもたない（$x = 2$ のとき $y^2 = 2$ なる $y \in \mathbb{Q}$ は存在しない）ので、存在の主張は $\mathbb{R}$ へ移行しなければ成り立たない。一方、一意性は順序体の代数だけで示せる。

一意性。$y_1, y_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ がともに $y_1^2 = x$、$y_2^2 = x$ を満たすとする。

$x = 0$ の場合と $x > 0$ の場合に分ける。

$x = 0$ のとき。

$$\begin{aligned}
y_1^2 &= x && (\because \ y_1 \text{ の仮定}) \\
&= 0 && (\because \text{ いまの場合分け})
\end{aligned}$$

であり、$\mathbb{R}$ は整域だから $y_1 = 0$ である。y_2 についても同じ議論で $y_2 = 0$ なので $y_1 = y_2$ である。

$x > 0$ のとき。まず $y_1 > 0$ である。実際 $y_1 = 0$ と仮定すると

$$\begin{aligned}
x &= y_1^2 && (\because \ y_1 \text{ の仮定}) \\
&= 0^2 && (\because \text{ 仮定 } y_1 = 0) \\
&= 0 && (\because \ 0 \text{ の冪})
\end{aligned}$$

となり $x > 0$ に矛盾する。$y_1 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ なので $y_1 > 0$ である。y_2 についても同じ議論で $y_2 > 0$ である。

$$\begin{aligned} y_1^2 &= x \quad (\because\ y_1 \text{ の仮定}) \\ &= y_2^2 \quad (\because\ y_2 \text{ の仮定}) \end{aligned}$$

と 主張 1.2（$a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ について $a^2 = b^2 \iff a = b$）より $y_1 = y_2$ である。

存在。$x = 0$ のときは $y := 0$ と置けば $y \geq 0$ であり、

$$\begin{aligned} y^2 &= 0^2 \quad (\because\ y \text{ の定め方}) \\ &= 0 \quad (\because\ 0 \text{ の冪}) \\ &= x \quad (\because\ \text{いまの場合分け}) \end{aligned}$$

を満たす。以下 $x > 0$ とし、

$$S := \left\{ s \in \mathbb{R}_{\geq 0} \,\middle|\, s^2 \leq x \right\} \subset \mathbb{R}$$

とおく。$0 \in S$ を確かめると、

$$\begin{aligned} 0^2 &= 0 \quad (\because\ 0 \text{ の冪}) \\ &\leq x \quad (\because\ x \in \mathbb{R}_{\geq 0}) \end{aligned}$$

より $S \neq \emptyset$。また $1 + x$ は S の上界である。実際、$s \in S$ かつ $s > 1 + x$ と仮定すると、

$$s > 1 + x \ \wedge\ 1 + x > 1 \Longrightarrow s > 1 \quad (\because\ \mathbb{R} \text{ の順序の推移律。 } 1 + x > 1 \text{ は } x > 0 \text{ による})$$

であり、

$$\begin{aligned} s^2 &= s \cdot s && (\because\ 2 \text{ 乗の定義}) \\ &> (1 + x) \cdot 1 && (\because\ s > 1 + x > 0 \text{ と } s > 1 > 0\text{、順序体の乗法の単調性}) \\ &= 1 + x && (\because\ 1 \text{ は乗法の単位元}) \\ &> x && (\because\ 1 > 0) \end{aligned}$$

となり $s^2 \leq x$ に矛盾する。よって S は空でなく上に有界であるから、$\mathbb{R}$ の上限性質により $y := \sup S \in \mathbb{R}$ が定まる。$0 \in S$ より $y \geq 0$。

この y について $y^2 = x$ を示す。三分律により $y^2 < x$、$y^2 > x$、$y^2 = x$ のいずれか一つが成り立つので、初めの 2 つが矛盾を導くことを示せばよい。

(a) $y^2 < x$ と仮定する。$\varepsilon := \min\left\{1,\ \dfrac{x - y^2}{2y + 1}\right\} \in \mathbb{R}$ とおく（$2y + 1 \geq 1 > 0$ なので商は定義され、$x - y^2 > 0$ より $\varepsilon > 0$）。

$$\begin{aligned} \varepsilon^2 &= \varepsilon \cdot \varepsilon \quad (\because\ 2 \text{ 乗の定義}) \\ &\leq 1 \cdot \varepsilon \quad (\because\ \varepsilon \leq 1,\ \varepsilon > 0\text{、順序体の乗法の単調性}) \\ &= \varepsilon \quad (\because\ 1 \text{ は乗法の単位元}) \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} (y + \varepsilon)^2 &= y^2 + 2y\varepsilon + \varepsilon^2 && (\because\ \text{分配律}) \\ &\leq y^2 + 2y\varepsilon + \varepsilon && (\because\ \varepsilon^2 \leq \varepsilon) \\ &= y^2 + (2y + 1)\varepsilon && (\because\ \text{分配律}) \\ &\leq y^2 + (2y + 1) \cdot \frac{x - y^2}{2y + 1} && \left(\because\ \varepsilon \leq \frac{x - y^2}{2y + 1},\ 2y + 1 > 0\right) \\ &= y^2 + (x - y^2) && (\because\ 2y + 1 \neq 0 \text{ による約分}) \\ &= x && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合性と逆元}) \end{aligned}$$

よって $y+\varepsilon \in S$ であり $y+\varepsilon > y = \sup S$ となって、y が S の上界であることに矛盾する。

(b) $y^2 > x$ と仮定する。

$$\begin{aligned} y^2 > x \ \wedge \ x > 0 &\Longrightarrow y^2 > 0 \quad (\because\ \mathbb{R} \text{ の順序の推移律}) \\ &\Longrightarrow y > 0 \quad (\because\ y \geq 0 \text{ と正実数の二乗の単射性}) \end{aligned}$$

$\delta := \dfrac{y^2 - x}{2y} \in \mathbb{R}_{>0}$ とおくと $\delta > 0$ である。また

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{y^2 - x}{2y} && (\because\ \delta \text{ の定め方}) \\ &< \frac{y^2}{2y} && (\because\ y^2 - x < y^2 \text{ と } 2y > 0) \\ &= \frac{y}{2} && (\because\ y \neq 0 \text{ による約分}) \\ &< y && (\because\ y > 0) \end{aligned}$$

なので $y - \delta \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、

$$\begin{aligned} (y-\delta)^2 &= y^2 - 2y\delta + \delta^2 && (\because\ \text{分配律}) \\ &\geq y^2 - 2y\delta && (\because\ \delta^2 \geq 0) \\ &= y^2 - 2y \cdot \frac{y^2 - x}{2y} && (\because\ \delta \text{ の定め方}) \\ &= y^2 - (y^2 - x) && (\because\ 2y \neq 0 \text{ による約分}) \\ &= x && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合性と逆元}) \end{aligned}$$

したがって $s \in S$ すなわち $s \geq 0,\ s^2 \leq x$ ならば $s^2 \leq x \leq (y-\delta)^2$ であり、$s \geq 0$ かつ $y - \delta > 0$ なので $s > y - \delta$ と仮定すると $s^2 > (y-\delta)^2$（正の数どうしの乗法の単調性）となって矛盾する。よって $s \leq y - \delta$ が全ての $s \in S$ について成り立ち、$y - \delta$ は S の上界である。しかし $y - \delta < y = \sup S$ であり、$\sup S$ が最小の上界であることに矛盾する。

以上より $y^2 = x$ であり、$y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ なので存在が示された。一意性と合わせて主張を得る。 □

定義 1.4 ($\sqrt{\cdot}$)**.** $\sqrt{\cdot}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ を次で定める。

$$x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

について、$y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ で

$$y \geq 0 \wedge y^2 = x$$

を満たすものがただ一つ存在する（主張 1.3)。

この y を用いて

$$\sqrt{x}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} := y$$

と定める。

定理 1.5 (負数 $\to \sqrt{\cdot}$)**.**

$$x \in \mathbb{R}_{<0}$$

$$x = -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$$

証明. 準備として $-x$ が平方根の定義の条件を満たすことを見る。

$$\begin{aligned} -x &> -0 \quad (\because\ x < 0 \text{ と加法の逆元による順序の反転}) \\ &= 0 \quad (\because\ 0 \text{ の加法の逆元は } 0) \end{aligned}$$

であり、とくに $-x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である。また、実数の平方は非負なので $(-x)^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である。したがって $y = -x$ は条件 $y \in \mathbb{R}_{\geq 0} \wedge y^2 = (-x)^2$ を満たす。この条件を満たす y はただ一つであり（主張 1.3)、それが $\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ である（定義 1.4)。よって

$$\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = -x \quad (\because\ \text{平方根の定義定義 1.4 と条件を満たす元の一意性主張 1.3})$$

である。以上を使って主張を示す。

$$\begin{aligned} -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= -(-x) \quad (\because\ \text{準備で得た等式}) \\ &= x \qquad (\because\ \text{加法の逆元の逆元はもとの元}) \end{aligned}$$

すなわち $x = -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ である。 □

定義 1.6 (行列の積の成分による定義)**.** $m, n, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$、$B \in \mathrm{Mat}(n, p, \mathbb{C})$ とする（$\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ は成分が 定義 1.12 の複素数である m 行 n 列の行列全体、$\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}) := \mathrm{Mat}(n, n, \mathbb{C})$)。積 $AB \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ を、成分ごとに

$$(AB)_{ik} := \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, B_{jk} \qquad (i \in \{1, \ldots, m\},\ k \in \{1, \ldots, p\})$$

で定める。右辺は n 個の複素数の有限和（定義 1.16）である。数ベクトル $a \in \mathbb{C}^n$ は n 行 1 列の行列とみなし、Aa も同じ式で定める。

定理 1.7 (行列の積は列ごとに作用する)**.** $m, n, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$、$b_1, \ldots, b_p \in \mathbb{C}^n$ とし、これらを列に並べた行列を $[\, b_1 \ \cdots \ b_p \,] \in \mathrm{Mat}(n, p, \mathbb{C})$ と書く（第 k 列の第 j 成分が $(b_k)_j$ である行列)。このとき

$$A\,[\, b_1 \ \cdots \ b_p \,] = [\, Ab_1 \ \cdots \ Ab_p \,]$$

が成り立つ。

証明. 両辺は同じ大きさの行列なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, p\}$ を取る。

$$\begin{aligned} (A\,[\, b_1 \ \cdots \ b_p \,])_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, ([\, b_1 \ \cdots \ b_p \,])_{jk} \quad (\because\ \text{行列の積の定義定義 1.6}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, (b_k)_j \qquad (\because\ \text{列に並べた行列の成分の定め方}) \\ &= (Ab_k)_i \qquad (\because\ \text{行列の積の定義定義 1.6 を } Ab_k \text{ へ適用}) \\ &= ([\, Ab_1 \ \cdots \ Ab_p \,])_{ik} \qquad (\because\ \text{列に並べた行列の成分の定め方}) \end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

定理 1.8 (行列の共役)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$B$ は正則とする。

$\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ の各元 A に対して $T_B(A) := BAB^{-1} \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ と定める（BAB^{-1} は $(BA)B^{-1}$ と読む)。このとき T_B は和とスカラー倍を保つ。すなわち

$$T_B(A + C) = T_B(A) + T_B(C), \qquad T_B(\alpha A) = \alpha\, T_B(A) \qquad (A, C \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}),\ \alpha \in \mathbb{C})$$

が成り立つ。

証明. 和を保つことと、スカラー倍を保つことを別々に示す。鎖が引く 4 つの主張（行列の積の分配の 2 つと、スカラー倍を積の外へ出す 2 つ）は、どれもその m, n, p をすべてこの主張の n として使う。

第一に、和を保つこと。$A, C \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して、

$$\begin{aligned} T_B(A + C) &= \big(B(A + C)\big)B^{-1} && (\because\ T_B \text{ の定義}) \\ &= (BA + BC)B^{-1} && (\because\ \text{主張 2.23}) \\ &= (BA)B^{-1} + (BC)B^{-1} && (\because\ \text{主張 2.24}) \\ &= T_B(A) + T_B(C) && (\because\ T_B \text{ の定義を 2 か所へ同時適用}) \end{aligned}$$

である。第二に、スカラー倍を保つこと。$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ と $\alpha \in \mathbb{C}$ に対して、

$$\begin{aligned} T_B(\alpha A) &= \big(B(\alpha A)\big)B^{-1} && (\because\ T_B \text{ の定義}) \\ &= \big(\alpha(BA)\big)B^{-1} && (\because\ \text{主張 2.19}) \\ &= \alpha\big((BA)B^{-1}\big) && (\because\ \text{主張 2.18}) \\ &= \alpha\, T_B(A) && (\because\ T_B \text{ の定義}) \end{aligned}$$

である。以上より T_B は和とスカラー倍を保つ。 □

主張 1.9 (行列の共役は有限和を保つ)**.** $n, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ は正則とし、T_B は 定理 1.8 の共役写像とする。$X_1, \ldots, X_r \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、有限和は 定義 2.5 による。このとき

$$T_B\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) = \sum_{j=1}^{r} T_B(X_j)$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で示す。$r = 1$ のとき

$$\begin{aligned} T_B\Big(\sum_{j=1}^{1} X_j\Big) &= T_B(X_1) && \big(\because\ \text{定義 2.5}\big) \\ &= \sum_{j=1}^{1} T_B(X_j) && \big(\because\ \text{定義 2.5 (項} T_B(X_j)\text{)}\ \big) \end{aligned}$$

である。r で成り立つと仮定すると、$X_1, \ldots, X_{r+1} \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について

$$
\begin{aligned}
T_B\Big(\sum_{j=1}^{r+1} X_j\Big) &= T_B\Big(\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + X_{r+1}\Big) && (\because \text{ 定義 2.5}) \\
&= T_B\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + T_B(X_{r+1}) && (\because \text{ 定理 1.8 の和を保つこと}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{r} T_B(X_j)\Big) + T_B(X_{r+1}) && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{j=1}^{r+1} T_B(X_j) && (\because \text{ 定義 2.5 (項} T_B(X_j)) \text{)}
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 1.10 (行列の共役は符号反転を保つ)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ は正則とし、T_B は 定理 1.8 の共役写像とする。$W \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、符号反転は 定義 1.94 による。このとき

$$T_B(-W) = -\,T_B(W)$$

が成り立つ。

証明. 鎖が引く 2 つの主張（符号反転を積の外へ出す 2 つ）は、どちらもその m, n, p をすべてこの主張の n として使う。

$$
\begin{aligned}
T_B(-W) &= \big(B(-W)\big)B^{-1} && (\because \text{ 定理 1.8 の } T_B \text{ の定義}) \\
&= \big(-(BW)\big)B^{-1} && (\because \text{ 主張 2.21}) \\
&= -\big((BW)B^{-1}\big) && (\because \text{ 主張 2.20}) \\
&= -\,T_B(W) && (\because \text{ 定理 1.8 の } T_B \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

□

主張 1.11 (行列の共役は差を保つ)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ は正則とし、T_B は 定理 1.8 の共役写像とする。$X, W \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、差は 定義 1.92 による。このとき

$$T_B(X - W) = T_B(X) - T_B(W)$$

が成り立つ。

証明.

$$
\begin{aligned}
T_B(X - W) &= T_B\big(X + (-W)\big) && \big(\because \text{ 主張 2.30 } (A \to X,\ B \to W)\big) \\
&= T_B(X) + T_B(-W) && \big(\because \text{ 定理 1.8 の和を保つこと } (A \to X,\ C \to -W)\big) \\
&= T_B(X) + \big(-\,T_B(W)\big) && \big(\because \text{ 主張 1.10}\big) \\
&= T_B(X) - T_B(W) && \big(\because \text{ 主張 2.30 } (A \to T_B(X),\ B \to T_B(W))\big)
\end{aligned}
$$

□

定義 1.12 (ℂの定義)**.** 定義 1.1 の実数の台集合と演算を使う。
$\mathbf{C} := \mathbf{R}^2$ を複素数の台集合とし、その上に以下の演算を入れた構造を $\mathbb{C}$ と書く。
和（成分ごと）

$$+_{\mathbb{C}} : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \to \mathbf{C}, \qquad (a, b) +_{\mathbb{C}} (c, d) := (a +_{\mathbb{R}} c,\ b +_{\mathbb{R}} d)$$

積

$$\cdot_{\mathbb{C}} : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \to \mathbf{C}, \qquad (a,b) \cdot_{\mathbb{C}} (c,d) := (a \cdot_{\mathbb{R}} c - b \cdot_{\mathbb{R}} d,\ a \cdot_{\mathbb{R}} d + b \cdot_{\mathbb{R}} c)$$

本論文で $\mathbb{C}$ に必要な構造はこの 2 つの演算だけである。和は指数関数の級数（主張 3.2）と絶対値の三角不等式（主張 1.75）で必要になる。

定義 1.13 ($\mathbb{R} \to \mathbb{C}$の包含写像)**.** $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ を

$$\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x) := (x, 0)$$

として定める。これを $\mathbb{R}$ から $\mathbb{C}$ への包含写像と呼ぶ。

略記として、$r \in \mathbb{R}$ について

$$r_{\mathbb{C}} := \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(r)$$

と書く。

定義 1.14 (-1倍)**.** $z \in \mathbb{C}$ について、

$$-z := (-1_{\mathbb{C}}) \cdot z$$

定義 1.15 (複素数の差)**.** $z, w \in \mathbb{C}$ について、差 $z - w \in \mathbb{C}$ を

$$z - w := z + (-w)$$

で定める。右辺の $-w$ は 定義 1.14、和は 定義 1.12 の和である。

定義 1.16 (複素数の有限和)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$z_1, \ldots, z_m \in \mathbb{C}$ について、有限和 $\sum_{j=1}^{m} z_j \in \mathbb{C}$ を m についての帰納法で

$$\sum_{j=1}^{1} z_j := z_1, \qquad \sum_{j=1}^{m+1} z_j := \Big(\sum_{j=1}^{m} z_j\Big) + z_{m+1}$$

と定める（左から順に足す)。和は 定義 1.12 の和である。

定義 1.17 (添字が 0 から始まる複素数の有限和)**.** $K \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$z_0, \ldots, z_K \in \mathbb{C}$ について、有限和 $\sum_{k=0}^{K} z_k \in \mathbb{C}$ を

$$\sum_{k=0}^{K} z_k := \sum_{j=1}^{K+1} z_{j-1}$$

と定める。右辺は 定義 1.16 の有限和（$m \to K+1$、j 番目の項を z_{j-1} とする）である。

主張 1.18 (複素数の零の有限和は零)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について $\sum_{j=1}^{m} 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}}$ が成り立つ。有限和は 定義 1.16、$0_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記である。

証明. m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき

$$\sum_{j=1}^{1} 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{ 定義 1.16})$$

m で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{m+1} 0_{\mathbb{C}} &= \Big(\sum_{j=1}^{m} 0_{\mathbb{C}}\Big) + 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.16}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} + 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= (0,0) + (0,0) && (\because \text{ 定義 1.13}) \\
&= (0+0,\ 0+0) && (\because \text{ 定義 1.12 の和}) \\
&= (0,0) && (\because \mathbb{R} \text{ で } 0+0=0) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.13})
\end{aligned}$$

□

定義 1.19 (実数の有限和)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$r_1, \ldots, r_m \in \mathbb{R}$ について、有限和 $\sum_{j=1}^{m} r_j \in \mathbb{R}$ を m についての帰納法で

$$\sum_{j=1}^{1} r_j := r_1, \qquad \sum_{j=1}^{m+1} r_j := \Big(\sum_{j=1}^{m} r_j\Big) + r_{m+1}$$

と定める（左から順に足す。定義 1.16 と同じ帰納法である）。和は $\mathbb{R}$ の和である。

主張 1.20 (実数の有限和の包含は包含の有限和に等しい)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$r_1, \ldots, r_m \in \mathbb{R}$ について

$$\sum_{j=1}^{m} (r_j)_{\mathbb{C}} = \Big(\sum_{j=1}^{m} r_j\Big)_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記、左辺の和は 定義 1.16 の有限和、右辺の和は 定義 1.19 の有限和である。

証明. m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{1} (r_j)_{\mathbb{C}} &= (r_1)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.16}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{1} r_j\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.19})
\end{aligned}$$

m で成り立つと仮定する。$r_1, \ldots, r_{m+1} \in \mathbb{R}$ について

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{m+1}(r_j)_{\mathbb{C}} &= \Big(\sum_{j=1}^{m}(r_j)_{\mathbb{C}}\Big) + (r_{m+1})_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.16}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{m} r_j\Big)_{\mathbb{C}} + (r_{m+1})_{\mathbb{C}} && (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{m} r_j,\ 0\Big) + (r_{m+1},\ 0) && (\because \text{定義 1.13 を各項へ}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{m} r_j + r_{m+1},\ 0+0\Big) && (\because \text{定義 1.12 の和}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{m+1} r_j,\ 0+0\Big) && (\because \text{定義 1.19}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{m+1} r_j,\ 0\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } 0+0=0) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{m+1} r_j\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.13})
\end{aligned}
$$

□

主張 1.21 (実数の和の包含は包含の和に等しい)**.** $a, b \in \mathbb{R}$ について

$$a_{\mathbb{C}} + b_{\mathbb{C}} = (a+b)_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記、左辺の和は 定義 1.12 の和、右辺の和は $\mathbb{R}$ の和である。

証明.

$$
\begin{aligned}
a_{\mathbb{C}} + b_{\mathbb{C}} &= (a,\ 0) + (b,\ 0) && (\because \text{定義 1.13 を 2 か所へ同時適用}) \\
&= (a+b,\ 0+0) && (\because \text{定義 1.12 の和}) \\
&= (a+b,\ 0) && (\because \mathbb{R} \text{ で } 0+0=0) \\
&= (a+b)_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.13})
\end{aligned}
$$

□

主張 1.22 (実数の差の有限和は有限和の差)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_m \in \mathbb{R}$ とする。有限和は 定義 1.19 による。このとき

$$\sum_{j=1}^{m}(a_j - b_j) = \Big(\sum_{j=1}^{m} a_j\Big) - \Big(\sum_{j=1}^{m} b_j\Big)$$

が成り立つ。

証明. m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{1}(a_j - b_j) &= a_1 - b_1 && \big(\because \text{定義 1.19}\big) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{1} a_j\Big) - \Big(\sum_{j=1}^{1} b_j\Big) && \big(\because \text{定義 1.19 を 2 か所へ同時適用}\big)
\end{aligned}
$$

である。m で成り立つと仮定し、$a_1, \ldots, a_{m+1}, b_1, \ldots, b_{m+1} \in \mathbb{R}$ を取る。$\alpha := \sum_{j=1}^{m} a_j$、$\beta := \sum_{j=1}^{m} b_j$ とおく（$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$）。

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{m+1}(a_j-b_j) &= \Big(\sum_{j=1}^{m}(a_j-b_j)\Big)+(a_{m+1}-b_{m+1}) && (\because \text{ 定義 1.19})\\
&= (\alpha-\beta)+(a_{m+1}-b_{m+1}) && (\because \text{ 帰納法の仮定})\\
&= (\alpha+a_{m+1})-(\beta+b_{m+1}) && (\because \mathbb{R} \text{ の和と差の計算})\\
&= \Big(\Big(\sum_{j=1}^{m}a_j\Big)+a_{m+1}\Big)-\Big(\Big(\sum_{j=1}^{m}b_j\Big)+b_{m+1}\Big) && (\because \alpha,\beta \text{ の置き方})\\
&= \Big(\sum_{j=1}^{m+1}a_j\Big)-\Big(\sum_{j=1}^{m+1}b_j\Big) && (\because \text{ 定義 1.19 を 2 か所へ同時適用})
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 1.23 (実数の符号反転の有限和は有限和の符号反転)**.** $m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$x_1,\dots,x_m\in\mathbb{R}$ とする。有限和は 定義 1.19 による。このとき

$$\sum_{j=1}^{m}(-x_j)=-\sum_{j=1}^{m}x_j$$

が成り立つ。

証明. m についての帰納法で示す。$m=1$ のとき

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{1}(-x_j) &= -x_1 && (\because \text{ 定義 1.19 } (r_j\to -x_j))\\
&= -\sum_{j=1}^{1}x_j && (\because \text{ 定義 1.19 を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

である。m で成り立つと仮定し、$x_1,\dots,x_{m+1}\in\mathbb{R}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{m+1}(-x_j) &= \Big(\sum_{j=1}^{m}(-x_j)\Big)+(-x_{m+1}) && (\because \text{ 定義 1.19 } (r_j\to -x_j))\\
&= \Big(-\sum_{j=1}^{m}x_j\Big)+(-x_{m+1}) && (\because \text{ 帰納法の仮定})\\
&= -\Big(\Big(\sum_{j=1}^{m}x_j\Big)+x_{m+1}\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } (-a)+(-b)=-(a+b)\ (a\to\textstyle\sum_{j=1}^{m}x_j,\ b\to x_{m+1}))\\
&= -\sum_{j=1}^{m+1}x_j && (\because \text{ 定義 1.19 を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 1.24 (実数の共通の因子は有限和の外へ出せる)**.** $m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c\in\mathbb{R}$、$x_1,\dots,x_m\in\mathbb{R}$ とする。有限和は 定義 1.19 による。このとき

$$\sum_{j=1}^{m}c\,x_j=c\sum_{j=1}^{m}x_j$$

が成り立つ。

証明. m についての帰納法で示す。$m=1$ のとき

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{1} c\,x_j &= c\,x_1 && \big(\because \text{ 定義 1.19 } (r_j \to c\,x_j)\big)\\ &= c\sum_{j=1}^{1} x_j && \big(\because \text{ 定義 1.19 を右辺から左辺へ}\big)\end{aligned}$$

である。m で成り立つと仮定し、$x_1,\dots,x_{m+1}\in\mathbb{R}$ を取る。

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{m+1} c\,x_j &= \Big(\sum_{j=1}^{m} c\,x_j\Big) + c\,x_{m+1} && \big(\because \text{ 定義 1.19 } (r_j \to c\,x_j)\big)\\ &= c\Big(\sum_{j=1}^{m} x_j\Big) + c\,x_{m+1} && \big(\because \text{ 帰納法の仮定}\big)\\ &= c\Big(\Big(\sum_{j=1}^{m} x_j\Big) + x_{m+1}\Big) && \big(\because \mathbb{R} \text{ の分配法則 } ca+cb=c(a+b)\ \big(a\to\textstyle\sum_{j=1}^{m} x_j,\ b\to x_{m+1}\big)\big)\\ &= c\sum_{j=1}^{m+1} x_j && \big(\because \text{ 定義 1.19 を右辺から左辺へ}\big)\end{aligned}$$

である。 □

主張 1.25 (非負の実数の有限和は各項以上)**.** $m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a_1,\dots,a_m\in\mathbb{R}$ がすべての $j\in\{1,\dots,m\}$ で $a_j\geq 0$ を満たすとする。有限和は 定義 1.19 による。このとき、すべての $k\in\{1,\dots,m\}$ について

$$\sum_{j=1}^{m} a_j \geq a_k$$

が成り立つ。

証明. m についての帰納法で示す（各 m で、すべての $k\in\{1,\dots,m\}$ についての主張を示す)。$m=1$ のとき $k=1$ であり

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{1} a_j &= a_1 && \big(\because \text{ 定義 1.19}\big)\\ &= a_k && \big(\because\ k=1\big)\end{aligned}$$

だから $\sum_{j=1}^{1} a_j \geq a_k$ である。m で成り立つと仮定し、$a_1,\dots,a_{m+1}\in\mathbb{R}$ がすべて 0 以上であるとして、$k\in\{1,\dots,m+1\}$ を取る。$k\leq m$ のとき

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{m+1} a_j &= \Big(\sum_{j=1}^{m} a_j\Big) + a_{m+1} && \big(\because \text{ 定義 1.19}\big)\\ &\geq \Big(\sum_{j=1}^{m} a_j\Big) + 0 && \big(\because\ a_{m+1}\geq 0 \text{ の両辺に同じ実数を足す}\big)\\ &= \sum_{j=1}^{m} a_j && \big(\because\ 0 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の和の単位元}\big)\\ &\geq a_k && \big(\because \text{ 帰納法の仮定（}k\leq m\text{）}\big)\end{aligned}$$

である。$k = m+1$ のとき、$a_1, \ldots, a_m$ はすべて 0 以上であり、$m \geq 1$ なので $1 \in \{1, \ldots, m\}$ である。よって

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{m} a_j &\geq a_1 \quad (\because \text{ 帰納法の仮定（}a_1, \ldots, a_m \text{ について、} k \to 1\text{）}) \\ &\geq 0 \quad (\because \text{ 仮定} a_1 \geq 0)\end{aligned}$$

であり

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{m+1} a_j &= \Big(\sum_{j=1}^{m} a_j\Big) + a_{m+1} && (\because \text{ 定義 1.19}) \\ &\geq 0 + a_{m+1} && (\because \textstyle\sum_{j=1}^{m} a_j \geq 0 \text{ の両辺に同じ実数を足す}) \\ &= a_{m+1} && (\because \ 0 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の和の単位元}) \\ &= a_k && (\because \ k = m+1)\end{aligned}$$

である。 □

定義 1.26 (実数の族の最大値)**.** 集合 S と、S の元 i ごとに一つの実数 $x_i \in \mathbb{R}$ を与える族 $(x_i)_{i \in S}$ について、実数 $m \in \mathbb{R}$ が族 $(x_i)_{i \in S}$ の最大値であるとは、次の二つが成り立つことをいう。

$$(1) \quad \text{ある } i_0 \in S \text{ について } x_{i_0} = m, \qquad (2) \quad \text{すべての } i \in S \text{ について } x_i \leq m$$

順序 $\leq$ は $\mathbb{R}$ の順序である。

主張 1.27 (実数の族の最大値は一つしかない)**.** 集合 S 上の実数の族 $(x_i)_{i \in S}$ について、$m, m' \in \mathbb{R}$ がどちらも 定義 1.26 の意味で族 $(x_i)_{i \in S}$ の最大値ならば、$m = m'$ である。

証明. $x_{i_0} = m$ となる $i_0 \in S$ と、$x_{i'_0} = m'$ となる $i'_0 \in S$ を取る。

$$i_0,\ i'_0 \in S \text{ が取れる} \qquad (\because \ m, m' \text{ それぞれについて 定義 1.26 の } (1))$$

$$\begin{aligned}m &= x_{i_0} \quad (\because \ i_0 \text{ の取り方}) \\ &\leq m' \quad (\because \ m' \text{ について 定義 1.26 (2) を } i = i_0 \text{ で使う})\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}m' &= x_{i'_0} \quad (\because \ i'_0 \text{ の取り方}) \\ &\leq m \quad (\because \ m \text{ について 定義 1.26 (2) を } i = i'_0 \text{ で使う})\end{aligned}$$

である。よって

$$m = m' \qquad (\because \text{ 上の二本の鎖の } m \leq m' \text{ と } m' \leq m \text{ に } \mathbb{R} \text{ の順序の反対称律を使う})$$

である。 □

定義 1.28 (実数の族の最大値の記号 max)**.** 集合 S 上の実数の族 $(x_i)_{i \in S}$ が 定義 1.26 の意味の最大値をもつとき、その最大値を

$$\max_{i \in S} x_i \in \mathbb{R}$$

と書く。最大値は 主張 1.27 により一つしかないので、この記号は一つの実数を指す。S が文脈から分かるときは $\max_i x_i$ とも書く。

主張 1.29 (実数の積の包含は包含の積に等しい)**.** $a, b \in \mathbb{R}$ について

$$a_{\mathbb{C}}\, b_{\mathbb{C}} = (ab)_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記、左辺の積は 定義 1.12 の積である。

証明.

$$\begin{aligned}
a_{\mathbb{C}}\, b_{\mathbb{C}} &= (a,0)\,(b,0) && (\because \text{ 定義 1.13})\\
&= (ab - 0\cdot 0,\ a\cdot 0 + 0\cdot b) && (\because \text{ 定義 1.12 の積})\\
&= (ab - 0,\ 0 + 0) && (\because \mathbb{R} \text{ で } x\cdot 0 = 0 \text{ と } 0\cdot x = 0\,(\mathbb{R} \text{ は体定義 1.1}) \text{ を 3 箇所へ適用})\\
&= (ab,\ 0) && (\because \mathbb{R} \text{ で } x - 0 = x \text{ と } 0 + 0 = 0)\\
&= (ab)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.13})
\end{aligned}$$

□

定義 1.30 ($\sqrt{-1}$)**.**

$$\sqrt{-1} := \sqrt{-1_{\mathbb{C}}}$$

定義 1.31 ($\mathbb{C}$の実部/虚部)**.**

$$x, y \in \mathbb{R},\ (x, y) \in \mathbb{C}$$

$$Re : \mathbb{C} \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x$$

$$Im : \mathbb{C} \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto y$$

を定め、$Re(z)$、$Im(z)$ をそれぞれ z の実部、虚部と呼ぶ。

定義 1.32 (単位円)**.** 定義 1.12 の台集合上で

$$C_{\text{unit}} := \{(x, y) \in \mathbb{C} \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

C_{unit} を単位円と呼ぶ。

定義 1.33 (円弧の定義)**.** 定義 1.32 の点について、

$$P := (x, y),\ Q := (x', y') \in C_{\text{unit}}$$

について、齋藤微積分命題 2.1.3 (1) を満たす実数 $l(PQ)$ がただ一つ存在し、それを弧 PQ の長さと呼ぶ。

主張 1.34 (非零実数対の単位円への正規化)**.** 定義 1.32 と 定義 1.4 を用いる。任意の $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ に対し、

$$rx_c = x, \quad ry_c = y, \quad r \in \mathbb{R}_{>0}, \quad (x_c, y_c) \in C_{\text{unit}}$$

を満たす $r \in \mathbb{R}_{>0}$ と $(x_c, y_c) \in \mathbb{R}^2$ が一意に存在する。

証明. $(x, y) \neq (0, 0)$ なので $x \neq 0$ または $y \neq 0$ である。$x \neq 0$ のとき

$$\begin{aligned}
x^2 + y^2 &\geq x^2 && \left(\because\ y^2 \geq 0 \text{ (実数の平方は非負)}\right)\\
&> 0 && \left(\because\ x \neq 0 \text{ (非零実数の平方は正)}\right)
\end{aligned}$$

$y \neq 0$ のときも x と y を入れ替えた同じ二行で $x^2 + y^2 > 0$ である。よって

$$r := \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める。

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 && (\because\ r \text{ の定義と正の平方根の平方。定義 1.4}) \\ &> 0 && (\because\ \text{上の場合分けの結論}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r &\neq 0 && (\because\ 0^2 = 0 \neq r^2) \\ r &> 0 && (\because\ r \geq 0 \text{ (定義 1.4) かつ} r \neq 0) \end{aligned}$$

であるから、

$$x_c := \frac{x}{r} \in \mathbb{R}, \qquad y_c := \frac{y}{r} \in \mathbb{R}$$

と定められる。このとき

$$\begin{aligned} rx_c &= r \cdot \frac{x}{r} && (\because\ x_c \text{ の定義}) \\ &= x && (\because\ r > 0 \text{ なので約分できる}) \\ ry_c &= r \cdot \frac{y}{r} && (\because\ y_c \text{ の定義}) \\ &= y && (\because\ r > 0 \text{ なので約分できる}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_c^2 + y_c^2 &= \left(\frac{x}{r}\right)^2 + \left(\frac{y}{r}\right)^2 && (\because\ x_c, y_c \text{ の定義}) \\ &= \frac{x^2 + y^2}{r^2} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &= \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} && (\because\ r \text{ の定義と正の平方根の平方。定義 1.4}) \\ &= 1 && (\because\ x^2 + y^2 > 0 \text{ なので約分できる}) \end{aligned}$$

であり、定義 1.32 より $(x_c, y_c) \in C_{\text{unit}}$ だから存在する。別の $r' \in \mathbb{R}_{>0}$ と $(x'_c, y'_c) \in C_{\text{unit}}$ が条件を満たすなら

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (r'x'_c)^2 + (r'y'_c)^2 && (\because\ \text{条件} r'x'_c = x,\ r'y'_c = y) \\ &= (r')^2\big((x'_c)^2 + (y'_c)^2\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &= (r')^2 && (\because\ (x'_c, y'_c) \in C_{\text{unit}} \text{ の定義式} (x'_c)^2 + (y'_c)^2 = 1\text{。定義 1.32}) \end{aligned}$$

である。したがって

$$\begin{aligned} r' &= \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ r' \geq 0 \text{ かつ} (r')^2 = x^2 + y^2 \text{ を満たすものはただ一つ。主張 1.3、定義 1.4}) \\ &= r && (\because\ r \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x'_c &= \frac{x}{r'} && (\because\ \text{条件} r'x'_c = x \text{ の両辺を} r' > 0 \text{ で割る}) \\ &= \frac{x}{r} && (\because\ r' = r) \\ &= x_c && (\because\ x_c \text{ の定義}) \\ y'_c &= \frac{y}{r'} && (\because\ \text{条件} r'y'_c = y \text{ の両辺を} r' > 0 \text{ で割る}) \\ &= \frac{y}{r} && (\because\ r' = r) \\ &= y_c && (\because\ y_c \text{ の定義}) \end{aligned}$$

であり一意である。 □

定義 1.35 ($\mathbb{C} \to C_{\text{unit}}$)**.** 定義 1.12 と 定義 1.32、主張 1.34 を用いる。$c_{\text{unit}} : \mathbb{C} \setminus \{(0,0)\} \to C_{\text{unit}}$ を以下のように定める。

$$\forall (x, y) \in \mathbb{C} \setminus \{(0,0)\}$$

について、上の存在一意性で定まる $r, (x_c, y_c)$ を用いて

$$c_{\text{unit}}(x, y) := (x_c, y_c)$$

と定める。

定義 1.36 (arcsin の定義)**.** 定義 1.12、定義 1.32、定義 1.33、定義 1.4 の記号を用いる。

$$A := (1, 0) \in \mathbb{C}$$

- i) $\arcsin : \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\} \to \mathbb{R}$ を以下のように定める。$y \in \mathbb{R},\ 0 \leq y \leq 1$ について、$P := (\sqrt{1-y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}, y) \in C_{\text{unit}}$ とおき、

  $$\arcsin(y) := l(AP)$$

  と定める。$y' \in \mathbb{R},\ -1 \leq y' < 0$ について、

  $$\arcsin(y') := -\arcsin(-y')$$

  と定める。

主張 1.37 (arcsin の値域・狭義単調増加・全単射・連続)**.** 定義 1.36 の $\arcsin : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ について次が成り立つ（$\mathbb{R}$ を使うのは、弧の長さ $l(AP)$ と π が実数だからである）。

- 値域: 任意の $y \in [-1, 1]$ について $-\pi/2 \leq \arcsin(y) \leq \pi/2$。
- 狭義単調増加: $y_1, y_2 \in [-1, 1]$、$y_1 < y_2$ ならば $\arcsin(y_1) < \arcsin(y_2)$。
- 全単射: 任意の $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ について、$\arcsin(y) = \theta$ を満たす $y \in [-1, 1]$ がただ一つ存在する。
- 連続: 任意の $y_0 \in [-1, 1]$ と $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ に対し、$\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在して、$|y - y_0| < \delta$ を満たす任意の $y \in [-1, 1]$ について $|\arcsin(y) - \arcsin(y_0)| < \varepsilon$。

証明. 準備。$f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ を 定義 1.36 の第一の式 $f(y) := l(AP)$ とおく。齋藤微積分命題 2.1.5 を f に適用すると、f は狭義単調増加で、$f([0, 1]) = [0, \pi/2]$ である（外部文献に委ねるのはこの二点だけである）。像が $[0, \pi/2]$ なので $f(0) \geq 0$ であり、$f(y_*) = 0$ を満たす $y_* \in [0, 1]$ がある。

$$\begin{aligned} f(0) &\leq f(y_*) && (\because\ 0 \leq y_* \text{ と } f \text{ の単調増加}) \\ &= 0 && (\because\ y_* \text{ の取り方}) \end{aligned}$$

と $f(0) \geq 0$ より $f(0) = 0$ である。

値域。$0 \leq y \leq 1$ なら $\arcsin(y) = f(y) \in [0, \pi/2]$（定義 1.36 の第一の式）。$-1 \leq y' < 0$ なら $0 < -y' \leq 1$ であり、

$$\begin{aligned} \arcsin(y') &= -f(-y') && (\because\ \text{定義 1.36 の第二の式と第一の式}) \\ &< -f(0) && (\because\ 0 < -y' \text{ と } f \text{ の狭義単調増加}) \\ &= 0 && (\because\ f(0) = 0) \end{aligned}$$

かつ $\arcsin(y') = -f(-y') \geq -\pi/2$（$f(-y') \leq \pi/2$）。よって $\arcsin(y') \in [-\pi/2, 0)$ で、値域の主張を得る。

狭義単調増加。$y_1 < y_2$ とする。$0 \leq y_1$ なら $\arcsin(y_1) = f(y_1) < f(y_2) = \arcsin(y_2)$（$f$ の狭義単調増加）。$y_1 < 0 \leq y_2$ なら値域の段落より $\arcsin(y_1) < 0 \leq \arcsin(y_2)$。$y_1 < y_2 < 0$ なら $0 < -y_2 < -y_1 \leq 1$ であり、

$$\begin{aligned}\arcsin(y_1) &= -f(-y_1) && (\because \text{ 定義 1.36 の第二の式と第一の式})\\ &< -f(-y_2) && (\because -y_2 < -y_1 \text{ と } f \text{ の狭義単調増加})\\ &= \arcsin(y_2) && (\because \text{ 定義 1.36 の第二の式と第一の式})\end{aligned}$$

全単射。存在: $\theta \in [0, \pi/2]$ なら $f([0,1]) = [0, \pi/2]$ より $f(y) = \theta$ となる $y \in [0,1]$ があり、$\arcsin(y) = f(y) = \theta$。$\theta \in [-\pi/2, 0)$ なら $-\theta \in (0, \pi/2]$ なので $f(y_\theta) = -\theta$ となる $y_\theta \in [0,1]$ があり、$f(0) = 0 \neq -\theta$ より $y_\theta \in (0,1]$、すなわち $y' := -y_\theta \in [-1, 0)$ である。

$$\begin{aligned}\arcsin(y') &= -f(-y') && (\because \text{ 定義 1.36 の第二の式と第一の式})\\ &= -f(y_\theta) && (\because -y' = y_\theta)\\ &= \theta && (\because y_\theta \text{ の取り方})\end{aligned}$$

一意性: $y_1 \neq y_2$ なら、小さい方を y_1 とすれば狭義単調増加の段落より $\arcsin(y_1) < \arcsin(y_2)$ なので、値は異なる。

連続。$\theta_0 := \arcsin(y_0)$、$\theta_- := \max(\theta_0 - \varepsilon/2, -\pi/2)$、$\theta_+ := \min(\theta_0 + \varepsilon/2, \pi/2)$ とおく。値域の段落より $\theta_0 \in [-\pi/2, \pi/2]$ なので、max・min の定義より $-\pi/2 \leq \theta_- \leq \theta_0 \leq \theta_+ \leq \pi/2$ である。よって、全単射の段落より $\arcsin(y_\pm) = \theta_\pm$ となる $y_\pm \in [-1,1]$ がある。この不等式と狭義単調増加の段落（の対偶）より $y_- \leq y_0 \leq y_+$ である。δ を、$y_- < y_0$ なら $y_0 - y_-$、$y_0 < y_+$ なら $y_+ - y_0$、および 1 のうちの最小値とおくと $\delta > 0$ である。$|y - y_0| < \delta$ とする。下側: $y_- < y_0$ なら $y > y_0 - \delta \geq y_-$ なので $\arcsin(y) > \theta_-$（狭義単調増加）。$y_- = y_0$ なら $\theta_- = \theta_0$ なので $\theta_- = -\pi/2$（$\theta_0 - \varepsilon/2 < \theta_0$）であり、値域の段落より $\arcsin(y) \geq \theta_-$。上側: $y_0 < y_+$ なら $y < y_0 + \delta \leq y_+$ なので $\arcsin(y) < \theta_+$（狭義単調増加）。$y_+ = y_0$ なら $\theta_+ = \theta_0$ なので $\theta_+ = \pi/2$（$\theta_0 < \theta_0 + \varepsilon/2$）であり、値域の段落より $\arcsin(y) \leq \theta_+$。よって $\theta_0 - \varepsilon/2 \leq \theta_- \leq \arcsin(y) \leq \theta_+ \leq \theta_0 + \varepsilon/2$ であり、

$$\begin{aligned}|\arcsin(y) - \arcsin(y_0)| &= |\arcsin(y) - \theta_0| && (\because \theta_0 \text{ の定義})\\ &\leq \varepsilon/2 && (\because \theta_0 - \varepsilon/2 \leq \arcsin(y) \leq \theta_0 + \varepsilon/2)\\ &< \varepsilon && (\because \varepsilon > 0)\end{aligned}$$

□

定義 1.38 (sin の定義)**.** 主張 1.37 の全単射の項により、各 $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ について $\arcsin(y) = \theta$ を満たす $y \in [-1,1]$ がただ一つ存在する。その y を $\sin(\theta)$ と書き、$\sin : [-\pi/2, \pi/2] \to [-1,1]$ を 定義 1.36 の逆関数と呼ぶ。

主張 1.39 (arctan の引数は arcsin の定義域に入る)**.** 定義 1.4 を用いる。任意の $x \in \mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ を使うのは、この主張を使う arctan の定義域が実数全体であるため）について、$1 + x^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ であって平方根 $\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ が定まり、

$$-1 \leq \frac{x}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} \leq 1$$

が成り立つ。

証明. まず平方根の中身が平方根の定義域に入ることを示す。

$$\begin{aligned}1 + x^2 &\geq 1 && (\because x^2 \geq 0 \text{ と両辺への 1 の加法})\\ &> 0 && (\because 0 < 1)\end{aligned}$$

よって $1+x^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ で、$s := \sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}$ が定まり、非負平方根の定義（定義 1.4）から $s \geq 0$ かつ $s^2 = 1+x^2$ である。次に $s > 0$ を示す。

$$\begin{aligned} s^2 &= 1+x^2 && (\because \text{ 非負平方根の定義。定義 1.4}) \\ &> 0 && (\because \text{ 上の鎖}) \\ &= 0^2 \end{aligned}$$

なので $s \neq 0$（$s = 0$ なら $s^2 = 0^2$ となる）であり、$s \geq 0$ と合わせて $s > 0$ である。次に $|x|^2 \leq s^2$ を示す。

$$\begin{aligned} |x|^2 &= x^2 && (\because \text{ 実数の絶対値の二乗}) \\ &\leq 1+x^2 && (\because \ 0 \leq 1 \text{ と両辺への } x^2 \text{ の加法}) \\ &= s^2 && (\because \text{ 非負平方根の定義。定義 1.4}) \end{aligned}$$

これから $|x| \leq s$ が従う。仮に $s < |x|$ とすると、$|x| > s \geq 0$ なので

$$\begin{aligned} s^2 &= s \cdot s \\ &\leq s \cdot |x| && (\because \ s \geq 0 \text{ と } s < |x| \text{ の両辺に } s \text{ を掛ける}) \\ &< |x| \cdot |x| && (\because \ |x| > 0 \text{ と } s < |x| \text{ の両辺に } |x| \text{ を掛ける}) \\ &= |x|^2 \end{aligned}$$

となり、$|x|^2 \leq s^2$ に反する。よって $|x| \leq s$ である。以上を使って、

$$\begin{aligned} \left|\frac{x}{s}\right| &= \frac{|x|}{|s|} && (\because \ s \neq 0 \text{ と実数の絶対値の商}) \\ &= \frac{|x|}{s} && (\because \ s > 0 \text{ なので } |s| = s) \\ &\leq \frac{s}{s} && (\because \ |x| \leq s \text{ の両辺を正の数 } s \text{ で割る}) \\ &= 1 && (\because \ s \neq 0 \text{ による約分}) \end{aligned}$$

これを使って主張の二つの不等式を得る。

$$\begin{aligned} \frac{x}{s} &\leq \left|\frac{x}{s}\right| && (\because \text{ 実数の絶対値の定義 } |q| = \max(q, -q)) \\ &\leq 1 && (\because \text{ 上の鎖}) \\ -\frac{x}{s} &\leq \left|\frac{x}{s}\right| && (\because \text{ 実数の絶対値の定義 } |q| = \max(q, -q)) \\ &\leq 1 && (\because \text{ 上の鎖}) \end{aligned}$$

二つ目の不等式から次を得る。

$$\begin{aligned} -1 &\leq -\left(-\frac{x}{s}\right) && (\because \ -\frac{x}{s} \leq 1 \text{ の両辺に } -1 \text{ を掛けると向きが反転する}) \\ &= \frac{x}{s} && (\because \text{ 加法の逆元の逆元はもとの元}) \end{aligned}$$

一つ目の不等式と合わせて $-1 \leq x/s \leq 1$ である。 □

定義 1.40 (arctan の定義)**.** 定義 1.36、定義 1.4、主張 1.39 を使い、$x \in \mathbb{R}$ に対して

$$\arctan(x) := \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}}\right)$$

と定める。

定義 1.41 (cos の定義)**.** 定義 1.38 と 定義 1.4 を使い、$-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ に対して

$$\cos(\theta) := \sqrt{1-(\sin\theta)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$$

と定める。

主張 1.42 ($\cos(\arctan(x))$, $\sin(\arctan(x))$)**.** 主張 1.39 の引数の範囲を用いる。
定義 1.40、定義 1.38、定義 1.41、定義 1.4 の定義を用いる。
$x \in \mathbb{R}$ について、$-1 \leq x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq 1$ であるから、

$$\begin{aligned}
\cos(\arctan(x)) &= \cos\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right) && (\because \text{ arctan の定義})\\
&= \sqrt{1-\left(\sin\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right)\right)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ cos の定義})\\
&= \sqrt{1-\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ sin は arcsin の逆関数})\\
&= \sqrt{1-\frac{x^2}{\left(\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 商の二乗は二乗の商})\\
&= \sqrt{1-\frac{x^2}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 非負の平方根の二乗はもとの数})\\
&= \sqrt{\frac{(1+x^2)-x^2}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 通分})\\
&= \sqrt{\frac{1}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 加法逆元 } x^2-x^2=0)\\
&= \frac{\sqrt{1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} && (\because \text{ 商の平方根は平方根の商})\\
&= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} && (\because \sqrt{1}=1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sin(\arctan(x)) &= \sin\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right) && (\because \text{ arctan の定義})\\
&= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} && (\because \text{ sin は arcsin の逆関数})
\end{aligned}$$

定義 1.43 (角度表現の同値類)**.** $\mathbb{R}$ の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$ を $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\theta \sim_{\text{angle}} \theta' \overset{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } (\theta - \theta') = 2n\pi$$

と定めると、商集合 $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ が定まる。
$\theta \in \mathbb{R}$ の $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ における同値類を

$$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} \in \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

と書く。

主張 1.44 ($0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ なる$n \in \mathbb{Z}$ の存在と一意性)**.** $\theta \in \mathbb{R}$ について、

$$0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$$

を満たす $n \in \mathbb{Z}$ がただ一つ存在する。

証明. 以下では非可算集合 $\mathbb{R}$ の順序体としての構造と、そのアルキメデス性

$$\forall a \in \mathbb{R}\ \exists N \in \mathbb{Z}\ \text{s.t.}\ N > a$$

を使う（アルキメデス性は $\mathbb{R}$ の完備性から従う。ここが有理数体の代数だけでは閉じない箇所である）。極限・連続性は使わない。

存在。証明の中で使う記号を先に置く。$\pi > 0$ より $2\pi > 0$ であるから $t := \dfrac{\theta}{2\pi} \in \mathbb{R}$ が定まる。アルキメデス性を $a = t$ に適用して $N > t$ なる $N \in \mathbb{Z}$ を、$a = -t$ に適用して $M > -t$ なる $M \in \mathbb{Z}$ をとり、集合

$$S := \{\, m \in \mathbb{Z} \mid -M \le m \le N \ \wedge\ m \le t \,\}$$

を置く。

準備の第一は $-M < t$ である。

$$\begin{aligned} -M &< -(-t) && (\because\ M > -t \text{ の両辺に } -1 \text{ を掛けると不等号の向きが変わる}) \\ &= t && (\because\ -(-t) = t) \end{aligned}$$

準備の第二は $n := \max S \in \mathbb{Z}$ が定まることである。$-M < t$ と $-M < t < N$ より $-M \in S$ なので S は空でなく、$\{m \in \mathbb{Z} \mid -M \le m \le N\}$ の部分集合として有限である。有限かつ空でない整数の集合は最大元をもつ。

準備の第三は $n \le t$ である。これは $n \in S$ と S の定め方から出る。

準備の第四は $t < n+1$ である。$n+1 \le t$ と仮定すると $n+1 \le t < N$ かつ $-M \le n < n+1$ より $n+1 \in S$ となり、$n = \max S$ に矛盾する。

以上のもとで、下界は

$$\begin{aligned} 0 &= 2\pi \cdot 0 && (\because\ 0 \text{ との積は } 0) \\ &\le 2\pi(t-n) && (\because\ \text{準備の第三の } n \le t \text{ より } 0 \le t-n \text{、および } 2\pi > 0) \\ &= 2\pi t - 2n\pi && (\because\ \text{分配則}) \\ &= \theta - 2n\pi && (\because\ t \text{ の定め方より } \theta = 2\pi t) \end{aligned}$$

であり、上界は

$$\begin{aligned} \theta - 2n\pi &= 2\pi t - 2n\pi && (\because\ t \text{ の定め方より } \theta = 2\pi t) \\ &= 2\pi(t-n) && (\because\ \text{分配則}) \\ &< 2\pi \cdot 1 && (\because\ \text{準備の第四の } t < n+1 \text{ より } t-n < 1 \text{、および } 2\pi > 0) \\ &= 2\pi && (\because\ 1 \text{ との積は変わらない}) \end{aligned}$$

である。すなわち $0 \le \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たす $n \in \mathbb{Z}$ が存在する。

一意性。$n, n' \in \mathbb{Z}$ がともに $0 \le \theta - 2n\pi < 2\pi$、$0 \le \theta - 2n'\pi < 2\pi$ を満たすとする。下から評価すると

$$\begin{aligned} 2(n'-n)\pi &= (\theta - 2n\pi) - (\theta - 2n'\pi) && (\because\ \text{右辺を展開すると } 2n'\pi - 2n\pi \text{ になる}) \\ &> 0 - 2\pi && (\because\ 0 \le \theta - 2n\pi \text{ と } \theta - 2n'\pi < 2\pi) \\ &= -2\pi && (\because\ 0 \text{ から引くと符号が変わる}) \end{aligned}$$

であり、上から評価すると

$$\begin{aligned} 2(n'-n)\pi &= (\theta - 2n\pi) - (\theta - 2n'\pi) && (\because\ \text{右辺を展開すると } 2n'\pi - 2n\pi \text{ になる}) \\ &< 2\pi - 0 && (\because\ \theta - 2n\pi < 2\pi \text{ と } 0 \le \theta - 2n'\pi) \\ &= 2\pi && (\because\ 0 \text{ を引いても変わらない}) \end{aligned}$$

である。各辺を $2\pi > 0$ で割って $-1 < n' - n < 1$ を得る。$n' - n \in \mathbb{Z}$ であり、この範囲にある整数は 0 のみであるから $n' = n$。 □

定義 1.45 (角度表現の切断)**.** $s_{[0,2\pi)} : \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}} \to [0, 2\pi)$ を以下のように定める。

$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} \in \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ に対して、

$n \in \mathbb{Z}$ で $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすようなものがただ一つ存在して（主張 1.44)、

この n を用いて、

$$s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) := \theta - 2n\pi$$

と定める。

定義 1.46 ($\mathbb{R}$の角度表現)**.** $\mathbb{R}$ の（角度表現）を、定義 1.43 の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$ による商集合 $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ に

$$+ : (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \times (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \to \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

$$([\theta]_{\sim_{\text{angle}}}, [\theta']_{\sim_{\text{angle}}}) \mapsto [\theta + \theta']_{\sim_{\text{angle}}}$$

$$\cdot_{\text{real}} : \mathbb{R} \times (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \to \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

$$(a, [\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) \mapsto [a \cdot s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}})]_{\sim_{\text{angle}}}$$

を入れたものとして定める。ここで $s_{[0,2\pi)}$ は 定義 1.45 の切断である。

定義 1.47 (極座標表現の同値類)**.** 角度の同値関係は 定義 1.43 で定めたものを使う。半径が零の対は角度によらず同じ同値類に属するとし、正の半径の対は半径が等しく角度が同値な場合に同じ同値類に属するとする。

$\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ の同値関係 $\sim$ を $(r, \theta), (r', \theta') \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ に対して、

$$(r, \theta) \sim (r', \theta') \overset{\text{def}}{\iff} r = r' = 0 \vee \left(r = r' \wedge \theta \sim_{\text{angle}} \theta'\right)$$

と定めると、商集合 $(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ が定まる。

$(r, \theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ の $(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ における同値類を

$$[(r, \theta)]_{\sim} \in (\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$$

と書く。

主張 1.48 (極座標表現の積は代表元の取り方によらない)**.** $\sim$ を 定義 1.47 の同値関係とする。$(r, \theta), (\tilde{r}, \tilde{\theta}), (r', \theta'), (\tilde{r}', \tilde{\theta}') \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ が

$$(r, \theta) \sim (\tilde{r}, \tilde{\theta}) \quad \text{かつ} \quad (r', \theta') \sim (\tilde{r}', \tilde{\theta}')$$

を満たすならば

$$(rr', \theta + \theta') \sim (\tilde{r}\tilde{r}', \tilde{\theta} + \tilde{\theta}')$$

である。

証明. 以下、定義 1.47 の同値関係 $\sim$ と 定義 1.43 の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$ を用いる。$\mathbb{R}$ は 定義 1.47 の台集合から受け継いだもので、この証明が使うのは $\mathbb{R}$ の四則だけである（極限・完備性は使わない)。定義 1.47 の定義（$(s, \varphi), (s', \varphi') \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ に対して）

$$(s, \varphi) \sim (s', \varphi') \overset{\text{def}}{\iff} s = s' = 0 \ \vee \ \left(s = s' \wedge \varphi \sim_{\text{angle}} \varphi'\right)$$

に従って、次の 2 つの場合に分ける。

場合 (a): $r = \tilde{r} = 0$ または $r' = \tilde{r}' = 0$ のとき。

$$\begin{aligned} rr' &= 0 \quad (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\ &= \tilde{r}\tilde{r}' \quad (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \end{aligned}$$

であるから、$(rr', \theta + \theta')$ と $(\tilde{r}\tilde{r}', \tilde{\theta} + \tilde{\theta}')$ は第 1 成分がともに 0 であり、定義 1.47 の第 1 の選言により $(rr', \theta + \theta') \sim (\tilde{r}\tilde{r}', \tilde{\theta} + \tilde{\theta}')$。

場合 (b): 場合 (a) でないとき。このとき $(r, \theta) \sim (\tilde{r}, \tilde{\theta})$ の定義における第 1 の選言 $r = \tilde{r} = 0$ は偽であるから第 2 の選言が成り立ち、$r = \tilde{r}$ かつ $\theta \sim_{\text{angle}} \tilde{\theta}$。同様に $r' = \tilde{r}'$ かつ $\theta' \sim_{\text{angle}} \tilde{\theta}'$。

定義 1.43 より $n, n' \in \mathbb{Z}$ が存在して $\theta - \tilde{\theta} = 2n\pi$、$\theta' - \tilde{\theta}' = 2n'\pi$ であるから、

$$\begin{aligned} (\theta + \theta') - (\tilde{\theta} + \tilde{\theta}') &= (\theta - \tilde{\theta}) + (\theta' - \tilde{\theta}') \quad (\because\ \mathbb{R} \text{ の和と差の整理}) \\ &= 2n\pi + (\theta' - \tilde{\theta}') \qquad (\because\ \theta - \tilde{\theta} = 2n\pi) \\ &= 2n\pi + 2n'\pi \qquad (\because\ \theta' - \tilde{\theta}' = 2n'\pi) \\ &= 2(n + n')\pi \qquad (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配則}) \end{aligned}$$

であり $n + n' \in \mathbb{Z}$ であるから $\theta + \theta' \sim_{\text{angle}} \tilde{\theta} + \tilde{\theta}'$（定義 1.43）。また

$$\begin{aligned} rr' &= \tilde{r}r' \quad (\because\ r = \tilde{r}) \\ &= \tilde{r}\tilde{r}' \quad (\because\ r' = \tilde{r}') \end{aligned}$$

であるから、第 2 の選言により $(rr', \theta + \theta') \sim (\tilde{r}\tilde{r}', \tilde{\theta} + \tilde{\theta}')$。いずれの場合も主張の同値が成り立つ。 □

定義 1.49 (極座標表現の演算)**.** 定義 1.47 の同値類に対して演算を定める。

$((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim)$ に二項演算 $\cdot$ を次で定める。

$$\cdot : ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim) \times ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim) \to ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim)$$

$$\big([(r, \theta)]_\sim, [(r', \theta')]_\sim\big) \mapsto [(rr', \theta + \theta')]_\sim$$

右辺が同値類の代表元の取り方によらないことは 主張 1.48 による。

この構造を「極座標表現」と呼ぶ。

主張 1.50 (極座標表現は積についてモノイドをなす)**.** （極座標表現）$= (\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$（$\sim$ は定義 1.47 の同値関係）は、定義 1.49 の二項演算 $\cdot$ についてモノイドをなす。すなわち $\cdot$ は結合律を満たし、

$$e := [(1, 0)]_\sim$$

は $\cdot$ の単位元である。

証明. 二項演算 $\cdot$ は 定義 1.49 で定め、主張 1.48 により代表元の取り方によらない。$\mathbb{R}$ は 定義 1.47 の台集合から受け継いだもので、この証明が使うのは $\mathbb{R}$ の積と和の結合律・単位元と、非負の数の積が非負であることだけである。

結合律。$[(r_1, \theta_1)]_\sim, [(r_2, \theta_2)]_\sim, [(r_3, \theta_3)]_\sim \in$ (極座標表現) に対して、

$$\begin{aligned} ([(r_1, \theta_1)]_\sim \cdot [(r_2, \theta_2)]_\sim) \cdot [(r_3, \theta_3)]_\sim &= [(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)]_\sim \cdot [(r_3, \theta_3)]_\sim \qquad (\because \text{極座標表現の積の定義。定義 1.49}) \\ &= [((r_1 r_2) r_3,\ (\theta_1 + \theta_2) + \theta_3)]_\sim \qquad (\because \text{極座標表現の積の定義。定義 1.49}) \\ &= [(r_1 (r_2 r_3),\ (\theta_1 + \theta_2) + \theta_3)]_\sim \qquad (\because\ \mathbb{R} \text{ の積の結合律}) \\ &= [(r_1 (r_2 r_3),\ \theta_1 + (\theta_2 + \theta_3))]_\sim \qquad (\because\ \mathbb{R} \text{ の和の結合律}) \\ &= [(r_1, \theta_1)]_\sim \cdot [(r_2 r_3, \theta_2 + \theta_3)]_\sim \qquad (\because \text{極座標表現の積の定義。定義 1.49}) \\ &= [(r_1, \theta_1)]_\sim \cdot ([(r_2, \theta_2)]_\sim \cdot [(r_3, \theta_3)]_\sim) \quad (\because \text{極座標表現の積の定義。定義 1.49}) \end{aligned}$$

が成り立つ。$r_1, r_2, r_3 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ の積は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に属するので、各段の右辺は (極座標表現) の元である。

単位元。$e = [(1,0)]_\sim \in$ (極座標表現)（$1 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$）であり、$[(r,\theta)]_\sim \in$ (極座標表現) に対して

$$\begin{aligned}
[(r,\theta)]_\sim \cdot e &= [(r,\theta)]_\sim \cdot [(1,0)]_\sim && (\because\ e \text{ の定め方}) \\
&= [(r\cdot 1,\ \theta+0)]_\sim && (\because\ \text{極座標表現の積の定義。定義 1.49}) \\
&= [(r,\ \theta+0)]_\sim && (\because\ 1 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の積の単位元}) \\
&= [(r,\theta)]_\sim && (\because\ 0 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の和の単位元})
\end{aligned}$$

であり、また

$$\begin{aligned}
e \cdot [(r,\theta)]_\sim &= [(1,0)]_\sim \cdot [(r,\theta)]_\sim && (\because\ e \text{ の定め方}) \\
&= [(1\cdot r,\ 0+\theta)]_\sim && (\because\ \text{極座標表現の積の定義。定義 1.49}) \\
&= [(r,\ 0+\theta)]_\sim && (\because\ 1 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の積の単位元}) \\
&= [(r,\theta)]_\sim && (\because\ 0 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の和の単位元})
\end{aligned}$$

である。結合律と単位元の 2 つより、(極座標表現) は $\cdot$ について単位元 e をもつ結合的な二項演算をもつ、すなわちモノイドをなす。 □

主張 1.51 (極座標表現の元が半径零の類に等しいことの判定)**.** $\sim$ を 定義 1.47 の同値関係とする。

$(r,\theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ に対して

$$[(r,\theta)]_\sim = [(0,0)]_\sim \iff r = 0$$

証明. 定義 1.47 の同値関係 $\sim$ を用いる。両向きに分けて示す。

（$\Leftarrow$）$r = 0$ ならば $(0,\theta)$ と $(0,0)$ は第 1 成分がともに 0 であるから、定義 1.47 の第 1 の選言により $(0,\theta) \sim (0,0)$、すなわち $[(r,\theta)]_\sim = [(0,0)]_\sim$。

（$\Rightarrow$）$[(r,\theta)]_\sim = [(0,0)]_\sim$ すなわち $(r,\theta) \sim (0,0)$ のとき、定義 1.47 の第 1 の選言が成り立つならば $r = 0$、第 2 の選言が成り立つならば $r = 0$（右辺の第 1 成分が 0 だから）。いずれの場合も $r = 0$。 □

主張 1.52 (極座標表現の半径が正の元は両側の逆元をもつ)**.** $\sim$ を 定義 1.47 の同値関係、$\cdot$ を定義 1.49 の二項演算とし、(極座標表現) $= (\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ とする。

$(r,\theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$、$r \neq 0$ とし、$e = [(1,0)]_\sim$ を 主張 1.50 の単位元とする。$c := [(1/r, -\theta)]_\sim \in$ (極座標表現) は

$$[(r,\theta)]_\sim \cdot c = c \cdot [(r,\theta)]_\sim = e$$

を満たす。

証明. 定義 1.49 の二項演算 $\cdot$ と、主張 1.50 の単位元 e を用いる。$\mathbb{R}$ は 定義 1.47 の台集合から受け継いだもので、この証明が使うのは $\mathbb{R}$ の四則と順序だけである（極限・完備性は使わない）。

$r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ かつ $r \neq 0$ より $r > 0$ であるから $1/r \in \mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$ が定まり、$c = [(1/r, -\theta)]_\sim \in$ (極座標表現)。このとき

$$\begin{aligned}
[(r,\theta)]_\sim \cdot [(1/r,-\theta)]_\sim &= [(r\cdot(1/r),\ \theta+(-\theta))]_\sim && (\because\ \text{極座標表現の積の定義。定義 1.49}) \\
&= [(1,\ \theta+(-\theta))]_\sim && (\because\ r>0 \text{ より } r\cdot(1/r)=1) \\
&= [(1,0)]_\sim && (\because\ -\theta \text{ は } \theta \text{ の } \mathbb{R} \text{ における加法の逆元}) \\
&= e && (\because\ e \text{ の定め方。主張 1.50})
\end{aligned}$$

であり、また

$$
\begin{aligned}
[(1/r,-\theta)]_\sim \cdot [(r,\theta)]_\sim &= [((1/r)\cdot r,\ (-\theta)+\theta)]_\sim && (\because \text{極座標表現の積の定義。定義 1.49})\\
&= [(1,\ (-\theta)+\theta)]_\sim && (\because\ r>0 \text{ より } (1/r)\cdot r = 1)\\
&= [(1,0)]_\sim && (\because\ -\theta \text{ は } \theta \text{ の } \mathbb{R} \text{ における加法の逆元})\\
&= e && (\because\ e \text{ の定め方。主張 1.50})
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 1.53 (極座標表現の半径が正の元に右から掛けて単位元になる元はただ一つ)**.** $\sim$ を 定義 1.47 の同値関係、$\cdot$ を 定義 1.49 の二項演算とし、(極座標表現) $= (\mathbb{R}_{\geq 0}\times\mathbb{R})/\sim$ とする。

$(r,\theta)\in\mathbb{R}_{\geq 0}\times\mathbb{R}$、$r\neq 0$ とし、$e=[(1,0)]_\sim$ を 主張 1.50 の単位元とする。$b\in$ (極座標表現) が

$$[(r,\theta)]_\sim \cdot b = e$$

を満たすならば

$$b = [(1/r,-\theta)]_\sim$$

である。

証明. 定義 1.49 の二項演算 $\cdot$ と、主張 1.50 の単位元 e と結合律を用いる。$a := [(r,\theta)]_\sim$、$c := [(1/r,-\theta)]_\sim$ とおくと、主張 1.52 より $c\in$ (極座標表現) かつ $c\cdot a = e$。

$b\in$ (極座標表現) が $a\cdot b = e$ を満たすとすると、

$$
\begin{aligned}
b &= e\cdot b && (\because\ e \text{ は } \cdot \text{ の単位元。主張 1.50})\\
&= (c\cdot a)\cdot b && (\because\ c\cdot a = e \text{。主張 1.52})\\
&= c\cdot(a\cdot b) && (\because\ \cdot \text{の結合律。主張 1.50})\\
&= c\cdot e && (\because\ a\cdot b = e)\\
&= c && (\because\ e \text{ は } \cdot \text{ の単位元。主張 1.50})
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 1.54 (（極座標表現）の乗法群)**.** $\sim$ を 定義 1.47 の同値関係、$\cdot$ を 定義 1.49 の二項演算とし、(極座標表現) $= (\mathbb{R}_{\geq 0}\times\mathbb{R})/\sim$ とする。

$$(\text{極座標表現})^\times := (\text{極座標表現}) \setminus \{[(0,0)]_\sim\}$$

は二項演算 $\cdot$ について群をなす。

証明. 定義 1.49 の二項演算 $\cdot$ と、主張 1.50 の単位元 $e=[(1,0)]_\sim$ を用いる。$\mathbb{R}$ は 定義 1.47 の台集合から受け継いだもので、この証明が使うのは $\mathbb{R}$ の四則と順序だけである（極限・完備性は使わない)。

積で閉じること。$[(r,\theta)]_\sim, [(r',\theta')]_\sim \in$ (極座標表現)$^\times$ とすると、主張 1.51 より $r\neq 0$ かつ $r'\neq 0$。$r,r'\in\mathbb{R}_{\geq 0}$ かつ $r,r'\neq 0$ より $r>0$ かつ $r'>0$ であるから $rr'>0$、特に $rr'\neq 0$。よって

$$
\begin{aligned}
[(r,\theta)]_\sim \cdot [(r',\theta')]_\sim &= [(rr',\theta+\theta')]_\sim && (\because \text{極座標表現の積の定義。定義 1.49})\\
&\neq [(0,0)]_\sim && (\because\ rr'\neq 0 \text{ と 主張 1.51})
\end{aligned}
$$

すなわち積は (極座標表現)$^\times$ に属する。

単位元を含むこと。$1\neq 0$ と 主張 1.51 より $e=[(1,0)]_\sim \neq [(0,0)]_\sim$ であり、$e\in$ (極座標表現)$^\times$。

逆元をもつこと。$[(r,\theta)]_\sim \in$ (極座標表現)$^\times$ とすると、主張 1.51 より $r \neq 0$ であり、$r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ と合わせて $r > 0$ である。主張 1.52 より $[(1/r,-\theta)]_\sim$ は $[(r,\theta)]_\sim \cdot [(1/r,-\theta)]_\sim = [(1/r,-\theta)]_\sim \cdot [(r,\theta)]_\sim = e$ を満たす。$r > 0$ より $1/r \neq 0$ なので、主張 1.51 より $[(1/r,-\theta)]_\sim \in$ (極座標表現)$^\times$。

結論。(極座標表現)$^\times$ は $\cdot$ について閉じており、主張 1.50 より結合律を満たし、単位元 e を含み、各元が (極座標表現)$^\times$ の中に逆元をもつ。したがって (極座標表現)$^\times$ は $\cdot$ について群をなす。 □

主張 1.55 ($\mathbb{C}$の乗法群)**.**

$$\mathbb{C}^\times := \mathbb{C} \setminus \{(0,0)\}$$

は群をなす。

$z \in \mathbb{C},\ z \neq 0$ に対して逆元を z^{-1} と書き、

$$z^{-1} = 1/z$$

証明. 以下、定義 1.12 の積

$$(a,b) \cdot (c,d) := (ac - bd,\ ad + bc)$$

を用いる（$a,b,c,d \in \mathbb{R}$）。また 定義 1.13 より $1_\mathbb{C} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) = (1,0)$、$0_\mathbb{C} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) = (0,0)$ である。

証明は独立した中間目標へ分かれるので、以下ではそれぞれに名前を付けて示す。以下、$(a,b),(c,d),(e,f) \in \mathbb{C}$ は任意に取ったものとする（したがって $a,b,c,d,e,f \in \mathbb{R}$）。

積の可換律。

$$\begin{aligned}
(c,d)\cdot(a,b) &= (ca - db,\ cb + da) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義})\\
&= (ac - bd,\ cb + da) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の積の可換律を 2 箇所へ適用})\\
&= (ac - bd,\ bc + ad) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の積の可換律を 2 箇所へ適用})\\
&= (ac - bd,\ ad + bc) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の和の可換律})\\
&= (a,b)\cdot(c,d) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義})
\end{aligned}$$

積の結合律。

$$\begin{aligned}
((a,b)\cdot(c,d))\cdot(e,f) &= (ac - bd,\ ad + bc)\cdot(e,f) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義})\\
&= ((ac - bd)e - (ad + bc)f,\ (ac - bd)f + (ad + bc)e) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義})\\
&= (ace - bde - adf - bcf,\ acf - bdf + ade + bce) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律と積の結合律を 4 箇所へ適用})\\
&= (ace - adf - bcf - bde,\ acf + ade + bce - bdf) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の和の可換律と結合律})\\
&= (a(ce - df) - b(cf + de),\ a(cf + de) + b(ce - df)) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律と積の結合律を 4 箇所へ適用})\\
&= (a,b)\cdot(ce - df,\ cf + de) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義})\\
&= (a,b)\cdot((c,d)\cdot(e,f)) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義})
\end{aligned}$$

第 3 の等号と第 5 の等号では、$\mathbb{R}$ の分配律と積の結合律を同時に使っている（例えば $(ac - bd)e = ace - bde$ は分配律で 2 項に分けたうえで、各項の積の順序を結合律で括り直したものである）。同じ定理を複数箇所へ同時に適用しているので 1 行にまとめてある。

積の単位元。

$$\begin{aligned}
(a,b)\cdot 1_\mathbb{C} &= (a,b)\cdot(1,0) && (\because\ 1_\mathbb{C} = (1,0))\\
&= (a\cdot 1 - b\cdot 0,\ a\cdot 0 + b\cdot 1) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義})\\
&= (a - b\cdot 0,\ a\cdot 0 + b) && (\because\ \mathbb{R} \text{ では 1 は積の単位元。2 箇所へ適用})\\
&= (a - 0,\ 0 + b) && (\because\ \mathbb{R} \text{ では 0 を因子にもつ積は 0。2 箇所へ適用})\\
&= (a,b) && (\because\ \mathbb{R} \text{ では 0 は和の単位元。2 箇所へ適用})
\end{aligned}$$

であり、また

$$\begin{aligned} 1_{\mathbb{C}} \cdot (a,b) &= (a,b) \cdot 1_{\mathbb{C}} && (\because \text{上で示した積の可換律}) \\ &= (a,b) && (\because \text{上の計算}) \end{aligned}$$

であるから $1_{\mathbb{C}}$ は積の単位元である。

零でないことと平方和が正であることの同値。$z = (a,b) \in \mathbb{C}$ について $z \neq (0,0) \iff a^2 + b^2 > 0$ を示す。まず

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &\geq 0 + b^2 && (\because \mathbb{R} \text{ では平方は非負であることと、和が順序を保つこと}) \\ &\geq 0 + 0 && (\because \mathbb{R} \text{ では平方は非負であることと、和が順序を保つこと}) \\ &= 0 && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \end{aligned}$$

である。次に $a^2 + b^2 = 0$ と仮定すると

$$\begin{aligned} a^2 &= a^2 + 0 && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\ &= a^2 + \left(b^2 + (-b^2)\right) && (\because -b^2 \text{ は } b^2 \text{ の和の逆元}) \\ &= \left(a^2 + b^2\right) + (-b^2) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の結合律}) \\ &= 0 + (-b^2) && (\because \text{仮定 } a^2 + b^2 = 0) \\ &= -b^2 && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\ &\leq 0 && (\because b^2 \geq 0 \text{ と、和の逆元が順序を反転すること}) \end{aligned}$$

となり、$a^2 \geq 0$ と併せて $a^2 = 0$、したがって $a = 0$ である（$\mathbb{R}$ では $x \neq 0$ なら $x^2 > 0$ だから）。a と b を入れ替えれば同じ議論で $b = 0$ を得る。逆に $a = b = 0$ のときは

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= 0^2 + 0^2 && (\because \text{仮定 } a = b = 0) \\ &= 0 + 0 && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0\text{。}2 \text{ 箇所へ適用}) \\ &= 0 && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \end{aligned}$$

である。ゆえに $a^2 + b^2 = 0 \iff z = (0,0)$ であり、これと $a^2 + b^2 \geq 0$ を併せて $z \neq (0,0) \iff a^2 + b^2 > 0$ を得る。

$\mathbb{C}^\times$ が積について閉じること。まず次の恒等式を示す。

$$\begin{aligned} (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 &= \left(a^2c^2 - 2abcd + b^2d^2\right) + \left(a^2d^2 + 2abcd + b^2c^2\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と積の結合律・可換律を } 2 \text{ 箇所へ適用}) \\ &= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + ((-2abcd) + 2abcd) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律と結合律}) \\ &= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + 0 && (\because -2abcd \text{ は } 2abcd \text{ の和の逆元}) \\ &= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\ &= \left(a^2 + b^2\right)\left(c^2 + d^2\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と積の可換律}) \end{aligned}$$

$z = (a,b),\ w = (c,d) \in \mathbb{C}^\times$ とすると、上で示した同値より $a^2 + b^2 > 0$ かつ $c^2 + d^2 > 0$ であるから $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) > 0$ である（$\mathbb{R}$ では正の元どうしの積は正）。この恒等式より $zw = (ac - bd,\ ad + bc)$ の 2 つの成分の平方和は正であり、再び上の同値より $zw \neq (0,0)$、すなわち $zw \in \mathbb{C}^\times$ である。また

$$\begin{aligned} 1^2 + 0^2 &= 1 + 0 && (\because \mathbb{R} \text{ では } 1 \text{ は積の単位元、および } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\ &= 1 && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\ &> 0 && (\because \mathbb{R} \text{ の順序}) \end{aligned}$$

より $1_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}^\times$ である。

逆元の存在。$z = (a,b) \in \mathbb{C}^\times$ とすると、上で示した同値より $a^2 + b^2 > 0$ であるから

$$w := \left(\frac{a}{a^2 + b^2},\ \frac{-b}{a^2 + b^2}\right) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$$

が定まり、

$$
\begin{aligned}
z \cdot w &= (a,b) \cdot \left(\frac{a}{a^2+b^2},\ \frac{-b}{a^2+b^2} \right) && (\because\ w \text{ の定め方}) \\
&= \left(a \cdot \frac{a}{a^2+b^2} - b \cdot \frac{-b}{a^2+b^2},\ a \cdot \frac{-b}{a^2+b^2} + b \cdot \frac{a}{a^2+b^2} \right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\
&= \left(\frac{a^2}{a^2+b^2} - \frac{-b^2}{a^2+b^2},\ \frac{-ab}{a^2+b^2} + \frac{ab}{a^2+b^2} \right) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分数と積の関係を 4 箇所へ適用}) \\
&= \left(\frac{a^2-(-b^2)}{a^2+b^2},\ \frac{(-ab)+ab}{a^2+b^2} \right) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分母の等しい分数の差と和}) \\
&= \left(\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2},\ \frac{0}{a^2+b^2} \right) && (\because\ -(-b^2)=b^2 \text{ と、 } -ab \text{ が } ab \text{ の和の逆元であること}) \\
&= \left(1,\ \frac{0}{a^2+b^2} \right) && (\because\ a^2+b^2 \neq 0 \text{ による約分}) \\
&= (1,\ 0) && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を分子にもつ分数は } 0) \\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} = (1,0))
\end{aligned}
$$

である。さらに

$$
\begin{aligned}
w \cdot z &= z \cdot w && (\because\ \text{上で示した積の可換律}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{上の計算})
\end{aligned}
$$

である。また $w=(0,0)$ とすると 定義 1.12 の積の定義より $zw=(0,0)$ となって $zw=1_{\mathbb{C}} \neq (0,0)$ に矛盾するから $w \neq (0,0)$、すなわち $w \in \mathbb{C}^\times$ である。

逆元の一意性。単位元 e をもつ結合的な二項演算をもつ集合 S において、$a \in S$ に対し $b, b' \in S$ がともに $ab=ba=e$、$ab'=b'a=e$ を満たすとすると、

$$
\begin{aligned}
b &= b\,e && (\because\ e \text{ は単位元}) \\
&= b\,(ab') && (\because\ ab'=e) \\
&= (ba)\,b' && (\because\ \text{結合律}) \\
&= e\,b' && (\because\ ba=e) \\
&= b' && (\because\ e \text{ は単位元})
\end{aligned}
$$

であるから逆元は一意である。よって $z \in \mathbb{C}^\times$ の逆元を z^{-1} と書くことができ、

$$
z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2+b^2},\ \frac{-b}{a^2+b^2} \right) \qquad (z=(a,b))
$$

である。

結論と記法。上で示したところにより $\mathbb{C}^\times$ は積について閉じ、結合律を満たし、単位元 $1_{\mathbb{C}}$ を含み、各元が逆元をもつ。したがって $\mathbb{C}^\times$ は群をなす（積の可換律も示したので可換群である）。

主張の最後の等式 $z^{-1}=1/z$ は記法の約束である。すなわち $w \in \mathbb{C},\ z \in \mathbb{C}^\times$ に対して商を $w/z := w \cdot z^{-1}$ と定めると、

$$
\begin{aligned}
1/z &= 1_{\mathbb{C}} \cdot z^{-1} && (\because\ \text{商の定め方}) \\
&= z^{-1} && (\because\ \text{上で示した } 1_{\mathbb{C}} \text{ が積の単位元であること})
\end{aligned}
$$

であり、両記法は一致する。 □

主張 1.56 ($\mathbb{C}$は体)**.** $\mathbb{C}$ は体をなす。

証明. 加法について。定義 1.12 は $\mathbf{C}=\mathbf{R}^2$ 上の加法と積を定めている。その成分ごとの加法は $\mathbb{R}^2$ の実数成分を足す次の式

$$(a,b)+(c,d) := (a+c,\ b+d) \qquad (a,b,c,d \in \mathbb{R})$$

である。以下ではこの加法と 定義 1.12 の積について、体の公理をすべて確かめる。

示すべきことは次の 5 つである。

- $(\mathbb{C},+)$ は可換群である（加法の群構造）。
- 積は結合的・可換であり単位元 $1_{\mathbb{C}}$ をもつ（積のモノイド構造）。
- 分配律が成り立つ。
- $1_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$ である（単位元と零元の相違）。
- $0_{\mathbb{C}}$ 以外の元は積について可逆である（逆元の存在）。

以下 $a,b,c,d,e,f \in \mathbb{R}$ とし、$(a,b),(c,d),(e,f) \in \mathbb{C}$ とする。

加法の結合律。

$$\begin{aligned}
\big((a,b)+(c,d)\big)+(e,f) &= (a+c,\ b+d)+(e,f) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})\\
&= \big((a+c)+e,\ (b+d)+f\big) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})\\
&= \big(a+(c+e),\ b+(d+f)\big) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の結合律を 2 箇所へ適用})\\
&= (a,b)+(c+e,\ d+f) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})\\
&= (a,b)+\big((c,d)+(e,f)\big) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})
\end{aligned}$$

加法の可換律。

$$\begin{aligned}
(a,b)+(c,d) &= (a+c,\ b+d) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})\\
&= (c+a,\ d+b) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律を 2 箇所へ適用})\\
&= (c,d)+(a,b) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})
\end{aligned}$$

加法の単位元。

$$\begin{aligned}
(a,b)+0_{\mathbb{C}} &= (a,b)+(0,0) && (\because \mathbb{R}\to\mathbb{C} \text{ の包含写像 の } 0_{\mathbb{C}}=(0,0))\\
&= (a+0,\ b+0) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})\\
&= (a,b) && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元。2 箇所へ適用})
\end{aligned}$$

引いたブロックは 定義 1.13 である。

加法の逆元。

$$\begin{aligned}
(a,b)+(-a,-b) &= (a+(-a),\ b+(-b)) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})\\
&= (0,0) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の逆元を 2 箇所へ適用})\\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \mathbb{R}\to\mathbb{C} \text{ の包含写像 の } 0_{\mathbb{C}}=(0,0))
\end{aligned}$$

ここで $-a,-b \in \mathbb{R}$ なので $(-a,-b) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ である。以上の 4 つより $(\mathbb{C},+)$ は可換群である。引いたブロックは 定義 1.13 である。

この加法逆元は 定義 1.14 の $-z := (-1_{\mathbb{C}})\cdot z$ と一致する。

$$\begin{aligned}
(-1_{\mathbb{C}})\cdot(a,b) &= (-1,0)\cdot(a,b) && (\because \mathbb{R}\to\mathbb{C} \text{ の包含写像 より } -1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1)=(-1,0))\\
&= \big((-1)a-0\cdot b,\ (-1)b+0\cdot a\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の定義 の積})\\
&= (-a,-b) && (\because \mathbb{R} \text{ では } 1 \text{ は積の単位元、 } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0\text{、 } 0 \text{ は和の単位元})
\end{aligned}$$

引いたブロックは 定義 1.13 と 定義 1.12 である。

積のモノイド構造。積の結合律・可換律・単位元 $1_{\mathbb{C}}$ の存在は 主張 1.55 の「積の可換律」「積の結合律」「積の単位元」で示した（これらは $\mathbb{C}$ の全元について成り立つ主張である）。

左からの分配律。

$$\begin{aligned}
(a,b)\cdot\big((c,d)+(e,f)\big) &= (a,b)\cdot(c+e,\ d+f) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})\\
&= \big(a(c+e)-b(d+f),\ a(d+f)+b(c+e)\big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の定義 の積})\\
&= \big(ac+ae-(bd+bf),\ ad+af+(bc+be)\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律を 4 箇所へ適用})\\
&= \big((ac-bd)+(ae-bf),\ (ad+bc)+(af+be)\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の和の可換律・結合律、および和の逆元の分配})\\
&= (ac-bd,\ ad+bc)+(ae-bf,\ af+be) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})\\
&= (a,b)\cdot(c,d)+(a,b)\cdot(e,f) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の定義 の積を 2 箇所へ適用})
\end{aligned}$$

引いたブロックは 定義 1.12 である。第 4 の等号の「和の逆元の分配」とは $-(bd+bf)=(-bd)+(-bf)$ のことである。

右からの分配律。

$$\begin{aligned}
\big((c,d)+(e,f)\big)\cdot(a,b) &= (a,b)\cdot\big((c,d)+(e,f)\big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の乗法群 の積の可換律})\\
&= (a,b)\cdot(c,d)+(a,b)\cdot(e,f) && (\because \text{ 上で示した左からの分配律})\\
&= (c,d)\cdot(a,b)+(e,f)\cdot(a,b) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の乗法群 の積の可換律を 2 箇所へ適用})
\end{aligned}$$

引いたブロックは 主張 1.55 である。

単位元と零元の相違。

$$\begin{aligned}
1_{\mathbb{C}} &= (1,0) && (\because\ \mathbb{R}\to\mathbb{C} \text{ の包含写像 の } 1_{\mathbb{C}}=(1,0))\\
&\neq (0,0) && (\because\ \mathbb{R} \text{ において } 1\neq 0 \text{ であり、第 1 成分が異なる})\\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R}\to\mathbb{C} \text{ の包含写像 の } 0_{\mathbb{C}}=(0,0))
\end{aligned}$$

引いたブロックは 定義 1.13 である。

逆元の存在。主張 1.55 より $\mathbb{C}^\times=\mathbb{C}\setminus\{(0,0)\}$ は積について群をなす。したがって $z\neq 0_{\mathbb{C}}$ なる $z\in\mathbb{C}$ は $z\in\mathbb{C}^\times$ であり、積に関する逆元 $z^{-1}\in\mathbb{C}^\times$ をもつ。

結論。以上で 5 つがすべて成り立つので、$\mathbb{C}$ は体をなす。 □

主張 1.57 $\big(\big(\frac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}}=2_{\mathbb{C}}^{-1}\big)$**.** $r_{\mathbb{C}}$ を 定義 1.13 の略記とし、$2_{\mathbb{C}}:=(2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}=(2,0)\in\mathbb{C}$ とする。$2_{\mathbb{C}}\neq 0_{\mathbb{C}}=(0,0)$（実部が $2\neq 0$）なので、$2_{\mathbb{C}}$ は 主張 1.56 の逆元 $2_{\mathbb{C}}^{-1}\in\mathbb{C}$（$2_{\mathbb{C}}\,2_{\mathbb{C}}^{-1}=1_{\mathbb{C}}$）をもつ。このとき

$$\big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}}=2_{\mathbb{C}}^{-1}$$

が成り立つ（$\frac{1}{2}\in\mathbb{R}$ は 2 の $\mathbb{R}$ の逆数）。

証明.

$$\begin{aligned}
\big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}} &= \big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}}\,1_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.56 の積の単位元})\\
&= \big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}}\big(2_{\mathbb{C}}\,2_{\mathbb{C}}^{-1}\big) && (\because\ 2_{\mathbb{C}}^{-1} \text{ は } 2_{\mathbb{C}} \text{ の 主張 1.56 の逆元（主張の前置き）})\\
&= \Big(\big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}}\,2_{\mathbb{C}}\Big)2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{ 主張 1.56 の積の結合律})\\
&= \big(\tfrac{1}{2}\cdot 2\big)_{\mathbb{C}}\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{ 主張 1.29 } (a\to\tfrac{1}{2},\ b\to 2)。\ 2_{\mathbb{C}}=(2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}})\\
&= (1)_{\mathbb{C}}\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } \tfrac{1}{2}\cdot 2=1)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{ 定義 1.13 の略記 } 1_{\mathbb{C}}=(1)_{\mathbb{C}})\\
&= 2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{ 主張 1.56 の積の単位元})
\end{aligned}$$

□

主張 1.58 (複素数に 0 を左から掛けると 0 になる)**.** $z \in \mathbb{C}$ とする。積は 定義 1.12、$0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0)$ は 定義 1.13 の略記による。このとき

$$0_{\mathbb{C}}\, z = 0_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。

証明. $z = (a, b)$（$a, b \in \mathbb{R}$）と書く。

$$\begin{aligned}
0_{\mathbb{C}}\, z &= (0,0)\,(a,b) && \left(\because\ 0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) = (0,0) \text{ 定義 1.13}\right)\\
&= (0\cdot a - 0\cdot b,\ 0\cdot b + 0\cdot a) && \left(\because\ \text{複素数の積の定義定義 1.12}\right)\\
&= (0-0,\ 0+0) && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } 0\cdot x = 0\,(\mathbb{R} \text{ は体定義 1.1}) \text{ を 4 箇所へ適用}\right)\\
&= (0,\ 0+0) && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } 0-0=0\right)\\
&= (0,\ 0) && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } 0+0=0\right)\\
&= 0_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \text{定義 1.13}\right)
\end{aligned}$$

□

主張 1.59 (複素数に 0 を右から掛けると 0 になる)**.** $z \in \mathbb{C}$ とする。積は 定義 1.12、$0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0)$ は 定義 1.13 の略記による。このとき

$$z\, 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。

証明. $z = (a, b)$（$a, b \in \mathbb{R}$）と書く。

$$\begin{aligned}
z\, 0_{\mathbb{C}} &= (a,b)\,(0,0) && \left(\because\ 0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) = (0,0) \text{ 定義 1.13}\right)\\
&= (a\cdot 0 - b\cdot 0,\ a\cdot 0 + b\cdot 0) && \left(\because\ \text{複素数の積の定義定義 1.12}\right)\\
&= (0-0,\ 0+0) && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } x\cdot 0 = 0\,(\mathbb{R} \text{ は体定義 1.1}) \text{ を 4 箇所へ適用}\right)\\
&= (0,\ 0+0) && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } 0-0=0\right)\\
&= (0,\ 0) && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } 0+0=0\right)\\
&= 0_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \text{定義 1.13}\right)
\end{aligned}$$

□

定義 1.60 (複素数の有限積)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$z_1, \ldots, z_m \in \mathbb{C}$ について、有限積 $\prod_{j=1}^{m} z_j \in \mathbb{C}$ を m についての帰納法で

$$\prod_{j=1}^{1} z_j := z_1, \qquad \prod_{j=1}^{m+1} z_j := \left(\prod_{j=1}^{m} z_j\right) z_{m+1}$$

と定める（左から順に掛ける)。積は 定義 1.12 の積である。

定義 1.61 (実数の有限積)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$r_1, \ldots, r_m \in \mathbb{R}$ について、有限積 $\prod_{j=1}^{m} r_j \in \mathbb{R}$ を m についての帰納法で

$$\prod_{j=1}^{1} r_j := r_1, \qquad \prod_{j=1}^{m+1} r_j := \left(\prod_{j=1}^{m} r_j\right) r_{m+1}$$

と定める（左から順に掛ける。定義 1.60 と同じ帰納法である)。積は $\mathbb{R}$ の積である。

主張 1.62 (正の実数の有限積は正)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$r_1, \ldots, r_m \in \mathbb{R}$ がすべての $j \in \{1, \ldots, m\}$ について $r_j > 0$ を満たすとする。有限積は 定義 1.61 による。このとき

$$\prod_{j=1}^{m} r_j > 0$$

が成り立つ。

証明. m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{1} r_j &= r_1 \quad (\because \text{ 定義 1.61}) \\ &> 0 \quad (\because \text{ 仮定 } r_1 > 0) \end{aligned}$$

である。m で成り立つと仮定し、すべての $j \in \{1, \ldots, m+1\}$ について $r_j > 0$ を満たす $r_1, \ldots, r_{m+1} \in \mathbb{R}$ を取る。帰納法の仮定（$r_1, \ldots, r_m$ に当てる）より $\prod_{j=1}^{m} r_j > 0$、仮定より $r_{m+1} > 0$ である。

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{m+1} r_j &= \Big(\prod_{j=1}^{m} r_j\Big) r_{m+1} \quad (\because \text{ 定義 1.61}) \\ &> 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ で } a > 0,\ b > 0 \text{ なら } ab > 0 \ (a \to \textstyle\prod_{j=1}^{m} r_j,\ b \to r_{m+1}) \text{ に前置きの 2 つの不等号を当てる}) \end{aligned}$$

である。 □

主張 1.63 (実数の積の有限積は有限積の積)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$x_1, \ldots, x_m,\ y_1, \ldots, y_m \in \mathbb{R}$ とする。有限積は 定義 1.61 による。このとき

$$\prod_{j=1}^{m} (x_j y_j) = \Big(\prod_{j=1}^{m} x_j\Big)\Big(\prod_{j=1}^{m} y_j\Big)$$

が成り立つ。

証明. m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{1} (x_j y_j) &= x_1 y_1 \quad (\because \text{ 定義 1.61 } (r_j \to x_j y_j)) \\ &= \Big(\prod_{j=1}^{1} x_j\Big)\Big(\prod_{j=1}^{1} y_j\Big) \quad (\because \text{ 定義 1.61 } (r_j \to x_j,\ r_j \to y_j) \text{ を 2 箇所へ同時に、右辺から左辺へ}) \end{aligned}$$

である。m で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{m+1} (x_j y_j) &= \Big(\prod_{j=1}^{m} (x_j y_j)\Big)(x_{m+1} y_{m+1}) \quad (\because \text{ 定義 1.61 } (r_j \to x_j y_j)) \\ &= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{m} x_j\Big)\Big(\prod_{j=1}^{m} y_j\Big)\Big)(x_{m+1} y_{m+1}) \quad (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\ &= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{m} x_j\Big) x_{m+1}\Big)\Big(\Big(\prod_{j=1}^{m} y_j\Big) y_{m+1}\Big) \quad (\because \mathbb{R} \text{ で } (ab)(cd) = (ac)(bd) \text{ (乗法の交換則と結合則)}) \\ &= \Big(\prod_{j=1}^{m+1} x_j\Big)\Big(\prod_{j=1}^{m+1} y_j\Big) \quad (\because \text{ 定義 1.61 } (r_j \to x_j,\ r_j \to y_j) \text{ を 2 箇所へ同時に、右辺から左辺へ}) \end{aligned}$$

である。 □

定義 1.64 (複素数の冪)**.** $z \in \mathbb{C}$ と $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について、冪 $z^m \in \mathbb{C}$ を m についての帰納法で

$$z^0 := 1_{\mathbb{C}}, \qquad z^{m+1} := z^m\, z$$

と定める。積は 定義 1.12 の積、$1_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記である。

主張 1.65 (0 の因子を持つ複素数の有限積は 0)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$z_1, \ldots, z_m \in \mathbb{C}$、$n \in \{1, \ldots, m\}$ とし、$z_n = 0_{\mathbb{C}}$ とする。有限積は 定義 1.60、$0_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記による。このとき

$$\prod_{j=1}^{m} z_j = 0_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。

証明. m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき $n = 1$ であり、

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{1} z_j &= z_1 \quad (\because \text{ 定義 1.60}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because\ n = 1 \text{ と } z_n = 0_{\mathbb{C}}) \end{aligned}$$

m で成り立つと仮定し、$z_1, \ldots, z_{m+1} \in \mathbb{C}$、$n \in \{1, \ldots, m+1\}$、$z_n = 0_{\mathbb{C}}$ とする。$n = m+1$ のとき

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{m+1} z_j &= \Big(\prod_{j=1}^{m} z_j\Big) z_{m+1} \quad (\because \text{ 定義 1.60}) \\ &= \Big(\prod_{j=1}^{m} z_j\Big) 0_{\mathbb{C}} \qquad (\because\ n = m+1 \text{ と } z_n = 0_{\mathbb{C}}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} \qquad (\because \text{ 主張 1.59}) \end{aligned}$$

$n \in \{1, \ldots, m\}$ のとき

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{m+1} z_j &= \Big(\prod_{j=1}^{m} z_j\Big) z_{m+1} \quad (\because \text{ 定義 1.60}) \\ &= 0_{\mathbb{C}}\, z_{m+1} \qquad (\because \text{ 帰納法の仮定を } z_1, \ldots, z_m \text{ と } n \text{ へ}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} \qquad (\because \text{ 主張 1.58}) \end{aligned}$$

□

主張 1.66 (1 の有限積は 1)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について $\prod_{j=1}^{m} 1_{\mathbb{C}} = 1_{\mathbb{C}}$ が成り立つ。有限積は 定義 1.60、$1_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記である。

証明. m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき

$$\prod_{j=1}^{1} 1_{\mathbb{C}} = 1_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{ 定義 1.60})$$

m で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{m+1} 1_{\mathbb{C}} &= \Big(\prod_{j=1}^{m} 1_{\mathbb{C}}\Big) 1_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{ 定義 1.60}) \\ &= 1_{\mathbb{C}}\, 1_{\mathbb{C}} \qquad (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\ &= 1_{\mathbb{C}} \qquad (\because \text{ 主張 1.56 の乗法の単位元}) \end{aligned}$$

□

主張 1.67 (実数の包含の有限積は実数の包含)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$z_1, \ldots, z_m \in \mathbb{C}$ とし、各 $j \in \{1, \ldots, m\}$ について $z_j = (r_j)_{\mathbb{C}}$ を満たす $r_j \in \mathbb{R}$ が存在するとする。有限積は 定義 1.60、$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記による。このとき

$$\prod_{j=1}^{m} z_j = r_{\mathbb{C}}$$

を満たす $r \in \mathbb{R}$ が存在する。

証明. m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき、仮定の $r_1 \in \mathbb{R}$ を取ると

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{1} z_j &= z_1 && (\because \text{ 定義 1.60}) \\ &= (r_1)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 仮定を } j = 1 \text{ で}) \end{aligned}$$

であり、$r := r_1$ が求めるものである。m で成り立つと仮定し、$z_1, \ldots, z_{m+1} \in \mathbb{C}$ の各 z_j が $z_j = (r_j)_{\mathbb{C}}$（$r_j \in \mathbb{R}$）を満たすとする。帰納法の仮定を $z_1, \ldots, z_m$ に適用して、$\prod_{j=1}^{m} z_j = s_{\mathbb{C}}$ を満たす $s \in \mathbb{R}$ を取ると

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{m+1} z_j &= \Big(\prod_{j=1}^{m} z_j\Big) z_{m+1} && (\because \text{ 定義 1.60}) \\ &= s_{\mathbb{C}}\, z_{m+1} && (\because \text{ } s \text{ の取り方}) \\ &= s_{\mathbb{C}}\, (r_{m+1})_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 仮定を } j = m+1 \text{ で}) \\ &= (s\, r_{m+1})_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.29 } (a \to s,\ b \to r_{m+1})) \end{aligned}$$

であり、$r := s\, r_{m+1} \in \mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ の積）が求めるものである。 □

主張 1.68 (一つの項のほかが 0 の有限和はその項に等しい)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$z_1, \ldots, z_m \in \mathbb{C}$、$n \in \{1, \ldots, m\}$ とし、$j \neq n$ のすべての $j \in \{1, \ldots, m\}$ について $z_j = 0_{\mathbb{C}}$ とする。有限和は 定義 1.16、$0_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記による。このとき

$$\sum_{j=1}^{m} z_j = z_n$$

が成り立つ。

証明. m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき $n = 1$ であり、

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{1} z_j &= z_1 && (\because \text{ 定義 1.16}) \\ &= z_n && (\because \text{ } n = 1) \end{aligned}$$

m で成り立つと仮定し、$z_1, \ldots, z_{m+1} \in \mathbb{C}$、$n \in \{1, \ldots, m+1\}$ が仮定を満たすとする。$n = m+1$ のとき、$j \in \{1, \ldots, m\}$ はどれも $j \neq n$ なので

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{m+1} z_j &= \Big(\sum_{j=1}^{m} z_j\Big) + z_{m+1} && (\because \text{ 定義 1.16}) \\ &= \Big(\sum_{j=1}^{m} 0_{\mathbb{C}}\Big) + z_{m+1} && (\because \text{ } j \leq m \text{ のとき } z_j = 0_{\mathbb{C}} \text{ を各項へ同時に適用}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} + z_{m+1} && (\because \text{ 主張 1.18}) \\ &= z_{m+1} && (\because \text{ 主張 1.56 の加法の単位元}) \\ &= z_n && (\because \text{ } n = m+1) \end{aligned}$$

$n \in \{1, \dots, m\}$ のとき、$m+1 \neq n$ なので $z_{m+1} = 0_{\mathbb{C}}$ であり、

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{m+1} z_j &= \Big(\sum_{j=1}^{m} z_j\Big) + z_{m+1} && (\because \text{ 定義 1.16}) \\
&= z_n + z_{m+1} && (\because \text{ 帰納法の仮定を } z_1, \dots, z_m \text{ と } n \text{ へ}) \\
&= z_n + 0_{\mathbb{C}} && (\because \ z_{m+1} = 0_{\mathbb{C}}) \\
&= z_n && (\because \text{ 主張 1.56 の加法の単位元})
\end{aligned}$$

□

定義 1.69 (複素数から極座標同値類への写像)**.** 定義 1.47 の同値類と、定義 1.4、定義 1.40 を用いる。

$\phi_{\text{polar}} : \mathbb{C} \to$ (極座標表現) を次で定める。

$$\phi_{\text{polar}}(x,y) := \begin{cases}
\Big[\big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x)\big)\Big]_{\sim} & (x > 0), \\
\Big[\big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x) + \pi\big)\Big]_{\sim} & (x < 0,\ y \geq 0), \\
\Big[\big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x) - \pi\big)\Big]_{\sim} & (x < 0,\ y < 0), \\
[(y, \pi/2)]_{\sim} & (x = 0,\ y > 0), \\
[(-y, -\pi/2)]_{\sim} & (x = 0,\ y < 0), \\
[(0,0)]_{\sim} & (x = 0,\ y = 0).
\end{cases}$$

定義 1.70 (極座標同値類から複素数への写像)**.** 定義 1.47 の商集合と 定義 1.43 の関係を使う。以下の式に必要な正弦・余弦は、現在の 定義 1.38 と 定義 1.41 では主値区間に限られている。全実数上への拡張と周期性が未整備のため、以下の写像定義と代表元独立性の説明は未完である。

$\phi_{\text{cartesian}} :$ (極座標表現) $\to \mathbb{C}$ を次で定める。

$$\phi_{\text{cartesian}}([(r,\theta)]_{\sim}) := (r\cos\theta,\ r\sin\theta)$$

この右辺は同値類の代表元の取り方によらないので、$\phi_{\text{cartesian}}$ は well-defined である。実際、

$$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} = [\theta']_{\sim_{\text{angle}}} \Rightarrow \exists n \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } \theta - \theta' = 2n\pi \Rightarrow \cos\theta = \cos\theta',\ \sin\theta = \sin\theta'$$

主張 1.71 ($\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$)**.** 定義 1.69 と 定義 1.70 の写像を用いる。定義 1.70 は正弦・余弦が主値区間でしか定まっていないため未完であり（$x < 0$ の場合は主値区間の外の角を使う)、この主張もそれが整うまで未完である。

$(x,y) \in \mathbb{C}$ について、$(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) = (x,y)$。すなわち $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$。

証明. 定義 1.69 の場合分けに沿って場合ごとに示す。場合分けなので全体を 1 つの式変形にはできないが、各場合の中の計算はそれぞれ一続きにする。

$x > 0$ の場合。

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\big(\phi_{\text{polar}}(x,y)\big) && (\because \text{ 写像の合成の定義})\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\big[(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(y/x))\big]_{\sim}\Big) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x>0 \text{ の場合。定義 1.69})\\
&= \Big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos(\arctan(y/x)),\ \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin(\arctan(y/x))\Big) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}(y/x)}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \text{ arctan の } \cos,\sin \text{。主張 1.42})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{x\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{x\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because x>0 \text{ なので分母と分子に } x \text{ を掛けられる})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because x>0 \text{ と平方根の一意性から } x=\sqrt{x^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \text{。定義 1.4 主張 1.3})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2\big(1+(y/x)^2\big)}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2\big(1+(y/x)^2\big)}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \text{ 平方根の一意性から } \sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab} \text{。主張 1.3})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because x^2\big(1+(y/x)^2\big)=x^2+y^2)\\
&= (x,\ y) && (\because x>0 \text{ なので } \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\neq 0 \text{ で約分できる})
\end{aligned}
$$

$x<0$ の場合。$y\geq 0$ と $y<0$ で ϕ_{polar} の値は違うが、いずれも同じ式に着く。まず $y\geq 0$ のとき

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\big(\phi_{\text{polar}}(x,y)\big) && (\because \text{ 写像の合成の定義})\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\big[(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(y/x)+\pi)\big]_{\sim}\Big) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x<0,\ y\geq 0 \text{ の場合。定義 1.69})\\
&= \Big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos\big(\arctan(y/x)+\pi\big),\ \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin\big(\arctan(y/x)+\pi\big)\Big) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70})\\
&= \Big(-\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos(\arctan(y/x)),\ -\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin(\arctan(y/x))\Big) && (\because \cos(\theta+\pi)=-\cos\theta,\ \sin(\theta+\pi)=-\sin\theta)
\end{aligned}
$$

であり、$y<0$ のとき

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\big(\phi_{\text{polar}}(x,y)\big) && (\because \text{ 写像の合成の定義})\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\big[(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(y/x)-\pi)\big]_{\sim}\Big) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x<0,\ y<0 \text{ の場合。定義 1.69})\\
&= \Big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos\big(\arctan(y/x)-\pi\big),\ \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin\big(\arctan(y/x)-\pi\big)\Big) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70})\\
&= \Big(-\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos(\arctan(y/x)),\ -\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin(\arctan(y/x))\Big) && (\because \cos(\theta-\pi)=-\cos\theta,\ \sin(\theta-\pi)=-\sin\theta)
\end{aligned}
$$

である。いずれの場合も同じ式に着いたので、そこから続けると

$$
\begin{aligned}
&\Big(-\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos(\arctan(y/x)),\ -\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin(\arctan(y/x))\Big)\\
&= \left(-\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ -\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}(y/x)}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \text{ arctan の } \cos,\sin \text{。主張 1.42})\\
&= \left(-\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{x\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ -\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{x\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because x<0 \text{ なので分母と分子に } x \text{ を掛けられる})\\
&= \left(-\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{-\sqrt{(-x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ -\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{-\sqrt{(-x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because x<0 \text{ のとき } x=-\sqrt{(-x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \text{。定理 1.5})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{(-x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{(-x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \text{ 分子の負号と分母の負号が相殺する})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because (-x)^2=x^2)\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2\big(1+(y/x)^2\big)}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2\big(1+(y/x)^2\big)}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \text{ 平方根の一意性から } \sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab} \text{。主張 1.3})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because x^2\big(1+(y/x)^2\big)=x^2+y^2)\\
&= (x,\ y) && (\because x<0 \text{ なので } \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\neq 0 \text{ で約分できる})
\end{aligned}
$$

$x=0$ かつ $y>0$ の場合。

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\big(\phi_{\text{polar}}(x,y)\big) && (\because \text{ 写像の合成の定義})\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\big([(y,\ \pi/2)]_\sim\big) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x=0,\ y>0 \text{ の場合。定義 1.69})\\
&= \big(y\cos(\pi/2),\ y\sin(\pi/2)\big) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70})\\
&= (y\cdot 0,\ y\cdot 1) && (\because \cos(\pi/2)=0,\ \sin(\pi/2)=1)\\
&= (0,\ y) && (\because \text{ 0 を因子にもつ積は 0, 1 は積の単位元})\\
&= (x,\ y) && (\because\ x=0)
\end{aligned}
$$

$x=0$ かつ $y<0$ の場合。

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\big(\phi_{\text{polar}}(x,y)\big) && (\because \text{ 写像の合成の定義})\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\big([(-y,\ -\pi/2)]_\sim\big) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x=0,\ y<0 \text{ の場合。定義 1.69})\\
&= \big((-y)\cos(-\pi/2),\ (-y)\sin(-\pi/2)\big) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70})\\
&= \big((-y)\cdot 0,\ (-y)\cdot(-1)\big) && (\because \cos(-\pi/2)=0,\ \sin(-\pi/2)=-1)\\
&= (0,\ y) && (\because \text{ 0 を因子にもつ積は 0, 負号を 2 度施すともとに戻る})\\
&= (x,\ y) && (\because\ x=0)
\end{aligned}
$$

$x=0$ かつ $y=0$ の場合。

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\big(\phi_{\text{polar}}(x,y)\big) && (\because \text{ 写像の合成の定義})\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\big([(0,\ 0)]_\sim\big) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x=0,\ y=0 \text{ の場合。定義 1.69})\\
&= (0\cdot\cos 0,\ 0\cdot\sin 0) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70})\\
&= (0,\ 0) && (\because \text{ 0 を因子にもつ積は 0})\\
&= (x,\ y) && (\because\ x=0 \text{ かつ } y=0)
\end{aligned}
$$

以上で ϕ_{polar} の定義のすべての場合について $(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) = (x,y)$ が示され、$\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ である。 □

主張 1.72 ($\phi_{\text{cartesian}}$の同型性)**.** （TODO: 原稿注記「体として同型を示す」あり）

$A, B \in$ (極座標表現) に対して次が成り立つ。

- $\phi_{\text{cartesian}}(A \cdot B) = \phi_{\text{cartesian}}(A) \cdot \phi_{\text{cartesian}}(B)$（モノイド準同型）
- $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射。

証明. モノイド準同型性。$[(r,\theta)]_\sim, [(r',\theta')]_\sim \in$ (極座標表現) に対して、

$$
\begin{aligned}
\phi_{\text{cartesian}}\big([(r,\theta)]_\sim \cdot [(r',\theta')]_\sim\big) &= \phi_{\text{cartesian}}\big([(rr',\theta+\theta')]_\sim\big) && (\because \text{ 極座標表現の演算})\\
&= \big(rr'\cos(\theta+\theta'),\ rr'\sin(\theta+\theta')\big) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義})\\
&= \big(rr'(\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta'),\ rr'(\cos\theta\sin\theta' + \sin\theta\cos\theta')\big) && (\because \text{ 三角関数の加法定理})\\
&= \big(rr'\cos\theta\cos\theta' - rr'\sin\theta\sin\theta',\ rr'\cos\theta\sin\theta' + rr'\sin\theta\cos\theta'\big) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})\\
&= \big((r\cos\theta)(r'\cos\theta') - (r\sin\theta)(r'\sin\theta'),\ (r\cos\theta)(r'\sin\theta') + (r\sin\theta)(r'\cos\theta')\big) && (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律と結合律})\\
&= (r\cos\theta,\ r\sin\theta)\cdot(r'\cos\theta',\ r'\sin\theta') && (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義})\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\big([(r,\theta)]_\sim\big) \cdot \phi_{\text{cartesian}}\big([(r',\theta')]_\sim\big) && (\because \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

である（引いたブロックは 定義 1.49、定義 1.70、定義 1.12）。

全単射性。主張 1.71 により $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ であるから、$\phi_{\text{cartesian}}$ は全射である。単射性の導出は原文に無く、この証明は未完である。 □

定義 1.73 (第 1 座標, 第 2 座標)**.** 定義 1.47 の同値類から、半径と 定義 1.43 による角度の同値類を取り出す。

$[(r,\theta)]_\sim \in$ (極座標表現) について、

$$\mathrm{pr}_1 : (\text{極座標表現}) \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad [(r,\theta)]_\sim \mapsto r$$

$$\mathrm{pr}_2 : (\text{極座標表現}) \to (\text{角度表現}), \quad [(r,\theta)]_\sim \mapsto \begin{cases} [0]_{\sim_{\mathrm{angle}}} & (r=0), \\ [\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}} & (r \neq 0). \end{cases}$$

定義 1.74 (絶対値, 偏角)**.** 定義 1.69、定義 1.73、定義 1.45 を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ について、

$|\cdot| : \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ を

$$|z| := \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z))$$

と定め、z の絶対値と呼ぶ。

$\arg^{[0,2\pi)} : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ を

$$\arg^{[0,2\pi)}(z) := s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z)))$$

と定め、z の偏角と呼ぶ。

主張 1.75 (絶対値の基本性質)**.** 定義 1.74 の絶対値 $|\cdot| : \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ について、次が成り立つ。

- (1) $z = (x,y) \in \mathbb{C}$ について $|z| = \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$。
- (2) $z = (x,y) \in \mathbb{C}$ について $|z|^2 = x^2 + y^2$。
- (3) $|z| = 0 \iff z = 0_{\mathbb{C}}$。
- (4) $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について $|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|$。
- (5) $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$。
- (6) $x \in \mathbb{R}$ について $|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)| = |x|$（右辺は実数の絶対値）。

ここで $\mathbb{C}$ の加法は 主張 1.56 で定めた $\mathbb{R}^2$ の成分ごとの加法である。

証明. 証明の中で使うものを先に置く。$z = (x,y) \in \mathbb{C}$、$z_1 = (a,b) \in \mathbb{C}$、$z_2 = (c,d) \in \mathbb{C}$ と書く（$x,y,a,b,c,d \in \mathbb{R}$）。

pr_1 が well-defined であること。定義 1.73 は $\mathrm{pr}_1([(r,\theta)]_\sim) := r$ と代表元を用いて定めている。$(r,\theta) \sim (r',\theta')$ とすると 定義 1.47 より $r = r' = 0$ または $r = r'$ であり、いずれの場合も $r = r'$ である。よって値は代表元によらない。

非負実数の平方の比較。$u, v \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について $u^2 \leq v^2$ ならば $u \leq v$ である。対偶を示す。$u > v\ (\geq 0)$ とすると $u > 0$ であり、

$$\begin{aligned} u^2 &= u \cdot u && (\because \text{ 平方の定め方}) \\ &> v \cdot u && (\because\ u > v \text{ と } u > 0\text{。正の元を掛けても大小は保たれる}) \\ &\geq v \cdot v && (\because\ u \geq v \text{ と } v \geq 0\text{。非負の元を掛けても大小は保たれる}) \\ &= v^2 && (\because \text{ 平方の定め方}) \end{aligned}$$

であるから $u^2 > v^2$ である。とくに $u, v \geq 0$ かつ $u^2 = v^2$ ならば $u \leq v$ かつ $v \leq u$ より $u = v$ である。

以下、6 つの主張を順に示す。

(1) 成分による表示。定義 1.74 より $|z| = \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z))$ であるから、定義 1.69 の場合分けに従って計算する。

$$\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(x,y)) = \begin{cases} \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x>0), \\ \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x<0,\ y\geq 0), \\ \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x<0,\ y<0), \\ y & (x=0,\ y>0), \\ -y & (x=0,\ y<0), \\ 0 & (x=0,\ y=0). \end{cases}$$

上 3 つの場合は主張の形をしている。残りの 3 つの場合を確かめる。以下、定義 1.4 より $\sqrt{s}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ は $u \geq 0$ かつ $u^2 = s$ を満たす唯一の u であることを使う。

$x = 0,\ y > 0$ のとき、

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{0^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ x = 0) \\ &= \sqrt{0+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\ &= \sqrt{y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\ &= y && (\because\ y > 0 \text{ なので } y \geq 0 \text{ であり } y^2 = y^2\text{。平方根の一意性}) \\ &= \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(x,y)) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ の定義の } x = 0,\ y > 0 \text{ の場合}) \end{aligned}$$

$x = 0,\ y < 0$ のとき、

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{0^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ x = 0) \\ &= \sqrt{0+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\ &= \sqrt{y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\ &= \sqrt{(-y)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } (-y)^2 = y^2) \\ &= -y && (\because\ y < 0 \text{ なので } -y \geq 0 \text{ であり } (-y)^2 = (-y)^2\text{。平方根の一意性}) \\ &= \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(x,y)) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ の定義の } x = 0,\ y < 0 \text{ の場合}) \end{aligned}$$

$x = 0,\ y = 0$ のとき、

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{0^2+0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ x = 0 \text{ かつ } y = 0) \\ &= \sqrt{0+0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0\text{。2 箇所へ適用}) \\ &= \sqrt{0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\ &= 0 && (\because\ 0 \geq 0 \text{ であり } 0^2 = 0\text{。平方根の一意性}) \\ &= \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(x,y)) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ の定義の } x = 0,\ y = 0 \text{ の場合}) \end{aligned}$$

以上より、すべての場合で $|z| = \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ である。

(2) 絶対値の平方。

$$\begin{aligned} |z|^2 &= \left(\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 && (\because\ \text{上で示した成分による表示}) \\ &= x^2+y^2 && (\because\ x^2+y^2 \geq 0 \text{ と、平方根の定義 } \left(\sqrt{s}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = s) \end{aligned}$$

(3) 絶対値が 0 であることと $z = 0_{\mathbb{C}}$ であることの同値。2 つの向きを別々に示す。

$|z| = 0$ とすると、

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 = |z|^2 \quad & (\because \text{ 上で示した絶対値の平方}) \\ = 0^2 \quad & (\because \text{ 仮定 } |z| = 0) \\ = 0 \quad & (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \end{aligned}$$

である。主張 1.55 の「零でないことと平方和が正であることの同値」で示したとおり $x^2 + y^2 = 0 \iff (x, y) = (0, 0)$ であるから $z = 0_{\mathbb{C}}$ である。逆に $z = 0_{\mathbb{C}} = (0, 0)$ とすると、

$$\begin{aligned} |z| = \sqrt{0^2 + 0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad & (\because \text{ 上で示した成分による表示と } z = (0, 0)) \\ = 0 \quad & (\because \text{ 上の } x = 0,\ y = 0 \text{ の場合の計算}) \end{aligned}$$

(4) 積の絶対値。

$$\begin{aligned} |z_1 z_2|^2 = |(ac - bd,\ ad + bc)|^2 \quad & (\because \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\ = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 \quad & (\because \text{ 上で示した絶対値の平方}) \\ = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \quad & (\because \text{ 複素数の乗法群の「積について閉じること」の恒等式}) \\ = |z_1|^2 |z_2|^2 \quad & (\because \text{ 上で示した絶対値の平方。2 箇所へ適用}) \\ = (|z_1|\,|z_2|)^2 \quad & (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律と結合律}) \end{aligned}$$

定義 1.12、主張 1.55。$|z_1 z_2| \geq 0$ かつ $|z_1|\,|z_2| \geq 0$ であるから、上で示した非負実数の平方の比較より $|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|$ である。

Lagrange の恒等式。$a, b, c, d \in \mathbb{R}$ について次が成り立つ。

$$\begin{aligned} (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 &= \left(a^2c^2 + 2abcd + b^2d^2\right) + \left(a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律。2 箇所へ適用}) \\ &= \left(a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2\right) + (2abcd + (-2abcd)) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律と結合律}) \\ &= \left(a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2\right) + 0 && (\because -2abcd \text{ は } 2abcd \text{ の和の逆元}) \\ &= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元}) \\ &= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \end{aligned}$$

Cauchy–Schwarz の不等式（2 成分の場合）。

$$\begin{aligned} (ac + bd)^2 \leq (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 \quad & (\because \mathbb{R} \text{ では平方は非負であることと、和が順序を保つこと}) \\ = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \quad & (\because \text{ 上で示した Lagrange の恒等式}) \\ = |z_1|^2 |z_2|^2 \quad & (\because \text{ 上で示した絶対値の平方。2 箇所へ適用}) \\ = (|z_1|\,|z_2|)^2 \quad & (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律と結合律}) \end{aligned}$$

$ac + bd \leq 0$ のときは $ac + bd \leq 0 \leq |z_1|\,|z_2|$ である。$ac + bd > 0$ のときは、上で示した非負実数の平方の比較を $u = ac + bd$、$v = |z_1|\,|z_2|$ に適用して $ac + bd \leq |z_1|\,|z_2|$ である。いずれの場合も

$$ac + bd \leq |z_1|\,|z_2|$$

が成り立つ。

(5) 三角不等式。

$$
\begin{aligned}
|z_1+z_2|^2 &= |(a+c,\ b+d)|^2 && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の成分ごとの加法})\\
&= (a+c)^2+(b+d)^2 && (\because\ \text{上で示した絶対値の平方})\\
&= \left(a^2+b^2\right)+\left(c^2+d^2\right)+2(ac+bd) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配律と、和の可換律・結合律})\\
&= |z_1|^2+|z_2|^2+2(ac+bd) && (\because\ \text{上で示した絶対値の平方。2 箇所へ適用})\\
&\le |z_1|^2+|z_2|^2+2|z_1|\,|z_2| && (\because\ \text{上で示した Cauchy–Schwarz の不等式と、和が順序を保つこと})\\
&= (|z_1|+|z_2|)^2 && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配律})
\end{aligned}
$$

主張 1.56。$|z_1+z_2|\ge 0$ かつ $|z_1|+|z_2|\ge 0$ であるから、上で示した非負実数の平方の比較より $|z_1+z_2|\le |z_1|+|z_2|$ である。

(6) 実数の絶対値との一致。

$$
\begin{aligned}
|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)| &= |(x,0)| && (\because\ \mathbb{R}\ \text{から}\ \mathbb{C}\ \text{への包含写像の定め方})\\
&= \sqrt{x^2+0^2}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} && (\because\ \text{上で示した成分による表示})\\
&= \sqrt{x^2+0}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{では}\ 0\ \text{を因子にもつ積は}\ 0)\\
&= \sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{では}\ 0\ \text{は和の単位元})
\end{aligned}
$$

定義 1.13。あとは x の符号で場合を分ける。$x\ge 0$ のときは

$$
\begin{aligned}
\sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} &= x && (\because\ x\ge 0\ \text{であり}\ x^2=x^2\text{。平方根の一意性})\\
&= |x| && (\because\ x\ge 0\ \text{における実数の絶対値の定め方})
\end{aligned}
$$

であり、$x<0$ のときは

$$
\begin{aligned}
\sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} &= \sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{では}\ (-x)^2=x^2)\\
&= -x && (\because\ x<0\ \text{なので}\ -x\ge 0\ \text{であり}\ (-x)^2=(-x)^2\text{。平方根の一意性})\\
&= |x| && (\because\ x<0\ \text{における実数の絶対値の定め方})
\end{aligned}
$$

である。いずれの場合も $|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)|=|x|$ である。 □

主張 1.76. 定義 1.69 と 定義 1.45 を使う。非零性との同値には 主張 1.75、積の計算には 定義 1.49 を用いる。

$z_1,z_2\in\mathbb{C}$ について、$r_1,r_2\in\mathbb{R}_{\ge 0}$、$\theta_1,\theta_2\in\mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\text{polar}}(z_i)=[(r_i,\theta_i)]_\sim$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z_i)=\theta_i-2n_i\pi$（$n_i\in\mathbb{Z}$）とする。さらに $r_1\ne 0$ かつ $r_2\ne 0$ とする（定義 1.74 と 定義 1.73 により $r_i=|z_i|$ なので、これは $z_1\ne 0$ かつ $z_2\ne 0$ と同じことである）。このとき

$$
\arg^{[0,2\pi)}(z_1z_2)=\begin{cases}\arg^{[0,2\pi)}(z_1)+\arg^{[0,2\pi)}(z_2) & (0\le\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi<2\pi)\\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1)+\arg^{[0,2\pi)}(z_2)-2\pi & (2\pi\le\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi<4\pi)\end{cases}
$$

が成り立つ。$r_1\ne 0$ かつ $r_2\ne 0$ を落とすと主張は成り立たない。たとえば $z_1=0$、$z_2=(0,1)$ では左辺が 0、右辺が $\pi/2$ になる。

証明. 証明の中で使うものを 2 つ先に置く。

第一に、ϕ_{polar} は積を保つ。実際 主張 1.72 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\text{cartesian}}\circ\phi_{\text{polar}}=\mathrm{id}_{\mathbb{C}}$（主張 1.71）なので、$\phi_{\text{polar}}$ は $\phi_{\text{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$
\phi_{\text{polar}}(z_1z_2)=\phi_{\text{polar}}(z_1)\cdot\phi_{\text{polar}}(z_2)
$$

である。第二に、$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ なので $r_1 r_2 \neq 0$ である（実数の積は、因子がどちらも 0 でなければ 0 でない）。

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2))) && (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 1.74}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z_2))) && (\because \phi_{\mathrm{polar}} \text{ が積を保つこと}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1,\theta_1)]_\sim \cdot [(r_2,\theta_2)]_\sim)) && (\because r_i, \theta_i \text{ の取り方}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1 r_2, \theta_1+\theta_2)]_\sim)) && (\because \text{極座標表現の演算。定義 1.49}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合（定義 1.73）と } r_1 r_2 \neq 0)
\end{aligned}$$

である。

ここから先は $\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi$ の値で 2 つに分かれる。

$0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 2\pi$ のとき。この不等式は 主張 1.44 が一意に定める整数が $n_1 + n_2$ であることを言っているので、

$$\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) &= \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi && (\because \text{角度表現の切断の定義（定義 1.45）と、この場合の不等式（主張 1.44）}) \\
&= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定})
\end{aligned}$$

である。

$2\pi \leq \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi < 4\pi$ のとき。両辺から 2π を引けば $0 \leq \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2+1)\pi < 2\pi$ なので、主張 1.44 が一意に定める整数は $n_1 + n_2 + 1$ である。したがって

$$\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) &= \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2+1)\pi && (\because \text{角度表現の切断の定義（定義 1.45）と、いま見た不等式（主張 1.44）}) \\
&= (\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi) - 2\pi && (\because 2(n_1+n_2+1)\pi = 2(n_1+n_2)\pi + 2\pi) \\
&= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) - 2\pi && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + (\theta_2 - 2n_2\pi) - 2\pi && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定})
\end{aligned}$$

である。 □

主張 1.77. 定義 1.69 と 定義 1.45 を使う。非零性との同値には 主張 1.75、積の計算には 定義 1.49 を用いる。

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、$r_1, r_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\mathrm{polar}}(z_i) = [(r_i, \theta_i)]_\sim$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z_i) = \theta_i - 2n_i\pi$（$n_i \in \mathbb{Z}$）とする。さらに $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ とする（定義 1.74 と 定義 1.73 により $r_i = |z_i|$ なので、これは $z_1 \neq 0$ かつ $z_2 \neq 0$ と同じことである）。このとき

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) & (0 \leq \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1-n_2)\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) + 2\pi & (-2\pi < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1-n_2)\pi < 0) \end{cases}$$

が成り立つ。$r_2 \neq 0$ は商 z_1/z_2 が定まるために要る（主張 1.55）。$r_1 \neq 0$ も落とせない。たとえば $z_1 = 0$、$z_2 = (0,1)$ では左辺が 0、右辺が $-\pi/2 + 2\pi$ になる。

証明. 証明の中で使うものを 4 つ先に置く。

第一に、ϕ_{polar} は積を保つ。実際 主張 1.72 より $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\mathrm{cartesian}} \circ \phi_{\mathrm{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$（主張 1.71）なので、$\phi_{\mathrm{polar}}$ は $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\mathrm{polar}}(zz') = \phi_{\mathrm{polar}}(z) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z')$$

が任意の $z, z' \in \mathbb{C}$ について成り立つ。

第二に、ϕ_{polar} による逆元の像を求める。$r_2 \neq 0$ すなわち $z_2 \neq 0$ なので $z_2^{-1} \in \mathbb{C}$ が定まり（主張 1.55）、

$$\begin{aligned}
\phi_{\mathrm{polar}}(z_2)\cdot\phi_{\mathrm{polar}}(z_2^{-1}) &= \phi_{\mathrm{polar}}(z_2\, z_2^{-1}) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ が積を保つこと})\\
&= \phi_{\mathrm{polar}}(1_{\mathbb{C}}) && (\because\ z_2^{-1} \text{ が } z_2 \text{ の逆元であること})\\
&= [(1,0)]_{\sim} && (\because\ \text{モノイド準同型の逆写像は単位元を単位元へ写すこと。} [(1,0)]_{\sim} \text{ は 主張 1.50 の単位元})
\end{aligned}$$

である。したがって $\phi_{\mathrm{polar}}(z_2^{-1})$ は $\phi_{\mathrm{polar}}(z_2) = [(r_2, \theta_2)]_{\sim}$ に右から掛けて $[(1,0)]_{\sim}$ になる元であり、$r_2 \neq 0$ と 主張 1.53 により

$$\phi_{\mathrm{polar}}(z_2^{-1}) = [(1/r_2, -\theta_2)]_{\sim}$$

である。

第三に、$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ なので $r_1/r_2 \neq 0$ である（実数の商は、分子が 0 でなければ 0 でない）。

第四に、$\arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi$ と $\arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi$ はどちらも $[0, 2\pi)$ の元なので（定義 1.74）、その差について

$$-2\pi < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 2\pi$$

が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2^{-1}) && (\because\ \mathbb{C}\text{の乗法群の } z^{-1} = 1/z_{\circ} \text{ 主張 1.55})\\
&= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2^{-1}))\big) && (\because\ \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 1.74})\\
&= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1)\cdot\phi_{\mathrm{polar}}(z_2^{-1}))\big) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ が積を保つこと})\\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1,\theta_1)]_{\sim}\cdot[(1/r_2,-\theta_2)]_{\sim})) && (\because\ r_1, \theta_1 \text{ の取り方と、上で見た } \phi_{\mathrm{polar}}(z_2^{-1}) \text{ の形})\\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1\cdot(1/r_2),\ \theta_1+(-\theta_2))]_{\sim})) && (\because\ \text{極座標表現の演算。定義 1.49})\\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1/r_2,\ \theta_1-\theta_2)]_{\sim})) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の商と差の定義})\\
&= s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1-\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because\ \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合（定義 1.73）と } r_1/r_2 \neq 0)
\end{aligned}$$

である。

ここから先は $\theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi$ の値で 2 つに分かれる。第四の準備によりこの値は $(-2\pi, 2\pi)$ にあるので、この 2 つで尽きている。

$0 \leq \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 2\pi$ のとき。この不等式は 主張 1.44 が一意に定める整数が $n_1 - n_2$ であることを言っているので、

$$\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1-\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) &= \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi && (\because\ \text{角度表現の切断の定義（定義 1.45）と、この場合の不等式（主張 1.44）})\\
&= (\theta_1 - 2n_1\pi) - (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律})\\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定})\\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定})
\end{aligned}$$

である。

$-2\pi < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 0$ のとき。各辺に 2π を足せば $0 < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2 - 1)\pi < 2\pi$ なので、主張 1.44 が一意に定める整数は $n_1 - n_2 - 1$ である。したがって

$$\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1-\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) &= \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2 - 1)\pi && (\because\ \text{角度表現の切断の定義（定義 1.45）と、いま見た不等式（主張 1.44）})\\
&= (\theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi) + 2\pi && (\because\ 2(n_1 - n_2 - 1)\pi = 2(n_1 - n_2)\pi - 2\pi)\\
&= (\theta_1 - 2n_1\pi) - (\theta_2 - 2n_2\pi) + 2\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律})\\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - (\theta_2 - 2n_2\pi) + 2\pi && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定})\\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) + 2\pi && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定})
\end{aligned}$$

である。 □

主張 1.78. 定義 1.69、定義 1.74 を使い、半径の非零性と複素数の非零性の同値には 主張 1.75 を用いる。

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、$r_1, r_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\mathrm{polar}}(z_i) = [(r_i, \theta_i)]_\sim$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z_i) = \theta_i - 2n_i\pi$（$n_i \in \mathbb{Z}$）とする。さらに $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$（すなわち $z_1 \neq 0$ かつ $z_2 \neq 0$）とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \pi$ とする。このとき

$$\begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \pi & (0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \pi + 2\pi & (2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi) \end{cases}$$

が成り立つ。場合分けの条件に現れる整数は $n_1 + n_2$ であって、条件を満たす整数が存在すること（$\exists m \in \mathbb{Z}$）ではない。主張 1.44 により $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2m\pi < 2\pi$ を満たす整数 m はつねに存在し、同様に $2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2m'\pi < 4\pi$ を満たす整数 m' もつねに存在する（$m' = m - 1$ と取ればよい）ので、存在の形で書くと 2 つの場合がつねに同時に成り立ち、$\pi = \pi + 2\pi$ という偽の等式が出てしまう。

$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ が要るのは 主張 1.76 を使うためである。

証明. $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi$ のとき。

$$\begin{aligned} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) && (\because \text{ この場合の不等式と複素数の積の } \arg \text{ の主張（主張 1.76）}) \\ &= \pi && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \pi \text{ という仮定}) \end{aligned}$$

である。あわせて、この場合の $\theta_1 + \theta_2$ の値も定まる。

$$\begin{aligned} \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi &= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定}) \\ &= \pi && (\because \text{ いま示したこと}) \end{aligned}$$

$2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi$ のとき。

$$\begin{aligned} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) &= \left(\arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi\right) + 2\pi && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の逆元と単位元}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) + 2\pi && (\because \text{ この場合の不等式と複素数の積の } \arg \text{ の主張（主張 1.76）}) \\ &= \pi + 2\pi && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \pi \text{ という仮定}) \end{aligned}$$

である。あわせて、この場合の $\theta_1 + \theta_2$ の値も定まる。

$$\begin{aligned} \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2 + 1)\pi &= (\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi) - 2\pi && (\because 2(n_1 + n_2 + 1)\pi = 2(n_1 + n_2)\pi + 2\pi) \\ &= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) - 2\pi && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + (\theta_2 - 2n_2\pi) - 2\pi && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\ &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定}) \\ &= \pi && (\because \text{ いま示したこと}) \end{aligned}$$

□

主張 1.79 (ℂの自乗の arg)**.** 定義 1.69、定義 1.49、定義 1.45 を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ について、$r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(r, \theta)]_\sim$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$（$n \in \mathbb{Z}$）とする。このとき

$$\arg^{[0,2\pi)}(z^2) = \begin{cases} 2\arg^{[0,2\pi)}(z) & (0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi) \\ 2\arg^{[0,2\pi)}(z) - 2\pi & (\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

が成り立つ。定義 1.74 より $\arg^{[0,2\pi)}(z) \in [0, 2\pi)$ なので、2 つの場合はちょうど一方だけが成り立つ。

証明. 証明の中で使うものを 1 つ先に置く。ϕ_{polar} は積を保つ。実際 主張 1.72 より $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\mathrm{cartesian}} \circ \phi_{\mathrm{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$（主張 1.71）なので、$\phi_{\mathrm{polar}}$ は $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\mathrm{polar}}(z^2) = \phi_{\mathrm{polar}}(z) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z)$$

である。

ここから先は r が 0 かどうかで分かれる。定義 1.73 の pr_2 が $r = 0$ のとき $[0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$ を返す定義になっているためである。

$r = 0$ のとき。まず

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z) &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z))) && (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義（定義 1.74）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(0,\theta)]_\sim)) && (\because r = 0 \text{ という、この場合の仮定}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r = 0 \text{ の場合（定義 1.73）}) \\
&= 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi && (\because \text{角度表現の切断の定義（定義 1.45）と } 0 \le 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi < 2\pi) \\
&= 0 && (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0 \text{ であり、 } 0 \text{ は和の単位元})
\end{aligned}$$

であり、したがって $0 \le \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi$ すなわち第 1 の場合にあたる。一方

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z^2) &= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z^2))\big) && (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義（定義 1.74）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z))) && (\because \phi_{\mathrm{polar}} \text{ が積を保つこと（主張 1.72）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(0,\theta)]_\sim \cdot [(0,\theta)]_\sim)) && (\because r = 0 \text{ という、この場合の仮定}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(0 \cdot 0, \theta + \theta)]_\sim)) && (\because \text{極座標表現の演算（定義 1.49）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(0,\theta+\theta)]_\sim)) && (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r = 0 \text{ の場合（定義 1.73）}) \\
&= 0 && (\because \text{いま見た } \arg^{[0,2\pi)}(z) \text{ の計算の最後の 2 段}) \\
&= 2 \cdot 0 && (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\
&= 2 \arg^{[0,2\pi)}(z) && (\because \text{いま見た } \arg^{[0,2\pi)}(z) = 0)
\end{aligned}$$

であり、主張の第 1 の場合の等式が成り立つ。

$r \neq 0$ のとき。$r \neq 0$ なので $r \cdot r \neq 0$ である（実数の積は、因子がどちらも 0 でなければ 0 でない）。したがって

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z^2) &= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z^2))\big) && (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義（定義 1.74）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z))) && (\because \phi_{\mathrm{polar}} \text{ が積を保つこと（主張 1.72）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r,\theta)]_\sim \cdot [(r,\theta)]_\sim)) && (\because r, \theta \text{ の取り方}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r \cdot r, \theta + \theta)]_\sim)) && (\because \text{極座標表現の演算（定義 1.49）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big([\theta + \theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合（定義 1.73）と } r \cdot r \neq 0)
\end{aligned}$$

である。ここから先は $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ の値でさらに 2 つに分かれる。

$0 \le \theta - 2n\pi < \pi$ のとき。

$$\begin{aligned}
& 0 \le \theta - 2n\pi < \pi \\
\Longrightarrow\ & 0 \le 2(\theta - 2n\pi) < 2\pi && (\because \text{各辺に正の数2 を掛けても不等号は保たれる}) \\
\Longrightarrow\ & 0 \le (\theta + \theta) - 2(2n)\pi < 2\pi && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}$$

なので、主張 1.44 が一意に定める整数は $2n$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\left([\theta+\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\right) &= (\theta+\theta)-2(2n)\pi && (\because \text{ 角度表現の切断の定義（定義 1.45）と、いま見た不等式（主張 1.44）}) \\
&= (\theta-2n\pi)+(\theta-2n\pi) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z)+(\theta-2n\pi) && (\because \ \arg^{[0,2\pi)}(z)=\theta-2n\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z)+\arg^{[0,2\pi)}(z) && (\because \ \arg^{[0,2\pi)}(z)=\theta-2n\pi \text{ という仮定}) \\
&= 2\arg^{[0,2\pi)}(z) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の分配律と } 1 \text{ が積の単位元であること})
\end{aligned}
$$

である。この場合の条件 $0 \leq \theta - 2n\pi < \pi$ は、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ により主張の第 1 の場合の条件 $0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi$ と同じである。

$\pi \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ のとき。

$$
\begin{aligned}
& \pi \leq \theta - 2n\pi < 2\pi \\
\Longrightarrow\ & 2\pi \leq 2(\theta-2n\pi) < 4\pi && (\because \text{ 各辺に正の数2 を掛けても不等号は保たれる}) \\
\Longrightarrow\ & 2\pi \leq (\theta+\theta)-2(2n)\pi < 4\pi && (\because \ \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
\Longrightarrow\ & 0 \leq (\theta+\theta)-2(2n)\pi - 2\pi < 2\pi && (\because \text{ 各辺から}2\pi \text{ を引いても不等号は保たれる}) \\
\Longrightarrow\ & 0 \leq (\theta+\theta)-2(2n+1)\pi < 2\pi && (\because \ 2(2n)\pi + 2\pi = 2(2n+1)\pi)
\end{aligned}
$$

なので、主張 1.44 が一意に定める整数は $2n+1$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\left([\theta+\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\right) &= (\theta+\theta)-2(2n+1)\pi && (\because \text{ 角度表現の切断の定義（定義 1.45）と、いま見た不等式（主張 1.44）}) \\
&= ((\theta+\theta)-2(2n)\pi)-2\pi && (\because \ 2(2n+1)\pi = 2(2n)\pi + 2\pi) \\
&= (\theta-2n\pi)+(\theta-2n\pi)-2\pi && (\because \ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z)+(\theta-2n\pi)-2\pi && (\because \ \arg^{[0,2\pi)}(z)=\theta-2n\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z)+\arg^{[0,2\pi)}(z)-2\pi && (\because \ \arg^{[0,2\pi)}(z)=\theta-2n\pi \text{ という仮定}) \\
&= 2\arg^{[0,2\pi)}(z)-2\pi && (\because \ \mathbb{R} \text{ の分配律と } 1 \text{ が積の単位元であること})
\end{aligned}
$$

である。この場合の条件も、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ により主張の第 2 の場合の条件 $\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi$ と同じである。 □

主張 1.80 ($\mathbb{C}$の逆数の arg)**.** 定義 1.69 と 定義 1.45 を使い、半径の非零性と複素数の非零性の同値には 主張 1.75 を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ について、$r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(r,\theta)]_{\sim}$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) とする。さらに $r \neq 0$ とする（定義 1.74 と 定義 1.73 により $r = |z|$ なので、これは $z \neq 0$ と同じことである)。このとき

$$
\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) = \begin{cases} 0 & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ 2\pi - \arg^{[0,2\pi)}(z) & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}
$$

が成り立つ。$r \neq 0$ は逆数 $1/z$ が定まるために要る（主張 1.55)。定義 1.74 より $\arg^{[0,2\pi)}(z) \in [0, 2\pi)$ なので、2 つの場合はちょうど一方だけが成り立つ。

証明. 証明の中で使うものを 3 つ先に置く。

第一に、ϕ_{polar} は積を保つ。実際 主張 1.72 より $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\mathrm{cartesian}} \circ \phi_{\mathrm{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$（主張 1.71）なので、$\phi_{\mathrm{polar}}$ は $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$
\phi_{\mathrm{polar}}(zz') = \phi_{\mathrm{polar}}(z) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z')
$$

が任意の $z, z' \in \mathbb{C}$ について成り立つ。

第二に、ϕ_{polar} による逆元の像を求める。$r \neq 0$ すなわち $z \neq 0$ なので $z^{-1} \in \mathbb{C}$ が定まり（主張 1.55)、

$$
\begin{aligned}
\phi_{\mathrm{polar}}(z)\cdot\phi_{\mathrm{polar}}(z^{-1}) &= \phi_{\mathrm{polar}}(z\,z^{-1}) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}}\text{ が積を保つこと})\\
&= \phi_{\mathrm{polar}}(1_{\mathbb{C}}) && (\because\ z^{-1}\text{ が }z\text{ の逆元であること})\\
&= [(1,0)]_{\sim} && (\because\ \text{モノイド準同型の逆写像は単位元を単位元へ写すこと。}[(1,0)]_{\sim}\text{ は 主張 1.50 の単位元})
\end{aligned}
$$

である。したがって $\phi_{\mathrm{polar}}(z^{-1})$ は $\phi_{\mathrm{polar}}(z)=[(r,\theta)]_{\sim}$ に右から掛けて $[(1,0)]_{\sim}$ になる元であり、$r\neq 0$ と 主張 1.53 により

$$
\phi_{\mathrm{polar}}(z^{-1}) = [(1/r,-\theta)]_{\sim}
$$

である。

第三に、$r\neq 0$ なので $1/r\neq 0$ である（実数の商は、分子が 0 でなければ 0 でない）。

本体に入る。

$$
\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) &= \arg^{[0,2\pi)}(z^{-1}) && (\because\ \mathbb{C}\text{の乗法群の }z^{-1}=1/z\text{。主張 1.55})\\
&= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z^{-1}))\big) && (\because\ \text{絶対値, 偏角の }\arg^{[0,2\pi)}\text{ の定義。定義 1.74})\\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(1/r,-\theta)]_{\sim})) && (\because\ \text{上で見た }\phi_{\mathrm{polar}}(z^{-1})\text{ の形})\\
&= s_{[0,2\pi)}\big([-\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because\ \text{第 1 座標, 第 2 座標の }r\neq 0\text{ の場合と }1/r\neq 0\text{。定義 1.73})
\end{aligned}
$$

である。

ここから先は $\arg^{[0,2\pi)}(z)=\theta-2n\pi$ の値で 2 つに分かれる。定義 1.74 よりこの値は $[0,2\pi)$ にあるので、この 2 つで尽きている。

$\theta-2n\pi=0$ のとき。このとき

$$
\begin{aligned}
-\theta-2(-n)\pi &= -(\theta-2n\pi) && (\because\ \mathbb{R}\text{ の加法の結合律・交換律と分配律})\\
&= 0 && (\because\ \theta-2n\pi=0\text{ という、この場合の条件})
\end{aligned}
$$

であり $0\leq 0<2\pi$ なので、主張 1.44 が一意に定める整数は $-n$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([-\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) &= -\theta-2(-n)\pi && (\because\ \text{角度表現の切断の定義と、いま見た不等式。定義 1.45 主張 1.44})\\
&= -(\theta-2n\pi) && (\because\ \mathbb{R}\text{ の加法の結合律・交換律と分配律})\\
&= -\arg^{[0,2\pi)}(z) && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z)=\theta-2n\pi\text{ という仮定})\\
&= -0 && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z)=0\text{ という、この場合の条件})\\
&= 0 && (\because\ 0\text{ の加法の逆元は }0)
\end{aligned}
$$

である。この場合の条件 $\theta-2n\pi=0$ は、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z)=\theta-2n\pi$ により主張の第 1 の場合の条件 $\arg^{[0,2\pi)}(z)=0$ と同じである。

$0<\theta-2n\pi<2\pi$ のとき。各辺に -1 を掛けて向きを入れ替えると $-2\pi<-(\theta-2n\pi)<0$ であり、さらに各辺へ 2π を足せば $0<-\theta-2(-n-1)\pi<2\pi$ なので、主張 1.44 が一意に定める整数は $-n-1$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([-\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) &= -\theta-2(-n-1)\pi && (\because\ \text{角度表現の切断の定義と、いま見た不等式。定義 1.45 主張 1.44})\\
&= (-\theta-2(-n)\pi)+2\pi && (\because\ 2(-n-1)\pi=2(-n)\pi-2\pi)\\
&= -(\theta-2n\pi)+2\pi && (\because\ \mathbb{R}\text{ の加法の結合律・交換律と分配律})\\
&= -\arg^{[0,2\pi)}(z)+2\pi && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z)=\theta-2n\pi\text{ という仮定})\\
&= 2\pi-\arg^{[0,2\pi)}(z) && (\because\ \mathbb{R}\text{ の加法の交換律と差の定義})
\end{aligned}
$$

である。この場合の条件も、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z)=\theta-2n\pi$ により主張の第 2 の場合の条件 $0<\arg^{[0,2\pi)}(z)<2\pi$ と同じである。 □

定義 1.81 ($\mathbb{C}$の$\sqrt{\cdot}$)**.** 定義 1.4、定義 1.69、定義 1.70、定義 1.73、定義 1.45、定義 1.47 を用いる。半角の値域は $[0,\pi)$ であり、現行の正弦・余弦の定義域を超える。逆方向写像が未完のため、以下の平方根写像の定義も未完である。

$\sqrt{\cdot}:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ を以下のように定める。

$z\in\mathbb{C}$ について、

$$\sqrt{z}:=\phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \frac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z)))\right)\right]_{\sim}\right)$$

主張 1.82. 定義 1.73 の射影を用いる。

$z\in\mathbb{C}$ とし、$(r,\theta)\in\mathbb{R}_{\geq 0}\times\mathbb{R}$ を $\phi_{\mathrm{polar}}(z)=[(r,\theta)]_{\sim}$ なる代表元とする（定義 1.69、定義 1.47）。$n\in\mathbb{Z}$ を $0\leq\theta-2n\pi<2\pi$ を満たすものとすると（このような n は各 $\theta\in\mathbb{R}$ に対してただ一つ存在する。主張 1.44）、

$$\sqrt{z}=\phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \frac{\theta}{2}-n\pi\right)\right]_{\sim}\right)$$

ここで $\sqrt{\cdot}:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ は 定義 1.81 の複素数の平方根、$\sqrt{\cdot}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}:\mathbb{R}_{\geq 0}\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ は 定義 1.4 の非負実数の平方根、$\phi_{\mathrm{cartesian}}$ は 定義 1.70 の写像である。右辺の $\theta/2-n\pi$ は実数体 $\mathbb{R}$ 内の演算（θ と $1/2$ の積、および $n\pi$ との差）である。

証明. 証明の中で使うものを 2 つ先に置く。

第一に、$0\leq\theta-2n\pi<2\pi$ を満たす $n\in\mathbb{Z}$ は各 $\theta\in\mathbb{R}$ に対してただ一つ存在する（主張 1.44）。この一意性により 定義 1.45 の $s_{[0,2\pi)}$ について

$$s_{[0,2\pi)}\left([\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\right)=\theta-2n\pi$$

が成り立つ。

第二に、定義 1.4 より $\sqrt{0}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}=0$ である。

主張の右辺が代表元 (r,θ) の取り方によらないことを先に見る。$(r,\theta)\sim(r',\theta')$ とし、$n,n'\in\mathbb{Z}$ をそれぞれ $0\leq\theta-2n\pi<2\pi$、$0\leq\theta'-2n'\pi<2\pi$ を満たすもの（準備の第一により一意）とする。定義 1.47 より次の 2 つの場合がある。

$r=r'=0$ のとき。準備の第二より両辺の内側の対はそれぞれ $(0,\theta/2-n\pi)$ と $(0,\theta'/2-n'\pi)$ であり、第 1 成分がともに 0 なので 定義 1.47（$r=r'=0$ の場合）により同値、すなわち同じ同値類を定める。

$r=r'$ かつ $\theta\sim_{\mathrm{angle}}\theta'$ のとき。定義 1.43 より $\theta-\theta'=2k\pi$ なる $k\in\mathbb{Z}$ が存在する。このとき $\theta-2(n'+k)\pi=\theta'-2n'\pi\in[0,2\pi)$ かつ $n'+k\in\mathbb{Z}$ なので、準備の第一の一意性より $n=n'+k$ である。したがって

$$\begin{aligned}
\frac{\theta}{2}-n\pi&=\frac{\theta'+2k\pi}{2}-(n'+k)\pi && (\because\ \theta=\theta'+2k\pi\text{（定義 1.43）と }n=n'+k\text{（主張 1.44）})\\
&=\frac{\theta'}{2}+k\pi-(n'+k)\pi && (\because\ \mathbb{R}\text{ の分配律})\\
&=\frac{\theta'}{2}+k\pi-n'\pi-k\pi && (\because\ \mathbb{R}\text{ の分配律})\\
&=\frac{\theta'}{2}-n'\pi && (\because\ \mathbb{R}\text{ の加法の結合律・交換律})
\end{aligned}$$

であり、第 1 成分も $\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}=\sqrt{r'}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}$ で一致するから、両者は同じ対であり同じ同値類を定める。いずれの場合も右辺は代表元によらない。

ここから先は r の値で 2 つに分かれる。

$r\neq 0$ のとき。

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z} &= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z))}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z)))\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の}\ \sqrt{\cdot}\ \text{の定義。定義 1.81)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z)))\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \text{第 1 座標, 第 2 座標の}\ \mathrm{pr}_1\ \text{と}\ \phi_{\text{polar}}(z)=[(r,\theta)]_{\sim}\text{。定義 1.73)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}})\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \text{第 1 座標, 第 2 座標の}\ \mathrm{pr}_2\ \text{の}\ r\neq 0\ \text{の場合。定義 1.73)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}(\theta-2n\pi)\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \text{準備の第一。主張 1.44)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配律)}
\end{aligned}
$$

であり、これは主張の右辺そのものである。

$r=0$ のとき。まず左辺を計算する。

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z} &= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z))}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z)))\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の}\ \sqrt{\cdot}\ \text{の定義。定義 1.81)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{0}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}})\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \text{第 1 座標, 第 2 座標の}\ r=0\ \text{の場合。定義 1.73)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\big[(0,\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}}))\big]_{\sim}\Big) && (\because\ \text{準備の第二。定義 1.4)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\big(\big[(0,\ \tfrac{1}{2}\cdot 0)\big]_{\sim}\big) && (\because\ 0\leq 0-2\cdot 0\cdot\pi<2\pi\ \text{と準備の第一)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}([(0,0)]_{\sim}) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}\ a\cdot 0=0)\\
&= (0\cdot\cos 0,\ 0\cdot\sin 0) && (\because\ \phi_{\text{cartesian}}\ \text{の定義。定義 1.70)}\\
&= (0,0)=0_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}\ 0\cdot a=0)
\end{aligned}
$$

次に右辺を計算する。

$$
\begin{aligned}
\phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\Big)\Big]_{\sim}\Big) &= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{0}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ r=0\ \text{という、この場合の条件)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\big(\big[(0,\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi)\big]_{\sim}\big) && (\because\ \text{準備の第二。定義 1.4)}\\
&= \big(0\cdot\cos\big(\tfrac{\theta}{2}-n\pi\big),\ 0\cdot\sin\big(\tfrac{\theta}{2}-n\pi\big)\big) && (\because\ \phi_{\text{cartesian}}\ \text{の定義。定義 1.70)}\\
&= (0,0)=0_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}\ 0\cdot a=0)
\end{aligned}
$$

であり、両辺は一致する。$\cos,\sin$ の値は $\mathbb{R}$ の元なので、最後の段は $\mathbb{R}$ の中の計算である。

以上より、$r\neq 0$ と $r=0$ のいずれの場合も主張の等式が成り立つ。右辺は代表元の取り方によらないので、主張は $\phi_{\text{polar}}(z)=[(r,\theta)]_{\sim}$ なる任意の代表元 (r,θ) について成り立つ。 □

主張 1.83 (sqrt と積が可換になる条件)**.** 定義 1.81、主張 1.82、定義 1.4、定義 1.69、定義 1.70 を用いる。

$z_1,z_2\in\mathbb{C}$ について、

$$
\sqrt{z_1z_2}=\begin{cases}\sqrt{z_1}\sqrt{z_2} & (0\leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1)+\arg^{[0,2\pi)}(z_2)<2\pi)\\ -\sqrt{z_1}\sqrt{z_2} & (2\pi\leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1)+\arg^{[0,2\pi)}(z_2)<4\pi)\end{cases}
$$

証明. 証明の中で使うものを 3 つ先に置く。

第一に、主張 1.72 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、$\phi_{\text{cartesian}}\circ\phi_{\text{polar}}=\mathrm{id}_{\mathbb{C}}$（主張 1.71）なので ϕ_{polar} はその逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$
\phi_{\text{polar}}(z_1z_2)=\phi_{\text{polar}}(z_1)\cdot\phi_{\text{polar}}(z_2)
$$

である。

第二に、定義 1.49 より

$$
[(r_1,\theta_1)]_{\sim}\cdot[(r_2,\theta_2)]_{\sim}=[(r_1r_2,\ \theta_1+\theta_2)]_{\sim}
$$

である。

第三に、主張 1.44 より、各 $\theta \in \mathbb{R}$ に対して $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たす $n \in \mathbb{Z}$ がただ一つ存在する。この一意性により、定義 1.45 の $s_{[0,2\pi)}$ について $s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = \theta - 2n\pi$ が成り立つ。

ここから先は $r_1 r_2$ が 0 かどうかで分かれる。定義 1.73 の pr_2 が $r = 0$ のとき $[0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$ を返す定義になっているため、$\mathrm{pr}_2([(r,\theta)]_\sim) = [\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$ と書けるのは $r \neq 0$ のときだけだからである。

$r_1 = 0$ または $r_2 = 0$ のとき。まず左辺は

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z_1 z_2} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2)))\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \text{ 複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.81)}\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z_2))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z_2)))\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ が積を保つこと。主張 1.72)}\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1([(r_1,\theta_1)]_\sim \cdot [(r_2,\theta_2)]_\sim)}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1,\theta_1)]_\sim \cdot [(r_2,\theta_2)]_\sim))\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \ r_1, r_2, \theta_1, \theta_2 \text{ の取り方)}\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1([(r_1 r_2, \theta_1+\theta_2)]_\sim)}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1 r_2, \theta_1+\theta_2)]_\sim))\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \text{ 極座標表現の積。定義 1.49)}\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \text{ 第 1 座標, 第 2 座標の定義と } r_1 r_2 = 0 \text{ 定義 1.73)}\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[(0,\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}))\Big]_\sim\Big) && (\because \ r_1 r_2 = 0 \text{ と非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.4)}\\
&= \big(0 \cdot \cos \tfrac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}),\ 0 \cdot \sin \tfrac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\big) && (\because \ \phi_{\mathrm{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70)}\\
&= (0,0) && (\because \ 0 \text{ を因子にもつ積は } 0)
\end{aligned}
$$

である。$r_1 = 0$ の場合は右辺の第 1 因子が

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z_1} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta_1}{2} - n_1\pi\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \text{ 複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の極座標表現による展開。主張 1.82)}\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(0,\ \tfrac{\theta_1}{2} - n_1\pi\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \ r_1 = 0 \text{ と非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.4)}\\
&= \Big(0 \cdot \cos\Big(\tfrac{\theta_1}{2} - n_1\pi\Big),\ 0 \cdot \sin\Big(\tfrac{\theta_1}{2} - n_1\pi\Big)\Big) && (\because \ \phi_{\mathrm{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70)}\\
&= (0,0) && (\because \ 0 \text{ を因子にもつ積は } 0)
\end{aligned}
$$

となる。したがって

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z_1}\sqrt{z_2} &= (0,0) \cdot \sqrt{z_2} && (\because \ \sqrt{z_1} = (0,0) \text{ という直前の計算})\\
&= (0,0) && (\because \ \mathbb{C} \text{ の零元を因子にもつ積は零元})
\end{aligned}
$$

$(0,0)$ は $\mathbb{C}$ の零元である。$r_2 = 0$ の場合も第 2 因子について同じ計算になる。したがってこの場合

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z_1 z_2} &= (0,0) && (\because \text{ 上で計算した左辺})\\
&= \sqrt{z_1}\sqrt{z_2} && (\because \ r_1 = 0 \text{ または } r_2 = 0 \text{ のときの直前の計算})
\end{aligned}
$$

この場合が主張のどちらの場合にあたるかも見ておく。$r_1 = 0$ なら

$$
\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z_1) &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1))) && (\because \text{ 絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 1.74)}\\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(0,\theta_1)]_\sim)) && (\because \ r_1 = 0 \text{ という、この場合の仮定})\\
&= s_{[0,2\pi)}\big([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because \text{ 第 1 座標, 第 2 座標の定義。定義 1.73)}\\
&= 0 && (\because \text{ 角度切断の一意性を } \theta = 0,\ n = 0 \text{ へ当てた。主張 1.44)}
\end{aligned}
$$

であり、定義 1.74 より $\arg^{[0,2\pi)}(z_2) \in [0, 2\pi)$ なので $0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) < 2\pi$ すなわち主張の第 1 の場合にあたり、いま示した等式はその場合の等式である。$r_2 = 0$ の場合も同じである。

$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ のとき。実数の積は因子がどちらも 0 でなければ 0 でないので $r_1 r_2 \neq 0$ である。$n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ を $0 \leq \theta_1 - 2n_1\pi < 2\pi$、$0 \leq \theta_2 - 2n_2\pi < 2\pi$ を満たすもの（準備の第三によりそれぞれただ一つ存在する）とする。まず左辺は

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z_1 z_2} &= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z_1 z_2))}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1 z_2)))\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \text{ 複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.81)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z_1)\cdot\phi_{\text{polar}}(z_2))}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1)\cdot\phi_{\text{polar}}(z_2)))\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと。主張 1.72)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1([(r_1,\theta_1)]_{\sim}\cdot[(r_2,\theta_2)]_{\sim})}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1,\theta_1)]_{\sim}\cdot[(r_2,\theta_2)]_{\sim}))\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \ r_1, r_2, \theta_1, \theta_2 \text{ の取り方)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1([(r_1 r_2,\theta_1+\theta_2)]_{\sim})}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1 r_2,\theta_1+\theta_2)]_{\sim}))\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \text{ 極座標表現の積。定義 1.49)}\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r_1 r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \text{ 第 1 座標, 第 2 座標の定義と } r_1 r_2 \neq 0 \text{ 定義 1.73)}\\
&= \left(\sqrt{r_1 r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}),\ \sqrt{r_1 r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\right) && (\because \ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70)}
\end{aligned}
$$

である。次に右辺は

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z_1}\sqrt{z_2} &= \phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r_1}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\right)\right]_{\sim}\right)\cdot\phi_{\text{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \text{ 複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ と第 1 座標, 第 2 座標の定義を } r_1, r_2 \neq 0 \text{ へ当てた。定義 1.81定義 1.73)}\\
&= \left(\sqrt{r_1}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}),\ \sqrt{r_1}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\right)\cdot\left(\sqrt{r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}),\ \sqrt{r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\right) && (\because \ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70)}\\
&= \Big(\sqrt{r_1 r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\big(\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})-\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big),\\
&\quad \sqrt{r_1 r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\big(\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})+\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big)\Big) && (\because \ \mathbb{C} \text{ の積の定義と } \sqrt{r_1}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} = \sqrt{r_1 r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}})\\
&= \left(\sqrt{r_1 r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})+s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big),\ \sqrt{r_1 r_2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})+s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big)\right) && (\because \text{ 三角関数の加法定理)}
\end{aligned}
$$

である。両者を比べるために、右辺に現れる角を計算する。

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})+s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big) &= \tfrac{1}{2}((\theta_1-2n_1\pi)+(\theta_2-2n_2\pi)) && (\because \text{ 角度切断の一意性を } \theta_1, \theta_2 \text{ へ当てた。主張 1.44)}\\
&= \tfrac{1}{2}(\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi) && (\because \text{ 実数の加法の交換則・結合則と分配則)}\\
&= \tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi && (\because \text{ 実数の分配則)}
\end{aligned}
$$

また、

$$
\begin{aligned}
&0 \leq \theta_1 - 2n_1\pi < 2\pi, \qquad 0 \leq \theta_2 - 2n_2\pi < 2\pi\\
\Longrightarrow\ &0 \leq (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) < 4\pi && (\because \text{ 二つの不等式の辺々を加えた)}\\
\Longrightarrow\ &0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 4\pi && (\because \ \mathbb{R} \text{ の加法の交換則・結合則と分配則)}
\end{aligned}
$$

であるから、ここで場合を 2 つに分ける。

$0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 2\pi$ の場合。左辺に現れる角は

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) &= \tfrac{1}{2}(\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi) && (\because \text{ 角度切断の一意性を } \theta=\theta_1+\theta_2,\ n=n_1+n_2 \text{ へ当てた。いまの場合分けがその範囲の条件である。主張 1.44)}\\
&= \tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi && (\because \text{ 実数の分配則)}
\end{aligned}
$$

であり、右辺に現れる角と一致する。したがって左辺と右辺の 2 つの成分がそれぞれ一致し、$\sqrt{z_1 z_2} = \sqrt{z_1}\sqrt{z_2}$ である。

$2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 4\pi$ の場合。このとき $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2+1)\pi < 2\pi$ なので、左辺に現れる角は

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) &= \tfrac{1}{2}(\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2+1)\pi) && (\because \text{ 角度切断の一意性を } \theta=\theta_1+\theta_2,\ n=n_1+n_2+1 \text{ へ当てた。主張 1.44)}\\
&= \tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi-\pi && (\because \text{ 実数の分配則)}
\end{aligned}
$$

である。したがって左辺の 2 つの成分は

$$
\begin{aligned}
\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) &= \cos\left(\left(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi\right)-\pi\right) && (\because \text{ いま計算した角)}\\
&= -\cos\left(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi\right) && (\because \ \cos(x-\pi) = -\cos x)\\
&= -\cos\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})+s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big) && (\because \text{ 右辺に現れる角の計算)}
\end{aligned}
$$

および

$$
\begin{aligned}
\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) &= \sin\left(\left(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi\right)-\pi\right) && (\because \text{ いま計算した角})\\
&= -\sin\left(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi\right) && (\because \sin(x-\pi)=-\sin x)\\
&= -\sin\tfrac{1}{2}\left(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}})+s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\right) && (\because \text{ 右辺に現れる角の計算})
\end{aligned}
$$

となり、2 つの成分がどちらも符号を変えたものになるので $\sqrt{z_1z_2}=-\sqrt{z_1}\sqrt{z_2}$ である。

最後に、場合分けの条件を主張の形へ書き直す。$r_1\neq 0$ かつ $r_2\neq 0$ のとき

$$
\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z_1)+\arg^{[0,2\pi)}(z_2) &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1)))+s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_2))) && (\because \text{ 絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 1.74})\\
&= s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}})+s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) && (\because \text{ 第 1 座標, 第 2 座標の定義と } r_1,r_2\neq 0 \text{ 定義 1.73})\\
&= (\theta_1-2n_1\pi)+(\theta_2-2n_2\pi) && (\because \text{ 角度切断の一意性。主張 1.44})\\
&= \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi && (\because \text{ 実数の加法の交換則・結合則と分配則})
\end{aligned}
$$

なので、2 つの場合分けの条件は主張の 2 つの場合の条件と一致する。 □

主張 1.84 (sqrt の 2 乗は元に戻る)**.** 主張 1.82、定義 1.49、定義 1.4 を用いる。定義 1.81 と定義 1.70 は正弦・余弦が主値区間でしか定まっていないため未完であり、この主張もそれらが整うまで未完である。

$z\in\mathbb{C}$ について、$\sqrt{z}\sqrt{z}=z$

証明. $(r,\theta)\in\mathbb{R}_{\geq 0}\times\mathbb{R}$ を $\phi_{\mathrm{polar}}(z)=[(r,\theta)]_\sim$ なる代表元とし（定義 1.69、定義 1.47）、$n\in\mathbb{Z}$ を $0\leq\theta-2n\pi<2\pi$ を満たすものとする（主張 1.44 により各 $\theta\in\mathbb{R}$ に対してただ一つ存在する）。

求めたい値から始める。

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z}\sqrt{z} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\right)\right]_\sim\right)\cdot\phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\right)\right]_\sim\right) && (\because \text{ 複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の極座標表現による展開。主張 1.82})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\right)\right]_\sim\cdot\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\right)\right]_\sim\right) && (\because \phi_{\mathrm{cartesian}} \text{ が積を保つこと。主張 1.72})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cdot\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ (\tfrac{\theta}{2}-n\pi)+(\tfrac{\theta}{2}-n\pi)\right)\right]_\sim\right) && (\because \text{ 極座標表現の演算。定義 1.49})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(r,\ (\tfrac{\theta}{2}-n\pi)+(\tfrac{\theta}{2}-n\pi)\right)\right]_\sim\right) && (\because \text{ 非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.4})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(r,\ (\tfrac{\theta}{2}+\tfrac{\theta}{2})-(n\pi+n\pi)\right)\right]_\sim\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の交換律と結合律})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}([(r,\ \theta-2n\pi)]_\sim) && (\because \tfrac{\theta}{2}+\tfrac{\theta}{2}=\theta,\ n\pi+n\pi=2n\pi)\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}([(r,\ \theta)]_\sim) && (\because (r,\theta-2n\pi)\sim(r,\theta) \text{ である。} (\theta-2n\pi)-\theta=2(-n)\pi,\ -n\in\mathbb{Z} \text{ 定義 1.43 定義 1.47})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}(\phi_{\mathrm{polar}}(z)) && (\because r,\theta \text{ の取り方。定義 1.69 定義 1.47})\\
&= z && (\because \phi_{\mathrm{cartesian}}\circ\phi_{\mathrm{polar}}=\mathrm{id}_{\mathbb{C}} \text{ 主張 1.71})
\end{aligned}
$$

□

主張 1.85 ($z=\pm\sqrt{z^2}$)**.** $z\in\mathbb{C}$ について、

$$
z=\begin{cases}\sqrt{z^2} & (0\leq\arg^{[0,2\pi)}(z)<\pi)\\ -\sqrt{z^2} & (\pi\leq\arg^{[0,2\pi)}(z)<2\pi)\end{cases}
$$

証明. 証明の中で使う記号を先に置く。$\alpha:=\arg^{[0,2\pi)}(z)\in\mathbb{R}$ と書く（定義 1.74）。主張の場合分けは α の値によるものである。

$0\leq\alpha<\pi$ の場合。このとき $0\leq\alpha+\alpha<2\pi$ なので、主張 1.83 は $z_1=z_2=z$ について第 1 の場合を与える。

$$
\begin{aligned}
z &= \sqrt{z}\sqrt{z} && (\because \text{ sqrt の 2 乗は元に戻る})\\
&= \sqrt{z\cdot z} && (\because \text{ sqrt と積が可換になる条件の第 1 の場合})\\
&= \sqrt{z^2} && (\because z\cdot z=z^2)
\end{aligned}
$$

（第 1 の等号で引いたのは 主張 1.84。）

$\pi \leq \alpha < 2\pi$ の場合。このとき $2\pi \leq \alpha + \alpha < 4\pi$ なので、主張 1.83 は $z_1 = z_2 = z$ について第 2 の場合、すなわち $\sqrt{z \cdot z} = -\sqrt{z}\sqrt{z}$ を与える。

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{z}\sqrt{z} && (\because \text{ sqrt の 2 乗は元に戻る}) \\ &= -\left(-\sqrt{z}\sqrt{z}\right) && (\because \mathbb{C} \text{ の元 } w \text{ について } -(-w) = w) \\ &= -\sqrt{z \cdot z} && (\because \text{ sqrt と積が可換になる条件の第 2 の場合}) \\ &= -\sqrt{z^2} && (\because\ z \cdot z = z^2) \end{aligned}$$

(第 1 の等号で引いたのは 主張 1.84。)

2 つの場合は $\alpha \in [0, 2\pi)$ を尽くしているので、主張を得る。 □

主張 1.86 ($\mathbb{C}$の逆数の$\sqrt{\cdot}$)**.** 定義 1.81、主張 1.84、主張 1.82、定義 1.4、定義 1.70、定義 1.13、主張 1.80 を用いる。零での値の計算には 定義 1.40、定義 1.38、定義 1.41 の関数が現れる。

$z \in \mathbb{C},\ z \neq 0$ について、

$$\sqrt{\frac{1}{z}} = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{z}} & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ -\dfrac{1}{\sqrt{z}} & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

証明. 証明の中で使うものを 4 つ先に置く。

第一に、$(r, \theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ を $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_\sim$ なる代表元とし（定義 1.69、定義 1.47)、$n \in \mathbb{Z}$ を $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすものとする（主張 1.44)。このとき $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ である（定義 1.74)。

第二に、仮定 $z \neq 0$ により逆数 $1/z$ が定まる（主張 1.55)。

第三に、$\sqrt{z} \neq 0_{\mathbb{C}}$ である。実際 $\sqrt{z} = 0_{\mathbb{C}}$ とすると

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{z}\sqrt{z} && (\because \text{ sqrt の 2 乗は元に戻る。主張 1.84}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ この場合の仮定を 2 箇所へ適用}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義。定義 1.12}) \end{aligned}$$

となって $z \neq 0$ に反する。したがって逆数 $1/\sqrt{z}$ が定まる（主張 1.55)。

第四に、$\sqrt{1_{\mathbb{C}}} = 1_{\mathbb{C}}$ である。まず ϕ_{polar} の値を求める。

$$\begin{aligned} \phi_{\text{polar}}(1_{\mathbb{C}}) &= \phi_{\text{polar}}((1, 0)) && (\because\ 1_{\mathbb{C}} = (1, 0),\ \text{定義 1.12 定義 1.13}) \\ &= \left[\left(\sqrt{1^2 + 0^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(0/1)\right)\right]_\sim && (\because\ \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x > 0 \text{ の場合。定義 1.69}) \\ &= \left[\left(\sqrt{1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(0/1)\right)\right]_\sim && (\because\ \mathbb{R} \text{ の計算 } 1^2 + 0^2 = 1) \\ &= [(1,\ \arctan(0/1))]_\sim && (\because \text{ 非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.4}) \\ &= [(1,\ \arctan 0)]_\sim && (\because\ \mathbb{R} \text{ の計算 } 0/1 = 0) \\ &= [(1,\ 0)]_\sim && (\because\ \arctan 0 = 0) \end{aligned}$$

であり、$0 \leq 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi < 2\pi$ なので、この代表元に対する整数は 0 である。したがって

$$
\begin{aligned}
\sqrt{1_{\mathbb{C}}} &= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{0}{2} - 0 \cdot \pi\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because \text{ 複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の極座標表現による展開。主張 1.82}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\big(\big[\big(1,\ \tfrac{0}{2} - 0 \cdot \pi\big)\big]_{\sim}\big) && (\because \text{ 非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 1.4}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}([(1,\ 0)]_{\sim}) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の計算}) \\
&= (1 \cdot \cos 0,\ 1 \cdot \sin 0) && (\because \ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 1.70}) \\
&= (1 \cdot 1,\ 1 \cdot \sin 0) && (\because \ \cos 0 = 1) \\
&= (1 \cdot 1,\ 1 \cdot 0) && (\because \ \sin 0 = 0) \\
&= (1,\ 0) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の積の計算を 2 箇所へ適用}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because \ 1_{\mathbb{C}} = (1, 0), \text{ 定義 1.12 定義 1.13})
\end{aligned}
$$

である。

$\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0$ の場合。まず 2 つの偏角の和を求める。

$$
\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z) + \arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) &= 0 + \arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) && (\because \text{ この場合の仮定}) \\
&= 0 + 0 && (\because \ \mathbb{C} \text{ の逆数の } \arg \text{ の第 1 の場合。主張 1.80}) \\
&= 0 && (\because \ \mathbb{R} \text{ の和の計算})
\end{aligned}
$$

であり $0 \leq 0 < 2\pi$ なので、以下では 主張 1.83 の第 1 の場合が当たる。

$$
\begin{aligned}
\sqrt{\frac{1}{z}} &= 1_{\mathbb{C}} \cdot \sqrt{\frac{1}{z}} && (\because \ 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元}) \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \sqrt{z}\right) \cdot \sqrt{\frac{1}{z}} && (\because \text{ 準備の第三で取った } 1/\sqrt{z} \text{ の定め方}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \left(\sqrt{z} \cdot \sqrt{\frac{1}{z}}\right) && (\because \ \mathbb{C} \text{ の積の結合律}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \sqrt{z \cdot \frac{1}{z}} && (\because \text{ sqrt と積が可換になる条件の第 1 の場合}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \sqrt{1_{\mathbb{C}}} && (\because \text{ 準備の第二で取った } 1/z \text{ の定め方}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 準備の第四}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} && (\because \ 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元})
\end{aligned}
$$

$0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi$ の場合。まず 2 つの偏角の和を求める。

$$
\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z) + \arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) &= \arg^{[0,2\pi)}(z) + \left(2\pi - \arg^{[0,2\pi)}(z)\right) && (\because \ \mathbb{C} \text{ の逆数の } \arg \text{ の第 2 の場合。主張 1.80}) \\
&= 2\pi && (\because \ \mathbb{R} \text{ の和の計算})
\end{aligned}
$$

であり $2\pi \leq 2\pi < 4\pi$ なので、以下では 主張 1.83 の第 2 の場合が当たる。

$$
\begin{aligned}
\sqrt{\frac{1}{z}} &= 1_{\mathbb{C}} \cdot \sqrt{\frac{1}{z}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元}) \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \sqrt{z}\right) \cdot \sqrt{\frac{1}{z}} && (\because\ \text{準備の第三で取った } 1/\sqrt{z} \text{ の定め方}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \left(\sqrt{z} \cdot \sqrt{\frac{1}{z}}\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の結合律}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \left(-\left(-\left(\sqrt{z} \cdot \sqrt{\frac{1}{z}}\right)\right)\right) && (\because\ -(-w) = w) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \left(-\sqrt{z \cdot \frac{1}{z}}\right) && (\because\ \text{sqrt と積が可換になる条件の第 2 の場合}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \left(-\sqrt{1_{\mathbb{C}}}\right) && (\because\ \text{準備の第二で取った } 1/z \text{ の定め方}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot (-1_{\mathbb{C}}) && (\because\ \text{準備の第四}) \\
&= -\left(\frac{1}{\sqrt{z}} \cdot 1_{\mathbb{C}}\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積と符号の関係 } a \cdot (-b) = -(a \cdot b)) \\
&= -\frac{1}{\sqrt{z}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元})
\end{aligned}
$$

□

主張 1.87 ($\mathbb{C}$の$\sqrt{\cdot}$の逆数)**.** 偏角は 定義 1.74 のものとする。

$z \in \mathbb{C},\ z \neq 0$ について、

$$
(\sqrt{z})^{-1} = \frac{1}{\sqrt{z}} = \begin{cases} \sqrt{1/z} & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ -\sqrt{1/z} & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}
$$

証明. 証明の中で使うものを 1 つ先に置く。$z \neq 0$ なので 主張 1.86 の準備の第三と同じ議論により $\sqrt{z} \neq 0$ であり、$\mathbb{C}$ の乗法群（主張 1.55）の中で $\sqrt{z}$ の逆元 $(\sqrt{z})^{-1}$ が定まる。$1/\sqrt{z}$ はこの逆元の別の書き方である。

$\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0$ の場合。

$$
\begin{aligned}
(\sqrt{z})^{-1} &= \frac{1}{\sqrt{z}} && (\because\ 1/\sqrt{z} \text{ は逆元 } (\sqrt{z})^{-1} \text{ の別の書き方である}) \\
&= \sqrt{\frac{1}{z}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の逆数の } \sqrt{\cdot} \text{ の第 1 の場合。主張 1.86})
\end{aligned}
$$

$0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi$ の場合。

$$
\begin{aligned}
(\sqrt{z})^{-1} &= \frac{1}{\sqrt{z}} && (\because\ 1/\sqrt{z} \text{ は逆元 } (\sqrt{z})^{-1} \text{ の別の書き方である}) \\
&= -\left(-\frac{1}{\sqrt{z}}\right) && (\because\ -(-w) = w) \\
&= -\sqrt{\frac{1}{z}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の逆数の } \sqrt{\cdot} \text{ の第 2 の場合。主張 1.86})
\end{aligned}
$$

□

定理 1.88 ($\cos, \sin$ の Euler 表示)**.** 現行の正弦・余弦は 定義 1.38、定義 1.41、複素数は 定義 1.12 で定めている。複素数の exp は行列の exp の章で 1 行 1 列の行列の exp として定める。全実数上への拡張と、以下で使う Euler 公式の導出は未整備である。

$\forall \theta \in \mathbb{R}$

$$\cos\theta = \frac{\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)}{2}$$

$$\sin\theta = \frac{\exp(i\theta) - \exp(-i\theta)}{2i}$$

証明. 準備として、Euler の公式 $\exp(i\varphi) = \cos\varphi + i\sin\varphi$ を $\varphi = -\theta$ で使う形を書いておく。

$$\begin{aligned}
\exp(-i\theta) &= \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) && (\because \text{ Euler の公式}) \\
&= \cos\theta + i\,(-\sin\theta) && (\because \cos \text{ は偶関数、} \sin \text{ は奇関数}) \\
&= \cos\theta - i\sin\theta
\end{aligned}$$

第 1 の等式を示す。

$$\begin{aligned}
\cos\theta &= \frac{2\cos\theta}{2} \\
&= \frac{(\cos\theta + i\sin\theta) + (\cos\theta - i\sin\theta)}{2} && (\because\ i\sin\theta \text{ を足して引いた}) \\
&= \frac{\exp(i\theta) + (\cos\theta - i\sin\theta)}{2} && (\because \text{ Euler の公式}) \\
&= \frac{\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)}{2} && (\because \text{ 上の準備})
\end{aligned}$$

第 2 の等式を示す。$2i \neq 0$ なので割ってよい。

$$\begin{aligned}
\sin\theta &= \frac{2i\sin\theta}{2i} \\
&= \frac{(\cos\theta + i\sin\theta) - (\cos\theta - i\sin\theta)}{2i} && (\because\ \cos\theta \text{ を足して引いた}) \\
&= \frac{\exp(i\theta) - (\cos\theta - i\sin\theta)}{2i} && (\because \text{ Euler の公式}) \\
&= \frac{\exp(i\theta) - \exp(-i\theta)}{2i} && (\because \text{ 上の準備})
\end{aligned}$$

□

主張 1.89 ($\exp(-i\theta_{\mathbb{C}}) = (\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}$)**.** $\theta \in \mathbb{R}$ とする。定理 1.88 と同じく、実数 $\cos\theta, \sin\theta$ は 定義 1.13 の包含で $\mathbb{C}$ の元 $(\cos\theta)_{\mathbb{C}}, (\sin\theta)_{\mathbb{C}}$ として読み、定理 1.88 の $\exp(\pm i\theta)$ を $\exp(\pm i\theta_{\mathbb{C}})$ と書く。このとき

$$\exp(-i\theta_{\mathbb{C}}) = (\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。全実数上の $\cos, \sin$ は 定理 1.88 の前置きのとおり未整備である。この主張は 定理 1.88 を前提とし、したがって全実数上の $\cos, \sin$ の拡張（未整備）に依る。

証明. $a := \exp(i\theta_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C}$、$b := \exp(-i\theta_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C}$ とおく。主張 1.56 の体で $2_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$、$i \neq 0_{\mathbb{C}}$ なので $2_{\mathbb{C}} i \neq 0_{\mathbb{C}}$ であり、以下の分数は定まる。主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
b &= \frac{2_{\mathbb{C}} b}{2_{\mathbb{C}}} && \big(\because\ 2_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}\ \text{(主張 1.56)}\big) \\
&= \frac{(a+b)-(a-b)}{2_{\mathbb{C}}} && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の四則 (主張 1.56, 定義 1.15)}\big) \\
&= \frac{a+b}{2_{\mathbb{C}}} - \frac{a-b}{2_{\mathbb{C}}} && \big(\because\ \text{分配法則 (主張 1.56)}\big) \\
&= (\cos\theta)_{\mathbb{C}} - \frac{a-b}{2_{\mathbb{C}}} && \big(\because\ \text{定理 1.88 の第 1 の等式}\big) \\
&= (\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i \cdot \frac{a-b}{2_{\mathbb{C}} i} && \big(\because\ i \neq 0_{\mathbb{C}}\ \text{(主張 1.56)}\big) \\
&= (\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \text{定理 1.88 の第 2 の等式}\big)
\end{aligned}
$$

となる。 □

主張 1.90 (共役写像は環準同型)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

$B \in (\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}))^{\times}$（正則）について、定理 1.8 の共役写像 $T_B : \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$、$T_B(A) = (BA)B^{-1}$（定理 1.8 の定義）は次を満たす。ここで、正則な $P \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ について P^{-1} は $PP^{-1} = I$ かつ $P^{-1}P = I$ を満たす行列である（正則の意味。$I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$）。

- 乗法的: 任意の $A, C \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ について $T_B(AC) = T_B(A)T_B(C)$
- 単位的: $T_B(I) = I$
- 合成則: $G, H \in (\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}))^{\times}$（正則）について GH は正則であり、定理 1.8 の共役写像 T_G, T_H, T_{GH} について $T_G \circ T_H = T_{GH}$

証明. 鎖が引く 3 つの主張（行列の積の結合法則と、単位行列を左右から掛けること）は、どれもその行列の大きさをすべてこの主張の n として使う。

乗法性を示す。$A, C \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ とする。

$$
\begin{aligned}
T_B(AC) &= \big(B(AC)\big)B^{-1} && \big(\because\ \text{定理 1.8 の}T_B\ \text{の定義}\big) \\
&= \big((BA)C\big)B^{-1} && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= \big((BA)(IC)\big)B^{-1} && \big(\because\ \text{主張 2.16}\big) \\
&= \Big((BA)\big((B^{-1}B)C\big)\Big)B^{-1} && \big(\because\ B^{-1}B = I\big) \\
&= \Big((BA)\big(B^{-1}(BC)\big)\Big)B^{-1} && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= \Big(\big((BA)B^{-1}\big)(BC)\Big)B^{-1} && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= \big((BA)B^{-1}\big)\big((BC)B^{-1}\big) && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= T_B(A)\big((BC)B^{-1}\big) && \big(\because\ \text{定理 1.8 の}T_B\ \text{の定義}\big) \\
&= T_B(A)T_B(C) && \big(\because\ \text{定理 1.8 の}T_B\ \text{の定義}\big)
\end{aligned}
$$

単位性を示す。

$$
\begin{aligned}
T_B(I) &= (BI)B^{-1} && \big(\because\ \text{定理 1.8 の}T_B\ \text{の定義}\big) \\
&= BB^{-1} && \big(\because\ \text{主張 2.17}\big) \\
&= I && \big(\because\ BB^{-1} = I\big)
\end{aligned}
$$

合成則を示す。$G, H \in (\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}))^{\times}$（正則）とする。準備として、$GH$ が正則で $(GH)^{-1} = H^{-1}G^{-1}$ であることを確認する。$H^{-1}G^{-1}$ が GH の右逆元かつ左逆元であることを示せばよい。

$$
\begin{aligned}
(GH)(H^{-1}G^{-1}) &= G\big(H(H^{-1}G^{-1})\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= G\big((HH^{-1})G^{-1}\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= G(IG^{-1}) && (\because\ HH^{-1} = I) \\
&= GG^{-1} && (\because \text{ 主張 2.16}) \\
&= I && (\because\ GG^{-1} = I)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(H^{-1}G^{-1})(GH) &= H^{-1}\big(G^{-1}(GH)\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= H^{-1}\big((G^{-1}G)H\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= H^{-1}(IH) && (\because\ G^{-1}G = I) \\
&= H^{-1}H && (\because \text{ 主張 2.16}) \\
&= I && (\because\ H^{-1}H = I)
\end{aligned}
$$

よって、$H^{-1}G^{-1}$ は GH の両側逆元であり、GH は正則である。$(GH)^{-1}$ は $(GH)^{-1}(GH) = I$ を満たすので（正則の意味）、逆元は一つに定まる。

$$
\begin{aligned}
(GH)^{-1} &= (GH)^{-1}I && (\because \text{ 主張 2.17}) \\
&= (GH)^{-1}\big((GH)(H^{-1}G^{-1})\big) && (\because \text{ 上の右逆元の鎖}) \\
&= \big((GH)^{-1}(GH)\big)(H^{-1}G^{-1}) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= I(H^{-1}G^{-1}) && (\because\ (GH)^{-1}(GH) = I) \\
&= H^{-1}G^{-1} && (\because \text{ 主張 2.16})
\end{aligned}
$$

任意の $X \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して、

$$
\begin{aligned}
(T_G \circ T_H)(X) &= T_G\big(T_H(X)\big) && (\because \text{ 写像の合成の定義}) \\
&= T_G\big((HX)H^{-1}\big) && (\because \text{ 定理 1.8 の} T_B \text{ の定義（} B \to H \text{）}) \\
&= \Big(G\big((HX)H^{-1}\big)\Big)G^{-1} && (\because \text{ 定理 1.8 の} T_B \text{ の定義（} B \to G \text{）}) \\
&= \Big(\big(G(HX)\big)H^{-1}\Big)G^{-1} && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= \Big(\big((GH)X\big)H^{-1}\Big)G^{-1} && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= \big((GH)X\big)(H^{-1}G^{-1}) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= \big((GH)X\big)(GH)^{-1} && (\because\ (GH)^{-1} = H^{-1}G^{-1}) \\
&= T_{GH}(X) && (\because \text{ 定理 1.8 の} T_B \text{ の定義（} B \to GH \text{）})
\end{aligned}
$$

が成り立つ。よって、任意の $X \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について $(T_G \circ T_H)(X) = T_{GH}(X)$ であるから、$T_G \circ T_H = T_{GH}$ である。 □

主張 1.91 (交換子と反交換子の関係)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。$a, b, c \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、交換子を $[x, y] := xy - yx$、反交換子を $[x, y]_+ := xy + yx$ と定めるとき、

$$[ab, c] = a[b, c]_+ - [a, c]_+ b$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned}
[ab, c] &= (ab)c - c(ab) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= abc - cab && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= abc + acb - acb - cab && (\because\ acb - acb = O) \\
&= a(bc + cb) - acb - cab && (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= a(bc + cb) - (ac + ca)b && (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= a[b, c]_+ - [a, c]_+ b && (\because \text{反交換子の定義})
\end{aligned}$$

□

定義 1.92 (行列の差)**.** $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ について、差 $A - B \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ を、成分ごとに

$$(A - B)_{ik} := A_{ik} - B_{ik} \qquad (i \in \{1, \ldots, m\},\ k \in \{1, \ldots, p\})$$

で定める。右辺は 定義 1.15 の複素数の差である。数ベクトルの差も 定義 1.6 のとおり m 行 1 列の行列の差としてこの式で定まる。

定義 1.93 (零行列)**.** $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について、$O \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ を、成分ごとに

$$O_{ik} := 0 \qquad (i \in \{1, \ldots, m\},\ k \in \{1, \ldots, p\})$$

で定め、零行列と呼ぶ。$p = 1$ のとき（数ベクトルのとき）は 0 と書いて零ベクトルと呼ぶ。

定義 1.94 (行列の符号反転)**.** $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ について、$-A \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ を、成分ごとに

$$(-A)_{ik} := -A_{ik} \qquad (i \in \{1, \ldots, m\},\ k \in \{1, \ldots, p\})$$

で定める。右辺の $-A_{ik} \in \mathbb{C}$ は 定義 1.14 による。

主張 1.95 (行列の差が零行列であることと等しいことの同値)**.** $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ について

$$A - B = O \iff A = B$$

が成り立つ。$A - B$ は 定義 1.92、O は 定義 1.93 による。

証明. 行列が等しいことは、同じ大きさのもとですべての成分が等しいことである。i は $\{1, \ldots, m\}$、k は $\{1, \ldots, p\}$ を動く。

$$\begin{aligned}
&A - B = O \\
&\iff \forall i, k,\ (A - B)_{ik} = O_{ik} && (\because \text{行列の等号は成分ごと}) \\
&\iff \forall i, k,\ A_{ik} - B_{ik} = O_{ik} && (\because \text{定義 1.92}) \\
&\iff \forall i, k,\ A_{ik} - B_{ik} = 0 && (\because \text{定義 1.93}) \\
&\iff \forall i, k,\ A_{ik} = B_{ik} && (\because \text{移項}) \\
&\iff A = B && (\because \text{行列の等号は成分ごと})
\end{aligned}$$

□

主張 1.96 (行列の差と数ベクトルの積の分配則)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$、$v \in \mathbb{C}^n$ について

$$Av - Bv = (A - B)v$$

が成り立つ。差は 定義 1.92、行列と数ベクトルの積は 定義 1.6 による。

証明. $i \in \{1, \dots, m\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
(Av - Bv)_i &= (Av)_i - (Bv)_i && (\because \text{定義 1.92}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, v_j - \sum_{j=1}^{n} B_{ij}\, v_j && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (A_{ij}\, v_j - B_{ij}\, v_j) && (\because \text{有限和の差は項ごとの差の和}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (A_{ij} - B_{ij})\, v_j && (\because \text{分配則}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (A - B)_{ij}\, v_j && (\because \text{定義 1.92}) \\
&= ((A - B)v)_i && (\because \text{定義 1.6})
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 1.97 (行列と数ベクトルの差の積の分配則)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$、$u, w \in \mathbb{C}^n$ について

$$A(u - w) = Au - Aw$$

が成り立つ。差は 定義 1.92、行列と数ベクトルの積は 定義 1.6 による。

証明. $i \in \{1, \dots, m\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\big(A(u - w)\big)_i &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, (u - w)_j && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, (u_j - w_j) && (\because \text{定義 1.92}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (A_{ij}\, u_j - A_{ij}\, w_j) && (\because \text{分配則}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, u_j - \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, w_j && (\because \text{有限和の差は項ごとの差の和}) \\
&= (Au)_i - (Aw)_i && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= (Au - Aw)_i && (\because \text{定義 1.92})
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

定義 1.98 (固有ベクトル)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$\lambda \in \mathbb{C}$ とする。$v \in \mathbb{C}^n$ が

$$v \neq 0 \quad \text{かつ} \quad Av = \lambda v$$

を満たすとき、v を A の λ に属する固有ベクトルと呼ぶ。0 は $\mathbb{C}^n$ の零ベクトル（定義 1.93）、Av は 定義 1.6 の行列とベクトルの積、λv は 定義 2.3 のスカラー倍である。

定義 1.99 (固有値)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ とする。$\lambda \in \mathbb{C}$ について、A の λ に属する固有ベクトル（定義 1.98）が存在するとき、すなわち

$$\exists v \in \mathbb{C}^n, \quad v \neq 0 \text{ かつ } Av = \lambda v$$

が成り立つとき、λ を A の固有値と呼ぶ。

定義 1.100 (2×2 行列の行列式)**.** $B\in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ について、その行列式 $\det B\in\mathbb{C}$ を

$$\det B := B_{11}B_{22}-B_{12}B_{21}$$

で定める。この論文で行列式を使うのは 2×2 行列に対してだけである。

主張 1.101 (2×2 行列が0 でないベクトルを0 へ送ることと行列式が0 であることの同値)**.** $B\in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ について、

$$\big(\exists v\in\mathbb{C}^2,\quad v\neq 0 \text{ かつ } Bv=0\big) \iff \det B=0$$

が成り立つ。Bv は 定義 1.6、$\det B$ は 定義 1.100 による。

証明. ($\Rightarrow$) $v=(v_1,v_2)^{\mathsf{T}}\in\mathbb{C}^2$ が $v\neq 0$ かつ $Bv=0$ を満たすとする。定義 1.6 より $(Bv)_1 = B_{11}v_1+B_{12}v_2$、$(Bv)_2=B_{21}v_1+B_{22}v_2$ である。

$$\begin{aligned}
\det B\cdot v_1 &= (B_{11}B_{22}-B_{12}B_{21})\,v_1 && (\because \text{定義 1.100})\\
&= B_{11}B_{22}v_1-B_{12}B_{21}v_1 && (\because \text{分配則})\\
&= B_{22}B_{11}v_1-B_{12}B_{21}v_1 && (\because \mathbb{C}\text{ の乗法の可換則})\\
&= B_{22}B_{11}v_1-B_{12}B_{21}v_1+(B_{22}B_{12}v_2-B_{22}B_{12}v_2) && (\because x-x=0\ (x:=B_{22}B_{12}v_2))\\
&= B_{22}B_{11}v_1-B_{12}B_{21}v_1+(B_{22}B_{12}v_2-B_{12}B_{22}v_2) && (\because \mathbb{C}\text{ の乗法の可換則})\\
&= B_{22}B_{11}v_1+B_{22}B_{12}v_2-B_{12}B_{21}v_1-B_{12}B_{22}v_2 && (\because \mathbb{C}\text{ の加法の交換則と結合則})\\
&= B_{22}\,(B_{11}v_1+B_{12}v_2)-B_{12}\,(B_{21}v_1+B_{22}v_2) && (\because \text{分配則})\\
&= B_{22}(Bv)_1-B_{12}(Bv)_2 && (\because \text{定義 1.6})\\
&= B_{22}\cdot 0-B_{12}\cdot 0 && (\because Bv=0)\\
&= 0 && (\because \mathbb{C}\text{ の四則})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\det B\cdot v_2 &= (B_{11}B_{22}-B_{12}B_{21})\,v_2 && (\because \text{定義 1.100})\\
&= B_{11}B_{22}v_2-B_{12}B_{21}v_2 && (\because \text{分配則})\\
&= B_{11}B_{22}v_2-B_{21}B_{12}v_2 && (\because \mathbb{C}\text{ の乗法の可換則})\\
&= B_{11}B_{22}v_2-B_{21}B_{12}v_2+(B_{11}B_{21}v_1-B_{11}B_{21}v_1) && (\because x-x=0\ (x:=B_{11}B_{21}v_1))\\
&= B_{11}B_{22}v_2-B_{21}B_{12}v_2+(B_{11}B_{21}v_1-B_{21}B_{11}v_1) && (\because \mathbb{C}\text{ の乗法の可換則})\\
&= B_{11}B_{21}v_1+B_{11}B_{22}v_2-B_{21}B_{11}v_1-B_{21}B_{12}v_2 && (\because \mathbb{C}\text{ の加法の交換則と結合則})\\
&= B_{11}\,(B_{21}v_1+B_{22}v_2)-B_{21}\,(B_{11}v_1+B_{12}v_2) && (\because \text{分配則})\\
&= B_{11}(Bv)_2-B_{21}(Bv)_1 && (\because \text{定義 1.6})\\
&= B_{11}\cdot 0-B_{21}\cdot 0 && (\because Bv=0)\\
&= 0 && (\because \mathbb{C}\text{ の四則})
\end{aligned}$$

$v\neq 0$ なので、$v_i\neq 0$ となる $i\in\{1,2\}$ がある。上の 2 本の鎖のうちその i の鎖から $\det B\cdot v_i=0$ である。$\mathbb{C}$ は体（主張 1.56）ゆえ零因子を持たないので、$\det B=0$ または $v_i=0$ であり、後者は $v_i\neq 0$ に反する。よって $\det B=0$ である。

($\Leftarrow$) $\det B=0$ とする。B の 1 行目 (B_{11},B_{12}) と 2 行目 (B_{21},B_{22}) が零であるかどうかで、次の 3 つの場合に分ける。3 つの場合は互いに重ならず、すべての B を尽くす。

1 行目が零でない場合（$(B_{11},B_{12})\neq(0,0)$）。$v:=(B_{12},\ -B_{11})^{\mathsf{T}}$ と置く。$B_{12}\neq 0$ または $-B_{11}\neq 0$ なので $v\neq 0$ である。

$$\begin{aligned}
(Bv)_1 &= B_{11}B_{12}+B_{12}\,(-B_{11}) && (\because \text{定義 1.6})\\
&= B_{11}B_{12}-B_{12}B_{11} && (\because \mathbb{C}\text{ の四則})\\
&= B_{11}B_{12}-B_{11}B_{12} && (\because \mathbb{C}\text{ の乗法の可換則})\\
&= 0 && (\because x-x=0)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
(Bv)_2 &= B_{21}B_{12} + B_{22}\,(-B_{11}) && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= B_{21}B_{12} - B_{22}B_{11} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= B_{12}B_{21} - B_{11}B_{22} && (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則}) \\
&= -\left(B_{11}B_{22} - B_{12}B_{21}\right) && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= -\det B && (\because \text{定義 1.100}) \\
&= -0 && (\because \det B = 0) \\
&= 0 && (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

1 行目が零で 2 行目が零でない場合（$B_{11} = B_{12} = 0$ かつ $(B_{21}, B_{22}) \neq (0,0)$）。$v := (B_{22},\ -B_{21})^{\mathsf{T}}$ と置く。$B_{22} \neq 0$ または $-B_{21} \neq 0$ なので $v \neq 0$ である。

$$
\begin{aligned}
(Bv)_1 &= B_{11}B_{22} + B_{12}\,(-B_{21}) && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= 0 \cdot B_{22} + 0 \cdot (-B_{21}) && (\because B_{11} = B_{12} = 0) \\
&= 0 && (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(Bv)_2 &= B_{21}B_{22} + B_{22}\,(-B_{21}) && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= B_{21}B_{22} - B_{22}B_{21} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= B_{21}B_{22} - B_{21}B_{22} && (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則}) \\
&= 0 && (\because x - x = 0)
\end{aligned}
$$

1 行目も 2 行目も零の場合（$B_{11} = B_{12} = B_{21} = B_{22} = 0$）。$v := (1,\ 0)^{\mathsf{T}}$ と置く。$1 \neq 0$ なので $v \neq 0$ である。

$$
\begin{aligned}
(Bv)_1 &= B_{11} \cdot 1 + B_{12} \cdot 0 && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 && (\because B_{11} = B_{12} = 0) \\
&= 0 && (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(Bv)_2 &= B_{21} \cdot 1 + B_{22} \cdot 0 && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 && (\because B_{21} = B_{22} = 0) \\
&= 0 && (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

どの場合も $v \neq 0$ かつ $Bv = 0$ となる $v \in \mathbb{C}^2$ がある。 □

2 線型空間の一般論

定義 2.1 (クロネッカーのデルタ)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。$i, j \in \{1, \ldots, n\}$ について、$\delta_{ij} \in \mathbb{C}$ を

$$
\delta_{ij} := \begin{cases} 1_{\mathbb{C}} & (i = j) \\ 0_{\mathbb{C}} & (i \neq j) \end{cases}
$$

で定める。$1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1)$、$0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0)$ は 定義 1.13 の略記である。

定義 2.2 (単位行列)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。単位行列 $I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）を、定義 2.1 の δ_{ij} を使って成分ごとに

$$
\left(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\right)_{ij} := \delta_{ij} \qquad (i, j \in \{1, \ldots, n\})
$$

で定める。

定義 2.3 (行列のスカラー倍)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a \in \mathbb{C}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）とする。$A$ のスカラー倍 $aA \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$（$a \cdot A$ とも書く）を、成分ごとに

$$(aA)_{ij} := a\, A_{ij} \qquad (i \in \{1, \ldots, m\},\ j \in \{1, \ldots, n\})$$

で定める。右辺は 定義 1.12 の複素数の積である。

定義 2.4 (行列の和)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）とする。和 $A + B \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ を、成分ごとに

$$(A + B)_{ij} := A_{ij} + B_{ij} \qquad (i \in \{1, \ldots, m\},\ j \in \{1, \ldots, n\})$$

で定める。右辺は 定義 1.12 の複素数の和である。

定義 2.5 (行列の有限和)**.** $m, n, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X_1, \ldots, X_r \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）について、有限和 $\sum_{j=1}^{r} X_j \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ を r についての帰納法で

$$\sum_{j=1}^{1} X_j := X_1, \qquad \sum_{j=1}^{r+1} X_j := \Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + X_{r+1}$$

と定める（左から順に足す)。和は 定義 2.4 の行列の和である。

定義 2.6 (添字が 0 から始まる行列の有限和)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$K \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$X_0, \ldots, X_K \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）について、有限和 $\sum_{k=0}^{K} X_k \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ を

$$\sum_{k=0}^{K} X_k := \sum_{j=1}^{K+1} X_{j-1}$$

と定める。右辺は 定義 2.5 の有限和（$r \to K + 1$、j 番目の項を X_{j-1} とする）である。

主張 2.7 (行列の有限和の成分は成分の有限和)**.** $m, n, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X_1, \ldots, X_r \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。行列の有限和は 定義 2.5、右辺の複素数の有限和は 定義 1.16 による。このとき、$i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)_{ik} = \sum_{j=1}^{r} (X_j)_{ik}$$

が成り立つ。

証明. $i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, n\}$ を固定し、r についての帰納法で示す。$r = 1$ のとき

$$\begin{aligned} \Big(\sum_{j=1}^{1} X_j\Big)_{ik} &= (X_1)_{ik} \qquad (\because \text{定義 2.5}) \\ &= \sum_{j=1}^{1} (X_j)_{ik} \quad (\because \text{定義 1.16}) \end{aligned}$$

である。r で成り立つと仮定すると、$X_1, \ldots, X_{r+1} \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ について

$$
\begin{aligned}
\Big(\sum_{j=1}^{r+1} X_j\Big)_{ik} &= \Big(\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + X_{r+1}\Big)_{ik} && (\because \text{定義 2.5}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)_{ik} + (X_{r+1})_{ik} && (\because \text{定義 2.4}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{r} (X_j)_{ik}\Big) + (X_{r+1})_{ik} && (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{j=1}^{r+1} (X_j)_{ik} && (\because \text{定義 1.16})
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 2.8 (零行列を右から足しても行列は変わらない)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ について

$$X + O = X$$

が成り立つ。和は 定義 2.4、$O \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列である。

証明. $i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, n\}$ を固定し、$a, b \in \mathbb{R}$ を $X_{ik} = (a, b)$（定義 1.12 の台集合 $\mathbf{C} = \mathbf{R}^2$ の元として）となるように取る。

$$
\begin{aligned}
(X + O)_{ik} &= X_{ik} + O_{ik} && (\because \text{定義 2.4}) \\
&= X_{ik} + 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.93}) \\
&= (a, b) + 0_{\mathbb{C}} && (\because a, b \text{ の取り方}) \\
&= (a, b) + (0, 0) && (\because \text{定義 1.13}) \\
&= (a + 0,\ b + 0) && (\because \text{定義 1.12 の和}) \\
&= (a, b) && (\because \mathbb{R} \text{ で } a + 0 = a,\ b + 0 = b) \\
&= X_{ik} && (\because a, b \text{ の取り方})
\end{aligned}
$$

であり、すべての成分が等しいので $X + O = X$ である（行列の等号は成分ごと）。 □

主張 2.9 (零行列を左から足しても行列は変わらない)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ について

$$O + X = X$$

が成り立つ。和は 定義 2.4、$O \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列である。

証明. $i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, n\}$ を固定し、$a, b \in \mathbb{R}$ を $X_{ik} = (a, b)$（定義 1.12 の台集合 $\mathbf{C} = \mathbf{R}^2$ の元として）となるように取る。

$$
\begin{aligned}
(O + X)_{ik} &= O_{ik} + X_{ik} && (\because \text{定義 2.4}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} + X_{ik} && (\because \text{定義 1.93}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} + (a, b) && (\because a, b \text{ の取り方}) \\
&= (0, 0) + (a, b) && (\because \text{定義 1.13}) \\
&= (0 + a,\ 0 + b) && (\because \text{定義 1.12 の和}) \\
&= (a, b) && (\because \mathbb{R} \text{ で } 0 + a = a,\ 0 + b = b) \\
&= X_{ik} && (\because a, b \text{ の取り方})
\end{aligned}
$$

であり、すべての成分が等しいので $O + X = X$ である（行列の等号は成分ごと）。 □

主張 2.10 (零行列を引いても行列は変わらない)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ について

$$X - O = X$$

が成り立つ。差は 定義 1.92、$O \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列である。

証明. $i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, n\}$ を固定すると

$$\begin{aligned}
(X - O)_{ik} &= X_{ik} - O_{ik} && (\because \text{ 定義 1.92}) \\
&= X_{ik} - 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.93}) \\
&= X_{ik} + (-0_{\mathbb{C}}) && (\because \text{ 定義 1.15}) \\
&= X_{ik} + (-1_{\mathbb{C}}) \cdot 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.14}) \\
&= X_{ik} + (-1, 0) \cdot (0, 0) && (\because \text{ 定義 1.13}) \\
&= X_{ik} + \big((-1) \cdot 0 - 0 \cdot 0,\ (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 0\big) && (\because \text{ 定義 1.12 の積}) \\
&= X_{ik} + (0, 0) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= X_{ik} + 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.13}) \\
&= X_{ik} + O_{ik} && (\because \text{ 定義 1.93}) \\
&= (X + O)_{ik} && (\because \text{ 定義 2.4})
\end{aligned}$$

であり、すべての成分が等しいので $X - O = X + O$ である（行列の等号は成分ごと）。よって

$$\begin{aligned}
X - O &= X + O && (\because \text{ 上の成分ごとの等式}) \\
&= X && (\because \text{ 主張 2.8})
\end{aligned}$$

である。 □

主張 2.11 (零行列の有限和は零行列)**.** $m, n, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について、$O \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$（定義 1.93）を r 個足した有限和（定義 2.5 で $X_1 = \cdots = X_r = O$ としたもの）について

$$\sum_{j=1}^{r} O = O$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で示す。$r = 1$ のとき

$$\sum_{j=1}^{1} O = O \quad (\because \text{ 定義 2.5})$$

である。r で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{r+1} O &= \Big(\sum_{j=1}^{r} O\Big) + O && (\because \text{ 定義 2.5}) \\
&= O + O && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= O && (\because \text{ 主張 2.8 } (X = O))
\end{aligned}$$

である。 □

主張 2.12 (零行列のスカラー倍は零行列)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a \in \mathbb{C}$ について

$$aO = O$$

が成り立つ。スカラー倍は 定義 2.3、$O \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列である。

証明. $i \in \{1, \dots, m\}$、$k \in \{1, \dots, n\}$ を固定する。

$$\begin{aligned}(aO)_{ik} &= a\,O_{ik} && \left(\because \text{ 定義 2.3}\right)\\ &= a\,0_{\mathbb{C}} && \left(\because \text{ 定義 1.93}\right)\\ &= 0_{\mathbb{C}} && \left(\because \text{ 主張 1.59 } (z = a)\right)\\ &= O_{ik} && \left(\because \text{ 定義 1.93}\right)\end{aligned}$$

であり、すべての成分が等しいので $aO = O$ である（行列の等号は成分ごと）。 □

主張 2.13 (行列の 0 倍は零行列)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ について

$$0_{\mathbb{C}}\, A = O$$

が成り立つ。スカラー倍は 定義 2.3、$O \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列である。

証明. $i \in \{1, \dots, m\}$、$k \in \{1, \dots, n\}$ を固定する。

$$\begin{aligned}(0_{\mathbb{C}}\, A)_{ik} &= 0_{\mathbb{C}}\, A_{ik} && \left(\because \text{ 定義 2.3}\right)\\ &= 0_{\mathbb{C}} && \left(\because \text{ 主張 1.58 } (z \to A_{ik})\right)\\ &= O_{ik} && \left(\because \text{ 定義 1.93}\right)\end{aligned}$$

であり、すべての成分が等しいので $0_{\mathbb{C}}\, A = O$ である（行列の等号は成分ごと）。 □

主張 2.14 (行列の和の可換則)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ について

$$A + B = B + A$$

が成り立つ。和は 定義 2.4 による。

証明. $i \in \{1, \dots, m\}$、$k \in \{1, \dots, n\}$ を固定する。

$$\begin{aligned}(A + B)_{ik} &= A_{ik} + B_{ik} && \left(\because \text{ 定義 2.4}\right)\\ &= B_{ik} + A_{ik} && \left(\because \text{ } \mathbb{C} \text{ の加法の交換律。主張 1.56}\right)\\ &= (B + A)_{ik} && \left(\because \text{ 定義 2.4 を右辺から左辺へ}\right)\end{aligned}$$

であり、すべての成分が等しいので $A + B = B + A$ である（行列の等号は成分ごと）。 □

主張 2.15 (行列の積の結合律)**.** $m, n, p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$、$B \in \mathrm{Mat}(n, p, \mathbb{C})$、$C \in \mathrm{Mat}(p, q, \mathbb{C})$ とする。積は 定義 1.6 による。このとき

$$(AB)C = A(BC)$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, q, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \dots, m\}$、$k \in \{1, \dots, q\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\big((AB)C\big)_{ik} &= \sum_{l=1}^{p} (AB)_{il}\, C_{lk} && (\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6}) \\
&= \sum_{l=1}^{p} \Big(\sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, B_{jl} \Big) C_{lk} && (\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6 を } (AB)_{il} \text{ へ適用}) \\
&= \sum_{l=1}^{p} \sum_{j=1}^{n} (A_{ij}\, B_{jl})\, C_{lk} && (\because \mathbb{C} \text{ の分配律を有限和の項の数だけ繰り返す主張 1.56}) \\
&= \sum_{l=1}^{p} \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, (B_{jl}\, C_{lk}) && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{l=1}^{p} A_{ij}\, (B_{jl}\, C_{lk}) && (\because \text{ 有限個の項の和の順序の入れ替え（}\mathbb{C} \text{ の加法の結合律・交換律主張 1.56）}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij} \Big(\sum_{l=1}^{p} B_{jl}\, C_{lk} \Big) && (\because \mathbb{C} \text{ の分配律を有限和の項の数だけ繰り返す主張 1.56}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, (BC)_{jk} && (\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6 を } (BC)_{jk} \text{ へ適用}) \\
&= \big(A(BC)\big)_{ik} && (\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.16 (単位行列を左から掛けても変わらない)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。単位行列は 定義 2.2、積は 定義 1.6 による。このとき

$$I_{\mathrm{Mat}(m,\mathbb{C})}\, A = A$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, n\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\big(I_{\mathrm{Mat}(m,\mathbb{C})}\, A\big)_{ik} &= \sum_{j=1}^{m} \big(I_{\mathrm{Mat}(m,\mathbb{C})}\big)_{ij}\, A_{jk} && (\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6}) \\
&= \sum_{j=1}^{m} \delta_{ij}\, A_{jk} && (\because \text{ 単位行列の定義定義 2.2}) \\
&= \delta_{ii}\, A_{ik} + \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \neq i}} \delta_{ij}\, A_{jk} && (\because j = i \text{ の項を分ける（}\mathbb{C} \text{ の加法の結合律・交換律主張 1.56）}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\, A_{ik} + \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \neq i}} 0_{\mathbb{C}}\, A_{jk} && (\because \delta \text{ の値定義 2.1}) \\
&= A_{ik} + \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \neq i}} 0_{\mathbb{C}}\, A_{jk} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元主張 1.56}) \\
&= A_{ik} + \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \neq i}} 0_{\mathbb{C}} && (\because 0_{\mathbb{C}} z = 0_{\mathbb{C}} \text{ 主張 1.58 を各項へ適用}) \\
&= A_{ik} && (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の加法の単位元で、これを項の数だけ繰り返す主張 1.56})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.17 (単位行列を右から掛けても変わらない)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。単位行列は 定義 2.2、積は 定義 1.6 による。このとき

$$A\, I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} = A$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1,\dots,m\}$、$k \in \{1,\dots,n\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\bigl(A\,I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\bigr)_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,\bigl(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\bigr)_{jk} && (\because \text{行列の積の定義定義 1.6})\\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,\delta_{jk} && (\because \text{単位行列の定義定義 2.2})\\
&= A_{ik}\,\delta_{kk} + \sum_{\substack{1\le j\le n\\ j\neq k}} A_{ij}\,\delta_{jk} && (\because\ j=k \text{ の項を分ける（}\mathbb{C}\text{ の加法の結合律・交換律主張 1.56）})\\
&= A_{ik}\,1_{\mathbb{C}} + \sum_{\substack{1\le j\le n\\ j\neq k}} A_{ij}\,0_{\mathbb{C}} && (\because \delta \text{ の値定義 2.1})\\
&= A_{ik} + \sum_{\substack{1\le j\le n\\ j\neq k}} A_{ij}\,0_{\mathbb{C}} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元主張 1.56})\\
&= A_{ik} + \sum_{\substack{1\le j\le n\\ j\neq k}} 0_{\mathbb{C}} && (\because z\,0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}} \text{ 主張 1.59 を各項へ適用})\\
&= A_{ik} && (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の加法の単位元で、これを項の数だけ繰り返す主張 1.56})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.18 (左の因子のスカラー倍は行列の積の外へ出せる)**.** $m,n,p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a \in \mathbb{C}$、$A \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$B \in \mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ とする。スカラー倍は 定義 2.3、積は 定義 1.6 による。このとき

$$(aA)B = a(AB)$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1,\dots,m\}$、$k \in \{1,\dots,p\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\bigl((aA)B\bigr)_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} (aA)_{ij}\,B_{jk} && (\because \text{行列の積の定義定義 1.6})\\
&= \sum_{j=1}^{n} (a\,A_{ij})\,B_{jk} && (\because \text{スカラー倍の定義定義 2.3})\\
&= \sum_{j=1}^{n} a\,(A_{ij}\,B_{jk}) && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56})\\
&= a\sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,B_{jk} && (\because \mathbb{C} \text{ の分配律を有限和の項の数だけ繰り返す主張 1.56})\\
&= a\,(AB)_{ik} && (\because \text{行列の積の定義定義 1.6})\\
&= \bigl(a(AB)\bigr)_{ik} && (\because \text{スカラー倍の定義定義 2.3})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.19 (右の因子のスカラー倍は行列の積の外へ出せる)**.** $m,n,p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a \in \mathbb{C}$、$A \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$B \in \mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ とする。スカラー倍は 定義 2.3、積は 定義 1.6 による。このとき

$$A(aB) = a(AB)$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1,\dots,m\}$、$k \in \{1,\dots,p\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\big(A(aB)\big)_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,(aB)_{jk} && \big(\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6}\big)\\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,(a\,B_{jk}) && \big(\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3}\big)\\
&= \sum_{j=1}^{n} (A_{ij}\,a)\,B_{jk} && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}\big)\\
&= \sum_{j=1}^{n} (a\,A_{ij})\,B_{jk} && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の交換律主張 1.56}\big)\\
&= \sum_{j=1}^{n} a\,(A_{ij}\,B_{jk}) && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}\big)\\
&= a\sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,B_{jk} && \big(\because \mathbb{C} \text{ の分配律を有限和の項の数だけ繰り返す主張 1.56}\big)\\
&= a\,(AB)_{ik} && \big(\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6}\big)\\
&= \big(a(AB)\big)_{ik} && \big(\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3}\big)
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.20 (左の因子の符号反転は行列の積の外へ出る)**.** $m,n,p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$B \in \mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ とする。符号反転は 定義 1.94、積は 定義 1.6 による。このとき

$$(-A)B = -(AB)$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1,\dots,m\}$、$k \in \{1,\dots,p\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\big((-A)B\big)_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} (-A)_{ij}\, B_{jk} && \big(\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6}\big) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-A_{ij})\, B_{jk} && \big(\because \text{ 符号反転の定義定義 1.94}\big) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \big((-1_{\mathbb{C}})\, A_{ij}\big)\, B_{jk} && \big(\because \text{ 定義 1.14}\big) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1_{\mathbb{C}})\, (A_{ij}\, B_{jk}) && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}\big) \\
&= (-1_{\mathbb{C}}) \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, B_{jk} && \big(\because \mathbb{C} \text{ の分配律を有限和の項の数だけ繰り返す主張 1.56}\big) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\, (AB)_{ik} && \big(\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6}\big) \\
&= -(AB)_{ik} && \big(\because \text{ 定義 1.14}\big) \\
&= \big(-(AB)\big)_{ik} && \big(\because \text{ 符号反転の定義定義 1.94}\big)
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.21 (右の因子の符号反転は行列の積の外へ出る)**.** $m, n, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$、$B \in \mathrm{Mat}(n, p, \mathbb{C})$ とする。符号反転は 定義 1.94、積は 定義 1.6 による。このとき

$$A(-B) = -(AB)$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, p\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\big(A(-B)\big)_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,(-B)_{jk} && (\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6})\\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,(-B_{jk}) && (\because \text{ 符号反転の定義定義 1.94})\\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,\big((-1_{\mathbb{C}})\,B_{jk}\big) && (\because \text{ 定義 1.14})\\
&= \sum_{j=1}^{n} \big(A_{ij}\,(-1_{\mathbb{C}})\big)\,B_{jk} && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56})\\
&= \sum_{j=1}^{n} \big((-1_{\mathbb{C}})\,A_{ij}\big)\,B_{jk} && (\because \mathbb{C} \text{ の積の交換律主張 1.56})\\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1_{\mathbb{C}})\,(A_{ij}\,B_{jk}) && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56})\\
&= (-1_{\mathbb{C}}) \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,B_{jk} && (\because \mathbb{C} \text{ の分配律を有限和の項の数だけ繰り返す主張 1.56})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,(AB)_{ik} && (\because \text{ 行列の積の定義定義 1.6})\\
&= -(AB)_{ik} && (\because \text{ 定義 1.14})\\
&= \big(-(AB)\big)_{ik} && (\because \text{ 符号反転の定義定義 1.94})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.22 (複素数の和の有限和は有限和の和)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n \in \mathbb{C}$ とする。有限和は 定義 1.16、和は 定義 1.12 の和による。このとき

$$
\sum_{j=1}^{n} (a_j + b_j) = \Big(\sum_{j=1}^{n} a_j\Big) + \Big(\sum_{j=1}^{n} b_j\Big)
$$

が成り立つ。

証明. n についての帰納法で示す。$n = 1$ のとき

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{1} (a_j + b_j) &= a_1 + b_1 && (\because \text{ 定義 1.16})\\
&= \Big(\sum_{j=1}^{1} a_j\Big) + \Big(\sum_{j=1}^{1} b_j\Big) && (\because \text{ 定義 1.16 を 2 か所へ同時適用})
\end{aligned}
$$

である。n で成り立つと仮定し、$a_1, \ldots, a_{n+1}, b_1, \ldots, b_{n+1} \in \mathbb{C}$ を取る。$\alpha := \sum_{j=1}^{n} a_j$、$\beta := \sum_{j=1}^{n} b_j$ とおく（$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$）。

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{n+1}(a_j+b_j) &= \Big(\sum_{j=1}^{n}(a_j+b_j)\Big)+(a_{n+1}+b_{n+1}) && (\because \text{定義 1.16})\\
&= (\alpha+\beta)+(a_{n+1}+b_{n+1}) && (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= \alpha+\big(\beta+(a_{n+1}+b_{n+1})\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の和の結合律主張 1.56})\\
&= \alpha+\big((\beta+a_{n+1})+b_{n+1}\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の和の結合律主張 1.56})\\
&= \alpha+\big((a_{n+1}+\beta)+b_{n+1}\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の和の交換律主張 1.56})\\
&= \alpha+\big(a_{n+1}+(\beta+b_{n+1})\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の和の結合律主張 1.56})\\
&= (\alpha+a_{n+1})+(\beta+b_{n+1}) && (\because \mathbb{C} \text{ の和の結合律主張 1.56})\\
&= \Big(\sum_{j=1}^{n+1}a_j\Big)+\Big(\sum_{j=1}^{n+1}b_j\Big) && (\because \alpha,\beta \text{ の置き方と定義 1.16 を 2 か所へ同時適用})
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 2.23 (行列の積は右の因子の和に分配する)**.** $m,n,p\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A\in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$B,C\in \mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ とする。和は 定義 2.4、積は 定義 1.6 による。このとき

$$A(B+C)=AB+AC$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i\in\{1,\dots,m\}$、$k\in\{1,\dots,p\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\big(A(B+C)\big)_{ik} &= \sum_{j=1}^{n}A_{ij}\,(B+C)_{jk} && (\because \text{行列の積の定義定義 1.6})\\
&= \sum_{j=1}^{n}A_{ij}\,(B_{jk}+C_{jk}) && (\because \text{行列の和の定義定義 2.4})\\
&= \sum_{j=1}^{n}\big(A_{ij}\,B_{jk}+A_{ij}\,C_{jk}\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の分配律主張 1.56 を各項へ同時適用})\\
&= \Big(\sum_{j=1}^{n}A_{ij}\,B_{jk}\Big)+\Big(\sum_{j=1}^{n}A_{ij}\,C_{jk}\Big) && (\because \text{主張 2.22})\\
&= (AB)_{ik}+(AC)_{ik} && (\because \text{行列の積の定義定義 1.6 を 2 か所へ同時適用})\\
&= (AB+AC)_{ik} && (\because \text{行列の和の定義定義 2.4})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.24 (行列の積は左の因子の和に分配する)**.** $m,n,p\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A,B\in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$C\in \mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ とする。和は 定義 2.4、積は 定義 1.6 による。このとき

$$(A+B)C=AC+BC$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i\in\{1,\dots,m\}$、$k\in\{1,\dots,p\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\big((A+B)C\big)_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} (A+B)_{ij}\, C_{jk} && (\because \text{行列の積の定義定義 1.6}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (A_{ij}+B_{ij})\, C_{jk} && (\because \text{行列の和の定義定義 2.4}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \big(A_{ij}\, C_{jk} + B_{ij}\, C_{jk}\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の分配律主張 1.56 を各項へ同時適用}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, C_{jk}\Big) + \Big(\sum_{j=1}^{n} B_{ij}\, C_{jk}\Big) && (\because \text{主張 2.22}) \\
&= (AC)_{ik} + (BC)_{ik} && (\because \text{行列の積の定義定義 1.6 を 2 か所へ同時適用}) \\
&= (AC+BC)_{ik} && (\because \text{行列の和の定義定義 2.4})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.25 (行列の符号反転は -1 倍に等しい)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。符号反転は 定義 1.94、スカラー倍は 定義 2.3 による。このとき

$$-A = (-1_{\mathbb{C}})\, A$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$j \in \{1, \ldots, n\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
(-A)_{ij} &= -A_{ij} && (\because \text{符号反転の定義定義 1.94}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\, A_{ij} && (\because \text{定義 1.14}) \\
&= \big((-1_{\mathbb{C}})\, A\big)_{ij} && (\because \text{スカラー倍の定義定義 2.3})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.26 (符号反転した行列のスカラー倍はスカラー倍の符号反転に等しい)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a \in \mathbb{C}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。スカラー倍は 定義 2.3、符号反転は 定義 1.94 による。このとき

$$a(-A) = -(aA)$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$j \in \{1, \ldots, n\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\big(a(-A)\big)_{ij} &= a\,(-A)_{ij} && (\because \text{スカラー倍の定義定義 2.3}) \\
&= a\,(-A_{ij}) && (\because \text{符号反転の定義定義 1.94}) \\
&= a\,\big((-1_{\mathbb{C}})\, A_{ij}\big) && (\because \text{定義 1.14}) \\
&= \big(a\,(-1_{\mathbb{C}})\big)\, A_{ij} && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= \big((-1_{\mathbb{C}})\, a\big)\, A_{ij} && (\because \mathbb{C} \text{ の積の交換律主張 1.56}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,(a\, A_{ij}) && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= -(a\, A_{ij}) && (\because \text{定義 1.14}) \\
&= -(aA)_{ij} && (\because \text{スカラー倍の定義定義 2.3}) \\
&= \big(-(aA)\big)_{ij} && (\because \text{符号反転の定義定義 1.94})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.27 (行列の符号反転を二回施すと元に戻る)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。符号反転は 定義 1.94 による。このとき

$$-(-A) = A$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$j \in \{1, \ldots, n\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\big(-(-A)\big)_{ij} &= -\big((-A)_{ij}\big) && (\because \text{符号反転の定義定義 1.94}) \\
&= -(-A_{ij}) && (\because \text{符号反転の定義定義 1.94}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,\big((-1_{\mathbb{C}})\,A_{ij}\big) && (\because \text{定義 1.14 を 2 か所へ同時適用}) \\
&= \big((-1_{\mathbb{C}})\,(-1_{\mathbb{C}})\big)\,A_{ij} && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\,A_{ij} && (\because \mathbb{C} \text{ で } (-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}}) = 1_{\mathbb{C}}\text{。定義 1.12 の積}) \\
&= A_{ij} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元主張 1.56})
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.28 (行列の和の符号反転は符号反転の和に等しい)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。符号反転は 定義 1.94、和は 定義 2.4 による。このとき

$$-(A + B) = (-A) + (-B)$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$j \in \{1, \ldots, n\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\big(-(A + B)\big)_{ij} &= -\big((A + B)_{ij}\big) && (\because \text{符号反転の定義定義 1.94}) \\
&= -(A_{ij} + B_{ij}) && (\because \text{和の定義定義 2.4}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,(A_{ij} + B_{ij}) && (\because \text{定義 1.14}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,A_{ij} + (-1_{\mathbb{C}})\,B_{ij} && (\because \mathbb{C} \text{ の分配律主張 1.56}) \\
&= (-A_{ij}) + (-B_{ij}) && (\because \text{定義 1.14 を 2 か所へ同時適用}) \\
&= (-A)_{ij} + (-B)_{ij} && (\because \text{符号反転の定義定義 1.94 を 2 か所へ同時適用}) \\
&= \big((-A) + (-B)\big)_{ij} && (\because \text{和の定義定義 2.4})
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.29 (符号反転した行列の有限和は有限和の符号反転に等しい)**.** $m, n, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X_1, \ldots, X_r \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。有限和は 定義 2.5、符号反転は 定義 1.94 による。このとき

$$\sum_{j=1}^{r} (-X_j) = -\sum_{j=1}^{r} X_j$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で示す。$r=1$ のとき

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{1}(-X_j) &= -X_1 && (\because \text{ 定義 2.5 (項 } -X_j) \text{ })\\ &= -\sum_{j=1}^{1} X_j && (\because \text{ 定義 2.5})\end{aligned}$$

である。r で成り立つと仮定すると、$X_1,\dots,X_{r+1}\in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{r+1}(-X_j) &= \Big(\sum_{j=1}^{r}(-X_j)\Big)+(-X_{r+1}) && (\because \text{ 定義 2.5 (項 } -X_j) \text{ })\\ &= \Big(-\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)+(-X_{r+1}) && (\because \text{ 帰納法の仮定})\\ &= -\Big(\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)+X_{r+1}\Big) && (\because \text{ 主張 2.28 } (A=\textstyle\sum_{j=1}^{r} X_j,\ B=X_{r+1}))\\ &= -\sum_{j=1}^{r+1} X_j && (\because \text{ 定義 2.5})\end{aligned}$$

である。 □

主張 2.30 (行列の差は符号反転した行列との和に等しい)**.** $m,n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A,B\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ とする。差は 定義 1.92、符号反転は 定義 1.94、和は 定義 2.4 による。このとき

$$A-B=A+(-B)$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i\in\{1,\dots,m\}$、$j\in\{1,\dots,n\}$ を取る。

$$\begin{aligned}(A-B)_{ij} &= A_{ij}-B_{ij} && (\because \text{ 差の定義定義 1.92})\\ &= A_{ij}+(-B_{ij}) && (\because \text{ 複素数の差の定義定義 1.15})\\ &= A_{ij}+(-B)_{ij} && (\because \text{ 符号反転の定義定義 1.94})\\ &= \big(A+(-B)\big)_{ij} && (\because \text{ 和の定義定義 2.4})\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.31 (符号反転した行列の差は差の符号反転に等しい)**.** $m,n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A,B\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ とする。差は 定義 1.92、符号反転は 定義 1.94 による。このとき

$$(-A)-(-B)=-(A-B)$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned}(-A)-(-B) &= (-A)+\big(-(-B)\big) && (\because \text{ 主張 2.30 } (A\to -A,\ B\to -B))\\ &= -\big(A+(-B)\big) && (\because \text{ 主張 2.28 } (A\to A,\ B\to -B))\\ &= -(A-B) && (\because \text{ 主張 2.30 を } -(\cdot) \text{ の中へ右辺から左辺へ})\end{aligned}$$

□

主張 2.32 (スカラー倍は行列の差に分配する)**.** $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c \in \mathbb{C}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ とする。スカラー倍は 定義 2.3、差は 定義 1.92 による。このとき

$$c(A - B) = cA - cB$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, p\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\big(c(A-B)\big)_{ik} &= c\,(A-B)_{ik} && (\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3}) \\
&= c\,(A_{ik} - B_{ik}) && (\because \text{ 差の定義定義 1.92}) \\
&= c\,\big(A_{ik} + (-B_{ik})\big) && (\because \text{ 定義 1.15}) \\
&= c\,A_{ik} + c\,(-B_{ik}) && (\because \mathbb{C} \text{ の分配律主張 1.56}) \\
&= c\,A_{ik} + c\,\big((-1_{\mathbb{C}})\,B_{ik}\big) && (\because \text{ 定義 1.14}) \\
&= c\,A_{ik} + \big(c\,(-1_{\mathbb{C}})\big)\,B_{ik} && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= c\,A_{ik} + \big((-1_{\mathbb{C}})\,c\big)\,B_{ik} && (\because \mathbb{C} \text{ の積の交換律主張 1.56}) \\
&= c\,A_{ik} + (-1_{\mathbb{C}})\,(c\,B_{ik}) && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= c\,A_{ik} + \big(-(c\,B_{ik})\big) && (\because \text{ 定義 1.14}) \\
&= c\,A_{ik} - c\,B_{ik} && (\because \text{ 定義 1.15}) \\
&= (cA)_{ik} - (cB)_{ik} && (\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3 を 2 箇所へ適用}) \\
&= (cA - cB)_{ik} && (\because \text{ 差の定義定義 1.92})
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.33 (スカラー倍は行列の和に分配する)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c \in \mathbb{C}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。スカラー倍は 定義 2.3、和は 定義 2.4 による。このとき

$$c(A + B) = cA + cB$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$j \in \{1, \ldots, n\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\big(c(A+B)\big)_{ij} &= c\,(A+B)_{ij} && (\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3}) \\
&= c\,(A_{ij} + B_{ij}) && (\because \text{ 和の定義定義 2.4}) \\
&= c\,A_{ij} + c\,B_{ij} && (\because \mathbb{C} \text{ の分配律主張 1.56}) \\
&= (cA)_{ij} + (cB)_{ij} && (\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3 を 2 箇所へ適用}) \\
&= (cA + cB)_{ij} && (\because \text{ 和の定義定義 2.4})
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.34 (スカラー倍した行列の有限和は有限和のスカラー倍に等しい)**.** $m, n, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c \in \mathbb{C}$、$X_1, \ldots, X_r \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。有限和は 定義 2.5、スカラー倍は 定義 2.3 による。このとき

$$\sum_{j=1}^{r} (cX_j) = c \sum_{j=1}^{r} X_j$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で示す。$r=1$ のとき

$$\sum_{j=1}^{1}(cX_j) = cX_1 \qquad (\because \text{ 定義 2.5 (項}cX_j\text{) })$$
$$= c\sum_{j=1}^{1} X_j \quad (\because \text{ 定義 2.5})$$

である。r で成り立つと仮定すると、$X_1,\dots,X_{r+1}\in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{r+1}(cX_j) &= \Big(\sum_{j=1}^{r}(cX_j)\Big) + cX_{r+1} \quad (\because \text{ 定義 2.5 (項}cX_j\text{) }) \\
&= \Big(c\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + cX_{r+1} \quad (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= c\Big(\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + X_{r+1}\Big) \quad (\because \text{ 主張 2.33 } (A\to\textstyle\sum_{j=1}^{r}X_j,\ B\to X_{r+1}) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= c\sum_{j=1}^{r+1} X_j \quad (\because \text{ 定義 2.5})
\end{aligned}$$

である。 □

主張 2.35 (一つの行列のスカラー倍の有限和は係数の有限和によるスカラー倍に等しい)**.** $m,n,r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c_1,\dots,c_r\in\mathbb{C}$、$A\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ とする。行列の有限和は 定義 2.5、複素数の有限和は 定義 1.16、スカラー倍は 定義 2.3 による。このとき

$$\sum_{j=1}^{r}(c_jA) = \Big(\sum_{j=1}^{r} c_j\Big)A$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i\in\{1,\dots,m\}$、$k\in\{1,\dots,n\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\Big(\sum_{j=1}^{r}(c_jA)\Big)_{ik} &= \sum_{j=1}^{r}(c_jA)_{ik} \qquad (\because \text{ 主張 2.7}) \\
&= \sum_{j=1}^{r} c_j\,A_{ik} \qquad (\because \text{ 定義 2.3 を}r\text{ 個の項へ同時適用}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{r} c_j\Big)A_{ik} \qquad (\because \mathbb{C}\text{ の有限和の分配則}) \\
&= \Big(\Big(\sum_{j=1}^{r} c_j\Big)A\Big)_{ik} \quad (\because \text{ 定義 2.3})
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.36 (行列の有限和を左の因子とする積は各項の積の有限和に等しい)**.** $m,n,p,r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X_1,\dots,X_r\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$C\in\mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ とする。有限和は 定義 2.5、積は 定義 1.6 による。このとき

$$\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)C = \sum_{j=1}^{r}(X_jC)$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で示す。$r=1$ のとき

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{j=1}^{1} X_j\Big)C &= X_1C && (\because \text{ 定義 2.5})\\ &= \sum_{j=1}^{1}(X_jC) && (\because \text{ 定義 2.5（項}X_jC\text{）を右辺から左辺へ})\end{aligned}$$

である。r で成り立つと仮定すると、$X_1,\ldots,X_{r+1}\in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{j=1}^{r+1} X_j\Big)C &= \Big(\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)+X_{r+1}\Big)C && (\because \text{ 定義 2.5})\\ &= \Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)C + X_{r+1}C && (\because \text{ 主張 2.24 } (A\to\textstyle\sum_{j=1}^{r}X_j,\ B\to X_{r+1}))\\ &= \Big(\sum_{j=1}^{r}(X_jC)\Big) + X_{r+1}C && (\because \text{ 帰納法の仮定})\\ &= \sum_{j=1}^{r+1}(X_jC) && (\because \text{ 定義 2.5（項}X_jC\text{）を右辺から左辺へ})\end{aligned}$$

である。 □

主張 2.37 (行列の有限和を右の因子とする積は各項の積の有限和に等しい)**.** $m,n,p,r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$C\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$X_1,\ldots,X_r\in\mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ とする。有限和は 定義 2.5、積は 定義 1.6 による。このとき

$$C\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) = \sum_{j=1}^{r}(CX_j)$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で示す。$r=1$ のとき

$$\begin{aligned}C\Big(\sum_{j=1}^{1} X_j\Big) &= CX_1 && (\because \text{ 定義 2.5})\\ &= \sum_{j=1}^{1}(CX_j) && (\because \text{ 定義 2.5（項}CX_j\text{）を右辺から左辺へ})\end{aligned}$$

である。r で成り立つと仮定すると、$X_1,\ldots,X_{r+1}\in\mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ について

$$
\begin{aligned}
C\Big(\sum_{j=1}^{r+1} X_j\Big) &= C\Big(\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + X_{r+1}\Big) && (\because \text{ 定義 2.5}) \\
&= C\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + CX_{r+1} && (\because \text{ 主張 2.23 } (A \to C,\ B \to \textstyle\sum_{j=1}^{r} X_j,\ C \to X_{r+1} \text{ を同時に置き換える})) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{r} (CX_j)\Big) + CX_{r+1} && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{j=1}^{r+1} (CX_j) && (\because \text{ 定義 2.5 (項} CX_j \text{) を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 2.38 (一つの行列のスカラー倍の差は係数の差によるスカラー倍に等しい)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a, b \in \mathbb{C}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。スカラー倍は 定義 2.3、行列の差は 定義 1.92、複素数の差は 定義 1.15 による。このとき

$$aA - bA = (a - b)A$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, n\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
(aA - bA)_{ik} &= (aA)_{ik} - (bA)_{ik} && (\because \text{ 差の定義定義 1.92}) \\
&= a\,A_{ik} - b\,A_{ik} && (\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3 を 2 箇所へ適用}) \\
&= a\,A_{ik} + \big(-(b\,A_{ik})\big) && (\because \text{ 定義 1.15}) \\
&= a\,A_{ik} + (-1_{\mathbb{C}})\,(b\,A_{ik}) && (\because \text{ 定義 1.14}) \\
&= a\,A_{ik} + \big((-1_{\mathbb{C}})\,b\big)\,A_{ik} && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= a\,A_{ik} + (-b)\,A_{ik} && (\because \text{ 定義 1.14 を右辺から左辺へ}) \\
&= \big(a + (-b)\big)\,A_{ik} && (\because \mathbb{C} \text{ の分配律主張 1.56 を右辺から左辺へ}) \\
&= (a - b)\,A_{ik} && (\because \text{ 定義 1.15 を右辺から左辺へ}) \\
&= \big((a - b)A\big)_{ik} && (\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.39 (行列の二重の有限和は和の順序を入れ替えても等しい)**.** $m, n, r, s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$a \in \{1, \ldots, r\}$、$b \in \{1, \ldots, s\}$ について $X_{a,b} \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ とする。行列の有限和は 定義 2.5 による。このとき

$$\sum_{a=1}^{r} \sum_{b=1}^{s} X_{a,b} = \sum_{b=1}^{s} \sum_{a=1}^{r} X_{a,b}$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, n\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\Big(\sum_{a=1}^{r}\sum_{b=1}^{s} X_{a,b}\Big)_{ik} &= \sum_{a=1}^{r}\Big(\sum_{b=1}^{s} X_{a,b}\Big)_{ik} && (\because \text{ 主張 2.7})\\
&= \sum_{a=1}^{r}\sum_{b=1}^{s} (X_{a,b})_{ik} && (\because \text{ 主張 2.7 を各}a \text{ へ同時適用})\\
&= \sum_{b=1}^{s}\sum_{a=1}^{r} (X_{a,b})_{ik} && (\because \mathbb{C} \text{ の加法の結合法則・交換法則による有限和の順序交換。主張 1.56})\\
&= \sum_{b=1}^{s}\Big(\sum_{a=1}^{r} X_{a,b}\Big)_{ik} && (\because \text{ 主張 2.7 を右辺から左辺へ、各}b \text{ へ同時適用})\\
&= \Big(\sum_{b=1}^{s}\sum_{a=1}^{r} X_{a,b}\Big)_{ik} && (\because \text{ 主張 2.7 を右辺から左辺へ})
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.40 (一つを除く項が零行列である行列の有限和は、その一つの項に等しい)**.** $m,n,r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X_1,\dots,X_r \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$q \in \{1,\dots,r\}$ とし、$a \neq q$ のすべての $a \in \{1,\dots,r\}$ について $X_a = O$（定義 1.93 の零行列）とする。行列の有限和は 定義 2.5 による。このとき

$$\sum_{a=1}^{r} X_a = X_q$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1,\dots,m\}$、$k \in \{1,\dots,n\}$ を取る。$a \neq q$ なら $(X_a)_{ik} = O_{ik} = 0_{\mathbb{C}}$（定義 1.93）なので、

$$\begin{aligned}
\Big(\sum_{a=1}^{r} X_a\Big)_{ik} &= \sum_{a=1}^{r} (X_a)_{ik} && (\because \text{ 主張 2.7})\\
&= (X_q)_{ik} && \big(\because \text{ 主張 1.68 } (m \to r,\ z_a \to (X_a)_{ik},\ n \to q)\big)
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.41 (スカラー倍を続けて施すことは積のスカラー倍に等しい)**.** $m,n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a,b \in \mathbb{C}$、$A \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ とする。スカラー倍は 定義 2.3 による。このとき

$$a(bA) = (ab)A$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1,\dots,m\}$、$j \in \{1,\dots,n\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\big(a(bA)\big)_{ij} &= a\,(bA)_{ij} && (\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3})\\
&= a\,(b\,A_{ij}) && (\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3})\\
&= (ab)\,A_{ij} && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56})\\
&= \big((ab)A\big)_{ij} && (\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3})
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.42 (1 倍しても行列は変わらない)**.** $m,n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ とする。スカラー倍は 定義 2.3、$1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1)$ は 定義 1.13 の略記による。このとき

$$1_{\mathbb{C}}\,A = A$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1,\dots,m\}$、$j \in \{1,\dots,n\}$ を取る。

$$\begin{aligned}\big(1_{\mathbb{C}}\, A\big)_{ij} &= 1_{\mathbb{C}}\, A_{ij} && \big(\because \text{ スカラー倍の定義定義 2.3}\big)\\ &= A_{ij} && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元主張 1.56}\big)\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.43 (和が零行列なら一方は他方の符号反転)**.** $m,p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X,Y \in \mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ が $X+Y=O$ を満たすとする。和は 定義 2.4、符号反転は 定義 1.94、O は 定義 1.93 による。このとき

$$X = -Y$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned}X-(-Y) &= X+\big(-(-Y)\big) && \big(\because \text{ 主張 2.30 } (A\to X,\ B\to -Y)\big)\\ &= X+Y && (\because \text{ 主張 2.27})\\ &= O && (\because \text{ 仮定 } X+Y=O)\end{aligned}$$

であるから、主張 1.95 を $A\to X$、$B\to -Y$ で引いて $X=-Y$ を得る。 □

定義 2.44 (行列の反交換子)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X,W \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ について、反交換子 $[X,W]_+ \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ を

$$[X,W]_+ := XW + WX$$

で定める。積は 定義 1.6、和は 定義 2.4 による。

主張 2.45 (スカラー倍の有限和どうしの反交換子は反交換子の二重和に等しい)**.** $n,r,s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$a_1,\dots,a_r,\ b_1,\dots,b_s \in \mathbb{C}$、$X_1,\dots,X_r,\ W_1,\dots,W_s \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ とする。反交換子は 定義 2.44、行列の有限和は 定義 2.5、スカラー倍は 定義 2.3 による。二重和は内側から定める：$\sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s} B_{jk} := \sum_{j=1}^{r}\Big(\sum_{k=1}^{s} B_{jk}\Big)$。このとき

$$\Big[\sum_{j=1}^{r} a_j X_j,\ \sum_{k=1}^{s} b_k W_k\Big]_+ = \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s} (a_j b_k)\,[X_j,W_k]_+$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$p,q \in \{1,\dots,n\}$ を取る。$S := \sum_{j=1}^{r} a_j X_j$、$T := \sum_{k=1}^{s} b_k W_k$ と置く。複素数の二重和も内側から定める。

$$
\begin{aligned}
\big([S,T]_+\big)_{pq} &= (ST+TS)_{pq} && (\because \text{定義 2.44})\\
&= (ST)_{pq} + (TS)_{pq} && (\because \text{定義 2.4})\\
&= \sum_{l=1}^{n} S_{pl}\,T_{lq} + \sum_{l=1}^{n} T_{pl}\,S_{lq} && (\because \text{定義 1.6 を 2 箇所へ同時適用})\\
&= \sum_{l=1}^{n}\Big(\sum_{j=1}^{r}(a_jX_j)_{pl}\Big)\Big(\sum_{k=1}^{s}(b_kW_k)_{lq}\Big) + \sum_{l=1}^{n}\Big(\sum_{k=1}^{s}(b_kW_k)_{pl}\Big)\Big(\sum_{j=1}^{r}(a_jX_j)_{lq}\Big) && (\because \text{主張 2.7 を 4 箇所へ同時適用})\\
&= \sum_{l=1}^{n}\Big(\sum_{j=1}^{r}a_j(X_j)_{pl}\Big)\Big(\sum_{k=1}^{s}b_k(W_k)_{lq}\Big) + \sum_{l=1}^{n}\Big(\sum_{k=1}^{s}b_k(W_k)_{pl}\Big)\Big(\sum_{j=1}^{r}a_j(X_j)_{lq}\Big) && (\because \text{定義 2.3 を全ての項へ同時適用})\\
&= \sum_{l=1}^{n}\Big(\sum_{j=1}^{r}a_j(X_j)_{pl}\Big)\Big(\sum_{k=1}^{s}b_k(W_k)_{lq}\Big) + \sum_{l=1}^{n}\Big(\sum_{j=1}^{r}a_j(X_j)_{lq}\Big)\Big(\sum_{k=1}^{s}b_k(W_k)_{pl}\Big) && (\because \mathbb{C}\text{ の積の交換律を第 2 項の各}l\text{ へ同時適用。主張 1.56})\\
&= \sum_{l=1}^{n}\sum_{j=1}^{r}(a_j(X_j)_{pl})\Big(\sum_{k=1}^{s}b_k(W_k)_{lq}\Big) + \sum_{l=1}^{n}\sum_{j=1}^{r}(a_j(X_j)_{lq})\Big(\sum_{k=1}^{s}b_k(W_k)_{pl}\Big) && (\because \mathbb{C}\text{ の有限和の分配則}(\textstyle\sum_j x_j)y=\sum_j x_jy\text{ を全ての}l\text{ へ同時適用})\\
&= \sum_{l=1}^{n}\sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}(a_j(X_j)_{pl})\big(b_k(W_k)_{lq}\big) + \sum_{l=1}^{n}\sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}(a_j(X_j)_{lq})\big(b_k(W_k)_{pl}\big) && (\because \mathbb{C}\text{ の有限和の分配則}x\textstyle\sum_k y_k=\sum_k xy_k\text{ を全ての}(l,j)\text{ へ同時適用})\\
&= \sum_{l=1}^{n}\sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}(a_jb_k)\big((X_j)_{pl}(W_k)_{lq}\big) + \sum_{l=1}^{n}\sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}(a_jb_k)\big((W_k)_{pl}(X_j)_{lq}\big) && (\because \mathbb{C}\text{ の積の結合律と交換律を全ての項へ同時適用。主張 1.56})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{s}(a_jb_k)\big((X_j)_{pl}(W_k)_{lq}\big) + \sum_{j=1}^{r}\sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{s}(a_jb_k)\big((W_k)_{pl}(X_j)_{lq}\big) && (\because \mathbb{C}\text{ の有限和の順序交換（}l\text{ と}j\text{）を 2 箇所へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\sum_{l=1}^{n}(a_jb_k)\big((X_j)_{pl}(W_k)_{lq}\big) + \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\sum_{l=1}^{n}(a_jb_k)\big((W_k)_{pl}(X_j)_{lq}\big) && (\because \mathbb{C}\text{ の有限和の順序交換（}l\text{ と}k\text{）を各}j\text{ の 2 箇所へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\Big(\sum_{k=1}^{s}\sum_{l=1}^{n}(a_jb_k)\big((X_j)_{pl}(W_k)_{lq}\big) + \sum_{k=1}^{s}\sum_{l=1}^{n}(a_jb_k)\big((W_k)_{pl}(X_j)_{lq}\big)\Big) && (\because \text{主張 2.22 を右辺から左辺へ（外側の}j\text{）})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\Big(\sum_{l=1}^{n}(a_jb_k)\big((X_j)_{pl}(W_k)_{lq}\big) + \sum_{l=1}^{n}(a_jb_k)\big((W_k)_{pl}(X_j)_{lq}\big)\Big) && (\because \text{主張 2.22 を右辺から左辺へ、各}j\text{ の内側の}k\text{ へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\Big((a_jb_k)\sum_{l=1}^{n}(X_j)_{pl}(W_k)_{lq} + (a_jb_k)\sum_{l=1}^{n}(W_k)_{pl}(X_j)_{lq}\Big) && (\because \mathbb{C}\text{ の有限和の分配則}\textstyle\sum_l cx_l = c\sum_l x_l\text{ を全ての}(j,k)\text{ の 2 箇所へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}(a_jb_k)\Big(\sum_{l=1}^{n}(X_j)_{pl}(W_k)_{lq} + \sum_{l=1}^{n}(W_k)_{pl}(X_j)_{lq}\Big) && (\because \mathbb{C}\text{ の分配法則}ca+cb=c(a+b)\text{。主張 1.56})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}(a_jb_k)\big((X_jW_k)_{pq} + (W_kX_j)_{pq}\big) && (\because \text{定義 1.6 を全ての項へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}(a_jb_k)\,(X_jW_k + W_kX_j)_{pq} && (\because \text{定義 2.4})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}(a_jb_k)\,\big([X_j,W_k]_+\big)_{pq} && (\because \text{定義 2.44})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\big((a_jb_k)[X_j,W_k]_+\big)_{pq} && (\because \text{定義 2.3})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\Big(\sum_{k=1}^{s}(a_jb_k)[X_j,W_k]_+\Big)_{pq} && (\because \text{主張 2.7 を各}j\text{ へ同時適用})\\
&= \Big(\sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}(a_jb_k)[X_j,W_k]_+\Big)_{pq} && (\because \text{主張 2.7})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.46 (零行列を左から掛けると零行列)**.** $m,n,p\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$B\in \mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ とする。$O_{m,n}\in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$O_{m,p}\in\mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列、積は 定義 1.6 による。このとき

$$O_{m,n}\,B = O_{m,p}$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i\in\{1,\dots,m\}$、$k\in\{1,\dots,p\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\big(O_{m,n}\,B\big)_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} \big(O_{m,n}\big)_{ij}\,B_{jk} && \big(\because \text{ 定義 1.6}\big)\\
&= \sum_{j=1}^{n} 0_{\mathbb{C}}\,B_{jk} && \big(\because \text{ 定義 1.93 を各項へ}\big)\\
&= \sum_{j=1}^{n} 0_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 1.58 } (z \to B_{jk}) \text{ を各項へ}\big)\\
&= 0_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 1.18 } (m \to n)\big)\\
&= \big(O_{m,p}\big)_{ik} && \big(\because \text{ 定義 1.93}\big)
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.47 (零行列を右から掛けると零行列)**.** $m,n,p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ とする。$O_{n,p} \in \mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$、$O_{m,p} \in \mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列、積は 定義 1.6 による。このとき

$$A\,O_{n,p} = O_{m,p}$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1,\dots,m\}$、$k \in \{1,\dots,p\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\big(A\,O_{n,p}\big)_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,\big(O_{n,p}\big)_{jk} && \big(\because \text{ 定義 1.6}\big)\\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,0_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 定義 1.93 を各項へ}\big)\\
&= \sum_{j=1}^{n} 0_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 1.59 } (z \to A_{ij}) \text{ を各項へ}\big)\\
&= 0_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 1.18 } (m \to n)\big)\\
&= \big(O_{m,p}\big)_{ik} && \big(\because \text{ 定義 1.93}\big)
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

定義 2.48 (行列の有限積)**.** $n,r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A_1,\dots,A_r \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）について、有限積 $\prod_{j=1}^{r} A_j \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ を r についての帰納法で

$$\prod_{j=1}^{1} A_j := A_1, \qquad \prod_{j=1}^{r+1} A_j := \Big(\prod_{j=1}^{r} A_j\Big)\,A_{r+1}$$

と定める（左から順に掛ける）。積は 定義 1.6（$m,n,p \to n$）の行列の積である。

主張 2.49 (単位行列の有限積は単位行列)**.** $n,r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$\prod_{j=1}^{r} I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} = I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$$

が成り立つ。有限積は 定義 2.48（$A_1 = \cdots = A_r = I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$）、単位行列は 定義 2.2 による。

証明. r についての帰納法で示す。$r=1$ のとき

$$\prod_{j=1}^{1} I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} = I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} \quad (\because \text{ 定義 2.48})$$

r で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned}
\prod_{j=1}^{r+1} I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} &= \Big(\prod_{j=1}^{r} I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\Big) I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} && (\because \text{ 定義 2.48}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\, I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} && \big(\because \text{ 主張 2.17 } (m,n\to n,\ A\to I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})})\big)
\end{aligned}$$

□

定義 2.50 ($\{0,1\}^r$ の上の行列の和)**.** $r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ について、$\{0,1\}\subset\mathbb{Z}$ とし、$\{0,1\}^r$ は写像 $\epsilon:\{1,\dots,r\}\to\{0,1\}$ の全体とし、ϵ を $(\epsilon_1,\dots,\epsilon_r)$（$\epsilon_j:=\epsilon(j)$）と書く。$\epsilon'\in\{0,1\}^r$ と $e\in\{0,1\}$ に対して、$(\epsilon',e)\in\{0,1\}^{r+1}$ を

$$(\epsilon',e)_j:=\epsilon'_j \quad (j\in\{1,\dots,r\}), \qquad (\epsilon',e)_{r+1}:=e$$

と定める。$\{0,1\}^1$ の元は (1)（$(1)_1=1$）と (0)（$(0)_1=0$）の二つである。

$m,n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ と、$\epsilon\in\{0,1\}^r$ で添字付けられた $B_\epsilon\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）について、和 $\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} B_\epsilon\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ を r についての帰納法で

$$\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1} B_\epsilon := B_{(1)}+B_{(0)}, \qquad \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} B_\epsilon := \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\Big(B_{(\epsilon',1)}+B_{(\epsilon',0)}\Big)$$

と定める（右辺の和は $\epsilon'\in\{0,1\}^r$ で添字付けられた $B_{(\epsilon',1)}+B_{(\epsilon',0)}$ の和である）。和 $+$ は 定義 2.4 の行列の和である。

定義 2.51 ($\{0,1\}^r$ の上の複素数の和)**.** $r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ について、$\{0,1\}^r$ と $(\epsilon',e)\in\{0,1\}^{r+1}$（$\epsilon'\in\{0,1\}^r$、$e\in\{0,1\}$）は 定義 2.50 のものとする。$\epsilon\in\{0,1\}^r$ で添字付けられた $z_\epsilon\in\mathbb{C}$ について、和 $\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} z_\epsilon\in\mathbb{C}$ を r についての帰納法で

$$\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1} z_\epsilon := z_{(1)}+z_{(0)}, \qquad \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} z_\epsilon := \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\Big(z_{(\epsilon',1)}+z_{(\epsilon',0)}\Big)$$

と定める（右辺の和は $\epsilon'\in\{0,1\}^r$ で添字付けられた $z_{(\epsilon',1)}+z_{(\epsilon',0)}$ の和である）。和 $+$ は 定義 1.12 の複素数の和である。

定義 2.52 ($\{0,1\}^r$ の上の実数の和)**.** $r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ について、$\{0,1\}^r$ と $(\epsilon',e)\in\{0,1\}^{r+1}$（$\epsilon'\in\{0,1\}^r$、$e\in\{0,1\}$）は 定義 2.50 のものとする。$\epsilon\in\{0,1\}^r$ で添字付けられた $x_\epsilon\in\mathbb{R}$ について、和 $\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} x_\epsilon\in\mathbb{R}$ を r についての帰納法で

$$\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1} x_\epsilon := x_{(1)}+x_{(0)}, \qquad \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} x_\epsilon := \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\Big(x_{(\epsilon',1)}+x_{(\epsilon',0)}\Big)$$

と定める（右辺の和は $\epsilon'\in\{0,1\}^r$ で添字付けられた $x_{(\epsilon',1)}+x_{(\epsilon',0)}$ の和である）。和 $+$ は $\mathbb{R}$ の和である。

主張 2.53 ($\{0,1\}^r$ の上の実数の和の包含は、包含の和に等しい)**.** $r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$\epsilon\in\{0,1\}^r$ で添字付けられた $x_\epsilon\in\mathbb{R}$ とする。$s_{\mathbb{C}}$（$s\in\mathbb{R}$）は 定義 1.13 の略記である。このとき

$$\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} (x_\epsilon)_{\mathbb{C}} = \Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} x_\epsilon\Big)_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。左辺の和は 定義 2.51、右辺の和は 定義 2.52 による。

証明. r についての帰納法で、$\{0,1\}^r$ で添字付けられた実数の全ての族について示す。$r=1$ のとき

$$\begin{aligned}\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1}(x_\epsilon)_{\mathbb{C}} &= (x_{(1)})_{\mathbb{C}}+(x_{(0)})_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 2.51})\\ &= \big(x_{(1)}+x_{(0)}\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.21 } (a\to x_{(1)},\ b\to x_{(0)}))\\ &= \Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1}x_\epsilon\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 2.52 を右辺から左辺へ})\end{aligned}$$

r で、$\{0,1\}^r$ で添字付けられた実数の全ての族について成り立つと仮定する。$\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}$ で添字付けられた $x_\epsilon\in\mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}}(x_\epsilon)_{\mathbb{C}} &= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\Big((x_{(\epsilon',1)})_{\mathbb{C}}+(x_{(\epsilon',0)})_{\mathbb{C}}\Big) && (\because \text{定義 2.51})\\ &= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\big(x_{(\epsilon',1)}+x_{(\epsilon',0)}\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.21 } (a\to x_{(\epsilon',1)},\ b\to x_{(\epsilon',0)}) \text{ を各項へ同時に})\\ &= \Big(\sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\big(x_{(\epsilon',1)}+x_{(\epsilon',0)}\big)\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{帰納法の仮定 } (x_{\epsilon'}\to x_{(\epsilon',1)}+x_{(\epsilon',0)}))\\ &= \Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}}x_\epsilon\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 2.52 を右辺から左辺へ})\end{aligned}$$

□

主張 2.54 ($\{0,1\}^r$ の上の実数の和に右から実数を掛けると、各項に掛けた和になる)**.** $r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$\epsilon\in\{0,1\}^r$ で添字付けられた $x_\epsilon\in\mathbb{R}$、$c\in\mathbb{R}$ とする。和は 定義 2.52、積は $\mathbb{R}$ の積である。このとき

$$\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r}x_\epsilon\Big)c=\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r}x_\epsilon c$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で、$\{0,1\}^r$ で添字付けられた実数の全ての族について示す。$r=1$ のとき

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1}x_\epsilon\Big)c &= \big(x_{(1)}+x_{(0)}\big)c && (\because \text{定義 2.52})\\ &= x_{(1)}c+x_{(0)}c && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則 } (a+b)c=ac+bc\ (a\to x_{(1)},\ b\to x_{(0)}))\\ &= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1}x_\epsilon c && (\because \text{定義 2.52 } (x_\epsilon\to x_\epsilon c) \text{ を右辺から左辺へ})\end{aligned}$$

r で全ての族について成り立つと仮定する。$\{0,1\}^{r+1}$ で添字付けられた族 x_ϵ に対して

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}}x_\epsilon\Big)c &= \Big(\sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\big(x_{(\epsilon',1)}+x_{(\epsilon',0)}\big)\Big)c && (\because \text{定義 2.52})\\ &= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\big(x_{(\epsilon',1)}+x_{(\epsilon',0)}\big)c && (\because \text{帰納法の仮定 } (x_{\epsilon'}\to x_{(\epsilon',1)}+x_{(\epsilon',0)}))\\ &= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\big(x_{(\epsilon',1)}c+x_{(\epsilon',0)}c\big) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則 } (a+b)c=ac+bc\ (a\to x_{(\epsilon',1)},\ b\to x_{(\epsilon',0)}) \text{ を各項へ同時に})\\ &= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}}x_\epsilon c && (\because \text{定義 2.52 } (x_\epsilon\to x_\epsilon c) \text{ を右辺から左辺へ})\end{aligned}$$

□

主張 2.55 (実数の二項の和の有限積の展開)**.** $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$j \in \{1, \dots, r\}$ と $e \in \{0,1\}$ で添字付けられた $a_j^{(e)} \in \mathbb{R}$ とする。有限積は 定義 1.61、$\{0,1\}^r$ の上の和は 定義 2.52、和 $a_j^{(1)} + a_j^{(0)}$ は $\mathbb{R}$ の和による。このとき

$$\prod_{j=1}^{r}\Big(a_j^{(1)} + a_j^{(0)}\Big) = \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^r} \prod_{j=1}^{r} a_j^{(\epsilon_j)}$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で、実数の全ての族 $(a_j^{(e)})$ について示す。$r = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
\prod_{j=1}^{1}\Big(a_j^{(1)} + a_j^{(0)}\Big) &= a_1^{(1)} + a_1^{(0)} && \big(\because \text{定義 1.61 } (m \to 1,\ r_j \to a_j^{(1)} + a_j^{(0)})\big) \\
&= a_1^{((1)_1)} + a_1^{((0)_1)} && \big(\because \text{定義 2.50 の } (1)_1 = 1,\ (0)_1 = 0\big) \\
&= \prod_{j=1}^{1} a_j^{((1)_j)} + \prod_{j=1}^{1} a_j^{((0)_j)} && \big(\because \text{定義 1.61 } (m \to 1,\ r_j \to a_j^{((1)_j)},\ r_j \to a_j^{((0)_j)}) \text{ を右辺から左辺へ 2 か所}\big) \\
&= \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^1} \prod_{j=1}^{1} a_j^{(\epsilon_j)} && \big(\because \text{定義 2.52 } (x_\epsilon \to \textstyle\prod_{j=1}^{1} a_j^{(\epsilon_j)}) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}$$

r で全ての族について成り立つと仮定する。$j \in \{1, \dots, r+1\}$ で添字付けられた族 $(a_j^{(e)})$ に対して

$$\begin{aligned}
\prod_{j=1}^{r+1}\big(a_j^{(1)} + a_j^{(0)}\big) &= \Big(\prod_{j=1}^{r}\big(a_j^{(1)} + a_j^{(0)}\big)\Big)\big(a_{r+1}^{(1)} + a_{r+1}^{(0)}\big) && \big(\because \text{定義 1.61 } (m \to r,\ r_j \to a_j^{(1)} + a_j^{(0)})\big) \\
&= \Big(\sum_{\epsilon' \in \{0,1\}^r} \prod_{j=1}^{r} a_j^{(\epsilon'_j)}\Big)\big(a_{r+1}^{(1)} + a_{r+1}^{(0)}\big) && \big(\because \text{帰納法の仮定 } (a_j^{(e)} \to a_j^{(e)}\ (j \in \{1, \dots, r\}))\big) \\
&= \sum_{\epsilon' \in \{0,1\}^r} \Big(\prod_{j=1}^{r} a_j^{(\epsilon'_j)}\Big)\big(a_{r+1}^{(1)} + a_{r+1}^{(0)}\big) && \big(\because \text{主張 2.54 } (x_{\epsilon'} \to \textstyle\prod_{j=1}^{r} a_j^{(\epsilon'_j)},\ c \to a_{r+1}^{(1)} + a_{r+1}^{(0)})\big) \\
&= \sum_{\epsilon' \in \{0,1\}^r} \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} a_j^{(\epsilon'_j)}\Big)a_{r+1}^{(1)} + \Big(\prod_{j=1}^{r} a_j^{(\epsilon'_j)}\Big)a_{r+1}^{(0)}\Big) && \big(\because \mathbb{R} \text{ の分配則 } a(b+c) = ab + ac\ (a \to \textstyle\prod_{j=1}^{r} a_j^{(\epsilon'_j)},\ b \to a_{r+1}^{(1)},\ c \to a_{r+1}^{(0)}) \text{ を各項へ同時に}\big) \\
&= \sum_{\epsilon' \in \{0,1\}^r} \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} a_j^{((\epsilon',1)_j)}\Big)a_{r+1}^{((\epsilon',1)_{r+1})} + \Big(\prod_{j=1}^{r} a_j^{((\epsilon',0)_j)}\Big)a_{r+1}^{((\epsilon',0)_{r+1})}\Big) && \big(\because \text{定義 2.50 の } (\epsilon', e)_j = \epsilon'_j\ (j \leq r),\ (\epsilon', e)_{r+1} = e \text{ を各項へ同時に}\big) \\
&= \sum_{\epsilon' \in \{0,1\}^r} \Big(\prod_{j=1}^{r+1} a_j^{((\epsilon',1)_j)} + \prod_{j=1}^{r+1} a_j^{((\epsilon',0)_j)}\Big) && \big(\because \text{定義 1.61 } (m \to r,\ r_j \to a_j^{((\epsilon',e)_j)}) \text{ を右辺から左辺へ、各項の 2 か所へ同時に}\big) \\
&= \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{r+1}} \prod_{j=1}^{r+1} a_j^{(\epsilon_j)} && \big(\because \text{定義 2.52 } (x_\epsilon \to \textstyle\prod_{j=1}^{r+1} a_j^{(\epsilon_j)}) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}$$

□

主張 2.56 ($\{0,1\}^r$ の上の和に右から行列を掛けると、各項に掛けた和になる)**.** $m, n, p, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$\epsilon \in \{0,1\}^r$ で添字付けられた $X_\epsilon \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$、$C \in \mathrm{Mat}(n, p, \mathbb{C})$ とする。和は 定義 2.50、積は 定義 1.6 による。このとき

$$\Big(\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^r} X_\epsilon\Big)C = \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^r} X_\epsilon C$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で、$\{0,1\}^r$ で添字付けられた $\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ の元の全ての族について示す。$r = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
\Big(\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^1} X_\epsilon\Big)C &= \big(X_{(1)} + X_{(0)}\big)C && \big(\because \text{定義 2.50 } (B_\epsilon \to X_\epsilon)\big) \\
&= X_{(1)}C + X_{(0)}C && \big(\because \text{主張 2.24 } (A \to X_{(1)},\ B \to X_{(0)})\big) \\
&= \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^1} X_\epsilon C && \big(\because \text{定義 2.50 } (B_\epsilon \to X_\epsilon C) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}$$

r で全ての族について成り立つと仮定する。$\{0,1\}^{r+1}$ で添字付けられた族 X_ϵ に対して

$$\begin{aligned}
\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} X_\epsilon\Big)C &= \Big(\sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^{r}} \big(X_{(\epsilon',1)}+X_{(\epsilon',0)}\big)\Big)C && \big(\because \text{定義 2.50 } (B_\epsilon \to X_\epsilon)\big)\\
&= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^{r}} \big(X_{(\epsilon',1)}+X_{(\epsilon',0)}\big)C && \big(\because \text{帰納法の仮定 } (X_{\epsilon'} \to X_{(\epsilon',1)}+X_{(\epsilon',0)})\big)\\
&= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^{r}} \big(X_{(\epsilon',1)}C+X_{(\epsilon',0)}C\big) && \big(\because \text{主張 2.24 } (A\to X_{(\epsilon',1)},\ B\to X_{(\epsilon',0)}) \text{ を各項へ同時適用}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} X_\epsilon C && \big(\because \text{定義 2.50 } (B_\epsilon \to X_\epsilon C) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}$$

□

主張 2.57 ($\{0,1\}^r$ の上の和に左から行列を掛けると、各項に掛けた和になる)**.** $m,n,p,r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$C \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$\epsilon \in \{0,1\}^r$ で添字付けられた $X_\epsilon \in \mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ とする。和は定義 2.50、積は 定義 1.6 による。このとき

$$C\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} X_\epsilon\Big) = \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} CX_\epsilon$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で、$\{0,1\}^r$ で添字付けられた $\mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ の元の全ての族について示す。$r=1$ のとき

$$\begin{aligned}
C\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1} X_\epsilon\Big) &= C\big(X_{(1)}+X_{(0)}\big) && \big(\because \text{定義 2.50 } (m\to n,\ n\to p,\ B_\epsilon\to X_\epsilon)\big)\\
&= CX_{(1)}+CX_{(0)} && \big(\because \text{主張 2.23 } (A\to C,\ B\to X_{(1)},\ C\to X_{(0)})\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1} CX_\epsilon && \big(\because \text{定義 2.50 } (n\to p,\ B_\epsilon\to CX_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}$$

r で全ての族について成り立つと仮定する。$\{0,1\}^{r+1}$ で添字付けられた族 X_ϵ に対して

$$\begin{aligned}
C\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} X_\epsilon\Big) &= C\Big(\sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^{r}} \big(X_{(\epsilon',1)}+X_{(\epsilon',0)}\big)\Big) && \big(\because \text{定義 2.50 } (m\to n,\ n\to p,\ B_\epsilon\to X_\epsilon)\big)\\
&= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^{r}} C\big(X_{(\epsilon',1)}+X_{(\epsilon',0)}\big) && \big(\because \text{帰納法の仮定 } (X_{\epsilon'} \to X_{(\epsilon',1)}+X_{(\epsilon',0)})\big)\\
&= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^{r}} \big(CX_{(\epsilon',1)}+CX_{(\epsilon',0)}\big) && \big(\because \text{主張 2.23 } (A\to C,\ B\to X_{(\epsilon',1)},\ C\to X_{(\epsilon',0)}) \text{ を各項へ同時適用}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} CX_\epsilon && \big(\because \text{定義 2.50 } (n\to p,\ B_\epsilon\to CX_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}$$

□

主張 2.58 ($\{0,1\}^r$ の上の行列の和の成分は、成分の和に等しい)**.** $m,n,r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$\epsilon \in \{0,1\}^r$ で添字付けられた $X_\epsilon \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ とする。行列の和は 定義 2.50、右辺の複素数の和は 定義 2.51 による。このとき、$i\in\{1,\dots,m\}$、$k\in\{1,\dots,n\}$ について

$$\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} X_\epsilon\Big)_{ik} = \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} (X_\epsilon)_{ik}$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で、$\{0,1\}^r$ で添字付けられた $\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の元の全ての族について示す。$r=1$ のとき

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1} X_\epsilon\Big)_{ik} &= \big(X_{(1)}+X_{(0)}\big)_{ik} && \big(\because \text{定義 2.50 } (B_\epsilon \to X_\epsilon)\big)\\ &= (X_{(1)})_{ik}+(X_{(0)})_{ik} && \big(\because \text{定義 2.4}\big)\\ &= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1}(X_\epsilon)_{ik} && \big(\because \text{定義 2.51 } (z_\epsilon \to (X_\epsilon)_{ik}) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\end{aligned}$$

r で全ての族について成り立つと仮定する。$\{0,1\}^{r+1}$ で添字付けられた族 X_ϵ に対して

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} X_\epsilon\Big)_{ik} &= \Big(\sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\big(X_{(\epsilon',1)}+X_{(\epsilon',0)}\big)\Big)_{ik} && \big(\because \text{定義 2.50 } (B_\epsilon \to X_\epsilon)\big)\\ &= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\big(X_{(\epsilon',1)}+X_{(\epsilon',0)}\big)_{ik} && \big(\because \text{帰納法の仮定 } (X_{\epsilon'} \to X_{(\epsilon',1)}+X_{(\epsilon',0)})\big)\\ &= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\big((X_{(\epsilon',1)})_{ik}+(X_{(\epsilon',0)})_{ik}\big) && \big(\because \text{定義 2.4 を各項へ同時適用}\big)\\ &= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}}(X_\epsilon)_{ik} && \big(\because \text{定義 2.51 } (z_\epsilon \to (X_\epsilon)_{ik}) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\end{aligned}$$

□

主張 2.59 ($\{0,1\}^r$ の上の和で、一つの項以外が零行列なら、和はその項に等しい)**.** $m,n,r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$\epsilon'\in\{0,1\}^r$、$\epsilon\in\{0,1\}^r$ で添字付けられた $B_\epsilon\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ とし、$\epsilon\neq\epsilon'$ を満たす全ての ϵ について $B_\epsilon=O$ とする。和は 定義 2.50、$O\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列である。このとき

$$\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} B_\epsilon = B_{\epsilon'}$$

が成り立つ。

証明. $\{0,1\}^r$ の二つの元は写像なので、$\epsilon=\epsilon'$ は全ての $j\in\{1,\dots,r\}$ で $\epsilon_j=\epsilon'_j$ であることを指し、$\epsilon\neq\epsilon'$ はある j で $\epsilon_j\neq\epsilon'_j$ であることを指す。r についての帰納法で、全ての $\epsilon'\in\{0,1\}^r$ と、仮定を満たす $\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の元の全ての族について示す。

$r=1$ のとき、$\{0,1\}^1$ の元は (1) と (0) である (定義 2.50)。$\epsilon'=(1)$ なら $(0)_1=0\neq 1=(1)_1$ なので仮定から $B_{(0)}=O$ であり、

$$\begin{aligned}\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1} B_\epsilon &= B_{(1)}+B_{(0)} && \big(\because \text{定義 2.50}\big)\\ &= B_{(1)}+O && \big(\because\ B_{(0)}=O\big)\\ &= B_{(1)} && \big(\because \text{主張 2.8 } (X\to B_{(1)})\big)\end{aligned}$$

$\epsilon'=(0)$ なら $(1)_1=1\neq 0=(0)_1$ なので仮定から $B_{(1)}=O$ であり、

$$\begin{aligned}\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1} B_\epsilon &= B_{(1)}+B_{(0)} && \big(\because \text{定義 2.50}\big)\\ &= O+B_{(0)} && \big(\because\ B_{(1)}=O\big)\\ &= B_{(0)} && \big(\because \text{主張 2.9 } (X\to B_{(0)})\big)\end{aligned}$$

r で成り立つと仮定する。$\epsilon' \in \{0,1\}^{r+1}$ と、仮定を満たす $\{0,1\}^{r+1}$ で添字付けられた族 B_ϵ を取る。$\delta \in \{0,1\}^r$ を $\delta_j := \epsilon'_j$ $(j \in \{1,\dots,r\})$、$e := \epsilon'_{r+1} \in \{0,1\}$ と置くと、$(\delta,e)_j = \delta_j = \epsilon'_j$ $(j \le r)$、$(\delta,e)_{r+1} = e = \epsilon'_{r+1}$ なので $(\delta,e) = \epsilon'$ である（$(\cdot,\cdot)$ は 定義 2.50 のもの）。$\delta' \in \{0,1\}^r$ が $\delta' \neq \delta$ なら、ある $j \le r$ で $\delta'_j \neq \delta_j$ であり、$e'' \in \{0,1\}$ のどちらについても $(\delta',e'')_j = \delta'_j \neq \delta_j = \epsilon'_j$ なので $(\delta',e'') \neq \epsilon'$、仮定から $B_{(\delta',e'')} = O$ である。全ての $\delta' \in \{0,1\}^r$ について $C_{\delta'} := B_{(\delta',1)} + B_{(\delta',0)} \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ と置く。$\delta' \neq \delta$ なら

$$\begin{aligned} C_{\delta'} &= B_{(\delta',1)} + B_{(\delta',0)} && \left(\because\ C_{\delta'} \text{ の定義}\right) \\ &= O + O && \left(\because\ B_{(\delta',1)} = O,\ B_{(\delta',0)} = O\right) \\ &= O && \left(\because\ \text{主張 2.8 } (X \to O)\right) \end{aligned}$$

であり、$\delta' \in \{0,1\}^r$ で添字付けられた族 $C_{\delta'}$ は $\epsilon' \to \delta$ について帰納法の仮定の前提を満たす。したがって

$$\begin{aligned} \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} B_\epsilon &= \sum_{\delta'\in\{0,1\}^r} \Big(B_{(\delta',1)} + B_{(\delta',0)}\Big) && \left(\because\ \text{定義 2.50}\right) \\ &= \sum_{\delta'\in\{0,1\}^r} C_{\delta'} && \left(\because\ C_{\delta'} \text{ の定義を各項へ同時適用}\right) \\ &= C_\delta && \left(\because\ \text{帰納法の仮定 } (\epsilon' \to \delta,\ B_\epsilon \to C_\epsilon)\right) \\ &= B_{(\delta,1)} + B_{(\delta,0)} && \left(\because\ C_\delta \text{ の定義}\right) \end{aligned}$$

である。$e = 1$ なら $(\delta,0)_{r+1} = 0 \neq 1 = \epsilon'_{r+1}$ なので $(\delta,0) \neq \epsilon'$、仮定から $B_{(\delta,0)} = O$ であり、

$$\begin{aligned} B_{(\delta,1)} + B_{(\delta,0)} &= B_{(\delta,1)} + O && \left(\because\ B_{(\delta,0)} = O\right) \\ &= B_{(\delta,1)} && \left(\because\ \text{主張 2.8 } (X \to B_{(\delta,1)})\right) \\ &= B_{\epsilon'} && \left(\because\ (\delta,1) = (\delta,e) = \epsilon'\right) \end{aligned}$$

$e = 0$ なら $(\delta,1)_{r+1} = 1 \neq 0 = \epsilon'_{r+1}$ なので $(\delta,1) \neq \epsilon'$、仮定から $B_{(\delta,1)} = O$ であり、

$$\begin{aligned} B_{(\delta,1)} + B_{(\delta,0)} &= O + B_{(\delta,0)} && \left(\because\ B_{(\delta,1)} = O\right) \\ &= B_{(\delta,0)} && \left(\because\ \text{主張 2.9 } (X \to B_{(\delta,0)})\right) \\ &= B_{\epsilon'} && \left(\because\ (\delta,0) = (\delta,e) = \epsilon'\right) \end{aligned}$$

□

主張 2.60 (二項の和の有限積の展開)**.** $n,r \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$j \in \{1,\dots,r\}$ と $e \in \{0,1\}$ で添字付けられた $A_j^{(e)} \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ とする。有限積は 定義 2.48、$\{0,1\}^r$ の上の和は 定義 2.50、和 $A_j^{(1)} + A_j^{(0)}$ は 定義 2.4 による。このとき

$$\prod_{j=1}^{r}\Big(A_j^{(1)} + A_j^{(0)}\Big) = \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} \prod_{j=1}^{r} A_j^{(\epsilon_j)}$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で、$\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ の元の全ての族 $(A_j^{(e)})$ について示す。$r = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
\prod_{j=1}^{1}\Big(A_j^{(1)}+A_j^{(0)}\Big) &= A_1^{(1)}+A_1^{(0)} && (\because \text{ 定義 2.48 } (A_j \to A_j^{(1)}+A_j^{(0)})) \\
&= A_1^{((1)_1)}+A_1^{((0)_1)} && (\because \text{ 定義 2.50 の } (1)_1=1,\ (0)_1=0) \\
&= \prod_{j=1}^{1} A_j^{((1)_j)} + \prod_{j=1}^{1} A_j^{((0)_j)} && (\because \text{ 定義 2.48 } (A_j \to A_j^{((1)_j)},\ A_j \to A_j^{((0)_j)}) \text{ を右辺から左辺へ 2 か所}) \\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1}\prod_{j=1}^{1} A_j^{(\epsilon_j)} && (\because \text{ 定義 2.50 } (B_\epsilon \to \textstyle\prod_{j=1}^{1} A_j^{(\epsilon_j)}) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}$$

r で全ての族について成り立つと仮定する。$j \in \{1,\dots,r+1\}$ で添字付けられた族 $(A_j^{(e)})$ に対して

$$\begin{aligned}
\prod_{j=1}^{r+1}\big(A_j^{(1)}+A_j^{(0)}\big) &= \Big(\prod_{j=1}^{r}\big(A_j^{(1)}+A_j^{(0)}\big)\Big)\big(A_{r+1}^{(1)}+A_{r+1}^{(0)}\big) && (\because \text{ 定義 2.48 } (A_j \to A_j^{(1)}+A_j^{(0)})) \\
&= \Big(\sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\prod_{j=1}^{r} A_j^{(\epsilon'_j)}\Big)\big(A_{r+1}^{(1)}+A_{r+1}^{(0)}\big) && (\because \text{ 帰納法の仮定 } (A_j^{(e)} \to A_j^{(e)}\ (j\in\{1,\dots,r\}))) \\
&= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\Big(\prod_{j=1}^{r} A_j^{(\epsilon'_j)}\Big)\big(A_{r+1}^{(1)}+A_{r+1}^{(0)}\big) && (\because \text{ 主張 2.56 } (m,n,p\to n,\ X_{\epsilon'} \to \textstyle\prod_{j=1}^{r} A_j^{(\epsilon'_j)},\ C \to A_{r+1}^{(1)}+A_{r+1}^{(0)})) \\
&= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} A_j^{(\epsilon'_j)}\Big)A_{r+1}^{(1)} + \Big(\prod_{j=1}^{r} A_j^{(\epsilon'_j)}\Big)A_{r+1}^{(0)}\Big) && (\because \text{ 主張 2.23 } (m,n,p\to n,\ A \to \textstyle\prod_{j=1}^{r} A_j^{(\epsilon'_j)},\ B \to A_{r+1}^{(1)},\ C \to A_{r+1}^{(0)}) \text{ を各項へ同時適用}) \\
&= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} A_j^{((\epsilon',1)_j)}\Big)A_{r+1}^{((\epsilon',1)_{r+1})} + \Big(\prod_{j=1}^{r} A_j^{((\epsilon',0)_j)}\Big)A_{r+1}^{((\epsilon',0)_{r+1})}\Big) && (\because \text{ 定義 2.50 の } (\epsilon',e)_j=\epsilon'_j\ (j\le r),\ (\epsilon',e)_{r+1}=e \text{ を各項へ同時適用}) \\
&= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r}\Big(\prod_{j=1}^{r+1} A_j^{((\epsilon',1)_j)} + \prod_{j=1}^{r+1} A_j^{((\epsilon',0)_j)}\Big) && (\because \text{ 定義 2.48 } (A_j \to A_j^{((\epsilon',e)_j)}) \text{ を右辺から左辺へ、各項の 2 か所へ同時適用}) \\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}}\prod_{j=1}^{r+1} A_j^{(\epsilon_j)} && (\because \text{ 定義 2.50 } (B_\epsilon \to \textstyle\prod_{j=1}^{r+1} A_j^{(\epsilon_j)}) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}$$

□

主張 2.61 (各因子と可換な行列は有限積とも可換)**.** $n, r \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$X, A_1, \dots, A_r \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ が、全ての $j \in \{1,\dots,r\}$ について $XA_j = A_jX$ を満たすとする。有限積は 定義 2.48、積は 定義 1.6 による。このとき

$$X\prod_{j=1}^{r} A_j = \Big(\prod_{j=1}^{r} A_j\Big)X$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で、仮定を満たす全ての X と族 (A_j) について示す。$r=1$ のとき

$$\begin{aligned}
X\prod_{j=1}^{1} A_j &= XA_1 && (\because \text{ 定義 2.48}) \\
&= A_1X && (\because \text{ 仮定 } XA_j = A_jX\ (j\to 1)) \\
&= \Big(\prod_{j=1}^{1} A_j\Big)X && (\because \text{ 定義 2.48 を右辺から左辺へ})
\end{aligned}$$

r で成り立つと仮定する。$X, A_1, \dots, A_{r+1}$ が全ての $j \in \{1,\dots,r+1\}$ について $XA_j = A_jX$ を満たすとき、$X, A_1, \dots, A_r$ は帰納法の仮定の前提を満たすので

$$
\begin{aligned}
X\prod_{j=1}^{r+1}A_j &= X\Big(\Big(\prod_{j=1}^{r}A_j\Big)A_{r+1}\Big) && (\because \text{定義 2.48})\\
&= \Big(X\prod_{j=1}^{r}A_j\Big)A_{r+1} && \big(\because \text{主張 2.15 } (m,n,p,q\to n,\ A\to X,\ B\to\textstyle\prod_{j=1}^{r}A_j,\ C\to A_{r+1}) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r}A_j\Big)X\Big)A_{r+1} && (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= \Big(\prod_{j=1}^{r}A_j\Big)(XA_{r+1}) && \big(\because \text{主張 2.15 } (m,n,p,q\to n,\ A\to\textstyle\prod_{j=1}^{r}A_j,\ B\to X,\ C\to A_{r+1})\big)\\
&= \Big(\prod_{j=1}^{r}A_j\Big)(A_{r+1}X) && (\because \text{仮定 } XA_j=A_jX\ (j\to r+1))\\
&= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r}A_j\Big)A_{r+1}\Big)X && \big(\because \text{主張 2.15 } (m,n,p,q\to n,\ A\to\textstyle\prod_{j=1}^{r}A_j,\ B\to A_{r+1},\ C\to X) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \Big(\prod_{j=1}^{r+1}A_j\Big)X && (\because \text{定義 2.48 を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

□

主張 2.62 (二つの有限積の積は、因子ごとの積の有限積)**.** $n,r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A_1,\dots,A_r,B_1,\dots,B_r\in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ が、$1\leq j<i\leq r$ を満たす全ての $i,j\in\{1,\dots,r\}$ について $A_iB_j=B_jA_i$ を満たすとする。有限積は 定義 2.48、積は 定義 1.6 による。このとき

$$\Big(\prod_{j=1}^{r}A_j\Big)\Big(\prod_{j=1}^{r}B_j\Big)=\prod_{j=1}^{r}(A_jB_j)$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で、仮定を満たす全ての族 $(A_j),(B_j)$ について示す。$r=1$ のとき

$$
\begin{aligned}
\Big(\prod_{j=1}^{1}A_j\Big)\Big(\prod_{j=1}^{1}B_j\Big) &= A_1B_1 && (\because \text{定義 2.48 を 2 か所})\\
&= \prod_{j=1}^{1}(A_jB_j) && \big(\because \text{定義 2.48 } (A_j\to A_jB_j) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}
$$

r で成り立つと仮定する。$A_1,\dots,A_{r+1},B_1,\dots,B_{r+1}$ が $1\leq j<i\leq r+1$ で $A_iB_j=B_jA_i$ を満たすとき、$A_1,\dots,A_r,B_1,\dots,B_r$ は帰納法の仮定の前提を満たす。また $j\in\{1,\dots,r\}$ なら $j<r+1$ なので $A_{r+1}B_j=B_jA_{r+1}$ であり、$X:=A_{r+1}$ と $B_1,\dots,B_r$ は 主張 2.61 の前提を満たす。よって

$$
\begin{aligned}
\Big(\prod_{j=1}^{r+1} A_j\Big)\Big(\prod_{j=1}^{r+1} B_j\Big) &= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} A_j\Big)A_{r+1}\Big)\Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} B_j\Big)B_{r+1}\Big) && (\because \text{定義 2.48 を 2 か所})\\
&= \Big(\Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} A_j\Big)A_{r+1}\Big)\prod_{j=1}^{r} B_j\Big)B_{r+1} && (\because \text{主張 2.15 } (m,n,p,q\to n,\ A\to(\textstyle\prod_{j=1}^{r}A_j)A_{r+1},\ B\to\prod_{j=1}^{r}B_j,\ C\to B_{r+1}) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} A_j\Big)\Big(A_{r+1}\prod_{j=1}^{r} B_j\Big)\Big)B_{r+1} && (\because \text{主張 2.15 } (m,n,p,q\to n,\ A\to\textstyle\prod_{j=1}^{r}A_j,\ B\to A_{r+1},\ C\to\prod_{j=1}^{r}B_j))\\
&= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} A_j\Big)\Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} B_j\Big)A_{r+1}\Big)\Big)B_{r+1} && (\because \text{主張 2.61 } (r\to r,\ X\to A_{r+1},\ A_j\to B_j))\\
&= \Big(\Big(\Big(\prod_{j=1}^{r} A_j\Big)\prod_{j=1}^{r} B_j\Big)A_{r+1}\Big)B_{r+1} && (\because \text{主張 2.15 } (m,n,p,q\to n,\ A\to\textstyle\prod_{j=1}^{r}A_j,\ B\to\prod_{j=1}^{r}B_j,\ C\to A_{r+1}) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r}(A_jB_j)\Big)A_{r+1}\Big)B_{r+1} && (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= \Big(\prod_{j=1}^{r}(A_jB_j)\Big)(A_{r+1}B_{r+1}) && (\because \text{主張 2.15 } (m,n,p,q\to n,\ A\to\textstyle\prod_{j=1}^{r}(A_jB_j),\ B\to A_{r+1},\ C\to B_{r+1}))\\
&= \prod_{j=1}^{r+1}(A_jB_j) && (\because \text{定義 2.48 } (A_j\to A_jB_j) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

□

定義 2.63 (一つの添字を除いた行列の有限積)**.** $n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$r\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\nu\in\{1,\dots,r\}$、$A_1,\dots,A_r\in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ とする。写像 $s_{r,\nu}:\{1,\dots,r-1\}\to\{1,\dots,r\}$ を

$$
s_{r,\nu}(j) := \begin{cases} j & (j<\nu)\\ j+1 & (\nu\leq j)\end{cases}
$$

と定める（$j<\nu$ なら $j\leq r$、$\nu\leq j\leq r-1$ なら $j+1\leq r$ なので、値は $\{1,\dots,r\}$ に入る）。そのうえで

$$
\prod_{j=1,\ j\neq\nu}^{r} A_j := \prod_{j=1}^{r-1} A_{s_{r,\nu}(j)} \ \in\ \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})
$$

と定める。右辺の有限積は 定義 2.48（$n\to n,\ r\to r-1,\ A_j\to A_{s_{r,\nu}(j)}$）による（$r-1\geq 1$ なので定まる）。$s_{r,\nu}$ は $\{1,\dots,r\}$ から ν を除いた添字を小さい順に並べるので、左辺は A_ν 以外の因子を添字の小さい順に左から掛けた積である。

主張 2.64 (有限積の一つの因子を末尾へ寄せる)**.** $n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$r\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\nu\in\{1,\dots,r\}$、$A_1,\dots,A_r\in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ が、$\nu<j\leq r$ を満たす全ての $j\in\{1,\dots,r\}$ について $A_\nu A_j = A_jA_\nu$ を満たすとする。有限積は 定義 2.48 と 定義 2.63、積は 定義 1.6 による。このとき

$$
\prod_{j=1}^{r} A_j = \Big(\prod_{j=1,\ j\neq\nu}^{r} A_j\Big)A_\nu
$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で、全ての $\nu\in\{1,\dots,r\}$ と仮定を満たす全ての族 (A_j) について示す。$r=2$、$\nu=1$ のとき、$s_{2,1}(1)=2$（$s_{2,1}$ の定義の $\nu\leq j$ の場合）なので

$$
\begin{aligned}
\prod_{j=1}^{2} A_j &= \Big(\prod_{j=1}^{1} A_j\Big) A_2 && (\because \text{ 定義 2.48}) \\
&= A_1 A_2 && (\because \text{ 定義 2.48}) \\
&= A_2 A_1 && (\because \text{ 仮定 } A_\nu A_j = A_j A_\nu \ (\nu \to 1,\ j \to 2)) \\
&= A_{s_{2,1}(1)} A_1 && (\because \ s_{2,1}(1) = 2) \\
&= \Big(\prod_{j=1}^{1} A_{s_{2,1}(j)}\Big) A_1 && \big(\because \text{ 定義 2.48 } (r \to 1,\ A_j \to A_{s_{2,1}(j)}) \text{ を右辺から左辺へ}\big) \\
&= \Big(\prod_{j=1,\ j\neq 1}^{2} A_j\Big) A_1 && \big(\because \text{ 定義 2.63 } (r \to 2,\ \nu \to 1) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}
$$

$r = 2$、$\nu = 2$ のとき、$s_{2,2}(1) = 1$（$s_{2,2}$ の定義の $j < \nu$ の場合）なので

$$
\begin{aligned}
\prod_{j=1}^{2} A_j &= \Big(\prod_{j=1}^{1} A_j\Big) A_2 && (\because \text{ 定義 2.48}) \\
&= A_1 A_2 && (\because \text{ 定義 2.48}) \\
&= A_{s_{2,2}(1)} A_2 && (\because \ s_{2,2}(1) = 1) \\
&= \Big(\prod_{j=1}^{1} A_{s_{2,2}(j)}\Big) A_2 && \big(\because \text{ 定義 2.48 } (r \to 1,\ A_j \to A_{s_{2,2}(j)}) \text{ を右辺から左辺へ}\big) \\
&= \Big(\prod_{j=1,\ j\neq 2}^{2} A_j\Big) A_2 && \big(\because \text{ 定義 2.63 } (r \to 2,\ \nu \to 2) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}
$$

$r \geq 2$ で成り立つと仮定し、$\nu \in \{1, \ldots, r+1\}$ と、$\nu < j \leq r+1$ で $A_\nu A_j = A_j A_\nu$ を満たす $A_1, \ldots, A_{r+1}$ を取る。$\nu = r+1$ のとき、全ての $j \in \{1, \ldots, r\}$ で $j < \nu$ なので $s_{r+1,r+1}(j) = j$ であり

$$
\begin{aligned}
\prod_{j=1}^{r+1} A_j &= \Big(\prod_{j=1}^{r} A_j\Big) A_{r+1} && (\because \text{ 定義 2.48}) \\
&= \Big(\prod_{j=1}^{r} A_{s_{r+1,r+1}(j)}\Big) A_{r+1} && (\because \ s_{r+1,r+1}(j) = j \ (j \in \{1, \ldots, r\})) \\
&= \Big(\prod_{j=1,\ j\neq r+1}^{r+1} A_j\Big) A_{r+1} && \big(\because \text{ 定義 2.63 } (r \to r+1,\ \nu \to r+1) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}
$$

$\nu \leq r$ のとき、$\nu \in \{1, \ldots, r\}$ と $A_1, \ldots, A_r$ は帰納法の仮定の前提（$\nu < j \leq r$ で $A_\nu A_j = A_j A_\nu$）を満たす。また $\nu \leq r$ なので $s_{r+1,\nu}(r) = r+1$（$\nu \leq j$ の場合）であり、$s_{r+1,\nu}$ と $s_{r,\nu}$ は同じ式で定まるので $j \in \{1, \ldots, r-1\}$ で $s_{r+1,\nu}(j) = s_{r,\nu}(j)$ である。よって

$$
\begin{aligned}
\prod_{j=1}^{r+1} A_j &= \Big(\prod_{j=1}^{r} A_j\Big) A_{r+1} && (\because \text{ 定義 2.48}) \\
&= \Big(\Big(\prod_{j=1,\ j\neq\nu}^{r} A_j\Big) A_\nu\Big) A_{r+1} && (\because \text{ 帰納法の仮定 } (\nu \to \nu,\ A_1, \dots, A_r \to A_1, \dots, A_r)) \\
&= \Big(\prod_{j=1,\ j\neq\nu}^{r} A_j\Big) (A_\nu A_{r+1}) && (\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p,q \to n,\ A \to \textstyle\prod_{j=1,\ j\neq\nu}^{r} A_j,\ B \to A_\nu,\ C \to A_{r+1})) \\
&= \Big(\prod_{j=1,\ j\neq\nu}^{r} A_j\Big) (A_{r+1} A_\nu) && (\because \text{ 仮定 } A_\nu A_j = A_j A_\nu \ (j \to r+1)。\ \nu \leq r < r+1) \\
&= \Big(\Big(\prod_{j=1,\ j\neq\nu}^{r} A_j\Big) A_{r+1}\Big) A_\nu && (\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p,q \to n,\ A \to \textstyle\prod_{j=1,\ j\neq\nu}^{r} A_j,\ B \to A_{r+1},\ C \to A_\nu) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r-1} A_{s_{r,\nu}(j)}\Big) A_{r+1}\Big) A_\nu && (\because \text{ 定義 2.63 } (r \to r)) \\
&= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r-1} A_{s_{r,\nu}(j)}\Big) A_{s_{r+1,\nu}(r)}\Big) A_\nu && (\because \ s_{r+1,\nu}(r) = r+1) \\
&= \Big(\Big(\prod_{j=1}^{r-1} A_{s_{r+1,\nu}(j)}\Big) A_{s_{r+1,\nu}(r)}\Big) A_\nu && (\because \ s_{r+1,\nu}(j) = s_{r,\nu}(j) \ (j \in \{1, \dots, r-1\})) \\
&= \Big(\prod_{j=1}^{r} A_{s_{r+1,\nu}(j)}\Big) A_\nu && (\because \text{ 定義 2.48 } (r \to r-1,\ A_j \to A_{s_{r+1,\nu}(j)}) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \Big(\prod_{j=1,\ j\neq\nu}^{r+1} A_j\Big) A_\nu && (\because \text{ 定義 2.63 } (r \to r+1) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

□

主張 2.65 (自分自身との和が零行列なら零行列)**.** $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X \in \mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ が $X + X = O$ を満たすとする。和は 定義 2.4、$O \in \mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列である。このとき

$$X = O$$

が成り立つ。

証明. $2_{\mathbb{C}} := \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(2)$ は 定義 1.13 の略記である。

$$
\begin{aligned}
1_{\mathbb{C}} + 1_{\mathbb{C}} &= (1,0) + (1,0) && \big(\because \text{ 定義 1.13}\big) \\
&= (1+1,\ 0+0) && \big(\because \text{ 定義 1.12 の和}\big) \\
&= (2,0) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= 2_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 定義 1.13}\big)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
2_{\mathbb{C}} &= (2,0) && \big(\because \text{ 定義 1.13}\big) \\
&\neq (0,0) && (\because \text{ 第 1 成分が } 2 \neq 0 \ (\mathbb{R})) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 定義 1.13}\big)
\end{aligned}
$$

よって $2_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$ なので、主張 1.56 の逆元の存在から $2_{\mathbb{C}}^{-1} \in \mathbb{C}$ で $2_{\mathbb{C}}^{-1} 2_{\mathbb{C}} = 1_{\mathbb{C}}$ となるものが取れる。両辺はともに $\mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \dots, m\}$、$k \in \{1, \dots, p\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
X_{ik} &= 1_{\mathbb{C}}\, X_{ik} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元主張 1.56}) \\
&= \left(2_{\mathbb{C}}^{-1}\, 2_{\mathbb{C}}\right) X_{ik} && (\because\ 2_{\mathbb{C}}^{-1} \text{ の取り方}) \\
&= 2_{\mathbb{C}}^{-1}\left(2_{\mathbb{C}}\, X_{ik}\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= 2_{\mathbb{C}}^{-1}\left((1_{\mathbb{C}} + 1_{\mathbb{C}})\, X_{ik}\right) && (\because\ \text{上の鎖 } 1_{\mathbb{C}} + 1_{\mathbb{C}} = 2_{\mathbb{C}} \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= 2_{\mathbb{C}}^{-1}\left(1_{\mathbb{C}}\, X_{ik} + 1_{\mathbb{C}}\, X_{ik}\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配律主張 1.56}) \\
&= 2_{\mathbb{C}}^{-1}\left(X_{ik} + X_{ik}\right) && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元主張 1.56 を 2 か所へ}) \\
&= 2_{\mathbb{C}}^{-1}\,(X + X)_{ik} && (\because\ \text{定義 2.4}) \\
&= 2_{\mathbb{C}}^{-1}\, O_{ik} && (\because\ \text{仮定 } X + X = O) \\
&= 2_{\mathbb{C}}^{-1}\, 0_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定義 1.93}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.59 } (z \to 2_{\mathbb{C}}^{-1})) \\
&= O_{ik} && (\because\ \text{定義 1.93})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.66 (和の等式から右の項を差で表す)**.** $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B, C \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ が $A+B = C$ を満たすとする。和は 定義 2.4、差は 定義 1.92 による。このとき

$$B = C - A$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, p\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
B_{ik} &= 0_{\mathbb{C}} + B_{ik} && (\because\ 0_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の加法の単位元主張 1.56}) \\
&= \left((-A_{ik}) + A_{ik}\right) + B_{ik} && (\because\ -A_{ik} \text{ は } A_{ik} \text{ の加法の逆元主張 1.56}) \\
&= (-A_{ik}) + \left(A_{ik} + B_{ik}\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の加法の結合律主張 1.56}) \\
&= (-A_{ik}) + (A + B)_{ik} && (\because\ \text{定義 2.4}) \\
&= (-A_{ik}) + C_{ik} && (\because\ \text{仮定 } A + B = C) \\
&= C_{ik} + (-A_{ik}) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の加法の交換律主張 1.56}) \\
&= C_{ik} - A_{ik} && (\because\ \text{定義 1.15 を右辺から左辺へ}) \\
&= (C - A)_{ik} && (\because\ \text{定義 1.92})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.67 (行列 A と差 B − A の和は B)**.** $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ について

$$A + (B - A) = B$$

が成り立つ。和は 定義 2.4、差は 定義 1.92 による。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, p\}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
\big(A+(B-A)\big)_{ik} &= A_{ik}+(B-A)_{ik} && (\because \text{定義 2.4})\\
&= A_{ik}+\big(B_{ik}-A_{ik}\big) && (\because \text{定義 1.92})\\
&= A_{ik}+\big(B_{ik}+(-A_{ik})\big) && (\because \text{定義 1.15})\\
&= A_{ik}+\big((-A_{ik})+B_{ik}\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の加法の交換律主張 1.56})\\
&= \big(A_{ik}+(-A_{ik})\big)+B_{ik} && (\because \mathbb{C} \text{ の加法の結合律主張 1.56})\\
&= 0_{\mathbb{C}}+B_{ik} && (\because -A_{ik} \text{ は } A_{ik} \text{ の加法の逆元主張 1.56})\\
&= B_{ik} && (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の加法の単位元主張 1.56})
\end{aligned}
$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.68 (反可換な二つの行列の積は可換)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$G, X, Y \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $GX = -(XG)$ と $GY = -(YG)$ を満たすとする。積は 定義 1.6、符号反転は 定義 1.94 による。このとき

$$G(XY) = (XY)G$$

が成り立つ。

証明.

$$
\begin{aligned}
G(XY) &= (GX)Y && (\because \text{主張 2.15})\\
&= \big(-(XG)\big)Y && (\because \text{仮定 } GX = -(XG))\\
&= -\big((XG)Y\big) && (\because \text{主張 2.20})\\
&= -\big(X(GY)\big) && (\because \text{主張 2.15})\\
&= -\Big(X\big(-(YG)\big)\Big) && (\because \text{仮定 } GY = -(YG))\\
&= -\Big(-\big(X(YG)\big)\Big) && (\because \text{主張 2.21})\\
&= X(YG) && (\because \text{主張 2.27})\\
&= (XY)G && (\because \text{主張 2.15})
\end{aligned}
$$

□

主張 2.69 (可換な行列のスカラー倍とも可換)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c \in \mathbb{C}$、$G, X \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $GX = XG$ を満たすとする。スカラー倍は 定義 2.3、積は 定義 1.6 による。このとき

$$G(cX) = (cX)G$$

が成り立つ。

証明.

$$
\begin{aligned}
G(cX) &= c(GX) && (\because \text{主張 2.19})\\
&= c(XG) && (\because \text{仮定 } GX = XG)\\
&= (cX)G && (\because \text{主張 2.18})
\end{aligned}
$$

□

主張 2.70 (可換な行列の有限和とも可換)**.** $n, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$G, X_1, \ldots, X_r \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が、すべての $j \in \{1, \ldots, r\}$ について $GX_j = X_jG$ を満たすとする。有限和は 定義 2.5、積は 定義 1.6 による。このとき

$$G\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) = \Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)G$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で示す。$r=1$ のとき、

$$\begin{aligned} G\Big(\sum_{j=1}^{1} X_j\Big) &= GX_1 && (\because \text{ 定義 2.5}) \\ &= X_1G && (\because \text{ 仮定 } GX_1 = X_1G) \\ &= \Big(\sum_{j=1}^{1} X_j\Big)G && (\because \text{ 定義 2.5}) \end{aligned}$$

r で成り立つとし、$X_1, \ldots, X_{r+1}$ がすべて G と可換とする。$X_1, \ldots, X_r$ に帰納法の仮定を当てて

$$\begin{aligned} G\Big(\sum_{j=1}^{r+1} X_j\Big) &= G\Big(\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + X_{r+1}\Big) && (\because \text{ 定義 2.5}) \\ &= G\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + GX_{r+1} && (\because \text{ 主張 2.23}) \\ &= \Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)G + GX_{r+1} && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\ &= \Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)G + X_{r+1}G && (\because \text{ 仮定 } GX_{r+1} = X_{r+1}G) \\ &= \Big(\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + X_{r+1}\Big)G && (\because \text{ 主張 2.24}) \\ &= \Big(\sum_{j=1}^{r+1} X_j\Big)G && (\because \text{ 定義 2.5}) \end{aligned}$$

□

主張 2.71 (可換な二つの行列の差とも可換)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$G, X, W \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $GX = XG$ と $GW = WG$ を満たすとする。差は 定義 1.92、積は 定義 1.6 による。このとき

$$G(X - W) = (X - W)G$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned} G(X-W) &= G\big(X + (-W)\big) && (\because \text{ 主張 2.30}) \\ &= GX + G(-W) && (\because \text{ 主張 2.23}) \\ &= XG + G(-W) && (\because \text{ 仮定 } GX = XG) \\ &= XG + \big(-(GW)\big) && (\because \text{ 主張 2.21}) \\ &= XG + \big(-(WG)\big) && (\because \text{ 仮定 } GW = WG) \\ &= XG + (-W)G && (\because \text{ 主張 2.20}) \\ &= \big(X + (-W)\big)G && (\because \text{ 主張 2.24}) \\ &= (X - W)G && (\because \text{ 主張 2.30}) \end{aligned}$$

□

定義 2.72 (クロネッカー積（2 次の複素行列・2 次元数ベクトルの M 個の積）)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。各成分が 1 か 2 である M 個組の全体

$$\mathcal{I}_M := \{1,2\}^M = \{\,(i_1,\dots,i_M) \mid i_1,\dots,i_M \in \{1,2\}\,\}$$

を添字集合とする。$\#\mathcal{I}_M = 2^M$ である（下の Step 1）。写像

$$\nu : \mathcal{I}_M \to \{1,2,\dots,2^M\}, \qquad \nu(I) := 1 + \sum_{k=1}^{M} (i_k - 1)\, 2^{M-k} \quad (I = (i_1,\dots,i_M))$$

は全単射である（下の Step 2・Step 3）。以後、$\mathcal{I}_M$ の元 I を、行番号・列番号 $\nu(I) \in \{1,\dots,2^M\}$ と同一視して使う。

（1）数ベクトルのクロネッカー積。$v_1,\dots,v_M \in \mathbb{C}^2$ に対し、$v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M \in \mathbb{C}^{2^M}$ を成分で

$$(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M)_{\nu(I)} := \prod_{k=1}^{M} (v_k)_{i_k} \qquad (I = (i_1,\dots,i_M) \in \mathcal{I}_M)$$

と定める（右辺は 定義 1.60 の複素数の有限積であり、$(v_k)_{i_k} \in \mathbb{C}$ は v_k の第 i_k 成分）。ν が全単射だから、これで $\mathbb{C}^{2^M}$ の元が 1 つ確定する。

（2）行列のクロネッカー積。$A_1,\dots,A_M \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ に対し、$A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ を成分で

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I),\nu(J)} := \prod_{k=1}^{M} (A_k)_{i_k j_k} \qquad (I = (i_1,\dots,i_M),\ J = (j_1,\dots,j_M) \in \mathcal{I}_M)$$

と定める（右辺は 定義 1.60 の有限積）。これは 2^M 行 2^M 列の複素行列であって、抽象的なテンソル積ではない。

（3）これらが住む空間。$A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M$ は 2^M 次の複素正方行列全体 $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の元、$v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M$ は 2^M 次元数ベクトル全体 $\mathbb{C}^{2^M}$ の元である。基底と単位行列に関する帰結は、定義後の成分計算で別に示す。

証明. ν が定義どおりの写像であり全単射であること（定義が意味をもつために必要な事項）を確かめる。

Step 1: $\#\mathcal{I}_M = 2^M$。M についての帰納法による。$M = 1$ のとき $\mathcal{I}_1 = \{(1),(2)\}$ で元数は $2 = 2^1$。M で $\#\mathcal{I}_M = 2^M$ とすると、$\mathcal{I}_{M+1}$ の元は (I, i_{M+1})（$I \in \mathcal{I}_M$、$i_{M+1} \in \{1,2\}$）と一対一に対応するから、次の一続きで $M+1$ でも成り立つ。

$$\begin{aligned}
\#\mathcal{I}_{M+1} &= \#\mathcal{I}_M \cdot 2 && (\because \text{一対一対応で} I \text{ が} \#\mathcal{I}_M \text{ 通り、} i_{M+1} \text{ が2 通り}) \\
&= 2^M \cdot 2 && (\because \text{帰納法の仮定 } \#\mathcal{I}_M = 2^M) \\
&= 2^{M+1} && (\because \text{指数法則 } 2^M \cdot 2 = 2^{M+1})
\end{aligned}$$

Step 2: 値域。まず $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1$（$n = 0$ のときは空和で $0 = 2^0 - 1$、n で成り立てば次の一続きで $n+1$ でも成り立つ）。

$$\begin{aligned}
\sum_{t=0}^{n} 2^t &= \sum_{t=0}^{n-1} 2^t + 2^n && (\because \text{有限和の最後の項を分ける}) \\
&= (2^n - 1) + 2^n && (\because \text{帰納法の仮定 } \textstyle\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1) \\
&= 2 \cdot 2^n - 1 && (\because \text{加法の結合則と} 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n) \\
&= 2^{n+1} - 1 && (\because \text{指数法則 } 2 \cdot 2^n = 2^{n+1})
\end{aligned}$$

各 k について $i_k - 1 \in \{0,1\}$ であるから

$$
\begin{aligned}
0 &\leq \sum_{k=1}^{M}(i_k-1)2^{M-k} && (\because \text{各項は} 0 \leq i_k - 1 \text{ と} 2^{M-k} > 0 \text{ の積で非負})\\
&\leq \sum_{k=1}^{M} 2^{M-k} && (\because \text{各項で} i_k - 1 \leq 1 \text{ かつ} 2^{M-k} > 0)\\
&= \sum_{t=0}^{M-1} 2^t && (\because \text{添字の置き換え} t := M-k)\\
&= 2^M - 1 && (\because \text{上の} \textstyle\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1 \text{ を} n := M \text{ で})
\end{aligned}
$$

であり、$1 \leq \nu(I) \leq 2^M$。よって ν は $\mathcal{I}_M$ から $\{1, \ldots, 2^M\}$ への写像である。

Step 3: 単射性、および全単射性。$I = (i_1, \ldots, i_M) \neq J = (j_1, \ldots, j_M)$ とし、$i_k \neq j_k$ となる最小の k をとる。必要なら I と J を入れ替えて $i_k = 2,\ j_k = 1$ としてよい。$l < k$ では $i_l = j_l$ だから

$$
\begin{aligned}
\nu(I) - \nu(J) &= \Big(1 + \sum_{l=1}^{M}(i_l-1)2^{M-l}\Big) - \Big(1 + \sum_{l=1}^{M}(j_l-1)2^{M-l}\Big) && (\because \nu \text{ の定義})\\
&= \sum_{l=1}^{M}(i_l - j_l)2^{M-l} && (\because \text{和の差を項ごとに取る。} (i_l-1)-(j_l-1) = i_l - j_l)\\
&= \sum_{l=k}^{M}(i_l - j_l)2^{M-l} && (\because l < k \text{ では} i_l = j_l \text{ で項が} 0)\\
&= 2^{M-k} + \sum_{l=k+1}^{M}(i_l - j_l)2^{M-l} && (\because l = k \text{ の項を分ける。} i_k - j_k = 2 - 1 = 1)
\end{aligned}
$$

であり、$i_l - j_l \in \{-1, 0, 1\}$ より次の一続きが成り立つ。

$$
\begin{aligned}
\left|\sum_{l=k+1}^{M}(i_l - j_l)2^{M-l}\right| &\leq \sum_{l=k+1}^{M}|i_l - j_l|\,2^{M-l} && (\because \text{三角不等式と} 2^{M-l} > 0)\\
&\leq \sum_{l=k+1}^{M} 2^{M-l} && (\because \text{各項で} |i_l - j_l| \leq 1 \text{ かつ} 2^{M-l} > 0)\\
&= \sum_{t=0}^{M-k-1} 2^t && (\because \text{添字の置き換え} t := M-l)\\
&= 2^{M-k} - 1 && (\because \text{Step 2 の} \textstyle\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1 \text{ を} n := M-k \text{ で})\\
&< 2^{M-k} && (\because 2^{M-k} - 1 < 2^{M-k})
\end{aligned}
$$

よって $\nu(I) - \nu(J) \neq 0$ すなわち ν は単射である。Step 1 より $\#\mathcal{I}_M = 2^M = \#\{1, \ldots, 2^M\}$ であり、有限集合の間の単射で元数が等しいものは全射でもあるから（像は 2^M 個の元をもつ $\{1, \ldots, 2^M\}$ の部分集合、すなわち全体）、ν は全単射である。 □

主張 2.73 (クロネッカー積の積の規則（各因子ごとの積になること）)**.** 定義 2.72 の記号のもと、$A_1, \ldots, A_M, B_1, \ldots, B_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$、$v_1, \ldots, v_M \in \mathbb{C}^2$ について次が成り立つ。

- (1) $(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_MB_M)$（左辺は 2^M 次の行列の積、右辺の各 A_kB_k は 2 次の行列の積）。
- (2) $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$。
- (3) $(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M) = (A_1v_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_Mv_M)$。

証明. 行列積と列ベクトルへの作用は 定義 1.6 に従い、複素数の結合律・可換律・分配律は主張 1.56 を用いる。

多重添字についての和を、各因子ごとの和の積へ直すこと。$M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ と、各 $k \in \{1, \ldots, M\}$ ごとに与えられた複素数 $c_k(1), c_k(2) \in \mathbb{C}$ について

$$\sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^{M} c_k(t_k) = \prod_{k=1}^{M} \left(\sum_{t=1}^{2} c_k(t) \right) \qquad (K = (t_1, \ldots, t_M))$$

が成り立つ。M についての帰納法で示す。$M = 1$ のときは両辺とも $c_1(1) + c_1(2)$。M で成り立つとすると、$\mathcal{I}_{M+1}$ の元は (K, t)（$K \in \mathcal{I}_M,\ t \in \{1, 2\}$）と一対一に対応するから

$$\begin{aligned}
\sum_{(t_1, \ldots, t_{M+1}) \in \mathcal{I}_{M+1}} \prod_{k=1}^{M+1} c_k(t_k) &= \sum_{t=1}^{2} \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \left(\prod_{k=1}^{M} c_k(t_k) \right) c_{M+1}(t) && (\because \text{最後の成分} t_{M+1} = t \text{ で場合分けした有限和の分割}) \\
&= \left(\sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^{M} c_k(t_k) \right) \left(\sum_{t=1}^{2} c_{M+1}(t) \right) && (\because \text{分配律}) \\
&= \left(\prod_{k=1}^{M} \left(\sum_{s=1}^{2} c_k(s) \right) \right) \left(\sum_{t=1}^{2} c_{M+1}(t) \right) && (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \prod_{k=1}^{M+1} \left(\sum_{t=1}^{2} c_k(t) \right) && (\because \text{有限積の最後の因子を戻した（積の定義）})
\end{aligned}$$

(1) の証明。$I = (i_1, \ldots, i_M),\ L = (l_1, \ldots, l_M) \in \mathcal{I}_M$ を任意に取る。行列の積の定義と、定義 2.72 の ν が全単射であること（和の変数 $p \in \{1, \ldots, 2^M\}$ を $p = \nu(K),\ K = (t_1, \ldots, t_M) \in \mathcal{I}_M$ と書き換えてよい）より、

$$\begin{aligned}
\left((A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) \right)_{\nu(I), \nu(L)} &= \sum_{p=1}^{2^M} (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I), p} (B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M)_{p, \nu(L)} && (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \left(\prod_{k=1}^{M} (A_k)_{i_k t_k} \right) \left(\prod_{k=1}^{M} (B_k)_{t_k l_k} \right) && (\because \nu \text{ は全単射、} \boxtimes \text{ の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^{M} \left((A_k)_{i_k t_k} (B_k)_{t_k l_k} \right) && (\because \text{複素数の積の可換律・結合律}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \left(\sum_{t=1}^{2} (A_k)_{i_k t} (B_k)_{t l_k} \right) && (\because \text{多重添字の和を各因子ごとの和の積へ直す段を} c_k(t) = (A_k)_{i_k t} (B_k)_{t l_k} \text{ に適用}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} (A_k B_k)_{i_k l_k} && (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= \left((A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M B_M) \right)_{\nu(I), \nu(L)} && (\because \boxtimes \text{ の定義})
\end{aligned}$$

ν は全単射だから、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。

(2) の証明。$I = (i_1, \ldots, i_M),\ J = (j_1, \ldots, j_M) \in \mathcal{I}_M$ を任意に取る。単位行列の成分は $\left(I_{\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})} \right)_{ij} = \delta_{ij}$（$i = j$ のとき 1、そうでなければ 0）である。

$$\begin{aligned}
\left(I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \right)_{\nu(I), \nu(J)} &= \prod_{k=1}^{M} \delta_{i_k j_k} && (\because \boxtimes \text{ の定義と単位行列の成分}) \\
&= \begin{cases} 1 & (I = J) \\ 0 & (I \neq J) \end{cases} && (\because \text{積が1 になるのは全ての} k \text{ で} i_k = j_k \text{、すなわち} I = J \text{ のときに限り、そうでなければ因子に0 が現れる}) \\
&= \left(I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right)_{\nu(I), \nu(J)} && (\because \nu \text{ は単射なので} I = J \iff \nu(I) = \nu(J) \text{、および単位行列の成分})
\end{aligned}$$

ν は全単射だから、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。

(3) の証明。(1) と同じ計算を、第 2 の因子を数ベクトルに置き換えて行う。

$$
\begin{aligned}
((A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M))_{\nu(I)} &= \sum_{p=1}^{2^M} (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I),p} (v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M)_p && (\because \text{行列と数ベクトルの積の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \left(\prod_{k=1}^{M} (A_k)_{i_k t_k} \right) \left(\prod_{k=1}^{M} (v_k)_{t_k} \right) && (\because \nu \text{ は全単射、} \boxtimes \text{ の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^{M} ((A_k)_{i_k t_k} (v_k)_{t_k}) && (\because \text{複素数の積の可換律・結合律}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \left(\sum_{t=1}^{2} (A_k)_{i_k t} (v_k)_t \right) && (\because \text{多重添字の和を各因子ごとの和の積へ直す段を} c_k(t) = (A_k)_{i_k t}(v_k)_t \text{ に適用}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} (A_k v_k)_{i_k} && (\because \text{行列と数ベクトルの積の定義}) \\
&= ((A_1 v_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M v_M))_{\nu(I)} && (\because \boxtimes \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

□

主張 2.74 (クロネッカー積の各因子についての線型性)**.** 定義 2.72 の記号のもと、$j \in \{1, \ldots, M\}$ を固定し、$A_1, \ldots, A_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$、$r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c_1, \ldots, c_r \in \mathbb{C}$、$B_1, \ldots, B_r \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ とする。第 j 因子が $A_j = \sum_{a=1}^{r} c_a B_a$ と書けているとき、

$$
A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\left(\sum_{a=1}^{r} c_a B_a \right)}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M = \sum_{a=1}^{r} c_a \left(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{B_a}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M \right)
$$

が成り立つ。特に $r = 1$ として、$c \in \mathbb{C}$ について

$$
A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(c\, A_j)}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M = c\, (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)
$$

である。数ベクトルのクロネッカー積についても、$\mathbb{C}^2$ の元を同じ形に分解したとき同じ等式が成り立つ。

証明. 成分の複素数の演算には 主張 1.56 の結合律・可換律・分配律を用いる。

準備。$I = (i_1, \ldots, i_M),\ J = (j_1, \ldots, j_M) \in \mathcal{I}_M$ を任意に取り、両辺の $(\nu(I), \nu(J))$ 成分を比べる。以下で $\prod_{k \neq j} (A_k)_{i_k j_k}$ は $k \in \{1, \ldots, M\} \setminus \{j\}$ についての積を表す。

$$
\begin{aligned}
\left(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \left(\sum_{a=1}^{r} c_a B_a \right) \boxtimes \cdots \boxtimes A_M \right)_{\nu(I),\nu(J)} &= \left(\prod_{k \neq j} (A_k)_{i_k j_k} \right) \left(\sum_{a=1}^{r} c_a B_a \right)_{i_j j_j} && (\because \boxtimes \text{ の定義}) \\
&= \left(\prod_{k \neq j} (A_k)_{i_k j_k} \right) \left(\sum_{a=1}^{r} c_a (B_a)_{i_j j_j} \right) && (\because \text{行列の和・スカラー倍は成分ごとの演算}) \\
&= \sum_{a=1}^{r} c_a \left(\prod_{k \neq j} (A_k)_{i_k j_k} \right) (B_a)_{i_j j_j} && (\because \text{複素数の分配律}) \\
&= \sum_{a=1}^{r} c_a \, (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_a \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I),\nu(J)} && (\because \boxtimes \text{ の定義}) \\
&= \left(\sum_{a=1}^{r} c_a \, (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_a \boxtimes \cdots \boxtimes A_M) \right)_{\nu(I),\nu(J)} && (\because \text{行列の和・スカラー倍は成分ごとの演算})
\end{aligned}
$$

ν は全単射だから、すべての成分が一致し両辺は等しい。$r = 1,\ c_1 = c,\ B_1 = A_j$ とすればスカラーを前に出す式を得る。数ベクトルの場合は、上の計算で $(A_k)_{i_k j_k}$ を $(v_k)_{i_k}$ に置き換えれば同じ議論がそのまま通用する。 □

定義 2.75 (行列の転置)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$B \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）とする。$B$ の転置 $B^{\top} \in \mathrm{Mat}(n, m, \mathbb{C})$ を、成分ごとに

$$
\left(B^{\top} \right)_{pq} := B_{qp} \qquad (p \in \{1, \ldots, n\},\ q \in \{1, \ldots, m\})
$$

で定める。右辺は B の (q, p) 成分であり、$q \in \{1, \ldots, m\}$、$p \in \{1, \ldots, n\}$ だから定まっている。

主張 2.76 (クロネッカー積の転置（因子ごとの転置になること）)**.** 定義 2.72 の記号のもと、$A_1, \dots, A_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ について、定義 2.75 の転置に関して

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)^\top = A_1^\top \boxtimes \cdots \boxtimes A_M^\top$$

が成り立つ。

証明. $I = (i_1, \dots, i_M),\ J = (j_1, \dots, j_M) \in \mathcal{I}_M$ を任意に取り、両辺の $(\nu(I), \nu(J))$ 成分を比べる。

$$\begin{aligned}
\left((A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)^\top\right)_{\nu(I),\nu(J)} &= (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(J),\nu(I)} && (\because \text{定義 2.75 で} m = n = 2^M) \\
&= \prod_{k=1}^{M} (A_k)_{j_k i_k} && (\because \text{定義 2.72 を} A_1, \dots, A_M \text{ に適用}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \left(A_k^\top\right)_{i_k j_k} && (\because \text{定義 2.75 で} m = n = 2 \text{ を各} k \text{ に適用}) \\
&= \left(A_1^\top \boxtimes \cdots \boxtimes A_M^\top\right)_{\nu(I),\nu(J)} && (\because \text{定義 2.72 を} A_1^\top, \dots, A_M^\top (\text{定義 2.75 により} \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C}) \text{ の元}) \text{ に適用})
\end{aligned}$$

ν は 定義 2.72 により全単射であり、$\{1, \dots, 2^M\}$ のどの成分の番号も $\nu(I)$ の形に書けるので、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。 □

主張 2.77 (行列の和の転置は転置の和)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）とする。和は 定義 2.4、転置は 定義 2.75 による。このとき

$$(A + B)^\top = A^\top + B^\top$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(n, m, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$p \in \{1, \dots, n\}$、$q \in \{1, \dots, m\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\left((A + B)^\top\right)_{pq} &= (A + B)_{qp} && \left(\because \text{定義 2.75 } (B \to A + B)\right) \\
&= A_{qp} + B_{qp} && \left(\because \text{定義 2.4 } (i \to q,\ j \to p)\right) \\
&= \left(A^\top\right)_{pq} + \left(B^\top\right)_{pq} && \left(\because \text{定義 2.75 } (B \to A \text{ と} B \to B) \text{ を 2 箇所へ適用}\right) \\
&= \left(A^\top + B^\top\right)_{pq} && \left(\because \text{定義 2.4 } (m \to n,\ n \to m,\ A \to A^\top,\ B \to B^\top,\ i \to p,\ j \to q)\right)
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.78 (行列のスカラー倍の転置は転置のスカラー倍)**.** $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c \in \mathbb{C}$、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）とする。スカラー倍は 定義 2.3、転置は 定義 2.75 による。このとき

$$(cA)^\top = c\, A^\top$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(n, m, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$p \in \{1, \dots, n\}$、$q \in \{1, \dots, m\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\left((cA)^\top\right)_{pq} &= (cA)_{qp} && \left(\because \text{定義 2.75 } (B \to cA)\right) \\
&= c\, A_{qp} && \left(\because \text{定義 2.3 } (a \to c,\ i \to q,\ j \to p)\right) \\
&= c \left(A^\top\right)_{pq} && \left(\because \text{定義 2.75 } (B \to A)\right) \\
&= \left(c\, A^\top\right)_{pq} && \left(\because \text{定義 2.3 } (m \to n,\ n \to m,\ a \to c,\ A \to A^\top,\ i \to p,\ j \to q)\right)
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.79 (行列の差の転置は転置の差)**.** $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）とする。差は 定義 1.92、転置は 定義 2.75 による。このとき

$$(A - B)^\top = A^\top - B^\top$$

が成り立つ。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(p, m, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$k \in \{1, \ldots, p\}$、$i \in \{1, \ldots, m\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
\left((A-B)^\top\right)_{ki} &= (A-B)_{ik} && (\because \text{定義 2.75 } (n \to p,\ B \to A-B,\ p \to k,\ q \to i \text{ を同時に置き換える})) \\
&= A_{ik} - B_{ik} && (\because \text{定義 1.92}) \\
&= \left(A^\top\right)_{ki} - \left(B^\top\right)_{ki} && (\because \text{定義 2.75 } (n \to p,\ B \to A \text{ と} B \to B,\ p \to k,\ q \to i \text{ を同時に置き換える}) \text{ を 2 箇所へ適用}) \\
&= \left(A^\top - B^\top\right)_{ki} && (\because \text{定義 1.92 } (m \to p,\ p \to m,\ A \to A^\top,\ B \to B^\top,\ i \to k,\ k \to i))
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

主張 2.80 (行列の有限和の転置は転置の有限和)**.** $m, n, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X_1, \ldots, X_r \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）とする。左辺の有限和は 定義 2.5（$\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ の中)、右辺の有限和は 定義 2.5（$\mathrm{Mat}(n, m, \mathbb{C})$ の中)、転置は 定義 2.75 による。このとき

$$\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)^\top = \sum_{j=1}^{r} X_j^\top$$

が成り立つ。

証明. r についての帰納法で示す。$r = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
\Big(\sum_{j=1}^{1} X_j\Big)^\top &= X_1^\top && (\because \text{定義 2.5}) \\
&= \sum_{j=1}^{1} X_j^\top && (\because \text{定義 2.5 } (m \to n,\ n \to m,\ X_j \to X_j^\top))
\end{aligned}$$

である。r で成り立つと仮定すると、$X_1, \ldots, X_{r+1} \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}
\Big(\sum_{j=1}^{r+1} X_j\Big)^\top &= \Big(\Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + X_{r+1}\Big)^\top && (\because \text{定義 2.5}) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big)^\top + X_{r+1}^\top && (\because \text{主張 2.77 } (A \to \textstyle\sum_{j=1}^{r} X_j,\ B \to X_{r+1})) \\
&= \Big(\sum_{j=1}^{r} X_j^\top\Big) + X_{r+1}^\top && (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{j=1}^{r+1} X_j^\top && (\because \text{定義 2.5 } (m \to n,\ n \to m,\ X_j \to X_j^\top))
\end{aligned}$$

である。 □

定義 2.81 (成分がすべて実数の行列)**.** $m,n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$B\in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）とする。$B$ の ** 成分がすべて実数である ** とは、すべての $p\in\{1,\dots,m\}$、$q\in\{1,\dots,n\}$ について

$$B_{pq}=r_{\mathbb{C}}$$

を満たす $r\in\mathbb{R}$ が存在することをいう。$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記である。

主張 2.82 (成分がすべて実数の行列のクロネッカー積は成分がすべて実数)**.** 定義 2.72 の記号のもと、$A_1,\dots,A_M\in\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の成分がすべて実数（定義 2.81 で $m=n=2$）ならば、$A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M\in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の成分もすべて実数（定義 2.81 で $m=n=2^M$）である。

証明. $I=(i_1,\dots,i_M),\ J=(j_1,\dots,j_M)\in\mathcal{I}_M$ を任意に取る。各 $k\in\{1,\dots,M\}$ について、仮定（定義 2.81 で $B\to A_k,\ p\to i_k,\ q\to j_k$）から $(A_k)_{i_kj_k}=(r_k)_{\mathbb{C}}$ を満たす $r_k\in\mathbb{R}$ がある。主張 1.67（$m\to M,\ j\to k,\ z_j\to(A_k)_{i_kj_k},\ r_j\to r_k$）から $\prod_{k=1}^{M}(A_k)_{i_kj_k}=r_{\mathbb{C}}$ を満たす $r\in\mathbb{R}$ を取ると

$$\begin{aligned}(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M)_{\nu(I),\nu(J)}&=\prod_{k=1}^{M}(A_k)_{i_kj_k}\quad(\because\text{定義 2.72 を}A_1,\dots,A_M\text{ に適用})\\&=r_{\mathbb{C}}\qquad(\because r\text{ の取り方})\end{aligned}$$

である。ν は 定義 2.72 により全単射であり、$\{1,\dots,2^M\}$ のどの成分の番号も $\nu(I)$ の形に書けるので、$A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M$ のすべての成分について 定義 2.81 の条件が示された。 □

主張 2.83 (成分がすべて実数の行列の実数倍は成分がすべて実数)**.** $m,n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c\in\mathbb{R}$ とし、$B\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の成分がすべて実数（定義 2.81）とする。このとき $c_{\mathbb{C}}B\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$（定義 2.3 のスカラー倍。$c_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記）の成分もすべて実数である。

証明. $p\in\{1,\dots,m\}$、$q\in\{1,\dots,n\}$ を任意に取る。仮定（定義 2.81）から $B_{pq}=s_{\mathbb{C}}$ を満たす $s\in\mathbb{R}$ がある。

$$\begin{aligned}(c_{\mathbb{C}}B)_{pq}&=c_{\mathbb{C}}\,B_{pq}\quad(\because\text{定義 2.3 }(a\to c_{\mathbb{C}},\ A\to B,\ i\to p,\ j\to q))\\&=c_{\mathbb{C}}\,s_{\mathbb{C}}\quad(\because s\text{ の取り方})\\&=(cs)_{\mathbb{C}}\quad(\because\text{主張 1.29 }(a\to c,\ b\to s))\end{aligned}$$

$r:=cs\in\mathbb{R}$ と取れば $(c_{\mathbb{C}}B)_{pq}=r_{\mathbb{C}}$ であり、p,q は任意なので 定義 2.81 の条件が成り立つ。 □

主張 2.84 (成分がすべて実数の行列の和は成分がすべて実数)**.** $m,n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$A,B\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の成分がすべて実数（定義 2.81）とする。このとき $A+B\in\mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$（定義 2.4 の和）の成分もすべて実数である。

証明. $p\in\{1,\dots,m\}$、$q\in\{1,\dots,n\}$ を任意に取る。仮定（定義 2.81）から $A_{pq}=s_{\mathbb{C}}$ を満たす $s\in\mathbb{R}$ と、$B_{pq}=t_{\mathbb{C}}$ を満たす $t\in\mathbb{R}$ がある。

$$\begin{aligned}(A+B)_{pq}&=A_{pq}+B_{pq}\qquad(\because\text{定義 2.4 }(i\to p,\ j\to q))\\&=s_{\mathbb{C}}+t_{\mathbb{C}}\qquad(\because s,t\text{ の取り方})\\&=(s,0)+(t,0)\quad(\because\text{定義 1.13 を 2 箇所へ同時に適用})\\&=(s+t,\ 0+0)\quad(\because\text{定義 1.12 の和})\\&=(s+t,\ 0)\qquad(\because\mathbb{R}\text{ で }0+0=0)\\&=(s+t)_{\mathbb{C}}\qquad(\because\text{定義 1.13})\end{aligned}$$

$r:=s+t\in\mathbb{R}$ と取れば $(A+B)_{pq}=r_{\mathbb{C}}$ であり、p,q は任意なので 定義 2.81 の条件が成り立つ。 □

主張 2.85 (成分がすべて実数の行列の差は成分がすべて実数)**.** $m,n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$A,B \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の成分がすべて実数（定義 2.81）とする。このとき $A-B \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$（定義 1.92 の差）の成分もすべて実数である。

証明.

$$\begin{aligned} A-B &= A+(-B) && (\because \text{主張 2.30}) \\ &= A+(-1_{\mathbb{C}})B && (\because \text{主張 2.25 } (A \to B)) \\ &= A+(-1)_{\mathbb{C}}B && (\because \text{定義 1.13 の略記} -1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1)) \end{aligned}$$

である。B の成分はすべて実数なので、主張 2.83（$c \to -1$）より $(-1)_{\mathbb{C}}B$ の成分はすべて実数である。A の成分もすべて実数なので、主張 2.84（$B \to (-1)_{\mathbb{C}}B$）より $A+(-1)_{\mathbb{C}}B$ の成分はすべて実数である。上の鎖より、$A-B$ の成分はすべて実数である。 □

主張 2.86 (成分がすべて実数の行列の有限和は成分がすべて実数)**.** $m,n,r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$X_1,\ldots,X_r \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ の成分がすべて実数（定義 2.81）とする。このとき $\sum_{j=1}^{r} X_j \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$（定義 2.5 の有限和）の成分もすべて実数である。

証明. r についての帰納法で示す。$r=1$ のとき

$$\sum_{j=1}^{1} X_j = X_1 \qquad (\because \text{定義 2.5})$$

であり、X_1 の成分はすべて実数である（仮定）。r で成り立つと仮定し、成分がすべて実数の $X_1,\ldots,X_{r+1} \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$ を取る。

$$\sum_{j=1}^{r+1} X_j = \Big(\sum_{j=1}^{r} X_j\Big) + X_{r+1} \qquad (\because \text{定義 2.5})$$

である。帰納法の仮定より $\sum_{j=1}^{r} X_j$ の成分はすべて実数で、X_{r+1} の成分もすべて実数（仮定）なので、主張 2.84（$A \to \sum_{j=1}^{r} X_j,\ B \to X_{r+1}$）より $\sum_{j=1}^{r+1} X_j$ の成分はすべて実数である。 □

主張 2.87 (成分がすべて実数の行列の積は成分がすべて実数)**.** $m,n,p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$A \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$B \in \mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ の成分がすべて実数（定義 2.81）とする。このとき $AB \in \mathrm{Mat}(m,p,\mathbb{C})$（定義 1.6 の積）の成分もすべて実数である。

証明. $i \in \{1,\ldots,m\}$、$k \in \{1,\ldots,p\}$ を任意に取る。仮定（定義 2.81）から、各 $j \in \{1,\ldots,n\}$ について $A_{ij} = (s_j)_{\mathbb{C}}$ を満たす $s_j \in \mathbb{R}$ と、$B_{jk} = (t_j)_{\mathbb{C}}$ を満たす $t_j \in \mathbb{R}$ がある。

$$\begin{aligned} (AB)_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}B_{jk} && (\because \text{定義 1.6}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} (s_j)_{\mathbb{C}}\,(t_j)_{\mathbb{C}} && (\because s_j, t_j \text{ の取り方}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} (s_jt_j)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29 } (a \to s_j,\ b \to t_j) \text{ を } n \text{ 個の項へ同時に適用}) \\ &= \Big(\sum_{j=1}^{n} s_jt_j\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.20 } (m \to n,\ r_j \to s_jt_j)) \end{aligned}$$

であり、$\sum_{j=1}^{n} s_jt_j \in \mathbb{R}$（定義 1.19）である。$i,k$ は任意なので 定義 2.81 の条件が成り立つ。 □

定理 2.88 (クロネッカー積がつくる基底)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、記号は 定義 2.72 のものとする。$\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の行列単位を E_{ij} ((i,j) 成分が 1 で他の成分が 0、$i,j \in \{1,2\}$)、$\mathbb{C}^2$ の標準基底を $e_1 = (1,0),\ e_2 = (0,1)$ とする。$I = (i_1,\dots,i_M),\ J = (j_1,\dots,j_M) \in \mathcal{I}_M$ について

$$E_{I,J} := E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M} \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}), \qquad f_I := e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M} \in \mathbb{C}^{2^M}$$

とおく。次が成り立つ。

- (1) 族 $(E_{I,J})_{I,J\in\mathcal{I}_M}$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。特に $\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}) = 4^M$。
- (2) $\mathcal{B} = \{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ を $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の任意の $\mathbb{C}$-基底とするとき、多重添字 $(a_1,\dots,a_M) \in \{1,2,3,4\}^M$ で添字づけられた 4^M 個の元からなる族 $(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M})_{(a_1,\dots,a_M)\in\{1,2,3,4\}^M}$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。
- (3) $\{u_1,u_2\}$ を $\mathbb{C}^2$ の任意の $\mathbb{C}$-基底とするとき、族 $(u_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes u_{a_M})_{(a_1,\dots,a_M)\in\{1,2\}^M}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ の $\mathbb{C}$-基底である。特に $(f_I)_{I\in\mathcal{I}_M}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底であり $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M} = 2^M$。

(1)(2) は 2^M 次の複素正方行列全体 $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の基底についての主張、(3) は 2^M 次元数ベクトル空間 $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底についての主張である。

証明. Step 1: (3) の特別な場合（標準基底)。$(e_i)_t = \delta_{it}$ であるから、$K = (k_1,\dots,k_M) \in \mathcal{I}_M$ について

$$\begin{aligned}
(f_I)_{\nu(K)} &= \prod_{k=1}^{M} (e_{i_k})_{k_k} && (\because \text{定義 2.72 のクロネッカー積の成分の定め方}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \delta_{i_k k_k} && (\because (e_i)_t = \delta_{it}) \\
&= \begin{cases} 1 & (I = K) \\ 0 & (I \neq K) \end{cases} && (\because I = K \text{ ならばどの因子も1、} I \neq K \text{ ならば} i_k \neq k_k \text{ となる} k \text{ があってその因子が0})
\end{aligned}$$

すなわち f_I は第 $\nu(I)$ 成分だけが 1 で他が 0 の数ベクトル、つまり $\mathbb{C}^{2^M}$ の標準基底ベクトルである。ν が全単射だから $(f_I)_{I\in\mathcal{I}_M}$ は標準基底全体と一致し、これは $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底である（任意の $w = (w_1,\dots,w_{2^M})$ は $w = \sum_{p=1}^{2^M} w_p$ (第p 標準基底ベクトル) と成分比較で一意に書ける)。特に $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M} = 2^M$。

Step 2: (1)。同様に $(E_{ij})_{st} = \delta_{is}\delta_{jt}$ であるから、$K,L \in \mathcal{I}_M$ について

$$\begin{aligned}
(E_{I,J})_{\nu(K),\nu(L)} &= \prod_{k=1}^{M} (E_{i_k j_k})_{k_k l_k} && (\because \text{定義 2.72 のクロネッカー積の成分の定め方}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \delta_{i_k k_k}\delta_{j_k l_k} && (\because (E_{ij})_{st} = \delta_{is}\delta_{jt}) \\
&= \begin{cases} 1 & (I = K \text{ かつ} J = L) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases} && (\because I = K \text{ かつ} J = L \text{ ならばどの因子も1、そうでなければ0 となる因子がある})
\end{aligned}$$

すなわち $E_{I,J}$ は $(\nu(I),\nu(J))$ 成分だけが 1 で他が 0 の 2^M 次行列（$\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の行列単位）である。ν が全単射だから $(E_{I,J})_{I,J\in\mathcal{I}_M}$ は 2^M 次の行列単位全体と一致する。任意の $A = (a_{pq}) \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ は成分比較により $A = \sum_{p,q=1}^{2^M} a_{pq}$ (第(p,q) 行列単位) と一意に書けるから、これは基底であり、元数は $2^M \cdot 2^M = 4^M$。よって $\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}) = 4^M$。

Step 3: 有限次元線型空間についての 2 つの事実。以下で次を使う。

- (a) d 次元 $\mathbb{C}$-線型空間を張る有限族の元数は d 以上である。

- (b) したがって、d 次元 $\mathbb{C}$-線型空間を張る、ちょうど d 個の元からなる族は基底である。実際、線型独立でなければ、ある元が他の元の線型結合になり、その元を除いた $d-1$ 個の族がなお全体を張るので (a) に反する。

Step 4: (2)。$\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_4\}$ は $\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の基底だから、各行列単位 E_{ij}（$i, j \in \{1, 2\}$）は

$$E_{ij} = \sum_{a=1}^{4} d_a^{(ij)}\, b_a \qquad (d_a^{(ij)} \in \mathbb{C})$$

と書ける。$I, J \in \mathcal{I}_M$ を固定し、$E_{I,J} = E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M}$ の第 1 因子から順にこの展開を代入する。主張 2.74 を第 j 因子に適用する操作を $j = 1, 2, \dots, M$ と繰り返す（j についての帰納法）と、

$$E_{I,J} = \sum_{(a_1,\dots,a_M) \in \{1,2,3,4\}^M} \left(\prod_{k=1}^{M} d_{a_k}^{(i_k j_k)} \right) (b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M}) \quad (\because \text{各因子についての線型性})$$

を得る（各段階で和の項数が 4 倍になり、M 段階で 4^M 項になる）。よって $E_{I,J}$ は族 $(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M})$ の $\mathbb{C}$-線型結合である。Step 2 より $(E_{I,J})$ は $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を張るから、$(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M})$ も $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を張る（既知の基底の各元がこの候補族の線型結合で書けるので、既知の基底が張る空間は候補族が張る空間に含まれる）。この族の元数は $\#\{1,2,3,4\}^M = 4^M$ であり、Step 2 より $\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = 4^M$ であるから、Step 3 (b) よりこの族は基底である。

Step 5: (3) の一般の基底の場合。Step 4 とまったく同じ議論を、$e_i = \sum_{a=1}^{2} d_a^{(i)} u_a$、主張 2.74 の数ベクトル版、Step 1 の (f_I) が $\mathbb{C}^{2^M}$ を張ること、$\#\{1,2\}^M = 2^M = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M}$ に対して行えばよい。 □

主張 2.89 ($c \cdot I$ は全行列と可換)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c \in \mathbb{C}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、

$$[c \cdot I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})},\, A] = O$$

行列積は 定義 1.6、交換子は 主張 1.91、単位行列 $I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ は 定義 2.2、スカラー倍は 定義 2.3、差は 定義 1.92、零行列 $O \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ は 定義 1.93 の定義を用いる。

証明. 以下 $I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ と書く。

$$\begin{aligned}
[c \cdot I,\, A] &= (c \cdot I)A - A(c \cdot I) && (\because \text{交換子の定義主張 1.91}) \\
&= c(IA) - A(c \cdot I) && (\because \text{主張 2.18}) \\
&= c(IA) - c(AI) && (\because \text{主張 2.19}) \\
&= cA - c(AI) && (\because \text{主張 2.16}) \\
&= cA - cA && (\because \text{主張 2.17}) \\
&= O && (\because \text{主張 1.95 の } \Leftarrow \text{ を } cA = cA \text{ へ適用})
\end{aligned}$$

□

主張 2.90 ($\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の中で全元と可換な元はスカラー)**.** 行列単位の成分積は 定義 1.6、複素係数の演算は 主張 1.56 による。

$M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。$W \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ が、すべての $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について $Wx = xW$ を満たすならば、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して $W = c \cdot I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$ が成り立つ。

証明. Step 1: $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の行列単位。$\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の行列単位を

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ に対し

$$A = a_{11}E_{11} + a_{12}E_{12} + a_{21}E_{21} + a_{22}E_{22} \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つので $\mathcal{E}_0 := \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ を張り、$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{E}_0$ であるから $\mathcal{E}_0$ は基底である。成分計算により、$i,j,k,l \in \{1,2\}$ について

$$E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il} \quad (\because \text{行列の積の成分計算})$$

（δ_{jk} は Kronecker のデルタ）。特に $E_{11} + E_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$。多重添字 $I = (i_1, \ldots, i_M),\ J = (j_1, \ldots, j_M) \in \{1,2\}^M$ について $E_{IJ} := E_{i_1 j_1} \boxtimes E_{i_2 j_2} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M} \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ とおく（定義 2.72 のクロネッカー積。これは 2^M 次の複素行列である）。$\mathcal{E} := \{E_{IJ} : I, J \in \{1,2\}^M\}$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の基底である（定理 2.88 (1)）。その元数は $\#\mathcal{E} = (2^M)^2 = 4^M$。

Step 2: 行列単位 E_{IJ} の積公式。$I, J, K, L \in \{1,2\}^M$ について、主張 2.73 (1)、主張 2.74 と Step 1 より

$$\begin{aligned}
E_{IJ}E_{KL} &= (E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M})(E_{k_1 l_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{k_M l_M}) \\
&= (E_{i_1 j_1}E_{k_1 l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{i_M j_M}E_{k_M l_M}) && (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= (\delta_{j_1 k_1}E_{i_1 l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\delta_{j_M k_M}E_{i_M l_M}) && (\because E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}) \\
&= \left(\prod_{r=1}^{M} \delta_{j_r k_r}\right) E_{IL} && (\because \text{各因子についての線型性を} M \text{ 回})
\end{aligned}$$

$\delta_{JK} := \prod_{r=1}^{M} \delta_{j_r k_r}$ とおくと、これは $J = K$ のとき 1、そうでなければ 0 であるから $E_{IJ}E_{KL} = \delta_{JK}E_{IL}$。また各因子に $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}$ を代入して展開すると

$$\begin{aligned}
I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} &= I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} && (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (2) を右辺から左辺へ}) \\
&= (E_{11} + E_{22}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{11} + E_{22}) && (\because I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}) \\
&= \sum_{P=(p_1,\ldots,p_M) \in \{1,2\}^M} E_{p_1 p_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{p_M p_M} && (\because \text{各因子についての線型性を} M \text{ 回}) \\
&= \sum_{P \in \{1,2\}^M} E_{PP} && (\because E_{PP} \text{ の定め方})
\end{aligned}$$

（引いたのは 主張 2.73 (2) と 主張 2.74 である）。

Step 3: W を行列単位で展開し、可換性から係数を決定する。$\mathcal{E}$ は基底であるから W は一意に $W = \sum_{I,J \in \{1,2\}^M} w_{IJ}E_{IJ}$（$w_{IJ} \in \mathbb{C}$）と展開できる。仮定より各 E_{KL} について $WE_{KL} = E_{KL}W$。左辺は

$$\begin{aligned}
WE_{KL} &= \left(\sum_{I,J} w_{IJ}E_{IJ}\right) E_{KL} && (\because W \text{ の基底}\mathcal{E} \text{ による展開}) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}(E_{IJ}E_{KL}) && (\because \text{積の双線型性}) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}\delta_{JK}E_{IL} && (\because \text{Step 2 の積公式}) \\
&= \sum_{I \in \{1,2\}^M} w_{IK}E_{IL} && (\because \delta_{JK} \text{ は} J = K \text{ でのみ非零})
\end{aligned}$$

右辺は

$$
\begin{aligned}
E_{KL}W &= E_{KL}\left(\sum_{I,J} w_{IJ}E_{IJ}\right) && (\because W \text{ の基底}\mathcal{E} \text{ による展開})\\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}(E_{KL}E_{IJ}) && (\because \text{積の双線型性})\\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}\delta_{LI}E_{KJ} && (\because \text{Step 2 の積公式})\\
&= \sum_{J\in\{1,2\}^M} w_{LJ}E_{KJ} && (\because \delta_{LI} \text{ は} I=L \text{ でのみ非零})
\end{aligned}
$$

$\mathcal{E}$ は基底であるから両辺の係数は一致する。任意に $P,Q\in\{1,2\}^M$ を固定し E_{PQ} の係数を比較する。

場合 1: $Q=L$ かつ $P=K$ のとき。左辺で E_{PL} の係数は $w_{PK}=w_{KK}$、右辺で E_{KQ} の係数は $w_{LQ}=w_{LL}$ であるから $w_{KK}=w_{LL}$。これは任意の K,L で成立するから対角係数は K によらない定数 $c:=w_{KK}$ である。

場合 2: $K\neq L$ とし $P=K$, $Q=K$ のとき（E_{KK} の係数比較)。第 2 添字が $K\neq L$ なので左辺に E_{KK} は現れず係数は 0、右辺で E_{KK} の係数は w_{LK} であるから $w_{LK}=0$。すなわち $I\neq J$ なる非対角係数 w_{IJ} はすべて 0。

Step 4: 結論。

$$
\begin{aligned}
W &= \sum_{I,J\in\{1,2\}^M} w_{IJ}E_{IJ} && (\because \text{Step 3 の} W \text{ の基底}\mathcal{E} \text{ による展開})\\
&= \sum_{P\in\{1,2\}^M} w_{PP}E_{PP} && (\because \text{Step 3: 非対角係数は0})\\
&= \sum_{P\in\{1,2\}^M} c\,E_{PP} && (\because \text{Step 3: 対角係数は共通の} c)\\
&= c\sum_{P\in\{1,2\}^M} E_{PP} && (\because \text{和のスカラー倍})\\
&= c\cdot I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} && \left(\because I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}=\sum_{P\in\{1,2\}^M} E_{PP}\right)
\end{aligned}
$$

□

定義 2.91 (数ベクトル・行列のノルムと収束)**.** $K:=\mathbb{R}$ または $K:=\mathbb{C}$、$d,n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

$|\cdot|:K\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ を、$K=\mathbb{R}$ のときは実数の絶対値、$K=\mathbb{C}$ のときは 定義 1.74 の絶対値とする（主張 1.75 (6) より、$\mathbb{R}$ を $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$（定義 1.13）で $\mathbb{C}$ に埋め込んだとき両者は一致する)。

$w=(w_1,\dots,w_d)\in K^d$ のノルムを

$$
\|w\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{d}|w_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \qquad \in\mathbb{R}_{\geq 0}
$$

と定める。また $A=(a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}\in\mathrm{Mat}(n,K)$ のノルムを

$$
\|A\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \qquad \in\mathbb{R}_{\geq 0}
$$

と定める（いずれも根号の中は非負実数の有限和なので 定義 1.4 により定まる)。

$\mathrm{Mat}(n,K)$ の列 $(A_N)_{N\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ と $A\in\mathrm{Mat}(n,K)$ について、

$$A_N \to A \overset{\text{def}}{\iff} \|A_N - A\| \to 0 \ (N \to \infty)$$

と定める（右辺は実数列 $(\|A_N - A\|)_N$ の 0 への収束）。このとき A を (A_N) の極限といい $A = \lim_{N\to\infty} A_N$ と書く。さらに $B_0, B_1, \cdots \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、部分和 $S_N := \sum_{m=0}^{N} B_m$ が S に収束するとき

$$\sum_{m=0}^{\infty} B_m := S$$

と書く。

K^d の列の収束も同様に $\|w_N - w\| \to 0$ で定める。K の列 $(a_N)_{N\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ と $a \in K$ についても、$a_N \to a$ を実数列の収束 $|a_N - a| \to 0$ で定める。

主張 2.92 (ノルムの基本性質（非退化性・斉次性・三角不等式）)**.** 定義 2.91 のノルムについて、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$、$c \in K$ に対して次が成り立つ。

- (1) $\|A\| \geq 0$ であり、$\|A\| = 0 \iff A = O$（O は零行列）。
- (2) $\|cA\| = |c|\,\|A\|$。
- (3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$。
- (4) 定義 2.91 の意味での極限は、存在すれば一意である。すなわち $A_N \to A$ かつ $A_N \to A'$ ならば $A = A'$。

K^d のノルムについても同じ 4 つが成り立つ（証明は成分の添字を 1 重にするだけで同一）。

証明. 以下、$A = (a_{ij})$、$B = (b_{ij})$ とおき、和は $1 \leq i, j \leq n$ の全体にわたるものとする。

Step 0: 補題（非負実数の平方の単調性）。$u, v \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について

$$u \leq v \iff u^2 \leq v^2$$

が成り立つ。実際、$u \leq v$ ならば

$$\begin{aligned} u^2 &= u \cdot u && (\because \text{ 平方の定義}) \\ &\leq v \cdot u && (\because\ u \leq v,\ u \geq 0) \\ &\leq v \cdot v && (\because\ u \leq v,\ v \geq 0) \\ &= v^2 && (\because \text{ 平方の定義}) \end{aligned}$$

である。逆に $u > v\ (\geq 0)$ ならば $u > 0$ であり、

$$\begin{aligned} u^2 &= u \cdot u && (\because \text{ 平方の定義}) \\ &> v \cdot u && (\because\ u > v,\ u > 0) \\ &\geq v \cdot v && (\because\ u > v,\ v \geq 0) \\ &= v^2 && (\because \text{ 平方の定義}) \end{aligned}$$

であるから、対偶により $u^2 \leq v^2 \Rightarrow u \leq v$。特に $u^2 = v^2 \Rightarrow u = v$。

Step 1: 絶対値の性質。$z, w \in K$ について

$$|z| \geq 0, \qquad |zw| = |z|\,|w|, \qquad |z + w| \leq |z| + |w|, \qquad (|z| = 0 \iff z = 0)$$

が成り立つ。$K = \mathbb{C}$ のときは 主張 1.75 (3)(4)(5) と 定義 1.74（値域が $\mathbb{R}_{\geq 0}$）による。$K = \mathbb{R}$ のときは、定義 1.13 の $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$ が和と積を保つこと

$$\begin{aligned}\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)+\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y)&=(x,0)+(y,0) && (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ の定め方})\\ &=(x+y,0) && (\because \text{複素数の和の定め方})\\ &=\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x+y) && (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ の定め方})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)\cdot\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y)&=(x,0)\cdot(y,0) && (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ の定め方})\\ &=(xy-0\cdot 0,\ x\cdot 0+0\cdot y) && (\because \text{複素数の積の定め方})\\ &=(xy,0) && (\because 0 \text{ を掛けた項が消えること})\\ &=\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(xy) && (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ の定め方})\end{aligned}$$

と 主張 1.75 (6) を組み合わせて同じ 4 つの性質が従う。たとえば $x,y\in\mathbb{R}$ について $|x+y|=|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x+y)|=|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)+\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y)|\le|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)|+|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y)|=|x|+|y|$ であり、乗法性・非負性・非退化性も同様である。

Step 2: (1)。定義 1.4 より $\|A\|\ge 0$。また Step 0 より $\|A\|=0$ と $\|A\|^2=0$ は同値であり、

$$\|A\|^2=\sum_{i,j}|a_{ij}|^2$$

は非負実数の有限和であるから、$\|A\|^2=0$ と「すべての i,j について $|a_{ij}|^2=0$」は同値（非負数の有限和が 0 ならば各項が 0、逆も明らか)。Step 1 より $|a_{ij}|=0\iff a_{ij}=0$ であるから $\|A\|=0\iff A=O$。

Step 3: (2)。Step 1 の乗法性より、

$$\begin{aligned}\|cA\|^2&=\sum_{i,j}|c\,a_{ij}|^2 && (\because \text{ノルムの定め方と}(cA)_{ij}=c\,a_{ij})\\ &=\sum_{i,j}(|c|\,|a_{ij}|)^2 && (\because \text{Step 1 の乗法性}|zw|=|z||w|)\\ &=\sum_{i,j}|c|^2\,|a_{ij}|^2 && (\because \text{積の平方は平方の積})\\ &=|c|^2\sum_{i,j}|a_{ij}|^2 && (\because \text{有限和についての分配律})\\ &=|c|^2\,\|A\|^2 && (\because \text{ノルムの定め方})\\ &=(|c|\,\|A\|)^2 && (\because \text{積の平方は平方の積})\end{aligned}$$

$\|cA\|\ge 0$ かつ $|c|\,\|A\|\ge 0$ であるから Step 0 より $\|cA\|=|c|\,\|A\|$。

Step 4: 有限列に対する Cauchy–Schwarz の不等式。$m\in\mathbb{Z}_{\ge 1}$、$u_1,\dots,u_m,v_1,\dots,v_m\in\mathbb{R}$ について

$$\left(\sum_{k=1}^m u_kv_k\right)^2\le\left(\sum_{k=1}^m u_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^m v_k^2\right)$$

が成り立つ。実際 $P:=\sum_k u_k^2$, $Q:=\sum_k v_k^2$, $R:=\sum_k u_kv_k$ とおく。$Q=0$ のときは非負数の有限和が 0 であることから各 $v_k^2=0$ すなわち $v_k=0$ となり $R=0$ であるから $R^2=0=PQ$。$Q>0$ のときは、任意の $t\in\mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}0&\le\sum_{k=1}^m(u_k-tv_k)^2 && (\because \text{実数の平方は非負であり、非負数の有限和は非負})\\ &=\sum_{k=1}^m\left(u_k^2-2tu_kv_k+t^2v_k^2\right) && (\because \text{分配律})\\ &=P-2tR+t^2Q && (\because P,\ Q,\ R \text{ の置き方と有限和の分解})\end{aligned}$$

であるから、$t := R/Q$ とおくと

$$\begin{aligned} 0 &\le P - 2\frac{R}{Q}R + \left(\frac{R}{Q}\right)^2 Q && (\because \text{上の不等式に} t = R/Q \text{ を代入した}) \\ &= P - 2\frac{R^2}{Q} + \frac{R^2}{Q} && (\because Q > 0 \text{ による約分}) \\ &= P - \frac{R^2}{Q} && (\because \text{同類項をまとめた}) \end{aligned}$$

となる。したがって

$$\begin{aligned} R^2 &= \frac{R^2}{Q} \cdot Q && (\because Q > 0 \text{ と} \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &\le P \cdot Q && (\because \text{直前の} 0 \le P - R^2/Q \text{ の移項による} R^2/Q \le P \text{ と、両辺に正の数} Q \text{ を掛けても順序が保たれること}) \end{aligned}$$

を得る。すなわち $R^2 \le PQ$。

Step 5: (3)。Step 1 の三角不等式と Step 0 より、各 i, j について $|a_{ij} + b_{ij}| \le |a_{ij}| + |b_{ij}|$ であり、両辺とも非負なので

$$\begin{aligned} |a_{ij} + b_{ij}|^2 &\le (|a_{ij}| + |b_{ij}|)^2 && (\because \text{Step 0 を} u = |a_{ij} + b_{ij}|,\ v = |a_{ij}| + |b_{ij}| \text{ に当てた}) \\ &= |a_{ij}|^2 + 2|a_{ij}||b_{ij}| + |b_{ij}|^2 && (\because \text{分配律}) \end{aligned}$$

これを i, j について加えると、

$$\begin{aligned} \|A + B\|^2 &= \sum_{i,j} |a_{ij} + b_{ij}|^2 && (\because \text{ノルムの定め方と} (A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}) \\ &\le \sum_{i,j} \left(|a_{ij}|^2 + 2|a_{ij}||b_{ij}| + |b_{ij}|^2\right) && (\because \text{上の各項ごとの不等式を} i, j \text{ について加えた}) \\ &= \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 + 2\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| + \sum_{i,j} |b_{ij}|^2 && (\because \text{有限和の分解と分配律}) \\ &= \|A\|^2 + 2\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| + \|B\|^2 && (\because \text{ノルムの定め方}) \end{aligned}$$

ここで Step 4 を $m = n^2$ 個の添字 (i, j) について $u_{(i,j)} = |a_{ij}|,\ v_{(i,j)} = |b_{ij}|$ として適用すると

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}|\right)^2 &\le \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)\left(\sum_{i,j} |b_{ij}|^2\right) && (\because \text{Step 4}) \\ &= \|A\|^2 \|B\|^2 && (\because \text{ノルムの定め方}) \\ &= (\|A\|\,\|B\|)^2 && (\because \text{積の平方は平方の積}) \end{aligned}$$

である。また

$$\begin{aligned} 0 &\le \sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| && (\because \text{非負実数の有限和は非負}) \\ 0 &\le \|A\|\,\|B\| && (\because \text{ノルムは非負であり、非負実数の積は非負}) \\ \sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| &\le \|A\|\,\|B\| && (\because \text{直前の平方の不等式と Step 0}) \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}\|A+B\|^2 &\le \|A\|^2 + 2\sum_{i,j}|a_{ij}||b_{ij}| + \|B\|^2 \quad (\because \text{上の式変形})\\ &\le \|A\|^2 + 2\|A\|\,\|B\| + \|B\|^2 \qquad (\because \sum_{i,j}|a_{ij}||b_{ij}| \le \|A\|\,\|B\|)\\ &= (\|A\| + \|B\|)^2 \qquad (\because \text{分配律})\end{aligned}$$

となり、両辺の平方根をとる（Step 0、$\|A+B\| \ge 0$、$\|A\|+\|B\| \ge 0$）ことで $\|A+B\| \le \|A\|+\|B\|$ を得る。

Step 6: (4)。$A_N \to A$ かつ $A_N \to A'$ とする。各 N について $A - A' = (A - A_N) + (A_N - A')$ であるから、Step 5 より

$$\begin{aligned}0 &\le \|A - A'\| && (\because (1))\\ &\le \|A - A_N\| + \|A_N - A'\| && (\because \text{Step 5 を} A - A' = (A - A_N) + (A_N - A') \text{ に当てた})\\ &= \|A_N - A\| + \|A_N - A'\| && (\because\ A - A_N = (-1)(A_N - A) \text{ と Step 3（}c = -1\text{）、および} |-1| = 1 (K = \mathbb{C} \text{ のときは主張 1.75 (6) より} |-1_{\mathbb{C}}| = |-1| = 1)\ )\end{aligned}$$

右辺は $N \to \infty$ で 0 に収束する実数列であり、左辺の $\|A - A'\|$ は N によらない定数である。非負の定数が 0 に収束する列で上から抑えられるならその定数は 0 であるから $\|A - A'\| = 0$、Step 2 より $A - A' = O$ すなわち $A = A'$。

Step 7: K^d の場合。上の Step 2・Step 3・Step 5・Step 6 で添字の組 (i, j) を単一の添字 i に置き換えれば、同じ議論がそのまま通用する。 □

主張 2.93 (行列ノルムの劣乗法性)**.** 行列積の成分式は 定義 1.6、非負実数の平方根は 定義 1.4 を用いる。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、

$$\|AB\| \le \|A\| \cdot \|B\|$$

ここで $\|\cdot\|$ は 定義 2.91 のノルムである。

証明. $A = (a_{ij})_{1\le i,j\le n}$、$B = (b_{ij})_{1\le i,j\le n}$ とおく。行列の積の定義より $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$ である。

Step 1: 有限和の三角不等式。$m \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$z_1, \ldots, z_m \in K$ について

$$\left|\sum_{k=1}^{m} z_k\right| \le \sum_{k=1}^{m} |z_k|$$

が成り立つ。m に関する帰納法で示す。$m = 1$ のときは両辺とも $|z_1|$ で等号成立。m で成り立つと仮定すると、主張 2.92 の Step 1（絶対値の三角不等式）より

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^{m+1} z_k\right| &= \left|\left(\sum_{k=1}^{m} z_k\right) + z_{m+1}\right|\\ &\le \left|\sum_{k=1}^{m} z_k\right| + |z_{m+1}| \qquad (\because \text{主張 2.92 の Step 1})\\ &\le \sum_{k=1}^{m} |z_k| + |z_{m+1}| \qquad (\because \text{帰納法の仮定})\\ &= \sum_{k=1}^{m+1} |z_k| \qquad (\because \text{有限和の末項の吸収})\end{aligned}$$

Step 2: 各成分の評価。$1 \le i, j \le n$ を固定する。Step 1 と絶対値の乗法性（主張 2.92 の Step 1）より

$$
\begin{aligned}
|(AB)_{ij}| &= \left|\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}\right| && (\because \text{ 行列の積の定義}) \\
&\leq \sum_{k=1}^{n} |a_{ik}b_{kj}| && (\because \text{ Step 1}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|\,|b_{kj}| && (\because \text{ 絶対値の乗法性})
\end{aligned}
$$

である。ここから、主張 2.92 の Step 0（非負実数の平方の単調性）と Step 4（Cauchy–Schwarz の不等式）により

$$
\begin{aligned}
|(AB)_{ij}|^2 &\leq \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|\,|b_{kj}|\right)^2 && (\because \text{ 直前の評価と主張 2.92 の Step 0}) \\
&\leq \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} |b_{kj}|^2\right) && (\because \text{ 主張 2.92 の Step 4 を} u_k = |a_{ik}|,\ v_k = |b_{kj}| \text{ として適用}) \\
&= \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{l=1}^{n} |b_{lj}|^2\right) && (\because \text{ 第 2 因子の和の添字の付け替え})
\end{aligned}
$$

Step 3: 全成分についての和。Step 2 の不等式を $1 \leq i, j \leq n$ について加えると、右辺の第 1 因子は i のみ、第 2 因子は j のみに依存するので二重和が積に分解して、

$$
\begin{aligned}
\|AB\|^2 &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |(AB)_{ij}|^2 && (\because \text{ } \|\cdot\| \text{ の定義と} \left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = a) \\
&\leq \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{l=1}^{n} |b_{lj}|^2\right) && (\because \text{ Step 2}) \\
&= \left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} |b_{lj}|^2\right) && (\because \text{ 有限和の分配律}) \\
&= \|A\|^2\,\|B\|^2 && (\because \text{ } \|\cdot\| \text{ の定義と} \left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = a) \\
&= (\|A\| \cdot \|B\|)^2 && (\because \text{ 非負実数の積の平方} (xy)^2 = x^2y^2)
\end{aligned}
$$

Step 4: 結論。$\|AB\| \geq 0$ かつ $\|A\| \cdot \|B\| \geq 0$ であるから、主張 2.92 の Step 0 より

$$
\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \qquad (\because \text{ 主張 2.92 の Step 0 を Step 3 の平方の不等式へ適用})
$$

□

主張 2.94 (行列ノルムによる数ベクトルの評価)**.** 行列と数ベクトルの積は 定義 1.6、零成分の絶対値は 主張 2.92 の証明冒頭、積のノルムの評価は 主張 2.93 による。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, K)$、$w \in K^n$ について、

$$
\|Aw\| \leq \|A\| \cdot \|w\|
$$

ここで $\|\cdot\|$ は 定義 2.91 のノルム（左辺と右辺第 2 因子は K^n のノルム、右辺第 1 因子は $\mathrm{Mat}(n, K)$ のノルム）である。

証明. $w = (w_1, \ldots, w_n)$ に対し、第 1 列が w、第 2 列以降が 0 である行列 $W \in \mathrm{Mat}(n, K)$ を

$$W_{i1} := w_i \quad (1 \leq i \leq n), \qquad W_{ij} := 0 \quad (1 \leq i \leq n,\ 2 \leq j \leq n)$$

で定める。第 1 列の成分は

$$\begin{aligned}
(AW)_{i1} &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} W_{k1} && (\because \text{ 行列の積の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} w_k && (\because \ W \text{ の第 1 列の定め方}) \\
&= (Aw)_i && (\because \text{ 行列と数ベクトルの積の定義})
\end{aligned}$$

であり、$2 \leq j \leq n$ について第 j 列の成分は

$$\begin{aligned}
(AW)_{ij} &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} W_{kj} && (\because \text{ 行列の積の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot 0 && (\because \ W \text{ の第 2 列以降の定め方}) \\
&= 0 && (\because \ 0 \text{ を掛けた項だけの有限和は } 0)
\end{aligned}$$

である。これを使って

$$\begin{aligned}
\|AW\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |(AW)_{ij}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ ノルムの定義。定義 2.91}) \\
&= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |(AW)_{i1}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \ |0| = 0 \text{（ノルムの基本性質の Step 1。主張 2.92）なので第 2 列以降は平方和に寄与しない}) \\
&= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |(Aw)_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 上の第 1 列の成分の等式}) \\
&= \|Aw\| && (\because \text{ ノルムの定義。定義 2.91})
\end{aligned}$$

、および

$$\begin{aligned}
\|W\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |W_{ij}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ ノルムの定義。定義 2.91}) \\
&= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |W_{i1}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \ |0| = 0 \text{（ノルムの基本性質の Step 1。主張 2.92）なので第 2 列以降は平方和に寄与しない}) \\
&= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |w_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \ W \text{ の第 1 列の定め方}) \\
&= \|w\| && (\because \text{ ノルムの定義。定義 2.91})
\end{aligned}$$

を得る。したがって

$$\begin{aligned}
\|Aw\| &= \|AW\| && (\because \text{ 上の第 1 の等式}) \\
&\leq \|A\| \cdot \|W\| && (\because \text{ 行列ノルムの劣乗法性。主張 2.93}) \\
&= \|A\| \cdot \|w\| && (\because \text{ 上の第 2 の等式})
\end{aligned}$$

である。 □

主張 2.95 ($\mathrm{Mat}(n,K)$ の完備性と絶対収束判定)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 2.91 のものとする。

- (1)（完備性）$(A_N)_{N\geq 0}$ を $\mathrm{Mat}(n,K)$ の列とし、Cauchy 列である、すなわち $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0},\ \exists N_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ s.t. $\forall N, M \geq N_0,\ \|A_N - A_M\| < \varepsilon$ とする。このとき $A \in \mathrm{Mat}(n,K)$ が存在して $A_N \to A$。
- (2)（絶対収束判定）$B_0, B_1, \cdots \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について実数列の級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$ が収束するならば $\sum_{m=0}^{\infty} B_m$ は $\mathrm{Mat}(n,K)$ において収束し、$\|\sum_{m=0}^{\infty} B_m\| \leq \sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$。

証明. Step 1: 成分はノルムで抑えられる。$A = (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}(n,K)$ と $1 \leq i, j \leq n$ について

$$\begin{aligned} |a_{ij}|^2 &\leq \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} |a_{kl}|^2 \quad (\because \text{非負項の有限和は各項以上}) \\ &= \|A\|^2 \qquad\qquad (\because \text{行列ノルムの定義}) \end{aligned}$$

であり、$|a_{ij}| \geq 0$、$\|A\| \geq 0$ であるから 主張 2.92 の Step 0 より次の一段を得る。

$$|a_{ij}| \leq \|A\| \quad (\because \text{直前の平方の評価と非負実数の平方の単調性})$$

Step 2: K の Cauchy 列は収束する。$K = \mathbb{R}$ のときは $\mathbb{R}$ の完備性そのものである。$K = \mathbb{C}$ のとき、$z = (x, y) \in \mathbb{C}$ について 主張 1.75 (2) より、次の一続きの評価を得る。

$$\begin{aligned} |z|^2 = x^2 + y^2 &\quad (\because \text{複素数の絶対値の平方}) \\ \geq x^2 &\quad (\because y^2 \geq 0) \\ = |x|^2 &\quad (\because \text{実数の絶対値の定義}) \end{aligned}$$

最後の等号は実数の絶対値の定義 $|x| \in \{x, -x\}$ による。主張 2.92 の Step 0 より $|x| \leq |z|$、同様に $|y| \leq |z|$。主張 1.56 より $\mathbb{C}$ の加法とその逆元は成分ごとである。いま示した評価を $z = z_N - z_M$ に適用すると

$$\begin{aligned} z_N - z_M = (x_N - x_M,\ y_N - y_M) &\quad (\because \mathbb{C} \text{ の減法は成分ごと}) \\ |x_N - x_M| \leq |z_N - z_M| &\quad (\because \text{直前の第 1 成分の評価}) \\ |y_N - y_M| \leq |z_N - z_M| &\quad (\because \text{同じ評価の第 2 成分版}) \end{aligned}$$

よって $\mathbb{C}$ の Cauchy 列 $(z_N) = ((x_N, y_N))$ に対して $(x_N), (y_N)$ は $\mathbb{R}$ の Cauchy 列であり、$\mathbb{R}$ の完備性より $x_N \to x$、$y_N \to y$ なる $x, y \in \mathbb{R}$ が存在する。このとき 主張 1.75 (2) より

$$\begin{aligned} |z_N - (x,y)|^2 = (x_N - x)^2 + (y_N - y)^2 &\quad (\because \text{複素数の絶対値の平方}) \\ \longrightarrow 0 &\quad (\because x_N \to x \text{ と} y_N \to y) \end{aligned}$$

であるから $|z_N - (x,y)| \to 0$（非負実数について $u_N^2 \to 0 \Rightarrow u_N \to 0$。実際 $\varepsilon > 0$ に対し $u_N^2 < \varepsilon^2$ なる N 以降で 主張 2.92 の Step 0 より $u_N < \varepsilon$）。

Step 3: (1) の証明。(A_N) を Cauchy 列とすると、Step 1 より各成分について

$$\begin{aligned} |(A_N)_{ij} - (A_M)_{ij}| = |(A_N - A_M)_{ij}| &\quad (\because \text{ 行列の差は成分ごとである}) \\ \leq \|A_N - A_M\| &\quad (\because \text{ Step 1}) \end{aligned}$$

であるから、$((A_N)_{ij})_N$ は K の Cauchy 列である。Step 2 よりその極限 $a_{ij} \in K$ が存在する。$A := (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}(n,K)$ とおくと

$$\begin{aligned} \|A_N - A\|^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |(A_N)_{ij} - a_{ij}|^2 &\quad (\because \text{行列ノルムの定義}) \\ \longrightarrow 0 &\quad (\because \text{有限個の0 に収束する実数列の和}) \end{aligned}$$

であり、Step 2 末尾と同じ理由で $\|A_N - A\| \to 0$、すなわち $A_N \to A$。

Step 4: (2) の証明。$S_N := \sum_{m=0}^{N} B_m$、$T_N := \sum_{m=0}^{N} \|B_m\|$ とおく。仮定より (T_N) は収束するので Cauchy 列である。$N > M$ のとき 主張 2.92 (3) を繰り返し用いて

$$\begin{aligned}
\|S_N - S_M\| &= \left\| \sum_{m=M+1}^{N} B_m \right\| && (\because\ S_N \text{ と } S_M \text{ の定義と、有限和の差}) \\
&\leq \sum_{m=M+1}^{N} \|B_m\| && (\because\ \text{行列ノルムの三角不等式を繰り返し用いる}) \\
&= T_N - T_M && (\because\ T_N \text{ と } T_M \text{ の定義と、有限和の差})
\end{aligned}$$

であるから (S_N) は Cauchy 列であり、(1) より $S := \lim_{N\to\infty} S_N$ が存在する。すなわち $\sum_{m=0}^{\infty} B_m = S$。

Step 5: ノルムの評価。主張 2.92 (3) より

$$\begin{aligned}
\|S_N\| &\leq T_N && (\because \text{行列ノルムの三角不等式を有限回適用}) \\
&\leq T && (\because \text{非負項の級数の部分和はその極限以下})
\end{aligned}$$

ここで $T := \sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$ である。(T_N) は非負項の級数の部分和なので単調非減少であり $T_N \leq T$。また 主張 2.92 (3) より

$$\begin{aligned}
\|S\| &\leq \|S - S_N\| + \|S_N\| && (\because\ S = (S - S_N) + S_N \text{ と行列ノルムの三角不等式}) \\
&\leq \|S - S_N\| + T && (\because\ \|S_N\| \leq T)
\end{aligned}$$

であり、右辺第 1 項は $N \to \infty$ で 0 に収束する。$\|S\|$ は N によらない定数であるから $\|S\| \leq T$。 □

主張 2.96 (行列乗算の連続性)**.** ノルムと収束は 定義 2.91、行列積は 定義 1.6、積のノルムの評価は 主張 2.93 による。$(A_N)_{N\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ は以下の行列空間の列とする。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A_N, A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$、$\|A_N - A\| \to 0$ のとき、

$$\|A_N B - AB\| \to 0$$

証明.

$$\begin{aligned}
\|A_N B - AB\| &= \|(A_N - A)B\| && (\because\ \text{行列の積の右分配則}) \\
&\leq \|A_N - A\| \cdot \|B\| && (\because\ \text{行列ノルムの劣乗法性。主張 2.93}) \\
&\to 0 && (\because\ \|A_N - A\| \to 0 \text{ と、収束する実数列に定数を掛けた列の極限})
\end{aligned}$$

□

主張 2.97 (行列乗算の右の因子についての連続性)**.** ノルムと収束は 定義 2.91、行列積は 定義 1.6、積のノルムの評価は 主張 2.93 による。$(A_N)_{N\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ は以下の行列空間の列とする。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A_N, A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$\|A_N - A\| \to 0$ のとき、

$$\|BA_N - BA\| \to 0$$

証明.

$$\begin{aligned}
\|BA_N - BA\| &= \|B(A_N - A)\| && (\because\ \text{行列の積の左分配則}) \\
&\leq \|B\| \cdot \|A_N - A\| && (\because\ \text{主張 2.93 } (K \to \mathbb{C},\ A \to B,\ B \to A_N - A)) \\
&\to 0 && (\because\ \|A_N - A\| \to 0 \text{ と、収束する実数列に定数を掛けた列の極限。左辺は非負なので、上の評価から挟み撃ちで})
\end{aligned}$$

□

主張 2.98 (収束する複素数の列による行列のスカラー倍は収束する)**.** ノルムと収束は 定義 2.91、スカラー倍は 定義 2.3、行列の差は 定義 1.92、複素数の差は 定義 1.15 による。$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$(c_N)_{N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ を $\mathbb{C}$ の列、$c \in \mathbb{C}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ とし、定義 2.91 の $\mathbb{C}$ の列の収束の意味で $c_N \to c$（すなわち $|c_N - c| \to 0$）とする。このとき

$$\|c_N A - cA\| \to 0$$

証明.

$$\begin{aligned} \|c_N A - cA\| &= \|(c_N - c)A\| && (\because \text{ 主張 2.38 } (m \to n,\ a \to c_N,\ b \to c)) \\ &= |c_N - c| \cdot \|A\| && (\because \text{ 主張 2.92 (2) } (K \to \mathbb{C},\ c \to c_N - c)) \\ &\to 0 && (\because\ |c_N - c| \to 0 \text{ と、収束する実数列に定数を掛けた列の極限}) \end{aligned}$$

□

3 線型写像の exp

主張 3.1 (非負実数の指数級数の収束)**.** $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とし、$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$E_N(a) := \sum_{m=0}^{N} \frac{a^m}{m!} \qquad (a^0 := 1,\ 0! := 1)$$

とおく。このとき次が成り立つ。

- (1) $(E_N(a))_{N \geq 0}$ は単調非減少かつ上に有界であり、収束する。その極限を $E(a) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{a^m}{m!}$ と書く。
- (2) すべての N について $E_N(a) \leq E(a)$。
- (3) 剰余 $R_N(a) := E(a) - E_N(a)$ は非負であり $R_N(a) \to 0$ $(N \to \infty)$。さらに $p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 1},\ p \leq q$ について $\sum_{m=p}^{q} \frac{a^m}{m!} \leq R_{p-1}(a)$。

証明. Step 1: 単調非減少性。$a \geq 0$ より各項 $a^m/m! \geq 0$ であるから

$$E_{N+1}(a) - E_N(a) = \frac{a^{N+1}}{(N+1)!} \geq 0$$

Step 2: 上に有界であること。Archimedes の原理より $m_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $m_0 \geq 2a$ を満たすものがとれる。$m \geq m_0$ のとき $m + 1 > m_0 \geq 2a$ すなわち $a/(m+1) \leq 1/2$ であるから

$$\begin{aligned} \frac{a^{m+1}}{(m+1)!} &= \frac{a}{m+1} \cdot \frac{a^m}{m!} && \left(\because\ (m+1)! = (m+1) \cdot m!\right) \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot \frac{a^m}{m!} && \left(\because\ a/(m+1) \leq 1/2 \text{ と} a^m/m! \geq 0\right) \end{aligned}$$

これを k に関する帰納法で繰り返すと $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\frac{a^{m_0+k}}{(m_0+k)!} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^k \frac{a^{m_0}}{m_0!}$$

($k = 0$ は等号。k から $k+1$ へは上の不等式を $m = m_0 + k$ $(\geq m_0)$ に適用する。) よって $N \geq m_0$ のとき等比数列の和の公式より

$$\begin{aligned}
\sum_{m=m_0}^{N} \frac{a^m}{m!} &\le \frac{a^{m_0}}{m_0!} \sum_{k=0}^{N-m_0} \left(\frac{1}{2}\right)^k && (\because \text{各項へ直前の評価} a^{m_0+k}/(m_0+k)! \le (1/2)^k a^{m_0}/m_0! \text{ を適用した}) \\
&= \frac{a^{m_0}}{m_0!} \left(2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{N-m_0}\right) && (\because \text{等比数列の和の公式}) \\
&\le \frac{2a^{m_0}}{m_0!} && (\because (1/2)^{N-m_0} \ge 0)
\end{aligned}$$

したがって $N \ge m_0$ について $E_N(a) \le E_{m_0-1}(a) + \dfrac{2a^{m_0}}{m_0!} =: C$。$N < m_0$ のときは Step 1 より $E_N(a) \le E_{m_0-1}(a) \le C$。よって $(E_N(a))$ は C で上に有界である。

Step 3: (1)。単調非減少かつ上に有界な実数列は収束する（$\mathbb{R}$ の連続性、すなわち上に有界な集合が上限をもつことによる）。よって $E(a) := \lim_{N\to\infty} E_N(a)$ が存在する。

Step 4: (2)。単調非減少な収束列の極限はその上限であるから、すべての N について $E_N(a) \le E(a)$。

Step 5: (3)。(2) より $R_N(a) = E(a) - E_N(a) \ge 0$ であり、$E_N(a) \to E(a)$ より $R_N(a) \to 0$。また $1 \le p \le q$ について

$$\begin{aligned}
\sum_{m=p}^{q} \frac{a^m}{m!} &= E_q(a) - E_{p-1}(a) && \left(\because E_N(a) = \sum_{m=0}^{N} a^m/m! \text{ の差}\right) \\
&\le E(a) - E_{p-1}(a) && (\because (2)) \\
&= R_{p-1}(a) && (\because R_N(a) = E(a) - E_N(a) \text{ の定義})
\end{aligned}$$

□

主張 3.2 (行列の exp 級数はノルム収束する)**.** 行列積は 定義 1.6、実数係数を複素数として使うときの包含は 定義 1.13 による。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ とし、ノルムと収束は 定義 2.91 のものとする。$A^0 := I$（単位行列）とおき

$$S_N(A) := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} A^m \in \mathrm{Mat}(n, K)$$

とおくと、次が成り立つ。

- (1) $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m := \lim_{N\to\infty} S_N(A)$ は $\mathrm{Mat}(n, K)$ において存在する。
- (2) $M_A := \|I\| + E(\|A\|)$（E は 主張 3.1 の極限）とおくと、すべての N について $\|S_N(A)\| \le M_A$ であり、$\left\|\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m\right\| \le M_A$。

証明. Step 1: $m \ge 1$ について $\|A^m\| \le \|A\|^m$。m に関する帰納法で示す。$m = 1$ のときは等号。m で成り立つとすると 主張 2.93 より

$$\begin{aligned}
\|A^{m+1}\| &= \|A^m A\| && (\because A^{m+1} = A^m A) \\
&\le \|A^m\| \cdot \|A\| && (\because \text{ノルムの劣乗法性}) \\
&\le \|A\|^m \cdot \|A\| && (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \|A\|^{m+1} && (\because \text{冪の定義})
\end{aligned}$$

Step 2: 実数級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \left\|\frac{1}{m!} A^m\right\|$ の収束。主張 2.92 (2) より $\left\|\frac{1}{m!} A^m\right\| = \frac{1}{m!}\|A^m\|$（$1/m! > 0$ なので $|1/m!| = 1/m!$）であるから、Step 1 より

$$\begin{aligned}
\sum_{m=0}^{N}\left\|\frac{1}{m!}A^m\right\| &= \|I\| + \sum_{m=1}^{N}\frac{\|A^m\|}{m!} && (\because\ m=0 \text{ の項は} \|A^0\| = \|I\|\text{、他の項は上の等式}) \\
&\le \|I\| + \sum_{m=1}^{N}\frac{\|A\|^m}{m!} && (\because\ \text{Step 1}) \\
&\le \|I\| + E(\|A\|) && (\because\ \text{非負実数の指数級数の収束(2)}) \\
&= M_A && (\because\ M_A \text{ の定義})
\end{aligned}$$

（第 3 行の不等号は 主張 3.1 (2) による。）この実数級数は非負項なので部分和は単調非減少であり、いま M_A で上に有界であるから収束する（$\mathbb{R}$ の連続性）。

Step 3: (1)。Step 2 と 主張 2.95 (2)（絶対収束判定）より $\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}A^m$ は $\mathrm{Mat}(n,K)$ において収束する。

Step 4: (2)。有限和については

$$\begin{aligned}
\|S_N(A)\| &\le \sum_{m=0}^{N}\left\|\frac{1}{m!}A^m\right\| && (\because\ \text{ノルムの三角不等式(3) を繰り返し用いる}) \\
&\le M_A && (\because\ \text{Step 2 の評価})
\end{aligned}$$

である。無限和については

$$\begin{aligned}
\left\|\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}A^m\right\| &\le \sum_{m=0}^{\infty}\left\|\frac{1}{m!}A^m\right\| && (\because\ \mathrm{Mat}(n,K) \text{ の完備性と絶対収束判定(2) の後半}) \\
&\le M_A && (\because\ \text{Step 2 の評価})
\end{aligned}$$

である（引いたブロックは 主張 2.92 と 主張 2.95）。 □

定理 3.3 (exp 級数の各点収束（数ベクトルへの作用・成分・行列への線型写像）)**.** 行列と数ベクトルの積は 定義 1.6、非負実数の平方根は 定義 1.4、実数係数の複素数への包含は 定義 1.13 による。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 2.91 のものとする。

(1) $A \in \mathrm{Mat}(n,K)$ とし、

$$S_N := \sum_{m=0}^{N}\frac{1}{m!}A^m \in \mathrm{Mat}(n,K), \qquad S := \sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}A^m \in \mathrm{Mat}(n,K)$$

とおく（S の存在は 主張 3.2 (1) による）。このとき次が成り立つ。

- (1a)（数ベクトルへの作用の各点収束）すべての $v \in K^n$ について $S_N v \to Sv$ が K^n において成り立つ。
- (1b)（成分ごとの収束）すべての $i,j \in \{1,\dots,n\}$ について $(S_N)_{ij} \to S_{ij}$、すなわち $|(S_N)_{ij} - S_{ij}| \to 0$。

(2) $\Phi : \mathrm{Mat}(n,K) \to \mathrm{Mat}(n,K)$ を K-線型写像とする。すなわち $Y, Z \in \mathrm{Mat}(n,K)$、$c \in K$ について $\Phi(Y+Z) = \Phi(Y) + \Phi(Z)$ かつ $\Phi(cY) = c\,\Phi(Y)$ が成り立つとする。$k,l \in \{1,\dots,n\}$ について行列単位 $E^{(k,l)} \in \mathrm{Mat}(n,K)$ を

$$\left(E^{(k,l)}\right)_{ij} := \begin{cases} 1 & ((i,j)=(k,l)) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

で定め、

$$c_\Phi := \sqrt{\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

とおく。また $\Phi^0 := \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)}$、$\Phi^{m+1} := \Phi \circ \Phi^m$（$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）とおく。このとき次が成り立つ。

- (2a) すべての $Y \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について $\|\Phi(Y)\| \leq c_\Phi \|Y\|$。
- (2b) すべての $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について Φ^m は K-線型であり、$\|\Phi^m(Y)\| \leq c_\Phi^m \|Y\|$（$c_\Phi^0 := 1$）。
- (2c)（各点収束）すべての $Y \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について、部分和 $T_N(Y) := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}\Phi^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(n,K)$ において収束する。その極限を $T(Y) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\Phi^m(Y)$ と書く。
- (2d) $T : \mathrm{Mat}(n,K) \to \mathrm{Mat}(n,K)$ は K-線型写像である。

証明. 以下、$\|\cdot\|$ と収束は 定義 2.91 のもの（K^n と $\mathrm{Mat}(n,K)$ の成分の平方和の平方根）である。

Step 1: 成分の絶対値はノルム以下である。$B = (b_{ij}) \in \mathrm{Mat}(n,K)$ と $i,j \in \{1,\dots,n\}$ について、定義 2.91 の定義に現れる平方和は非負項の有限和であり $|b_{ij}|^2$ はその項の 1 つであるから

$$\begin{aligned} |b_{ij}|^2 &\leq \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}|b_{kl}|^2 \quad (\because \text{非負項の有限和は各項以上である}) \\ &= \|B\|^2 \qquad\qquad (\because \text{ノルムの定義と } \left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = a) \end{aligned}$$

$|b_{ij}| \geq 0$ かつ $\|B\| \geq 0$ であるから 主張 2.92 の Step 0（非負実数の平方の単調性）より

$$|b_{ij}| \leq \|B\| \qquad (i,j \in \{1,\dots,n\})$$

Step 2: (1b)。主張 3.2 (1) と 定義 2.91 の収束の定義より $\|S_N - S\| \to 0$。行列の差は成分ごとの差であるから $(S_N - S)_{ij} = (S_N)_{ij} - S_{ij}$ であり、Step 1 を $B = S_N - S$ に適用して

$$\begin{aligned} 0 &\leq |(S_N)_{ij} - S_{ij}| \quad (\because \text{絶対値は非負である}) \\ &= |(S_N - S)_{ij}| \quad (\because \text{行列の差は成分ごとの差である}) \\ &\leq \|S_N - S\| \qquad (\because \text{Step 1 を } B = S_N - S \text{ に適用する}) \end{aligned}$$

右辺は 0 に収束するから $|(S_N)_{ij} - S_{ij}| \to 0$。

Step 3: (1a)。$v \in K^n$ を固定する。行列と数ベクトルの積は分配律を満たすから $S_N v - Sv = (S_N - S)v$ であり、主張 2.94 より

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|S_N v - Sv\| \qquad (\because \text{ノルムは非負である}) \\ &= \|(S_N - S)v\| \qquad (\because \text{行列と数ベクトルの積の分配律}) \\ &\leq \|S_N - S\| \cdot \|v\| \quad (\because \text{行列のノルムによる数ベクトルの評価}) \end{aligned}$$

$\|v\|$ は N によらない非負定数であり、Step 2 より $\|S_N - S\| \to 0$ であるから右辺は 0 に収束する。よって $\|S_N v - Sv\| \to 0$ すなわち $S_N v \to Sv$。

Step 4: 行列単位による展開。$Y = (y_{kl}) \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について

$$Y = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} y_{kl} E^{(k,l)}$$

が成り立つ。実際、行列の和とスカラー倍は成分ごとに定まるので右辺の (i,j) 成分は $\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} y_{kl}\left(E^{(k,l)}\right)_{ij}$ であり、$E^{(k,l)}$ の定義よりこの和では $(k,l)=(i,j)$ の項が $y_{ij}\cdot 1 = y_{ij}$、他の項は $y_{kl}\cdot 0 = 0$ であるから、和は y_{ij} に等しい。また 定義 2.91 より

$$\begin{aligned}\left\|E^{(k,l)}\right\| &= \sqrt{1}^{\,(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \left(\because \text{ 行列ノルムの定義と} E^{(k,l)} \text{ の成分の定義}\right)\\ &= 1 && \left(\because \ \mathbb{R}_{\geq 0} \text{ における1 の非負平方根}\right).\end{aligned}$$

Step 5: (2a)。Φ の線型性を Step 4 の有限和に繰り返し適用すると（項数に関する帰納法）

$$\Phi(Y) = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} y_{kl}\,\Phi\left(E^{(k,l)}\right)$$

主張 2.92 (3) を有限個の項に繰り返し用い、続いて同 (2) を用いると

$$\begin{aligned}\|\Phi(Y)\| &= \left\|\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} y_{kl}\,\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\| && (\because \text{ 直前の等式})\\ &\leq \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}\left\|y_{kl}\,\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\| && (\because \text{ 三角不等式を有限個の項に繰り返し用いる})\\ &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}|y_{kl}|\,\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\| && (\because \text{ スカラー倍のノルム})\end{aligned}$$

この二重和に Cauchy–Schwarz の不等式を適用する。全単射

$$\sigma : \{1,\dots,n\}^2 \to \{1,\dots,n^2\}, \qquad \sigma(k,l) := (k-1)n + l$$

により二重和を 1 重の和へ書き換え（有限和の項の並べ替え）、主張 2.92 の Step 4（有限列に対する Cauchy–Schwarz の不等式）を $u_{\sigma(k,l)} := |y_{kl}|$、$v_{\sigma(k,l)} := \left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|$ に適用すると

$$\begin{aligned}\left(\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}|y_{kl}|\,\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|\right)^2 &\leq \left(\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}|y_{kl}|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|^2\right) && (\because \text{ 有限列に対する Cauchy–Schwarz の不等式})\\ &= \|Y\|^2\, c_\Phi^2 && \left(\because \left(\sqrt{a}^{\,(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = a \text{ を両方の和に用いる}\right)\\ &= \left(c_\Phi\|Y\|\right)^2 && (\because \text{ 非負実数の積の平方})\end{aligned}$$

左辺の平方の中身 $\sum_{k,l}|y_{kl}|\,\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|$ と $c_\Phi\|Y\|$ はともに非負であるから、主張 2.92 の Step 0 より

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}|y_{kl}|\,\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\| \leq c_\Phi\|Y\|$$

以上を合わせて $\|\Phi(Y)\| \leq c_\Phi\|Y\|$。

Step 6: (2b)。m に関する帰納法で示す。$m=0$ のとき $\Phi^0 = \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)}$ は線型である。ノルムについては

$$\begin{aligned}\left\|\Phi^0(Y)\right\| &= \|Y\| && (\because \ \Phi^0 = \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)})\\ &= c_\Phi^0\|Y\| && (\because \text{ 非負実数の零乗は1})\end{aligned}$$

m で成り立つとすると、$Y, Z \in \mathrm{Mat}(n,K)$、$c \in K$ について

$$
\begin{aligned}
\Phi^{m+1}(Y+Z) &= \Phi(\Phi^m(Y+Z)) && (\because\ \Phi^{m+1} = \Phi\circ\Phi^m)\\
&= \Phi(\Phi^m(Y)+\Phi^m(Z)) && (\because\ \Phi^m \text{ の線型性})\\
&= \Phi(\Phi^m(Y)) + \Phi(\Phi^m(Z)) && (\because\ \Phi \text{ の線型性})\\
&= \Phi^{m+1}(Y) + \Phi^{m+1}(Z) && (\because\ \Phi^{m+1} = \Phi\circ\Phi^m)\\
\Phi^{m+1}(cY) &= \Phi(\Phi^m(cY)) && (\because\ \Phi^{m+1} = \Phi\circ\Phi^m)\\
&= \Phi(c\,\Phi^m(Y)) && (\because\ \Phi^m \text{ の線型性})\\
&= c\,\Phi(\Phi^m(Y)) && (\because\ \Phi \text{ の線型性})\\
&= c\,\Phi^{m+1}(Y) && (\because\ \Phi^{m+1} = \Phi\circ\Phi^m)
\end{aligned}
$$

であるから Φ^{m+1} は K-線型。ノルムについては Step 5 と帰納法の仮定より

$$
\begin{aligned}
\left\|\Phi^{m+1}(Y)\right\| &= \|\Phi(\Phi^m(Y))\| && (\because\ \Phi^{m+1} = \Phi\circ\Phi^m)\\
&\le c_\Phi \,\|\Phi^m(Y)\| && (\because\ \text{Step 5 を } Y = \Phi^m(Y) \text{ に適用する})\\
&\le c_\Phi \cdot c_\Phi^m \|Y\| && (\because\ \text{帰納法の仮定と } c_\Phi \ge 0)\\
&= c_\Phi^{m+1}\|Y\| && (\because\ \text{非負実数の冪の指数法則})
\end{aligned}
$$

Step 7: (2c)。$Y \in \mathrm{Mat}(n,K)$ を固定する。主張 2.92 (2)（$1/m! > 0$ なので $|1/m!| = 1/m!$）と (2b) より

$$
\begin{aligned}
\sum_{m=0}^{N} \left\|\frac{1}{m!}\Phi^m(Y)\right\| &= \sum_{m=0}^{N} \frac{\|\Phi^m(Y)\|}{m!} && (\because\ \text{スカラー倍のノルムと } |1/m!| = 1/m!)\\
&\le \|Y\| \sum_{m=0}^{N} \frac{c_\Phi^m}{m!} && (\because\ \text{(2b) を各項に適用する})\\
&\le \|Y\|\, E(c_\Phi) && (\because\ \text{非負実数の指数級数の部分和の上界を } a = c_\Phi \text{ に適用し、 } \|Y\| \ge 0)
\end{aligned}
$$

(最後の不等号で引いたのは 主張 3.1 (2) である)。左辺は非負項の実数級数の部分和なので単調非減少であり、いま $\|Y\|\,E(c_\Phi)$ で上に有界であるから収束する（$\mathbb{R}$ の連続性)。よって 主張 2.95 (2)（絶対収束判定）より $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\Phi^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(n,K)$ において収束する。極限が一意であることは 主張 2.92 (4) による。

Step 8: (2d)。まず T_N は線型である。実際 (2b) より各 Φ^m は線型であり、行列の和とスカラー倍の性質から $T_N(Y+Z) = T_N(Y) + T_N(Z)$、$T_N(cY) = c\,T_N(Y)$ が成り立つ（有限和なので項ごとに確かめればよい)。

$Y, Z \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について、T_N の線型性と 主張 2.92 (3) より

$$
\begin{aligned}
0 &\le \|T_N(Y+Z) - (T(Y)+T(Z))\| && (\because\ \text{ノルムは非負である})\\
&= \|(T_N(Y) - T(Y)) + (T_N(Z) - T(Z))\| && (\because\ T_N \text{ の線型性})\\
&\le \|T_N(Y) - T(Y)\| + \|T_N(Z) - T(Z)\| && (\because\ \text{三角不等式})
\end{aligned}
$$

右辺は Step 7（$T_N(Y) \to T(Y)$ と $T_N(Z) \to T(Z)$）より 0 に収束するから $T_N(Y+Z) \to T(Y)+T(Z)$。一方、T の定義より $T_N(Y+Z) \to T(Y+Z)$ であるから、主張 2.92 (4)（極限の一意性）より $T(Y+Z) = T(Y)+T(Z)$。

同様に $c \in K$ について、T_N の線型性と 主張 2.92 (2) より

$$
\begin{aligned}
0 &\le \|T_N(cY) - c\,T(Y)\| && (\because\ \text{ノルムは非負である})\\
&= \|c\,(T_N(Y) - T(Y))\| && (\because\ T_N \text{ の線型性})\\
&= |c| \cdot \|T_N(Y) - T(Y)\| && (\because\ \text{スカラー倍のノルム})
\end{aligned}
$$

であり、右辺は Step 7 より 0 に収束する。よって $T_N(cY) \to c\,T(Y)$ であり、$T_N(cY) \to T(cY)$ と極限の一意性より $T(cY) = c\,T(Y)$。したがって T は K-線型写像である。 □

定義 3.4 (exp の定義（行列の場合と、行列への線型写像の場合）)**.** 行列の積は 定義 1.6、実数係数の複素数への包含は 定義 1.13 を用いる。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 2.91 のものとする。

(1)（行列の exp）$A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、$A^0 := I$（単位行列)、$A^{m+1} := A^m A$ とおき

$$\exp(A) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m = \lim_{N \to \infty} \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} A^m \in \mathrm{Mat}(n, K)$$

と定める。この極限は 主張 3.2 (1) により存在し、主張 2.92 (4) により一意である。これにより写像 $\exp : \mathrm{Mat}(n, K) \to \mathrm{Mat}(n, K)$ が定まる。

(2)（行列への線型写像の exp）$\Phi : \mathrm{Mat}(n, K) \to \mathrm{Mat}(n, K)$ を K-線型写像とし、$\Phi^0 := \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)}$、$\Phi^{m+1} := \Phi \circ \Phi^m$ とおく。写像 $\exp(\Phi) : \mathrm{Mat}(n, K) \to \mathrm{Mat}(n, K)$ を

$$(\exp(\Phi))(Y) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \Phi^m(Y) = \lim_{N \to \infty} \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} \Phi^m(Y) \qquad (Y \in \mathrm{Mat}(n, K))$$

で定める。各 Y についてこの極限が存在すること（各点収束）は 定理 3.3 (2c) により、一意であることは 主張 2.92 (4) による。また 定理 3.3 (2d) より $\exp(\Phi)$ は K-線型写像である。

主張 3.5 (行列の冪の指数法則$A^{p+q} = A^p A^q$)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ とし、冪は 定義 3.4 (1) のもの、積は 定義 1.6 のものとする。すべての $p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$A^{p+q} = A^p A^q$$

である。

証明. $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を固定し、q についての帰納法で示す。$q = 0$ のとき

$$\begin{aligned} A^{p+0} &= A^p && (\because \mathbb{Z} \text{ で } p + 0 = p) \\ &= A^p I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} && (\because \text{主張 2.17}) \\ &= A^p A^0 && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I) \end{aligned}$$

である。q で成り立つとすると

$$\begin{aligned} A^{p+(q+1)} &= A^{(p+q)+1} && (\because \mathbb{Z} \text{ の加法の結合則}) \\ &= A^{p+q} A && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A \text{ を } m = p + q \text{ に適用}) \\ &= (A^p A^q) A && (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= A^p (A^q A) && (\because \text{主張 2.15}) \\ &= A^p A^{q+1} && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A \text{ を } m = q \text{ に適用}) \end{aligned}$$

であり、$q + 1$ でも成り立つ。 □

主張 3.6 (可換な行列は exp とも可換)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $AB = BA$ を満たすとする。積は 定義 1.6、冪 B^p（$p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）と exp は 定義 3.4 (1) による。このとき

$$A \exp(B) = \exp(B) A$$

が成り立つ。証明の極限の段だけが $\mathbb{R}$ を使う（定義 2.91 の収束が実数列 $\|\cdot\|$ の 0 への収束だからである)。

証明. 準備。$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について部分和を

$$S_N := \sum_{p=0}^{N} \left(\tfrac{1}{p!}\right)_{\mathbb{C}} B^p \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$$

と置く（$\left(\frac{1}{p!}\right)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記、和は 定義 2.5 を添字 $p = j - 1$ で書いたもの）。定義 2.5 より $S_0 = \left(\frac{1}{0!}\right)_{\mathbb{C}} B^0$、$S_{N+1} = S_N + \left(\frac{1}{(N+1)!}\right)_{\mathbb{C}} B^{N+1}$ である。$E := \exp(B)$ と置くと、定義 3.4 (1) と 主張 3.2 (1) より $S_N \to E$、すなわち実数列 $\|S_N - E\|$ は 0 に収束する（定義 2.91）。

Step 1（冪との可換性）。すべての $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $AB^p = B^p A$ を p についての帰納法で示す。$p = 0$ のとき、

$$\begin{aligned}
AB^0 &= AI_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} && (\because \text{定義 3.4 (1) の } B^0 := I) \\
&= A && (\because \text{主張 2.17}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}A && (\because \text{主張 2.16}) \\
&= B^0 A && (\because \text{定義 3.4 (1) の } B^0 := I)
\end{aligned}$$

p で成り立つとすると、

$$\begin{aligned}
AB^{p+1} &= A(B^p B) && (\because \text{定義 3.4 (1) の } B^{p+1} := B^p B) \\
&= (AB^p)B && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= (B^p A)B && (\because \text{帰納法の仮定 } AB^p = B^p A) \\
&= B^p(AB) && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= B^p(BA) && (\because \text{仮定 } AB = BA) \\
&= (B^p B)A && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= B^{p+1}A && (\because \text{定義 3.4 (1) の } B^{p+1} := B^p B)
\end{aligned}$$

Step 2（部分和との可換性）。すべての $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $AS_N = S_N A$ を N についての帰納法で示す。$c_p := \left(\frac{1}{p!}\right)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ と書く。$N = 0$ のとき、

$$\begin{aligned}
AS_0 &= A(c_0 B^0) && (\because \text{準備の } S_0 = c_0 B^0) \\
&= c_0(AB^0) && (\because \text{主張 2.19}) \\
&= c_0(B^0 A) && (\because \text{Step 1 の } p = 0) \\
&= (c_0 B^0)A && (\because \text{主張 2.18}) \\
&= S_0 A && (\because \text{準備の } S_0 = c_0 B^0)
\end{aligned}$$

N で成り立つとすると、

$$\begin{aligned}
AS_{N+1} &= A\left(S_N + c_{N+1}B^{N+1}\right) && (\because \text{準備の } S_{N+1} = S_N + c_{N+1}B^{N+1}) \\
&= AS_N + A\left(c_{N+1}B^{N+1}\right) && (\because \text{主張 2.23}) \\
&= S_N A + A\left(c_{N+1}B^{N+1}\right) && (\because \text{帰納法の仮定 } AS_N = S_N A) \\
&= S_N A + c_{N+1}\left(AB^{N+1}\right) && (\because \text{主張 2.19}) \\
&= S_N A + c_{N+1}\left(B^{N+1}A\right) && (\because \text{Step 1 の } p = N+1) \\
&= S_N A + \left(c_{N+1}B^{N+1}\right)A && (\because \text{主張 2.18}) \\
&= \left(S_N + c_{N+1}B^{N+1}\right)A && (\because \text{主張 2.24}) \\
&= S_{N+1}A && (\because \text{準備の } S_{N+1} = S_N + c_{N+1}B^{N+1})
\end{aligned}$$

Step 3（左からの積の極限）。$AS_N \to AE$ を示す。各 N について

$$\begin{aligned}
AS_N - AE &= AS_N + \big(-(AE)\big) && (\because \text{主張 2.30}) \\
&= AS_N + A(-E) && (\because \text{主張 2.21}) \\
&= A\big(S_N + (-E)\big) && (\because \text{主張 2.23}) \\
&= A(S_N - E) && (\because \text{主張 2.30})
\end{aligned}$$

である。$\eta \in \mathbb{R}_{>0}$ を任意に取り、$\eta' := \eta/(\|A\|+1) \in \mathbb{R}_{>0}$ と置く（主張 2.92 (1) より $\|A\|+1 \geq 1 > 0$）。準備の $\|S_N - E\| \to 0$ より、$N_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して $N \geq N_0$ ならば $\|S_N - E\| < \eta'$ である。このとき $N \geq N_0$ について

$$\begin{aligned}
\|AS_N - AE\| &= \|A(S_N - E)\| && (\because \text{上の鎖}) \\
&\leq \|A\|\,\|S_N - E\| && (\because \text{主張 2.93}) \\
&\leq (\|A\|+1)\,\|S_N - E\| && (\because \|S_N - E\| \geq 0 \text{。主張 2.92 (1)}) \\
&< (\|A\|+1)\,\eta' && (\because \|S_N - E\| < \eta' \text{ と } \|A\|+1 > 0) \\
&= \eta && (\because \eta' \text{ の定義})
\end{aligned}$$

であるから、実数列 $\|AS_N - AE\|$ は 0 に収束し、$AS_N \to AE$ である（定義 2.91）。

Step 4（右からの積の極限と結論）。主張 2.96 を $A_N \to S_N$、$A \to E$、$B \to A$ で引くと $S_N A \to EA$ である。行列の列 $C_N := AS_N$ は、Step 3 より AE に収束し、Step 2 より $C_N = S_N A$ だから EA にも収束する。よって

$$\begin{aligned}
A\exp(B) &= AE && (\because E \text{ の定義}) \\
&= EA && (\because (C_N) \text{ の二つの極限に 主張 2.92 (4) の極限の一意性}) \\
&= \exp(B)A && (\because E \text{ の定義})
\end{aligned}$$

□

定理 3.7 (可換行列の exp 積公式)**.** 行列積は 定義 1.6、成分の演算は 主張 1.56、実数係数の包含は 定義 1.13、非負平方根は 定義 1.4 による。二項係数と Pascal の関係式は 定理 5.10 の定義と証明の準備で述べたものを使う。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$

$A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$ が $AB = BA$ を満たすとき、

$$\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B)$$

証明. 以下、定義 3.4 (1) の exp を

$$\exp(A) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m \in \mathrm{Mat}(n, K)$$

（定義 2.91 の意味での収束）として扱う。この級数が収束することは 主張 3.2 による。記号を

$$S_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} A^m, \qquad T_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} B^m, \qquad C_N := \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} (A+B)^k$$

と定め、$a := \|A\|,\ b := \|B\| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とおく。

Step 1: A は B の冪と可換である。すなわち $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $AB^m = B^m A$。m に関する帰納法で示す。$m = 0$ のときは

$$\begin{aligned}
AI &= A && (\because I \text{ は単位行列である}) \\
&= IA && (\because I \text{ は単位行列である})
\end{aligned}$$

m で成り立つとすると、

$$\begin{aligned}
AB^{m+1} &= (AB^m)B && (\because B^{m+1} = B^m B \text{ と積の結合律}) \\
&= (B^m A)B && (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= B^m(AB) && (\because \text{積の結合律}) \\
&= B^m(BA) && (\because AB = BA) \\
&= B^{m+1}A && (\because \text{積の結合律と } B^m B = B^{m+1})
\end{aligned}$$

Step 2: 二項定理。$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$(A+B)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j}$$

を k に関する帰納法で示す。$k=0$ のときは両辺とも I。k で成り立つとすると、

$$\begin{aligned}
(A+B)^{k+1} &= (A+B)^k (A+B) && (\because \text{ 冪の定義}) \\
&= \left(\sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j} \right) (A+B) && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j} A + \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j} B && (\because \text{ 積の分配律}) \\
&= \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^{j+1} B^{k-j} + \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j+1} && (\because \text{ Step 1 を第 1 和の各項へ当てる}) \\
&= \sum_{j=1}^{k+1} \binom{k}{j-1} A^j B^{k+1-j} + \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k+1-j} && (\because \text{ 第 1 和で } j \to j-1 \text{ と添字を付け替えた}) \\
&= \sum_{j=0}^{k+1} \left(\binom{k}{j-1} + \binom{k}{j} \right) A^j B^{k+1-j} && \left(\because \binom{k}{-1} := 0,\ \binom{k}{k+1} := 0 \text{ として和をまとめた} \right) \\
&= \sum_{j=0}^{k+1} \binom{k+1}{j} A^j B^{k+1-j} && (\because \text{ Pascal の関係式})
\end{aligned}$$

Step 3: 部分和の書き換え。$\binom{k}{j} \frac{1}{k!} = \frac{1}{j!\,(k-j)!}$ であるから、Step 2 より

$$\begin{aligned}
C_N &= \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j} && (\because \text{ Step 2 を各 } k \text{ へ当てる}) \\
&= \sum_{k=0}^{N} \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!\,(k-j)!} A^j B^{k-j} && \left(\because \binom{k}{j} \frac{1}{k!} = \frac{1}{j!\,(k-j)!} \right) \\
&= \sum_{(j,l) \in D_N} \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l && (\because \ l := k-j \text{ と置くと添字は } D_N := \{(j,l) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 \mid j+l \leq N\} \text{ を走る})
\end{aligned}$$

一方、有限和の積を展開して

$$\begin{aligned}
S_N T_N &= \left(\sum_{j=0}^{N} \frac{1}{j!} A^j \right) \left(\sum_{l=0}^{N} \frac{1}{l!} B^l \right) && (\because \ S_N,\ T_N \text{ の置き方}) \\
&= \sum_{(j,l) \in Q_N} \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l && (\because \text{ 積の分配律。添字は } Q_N := \{0,1,\ldots,N\}^2 \text{ を走る})
\end{aligned}$$

$(j,l) \in D_N$ ならば $j \leq j+l \leq N$ かつ $l \leq N$ であるから $D_N \subseteq Q_N$。よって

$$S_N T_N - C_N = \sum_{(j,l) \in Q_N \setminus D_N} \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l$$

Step 4: 各項のノルム評価。$\|I\| \geq 1$ である（定義 2.91 より $\|I\| = \sqrt{n}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ であり $n \geq 1$）。主張 3.2 の Step 1 より $j \geq 1$ で $\|A^j\| \leq a^j$、$j=0$ では $\|A^0\| = \|I\|$ であるから、いずれの場合も

$$\|A^j\| \leq \|I\|\, a^j \qquad (j \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

B についても同様。よって 主張 2.93 と 主張 2.92 (2) より

$$\begin{aligned}
\left\| \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l \right\| &= \frac{\|A^j B^l\|}{j!\,l!} && (\because\ \text{ノルムのスカラー倍についての等式と } 1/(j!\,l!) > 0) \\
&\leq \frac{\|A^j\|\,\|B^l\|}{j!\,l!} && (\because\ \text{行列ノルムの劣乗法性と } 1/(j!\,l!) > 0) \\
&\leq \|I\|^2 \cdot \frac{a^j}{j!} \cdot \frac{b^l}{l!} && (\because\ \|A^j\| \leq \|I\|\,a^j \text{ と } \|B^l\| \leq \|I\|\,b^l)
\end{aligned}$$

Step 5: $\|S_N T_N - C_N\| \to 0$。まず添字集合を評価する。$(j,l) \in Q_N \setminus D_N$ とすると $j + l > N$ であるから $2j > N$ または $2l > N$ である（もし $2j \leq N$ かつ $2l \leq N$ なら $j + l \leq N$ となり矛盾）。$P_N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を $P_N \geq (N+1)/2$ を満たす最小の整数とすると、整数 j について $2j > N$ は $2j \geq N+1$ すなわち $j \geq P_N$ と同値であるから

$$Q_N \setminus D_N \subseteq (\{P_N, \ldots, N\} \times \{0, \ldots, N\}) \cup (\{0, \ldots, N\} \times \{P_N, \ldots, N\})$$

（$P_N > N$ のときは対応する部分は空集合とする。）主張 2.92 (3) を有限個の項に繰り返し用い、Step 4 の評価と、非負項を付け加えても和が増えるだけであることを使うと、

$$\begin{aligned}
\|S_N T_N - C_N\| &\leq \sum_{(j,l) \in Q_N \setminus D_N} \left\| \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l \right\| && (\because\ \text{三角不等式を有限個の項に繰り返し用いる}) \\
&\leq \|I\|^2 \sum_{(j,l) \in Q_N \setminus D_N} \frac{a^j}{j!} \cdot \frac{b^l}{l!} && (\because\ \text{Step 4 を各項へ当てる}) \\
&\leq \|I\|^2 \left(\left(\sum_{j=P_N}^{N} \frac{a^j}{j!} \right) \left(\sum_{l=0}^{N} \frac{b^l}{l!} \right) + \left(\sum_{j=0}^{N} \frac{a^j}{j!} \right) \left(\sum_{l=P_N}^{N} \frac{b^l}{l!} \right) \right) && (\because\ \text{上の添字集合の包含と、非負項を付け加えても和は増えるだけであること}) \\
&\leq \|I\|^2 \left(R_{P_N - 1}(a)\, E(b) + E(a)\, R_{P_N - 1}(b) \right) && (\because\ \text{非負実数の指数級数の収束の (2)(3)})
\end{aligned}$$

最後の不等号で引いたのは 主張 3.1 の (2)(3) である。$P_N \geq (N+1)/2$ より $P_N - 1 \to \infty$ であり、主張 3.1 (3) より $R_{P_N - 1}(a) \to 0$、$R_{P_N - 1}(b) \to 0$。$\|I\|^2$, $E(a)$, $E(b)$ は N によらない定数であるから $\|S_N T_N - C_N\| \to 0$。

Step 6: $S_N T_N \to \exp(A)\exp(B)$。主張 2.92 (3)、主張 2.93、および 主張 3.2 (2) の評価 $\|S_N\| \leq M_A$、$\|\exp(B)\| \leq M_B$（$M_A = \|I\| + E(\|A\|)$、$M_B = \|I\| + E(\|B\|)$ は 主張 3.2 (2) をそれぞれ A、B に適用したもの）より、

$$\begin{aligned}
\|S_N T_N - \exp(A)\exp(B)\| &\leq \|S_N T_N - S_N \exp(B)\| + \|S_N \exp(B) - \exp(A)\exp(B)\| && (\because\ \text{三角不等式}) \\
&= \|S_N\,(T_N - \exp(B))\| + \|(S_N - \exp(A))\exp(B)\| && (\because\ \text{積の分配律}) \\
&\leq \|S_N\| \cdot \|T_N - \exp(B)\| + \|S_N - \exp(A)\| \cdot \|\exp(B)\| && (\because\ \text{行列ノルムの劣乗法性を 2 つの項へ当てる}) \\
&\leq M_A \|T_N - \exp(B)\| + M_B \|S_N - \exp(A)\| && (\because\ \|S_N\| \leq M_A \text{ と } \|\exp(B)\| \leq M_B)
\end{aligned}$$

主張 3.2 (1) より $\|S_N - \exp(A)\| \to 0$、$\|T_N - \exp(B)\| \to 0$ であるから右辺は 0 に収束する。

Step 7: $C_N \to \exp(A+B)$。主張 3.2 を行列 $A+B$ に適用すれば、C_N は $\exp(A+B)$ の部分和列であるから $\|C_N - \exp(A+B)\| \to 0$。

Step 8: 結論。主張 2.92 (3) より各 N について

$$\begin{aligned}
0 &\leq \|\exp(A)\exp(B) - \exp(A+B)\| && (\because\ \text{ノルムは非負実数として定まる}) \\
&\leq \|\exp(A)\exp(B) - S_N T_N\| + \|S_N T_N - \exp(A+B)\| && (\because\ \text{三角不等式}) \\
&\leq \|\exp(A)\exp(B) - S_N T_N\| + \|S_N T_N - C_N\| + \|C_N - \exp(A+B)\| && (\because\ \text{第 2 項へもう一度三角不等式})
\end{aligned}$$

右辺は Step 5・Step 6・Step 7 より $N \to \infty$ で 0 に収束する（$\|\exp(A)\exp(B) - S_N T_N\| = \|S_N T_N - \exp(A)\exp(B)\|$ は 主張 2.92 (2) を $c = -1$ に適用し $|-1| = 1$ を用いて得られる）。左辺は N によらない非負定数であるから $\|\exp(A)\exp(B) - \exp(A+B)\| = 0$ であり、主張 2.92 (1) より

$$\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B) \quad (\because \text{直前のノルム零の結論と 主張 2.92 (1)})$$

なお、この証明で用いたのは行列の積・和の計算と 定義 2.91 のノルムに関する評価のみであり、微分は用いていない。 □

定理 3.8 ($\exp(O) = I$)**.** 行列指数は 定義 3.4、成分積は 定義 1.6、実数係数の包含は 定義 1.13 による。実数級数の収束は 主張 3.1 を引数 1 に適用する。

$d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$O, I \in \mathrm{Mat}(d, \mathbb{C})$ とする。

O を零行列、I を単位行列とするとき、

$$\exp(O) = I$$

証明. 準備として、零行列の冪を書き下しておく。行列の冪の定義より $O^0 = I$ であり、$n \geq 1$ のとき $O^n = O$ である。

$$\begin{aligned}
\exp(O) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{O^n}{n!} && (\because \exp \text{ の定義（行列の場合と、行列への線型写像の場合）。定義 3.4}) \\
&= \frac{O^0}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O^n}{n!} && (\because \text{収束級数の第 0 項を分ける}) \\
&= \frac{I}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O^n}{n!} && (\because O^0 = I) \\
&= \frac{I}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O}{n!} && (\because n \geq 1 \text{ のとき } O^n = O) \\
&= I + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O}{n!} && (\because 0! = 1) \\
&= I + \Big(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} O && (\because \text{収束級数のスカラー倍は各項のスカラー倍の和である。実数の係数は 定義 1.13 の記法 } r_{\mathbb{C}} \text{ で } \mathbb{C} \text{ へ移す}) \\
&= I + O && (\because \text{主張 2.12 } (a = \textstyle\sum_{n=1}^{\infty} 1/n!)_{\mathbb{C}})) \\
&= I && (\because \text{主張 2.8 } (X = I))
\end{aligned}$$

□

定義 3.9 (数を成分とする 1 行 1 列の行列)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ とする。$x \in K$ に対して、ただ 1 つの成分が x である 1 行 1 列の行列を

$$[x]_K \in \mathrm{Mat}(1, K), \qquad ([x]_K)_{11} := x$$

と書く。これにより写像 $[\,\cdot\,]_K : K \to \mathrm{Mat}(1, K)$ が定まる。$\mathrm{Mat}(1, K)$ の元 A は成分 A_{11} だけで決まるので、$A = [A_{11}]_K$ である。

主張 3.10 (数の列の極限は一意)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ とし、$(a_N)_{N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ を K の列、$a, a' \in K$ とする。定義 2.91 の K の列の収束の意味で $a_N \to a$ かつ $a_N \to a'$ ならば、$a = a'$ である。絶対値の値は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に入り（$K = \mathbb{C}$ では 定義 1.74 の絶対値で、主張 1.75 (1) により実数の平方根、$K = \mathbb{R}$ では実数の絶対値）、収束は実数列の収束なので（理由: 極限）、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出している。

証明. $u, v \in K$ について

$$\begin{aligned}
[u]_K - [v]_K &= [([u]_K - [v]_K)_{11}]_K \quad (\because 1 \text{ 行 } 1 \text{ 列の行列は成分だけで決まる。定義 3.9}) \\
&= [([u]_K)_{11} - ([v]_K)_{11}]_K \quad (\because \text{行列の差は成分ごと}) \\
&= [u - v]_K \quad (\because \text{定義 3.9})
\end{aligned}$$

であり、$w \in K$ について（ノルムの値は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に入る。理由: 実数の平方根）

$$
\begin{aligned}
\|[w]_K\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^{1}\sum_{j=1}^{1}\left|([w]_K)_{ij}\right|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \qquad (\because \text{定義 2.91 を} n=1 \text{ で}) \\
&= \sqrt{\left|([w]_K)_{11}\right|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \qquad (\because \text{和は} i=j=1 \text{ の 1 項だけ}) \\
&= \sqrt{|w|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \text{定義 3.9}) \\
&= |w| \quad (\because |w| \in \mathbb{R}_{\geq 0} \text{ かつ} |w|^2 = |w|^2 \text{ なので、定義 1.4 の値の一意性。主張 1.3})
\end{aligned}
$$

である。$b \in \{a, a'\}$ とすると、$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
\|[a_N]_K - [b]_K\| &= \|[a_N - b]_K\| \quad (\because \text{上の} [u]_K - [v]_K = [u-v]_K) \\
&= |a_N - b| \quad (\because \text{上の} \|[w]_K\| = |w|) \\
&\to 0 \quad (N \to \infty) \quad (\because \text{仮定} a_N \to b \text{。定義 2.91 の} K \text{ の列の収束})
\end{aligned}
$$

である。すなわち 定義 2.91 の意味で $[a_N]_K \to [a]_K$ かつ $[a_N]_K \to [a']_K$ である。よって

$$
\begin{aligned}
a &= ([a]_K)_{11} \quad (\because \text{定義 3.9}) \\
&= \left([a']_K\right)_{11} \quad (\because [a]_K = [a']_K \text{。主張 2.92 (4) を} n=1 \text{ で、上の二つの収束へ}) \\
&= a' \quad (\because \text{定義 3.9})
\end{aligned}
$$

である。 □

定義 3.11 (実数と複素数の exp)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ とし、$x \in K$ に対して

$$\exp(x) := \left(\exp([x]_K)\right)_{11} \in K$$

と定める。右辺の exp は 定義 3.4 (1) の行列の exp を $n=1$ で 定義 3.9 の $[x]_K$ に適用したものであり、$\exp([x]_K) \in \mathrm{Mat}(1, K)$ だからその成分は K の元である。これにより写像 $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ と $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ が定まる。以後、exp の引数が実数ならば前者、複素数ならば後者、行列ならば 定義 3.4 の行列の exp を表す。

主張 3.12 (数の exp は指数級数の部分和の極限)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$x \in K$ とする。$N \to \infty$ のとき

$$\sum_{m=0}^{N} \frac{x^m}{m!} \to \exp(x)$$

が K において (定義 2.91 の K の列の収束の意味で) 成り立つ。ここで $x^0 := 1$、$x^{m+1} := x^m\, x$ $(m \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$、$0! := 1$ とする。

証明. Step 1 ($[x]_K^m = [x^m]_K$)。$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に関する帰納法で示す。$m=0$ では

$$
\begin{aligned}
[x]_K^0 &= I \quad (\because \text{行列の冪の定義} A^0 := I \text{。定義 3.4}) \\
&= [I_{11}]_K \quad (\because 1 \text{ 行 } 1 \text{ 列の行列は成分だけで決まる。定義 3.9}) \\
&= [1]_K \quad (\because \text{単位行列の対角成分は1}) \\
&= [x^0]_K \quad (\because \text{主張の約束} x^0 := 1)
\end{aligned}
$$

m で成り立つと仮定すると

$$
\begin{aligned}
\left([x]_K^{m+1}\right)_{11} &= \left([x]_K^m [x]_K\right)_{11} \quad (\because \text{行列の冪の定義} A^{m+1} := A^m A\text{。定義 3.4}) \\
&= \sum_{j=1}^{1} \left([x]_K^m\right)_{1j} \left([x]_K\right)_{j1} \quad (\because \text{行列の積の成分。定義 1.6}) \\
&= \left([x]_K^m\right)_{11} \left([x]_K\right)_{11} \quad (\because \text{和は} j=1 \text{ の 1 項だけ}) \\
&= \left([x^m]_K\right)_{11} \left([x]_K\right)_{11} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= x^m\, x \quad (\because \text{定義 3.9}) \\
&= x^{m+1} \quad (\because \text{主張の約束} x^{m+1} := x^m\, x)
\end{aligned}
$$

であるから

$$
\begin{aligned}
[x]_K^{m+1} &= \left[\left([x]_K^{m+1}\right)_{11}\right]_K \quad (\because 1 \text{ 行 } 1 \text{ 列の行列は成分だけで決まる。定義 3.9}) \\
&= [x^{m+1}]_K \quad (\because \text{上の鎖})
\end{aligned}
$$

Step 2（部分和の成分）。主張 3.2 の部分和 $S_N([x]_K) = \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} [x]_K^m \in \mathrm{Mat}(1, K)$ について

$$
\begin{aligned}
\left(S_N([x]_K)\right)_{11} &= \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} \left([x]_K^m\right)_{11} \quad (\because \text{行列の和とスカラー倍は成分ごと}) \\
&= \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} \left([x^m]_K\right)_{11} \quad (\because \text{Step 1 を各項へ適用}) \\
&= \sum_{m=0}^{N} \frac{x^m}{m!} \quad (\because \text{定義 3.9})
\end{aligned}
$$

Step 3（極限）。$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
\left| \sum_{m=0}^{N} \frac{x^m}{m!} - \exp(x) \right| &= \left| \left(S_N([x]_K)\right)_{11} - \exp(x) \right| \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \left| \left(S_N([x]_K)\right)_{11} - \left(\exp([x]_K)\right)_{11} \right| \quad (\because \text{定義 3.11}) \\
&\to 0 \quad (N \to \infty) \quad (\because \text{定理 3.3 (1b) を} n=1,\ A=[x]_K,\ i=j=1 \text{ に適用。} \textstyle\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} [x]_K^m = \exp([x]_K) \text{ は定義 3.4 (1)})
\end{aligned}
$$

であり、これは 定義 2.91 の K の列の収束の定義そのものである。 □

主張 3.13 $(\exp(x)\exp(y) = \exp(x+y))$**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$x, y \in K$ について

$$
\exp(x)\exp(y) = \exp(x+y)
$$

証明. 準備。1 行 1 列の行列 $A, B \in \mathrm{Mat}(1, K)$ について

$$
\begin{aligned}
(AB)_{11} &= \sum_{j=1}^{1} A_{1j} B_{j1} \quad (\because \text{行列の積の成分。定義 1.6}) \\
&= A_{11} B_{11} \quad (\because \text{和は} j=1 \text{ の 1 項だけ})
\end{aligned}
$$

である。これを使うと

$$
\begin{aligned}
\left([x]_K [y]_K\right)_{11} &= \left([x]_K\right)_{11} \left([y]_K\right)_{11} \quad (\because \text{準備の} (AB)_{11} = A_{11} B_{11}) \\
&= xy \quad (\because \text{定義 3.9}) \\
&= yx \quad (\because K \text{ の積の可換性}) \\
&= \left([y]_K\right)_{11} \left([x]_K\right)_{11} \quad (\because \text{定義 3.9}) \\
&= \left([y]_K [x]_K\right)_{11} \quad (\because \text{準備の} (AB)_{11} = A_{11} B_{11})
\end{aligned}
$$

であり、

$$\begin{aligned}
[x]_K[y]_K &= [([x]_K[y]_K)_{11}]_K \quad (\because 1\text{ 行 }1\text{ 列の行列は成分だけで決まる。定義 3.9)}\\
&= [([y]_K[x]_K)_{11}]_K \quad (\because \text{上の鎖})\\
&= [y]_K[x]_K \quad (\because 1\text{ 行 }1\text{ 列の行列は成分だけで決まる。定義 3.9)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[x]_K + [y]_K &= [([x]_K + [y]_K)_{11}]_K \quad (\because 1\text{ 行 }1\text{ 列の行列は成分だけで決まる。定義 3.9)}\\
&= [([x]_K)_{11} + ([y]_K)_{11}]_K \quad (\because \text{行列の和は成分ごと})\\
&= [x+y]_K \quad (\because \text{定義 3.9})
\end{aligned}$$

である。以上を使って

$$\begin{aligned}
\exp(x)\exp(y) &= \big(\exp([x]_K)\big)_{11}\big(\exp([y]_K)\big)_{11} \quad (\because \text{定義 3.11})\\
&= \big(\exp([x]_K)\exp([y]_K)\big)_{11} \quad (\because \text{準備の}(AB)_{11} = A_{11}B_{11})\\
&= \big(\exp([x]_K + [y]_K)\big)_{11} \quad (\because [x]_K[y]_K = [y]_K[x]_K \text{ と可換行列の exp 積公式。定理 3.7})\\
&= \big(\exp([x+y]_K)\big)_{11} \quad (\because [x]_K + [y]_K = [x+y]_K)\\
&= \exp(x+y) \quad (\because \text{定義 3.11})
\end{aligned}$$

□

主張 3.14 ($\exp(0) = 1$)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ とし、$0, 1$ を K の零元と単位元とするとき

$$\exp(0) = 1$$

証明. 準備。$O \in \mathrm{Mat}(1, K)$ を零行列とすると $O = [0]_K$（定義 3.9）である。$m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$\begin{aligned}
([0]_K^m)_{11} &= \big([0]_K^{m-1}[0]_K\big)_{11} \quad (\because \text{行列の冪の定義}A^m := A^{m-1}A\text{。定義 3.4})\\
&= \sum_{j=1}^{1} \big([0]_K^{m-1}\big)_{1j}\,([0]_K)_{j1} \quad (\because \text{行列の積の成分。定義 1.6})\\
&= \big([0]_K^{m-1}\big)_{11}\,([0]_K)_{11} \quad (\because \text{和は}j=1\text{ の }1\text{ 項だけ})\\
&= \big([0]_K^{m-1}\big)_{11} \cdot 0 \quad (\because \text{定義 3.9})\\
&= 0 \quad (\because K\text{ の元に}0\text{ を掛けると}0)
\end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned}
[0]_K^m &= [([0]_K^m)_{11}]_K \quad (\because 1\text{ 行 }1\text{ 列の行列は成分だけで決まる。定義 3.9})\\
&= [0]_K \quad (\because \text{上の鎖})\\
&= O \quad (\because \text{上の}O = [0]_K)
\end{aligned}$$

である。主張 3.2 の部分和について、すべての $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ で

$$
\begin{aligned}
S_N([0]_K) &= \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}[0]_K^m \quad (\because \text{主張 3.2 の} S_N) \\
&= \frac{1}{0!}[0]_K^0 + \sum_{m=1}^{N} \frac{1}{m!}[0]_K^m \quad (\because \text{第 0 項を分ける}) \\
&= \frac{1}{0!}I + \sum_{m=1}^{N} \frac{1}{m!}[0]_K^m \quad (\because \text{行列の冪の定義} A^0 := I\text{。定義 3.4}) \\
&= I + \sum_{m=1}^{N} \frac{1}{m!}[0]_K^m \quad (\because 0! = 1) \\
&= I + \sum_{m=1}^{N} \frac{1}{m!}O \quad (\because \text{上の} [0]_K^m = O\ (m \geq 1)) \\
&= I + \sum_{m=1}^{N} O \quad (\because \text{零行列のスカラー倍は零行列}) \\
&= I + O \quad (\because \text{零行列どうしの和は零行列}) \\
&= I \quad (\because \text{零行列は行列の加法の単位元}) \\
&= [I_{11}]_K \quad (\because 1 \text{ 行 } 1 \text{ 列の行列は成分だけで決まる。定義 3.9}) \\
&= [1]_K \quad (\because \text{単位行列の対角成分は1})
\end{aligned}
$$

である。したがって

$$
\begin{aligned}
\|S_N([0]_K) - [1]_K\| &= \|[1]_K - [1]_K\| \quad (\because \text{上の鎖}) \\
&= \|O\| \quad (\because \text{行列の差は成分ごと}) \\
&= 0 \quad (\because \text{主張 2.92 (1)})
\end{aligned}
$$

がすべての N で成り立ち、値が 0 の定数の実数列は 0 に収束するので、定義 2.91 の意味で $S_N([0]_K) \to [1]_K$ である。一方 定義 3.4 (1) より $S_N([0]_K) \to \exp([0]_K)$ である。主張 2.92 (4) の極限の一意性より $\exp([0]_K) = [1]_K$ であり、

$$
\begin{aligned}
\exp(0) &= \big(\exp([0]_K)\big)_{11} \quad (\because \text{定義 3.11}) \\
&= ([1]_K)_{11} \quad (\because \exp([0]_K) = [1]_K) \\
&= 1 \quad (\because \text{定義 3.9})
\end{aligned}
$$

□

主張 3.15 (実数の有限和の exp は exp の有限積)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$x_1, \ldots, x_m \in \mathbb{R}$ について

$$
\exp\Big(\sum_{j=1}^{m} x_j\Big) = \prod_{j=1}^{m} \exp(x_j)
$$

が成り立つ。exp は 定義 3.11 の $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$、左辺の和は 定義 1.19 の有限和、右辺の積は定義 1.61 の有限積である。

証明. m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき

$$
\begin{aligned}
\exp\Big(\sum_{j=1}^{1} x_j\Big) &= \exp(x_1) \quad (\because \text{定義 1.19}) \\
&= \prod_{j=1}^{1} \exp(x_j) \quad (\because \text{定義 1.61 } (r_j \to \exp(x_j)) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

m で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned}
\exp\Big(\sum_{j=1}^{m+1} x_j\Big) &= \exp\Big(\Big(\sum_{j=1}^{m} x_j\Big) + x_{m+1}\Big) \quad (\because \text{定義 1.19}) \\
&= \exp\Big(\sum_{j=1}^{m} x_j\Big)\exp(x_{m+1}) \quad (\because \text{主張 3.13 } (K \to \mathbb{R},\ x \to \textstyle\sum_{j=1}^{m} x_j,\ y \to x_{m+1}) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \Big(\prod_{j=1}^{m} \exp(x_j)\Big)\exp(x_{m+1}) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \prod_{j=1}^{m+1} \exp(x_j) \quad (\because \text{定義 1.61 } (r_j \to \exp(x_j)) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}$$

□

主張 3.16 ($\exp(x) > 0$)**.** $x \in \mathbb{R}$ について $\exp(x) > 0$。

証明. Step 1（0 でない）。$-x \in \mathbb{R}$ であり、定義 3.11 より $\exp(x), \exp(-x) \in \mathbb{R}$ である。

$$\begin{aligned}
\exp(x)\exp(-x) &= \exp\big(x + (-x)\big) \quad (\because \text{主張 3.13}) \\
&= \exp(0) \quad (\because \text{加法の逆元}) \\
&= 1 \quad (\because \text{主張 3.14})
\end{aligned}$$

である。$\exp(x) = 0$ と仮定すると

$$\begin{aligned}
1 &= \exp(x)\exp(-x) \quad (\because \text{上の鎖}) \\
&= 0 \cdot \exp(-x) \quad (\because \text{仮定} \exp(x) = 0) \\
&= 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の元に} 0 \text{ を掛けると} 0)
\end{aligned}$$

となり $1 \neq 0$ に反する。よって $\exp(x) \neq 0$。

Step 2（非負）。$\frac{x}{2} \in \mathbb{R}$ であり、定義 3.11 より $\exp\big(\frac{x}{2}\big) \in \mathbb{R}$ である。

$$\begin{aligned}
\exp(x) &= \exp\Big(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\Big) \quad (\because \tfrac{x}{2} + \tfrac{x}{2} = x) \\
&= \exp\Big(\frac{x}{2}\Big)\exp\Big(\frac{x}{2}\Big) \quad (\because \text{主張 3.13}) \\
&= \Big(\exp\Big(\frac{x}{2}\Big)\Big)^2 \quad (\because \text{冪の定義}) \\
&\geq 0 \quad (\because \text{実数の平方は非負})
\end{aligned}$$

Step 2 の $\exp(x) \geq 0$ と Step 1 の $\exp(x) \neq 0$ より $\exp(x) > 0$。 □

主張 3.17 (実数の exp は狭義単調増加)**.** $x, y \in \mathbb{R}$ が $x < y$ を満たすなら $\exp(x) < \exp(y)$。

証明. Step 1（$a > 0$ なら $\exp(a) > 1$）。$a \in \mathbb{R}$、$a > 0$ とする。主張 3.1 の $E_N(a) = \sum_{m=0}^{N} \frac{a^m}{m!}$ と $E(a) = \lim_{N\to\infty} E_N(a)$ を使う（$a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ なので適用できる）。$u \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}
\|[u]_{\mathbb{R}}\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^{1}\sum_{j=1}^{1} \Big|([u]_{\mathbb{R}})_{ij}\Big|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \text{定義 2.91 を} n = 1 \text{ で}) \\
&= \sqrt{|([u]_{\mathbb{R}})_{11}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \text{和は} i = j = 1 \text{ の 1 項だけ}) \\
&= \sqrt{|u|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \text{定義 3.9}) \\
&= |u| \quad (\because |u| \in \mathbb{R}_{\geq 0} \text{ かつ} |u|^2 = |u|^2 \text{ なので、定義 1.4 の値の一意性。主張 1.3})
\end{aligned}$$

であり、$u, v \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}
[u]_{\mathbb{R}} - [v]_{\mathbb{R}} &= [([u]_{\mathbb{R}} - [v]_{\mathbb{R}})_{11}]_{\mathbb{R}} \quad (\because 1 \text{ 行 } 1 \text{ 列の行列は成分だけで決まる。定義 } 3.9) \\
&= [([u]_{\mathbb{R}})_{11} - ([v]_{\mathbb{R}})_{11}]_{\mathbb{R}} \quad (\because \text{行列の差は成分ごと}) \\
&= [u - v]_{\mathbb{R}} \quad (\because \text{定義 } 3.9)
\end{aligned}$$

である。よって $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned}
\|[E_N(a)]_{\mathbb{R}} - [E(a)]_{\mathbb{R}}\| &= \|[E_N(a) - E(a)]_{\mathbb{R}}\| \quad (\because \text{上の} [u]_{\mathbb{R}} - [v]_{\mathbb{R}} = [u - v]_{\mathbb{R}}) \\
&= |E_N(a) - E(a)| \quad (\because \text{上の} \|[u]_{\mathbb{R}}\| = |u|) \\
&\to 0 \quad (N \to \infty) \quad (\because E(a) \text{ は} (E_N(a))_N \text{ の極限。主張 } 3.1\ (1))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|[E_N(a)]_{\mathbb{R}} - [\exp(a)]_{\mathbb{R}}\| &= \|[E_N(a) - \exp(a)]_{\mathbb{R}}\| \quad (\because \text{上の} [u]_{\mathbb{R}} - [v]_{\mathbb{R}} = [u - v]_{\mathbb{R}}) \\
&= |E_N(a) - \exp(a)| \quad (\because \text{上の} \|[u]_{\mathbb{R}}\| = |u|) \\
&= \left| \sum_{m=0}^{N} \frac{a^m}{m!} - \exp(a) \right| \quad (\because \text{主張 } 3.1 \text{ の} E_N(a) \text{ の定義。冪} a^m \text{ の約束は主張 } 3.12 \text{ と同じ}) \\
&\to 0 \quad (N \to \infty) \quad (\because \text{主張 } 3.12 \text{ を} K = \mathbb{R},\ x = a \text{ で})
\end{aligned}$$

である。定義 2.91 の意味で $[E_N(a)]_{\mathbb{R}} \to [E(a)]_{\mathbb{R}}$ かつ $[E_N(a)]_{\mathbb{R}} \to [\exp(a)]_{\mathbb{R}}$ だから、主張 2.92 (4) の極限の一意性より $[E(a)]_{\mathbb{R}} = [\exp(a)]_{\mathbb{R}}$ であり、

$$\begin{aligned}
E(a) &= ([E(a)]_{\mathbb{R}})_{11} \quad (\because \text{定義 } 3.9) \\
&= ([\exp(a)]_{\mathbb{R}})_{11} \quad (\because [E(a)]_{\mathbb{R}} = [\exp(a)]_{\mathbb{R}}) \\
&= \exp(a) \quad (\because \text{定義 } 3.9)
\end{aligned}$$

である。よって

$$\begin{aligned}
\exp(a) &= E(a) \quad (\because \text{上の} E(a) = \exp(a)) \\
&\geq E_1(a) \quad (\because \text{主張 } 3.1\ (2)) \\
&= 1 + a \quad (\because E_1(a) = \tfrac{a^0}{0!} + \tfrac{a^1}{1!}) \\
&> 1 \quad (\because a > 0)
\end{aligned}$$

Step 2。$x < y$ より $y - x \in \mathbb{R}$ は $y - x > 0$ を満たすので、Step 1 を $a := y - x$ に適用して $\exp(y - x) > 1$ である。

$$\begin{aligned}
\exp(y) &= \exp\big(x + (y - x)\big) \quad (\because x + (y - x) = y) \\
&= \exp(x) \exp(y - x) \quad (\because \text{主張 } 3.13) \\
&> \exp(x) \cdot 1 \quad (\because \exp(y - x) > 1 \text{ の両辺に} \exp(x) > 0 \text{ 主張 } 3.16 \text{ を掛ける}) \\
&= \exp(x) \quad (\because 1 \text{ は乗法の単位元})
\end{aligned}$$

□

主張 3.18 (実数の exp と複素数の exp は実数上で一致する)**.** $x \in \mathbb{R}$ について、定義 1.13 の記法で

$$\exp(x_{\mathbb{C}}) = (\exp(x))_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。左辺は複素数の exp、右辺の内側は実数の exp である（定義 3.11)。

証明. 準備。$a, b \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned} a_{\mathbb{C}} + b_{\mathbb{C}} &= (a,0) + (b,0) \quad (\because \text{定義 1.13}) \\ &= (a+b,\ 0+0) \quad (\because \text{定義 1.12 の和}) \\ &= (a+b,\ 0) \quad (\because 0+0=0) \\ &= (a+b)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 1.13}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{\mathbb{C}}\, b_{\mathbb{C}} &= (a,0)\,(b,0) \quad (\because \text{定義 1.13}) \\ &= (ab - 0\cdot 0,\ a\cdot 0 + 0\cdot b) \quad (\because \text{定義 1.12 の積}) \\ &= (ab,\ 0) \quad (\because 0\cdot 0 = a\cdot 0 = 0\cdot b = 0) \\ &= (ab)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 1.13}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{\mathbb{C}} - b_{\mathbb{C}} &= a_{\mathbb{C}} + (-b_{\mathbb{C}}) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の差は加法の逆元を足すこと}) \\ &= a_{\mathbb{C}} + (-1)_{\mathbb{C}}\, b_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 1.14。} -1_{\mathbb{C}} \text{ は定義 1.13 の略記} r_{\mathbb{C}} \text{ の} r=-1) \\ &= a_{\mathbb{C}} + ((-1)\, b)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の積の鎖}) \\ &= (a + (-1)\, b)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の和の鎖}) \\ &= (a-b)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{実数の四則}) \end{aligned}$$

次に、$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $(x_{\mathbb{C}})^m = (x^m)_{\mathbb{C}}$ を m に関する帰納法で示す（冪の約束 $x^0 := 1$、$x^{m+1} := x^m\, x$ は 主張 3.12 のもので、左辺は $K = \mathbb{C}$、右辺の内側は $K = \mathbb{R}$ の冪である）。$m = 0$ では

$$\begin{aligned} (x_{\mathbb{C}})^0 &= 1_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{冪の約束} x^0 := 1 \text{ を} K = \mathbb{C} \text{ で。主張 3.12}) \\ &= \left(x^0\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は定義 1.13 の略記} r_{\mathbb{C}} \text{ の} r = 1 \text{ と、冪の約束} x^0 := 1 \text{ を} K = \mathbb{R} \text{ で。主張 3.12}) \end{aligned}$$

m で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned} (x_{\mathbb{C}})^{m+1} &= (x_{\mathbb{C}})^m\, x_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{冪の約束} x^{m+1} := x^m\, x \text{ を} K = \mathbb{C} \text{ で。主張 3.12}) \\ &= (x^m)_{\mathbb{C}}\, x_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= (x^m\, x)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の積の鎖}) \\ &= \left(x^{m+1}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{冪の約束} x^{m+1} := x^m\, x \text{ を} K = \mathbb{R} \text{ で。主張 3.12}) \end{aligned}$$

である。よって $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned} \frac{(x_{\mathbb{C}})^m}{m!} &= \left(\frac{1}{m!}\right)_{\mathbb{C}} (x_{\mathbb{C}})^m \quad (\because K = \mathbb{C} \text{ の} x^m/m! \text{ は実数係数} 1/m! \text{ を定義 1.13 で掛けたもの。主張 3.12 の Step 2、定義 3.4}) \\ &= \left(\frac{1}{m!}\right)_{\mathbb{C}} (x^m)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の} (x_{\mathbb{C}})^m = (x^m)_{\mathbb{C}}) \\ &= \left(\frac{1}{m!}\, x^m\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の積の鎖}) \\ &= \left(\frac{x^m}{m!}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{実数の四則}) \end{aligned}$$

である。$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $E_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{x^m}{m!} \in \mathbb{R}$ とおき、$\sum_{m=0}^{N} \frac{(x_{\mathbb{C}})^m}{m!} = (E_N)_{\mathbb{C}}$ を N に関する帰納法で示す。$N = 0$ では

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^{0} \frac{(x_{\mathbb{C}})^m}{m!} &= \frac{(x_{\mathbb{C}})^0}{0!} \quad (\because \text{和は} m = 0 \text{ の 1 項だけ}) \\ &= \left(\frac{x^0}{0!}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の項の鎖}) \\ &= (E_0)_{\mathbb{C}} \quad (\because E_0 \text{ の定義}) \end{aligned}$$

N で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned}
\sum_{m=0}^{N+1}\frac{(x_{\mathbb{C}})^m}{m!} &= \sum_{m=0}^{N}\frac{(x_{\mathbb{C}})^m}{m!}+\frac{(x_{\mathbb{C}})^{N+1}}{(N+1)!} \quad (\because \text{有限和の最後の項を分ける})\\
&= (E_N)_{\mathbb{C}}+\frac{(x_{\mathbb{C}})^{N+1}}{(N+1)!} \quad (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= (E_N)_{\mathbb{C}}+\left(\frac{x^{N+1}}{(N+1)!}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の項の鎖})\\
&= \left(E_N+\frac{x^{N+1}}{(N+1)!}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の和の鎖})\\
&= (E_{N+1})_{\mathbb{C}} \quad (\because E_{N+1} \text{ の定義と、有限和の最後の項を分ける})
\end{aligned}$$

である。また $u,v,w\in\mathbb{C}$ について

$$\begin{aligned}
[u]_{\mathbb{C}}-[v]_{\mathbb{C}} &= [([u]_{\mathbb{C}}-[v]_{\mathbb{C}})_{11}]_{\mathbb{C}} \quad (\because 1 \text{ 行 } 1 \text{ 列の行列は成分だけで決まる。定義 } 3.9)\\
&= [([u]_{\mathbb{C}})_{11}-([v]_{\mathbb{C}})_{11}]_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 } 1.92 \text{ を} m=p=1,\ i=k=1 \text{ で})\\
&= [u-v]_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 } 3.9)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|[w]_{\mathbb{C}}\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^{1}\sum_{j=1}^{1}\left|([w]_{\mathbb{C}})_{ij}\right|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \text{定義 } 2.91 \text{ を} n=1 \text{ で})\\
&= \sqrt{|([w]_{\mathbb{C}})_{11}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \text{和は} i=j=1 \text{ の } 1 \text{ 項だけ})\\
&= \sqrt{|w|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \text{定義 } 3.9)\\
&= |w| \quad (\because |w|\in\mathbb{R}_{\geq 0} \text{ かつ} |w|^2=|w|^2 \text{ なので、定義 } 1.4 \text{ の値の一意性。主張 } 1.3)
\end{aligned}$$

である。以下の $\exp(x)\in\mathbb{R}$ と $\exp(x_{\mathbb{C}})\in\mathbb{C}$ は極限で定まる量であり、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出している（理由: 極限。定義 3.4)。部分和 E_N は有限和である。以上を使うと、$N\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned}
\left\|[(E_N)_{\mathbb{C}}]_{\mathbb{C}}-[(\exp(x))_{\mathbb{C}}]_{\mathbb{C}}\right\| &= \left\|[(E_N)_{\mathbb{C}}-(\exp(x))_{\mathbb{C}}]_{\mathbb{C}}\right\| \quad (\because \text{上の} [u]_{\mathbb{C}}-[v]_{\mathbb{C}}=[u-v]_{\mathbb{C}})\\
&= |(E_N)_{\mathbb{C}}-(\exp(x))_{\mathbb{C}}| \quad (\because \text{上の} \|[w]_{\mathbb{C}}\|=|w|)\\
&= |(E_N-\exp(x))_{\mathbb{C}}| \quad (\because \text{上の差の鎖})\\
&= |E_N-\exp(x)| \quad (\because \text{主張 } 1.75 \text{ (6)})\\
&= \left|\sum_{m=0}^{N}\frac{x^m}{m!}-\exp(x)\right| \quad (\because E_N \text{ の定義})\\
&\to 0 \quad (N\to\infty) \quad (\because \text{主張 } 3.12 \text{ を} K=\mathbb{R} \text{ で。定義 } 2.91 \text{ の} K \text{ の列の収束})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left\|[(E_N)_{\mathbb{C}}]_{\mathbb{C}}-[\exp(x_{\mathbb{C}})]_{\mathbb{C}}\right\| &= \left\|[(E_N)_{\mathbb{C}}-\exp(x_{\mathbb{C}})]_{\mathbb{C}}\right\| \quad (\because \text{上の} [u]_{\mathbb{C}}-[v]_{\mathbb{C}}=[u-v]_{\mathbb{C}})\\
&= |(E_N)_{\mathbb{C}}-\exp(x_{\mathbb{C}})| \quad (\because \text{上の} \|[w]_{\mathbb{C}}\|=|w|)\\
&= \left|\sum_{m=0}^{N}\frac{(x_{\mathbb{C}})^m}{m!}-\exp(x_{\mathbb{C}})\right| \quad (\because \text{上の部分和の鎖})\\
&\to 0 \quad (N\to\infty) \quad (\because \text{主張 } 3.12 \text{ を} K=\mathbb{C} \text{ で。定義 } 2.91 \text{ の} K \text{ の列の収束})
\end{aligned}$$

である。定義 2.91 の意味で $[(E_N)_{\mathbb{C}}]_{\mathbb{C}}\to[(\exp(x))_{\mathbb{C}}]_{\mathbb{C}}$ かつ $[(E_N)_{\mathbb{C}}]_{\mathbb{C}}\to[\exp(x_{\mathbb{C}})]_{\mathbb{C}}$ だから、主張 2.92 (4) の極限の一意性より $[\exp(x_{\mathbb{C}})]_{\mathbb{C}}=[(\exp(x))_{\mathbb{C}}]_{\mathbb{C}}$ であり、

$$\begin{aligned}\exp(x_{\mathbb{C}}) &= ([\exp(x_{\mathbb{C}})]_{\mathbb{C}})_{11} \quad (\because \text{定義 3.9})\\ &= \big([(\exp(x))_{\mathbb{C}}]_{\mathbb{C}}\big)_{11} \quad (\because [\exp(x_{\mathbb{C}})]_{\mathbb{C}} = [(\exp(x))_{\mathbb{C}}]_{\mathbb{C}})\\ &= (\exp(x))_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 3.9})\end{aligned}$$

である。 □

定義 3.19 (双曲線余弦と双曲線正弦)**.** $x \in \mathbb{R}$ に対して、定義 3.11 の実数の exp を使い

$$\cosh x := \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2}, \qquad \sinh x := \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2}$$

と定める。

定理 3.20 ($\cosh, \sinh$ の掛け算)**.** 定義 3.19 の記号を用いる。

$$\forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned}\cosh(a)\sinh(b) &= \frac{1}{2}\left(\sinh(a+b) - \sinh(a-b)\right)\\ \cosh(a)\cosh(b) &= \frac{1}{2}\left(\cosh(a+b) + \cosh(a-b)\right)\end{aligned}$$

証明. $a, b \in \mathbb{R}$ なので $-a,\ -b,\ a+b,\ a-b \in \mathbb{R}$ であり、以下に現れる exp はすべて 定義 3.11 の実数の exp である。

1 つめの等式。

$$\begin{aligned}\cosh(a)\sinh(b) &= \frac{\exp(a)+\exp(-a)}{2} \cdot \frac{\exp(b)-\exp(-b)}{2} && (\because \cosh,\ \sinh \text{ の定義。定義 3.19})\\ &= \frac{1}{4}\big(\exp(a)+\exp(-a)\big)\big(\exp(b)-\exp(-b)\big) && (\because \text{分数の積})\\ &= \frac{1}{4}\big(\exp(a)\exp(b) - \exp(a)\exp(-b) + \exp(-a)\exp(b) - \exp(-a)\exp(-b)\big) && (\because \text{分配則})\\ &= \frac{1}{4}\big(\exp(a+b) - \exp(a+(-b)) + \exp((-a)+b) - \exp((-a)+(-b))\big) && (\because \exp(s)\exp(t) = \exp(s+t) \text{ を 4 箇所へ。主張 3.13})\\ &= \frac{1}{4}\big(\exp(a+b) - \exp(a-b) + \exp(-(a-b)) - \exp(-(a+b))\big) && (\because a+(-b) = a-b,\ (-a)+b = -(a-b),\ (-a)+(-b) = -(a+b))\\ &= \frac{1}{4}\Big(\big(\exp(a+b) - \exp(-(a+b))\big) - \big(\exp(a-b) - \exp(-(a-b))\big)\Big) && (\because \text{項の並べ替えとくくり})\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\Big(\big(\exp(a+b) - \exp(-(a+b))\big) - \big(\exp(a-b) - \exp(-(a-b))\big)\Big) && (\because \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2})\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\exp(a+b) - \exp(-(a+b))}{2} - \frac{\exp(a-b) - \exp(-(a-b))}{2}\right) && (\because \text{分配則})\\ &= \frac{1}{2}\left(\sinh(a+b) - \sinh(a-b)\right) && (\because \sinh \text{ の定義を 2 箇所へ。定義 3.19})\end{aligned}$$

2 つめの等式。

$$\begin{aligned}\cosh(a)\cosh(b) &= \frac{\exp(a)+\exp(-a)}{2} \cdot \frac{\exp(b)+\exp(-b)}{2} && (\because \cosh \text{ の定義。定義 3.19})\\ &= \frac{1}{4}\big(\exp(a)+\exp(-a)\big)\big(\exp(b)+\exp(-b)\big) && (\because \text{分数の積})\\ &= \frac{1}{4}\big(\exp(a)\exp(b) + \exp(a)\exp(-b) + \exp(-a)\exp(b) + \exp(-a)\exp(-b)\big) && (\because \text{分配則})\\ &= \frac{1}{4}\big(\exp(a+b) + \exp(a+(-b)) + \exp((-a)+b) + \exp((-a)+(-b))\big) && (\because \exp(s)\exp(t) = \exp(s+t) \text{ を 4 箇所へ。主張 3.13})\\ &= \frac{1}{4}\big(\exp(a+b) + \exp(a-b) + \exp(-(a-b)) + \exp(-(a+b))\big) && (\because a+(-b) = a-b,\ (-a)+b = -(a-b),\ (-a)+(-b) = -(a+b))\\ &= \frac{1}{4}\Big(\big(\exp(a+b) + \exp(-(a+b))\big) + \big(\exp(a-b) + \exp(-(a-b))\big)\Big) && (\because \text{項の並べ替えとくくり})\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\Big(\big(\exp(a+b) + \exp(-(a+b))\big) + \big(\exp(a-b) + \exp(-(a-b))\big)\Big) && (\because \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2})\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\exp(a+b) + \exp(-(a+b))}{2} + \frac{\exp(a-b) + \exp(-(a-b))}{2}\right) && (\because \text{分配則})\\ &= \frac{1}{2}\left(\cosh(a+b) + \cosh(a-b)\right) && (\because \cosh \text{ の定義を 2 箇所へ。定義 3.19})\end{aligned}$$

□

主張 3.21 ($\cosh,\ \sinh$ の基本性質)**.** 定義 3.19 の $x \in \mathbb{R}$ における値について、次が成り立つ。

- (1) $\cosh x - \sinh x = \exp(-x) > 0$ かつ $\cosh x + \sinh x = \exp(x) > 0$。特に $\cosh x > 0$ かつ $\cosh x > \sinh x$。
- (2) $(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 = 1$。
- (3) $x > 0$ ならば $\cosh x > \sinh x > 0$。
- (4) $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ について $a^2 = b^2 \iff a = b$。

証明. (1) の証明。

$$\begin{aligned}
\cosh x - \sinh x &= \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} - \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} && (\because \text{ cosh, sinh の定義}) \\
&= \frac{\big(\exp(x) + \exp(-x)\big) - \big(\exp(x) - \exp(-x)\big)}{2} && (\because \text{ 分母の等しい分数の差}) \\
&= \frac{2\exp(-x)}{2} && (\because \text{ 分子の整理}) \\
&= \exp(-x) && (\because \text{ 約分})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cosh x + \sinh x &= \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} + \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} && (\because \text{ cosh, sinh の定義}) \\
&= \frac{\big(\exp(x) + \exp(-x)\big) + \big(\exp(x) - \exp(-x)\big)}{2} && (\because \text{ 分母の等しい分数の和}) \\
&= \frac{2\exp(x)}{2} && (\because \text{ 分子の整理}) \\
&= \exp(x) && (\because \text{ 約分})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cosh x - \sinh x &= \exp(-x) && (\because \text{ 上の第 1 式}) \\
&> 0 && (\because \exp \text{ の正値性。主張 3.16})
\end{aligned}$$

$$\cosh x - \sinh x > 0 \Longrightarrow \cosh x > \sinh x \quad (\because \text{ 両辺に } \sinh x \text{ を加える})$$

$$\begin{aligned}
2\cosh x &= (\cosh x - \sinh x) + (\cosh x + \sinh x) && (\because \text{ 右辺の整理}) \\
&= \exp(-x) + \exp(x) && (\because \text{ 上の 2 式}) \\
&> 0 && (\because \exp \text{ の正値性。主張 3.16})
\end{aligned}$$

$$2\cosh x > 0 \Longrightarrow \cosh x > 0 \quad (\because \text{ 両辺を } 2 > 0 \text{ で割る})$$

(2) の証明。

$$\begin{aligned}
(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 &= (\cosh x - \sinh x)(\cosh x + \sinh x) && (\because \text{ 2 乗の差の因数分解}) \\
&= \exp(-x)\exp(x) && (\because \text{ (1) の 2 式}) \\
&= \exp(-x + x) && (\because \text{ 主張 3.13}) \\
&= \exp(0) && (\because -x + x = 0) \\
&= 1 && (\because \text{ 主張 3.14})
\end{aligned}$$

(3) の証明。

$$x > 0 \Longrightarrow -x < 0 \quad (\because \text{ 両辺に } -1 < 0 \text{ を掛けると不等号の向きが反転する})$$
$$x > 0 \Longrightarrow 0 < x \quad (\because \text{ 同じ不等式の左右を入れ替える})$$

$$\begin{aligned}\exp(-x) &< \exp(0) && (\because\ -x < 0 \text{ と 主張 3.17})\\ &= 1 && (\because\ \text{主張 3.14})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1 &= \exp(0) && (\because\ \text{主張 3.14})\\ &< \exp(x) && (\because\ 0 < x \text{ と 主張 3.17})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\exp(-x) < 1 < \exp(x) &\Longrightarrow \exp(-x) < \exp(x) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の順序の推移律})\\ &\Longrightarrow \exp(x) - \exp(-x) > 0 && (\because\ \text{両辺に} -\exp(-x) \text{ を加える})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sinh x &= \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} && (\because\ \sinh \text{ の定義})\\ &> 0 && (\because\ \text{正の実数を } 2 > 0 \text{ で割った値は正})\end{aligned}$$

$$\cosh x > \sinh x \ \wedge\ \sinh x > 0 \Longrightarrow \cosh x > \sinh x > 0 \quad (\because\ (1) \text{ と直前の不等式})$$

(4) の証明。両方向を別々に示すので、ここは一続きの式にしない。

$$a = b \Longrightarrow a^2 = b^2 \quad (\because\ \text{等しい実数を二乗しても等しい})$$

逆に $a^2 = b^2$ とする。

$$\begin{aligned}(a-b)(a+b) &= a^2 - b^2 && (\because\ 2 \text{ 乗の差の因数分解})\\ &= 0 && (\because\ a^2 = b^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a > 0 \ \wedge\ b > 0 &\Longrightarrow a + b > 0 && (\because\ \text{正の実数の和は正})\\ &\Longrightarrow a + b \neq 0 && (\because\ \text{正の実数は0 でない})\\ (a-b)(a+b) = 0 \ \wedge\ a + b \neq 0 &\Longrightarrow a - b = 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ は整域})\\ &\Longrightarrow a = b && (\because\ \text{両辺に} b \text{ を加える})\end{aligned}$$

□

4 行列と線型写像の対応と、対角行列の指数関数

定義 4.1 (**end** : $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \to \mathrm{End}(\mathcal{F})$)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、

$$\mathcal{F} := \mathbb{C}^{2^M}$$

とおく（2^M 次元の数ベクトル全体。定義 2.72 のクロネッカー積 $v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M$ が住む空間である）。$\mathbb{C}^2$ の標準基底を $e_1 := (1, 0),\ e_2 := (0, 1)$、$\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の行列単位を E_{ij}（(i, j) 成分が 1 で他が 0、$i, j \in \{1, 2\}$）とする。多重添字 $\mathcal{I} := \{1, 2\}^M$ の元 $I = (i_1, \ldots, i_M),\ J = (j_1, \ldots, j_M)$ について

$$f_I := e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M} \in \mathcal{F}, \qquad E_{I,J} := E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M} \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

とおく（定義 2.72 のクロネッカー積。$f_I \in \mathbb{C}^{2^M}$ は数ベクトル、$E_{I,J} \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ は 2^M 次の複素行列である）。定理 2.88 (3) と (1) より $(f_I)_{I \in \mathcal{I}}$ は $\mathcal{F}$ の $\mathbb{C}$-基底（$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{F} = 2^M$）であり、$(E_{I,J})_{I,J \in \mathcal{I}}$ は $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底（$\dim_{\mathbb{C}} = 4^M$）である。さらに $\Theta_{I,J} \in \mathrm{End}(\mathcal{F})$ を、基底 $(f_K)_{K \in \mathcal{I}}$ 上の値

$$\Theta_{I,J}(f_K) := \begin{cases} f_I & (K = J)\\ 0 & (K \neq J)\end{cases}$$

で定まる $\mathbb{C}$-線型写像とする（基底上の値を与えれば線型写像が一意に定まる）。このとき **end** を、基底 $(E_{I,J})$ 上で

$$\mathbf{end}(E_{I,J}) := \Theta_{I,J} \qquad (I, J \in \mathcal{I})$$

と定めて $\mathbb{C}$-線型に拡張した写像

$$\mathbf{end} : \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \to \mathrm{End}(\mathcal{F})$$

とおく（この写像が積と単位行列を保つ全単射であることは、直後の主張で成分計算から示す）。$A \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の $\mathcal{F}$ への作用 Af（$f \in \mathcal{F}$）は、以後つねに $(\mathbf{end}(A))(f)$ を意味する。

定義 4.2 (対角行列)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$D \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）とする。すべての $k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$k \neq l \implies D_{kl} = 0_{\mathbb{C}}$$

が成り立つとき、D を対角行列と呼ぶ。D_{kk}（$k \in \{1, \ldots, n\}$）を D の対角成分と呼ぶ。$0_{\mathbb{C}}$ は定義 1.13 の略記である。

主張 4.3 (対角行列の指数関数)**.** 行列の積は 定義 1.6、複素成分の演算は 主張 1.56、指数級数の部分和の実数の係数 $1/p!$（$p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）の複素数への包含は 定義 1.13 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$D \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が対角行列（定義 4.2）で、$k \in \{1, \ldots, n\}$ について対角成分を $d_k := D_{kk}$ とすると、すべての $k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$\exp(D)_{kl} = \begin{cases} \exp(d_k) & (k = l) \\ 0 & (k \neq l) \end{cases}$$

すなわち $\exp(D)$ も対角行列で、対角成分は $\exp(d_k)$ である。左辺の exp は 定義 3.4 (1) の行列の exp、右辺の exp は 定義 3.11 の複素数の exp であり、どちらも極限で定まる量である。また証明の中の絶対値の値は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に入り（定義 1.74）、$\mathbb{C}$ の列の収束は実数列の収束である。これらの理由（極限）で、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出している。

証明. 証明の中では、$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ は主張のとおりとし、$p, N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とし、数の冪を $d_k^0 := 1_{\mathbb{C}}$、$d_k^{p+1} := d_k^p \, d_k$ で、行列の冪を 定義 3.4 の $D^0 := I$、$D^{p+1} := D^p D$ で表す。定義 3.4 を $K := \mathbb{C}$ として用いるので、その単位行列 I は 定義 2.2 の $I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ であり、δ_{kl} は 定義 2.1 のものである。部分和を

$$S_N := \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!} D^p \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$$

とおく。

中間目標: 対角行列の積。$P, Q \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ を対角行列とする。$k \neq l$ のとき

$$\begin{aligned} (PQ)_{kl} &= \sum_{j=1}^{n} P_{kj} Q_{jl} \quad (\because \text{定義 1.6}) \\ &= P_{kk} Q_{kl} \quad (\because j \neq k \text{ の項は} P_{kj} = 0) \\ &= 0 \quad (\because k \neq l \text{ より} Q_{kl} = 0) \end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned} (PQ)_{kk} &= \sum_{j=1}^{n} P_{kj} Q_{jk} \quad (\because \text{定義 1.6}) \\ &= P_{kk} Q_{kk} \quad (\because j \neq k \text{ の項は} P_{kj} = 0) \end{aligned}$$

である。すなわち対角行列どうしの積は対角行列で、対角成分は対角成分どうしの積である。

中間目標: 対角行列の冪。「D^p は対角行列で $(D^p)_{kk} = d_k^p$」を p に関する帰納法で示す。

$p = 0$ では、$k \neq l$ のとき

$$\begin{aligned}(D^0)_{kl} &= \left(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\right)_{kl} \quad (\because D^0 := I\text{。定義 3.4}) \\ &= \delta_{kl} \quad (\because \text{定義 2.2}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because k \neq l\text{。定義 2.1})\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}(D^0)_{kk} &= \left(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\right)_{kk} \quad (\because D^0 := I\text{。定義 3.4}) \\ &= \delta_{kk} \quad (\because \text{定義 2.2}) \\ &= 1_{\mathbb{C}} \quad (\because k = k\text{。定義 2.1}) \\ &= d_k^0 \quad (\because d_k^0 := 1_{\mathbb{C}})\end{aligned}$$

である。p で成り立つと仮定する。$k \neq l$ のとき

$$\begin{aligned}(D^{p+1})_{kl} &= (D^p D)_{kl} \quad (\because D^{p+1} := D^p D\text{。定義 3.4}) \\ &= 0 \quad (\because D^p \text{ は対角行列（帰納法の仮定）で、上の対角行列の積を} P := D^p,\ Q := D \text{ として適用})\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}(D^{p+1})_{kk} &= (D^p D)_{kk} \quad (\because D^{p+1} := D^p D\text{。定義 3.4}) \\ &= (D^p)_{kk}\, D_{kk} \quad (\because D^p \text{ は対角行列（帰納法の仮定）で、上の対角行列の積を} P := D^p,\ Q := D \text{ として適用}) \\ &= d_k^p\, D_{kk} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= d_k^p\, d_k \quad (\because d_k := D_{kk}) \\ &= d_k^{p+1} \quad (\because d_k^{p+1} := d_k^p\, d_k)\end{aligned}$$

である。

中間目標: 指数級数の部分和の成分。

$$\begin{aligned}(S_N)_{kk} &= \left(\sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!} D^p\right)_{kk} \quad (\because S_N \text{ の定義}) \\ &= \sum_{p=0}^{N} \left(\frac{1}{p!} D^p\right)_{kk} \quad (\because \text{主張 2.7}) \\ &= \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!} (D^p)_{kk} \quad (\because \text{定義 2.3 を各項へ同時に適用}) \\ &= \sum_{p=0}^{N} \frac{d_k^p}{p!} \quad (\because \text{上の対角行列の冪を各項へ適用})\end{aligned}$$

$k \neq l$ のとき

$$
\begin{aligned}
(S_N)_{kl} &= \left(\sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!} D^p\right)_{kl} \quad (\because S_N \text{ の定義}) \\
&= \sum_{p=0}^{N} \left(\frac{1}{p!} D^p\right)_{kl} \quad (\because \text{主張 2.7}) \\
&= \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!} (D^p)_{kl} \quad (\because \text{定義 2.3 を各項へ同時に適用}) \\
&= \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!} \cdot 0 \quad (\because \text{上の対角行列の冪より} D^p \text{ は対角行列}) \\
&= 0
\end{aligned}
$$

中間目標: 極限。定義 3.4 (1) より $\exp(D) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} D^p$ だから、定理 3.3 (1b) を $A = D$ に適用すると、すべての (k, l) について 定義 2.91 の $\mathbb{C}$ の列の収束の意味で

$$
(S_N)_{kl} \to \exp(D)_{kl} \quad (N \to \infty)
$$

である。$k \neq l$ のとき、$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
|(S_N)_{kl} - 0| &= |0 - 0| \quad (\because \text{上の部分和の成分} (S_N)_{kl} = 0) \\
&= |0| \quad (\because 0 - 0 = 0) \\
&= 0 \quad (\because \text{主張 1.75 (3)}) \\
&\to 0 \quad (N \to \infty) \quad (\because \text{各項が0 の実数列})
\end{aligned}
$$

であり、これは 定義 2.91 の $\mathbb{C}$ の列の収束の意味で $(S_N)_{kl} \to 0$ である。よって

$\exp(D)_{kl} = 0$ $(\because$ 主張 3.10 を、体を$\mathbb{C}$、列を$\big((S_N)_{kl}\big)_N$、$a := \exp(D)_{kl}$、$a' := 0$ として。上の二つの収束$)$

である。$k = l$ のとき、$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
|(S_N)_{kk} - \exp(d_k)| &= \left|\sum_{p=0}^{N} \frac{d_k^p}{p!} - \exp(d_k)\right| \quad (\because \text{上の部分和の成分}) \\
&\to 0 \quad (N \to \infty) \quad (\because \text{主張 3.12 を、体を}\mathbb{C}、x := d_k \text{ として})
\end{aligned}
$$

であり、これは 定義 2.91 の $\mathbb{C}$ の列の収束の意味で $(S_N)_{kk} \to \exp(d_k)$ である。よって

$\exp(D)_{kk} = \exp(d_k)$ $(\because$ 主張 3.10 を、体を$\mathbb{C}$、列を$\big((S_N)_{kk}\big)_N$、$a := \exp(D)_{kk}$、$a' := \exp(d_k)$ として。上の二つの収束$)$

である。 □

主張 4.4 (**end** は単位的$\mathbb{C}$-代数の同型)**.** 定義 4.1 の **end** について、次が成り立つ。

- (1) **end** は $\mathbb{C}$-線型同型（全単射）である。
- (2) $\mathbf{end}(AB) = \mathbf{end}(A) \circ \mathbf{end}(B)$（$A, B \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$）。
- (3) $\mathbf{end}\Big(I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})}\Big) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$。

証明. 記号は 定義 4.1 のものとする。多重添字 $I, J \in \mathcal{I} = \{1,2\}^M$ について $\delta_{I,J} := 1$（$I = J$）、0（$I \neq J$）とおく。成分ごとの $\delta_{i,j}$ についても同様とし、$I = J \iff \forall m,\ i_m = j_m$ より

$$\delta_{I,J} = \prod_{m=1}^{M} \delta_{i_m,j_m} \quad (\because\ I = J \iff \forall m,\ i_m = j_m \text{ と} \delta \text{ の定義}).$$

Step 1: $(\Theta_{I,J})_{I,J\in\mathcal{I}}$ は $\mathrm{End}(\mathcal{F})$ の $\mathbb{C}$-基底である。まず張ること: $T \in \mathrm{End}(\mathcal{F})$ を任意に取り、基底 (f_I) による表示 $T(f_J) = \sum_{I\in\mathcal{I}} t_{I,J} f_I$（$t_{I,J} \in \mathbb{C}$ は一意）を取ると、任意の $K \in \mathcal{I}$ について

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} t_{I,J}\Theta_{I,J}\right)(f_K) &= \sum_{I,J\in\mathcal{I}} t_{I,J}\,\Theta_{I,J}(f_K) && (\because\ \text{線型写像の和とスカラー倍の値の定義})\\
&= \sum_{I,J\in\mathcal{I}} t_{I,J}\,\delta_{J,K} f_I && (\because\ \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I\ (\Theta_{I,J}\ \text{の定義}))\\
&= \sum_{I\in\mathcal{I}} t_{I,K} f_I && (\because\ \delta_{J,K}\ \text{は}\ J = K\ \text{のときだけ 1 で他は 0})\\
&= T(f_K) && (\because\ T(f_K) = \sum_{I\in\mathcal{I}} t_{I,K} f_I\ (\text{表示の取り方}))
\end{aligned}$$

であり、基底上で一致する線型写像は等しいから $T = \sum_{I,J} t_{I,J}\Theta_{I,J}$。次に線型独立性: $c_{I,J} \in \mathbb{C}$ が $\sum_{I,J} c_{I,J}\Theta_{I,J} = 0$ を満たすとすると、各 K について次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
0 &= \left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} c_{I,J}\Theta_{I,J}\right)(f_K) && (\because\ \sum_{I,J} c_{I,J}\Theta_{I,J} = 0)\\
&= \sum_{I,J\in\mathcal{I}} c_{I,J}\delta_{J,K} f_I && (\because\ \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I\ \text{と線型写像の和の値の定義})\\
&= \sum_{I\in\mathcal{I}} c_{I,K} f_I && (\because\ \delta_{J,K}\ \text{は}\ J = K\ \text{のときだけ 1 で他は 0})
\end{aligned}$$

(f_I) が基底だからすべての I で $c_{I,K} = 0$。K は任意だからすべての係数が 0 である。

Step 2: (1)。**end** は基底 $(E_{I,J})$ を基底 $(\Theta_{I,J})$ へ、添字を保って一対一に写す線型写像である。基底を基底へ写す線型写像は全単射である（基底の像が張るので全射、基底の像が線型独立なので単射）。

Step 3: (2)。両辺は (A, B) について $\mathbb{C}$-双線型（左辺は積の双線型性と **end** の線型性、右辺は写像の合成の双線型性）だから、基底の元 $A = E_{I,J},\ B = E_{K,L}$ について示せば十分である。$\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の行列単位の積は $E_{ij}E_{kl} = \delta_{j,k}E_{il}$（成分計算）であるから、クロネッカー積の積の規則（主張 2.73 (1)）と各因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 2.74）より

$$\begin{aligned}
E_{I,J}E_{K,L} &= (E_{i_1j_1}E_{k_1l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{i_Mj_M}E_{k_Ml_M}) && (\because\ \text{クロネッカー積の積の規則})\\
&= (\delta_{j_1,k_1}E_{i_1l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\delta_{j_M,k_M}E_{i_Ml_M}) && (\because\ E_{ij}E_{kl} = \delta_{j,k}E_{il}\ \text{を各因子へ同時に適用})\\
&= \left(\prod_{m=1}^{M} \delta_{j_m,k_m}\right)\left(E_{i_1l_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_Ml_M}\right) && (\because\ \text{各因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性})\\
&= \left(\prod_{m=1}^{M} \delta_{j_m,k_m}\right) E_{I,L} && (\because\ E_{I,L}\ \text{の定義})\\
&= \delta_{J,K}E_{I,L} && (\because\ \delta_{J,K} = \prod_{m=1}^{M} \delta_{j_m,k_m})
\end{aligned}$$

一方、任意の $P \in \mathcal{I}$ について

$$\begin{aligned}
(\Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L})(f_P) &= \Theta_{I,J}(\Theta_{K,L}(f_P)) && (\because \text{ 写像の合成の定義}) \\
&= \Theta_{I,J}(\delta_{L,P} f_K) && (\because \Theta_{K,L}(f_P) = \delta_{L,P} f_K \text{（}\Theta_{K,L} \text{ の定義）}) \\
&= \delta_{L,P}\, \Theta_{I,J}(f_K) && (\because \Theta_{I,J} \text{ の } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= \delta_{L,P}\, \delta_{J,K}\, f_I && (\because \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I \text{（}\Theta_{I,J} \text{ の定義）}) \\
&= \delta_{J,K}\, \delta_{L,P}\, f_I && (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則}) \\
&= \delta_{J,K}\, \Theta_{I,L}(f_P) && (\because \Theta_{I,L}(f_P) = \delta_{L,P} f_I \text{（}\Theta_{I,L} \text{ の定義）})
\end{aligned}$$

であり、基底上で一致するから $\Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L} = \delta_{J,K} \Theta_{I,L}$。よって

$$\begin{aligned}
\mathbf{end}(E_{I,J} E_{K,L}) &= \mathbf{end}(\delta_{J,K} E_{I,L}) && (\because \text{ 上で示した } E_{I,J} E_{K,L} = \delta_{J,K} E_{I,L}) \\
&= \delta_{J,K}\, \mathbf{end}(E_{I,L}) && (\because \mathbf{end} \text{ の } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= \delta_{J,K}\, \Theta_{I,L} && (\because \mathbf{end}(E_{I,L}) = \Theta_{I,L} \text{（}\mathbf{end} \text{ の定義）}) \\
&= \Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L} && (\because \text{ 上で示した } \Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L} = \delta_{J,K} \Theta_{I,L}) \\
&= \mathbf{end}(E_{I,J}) \circ \mathbf{end}(E_{K,L}) && (\because \mathbf{end} \text{ の定義を 2 箇所へ同時に適用})
\end{aligned}$$

Step 4: (3)。$I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}$、主張 2.73 (2)、およびクロネッカー積の各因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 2.74。和で展開する）より

$$\begin{aligned}
I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} &= \underbrace{I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}}_{M} && (\because \text{ クロネッカー積の単位元の規則}) \\
&= \underbrace{(E_{11} + E_{22}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{11} + E_{22})}_{M} && (\because I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = E_{11} + E_{22} \text{ を各因子へ同時に適用}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} E_{i_1 i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M i_M} && (\because \text{ 各因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性で和を展開}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} E_{I,I} && (\because E_{I,I} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

であり、各 $K \in \mathcal{I}$ について

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{I \in \mathcal{I}} \Theta_{I,I} \right)(f_K) &= \sum_{I \in \mathcal{I}} \Theta_{I,I}(f_K) && (\because \text{ 線型写像の和の値の定義}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} \delta_{I,K} f_I && (\because \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I \text{（}\Theta_{I,J} \text{ の定義）を } J = I \text{ に取ること}) \\
&= f_K && (\because \delta_{I,K} \text{ は } I = K \text{ のときだけ } 1 \text{ で他は } 0) \\
&= \mathrm{id}_{\mathcal{F}}(f_K) && (\because \text{ 恒等写像の定義})
\end{aligned}$$

であり、基底上で一致する線型写像は等しいから $\sum_I \Theta_{I,I} = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ である。したがって次の一続きの式変形を得る。

$$
\begin{aligned}
\mathbf{end}\Big(I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\Big) &= \mathbf{end}\left(\sum_{I\in\mathcal{I}} E_{I,I}\right) && (\because\ I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} = \sum_{I\in\mathcal{I}} E_{I,I} \text{ を上で示した})\\
&= \sum_{I\in\mathcal{I}} \mathbf{end}(E_{I,I}) && (\because\ \mathbf{end} \text{ の } \mathbb{C}\text{-線型性})\\
&= \sum_{I\in\mathcal{I}} \Theta_{I,I} && (\because\ \mathbf{end}(E_{I,I}) = \Theta_{I,I}\,(\mathbf{end} \text{ の定義}))\\
&= \mathrm{id}_{\mathcal{F}} && (\because\ \sum_{I\in\mathcal{I}} \Theta_{I,I} = \mathrm{id}_{\mathcal{F}} \text{ を上で示した})
\end{aligned}
$$

□

主張 4.5 (クロネッカー積で作る行列の作用)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A_1, \ldots, A_M \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$、$v_1, \ldots, v_M \in \mathbb{C}^2$ とする。定義 4.1 の写像について

$$
(\mathbf{end}(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M))\,(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M) = (A_1 v_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M v_M)
$$

が成り立つ。

証明. 主張 2.74 より、両辺は $A_1, \ldots, A_M, v_1, \ldots, v_M$ の各々について $\mathbb{C}$-線型であるから、$A_m = E_{i_m j_m}$、$v_m = e_{k_m}$ の場合に示せば十分である。$E_{ij}e_k = \delta_{j,k}e_i$（成分計算）より右辺は

$$
\begin{aligned}
(E_{i_1 j_1} e_{k_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{i_M j_M} e_{k_M}) &= (\delta_{j_1,k_1} e_{i_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\delta_{j_M,k_M} e_{i_M}) && (\because\ E_{ij}e_k = \delta_{j,k}e_i \text{ を各因子へ同時に適用})\\
&= \left(\prod_{m=1}^{M} \delta_{j_m,k_m}\right)(e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M}) && (\because\ \text{各因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性})\\
&= \left(\prod_{m=1}^{M} \delta_{j_m,k_m}\right) f_I && (\because\ f_I \text{ の定義})\\
&= \delta_{J,K} f_I && (\because\ \delta_{J,K} = \prod_{m=1}^{M} \delta_{j_m,k_m})
\end{aligned}
$$

であり、左辺は

$$
\begin{aligned}
(\mathbf{end}(E_{I,J}))\,(f_K) &= \Theta_{I,J}(f_K) && (\because\ \mathbf{end}(E_{I,J}) = \Theta_{I,J}\,(\mathbf{end} \text{ の定義}))\\
&= \delta_{J,K} f_I && (\because\ \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I\,(\Theta_{I,J} \text{ の定義}))
\end{aligned}
$$

であるから一致する。 □

主張 4.6 (線型写像表示の値は行列と数ベクトルの積に等しい)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$、$v \in \mathcal{F} = \mathbb{C}^{2^M}$ とする。定義 4.1 の写像について、すべての $k \in \{1, \ldots, 2^M\}$ で

$$
((\mathbf{end}(A))\,(v))_k = \sum_{l=1}^{2^M} A_{kl}\, v_l
$$

が成り立つ。右辺は 定義 1.6 が定める行列と数ベクトルの積の第 k 成分である。したがって定義 4.1 の作用の記法 $Av := (\mathbf{end}(A))(v)$ と 定義 1.6 の積 Av は同じ数ベクトルを表す。

証明. 記号は 定義 4.1 と 定義 2.72 のものとし、$\nu : \mathcal{I} \to \{1, \ldots, 2^M\}$ は 定義 2.72 の全単射とする。$i, j \in \{1, 2\}$ について $\delta_{i,j} := 1$（$i = j$）、0（$i \neq j$）、$I, J \in \mathcal{I}$ について $\delta_{I,J} := 1$（$I = J$）、0（$I \neq J$）とおく。$I = J \iff \forall m,\ i_m = j_m$ より $\delta_{I,J} = \prod_{m=1}^{M} \delta_{i_m,j_m}$ である。e_i の第 j 成分は $(e_i)_j = \delta_{i,j}$、E_{ij} の (k,l) 成分は $(E_{ij})_{kl} = \delta_{i,k}\delta_{j,l}$ である（定義 4.1 の標準基底と行列単位の定義）。$\mathcal{F} = \mathbb{C}^{2^M}$ の数ベクトルの和とスカラー倍は、定義 1.6 の約束どおり数ベクトルを 2^M 行 1 列の行列として、定義 2.5・定義 2.4・定義 2.3 のものとする。

準備: 基底の成分。$I=(i_1,\dots,i_M),\ J=(j_1,\dots,j_M),\ K=(k_1,\dots,k_M),\ L=(l_1,\dots,l_M)\in\mathcal{I}$ について

$$\begin{aligned}
(f_K)_{\nu(L)} &= (e_{k_1}\boxtimes\cdots\boxtimes e_{k_M})_{\nu(L)} && (\because\ f_K \text{ の定義。定義 4.1})\\
&= \prod_{m=1}^{M}(e_{k_m})_{l_m} && (\because\ \text{定義 2.72 (1)})\\
&= \prod_{m=1}^{M}\delta_{k_m,l_m} && (\because\ (e_i)_j=\delta_{i,j}\ \text{を各因子へ同時に適用})\\
&= \delta_{K,L} && (\because\ \delta_{K,L}=\prod_{m=1}^{M}\delta_{k_m,l_m})
\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}
(E_{I,J})_{\nu(K),\nu(L)} &= (E_{i_1j_1}\boxtimes\cdots\boxtimes E_{i_Mj_M})_{\nu(K),\nu(L)} && (\because\ E_{I,J} \text{ の定義。定義 4.1})\\
&= \prod_{m=1}^{M}(E_{i_mj_m})_{k_ml_m} && (\because\ \text{定義 2.72 (2)})\\
&= \prod_{m=1}^{M}\delta_{i_m,k_m}\delta_{j_m,l_m} && (\because\ (E_{ij})_{kl}=\delta_{i,k}\delta_{j,l}\ \text{を各因子へ同時に適用})\\
&= \left(\prod_{m=1}^{M}\delta_{i_m,k_m}\right)\left(\prod_{m=1}^{M}\delta_{j_m,l_m}\right) && (\because\ \text{複素数の積の交換法則と結合法則})\\
&= \delta_{I,K}\,\delta_{J,L} && (\because\ \delta_{I,K}=\prod_{m=1}^{M}\delta_{i_m,k_m},\ \delta_{J,L}=\prod_{m=1}^{M}\delta_{j_m,l_m})
\end{aligned}$$

である。準備: 基底による展開。$K,L\in\mathcal{I}$ について

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}}A_{\nu(I),\nu(J)}E_{I,J}\right)_{\nu(K),\nu(L)} &= \sum_{I,J\in\mathcal{I}}\left(A_{\nu(I),\nu(J)}E_{I,J}\right)_{\nu(K),\nu(L)} && (\because\ \text{主張 2.7})\\
&= \sum_{I,J\in\mathcal{I}}A_{\nu(I),\nu(J)}(E_{I,J})_{\nu(K),\nu(L)} && (\because\ \text{定義 2.3 を各項へ同時に適用})\\
&= \sum_{I,J\in\mathcal{I}}A_{\nu(I),\nu(J)}\,\delta_{I,K}\,\delta_{J,L} && (\because\ \text{上の } (E_{I,J})_{\nu(K),\nu(L)}=\delta_{I,K}\delta_{J,L})\\
&= A_{\nu(K),\nu(L)} && (\because\ \delta_{I,K}\delta_{J,L}\ \text{は } (I,J)=(K,L)\ \text{のときだけ } 1\ \text{で他は } 0)
\end{aligned}$$

であり、ν は全単射だから $(\nu(K),\nu(L))$ は $\{1,\dots,2^M\}^2$ の元をすべて動く。ゆえに $A=\sum_{I,J\in\mathcal{I}}A_{\nu(I),\nu(J)}E_{I,J}$ である。同様に $L\in\mathcal{I}$ について

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{K\in\mathcal{I}}v_{\nu(K)}f_K\right)_{\nu(L)} &= \sum_{K\in\mathcal{I}}\left(v_{\nu(K)}f_K\right)_{\nu(L)} && (\because\ \text{主張 2.7})\\
&= \sum_{K\in\mathcal{I}}v_{\nu(K)}(f_K)_{\nu(L)} && (\because\ \text{定義 2.3 を各項へ同時に適用})\\
&= \sum_{K\in\mathcal{I}}v_{\nu(K)}\,\delta_{K,L} && (\because\ \text{上の } (f_K)_{\nu(L)}=\delta_{K,L})\\
&= v_{\nu(L)} && (\because\ \delta_{K,L}\ \text{は } K=L\ \text{のときだけ } 1\ \text{で他は } 0)
\end{aligned}$$

であり、ν は全単射だから $v = \sum_{K\in\mathcal{I}} v_{\nu(K)} f_K$ である。

主張の式変形。ν は全単射なので、$k = \nu(L)$（$L \in \mathcal{I}$）の形のものについて示せば十分である。

$$
\begin{aligned}
\left(\left(\mathbf{end}(A)\right)(v)\right)_{\nu(L)} &= \left(\left(\mathbf{end}\left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} A_{\nu(I),\nu(J)} E_{I,J}\right)\right)(v)\right)_{\nu(L)} && (\because \text{ 上の基底による展開}) \\
&= \left(\left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} A_{\nu(I),\nu(J)} \Theta_{I,J}\right)(v)\right)_{\nu(L)} && (\because \mathbf{end} \text{ は } \mathbf{end}(E_{I,J}) = \Theta_{I,J} \text{ を線型に拡張したもの。定義 4.1}) \\
&= \left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} A_{\nu(I),\nu(J)} \Theta_{I,J}(v)\right)_{\nu(L)} && (\because \text{ 線型写像の和とスカラー倍の値の定義}) \\
&= \left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} A_{\nu(I),\nu(J)} \Theta_{I,J}\left(\sum_{K\in\mathcal{I}} v_{\nu(K)} f_K\right)\right)_{\nu(L)} && (\because \text{ 上の基底による展開}) \\
&= \left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} A_{\nu(I),\nu(J)} \sum_{K\in\mathcal{I}} v_{\nu(K)} \Theta_{I,J}(f_K)\right)_{\nu(L)} && (\because \Theta_{I,J} \text{ の } \mathbb{C}\text{-線型性。定義 4.1}) \\
&= \left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} A_{\nu(I),\nu(J)} \sum_{K\in\mathcal{I}} v_{\nu(K)} \delta_{J,K} f_I\right)_{\nu(L)} && (\because \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I \,(\Theta_{I,J} \text{ の定義。定義 4.1})) \\
&= \left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} \left(A_{\nu(I),\nu(J)} v_{\nu(J)}\right) f_I\right)_{\nu(L)} && (\because \delta_{J,K} \text{ は } K = J \text{ のときだけ } 1 \text{ で他は } 0) \\
&= \sum_{I,J\in\mathcal{I}} \left(\left(A_{\nu(I),\nu(J)} v_{\nu(J)}\right) f_I\right)_{\nu(L)} && (\because \text{ 主張 2.7}) \\
&= \sum_{I,J\in\mathcal{I}} \left(A_{\nu(I),\nu(J)} v_{\nu(J)}\right) (f_I)_{\nu(L)} && (\because \text{ 定義 2.3 を各項へ同時に適用}) \\
&= \sum_{I,J\in\mathcal{I}} A_{\nu(I),\nu(J)} v_{\nu(J)} \delta_{I,L} && (\because \text{ 上の } (f_I)_{\nu(L)} = \delta_{I,L}) \\
&= \sum_{J\in\mathcal{I}} A_{\nu(L),\nu(J)} v_{\nu(J)} && (\because \delta_{I,L} \text{ は } I = L \text{ のときだけ } 1 \text{ で他は } 0) \\
&= \sum_{l=1}^{2^M} A_{\nu(L),l}\, v_l && (\because \nu \text{ は全単射なので和の添字を } l = \nu(J) \text{ と付け替える})
\end{aligned}
$$

□

主張 4.7 (行列表示と線型写像表示は指数関数を保つ)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$、$f \in \mathcal{F} = \mathbb{C}^{2^M}$ とする。定義 4.1 の写像と 定義 3.4 の行列指数関数について

$\mathbf{end}(A)^0 := \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$、$\mathbf{end}(A)^{n+1} := \mathbf{end}(A)^n \circ \mathbf{end}(A)$（$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）と定める。このとき

$$
\left(\mathbf{end}(\exp(A))\right)(f) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \left(\mathbf{end}(A)^n\right)(f) \qquad \left(\mathcal{F} \text{ のノルムに関する収束}\right)
$$

が成り立つ。右辺は線型写像の指数関数という未定義の記号を使わず、数ベクトルの極限として定める。

証明. 記号は主張のとおりとし、A の冪は 定義 3.4 (1) の $A^0 := I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$、$A^{n+1} := A^n A$ とする。この証明の中では、定義 1.6 が定める行列 $B \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と数ベクトル f の積を、定義 4.1 の作用の記法と区別して $B \bullet f \in \mathcal{F}$（$(B \bullet f)_k := \sum_{l=1}^{2^M} B_{kl} (f)_l$。$(f)_l \in \mathbb{C}$ は f の第 l 成分で、定義 4.1 の基底の数ベクトル f_J（$J \in \mathcal{I}$）と区別するため括弧を付ける）と書く。$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
S_N := \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} A^n \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}), \qquad S := \exp(A) \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})
$$

とおく。係数 $1/n! \in \mathbb{R}$ は実数で、定義 1.13 で複素数として使う。$\mathcal{F}$ の列 $(w_N)_{N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ が $w \in \mathcal{F}$ へ 定義 2.91 の K^d の列の意味で収束するとき（$K := \mathbb{C}$、$d := 2^M$）、その極限は 主張 2.92 (4) により一意なので $w = \lim_{N \to \infty} w_N$ と書く。この極限はノルムの値（$\mathbb{R}_{\geq 0}$）で定まるので、ここで極限のために $\mathbb{R}$ へ脱出している。

中間目標: 冪の保存。すべての $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\mathbf{end}(A^n) = \mathbf{end}(A)^n$ であることを n に関する帰納法で示す。$n = 0$ では

$$\begin{aligned}
\mathbf{end}(A^0) &= \mathbf{end}\Big(I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\Big) && \Big(\because\ A^0 := I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\circ\ \text{定義 3.4 (1)}\Big) \\
&= \mathrm{id}_{\mathcal{F}} && \big(\because\ \text{主張 4.4 (3)}\big) \\
&= \mathbf{end}(A)^0 && \big(\because\ \mathbf{end}(A)^0 := \mathrm{id}_{\mathcal{F}}\ \text{（主張の約束）}\big)
\end{aligned}$$

である。n で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned}
\mathbf{end}(A^{n+1}) &= \mathbf{end}(A^n A) && \big(\because\ A^{n+1} := A^n A\circ\ \text{定義 3.4 (1)}\big) \\
&= \mathbf{end}(A^n) \circ \mathbf{end}(A) && \big(\because\ \text{主張 4.4 (2)}\big) \\
&= \mathbf{end}(A)^n \circ \mathbf{end}(A) && \big(\because\ \text{帰納法の仮定}\big) \\
&= \mathbf{end}(A)^{n+1} && \big(\because\ \mathbf{end}(A)^{n+1} := \mathbf{end}(A)^n \circ \mathbf{end}(A)\ \text{（主張の約束）}\big)
\end{aligned}$$

である。中間目標: 部分和の書き換え。各 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned}
S_N \bullet f &= (\mathbf{end}(S_N))(f) && \big(\because\ \text{主張 4.6}\big) \\
&= \left(\mathbf{end}\left(\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} A^n\right)\right)(f) && \big(\because\ S_N\ \text{の定義}\big) \\
&= \left(\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \mathbf{end}(A^n)\right)(f) && \big(\because\ \mathbf{end}\ \text{の}\ \mathbb{C}\text{-線型性。主張 4.4 (1)}\big) \\
&= \left(\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \mathbf{end}(A)^n\right)(f) && \big(\because\ \text{上の冪の保存を各}\ n \in \{0, \ldots, N\}\ \text{へ適用}\big) \\
&= \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} (\mathbf{end}(A)^n)(f) && \big(\because\ \text{線型写像の有限和とスカラー倍の値の定義}\big)
\end{aligned}$$

である。主張の式変形。

$$\begin{aligned}
(\mathbf{end}(\exp(A)))(f) &= (\mathbf{end}(S))(f) && (\because\ S := \exp(A)) \\
&= S \bullet f && (\because\ \text{主張 4.6}) \\
&= \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m\right) \bullet f && \left(\because\ S = \exp(A) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m\circ\ \text{定義 3.4 (1)}\right) \\
&= \lim_{N \to \infty} S_N \bullet f && (\because\ \text{定理 3.3 (1}a\text{) を、行列の次数を } 2^M\text{、}K := \mathbb{C}\text{、}v := f\ \text{として適用。}\mathbb{R}\ \text{への脱出（極限）}) \\
&= \lim_{N \to \infty} \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} (\mathbf{end}(A)^n)(f) && (\because\ \text{上の部分和の書き換えにより、二つの列は各 } N \text{ で等しい})
\end{aligned}$$

□

5 $\exp(X)Y\exp(-X) = \exp(\mathrm{ad}(X))(Y)$ の証明

定義 5.1 (複素共役)**.** 定義 1.12 の $z = (x, y) \in \mathbf{C} = \mathbf{R}^2$ に対して

$$\overline{z} := (x, -y) \in \mathbf{C}$$

と定める。実部は 定義 1.31 で定義済みである。

主張 5.2 (複素共役は有限和を保つ)**.** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$z_1, \ldots, z_m \in \mathbb{C}$ について

$$\overline{\sum_{j=1}^{m} z_j} = \sum_{j=1}^{m} \overline{z_j}$$

が成り立つ。複素共役は 定義 5.1、有限和は 定義 1.16 の有限和である。

証明. 準備（二つの和)。$z = (x, y),\ w = (u, v) \in \mathbb{C}$（$x, y, u, v \in \mathbb{R}$。定義 1.12 が $\mathbb{C}$ の台集合を $\mathbf{R}^2$ と定めるので成分は実数である）について

$$\begin{aligned}
\overline{z + w} &= \overline{(x + u,\ y + v)} && (\because \text{ 定義 1.12 の和}) \\
&= \big(x + u,\ -(y + v)\big) && (\because \text{ 定義 5.1}) \\
&= \big(x + u,\ (-y) + (-v)\big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } -(y + v) = (-y) + (-v)) \\
&= (x, -y) + (u, -v) && (\because \text{ 定義 1.12 の和}) \\
&= \overline{z} + \overline{w} && (\because \text{ 定義 5.1})
\end{aligned}$$

m についての帰納法で示す。$m = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
\overline{\textstyle\sum_{j=1}^{1} z_j} &= \overline{z_1} && (\because \text{ 定義 1.16}) \\
&= \textstyle\sum_{j=1}^{1} \overline{z_j} && (\because \text{ 定義 1.16})
\end{aligned}$$

m で成り立つとすると

$$\begin{aligned}
\overline{\textstyle\sum_{j=1}^{m+1} z_j} &= \overline{\big(\textstyle\sum_{j=1}^{m} z_j\big) + z_{m+1}} && (\because \text{ 定義 1.16}) \\
&= \overline{\textstyle\sum_{j=1}^{m} z_j} + \overline{z_{m+1}} && (\because \text{ 準備の二つの和}) \\
&= \big(\textstyle\sum_{j=1}^{m} \overline{z_j}\big) + \overline{z_{m+1}} && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= \textstyle\sum_{j=1}^{m+1} \overline{z_j} && (\because \text{ 定義 1.16})
\end{aligned}$$

□

主張 5.3 (複素共役は積を保つ)**.** $z, w \in \mathbb{C}$ について $\overline{z\,w} = \overline{z}\,\overline{w}$ が成り立つ。複素共役は 定義 5.1、積は 定義 1.12 の積である。

証明. $z = (x, y),\ w = (u, v)$（$x, y, u, v \in \mathbb{R}$。定義 1.12 が $\mathbb{C}$ の台集合を $\mathbf{R}^2$ と定めるので成分は実数である）と書く。

$$\begin{aligned}
\overline{z\,w} &= \overline{(xu - yv,\ xv + yu)} && (\because \text{ 定義 1.12 の積}) \\
&= \big(xu - yv,\ -(xv + yu)\big) && (\because \text{ 定義 5.1}) \\
&= \big(xu - (-y)(-v),\ -(xv + yu)\big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } (-y)(-v) = yv) \\
&= \big(xu - (-y)(-v),\ x(-v) + (-y)u\big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } x(-v) + (-y)u = -(xv + yu)) \\
&= (x, -y)\,(u, -v) && (\because \text{ 定義 1.12 の積}) \\
&= \overline{z}\,\overline{w} && (\because \text{ 定義 5.1})
\end{aligned}$$

□

主張 5.4 (複素共役は差を保つ)**.** $z, w \in \mathbb{C}$ について $\overline{z - w} = \overline{z} - \overline{w}$ が成り立つ。複素共役は定義 5.1、差は 定義 1.15 の差である。

証明. 準備（$-1_{\mathbb{C}}$ の共役)。

$$\begin{aligned}
\overline{-1_{\mathbb{C}}} &= \overline{(-1,\ 0)} && (\because \text{ 定義 1.13 の略記 } r_{\mathbb{C}} \text{ の } r = -1) \\
&= (-1,\ -0) && (\because \text{ 定義 5.1}) \\
&= (-1,\ 0) && (\because \mathbb{R} \text{ で } -0 = 0) \\
&= -1_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.13 の略記 } r_{\mathbb{C}} \text{ の } r = -1)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\overline{z-w} &= \overline{z+(-w)} && (\because \text{ 定義 1.15})\\
&= \overline{z}+\overline{-w} && (\because \text{ 主張 5.2 の } m=2)\\
&= \overline{z}+\overline{(-1_{\mathbb{C}})\,w} && (\because \text{ 定義 1.14})\\
&= \overline{z}+\overline{-1_{\mathbb{C}}}\;\overline{w} && (\because \text{ 主張 5.3})\\
&= \overline{z}+(-1_{\mathbb{C}})\,\overline{w} && (\because \text{ 準備の } \overline{-1_{\mathbb{C}}}=-1_{\mathbb{C}})\\
&= \overline{z}+\left(-\overline{w}\right) && (\because \text{ 定義 1.14})\\
&= \overline{z}-\overline{w} && (\because \text{ 定義 1.15})
\end{aligned}
$$

□

主張 5.5 (複素共役の絶対値)**.** $z\in\mathbb{C}$ について $|\overline{z}|=|z|$ が成り立つ。複素共役は 定義 5.1、絶対値は 定義 1.74 の絶対値である。

証明. $z=(x,y)$（$x,y\in\mathbb{R}$。定義 1.12 が $\mathbb{C}$ の台集合を $\mathbf{R}^2$ と定めるので成分は実数である）と書く。

$$
\begin{aligned}
|\overline{z}| &= |(x,-y)| && (\because \text{ 定義 5.1})\\
&= \sqrt{x^2+(-y)^2}^{\,(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 主張 1.75 (1)})\\
&= \sqrt{x^2+y^2}^{\,(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \mathbb{R} \text{ で } (-y)^2=y^2)\\
&= |z| && (\because \text{ 主張 1.75 (1)})
\end{aligned}
$$

□

主張 5.6 (実数の包含の複素共役は自分自身)**.** $r\in\mathbb{R}$ について $\overline{r_{\mathbb{C}}}=r_{\mathbb{C}}$ が成り立つ。複素共役は 定義 5.1、$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記である（$1_{\mathbb{C}}$、$0_{\mathbb{C}}$ はその $r=1,0$ である）。

証明.

$$
\begin{aligned}
\overline{r_{\mathbb{C}}} &= \overline{(r,0)} && (\because \text{ 定義 1.13})\\
&= (r,-0) && (\because \text{ 定義 5.1})\\
&= (r,0) && (\because \mathbb{R} \text{ で } -0=0)\\
&= r_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.13})
\end{aligned}
$$

□

主張 5.7 (複素共役と自分自身の積は絶対値の二乗の包含)**.** $z\in\mathbb{C}$ について $\overline{z}\,z=\left(|z|^2\right)_{\mathbb{C}}$ が成り立つ。複素共役は 定義 5.1、絶対値は 定義 1.74、積は 定義 1.12、$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記である。

証明. $z=(x,y)$（$x,y\in\mathbb{R}$）と書く。

$$
\begin{aligned}
\overline{z}\,z &= (x,-y)\,(x,y) && (\because \text{ 定義 5.1})\\
&= \big(xx-(-y)y,\ xy+(-y)x\big) && (\because \text{ 定義 1.12 の積})\\
&= \big(x^2+y^2,\ 0\big) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= \big(|z|^2,\ 0\big) && (\because \text{ 主張 1.75 (2)})\\
&= \left(|z|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.13})
\end{aligned}
$$

□

定義 5.8 ($M(n;\mathbb{C})$ の Frobenius 内積)**.** $n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$M(n;\mathbb{C}):=\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ を $\mathbb{C}^{n\times n}$（成分が 定義 1.12 の $\mathbb{C}$ に属する $n\times n$ 配列全体）と同一視する。以下、$A=(a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$, $B=(b_{ij})_{1\leq i,j\leq n}\in M(n;\mathbb{C})$ とする。

定義 8.7 の共役転置、定義 1.6 の行列積と 定義 8.1 のトレースを使い、Frobenius 内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle : M(n;\mathbb{C}) \times M(n;\mathbb{C}) \to \mathbb{C}$ を

$$\langle A, B \rangle := \operatorname{tr}(A^* B)$$

と定める。成分表示と内積の基本性質は後続の内積の性質の主張で成分計算から示す。この $\langle \cdot, \cdot \rangle$ のノルムは既出の成分公式 定義 2.91 を使う。後続の内積の性質の主張で、この内積から得る長さと同じ値になることを示す。

主張 5.9 (Frobenius 内積の性質（Hermite 内積の公理と Cauchy–Schwarz の不等式）)**.** 成分計算に使う行列積は 定義 1.6、共役転置は 定義 8.7、トレースは 定義 8.1 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A = (a_{ij}),\ B = (b_{ij}),\ C = (c_{ij}) \in M(n;\mathbb{C})$、$\lambda \in \mathbb{C}$ とし、$\langle \cdot, \cdot \rangle$、$\overline{\ }$、Re は 定義 5.8、複素共役は 定義 5.1、実部は 定義 1.31 のものとする。次が成り立つ。

- (0)（成分表示）$\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(A^* B) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ij}}\, b_{ij}$。
- (1)（共役対称性）$\langle B, A \rangle = \overline{\langle A, B \rangle}$。
- (2)（第 2 変数についての線型性・第 1 変数についての共役線型性）$\langle A, B + C \rangle = \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle$、$\langle A, \lambda B \rangle = \lambda \langle A, B \rangle$、$\langle A + B, C \rangle = \langle A, C \rangle + \langle B, C \rangle$、$\langle \lambda A, B \rangle = \overline{\lambda} \langle A, B \rangle$。
- (3)（正定値性）$\langle A, A \rangle = \left(\displaystyle\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \right)_{\mathbb{C}}$。特に $\langle A, A \rangle$ は 定義 1.13 による非負実数の像であり、$\langle A, A \rangle = 0_{\mathbb{C}} \iff A = O$。また 定義 2.91 で定義したノルムについて $\langle A, A \rangle = \left(\|A\|^2 \right)_{\mathbb{C}}$。
- (4)（Cauchy–Schwarz の不等式）$|\langle A, B \rangle| \leq \|A\|\, \|B\|$（左辺は 定義 1.74 の絶対値）。
- (5)（三角不等式）$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$。

証明. Step 0: 複素共役の基本性質。$z = (x, y),\ w = (u, v) \in \mathbb{C}$ について 定義 1.12 の演算を使うと

$$\begin{aligned}
\overline{z + w} &= \overline{(x + u,\ y + v)} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の定義}) \\
&= (x + u,\ -(y + v)) \quad (\because \text{複素共役の定義}) \\
&= (x, -y) + (u, -v) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の符号の計算と} \mathbb{C} \text{ の加法の定義}) \\
&= \overline{z} + \overline{w} \quad (\because \text{複素共役の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{z\, w} &= \overline{(xu - yv,\ xv + yu)} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の定義}) \\
&= (xu - yv,\ -(xv + yu)) \quad (\because \text{複素共役の定義}) \\
&= (xu - (-y)(-v),\ x(-v) + (-y)u) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の符号の計算}) \\
&= (x, -y) \cdot (u, -v) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の定義}) \\
&= \overline{z} \cdot \overline{w} \quad (\because \text{複素共役の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{\overline{z}} &= \overline{(x, -y)} \quad (\because \text{複素共役の定義}) \\
&= (x, y) \quad (\because \text{複素共役の定義}) \\
&= z \quad (\because z = (x, y))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{z}\, z &= (x, -y) \cdot (x, y) \quad (\because \text{複素共役の定義}) \\
&= (x \cdot x - (-y) \cdot y,\ x \cdot y + (-y) \cdot x) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の定義}) \\
&= (x^2 + y^2,\ 0) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の符号の計算}) \\
&= \left(|z|^2 \right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{絶対値の基本性質 (2) と} \mathbb{R} \to \mathbb{C} \text{ の包含写像})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Re}(z) &= x \quad (\because \mathrm{Re}\ \text{の定義}) \\
&\leq \sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because x \leq |x| = \sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}) \\
&\leq \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \sqrt{\cdot}\ \text{の単調性と} x^2 \leq x^2+y^2) \\
&= |z| \quad (\because \text{絶対値の基本性質 (1)})
\end{aligned}
$$

が成り立つ（用いた 定義 1.12、主張 1.75、定義 1.13、定義 1.4 は各行の $(\because\ \cdot)$ に挙げたとおりである）。

Step 1: (0)。行列の積の定義と 定義 1.12 の加法・乗法より、

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(A^*B) &= \sum_{i=1}^{n} (A^*B)_{ii} \quad (\because \mathrm{tr}\ \text{の定義}) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} (A^*)_{ij}\ b_{ji} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ji}}\, b_{ji} \quad (\because (A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}) \\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \overline{a_{ji}}\, b_{ji} \quad (\because \text{有限和の順序交換}) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ij}}\, b_{ij} \quad (\because \text{添字} i,j\ \text{の付け替え})
\end{aligned}
$$

Step 2: (1)。Step 0 の $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$、$\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$、$\overline{\overline{z}} = z$ より、

$$
\begin{aligned}
\overline{\langle A, B\rangle} &= \overline{\sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\, b_{ij}} \quad (\because (0)) \\
&= \sum_{i,j} \overline{\overline{a_{ij}}\, b_{ij}} \quad (\because {}^{-}\ \text{は加法的、有限和}) \\
&= \sum_{i,j} \overline{\overline{a_{ij}}} \cdot \overline{b_{ij}} \quad (\because {}^{-}\ \text{は乗法的}) \\
&= \sum_{i,j} \overline{b_{ij}}\, a_{ij} \quad (\because \overline{\overline{z}} = z,\ \mathbb{C}\ \text{の乗法の可換性}) \\
&= \langle B, A\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}
$$

Step 3: (2)。分配律と Step 0 の乗法性より、

$$
\begin{aligned}
\langle A, B+C\rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\, (B+C)_{ij} \quad (\because (0)) \\
&= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\, (b_{ij} + c_{ij}) \quad (\because \text{定義 2.4}) \\
&= \sum_{i,j} (\overline{a_{ij}} b_{ij} + \overline{a_{ij}} c_{ij}) \quad (\because \mathbb{C}\ \text{の分配律}) \\
&= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij} + \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} c_{ij} \quad (\because \text{有限和の分割}) \\
&= \langle A, B\rangle + \langle A, C\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\langle A, \lambda B\rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\,(\lambda B)_{ij} \quad (\because (0)) \\
&= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\,(\lambda b_{ij}) \quad (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \sum_{i,j} \lambda\,(\overline{a_{ij}} b_{ij}) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換性と結合律}) \\
&= \lambda \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij} \quad (\because \text{有限和と元の積についての分配律}) \\
&= \lambda \langle A, B\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\langle A + B, C\rangle &= \sum_{i,j} \overline{(A+B)_{ij}}\; c_{ij} \quad (\because (0)) \\
&= \sum_{i,j} \overline{a_{ij} + b_{ij}}\; c_{ij} \quad (\because \text{定義 2.4}) \\
&= \sum_{i,j} \left(\overline{a_{ij}} + \overline{b_{ij}}\right) c_{ij} \quad (\because \text{Step 0 の} \overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}) \\
&= \sum_{i,j} \left(\overline{a_{ij}} c_{ij} + \overline{b_{ij}} c_{ij}\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の分配律}) \\
&= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} c_{ij} + \sum_{i,j} \overline{b_{ij}} c_{ij} \quad (\because \text{有限和の分割}) \\
&= \langle A, C\rangle + \langle B, C\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\langle \lambda A, B\rangle &= \sum_{i,j} \overline{(\lambda A)_{ij}}\; b_{ij} \quad (\because (0)) \\
&= \sum_{i,j} \overline{\lambda a_{ij}}\; b_{ij} \quad (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \sum_{i,j} \overline{\lambda}\,\overline{a_{ij}}\, b_{ij} \quad (\because \text{Step 0 の} \overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}) \\
&= \overline{\lambda} \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\, b_{ij} \quad (\because \text{有限和と元の積についての分配律}) \\
&= \overline{\lambda} \langle A, B\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}
$$

Step 4: (3)。Step 0 の $\overline{z}z = \left(|z|^2\right)_{\mathbb{C}}$ より、

$$
\begin{aligned}
\langle A, A\rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\, a_{ij} \quad (\because (0)) \\
&= \sum_{i,j} \left(|a_{ij}|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{Step 0 の} \overline{z}z = \left(|z|^2\right)_{\mathbb{C}}) \\
&= \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{R} \to \mathbb{C} \text{ の包含写像} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ が加法を保つこと})
\end{aligned}
$$

最後の段で引いたのは 定義 1.13 である。さらに

$$
\begin{aligned}
\langle A, A\rangle &= \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の鎖}) \\
&= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \|A\|^2 = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \text{（ノルムの定義）})
\end{aligned}
$$

である（ノルムの定義は 定義 2.91）。よって $\langle A, A\rangle$ は非負実数 $\|A\|^2$ の像であり、$\sqrt{\langle A, A\rangle} = \|A\|$。$\langle A, A\rangle = 0_{\mathbb{C}} \iff \|A\| = 0 \iff A = O$ は 主張 2.92 (1) による。

Step 5: (4)。$u := \langle A, B\rangle \in \mathbb{C}$ とおく。

場合 1: $\|B\| = 0$ のとき。(3) より $B = O$ であるから

$$\begin{aligned} u &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\, b_{ij} \quad (\because u \text{ の定義と } (0)) \\ &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} \cdot 0_{\mathbb{C}} \quad (\because B = O \text{ なので各成分} b_{ij} = 0_{\mathbb{C}}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ との積が} 0_{\mathbb{C}} \text{ であることと有限和}) \end{aligned}$$

となる。したがって

$$\begin{aligned} |u| &= |0_{\mathbb{C}}| \quad (\because \text{上の鎖} u = 0_{\mathbb{C}}) \\ &= 0 \quad (\because \text{絶対値の基本性質}) \\ &= \|A\| \cdot 0 \quad (\because \text{実数の} 0 \text{ との積は} 0) \\ &= \|A\|\,\|B\| \quad (\because \|B\| = 0) \end{aligned}$$

であり、$|u| = \|A\|\,\|B\|$（主張 1.75）を得る。

場合 2: $\|B\| > 0$ のとき。$t := \dfrac{\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \in \mathbb{C}$ とおく（$\|B\|^2 > 0$ なので 主張 1.56 により逆元が存在する）。(2)(1) を展開すると

$$\begin{aligned} 0 \le \|A - tB\|^2 & \\ \left(\|A - tB\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \langle A - tB,\ A - tB\rangle \quad (\because (3)) \\ &= \langle A, A\rangle - \langle A, tB\rangle - \langle tB, A\rangle + \langle tB, tB\rangle \quad (\because (2) \text{ を各変数に適用}) \\ &= \langle A, A\rangle - t\langle A, B\rangle - \overline{t}\langle B, A\rangle + \overline{t}\,t\,\langle B, B\rangle \quad (\because (2)) \end{aligned}$$

三つの積の項を順に計算すると

$$\begin{aligned} -t\langle A, B\rangle &= -\frac{\overline{u}\,u}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because t \text{ の定義と、} u \text{ の定義} \langle A, B\rangle = u \text{ の代入}) \\ &= -\frac{\left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 の} \overline{u}u = \left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}}) \\ &= -\left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ が積と逆元を保つこと}) \\ -\overline{t}\langle B, A\rangle &= -\frac{u\,\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 と} \overline{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} = \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ による} \overline{t} = u/\left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ と、(1) の} \langle B, A\rangle = \overline{u} \text{ の代入}) \\ &= -\frac{\left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 の} \overline{u}u = \left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ と} \mathbb{C} \text{ の乗法の可換性}) \\ &= -\left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ が積と逆元を保つこと}) \\ \overline{t}\,t\,\langle B, B\rangle &= \frac{u\,\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}\,(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \cdot \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \overline{t},\ t \text{ の定義と、(3) の} \langle B, B\rangle = \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ の代入}) \\ &= \frac{u\,\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}} \text{ による約分}) \\ &= \frac{\left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 の} \overline{u}u = \left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ と} \mathbb{C} \text{ の乗法の可換性}) \\ &= \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ が積と逆元を保つこと}) \end{aligned}$$

となり、合わせて

$$\begin{aligned}
\left(\|A-tB\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} - \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} - \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} + \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because (3)\ \text{の}\langle A,A\rangle = \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}}\ \text{と直前の三つの計算を展開式へ代入}) \\
&= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} - \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{C}\ \text{の加法の結合律と加法逆元}) \\
&= \left(\|A\|^2 - \frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}\ \text{が減法を保つこと})
\end{aligned}$$

$\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$ は単射なので実数の等式 $\|A-tB\|^2 = \|A\|^2 - |u|^2/\|B\|^2$ を得る。これと 主張 2.92 (1) から

$$\begin{aligned}
0 &\le \|A-tB\|^2 \quad (\because \text{ノルムの基本性質（非退化性・斉次性・三角不等式）の } (1)) \\
&= \|A\|^2 - \frac{|u|^2}{\|B\|^2} \quad (\because \text{直前の実数の等式})
\end{aligned}$$

である。これを移項して

$$\begin{aligned}
\frac{|u|^2}{\|B\|^2} &= \|A\|^2 - \left(\|A\|^2 - \frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right) \quad (\because \mathbb{R}\ \text{の四則}) \\
&\le \|A\|^2 - 0 \quad (\because \text{直前の} 0 \le \|A\|^2 - |u|^2/\|B\|^2\ \text{と、}\mathbb{R}\ \text{で引く数が大きいほど差は小さいこと}) \\
&= \|A\|^2 \quad (\because \mathbb{R}\ \text{の四則})
\end{aligned}$$

を得る。したがって

$$\begin{aligned}
|u|^2 &= \frac{|u|^2}{\|B\|^2} \cdot \|B\|^2 \quad (\because \|B\|^2 > 0\ \text{と}\mathbb{R}\ \text{の四則}) \\
&\le \|A\|^2 \cdot \|B\|^2 \quad (\because \text{直前の不等式の両辺に正の数} \|B\|^2\ \text{を掛ける}) \\
&= \left(\|A\|\,\|B\|\right)^2 \quad (\because \mathbb{R}\ \text{の乗法の可換性と結合性})
\end{aligned}$$

を得る。$|u| \ge 0$ かつ $\|A\|\,\|B\| \ge 0$ なので非負実数の平方の単調性（主張 2.92 の証明 Step 0）により $|u| \le \|A\|\,\|B\|$。

Step 6: (5)。(3)(2)(1) より

$$\begin{aligned}
\left(\|A+B\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \langle A+B,\ A+B\rangle \quad (\because (3)) \\
&= \langle A,A\rangle + \langle A,B\rangle + \langle B,A\rangle + \langle B,B\rangle \quad (\because (2)) \\
&= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} + (u+\overline{u}) + \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because (1),(3),\ u = \langle A,B\rangle)
\end{aligned}$$

ここで $u = (x,y)$ と書けば

$$\begin{aligned}
u + \overline{u} &= (x,y) + (x,-y) \quad (\because u = (x,y)\ \text{と複素共役の定義}) \\
&= (2x,\ 0) \quad (\because \mathbb{C}\ \text{の加法の定義と}\mathbb{R}\ \text{の計算}) \\
&= \left(2\,\mathrm{Re}(u)\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathrm{Re}\ \text{の定義と}\mathbb{R}\to\mathbb{C}\ \text{の包含写像})
\end{aligned}$$

であるから、

$$\begin{aligned}
\left(\|A+B\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} + (u+\overline{u}) + \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の 3 段の鎖}) \\
&= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} + \left(2\,\mathrm{Re}(u)\right)_{\mathbb{C}} + \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because u+\overline{u}\ \text{の鎖}) \\
&= \left(\|A\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(u) + \|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}\ \text{は加法を保つ})
\end{aligned}$$

である。したがって、Step 0 の $\mathrm{Re}(u) \le |u|$ と Step 5 の (4) を使って

$$
\begin{aligned}
\|A+B\|^2 &= \|A\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(u) + \|B\|^2 \quad (\because \text{上の鎖と} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ の単射性}) \\
&\le \|A\|^2 + 2|u| + \|B\|^2 \quad (\because \text{Step 0 の} \mathrm{Re}(u) \le |u|) \\
&\le \|A\|^2 + 2\|A\|\,\|B\| + \|B\|^2 \quad (\because \text{Step 5 の Cauchy–Schwarz の不等式}) \\
&= (\|A\| + \|B\|)^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}
$$

となる。両辺とも非負実数（$0 \le \|A+B\|$、$0 \le \|A\|+\|B\|$。ノルムの非負性）なので、含意の鎖

$$
\begin{aligned}
&\|A+B\|^2 \le (\|A\|+\|B\|)^2 \quad (\because \text{上の鎖}) \\
\Longrightarrow\ &\|A+B\| \le \|A\|+\|B\| \quad (\because \text{非負実数の平方の単調性（「ノルムの基本性質（非退化性・斉次性・三角不等式）」の証明 Step 0）を} u = \|A+B\|,\ v = \|A\|+\|B\| \text{ に当てた})
\end{aligned}
$$

により (5) が従う（Step 0 の補題は 主張 2.92 の証明にある）。 □

定理 5.10 (ad 展開の二項定理的公式（Brian Hall exercise 14）)**.** 行列の積は 定義 1.6 の成分計算による。

$K := \mathbb{R}$ もしくは $K := \mathbb{C}$、$d \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$X, Y \in M(K,d) := \mathrm{Mat}(d,K)$ とする。交換子を $[P,Q] := PQ - QP \in \mathrm{Mat}(d,K)$ と定め、$m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ 重の交換子 $\mathrm{ad}_X^m(Y) \in \mathrm{Mat}(d,K)$ を m についての再帰で

$$
\mathrm{ad}_X^0(Y) := Y, \qquad \mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) := [X,\ \mathrm{ad}_X^m(Y)] \quad (m \in \mathbb{Z}_{\ge 0})
$$

と定める（すなわち $\mathrm{ad}_X^m(Y) = \underbrace{[X,[X,\dots,[X,Y]\dots]]}_{m \text{ times}}$ であり、$m=0$ のときは括弧を付けずに Y そのものとする規約である）。また $P^0 := I$（単位行列）、$\binom{m}{k} := \dfrac{m!}{k!\,(m-k)!} \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ $(0 \le k \le m)$、および $k<0$ または $k>m$ のとき $\binom{m}{k} := 0$ と約束する。このとき次が成り立つ。

$$
\underbrace{[X,[X,\dots,[X,Y]\dots]]}_{m \text{ times}} = \mathrm{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \qquad (m \in \mathbb{Z}_{\ge 0})
$$

証明. この主張は $\mathrm{Mat}(d,K)$ の環構造（加法・乗法・分配律・結合律）と K のスカラー倍だけを使う純代数的な主張であり、収束・極限は一切使わない。m についての帰納法で示す。

Step 0: 準備（符号の処理）。$l \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について $(-X)^l = (-1)^l X^l$ であり（$-X = (-1)X$ と、スカラー $(-1) \in K$ が行列と可換であることによる l についての帰納法）、X は自分自身と可換なので

$$
\begin{aligned}
(-X)^l\, X &= (-1)^l X^l X \quad (\because (-X)^l = (-1)^l X^l) \\
&= (-1)^l X^{l+1} \quad (\because \text{冪の定義}) \\
&= -\left((-1)^{l+1} X^{l+1}\right) \quad (\because (-1)^l = -(-1)^{l+1}) \\
&= -(-X)^{l+1} \quad (\because (-X)^{l+1} = (-1)^{l+1} X^{l+1})
\end{aligned}
$$

Step 1: 準備（Pascal の法則）。$m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$、$k \in \mathbb{Z}$ について

$$
\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} = \binom{m+1}{k}
$$

が成り立つ。実際、$1 \le k \le m$ のときは

$$
\begin{aligned}
\binom{m}{k-1}+\binom{m}{k} &= \frac{m!}{(k-1)!\,(m-k+1)!}+\frac{m!}{k!\,(m-k)!} \quad (\because \text{二項係数の定義})\\
&= \frac{m!\cdot k}{k!\,(m+1-k)!}+\frac{m!\cdot(m+1-k)}{k!\,(m+1-k)!} \quad (\because k!=k\cdot(k-1)!,\ (m+1-k)!=(m+1-k)\cdot(m-k)!)\\
&= \frac{m!\,(k+(m+1-k))}{k!\,(m+1-k)!} \quad (\because \text{分配律})\\
&= \frac{m!\,(m+1)}{k!\,(m+1-k)!} \quad (\because k+(m+1-k)=m+1)\\
&= \frac{(m+1)!}{k!\,(m+1-k)!} \quad (\because (m+1)!=(m+1)\cdot m!)\\
&= \binom{m+1}{k} \quad (\because \text{二項係数の定義})
\end{aligned}
$$

$k=0$ のときは

$$
\begin{aligned}
\binom{m}{-1}+\binom{m}{0} &= 0+\binom{m}{0} \quad (\because k<0 \text{ のとき} \binom{m}{k}:=0 \text{ という約束})\\
&= \binom{m}{0} \quad (\because \text{零元との和})\\
&= 1 \quad (\because \text{二項係数の定義と} 0!=1)\\
&= \binom{m+1}{0} \quad (\because \text{二項係数の定義と} 0!=1)
\end{aligned}
$$

$k=m+1$ のときは

$$
\begin{aligned}
\binom{m}{m}+\binom{m}{m+1} &= \binom{m}{m}+0 \quad (\because k>m \text{ のとき} \binom{m}{k}:=0 \text{ という約束})\\
&= \binom{m}{m} \quad (\because \text{零元との和})\\
&= 1 \quad (\because \text{二項係数の定義と} 0!=1)\\
&= \binom{m+1}{m+1} \quad (\because \text{二項係数の定義と} 0!=1)
\end{aligned}
$$

$k<0$ または $k>m+1$ のときは、$\binom{m}{k-1}$ も $\binom{m}{k}$ も $\binom{m+1}{k}$ も約束により 0 なので、両辺とも 0 である。

Step 2: $m=0$ の場合。

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{0}\binom{0}{k}X^kY(-X)^{0-k} &= \binom{0}{0}X^0Y(-X)^0 \quad (\because \text{和の項が} k=0 \text{ の } 1 \text{ つだけである})\\
&= 1\cdot X^0Y(-X)^0 \quad (\because \binom{0}{0}=1)\\
&= 1\cdot I\,Y\,I \quad (\because P^0:=I \text{ という約束})\\
&= Y \quad (\because \text{単位行列との積とスカラー1 倍})\\
&= \mathrm{ad}_X^0(Y) \quad (\because \mathrm{ad}_X^0 \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

Step 3: 帰納段階。ある $m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\mathrm{ad}_X^m(Y)=\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}X^kY(-X)^{m-k}
$$

が成り立つと仮定する（帰納法の仮定）。定義と分配律より

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) &= [X,\ \mathrm{ad}_X^m(Y)] \quad (\because \mathrm{ad}_X^{m+1} \text{ の定義}) \\
&= X\,\mathrm{ad}_X^m(Y) - \mathrm{ad}_X^m(Y)\,X \quad (\because [P,Q] = PQ - QP) \\
&= X\left(\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}X^kY(-X)^{m-k}\right) - \left(\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}X^kY(-X)^{m-k}\right)X \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}X^{k+1}Y(-X)^{m-k} - \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}X^kY(-X)^{m-k}X \quad (\because \text{分配律・結合律・スカラーの可換性})
\end{aligned}$$

第 2 項に Step 0 を $l = m - k$ として適用すると

$$\begin{aligned}
-\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}X^kY(-X)^{m-k}X &= -\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}X^kY\left(-(-X)^{m+1-k}\right) \quad (\because \text{Step 0}) \\
&= \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}X^kY(-X)^{m+1-k} \quad (\because \text{符号の反転が 2 度で打ち消し合うこと})
\end{aligned}$$

第 1 項は添字を $j := k+1$（$k = 0, \ldots, m$ に対し $j = 1, \ldots, m+1$）と付け替えると

$$\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}X^{k+1}Y(-X)^{m-k} = \sum_{j=1}^{m+1}\binom{m}{j-1}X^jY(-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{添字の付け替え} j := k+1 \text{(全単射なので和の値は変わらない)})$$

第 2 項の添字を $j := k$ と書き換え、$\binom{m}{-1} = 0$、$\binom{m}{m+1} = 0$ の約束により両方の和の範囲を $j = 0, \ldots, m+1$ に揃えると

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) &= \sum_{j=0}^{m+1}\binom{m}{j-1}X^jY(-X)^{m+1-j} + \sum_{j=0}^{m+1}\binom{m}{j}X^jY(-X)^{m+1-j} \quad \left(\because \binom{m}{-1} = 0,\ \binom{m}{m+1} = 0 \text{ の約束により足した項が0 である}\right) \\
&= \sum_{j=0}^{m+1}\left(\binom{m}{j-1} + \binom{m}{j}\right)X^jY(-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{分配律}) \\
&= \sum_{j=0}^{m+1}\binom{m+1}{j}X^jY(-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{Step 1: Pascal の法則})
\end{aligned}$$

これは $m+1$ についての主張である。したがって帰納法により、すべての $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について主張が成り立つ。 □

定義 5.11 (ad_X と Ad_g の定義（複素行列）)**.** 行列の積は 定義 1.6 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$\mathrm{M}(n,\mathbb{C}) := \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ は 定義 5.8 のもの（成分が 定義 1.12 の $\mathbb{C}$ に属する $n \times n$ 行列全体）とする。交換子は 定理 5.10 と同じく $[P,Q] := PQ - QP \in \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ とする。

（1）$X \in \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ に対し、写像 ad_X を

$$\mathrm{ad}_X : \mathrm{M}(n,\mathbb{C}) \to \mathrm{M}(n,\mathbb{C}), \quad Y \mapsto [X,Y] = XY - YX$$

と定める（右辺は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ の積と差だけで定まるので、ad_X は well-defined である)。$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 重の反復 ad_X^m は 定理 5.10 の再帰 $\mathrm{ad}_X^0(Y) = Y,\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) = [X, \mathrm{ad}_X^m(Y)]$ による。

（2）$g \in \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ が正則（すなわち、$I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$（定義 2.2）として $gh = hg = I$ を満たす $h \in \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ が存在し、この h を g^{-1} と書く）であるとき、写像 Ad_g を

$$\mathrm{Ad}_g : \mathrm{M}(n,\mathbb{C}) \to \mathrm{M}(n,\mathbb{C}), \quad Y \mapsto g\,Y\,g^{-1}$$

と定める（g^{-1} は存在すれば一意である。実際 h, h' がともに逆行列なら

$$
\begin{aligned}
h &= hI \quad (\because \text{主張 2.17}) \\
&= h(gh') \quad (\because gh' = I) \\
&= (hg)h' \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= Ih' \quad (\because hg = I) \\
&= h' \quad (\because \text{主張 2.16})
\end{aligned}
$$

である。したがって右辺は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ の積だけで一意に定まる)。

この定義に Lie 群・Lie 環は現れない。必要なのは $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ の和・積と、逆行列の存在だけである。

主張 5.12 (スカラー倍どうしの交換子は、係数の積のスカラー倍に等しい)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$、$X, W \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ とする。交換子 $[P,Q] := PQ - QP$ は 定義 5.11 のもの、スカラー倍は 定義 2.3 のものである。このとき

$$
[\alpha X, \beta W] = (\alpha\beta)[X, W]
$$

が成り立つ。

証明.

$$
\begin{aligned}
[\alpha X, \beta W] &= (\alpha X)(\beta W) - (\beta W)(\alpha X) && \big(\because \text{交換子の定義。定義 5.11}\big) \\
&= \alpha\big(X(\beta W)\big) - (\beta W)(\alpha X) && \big(\because \text{主張 2.18}\big) \\
&= \alpha\big(\beta(XW)\big) - (\beta W)(\alpha X) && \big(\because \text{主張 2.19}\big) \\
&= (\alpha\beta)(XW) - (\beta W)(\alpha X) && \big(\because \text{主張 2.41}\big) \\
&= (\alpha\beta)(XW) - \beta\big(W(\alpha X)\big) && \big(\because \text{主張 2.18}\big) \\
&= (\alpha\beta)(XW) - \beta\big(\alpha(WX)\big) && \big(\because \text{主張 2.19}\big) \\
&= (\alpha\beta)(XW) - (\beta\alpha)(WX) && \big(\because \text{主張 2.41}\big) \\
&= (\alpha\beta)(XW) - (\alpha\beta)(WX) && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の可換律。主張 1.56}\big) \\
&= (\alpha\beta)(XW - WX) && \big(\because \text{主張 2.32}\big) \\
&= (\alpha\beta)[X, W] && \big(\because \text{交換子の定義。定義 5.11}\big)
\end{aligned}
$$

□

定理 5.13 (行列版: $\exp(X)Y\exp(-X) = \exp(\mathrm{ad}_X)(Y)$)**.** 行列積は 定義 1.6、複素成分の演算は 主張 1.56、実数係数の包含は 定義 1.13、ノルムの積の評価は 主張 2.93 を用いる。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X, Y \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ とする。ノルム $\|\cdot\|$ と収束は 定義 2.91、exp は 定義 3.4、ad_X は 定義 5.11 ($\mathrm{ad}_X(Z) = [X,Z] = XZ - ZX$)、$\mathrm{ad}_X^m$ は 定理 5.10 の m 重交換子とする。このとき次が成り立つ。

- (1) 級数 $\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ において収束し、
- (2) $\exp(X)\,Y\,\exp(-X) = \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y) = \exp(\mathrm{ad}_X)\,(Y)$。
- (3) さらに $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ であるから、$\mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) := \exp(X)\,Y\,\exp(X)^{-1} = \exp(\mathrm{ad}_X)(Y)$。

証明. 以下 $a := \|X\| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とおき、主張 3.1 の記号 $E_N(a) = \sum_{m=0}^{N} a^m/m!$、$E(a) = \lim_{N\to\infty} E_N(a)$、$R_N(a) = E(a) - E_N(a)$ を使う。また $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$A \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ について $S_N(A) := \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!}A^p \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ ($A^0 := I$) とおく。主張 3.2 より $S_N(X) \to \exp(X)$、$S_N(-X) \to \exp(-X)$。この二つの収束と、後で使う実指数級数の剰余 $R_N(a) \to 0$ の根拠は

$\mathbb{R}$ の完備性（主張 2.95 および 主張 3.1）へ遡る。さらに Step 2 では収束する実数列の有界性、有界列と 0 収束列の積、および 0 収束列の有限和を使う。Step 5 では $\lfloor N/2 \rfloor \to \infty$ に沿う 0 収束、0 収束列の非負定数倍、およびはさみうちを使う。Step 6 では 0 収束列の和と、主張 2.92 (4) の極限一意性を使う。したがって非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の解析へ移る箇所は、これらの実数列・行列列の極限操作であり、それ以外は有限和の代数計算である。

Step 1: ad_X は $\mathbb{C}$-線型。$Z, W \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$、$c \in \mathbb{C}$ について分配律より

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_X(Z+W) &= X(Z+W) - (Z+W)X && (\because\ \mathrm{ad}_X \text{ の定義}) \\
&= (XZ+XW) - (ZX+WX) && (\because\ \text{行列の積の分配律}) \\
&= (XZ-ZX) + (XW-WX) && (\because\ \text{行列の加法の交換則と結合則}) \\
&= \mathrm{ad}_X(Z) + \mathrm{ad}_X(W) && (\because\ \mathrm{ad}_X \text{ の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_X(cZ) &= X(cZ) - (cZ)X && (\because\ \mathrm{ad}_X \text{ の定義}) \\
&= c(XZ) - (cZ)X && (\because\ \text{主張 2.19}) \\
&= c(XZ) - c(ZX) && (\because\ \text{主張 2.18}) \\
&= c(XZ-ZX) && (\because\ \text{主張 2.32 } (A=XZ,\ B=ZX)) \\
&= c\,\mathrm{ad}_X(Z) && (\because\ \mathrm{ad}_X \text{ の定義})
\end{aligned}$$

したがって $\mathrm{ad}_X \in \mathrm{End}(\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}))$ であり、$\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ は 定義 2.91 のノルムをもつ有限次元 $\mathbb{C}$-線型空間（次元 n^2）なので、定義 3.4 の $\exp(\mathrm{ad}_X)$ が定義され、定理 3.3 より

$$\exp(\mathrm{ad}_X)(Y) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y) = \lim_{N\to\infty} P_N, \qquad P_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y)$$

である（右辺の収束は Step 6 で独立に示すので、循環はしない）。

Step 2: 積の同時収束。$C_N \to C$、$D_N \to D$ ならば $C_N D_N \to CD$。実際

$$\begin{aligned}
\|C_N D_N - CD\| &= \|C_N D_N - C_N D + C_N D - CD\| && (\because \text{中間項} C_N D \text{ を引いて足した}) \\
&= \|C_N(D_N - D) + (C_N - C)D\| && (\because \text{行列の積の分配律}) \\
&\le \|C_N(D_N - D)\| + \|(C_N - C)D\| && (\because \text{三角不等式。主張 2.92}) \\
&\le \|C_N\|\,\|D_N - D\| + \|C_N - C\|\,\|D\| && (\because \text{行列ノルムの劣乗法性。主張 2.93})
\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}
\|C_N\| &= \|C + (C_N - C)\| && (\because C_N = C + (C_N - C)) \\
&\le \|C\| + \|C_N - C\| && (\because \text{三角不等式。主張 2.92})
\end{aligned}$$

は $\|C_N - C\| \to 0$ より有界（十分大きい N で $\|C_N - C\| \le 1$ なので $\|C_N\| \le \|C\| + 1$）だから、右辺は 0 に収束する。これを 2 回使って

$$Q_N := S_N(X)\,Y\,S_N(-X) \longrightarrow \exp(X)\,Y\,\exp(-X) \qquad (N \to \infty)$$

（1 回目は $C_N = S_N(X),\ D_N = Y$（定数列）として $S_N(X)Y \to \exp(X)Y$、2 回目は $C_N = S_N(X)Y,\ D_N = S_N(-X)$ として）。

Step 3: Q_N と P_N の有限和表示。まず $(-X)^q = (-1)^q X^q$ に注意すると、有限和の分配律より

$$
\begin{aligned}
Q_N &= S_N(X)\,Y\,S_N(-X) \quad (\because Q_N \text{ の定義（Step 2）}) \\
&= \left(\sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!} X^p\right) Y \left(\sum_{q=0}^{N} \frac{1}{q!}(-X)^q\right) \quad (\because \text{部分和} S_N \text{ の定義}) \\
&= \sum_{p=0}^{N}\sum_{q=0}^{N} \frac{1}{p!}\,\frac{1}{q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q \quad (\because \text{有限和の分配律を 2 度。定理 5.10 の証明 Step 0}) \\
&= \sum_{p=0}^{N}\sum_{q=0}^{N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q \quad (\because \text{スカラーの積})
\end{aligned}
$$

一方 $\mathrm{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k}$ であり、各 $0 \le k \le m$ について

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{m!}\binom{m}{k} &= \frac{1}{m!} \cdot \frac{m!}{k!\,(m-k)!} \quad (\because \text{二項係数の定義}) \\
&= \frac{1}{k!\,(m-k)!} \quad (\because \text{約分（} m! \neq 0\text{）})
\end{aligned}
$$

であるから

$$
\begin{aligned}
P_N &= \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y) \quad (\because P_N \text{ の定義（Step 1）}) \\
&= \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \quad (\because \text{ad の二項展開。定理 5.10}) \\
&= \sum_{m=0}^{N}\sum_{k=0}^{m} \frac{1}{m!}\binom{m}{k}\, X^k\, Y\, (-X)^{m-k} \quad (\because \text{有限和の分配律}) \\
&= \sum_{m=0}^{N}\sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!\,(m-k)!}\, X^k\, Y\, (-X)^{m-k} \quad \left(\because \tfrac{1}{m!}\tbinom{m}{k} = \tfrac{1}{k!\,(m-k)!}\right) \\
&= \sum_{(p,q)\in T_N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q, \qquad T_N := \left\{(p,q) \in \mathbb{Z}_{\ge 0}^2 \;\middle|\; p+q \le N\right\} \quad (\because \text{添字の全単射} (m,k) \mapsto (k,\ m-k))
\end{aligned}
$$

（最後の等号は $(m,k) \mapsto (p,q) := (k,\ m-k)$ が $\{(m,k) \mid 0 \le m \le N,\ 0 \le k \le m\}$ から T_N への全単射であることによる。逆写像は $(p,q) \mapsto (p+q,\ p)$）。$T_N \subset \{0,\dots,N\}^2$ であるから

$$
\begin{aligned}
Q_N - P_N &= \sum_{(p,q)\in\{0,\dots,N\}^2} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q - \sum_{(p,q)\in T_N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q \quad (\because \text{上の 2 つの有限和表示}) \\
&= \sum_{(p,q)\in\{0,\dots,N\}^2\setminus T_N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q \quad (\because T_N \subset \{0,\dots,N\}^2 \text{ による有限和の差}) \\
&= \sum_{(p,q)\in D_N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q, \qquad D_N := \{(p,q) \mid 0 \le p,q \le N,\ p+q > N\} \quad (\because D_N \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

Step 4: 項ごとのノルム評価。$p, q \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について

$$
\left\| X^p\, Y\, (-X)^q \right\| \le a^{p+q}\, \|Y\|
$$

が成り立つ。準備として $l \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について $\|X^l\| \le a^l$ を l についての帰納法で示す。$l = 1$ のときは

$$\begin{aligned}\left\|X^1\right\| &= \|X\| \quad (\because X^1 = X\,(\text{行列の冪の定義})) \\ &= a \quad (\because a\ \text{の定義}) \\ &= a^1 \quad (\because a^1 = a\,(\text{指数法則}))\end{aligned}$$

である。l のとき $\|X^l\| \leq a^l$ とすると

$$\begin{aligned}\left\|X^{l+1}\right\| &= \left\|X^l X\right\| \quad (\because \text{行列の冪の定義}) \\ &\leq \left\|X^l\right\| \|X\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 2.93}) \\ &\leq a^l \|X\| \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= a^l a \quad (\because a\ \text{の定義}) \\ &= a^{l+1} \quad (\because \text{指数法則})\end{aligned}$$

であるから、任意の $l \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について $\|X^l\| \leq a^l$ が成り立つ。符号を付けたものも同じ評価をもつ。

$$\begin{aligned}\left\|(-X)^l\right\| &= \left\|(-1)^l X^l\right\| \quad (\because (-X)^l = (-1)^l X^l) \\ &= \left|(-1)^l\right| \left\|X^l\right\| \quad (\because \text{ノルムの斉次性。主張 2.92}) \\ &= \left\|X^l\right\| \quad (\because \left|(-1)^l\right| = 1) \\ &\leq a^l \quad (\because \text{直前の帰納法})\end{aligned}$$

以上を使って p, q の 4 つの場合を評価する。

- $p \geq 1,\ q \geq 1$ のとき

$$\begin{aligned}\|X^p Y (-X)^q\| &\leq \|X^p\| \|Y (-X)^q\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 2.93}) \\ &\leq \|X^p\| \|Y\| \|(-X)^q\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 2.93}) \\ &\leq a^p \|Y\| \|(-X)^q\| \quad (\because \|X^p\| \leq a^p) \\ &\leq a^p \|Y\| a^q \quad (\because \|(-X)^q\| \leq a^q)\end{aligned}$$

- $p = 0,\ q \geq 1$ のとき

$$\begin{aligned}\left\|X^0 Y (-X)^q\right\| &= \|Y (-X)^q\| \quad (\because X^0 = I\ \text{と}IY = Y) \\ &\leq \|Y\| \|(-X)^q\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 2.93}) \\ &\leq \|Y\| a^q \quad (\because \|(-X)^q\| \leq a^q) \\ &= a^0 \|Y\| a^q \quad (\because a^0 = 1)\end{aligned}$$

- $p \geq 1,\ q = 0$ のとき

$$\begin{aligned}\left\|X^p Y (-X)^0\right\| &= \|X^p Y\| \quad (\because (-X)^0 = I\ \text{と}YI = Y) \\ &\leq \|X^p\| \|Y\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 2.93}) \\ &\leq a^p \|Y\| \quad (\because \|X^p\| \leq a^p) \\ &= a^p \|Y\| a^0 \quad (\because a^0 = 1)\end{aligned}$$

- $p = q = 0$ のとき

$$\begin{aligned}\left\|X^0 Y (-X)^0\right\| &= \|Y\| \quad (\because X^0 = (-X)^0 = I\ \text{と}IYI = Y) \\ &= a^0 \|Y\| a^0 \quad (\because a^0 = 1)\end{aligned}$$

いずれの場合も次が成り立つ。

$$\begin{aligned}\|X^p\,Y\,(-X)^q\| &\le a^p\,\|Y\|\,a^q \quad (\because \text{上の 4 つの場合})\\ &= a^p\,a^q\,\|Y\| \quad (\because \text{実数の積の可換性})\\ &= a^{p+q}\,\|Y\| \quad (\because \text{指数法則})\end{aligned}$$

Step 5: $\|Q_N - P_N\| \to 0$。$N \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、$L := \lfloor N/2 \rfloor$（$2L \le N$ を満たす最大の非負整数）とおく。$(p,q) \in D_N$ ならば $p \ge L+1$ または $q \ge L+1$ である（もし $p \le L$ かつ $q \le L$ なら $p+q \le 2L \le N$ となり $p+q > N$ に矛盾する）。したがって

$$D_N \subset \underbrace{\{(p,q) \mid L+1 \le p \le N,\ 0 \le q \le N\}}_{=:A_N} \cup \underbrace{\{(p,q) \mid 0 \le p \le N,\ L+1 \le q \le N\}}_{=:B_N}$$

であり（$N \ge 1$ より $L \le N/2 < N$ すなわち $L+1 \le N$ なので A_N, B_N は空でない）。

$$\begin{aligned}\|Q_N - P_N\| &\le \sum_{(p,q)\in D_N} \frac{1}{p!\,q!}\,\|X^p Y (-X)^q\| \quad (\because \text{三角不等式・斉次性。主張 2.92})\\ &\le \|Y\| \sum_{(p,q)\in D_N} \frac{a^p}{p!}\cdot\frac{a^q}{q!} \quad (\because \text{Step 4})\\ &\le \|Y\| \left(\sum_{(p,q)\in A_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} + \sum_{(p,q)\in B_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} \right) \quad (\because D_N \subset A_N \cup B_N,\ \text{各項} \ge 0)\end{aligned}$$

ここで $\sum_{q=0}^{N} \frac{a^q}{q!} = E_N(a) \le E(a)$ かつ $\sum_{p=L+1}^{N} \frac{a^p}{p!} \le R_L(a)$（(3) の後半を $p = L+1 \ge 1,\ q = N$ として適用）であるから

$$\begin{aligned}\sum_{(p,q)\in A_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} &= \left(\sum_{p=L+1}^{N} \frac{a^p}{p!}\right)\left(\sum_{q=0}^{N} \frac{a^q}{q!}\right) && (\because \text{長方形の添字集合にわたる有限和の、積への分解（分配律）})\\ &\le R_L(a) \left(\sum_{q=0}^{N} \frac{a^q}{q!}\right) && \left(\because \sum_{p=L+1}^{N} \tfrac{a^p}{p!} \le R_L(a) \text{ と } \sum_{q=0}^{N} \tfrac{a^q}{q!} \ge 0 \text{。主張 3.1}\right)\\ &= R_L(a)\,E_N(a) && (\because E_N(a) \text{ の定義})\\ &\le R_L(a)\,E(a) && (\because E_N(a) \le E(a) \text{ と } R_L(a) \ge 0 \text{。主張 3.1})\end{aligned}$$

同じ 4 段を B_N について繰り返して

$$\begin{aligned}\sum_{(p,q)\in B_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} &= \left(\sum_{p=0}^{N} \frac{a^p}{p!}\right)\left(\sum_{q=L+1}^{N} \frac{a^q}{q!}\right) && (\because \text{長方形の添字集合にわたる有限和の、積への分解（分配律）})\\ &\le \left(\sum_{p=0}^{N} \frac{a^p}{p!}\right) R_L(a) && \left(\because \sum_{q=L+1}^{N} \tfrac{a^q}{q!} \le R_L(a) \text{ と } \sum_{p=0}^{N} \tfrac{a^p}{p!} \ge 0 \text{。主張 3.1}\right)\\ &= E_N(a)\,R_L(a) && (\because E_N(a) \text{ の定義})\\ &\le E(a)\,R_L(a) && (\because E_N(a) \le E(a) \text{ と } R_L(a) \ge 0 \text{。主張 3.1})\end{aligned}$$

よって

$$
\begin{aligned}
\|Q_N - P_N\| &\le \|Y\| \left(\sum_{(p,q)\in A_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} + \sum_{(p,q)\in B_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} \right) && (\because \text{上の } \|Q_N - P_N\| \text{ の評価の最後の行}) \\
&\le \|Y\| \big(R_L(a)\, E(a) + E(a)\, R_L(a) \big) && (\because \text{直前の 2 つの評価と } \|Y\| \ge 0) \\
&= 2\, \|Y\|\, E(a)\, R_L(a) && (\because \text{実数の積の可換性と } c + c = 2c)
\end{aligned}
$$

である（$L = \lfloor N/2 \rfloor$）。

$N \to \infty$ のとき $L = \lfloor N/2 \rfloor \to \infty$ であり、主張 3.1 (3) より $R_L(a) \to 0$。$2\|Y\|E(a)$ は N によらない定数なので $\|Q_N - P_N\| \to 0$。

Step 6: 結論。Step 2 より $\|Q_N - \exp(X)Y\exp(-X)\| \to 0$、Step 5 より $\|Q_N - P_N\| \to 0$ である。ノルムの基本性質（主張 2.92 の (2)(3)）と実数列の評価により

$$
\begin{aligned}
\|P_N - \exp(X)\, Y\, \exp(-X)\| &= \|(P_N - Q_N) + (Q_N - \exp(X)\, Y\, \exp(-X))\| && (\because \text{行列の和の結合則と } (-Q_N) + Q_N = O) \\
&\le \|P_N - Q_N\| + \|Q_N - \exp(X)\, Y\, \exp(-X)\| && (\because \text{ノルムの三角不等式。主張 2.92}) \\
&= \|Q_N - P_N\| + \|Q_N - \exp(X)\, Y\, \exp(-X)\| && (\because \text{ノルムの斉次性を } c = -1 \text{ に取ること。主張 2.92}) \\
&\longrightarrow 0 + 0 && (\because \text{Step 5 と Step 2}) \\
&= 0 && (\because \text{実数の加法の単位元})
\end{aligned}
$$

であり、左辺は非負（主張 2.92 の (1)）なので $\|P_N - \exp(X)\, Y\, \exp(-X)\| \to 0$。すなわち $P_N \to \exp(X)Y\exp(-X)$。これは主張 (1)（級数の収束）と (2) の第 1 の等号 $\exp(X)Y\exp(-X) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ を与える。第 2 の等号は Step 1 の $\exp(\mathrm{ad}_X)(Y) = \lim_{N\to\infty} P_N$ と極限の一意性（主張 2.92 (4)）による。

Step 7: (3)。まず X と $-X$ が交換することを見る。

$$
\begin{aligned}
X(-X) &= -(XX) && (\because \text{主張 2.21 } (A = X,\ B = X)) \\
&= -X^2 && (\because \text{行列の冪の定義}) \\
&= -(XX) && (\because \text{行列の冪の定義}) \\
&= (-X)X && (\because \text{主張 2.20 } (A = X,\ B = X))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\exp(X)\exp(-X) &= \exp(X + (-X)) && (\because \text{可換な 2 つの行列の指数の積 定理 3.7 と、直前に示した } X(-X) = (-X)X) \\
&= \exp(O) && (\because \text{行列の加法についての逆元 } X + (-X) = O) \\
&= I && (\because \text{零行列の指数は単位行列であること 定理 3.8})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\exp(-X)\exp(X) &= \exp((-X) + X) && (\because \text{可換な 2 つの行列の指数の積 定理 3.7 と、直前に示した } (-X)X = X(-X)) \\
&= \exp(O) && (\because \text{行列の加法についての逆元 } (-X) + X = O) \\
&= I && (\because \text{零行列の指数は単位行列であること 定理 3.8})
\end{aligned}
$$

2 つの積がどちらも I なので、逆行列の定義により $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) &= \exp(X)\, Y\, \exp(X)^{-1} && (\because \text{Ad の定義}) \\
&= \exp(X)\, Y\, \exp(-X) && (\because \text{直前に示した } \exp(X)^{-1} = \exp(-X)) \\
&= \exp(\mathrm{ad}_X)(Y) && (\because \text{Step 6 で示した (2)。 } \mathrm{ad}_X \text{ の定義は 定義 5.11})
\end{aligned}
$$

□

定理 5.14 ($\exp(\mathrm{ad}_X)(Y)$ の級数展開)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、$\forall X, Y \in \mathrm{M}(n, \mathbb{C})$ について考える。ここで $\mathrm{ad}_X : \mathrm{M}(n,\mathbb{C}) \to \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ は 定義 5.11 の写像 $Z \mapsto [X, Z] = XZ - ZX$、$\mathrm{ad}_X^m$（$m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$）は 定理 5.10 の再帰 $\mathrm{ad}_X^0(Y) = Y,\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) = [X, \mathrm{ad}_X^m(Y)]$ で定まる m 重交換子、$\exp(\mathrm{ad}_X) :=$

$\exp(\mathrm{ad}_X)$ は 定義 3.4 の指数写像を有限次元 $\mathbb{C}$-線型空間 $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$（次元 n^2、ノルムは 定義 2.91）の自己準同型 ad_X に適用したものとする。このとき右辺の級数は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ において収束し、

$$\exp(\mathrm{ad}_X)(Y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{[X,[X,\dots,[X,Y]\dots]]}_{n \text{ times}} = Y + [X,Y] + \tfrac{1}{2}[X,[X,Y]] + \tfrac{1}{6}[X,[X,[X,Y]]] + \cdots$$

が成り立つ（$n=0$ のときは Y とする）。

証明. 定理 5.13 を $K := \mathbb{C}$ として適用する（同ブロックは Lie 群論を使わず、定理 5.10（純代数）と 主張 3.1・主張 2.93・主張 3.2 だけから証明されているので、循環しない）。

Step 1: 記号の一致。定理 5.10 の再帰の定義より $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\mathrm{ad}_X^m(Y) = \underbrace{[X,[X,\dots,[X,Y]\dots]]}_{m \text{ times}} \quad (\because \mathrm{ad}_X^m \text{ の再帰的定義 定理 5.10}) \qquad (m=0 \text{ のときは} Y)$$

であるから、主張の右辺は $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ に他ならない。

Step 2: 収束。定理 5.13 (1) より、級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ において収束する。より正確には、同ブロックの証明 Step 6 で有限和 $P_N = \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ が $\exp(X)Y\exp(-X)$ に収束することが示されている。

Step 3: 等号。定理 5.13 の証明 Step 1 より $\mathrm{ad}_X \in \mathrm{End}(\mathrm{M}(n,\mathbb{C}))$ であり、定義 3.4 と 定理 3.3 により $\exp(\mathrm{ad}_X)$ が定まって

$$\begin{aligned}
\exp(\mathrm{ad}_X)(Y) &= \exp(\mathrm{ad}_X)\,(Y) && (\because\ \exp(\mathrm{ad}_X) := \exp(\mathrm{ad}_X) \text{ という本定理の主張での記号の定め方}) \\
&= \lim_{N\to\infty} P_N && (\because\ \text{指数写像の定義 定義 3.4 と級数の収束 定理 3.3 および 定理 5.13 の (2) の第 2 の等号。 } P_N \text{ は Step 2 の有限和}) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y) && (\because\ \text{無限級数の値は部分和の列の極限であること})
\end{aligned}$$

が成り立つ。Step 1 の記号の一致と合わせて主張を得る。

解析（非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の極限）を使うのは Step 2・Step 3 の極限操作だけであり、その根拠は 主張 2.95（$\mathbb{R}$ の完備性）である。Step 1 は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ の環構造だけを使う純代数的な議論である。 □

6 Pauli 行列の積と、クロネッカー積の反交換

主張 6.1 (Pauli 行列の積)**.** 2 次の複素行列を

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$$

とする。このとき $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の中で

$$\sigma^x\sigma^x = \sigma^y\sigma^y = \sigma^z\sigma^z = I,$$

$$\sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z, \qquad \sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y, \qquad \sigma^y\sigma^z = -\sigma^z\sigma^y$$

が成り立つ。

証明. 準備として $\mathbb{C}$ の中で次を計算しておく。

$$\begin{aligned}(-i)\cdot i &= -(i\cdot i) && (\because \mathbb{C} \text{ の乗法と符号の計算})\\ &= -(-1) && (\because i\cdot i=-1)\\ &= 1 && (\because \mathbb{C} \text{ の符号の計算})\end{aligned}$$

続けて逆順の積を計算する。

$$\begin{aligned}i\cdot(-i) &= (-i)\cdot i && (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換律})\\ &= 1 && (\because \text{直前の鎖})\end{aligned}$$

反可換性の 3 式の右辺に現れる積も計算しておく。

$$\begin{aligned}\sigma^x\sigma^z &= \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix} && (\because \sigma^x,\ \sigma^z \text{ の定義})\\ &= \begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma^x\sigma^y &= \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix} && (\because \sigma^x,\ \sigma^y \text{ の定義})\\ &= \begin{pmatrix}i&0\\0&-i\end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma^z\sigma^y &= \begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix} && (\because \sigma^z,\ \sigma^y \text{ の定義})\\ &= \begin{pmatrix}0&-i\\(-1)\cdot i&0\end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6})\\ &= \begin{pmatrix}0&-i\\-i&0\end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.14})\end{aligned}$$

まず $\sigma^x\sigma^x=I$、$\sigma^y\sigma^y=I$、$\sigma^z\sigma^z=I$ の 3 式を示す。

$$\begin{aligned}\sigma^x\sigma^x &= \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} && (\because \sigma^x \text{ の定義})\\ &= \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6})\\ &= \begin{pmatrix}\delta_{11}&\delta_{12}\\\delta_{21}&\delta_{22}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.1})\\ &= I && (\because \text{定義 2.2})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma^y\sigma^y &= \begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix} && (\because \sigma^y \text{ の定義})\\ &= \begin{pmatrix}(-i)\cdot i&0\\0&i\cdot(-i)\end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6})\\ &= \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix} && (\because \text{上の準備})\\ &= \begin{pmatrix}\delta_{11}&\delta_{12}\\\delta_{21}&\delta_{22}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.1})\\ &= I && (\because \text{定義 2.2})\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} && (\because \sigma^z \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1)\cdot(-1) \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で} (-1)\cdot(-1) = 1) \\
&= \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} \\ \delta_{21} & \delta_{22} \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.1}) \\
&= I && (\because \text{定義 2.2})
\end{aligned}
$$

次に反可換性の 3 式を、それぞれ左辺から計算する。

$$
\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^x &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \sigma^z,\ \sigma^x \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} -0 & 1 \\ -1 & -0 \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で} 0 = -0\text{。}\ -z \text{ は定義 1.14 の記号}) \\
&= \begin{pmatrix} -0 & -(-1) \\ -1 & -0 \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で} 1 = -(-1)\text{。}\ -z \text{ は定義 1.14 の記号}) \\
&= -\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.94}) \\
&= -\sigma^x\sigma^z && (\because \text{上で計算した } \sigma^x\sigma^z)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sigma^y\sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \sigma^y,\ \sigma^x \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} -i & -0 \\ -0 & i \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で} 0 = -0\text{。}\ -z \text{ は定義 1.14 の記号}) \\
&= \begin{pmatrix} -i & -0 \\ -0 & -(-i) \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で} i = -(-i)\text{。}\ -z \text{ は定義 1.14 の記号}) \\
&= -\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.94}) \\
&= -\sigma^x\sigma^y && (\because \text{上で計算した } \sigma^x\sigma^y)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sigma^y\sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} && (\because \sigma^y,\ \sigma^z \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & (-i)\cdot(-1) \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で} (-i)\cdot(-1) = i) \\
&= \begin{pmatrix} -0 & i \\ i & -0 \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で} 0 = -0。\ -z \text{ は定義 1.14 の記号}) \\
&= \begin{pmatrix} -0 & -(-i) \\ -(-i) & -0 \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で} i = -(-i)。\ -z \text{ は定義 1.14 の記号}) \\
&= -\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.94}) \\
&= -\sigma^z\sigma^y && (\because \text{上で計算した } \sigma^z\sigma^y)
\end{aligned}
$$

以上で 6 式すべてが確かめられた。なお $\sigma^x\sigma^x = I$ より σ^x は σ^x と可換であり、I は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ のすべての元 A と可換である（主張 2.16 と 主張 2.17 より $IA = A = AI$）。 □

主張 6.2 $(\sigma^y\sigma^x = (-i)\,\sigma^z)$**.** 主張 6.1 の $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ と虚数単位 $i \in \mathbb{C}$ について、$\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の中で

$$\sigma^y\sigma^x = (-i)\,\sigma^z$$

が成り立つ。右辺は 定義 2.3 のスカラー倍である。

証明.

$$
\begin{aligned}
\sigma^y\sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1}) \\
&= \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 1.56 を右辺から左辺へ}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \\ (-i)\cdot 0 & i \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59 を 2 箇所へ右辺から左辺へ同時適用}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \\ (-i)\cdot 0 & (-i)\cdot(-1) \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で } (-i)\cdot(-1) = i。\text{定義 1.12 の積}) \\
&= (-i)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= (-i)\,\sigma^z && (\because \text{主張 6.1})
\end{aligned}
$$

□

主張 6.3 $(\sigma^x\sigma^z = (-i)\,\sigma^y)$**.** 主張 6.1 の $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ と虚数単位 $i \in \mathbb{C}$ について、$\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の中で

$$\sigma^x\sigma^z = (-i)\,\sigma^y$$

が成り立つ。右辺は 定義 2.3 のスカラー倍である。

証明.

$$\begin{aligned}
\sigma^x\sigma^z &= \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1})\\
&= \begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6})\\
&= \begin{pmatrix}(-i)\cdot 0 & -1\\ 1 & (-i)\cdot 0\end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59 を 2 箇所へ右辺から左辺へ同時適用})\\
&= \begin{pmatrix}(-i)\cdot 0 & (-i)\cdot(-i)\\ 1 & (-i)\cdot 0\end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で } (-i)\cdot(-i) = -1\text{。定義 1.12 の積})\\
&= \begin{pmatrix}(-i)\cdot 0 & (-i)\cdot(-i)\\ (-i)\cdot i & (-i)\cdot 0\end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で } (-i)\cdot i = 1\text{。定義 1.12 の積})\\
&= (-i)\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.3})\\
&= (-i)\,\sigma^y && (\because \text{主張 6.1})
\end{aligned}$$

□

主張 6.4 (2 次の単位行列の転置)**.** $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$（定義 2.2 で $n = 2$）とする。転置は 定義 2.75 による。このとき

$$I^\top = I$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned}
I^\top &= \begin{pmatrix}I_{11} & I_{21}\\ I_{12} & I_{22}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.75 で} m = n = 2)\\
&= \begin{pmatrix}\delta_{11} & \delta_{21}\\ \delta_{12} & \delta_{22}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.2 で} n = 2)\\
&= \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.1})\\
&= \begin{pmatrix}\delta_{11} & \delta_{12}\\ \delta_{21} & \delta_{22}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.1})\\
&= I && (\because \text{定義 2.2 で} n = 2)
\end{aligned}$$

□

主張 6.5 (σ^x の転置)**.** 主張 6.1 の $\sigma^x \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ について、定義 2.75 の転置に関して

$$(\sigma^x)^\top = \sigma^x$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned}
(\sigma^x)^\top &= \begin{pmatrix}(\sigma^x)_{11} & (\sigma^x)_{21}\\ (\sigma^x)_{12} & (\sigma^x)_{22}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.75 で} m = n = 2)\\
&= \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1 の} \sigma^x \text{ の成分})\\
&= \sigma^x && (\because \text{主張 6.1 の} \sigma^x)
\end{aligned}$$

□

主張 6.6 (σ^z の転置)**.** 主張 6.1 の $\sigma^z \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ について、定義 2.75 の転置に関して

$$(\sigma^z)^\top = \sigma^z$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned}
(\sigma^z)^\top &= \begin{pmatrix} (\sigma^z)_{11} & (\sigma^z)_{21} \\ (\sigma^z)_{12} & (\sigma^z)_{22} \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.75 で} m = n = 2) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1 の} \sigma^z \text{ の成分}) \\
&= \sigma^z && (\because \text{主張 6.1 の} \sigma^z)
\end{aligned}$$

□

主張 6.7 (σ^y の転置)**.** 主張 6.1 の $\sigma^y \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ について、定義 2.75 の転置と 定義 1.94 の符号反転に関して

$$(\sigma^y)^\top = -\sigma^y$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned}
(\sigma^y)^\top &= \begin{pmatrix} (\sigma^y)_{11} & (\sigma^y)_{21} \\ (\sigma^y)_{12} & (\sigma^y)_{22} \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.75 で} m = n = 2) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1 の} \sigma^y \text{ の成分}) \\
&= \begin{pmatrix} -0 & i \\ -i & -0 \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で} 0 = -0。\ -z \text{ は定義 1.14 の記号}) \\
&= \begin{pmatrix} -0 & -(-i) \\ -i & -0 \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で} i = -(-i)。\ -z \text{ は定義 1.14 の記号}) \\
&= -\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.94}) \\
&= -\sigma^y && (\because \text{主張 6.1 の} \sigma^y)
\end{aligned}$$

□

主張 6.8 (2 次の単位行列の成分はすべて実数)**.** $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$（定義 2.2 で $n = 2$）の成分はすべて実数（定義 2.81 で $m = n = 2$）である。

証明.

$$\begin{aligned}
I &= \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} \\ \delta_{21} & \delta_{22} \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.2 で} n = 2) \\
&= \begin{pmatrix} 1_{\mathbb{C}} & 0_{\mathbb{C}} \\ 0_{\mathbb{C}} & 1_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.1}) \\
&= \begin{pmatrix} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) & \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) \\ \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) & \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.13 の略記} 1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1),\ 0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) \text{ を各成分へ同時に適用})
\end{aligned}$$

したがって各成分 I_{pq}（$p, q \in \{1, 2\}$）について $r := 1$（$p = q$）または $r := 0$（$p \neq q$）と取れば $I_{pq} = r_{\mathbb{C}}$、$r \in \mathbb{R}$ であり、定義 2.81 の条件が成り立つ。 □

主張 6.9 (σ^x の成分はすべて実数)**.** 主張 6.1 の $\sigma^x \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の成分はすべて実数（定義 2.81 で $m = n = 2$）である。

証明.

$$\begin{aligned}\sigma^x &= \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{C}} & 1_{\mathbb{C}} \\ 1_{\mathbb{C}} & 0_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1 の} \sigma^x) \\ &= \begin{pmatrix} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) & \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) \\ \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) & \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.13 の略記} 0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0),\ 1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) \text{ を各成分へ同時に適用})\end{aligned}$$

したがって各成分 $(\sigma^x)_{pq}$（$p, q \in \{1, 2\}$）について $r := 0$（$p = q$）または $r := 1$（$p \neq q$）と取れば $(\sigma^x)_{pq} = r_{\mathbb{C}}$、$r \in \mathbb{R}$ であり、定義 2.81 の条件が成り立つ。 □

主張 6.10 (σ^z の成分はすべて実数)**.** 主張 6.1 の $\sigma^z \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の成分はすべて実数（定義 2.81 で $m = n = 2$）である。

証明.

$$\begin{aligned}\sigma^z &= \begin{pmatrix} 1_{\mathbb{C}} & 0_{\mathbb{C}} \\ 0_{\mathbb{C}} & -1_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1 の} \sigma^z) \\ &= \begin{pmatrix} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) & \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) \\ \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) & \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1) \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.13 の略記} 1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1),\ 0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0),\ -1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1) \text{ を各成分へ同時に適用})\end{aligned}$$

したがって各成分 $(\sigma^z)_{pq}$（$p, q \in \{1, 2\}$）について $r := 1$（$p = q = 1$）、$r := -1$（$p = q = 2$）、$r := 0$（$p \neq q$）と取れば $(\sigma^z)_{pq} = r_{\mathbb{C}}$、$r \in \mathbb{R}$ であり、定義 2.81 の条件が成り立つ。 □

定義 6.11 (σ^y の実の因子R^y)**.** $R^y \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ を

$$R^y := \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{C}} & -1_{\mathbb{C}} \\ 1_{\mathbb{C}} & 0_{\mathbb{C}} \end{pmatrix}$$

で定める。

主張 6.12 ($\sigma^y = iR^y$)**.** 主張 6.1 の $\sigma^y \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ と 定義 6.11 の R^y について、$i := (0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}) \in \mathbb{C}$（定義 1.12 の台集合の元、虚数単位）とすると

$$\sigma^y = iR^y$$

が成り立つ。右辺は 定義 2.3 のスカラー倍である。

証明.

$$\begin{aligned}\sigma^y &= \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{C}} & -i \\ i & 0_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1 の} \sigma^y) \\ &= \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{C}} & (-1_{\mathbb{C}}) \cdot i \\ i & 0_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.14 } (z \to i)) \\ &= \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{C}} & i \cdot (-1_{\mathbb{C}}) \\ i & 0_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because \text{積の可換律 } ((-1_{\mathbb{C}}) \cdot i = i \cdot (-1_{\mathbb{C}}))\text{。主張 1.56}) \\ &= \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{C}} & i \cdot (-1_{\mathbb{C}}) \\ i \cdot 1_{\mathbb{C}} & 0_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元 } (i = i \cdot 1_{\mathbb{C}})\text{。主張 1.56}) \\ &= \begin{pmatrix} i \cdot 0_{\mathbb{C}} & i \cdot (-1_{\mathbb{C}}) \\ i \cdot 1_{\mathbb{C}} & i \cdot 0_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59 } (z \to i) \text{ を } (1,1) \text{ 成分と } (2,2) \text{ 成分へ同時に適用}) \\ &= i \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{C}} & -1_{\mathbb{C}} \\ 1_{\mathbb{C}} & 0_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.3 } (m, n \to 2,\ a \to i)) \\ &= iR^y && (\because \text{定義 6.11})\end{aligned}$$

□

主張 6.13 (R^y の成分はすべて実数)**.** 定義 6.11 の $R^y \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の成分はすべて実数（定義 2.81 で $m=n=2$）である。

証明.

$$
\begin{aligned}
R^y &= \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{C}} & -1_{\mathbb{C}} \\ 1_{\mathbb{C}} & 0_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because \text{定義 6.11}) \\
&= \begin{pmatrix} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) & \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1) \\ \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) & \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.13 の略記} 0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0),\ -1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1),\ 1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) \text{ を各成分へ同時に適用})
\end{aligned}
$$

したがって各成分 $(R^y)_{pq}$（$p,q \in \{1,2\}$）について $r := 0$（$p=q$）、$r := -1$（$(p,q)=(1,2)$）、$r := 1$（$(p,q)=(2,1)$）と取れば $(R^y)_{pq} = r_{\mathbb{C}}$、$r \in \mathbb{R}$ であり、定義 2.81 の条件が成り立つ。 □

主張 6.14 (1 因子だけ反可換ならクロネッカー積は反交換する)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$x_1,\ldots,x_M,\ y_1,\ldots,y_M \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ に対して

$$
X := x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M, \qquad Y := y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M \ \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})
$$

とおく。ある $j \in \{1,\ldots,M\}$ が存在して

- $y_j x_j = -(x_j y_j)$（第 j 因子では反可換）
- $i \in \{1,\ldots,M\},\ i \neq j \implies y_i x_i = x_i y_i$（他の因子では可換）

が成り立つならば、

$$
[X,Y]_+ := XY + YX = 0
$$

が成り立つ。

証明. 2^M 次の複素行列としての積は、クロネッカー積で書かれた行列どうしでは各因子ごとの 2 次の行列の積になる。すなわち $A_1,\ldots,A_M,B_1,\ldots,B_M \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ に対し、

$$
(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_MB_M) \quad (\because \text{主張 2.73 の積の規則})
$$

また $c \in \mathbb{C}$ と $j \in \{1,\ldots,M\}$ に対し

$$
C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(cC_j)}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes C_M = c\,(C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes C_M) \quad (\because \text{主張 2.74 の第}j\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性})
$$

$$
\begin{aligned}
XY &= (x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M)(y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M) && (\because X,Y \text{ の定義}) \\
&= (x_1y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (x_My_M) && (\because \text{主張 2.73 の積の規則})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
YX &= (y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M)(x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M) && (\because X,Y \text{ の定義}) \\
&= (y_1x_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (y_Mx_M) && (\because \text{主張 2.73 の積の規則}) \\
&= (x_1y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(y_jx_j)}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (x_My_M) && (\because i \neq j \text{ では} y_ix_i = x_iy_i) \\
&= (x_1y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((-1)\,(x_jy_j))}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (x_My_M) && (\because y_jx_j = -(x_jy_j)) \\
&= (-1)\,((x_1y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (x_My_M)) && (\because \text{主張 2.74 の第}j\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= (-1)\,(XY) && (\because \text{上の}XY\text{ の計算}) \\
&= -XY && (\because \text{スカラー} -1 \text{ 倍は加法の逆元})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
[X,Y]_+ &= XY + YX && (\because\ [X,Y]_+ \text{ の定義})\\
&= XY + (-XY) && (\because\ \text{上の} YX \text{ の計算})\\
&= 0 && (\because\ \text{加法の逆元})
\end{aligned}
$$

□

主張 6.15 (全ての因子で可換ならクロネッカー積は可換)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$x_1, \ldots, x_M,\ y_1, \ldots, y_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対して

$$
X := x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M, \qquad Y := y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M \ \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})
$$

とおく（$\boxtimes$ は 定義 2.72 のクロネッカー積)。すべての $i \in \{1, \ldots, M\}$ について $y_i x_i = x_i y_i$ ならば、

$$
XY = YX
$$

が成り立つ。

証明.

$$
\begin{aligned}
XY &= (x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M)(y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M) && (\because\ X, Y \text{ の定義})\\
&= (x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M) && (\because\ \text{主張 2.73 (1)})\\
&= (y_1 x_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (y_M x_M) && (\because\ \text{仮定 } y_i x_i = x_i y_i \text{ を右辺から左辺へ、全ての } i \text{ へ同時に適用})\\
&= (y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M)(x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M) && (\because\ \text{主張 2.73 (1) を右辺から左辺へ})\\
&= YX && (\because\ X, Y \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

□

7 $\sinh, \cosh$ のテイラー展開、可逆行列と共役写像T_g

主張 7.1 ($\sinh, \cosh$ のテイラー展開)**.** $x \in \mathbb{R}$ とする。双曲線正弦と双曲線余弦は 定義 3.19 の定義による。

$$
\sinh x = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{x^n}{n!}, \qquad \cosh x = \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{x^n}{n!}
$$

定義 7.2 ($\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の可逆元)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。行列の積は 定義 1.6、行列のスカラー倍は 定義 2.3、複素係数の演算は 主張 1.56 による。

$R := \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と書き、定義 2.2 の単位行列を $I := I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ と書く。$g \in R$ が可逆であるとは、

$$
\exists h \in R, \quad g\,h = I \ \text{ かつ } \ h\,g = I
$$

が成り立つことをいう。可逆な元全体の集合を

$$
R^\times := \{\, g \in R \mid g \text{ は可逆} \,\}
$$

と書く。$g \in R^\times$ に対して上の h はただ 1 つに定まり、これを g^{-1} と書く。さらに次が成り立つ。

- (i) $I \in R^\times$ であり $I^{-1} = I$。
- (ii) $g_1, g_2 \in R^\times$ なら $g_1 g_2 \in R^\times$ であり $(g_1 g_2)^{-1} = g_2^{-1} g_1^{-1}$。
- (iii) $g \in R^\times$ なら $g^{-1} \in R^\times$ であり $(g^{-1})^{-1} = g$。

- (iv) $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ なら $cI \in R^\times$ であり $(cI)^{-1} = c^{-1}I$。

証明.（逆元の一意性）$h_1, h_2 \in R$ がともに $gh_1 = h_1 g = I$、$gh_2 = h_2 g = I$ を満たすとする。

$$\begin{aligned}
h_1 &= h_1 I && (\because \text{ 単位行列を右から掛けても変わらない主張 2.17}) \\
&= h_1(gh_2) && (\because \ gh_2 = I \text{ の代入}) \\
&= (h_1 g)h_2 && (\because \text{ 行列の積の結合律主張 2.15}) \\
&= Ih_2 && (\because \ h_1 g = I \text{ の代入}) \\
&= h_2 && (\because \text{ 単位行列を左から掛けても変わらない主張 2.16})
\end{aligned}$$

であるから、逆元はただ 1 つである。

(i) $I\,I = I$（主張 2.16 を $A = I$ に適用）より、$h = I$ が I に対する逆元の条件 $I\,h = h\,I = I$ を満たす。よって $I \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $I^{-1} = I$。

(ii) $h := g_2^{-1}g_1^{-1}$ とおくと、

$$\begin{aligned}
(g_1g_2)h &= (g_1g_2)(g_2^{-1}g_1^{-1}) && (\because \ h = g_2^{-1}g_1^{-1} \text{ の代入}) \\
&= \big((g_1g_2)g_2^{-1}\big)g_1^{-1} && (\because \text{ 行列の積の結合律主張 2.15}) \\
&= \big(g_1(g_2g_2^{-1})\big)g_1^{-1} && (\because \text{ 行列の積の結合律主張 2.15}) \\
&= (g_1I)g_1^{-1} && (\because \ g_2g_2^{-1} = I) \\
&= g_1g_1^{-1} && (\because \text{ 単位行列を右から掛けても変わらない主張 2.17}) \\
&= I && (\because \ g_1g_1^{-1} = I)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
h(g_1g_2) &= (g_2^{-1}g_1^{-1})(g_1g_2) && (\because \ h = g_2^{-1}g_1^{-1} \text{ の代入}) \\
&= \big((g_2^{-1}g_1^{-1})g_1\big)g_2 && (\because \text{ 行列の積の結合律主張 2.15}) \\
&= \big(g_2^{-1}(g_1^{-1}g_1)\big)g_2 && (\because \text{ 行列の積の結合律主張 2.15}) \\
&= (g_2^{-1}I)g_2 && (\because \ g_1^{-1}g_1 = I) \\
&= g_2^{-1}g_2 && (\because \text{ 単位行列を右から掛けても変わらない主張 2.17}) \\
&= I && (\because \ g_2^{-1}g_2 = I)
\end{aligned}$$

であるから $g_1g_2 \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(g_1g_2)^{-1} = g_2^{-1}g_1^{-1}$。

(iii) $gg^{-1} = g^{-1}g = I$ は、g^{-1} に対して g が逆元の条件を満たすことをそのまま述べている。よって $g^{-1} \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(g^{-1})^{-1} = g$。

(iv) $c \neq 0$ より、主張 1.56 の乗法の逆元 $c^{-1} \in \mathbb{C}$ があり、$c\,c^{-1} = c^{-1}c = 1$ である。次の 2 つの一続きの変形による。

$$\begin{aligned}
(cI)(c^{-1}I) &= c\big(I(c^{-1}I)\big) && (\because \ (aA)B = a(AB) \text{ 主張 2.18}) \\
&= c\big(c^{-1}(I\,I)\big) && (\because \ A(aB) = a(AB) \text{ 主張 2.19}) \\
&= (c\,c^{-1})(I\,I) && (\because \ a(bA) = (ab)A \text{ 主張 2.41}) \\
&= (c\,c^{-1})I && (\because \text{ 単位行列を左から掛けても変わらない主張 2.16 を } A = I \text{ に適用}) \\
&= 1\,I && (\because \ c\,c^{-1} = 1) \\
&= I && (\because \ 1A = A \text{ 主張 2.42})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
(c^{-1}I)(cI) &= c^{-1}\big(I(cI)\big) && (\because\ (aA)B = a(AB)\ \text{主張 2.18})\\
&= c^{-1}\big(c(I\,I)\big) && (\because\ A(aB) = a(AB)\ \text{主張 2.19})\\
&= (c^{-1}c)(I\,I) && (\because\ a(bA) = (ab)A\ \text{主張 2.41})\\
&= (c^{-1}c)I && (\because\ \text{単位行列を左から掛けても変わらない主張 2.16 を } A = I \text{ に適用})\\
&= 1\,I && (\because\ c^{-1}c = 1)\\
&= I && (\because\ 1A = A\ \text{主張 2.42})
\end{aligned}
$$

であるから $cI \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(cI)^{-1} = c^{-1}I$。 □

定義 7.3 (T_g の定義)**.** 定義 7.2 の記号を使い、$g \in (\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}))^\times$ について、

$$T_g : \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}), \quad h \mapsto g \cdot h \cdot g^{-1}$$

主張 7.4 (T_g の$\mathbb{C}$ 線型性)**.** 任意の $M \in \mathbb{N}_{>0}$ をとる。定義 7.2 の $R := \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と $R^\times$ を用いる。任意の $g \in R^\times$、$a, b \in \mathbb{C}$、$X, W \in R$ について、

$$T_g(aX + bW) = a\,T_g(X) + b\,T_g(W)$$

証明. 定義 7.3 の $g \cdot h \cdot g^{-1}$ は $(gh)g^{-1}$ と読む（$g, g^{-1} \in R$)。鎖が引く 4 つの主張（行列の積の分配の 2 つと、スカラー倍を積の外へ出す 2 つ）は、どれも $m = n = p = 2^M$ として使う。

$$
\begin{aligned}
T_g(aX + bW) &= \big(g(aX + bW)\big)g^{-1} && \big(\because\ \text{定義 7.3}\big)\\
&= \big(g(aX) + g(bW)\big)g^{-1} && \big(\because\ \text{主張 2.23}\big)\\
&= \big(g(aX)\big)g^{-1} + \big(g(bW)\big)g^{-1} && \big(\because\ \text{主張 2.24}\big)\\
&= \big(a(gX)\big)g^{-1} + \big(b(gW)\big)g^{-1} && \big(\because\ \text{主張 2.19 を 2 か所へ同時適用}\big)\\
&= a\big((gX)g^{-1}\big) + b\big((gW)g^{-1}\big) && \big(\because\ \text{主張 2.18 を 2 か所へ同時適用}\big)\\
&= a\,T_g(X) + b\,T_g(W) && \big(\because\ \text{定義 7.3 を 2 か所へ同時適用}\big).
\end{aligned}
$$

□

8 トレース・エルミート行列・正定値性

定義 8.1 (トレースtr)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$A = (A_{kl})_{1 \leq k,l \leq n} \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して

$$\mathrm{tr}(A) := \sum_{k=1}^{n} A_{kk} \in \mathbb{C}$$

と定める（対角成分の有限和なので、収束の議論を要しない)。

主張 8.2 (トレースの基本性質)**.** トレースは 定義 8.1、行列の積は 定義 1.6、行列の和は 定義 2.4、行列のスカラー倍は 定義 2.3、単位行列は 定義 2.2、複素数の演算の性質は 主張 1.56 のものとする。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、

- (1) $\mathrm{tr}(\alpha A + \beta B) = \alpha\,\mathrm{tr}(A) + \beta\,\mathrm{tr}(B)$（線型性）
- (2) $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$（巡回性）
- (3) $\mathrm{tr}\big(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\big) = \sum_{k=1}^{n} 1_{\mathbb{C}}$（$1_{\mathbb{C}}$ を n 個足した和。$1_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記）

- (4)　$P, P' \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $P'P = I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ を満たすなら $\mathrm{tr}\big(P(AP')\big) = \mathrm{tr}(A)$（相似変換で不変）

証明. (1)

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(\alpha A + \beta B) &= \sum_{k=1}^{n} (\alpha A + \beta B)_{kk} && (\because \text{定義 8.1}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \big((\alpha A)_{kk} + (\beta B)_{kk}\big) && (\because \text{定義 2.4}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \big(\alpha A_{kk} + \beta B_{kk}\big) && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \alpha A_{kk} + \sum_{k=1}^{n} \beta B_{kk} && (\because \mathbb{C} \text{ の加法の結合法則・交換法則による有限和の並べ替え。主張 1.56}) \\
&= \alpha \sum_{k=1}^{n} A_{kk} + \beta \sum_{k=1}^{n} B_{kk} && (\because \mathbb{C} \text{ の分配法則。主張 1.56}) \\
&= \alpha\, \mathrm{tr}(A) + \beta\, \mathrm{tr}(B) && (\because \text{定義 8.1})
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(AB) &= \sum_{k=1}^{n} (AB)_{kk} && (\because \text{定義 8.1}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} A_{kj} B_{jk} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} B_{jk} A_{kj} && (\because \mathbb{C} \text{ の積の交換法則。主張 1.56}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} B_{jk} A_{kj} && (\because \mathbb{C} \text{ の加法の結合法則・交換法則による有限和の順序交換。主張 1.56}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (BA)_{jj} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \mathrm{tr}(BA) && (\because \text{定義 8.1})
\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\big(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\big) &= \sum_{k=1}^{n} \big(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\big)_{kk} && (\because \text{定義 8.1}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \delta_{kk} && (\because \text{定義 2.2}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} 1_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 2.1 の } i = j \text{ の場合})
\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\big(P(AP')\big) &= \mathrm{tr}\big((PA)P'\big) && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \mathrm{tr}\big(P'(PA)\big) && (\because (2) \text{ を} A \to PA,\ B \to P' \text{ に適用}) \\
&= \mathrm{tr}\big((P'P)A\big) && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \mathrm{tr}\big(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} A\big) && (\because P'P = I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}) \\
&= \mathrm{tr}(A) && (\because \text{主張 2.16})
\end{aligned}$$

□

主張 8.3 ($\{0,1\}^r$ の上の和のトレース)**.** $n, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$\epsilon \in \{0,1\}^r$ で添字付けられた $B_\epsilon \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ とする。トレースは 定義 8.1、左辺の行列の和は 定義 2.50 ($m,n \to n$)、右辺の複素数の和は 定義 2.51 による。このとき

$$\mathrm{tr}\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} B_\epsilon\Big) = \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^r} \mathrm{tr}\big(B_\epsilon\big)$$

が成り立つ。

証明. 準備として、$A, B \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ について次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(A+B) &= \mathrm{tr}\big(1_{\mathbb{C}}A + 1_{\mathbb{C}}B\big) && \big(\because \text{ 主張 2.42 } (m,n\to n) \text{ を二つの項へ同時に右辺から左辺へ}\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\,\mathrm{tr}(A) + 1_{\mathbb{C}}\,\mathrm{tr}(B) && \big(\because \text{ 主張 8.2 (1) } (\alpha,\beta\to 1_{\mathbb{C}})\big)\\
&= \mathrm{tr}(A) + \mathrm{tr}(B) && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56 を二つの項へ同時に}\big)
\end{aligned}$$

r についての帰納法で、$\{0,1\}^r$ で添字付けられた $\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ の元の全ての族について示す。$r=1$ のとき

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1} B_\epsilon\Big) &= \mathrm{tr}\big(B_{(1)} + B_{(0)}\big) && \big(\because \text{ 定義 2.50 } (m,n\to n)\big)\\
&= \mathrm{tr}\big(B_{(1)}\big) + \mathrm{tr}\big(B_{(0)}\big) && \big(\because \text{ 準備の鎖 } (A\to B_{(1)},\ B\to B_{(0)})\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^1} \mathrm{tr}\big(B_\epsilon\big) && \big(\because \text{ 定義 2.51 } (z_\epsilon \to \mathrm{tr}(B_\epsilon)) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}$$

r で全ての族について成り立つと仮定する。$\{0,1\}^{r+1}$ で添字付けられた族 B_ϵ に対して

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} B_\epsilon\Big) &= \mathrm{tr}\Big(\sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r} \big(B_{(\epsilon',1)} + B_{(\epsilon',0)}\big)\Big) && \big(\because \text{ 定義 2.50 } (m,n\to n)\big)\\
&= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r} \mathrm{tr}\big(B_{(\epsilon',1)} + B_{(\epsilon',0)}\big) && \big(\because \text{ 帰納法の仮定 } (B_{\epsilon'} \to B_{(\epsilon',1)} + B_{(\epsilon',0)})\big)\\
&= \sum_{\epsilon'\in\{0,1\}^r} \Big(\mathrm{tr}\big(B_{(\epsilon',1)}\big) + \mathrm{tr}\big(B_{(\epsilon',0)}\big)\Big) && \big(\because \text{ 準備の鎖 } (A\to B_{(\epsilon',1)},\ B\to B_{(\epsilon',0)}) \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{r+1}} \mathrm{tr}\big(B_\epsilon\big) && \big(\because \text{ 定義 2.51 } (z_\epsilon \to \mathrm{tr}(B_\epsilon)) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}$$

□

主張 8.4 (行列のスカラー倍のトレース)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$、$\alpha \in \mathbb{C}$ とする。トレースは 定義 8.1、行列のスカラー倍は 定義 2.3 による。このとき

$$\mathrm{tr}(\alpha A) = \alpha\,\mathrm{tr}(A)$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(\alpha A) &= \mathrm{tr}(\alpha A + O) && \big(\because \text{ 主張 2.8 } (m,n\to n,\ X\to \alpha A) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \mathrm{tr}(\alpha A + 0_{\mathbb{C}} A) && \big(\because \text{ 主張 2.13 } (m,n\to n) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \alpha\,\mathrm{tr}(A) + 0_{\mathbb{C}}\,\mathrm{tr}(A) && \big(\because \text{ 主張 8.2 (1) } (\beta\to 0_{\mathbb{C}},\ B\to A)\big)\\
&= \alpha\,\mathrm{tr}(A) + 0_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 1.58 } (z\to \mathrm{tr}(A))\big)\\
&= \alpha\,\mathrm{tr}(A) && \big(\because\ 0_{\mathbb{C}} \text{ は加法の単位元。主張 1.56}\big)
\end{aligned}$$

□

主張 8.5 (冪等行列のトレースは像の次元)**.** トレースは 定義 8.1、行列の積は 定義 1.6、行列の冪 Q^2 は 定義 3.4 (1)、数ベクトルの和は 定義 2.4、差は 定義 1.92、零ベクトル 0 は 定義 1.93 のものとする。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$Q \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $Q^2 = Q$ を満たすとき、

$$\mathbb{C}^n = \operatorname{im} Q \oplus \ker Q, \qquad \operatorname{tr}(Q) = \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} Q$$

が成り立つ。ここで $\operatorname{im} Q := \{Qx \mid x \in \mathbb{C}^n\}$、$\ker Q := \{x \in \mathbb{C}^n \mid Qx = 0\}$ である。右辺の自然数 $\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} Q$ は、$1_{\mathbb{C}}$ をその個数だけ足した $\mathbb{C}$ の元として読む（$1_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記。零個の和は $0_{\mathbb{C}}$）。

証明. 準備（Q^2 は積 QQ に等しい）。

$$\begin{aligned}
Q^2 &= Q^1 Q && (\because\ A^{m+1} := A^m A \text{ を } m = 1 \text{ に。定義 3.4 (1)}) \\
&= (Q^0 Q) Q && (\because\ A^{m+1} := A^m A \text{ を } m = 0 \text{ に。定義 3.4 (1)}) \\
&= (IQ) Q && (\because\ A^0 := I \text{ 。定義 3.4 (1)}) \\
&= QQ && (\because\ \text{主張 2.16})
\end{aligned}$$

よって仮定 $Q^2 = Q$ から $QQ = Q$ である。

Step 1（直和分解）。任意の $x \in \mathbb{C}^n$ を取る。$k \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$\begin{aligned}
\big(Qx + (x - Qx)\big)_k &= (Qx)_k + (x - Qx)_k && (\because\ \text{定義 2.4}) \\
&= (Qx)_k + \big(x_k - (Qx)_k\big) && (\because\ \text{定義 1.92}) \\
&= x_k && (\because\ \mathbb{C} \text{ の加法の結合律・交換律・加法逆元・零元。主張 1.56})
\end{aligned}$$

なので、行列の等号は成分ごとであることから $x = Qx + (x - Qx)$ であり、$Qx \in \operatorname{im} Q$（$\operatorname{im} Q$ の定め方）である。$x - Qx \in \ker Q$ は次の計算による。

$$\begin{aligned}
Q(x - Qx) &= Qx - Q(Qx) && (\because\ \text{主張 1.97}) \\
&= Qx - (QQ)x && (\because\ \text{主張 2.15}) \\
&= Qx - Qx && (\because\ \text{準備の } QQ = Q) \\
&= 0 && (\because\ \text{主張 1.95 の } \Leftarrow \text{ を } A = B = Qx \text{ に})
\end{aligned}$$

よって $\mathbb{C}^n = \operatorname{im} Q + \ker Q$。また $y \in \operatorname{im} Q \cap \ker Q$ とすると、$y = Qx$ なる $x \in \mathbb{C}^n$ が取れて

$$\begin{aligned}
y &= Qx && (\because\ x \text{ の取り方}) \\
&= (QQ)x && (\because\ \text{準備の } QQ = Q) \\
&= Q(Qx) && (\because\ \text{主張 2.15}) \\
&= Qy && (\because\ Qx = y) \\
&= 0 && (\because\ y \in \ker Q)
\end{aligned}$$

よって交わりは $\{0\}$ であり、和は直和である。

Step 2（基底を並べた行列 P について $QP = PD$）。$r := \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} Q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とおき、$\operatorname{im} Q$ の基底 $v_1, \ldots, v_r$ と $\ker Q$ の基底 $v_{r+1}, \ldots, v_n$ を取る（Step 1 の直和分解より $v_1, \ldots, v_n$ は $\mathbb{C}^n$ の基底）。$j \in \{1, \ldots, r\}$ のとき $v_j = Qx_j$ なる $x_j \in \mathbb{C}^n$ が取れて

$$\begin{aligned}
Qv_j &= Q(Qx_j) && (\because\ v_j = Qx_j) \\
&= (QQ)x_j && (\because\ \text{主張 2.15}) \\
&= Qx_j && (\because\ \text{準備の } QQ = Q) \\
&= v_j && (\because\ v_j = Qx_j)
\end{aligned}$$

であり、$j \in \{r+1, \dots, n\}$ のとき $Qv_j = 0$（$v_j \in \ker Q$）である。$P := [\, v_1 \ \cdots \ v_n \,] \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$（定理 1.7 の列に並べた行列）とおき、$D \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ を

$$D_{kl} := \begin{cases} 1_{\mathbb{C}} & (k = l \leq r) \\ 0_{\mathbb{C}} & (\text{それ以外}) \end{cases} \qquad (k, l \in \{1, \dots, n\})$$

で定める。$i, l \in \{1, \dots, n\}$ について

$$\begin{aligned}
(PD)_{il} &= \sum_{k=1}^{n} P_{ik} D_{kl} && (\because \text{ 定義 1.6}) \\
&= P_{il} D_{ll} + \sum_{k \neq l} P_{ik} D_{kl} && (\because \ k = l \text{ の項を分ける。加法の結合律・交換律。主張 1.56}) \\
&= P_{il} D_{ll} + \sum_{k \neq l} P_{ik} 0_{\mathbb{C}} && (\because \ k \neq l \text{ では } D \text{ の定め方から } D_{kl} = 0_{\mathbb{C}}) \\
&= P_{il} D_{ll} + \sum_{k \neq l} 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.59}) \\
&= P_{il} D_{ll} && (\because \ 0_{\mathbb{C}} \text{ は加法の単位元。主張 1.56}) \\
&= (v_l)_i D_{ll} && (\because \ P \text{ の定め方}) \\
&= \begin{cases} (v_l)_i 1_{\mathbb{C}} & (l \leq r) \\ (v_l)_i 0_{\mathbb{C}} & (l > r) \end{cases} && (\because \ D \text{ の定め方}) \\
&= \begin{cases} (v_l)_i & (l \leq r) \\ 0_{\mathbb{C}} & (l > r) \end{cases} && (\because \ 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元（主張 1.56）と 主張 1.59}) \\
&= (Qv_l)_i && (\because \ l \leq r \text{ では上の } Qv_l = v_l, \ l > r \text{ では } Qv_l = 0 \text{ と 定義 1.93}) \\
&= \big([\, Qv_1 \ \cdots \ Qv_n \,] \big)_{il} && (\because \text{ 定理 1.7 の、列に並べた行列の成分の定め方}) \\
&= (QP)_{il} && (\because \text{ 定理 1.7})
\end{aligned}$$

なので $QP = PD$ である。

Step 3（トレースの計算）。$v_1, \dots, v_n$ は $\mathbb{C}^n$ の基底なので、$P'P = PP' = I$ を満たす $P' \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が取れる。

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(Q) &= \mathrm{tr}\big(P'(QP)\big) && (\because \text{ 主張 8.2 (4) を } P \to P', \ P' \to P, \ A \to Q \text{ に。} PP' = I) \\
&= \mathrm{tr}\big(P'(PD)\big) && (\because \text{ Step 2 の } QP = PD) \\
&= \mathrm{tr}\big((P'P)D\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= \mathrm{tr}(ID) && (\because \ P'P = I) \\
&= \mathrm{tr}(D) && (\because \text{ 主張 2.16}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} D_{kk} && (\because \text{ 定義 8.1}) \\
&= \sum_{k=1}^{r} 1_{\mathbb{C}} + \sum_{k=r+1}^{n} 0_{\mathbb{C}} && (\because \ D \text{ の定め方}) \\
&= \sum_{k=1}^{r} 1_{\mathbb{C}} && (\because \ 0_{\mathbb{C}} \text{ は加法の単位元。主張 1.56}) \\
&= \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{im}\, Q && (\because \ r \text{ の定め方と、主張の右辺の読み方})
\end{aligned}$$

□

定義 8.6 (数ベクトルと行列から作る数x^*Ay)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$x = (x_1, \ldots, x_n),\ y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{C}^n$、$A = (A_{kl}) \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対し、

$$x^*Ay := \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\, A_{kl}\, y_l \in \mathbb{C}$$

と定める。$^-$ は 定義 5.1 の複素共役、積と和は 定義 1.12 の積と 定義 1.16 の有限和で、$\overline{x_k}\, A_{kl}\, y_l := \left(\overline{x_k}\, A_{kl}\right) y_l$ とする。x^*Ay はこの式で定める一つの記号であり、数ベクトルの共役転置と行列の積を組み合わせたものとしては読まない。

定義 8.7 (共役転置・エルミート行列・正定値行列)**.** 行列の積は 定義 1.6、実数の複素数への包含は 定義 1.13 を用いる。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A = (A_{kl}) \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対し、共役転置を

$$(A^*)_{kl} := \overline{A_{lk}}$$

で定める（$^-$ は 定義 5.1 の複素共役)。$x \in \mathbb{C}^n$ について $x^*Ax \in \mathbb{C}$ は 定義 8.6 の $y = x$ の値である。$z \in \mathbb{C}$ について「$z \in \mathbb{R}_{>0}$」は、$z = r_{\mathbb{C}}$（定義 1.13 の略記）を満たす $r \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在することの略記とする。$\mathbb{C}^n$ の 0 は 定義 1.93 の零ベクトルである。

A が $A^* = A$ を満たすとき A は ** エルミート ** であるという。エルミートな A がさらに

$$\forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\} : \quad x^*Ax \in \mathbb{R}_{>0}$$

を満たすとき A は ** 正定値 ** であるという。

定義 8.8 (実対称な複素行列)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$（定義 1.6 の記号）とする。$A$ の成分がすべて実数であり（定義 2.81)、かつ $A^\top = A$（転置は 定義 2.75）であるとき、A は ** 実対称 ** であるという。

主張 8.9 (実対称な複素行列はエルミート)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が実対称（定義 8.8）ならば、$A^* = A$、すなわち A は 定義 8.7 の意味でエルミートである。

証明. 両辺はともに $\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ の元なので、各成分が一致することを示せばよい。$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ を取る。A の成分はすべて実数なので（定義 8.8)、定義 2.81（$m, n \to n,\ B \to A,\ p \to l,\ q \to k$）により $A_{lk} = r_{\mathbb{C}}$ を満たす $r \in \mathbb{R}$ を取れる（$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記)。

$$\begin{aligned}
(A^*)_{kl} &= \overline{A_{lk}} && \left(\because \text{ 定義 8.7 の共役転置}\right) \\
&= \overline{r_{\mathbb{C}}} && \left(\because\ r \text{ の取り方 } A_{lk} = r_{\mathbb{C}}\right) \\
&= r_{\mathbb{C}} && \left(\because \text{ 主張 5.6}\right) \\
&= A_{lk} && \left(\because\ r \text{ の取り方 } A_{lk} = r_{\mathbb{C}}\right) \\
&= \left(A^\top\right)_{kl} && \left(\because \text{ 定義 2.75 } (m, n \to n,\ B \to A,\ p \to k,\ q \to l)\right) \\
&= A_{kl} && \left(\because\ A^\top = A \text{。定義 8.8}\right)
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、$A^* = A$ を得る。これは 定義 8.7 のエルミートの条件そのものである。 □

主張 8.10 (実対称な複素行列の冪は実対称)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ を実対称（定義 8.8）とする。このとき、すべての $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について A^p（定義 3.4 (1) の冪）は実対称である。

証明. 準備として、$A^1 = A$ を示す。

$$
\begin{aligned}
A^1 &= A^{0+1} && (\because \mathbb{Z} \text{ で } 1 = 0 + 1) \\
&= A^0 A && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A \text{ を } m = 0 \text{ に適用}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\, A && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I) \\
&= A && (\because \text{主張 2.16})
\end{aligned}
$$

p についての帰納法で示す。$p = 0$ のとき、$A^0 = I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$（定義 3.4 (1)）である。$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ を任意に取ると

$$
\begin{aligned}
\left(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\right)_{kl} &= \delta_{kl} && (\because \text{定義 2.2}) \\
&= \begin{cases} 1_{\mathbb{C}} & (k = l) \\ 0_{\mathbb{C}} & (k \neq l) \end{cases} && (\because \text{定義 2.1}) \\
&= \begin{cases} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) & (k = l) \\ \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) & (k \neq l) \end{cases} && (\because \text{定義 2.1 の略記 } 1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1),\ 0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0))
\end{aligned}
$$

なので、$I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ の成分はすべて実数である（定義 2.81）。また

$$
\begin{aligned}
\left(I^{\top}_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\right)_{kl} &= \left(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\right)_{lk} && (\because \text{定義 2.75}) \\
&= \delta_{lk} && (\because \text{定義 2.2}) \\
&= \delta_{kl} && (\because \text{定義 2.1 の場合分けは } k = l \text{ と } l = k \text{ で同じ}) \\
&= \left(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\right)_{kl} && (\because \text{定義 2.2})
\end{aligned}
$$

であり、k, l は任意なので $I^{\top}_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} = I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ である。よって A^0 は実対称である。

A^p が実対称であるとする。$A^{p+1} = A^p A$（定義 3.4 (1)）であり、A^p と A の成分はすべて実数なので、主張 2.87（行列の大きさはすべて n、$A \to A^p$、$B \to A$）より A^{p+1} の成分はすべて実数である。$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ を任意に取ると

$$
\begin{aligned}
\left((A^{p+1})^{\top}\right)_{kl} &= (A^{p+1})_{lk} && (\because \text{定義 2.75}) \\
&= (A^p A)_{lk} && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A \text{ を } m = p \text{ に適用}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (A^p)_{lj}\, A_{jk} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \left((A^p)^{\top}\right)_{jl} \left(A^{\top}\right)_{kj} && (\because \text{定義 2.75 を 2 箇所へ同時に適用}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (A^p)_{jl} \left(A^{\top}\right)_{kj} && (\because \text{帰納法の仮定の } (A^p)^{\top} = A^p) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (A^p)_{jl}\, A_{kj} && (\because \text{仮定の } A^{\top} = A) \\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{kj}\, (A^p)_{jl} && (\because \text{主張 1.56 の乗法の可換則}) \\
&= (AA^p)_{kl} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= (A^1 A^p)_{kl} && (\because \text{準備の } A^1 = A) \\
&= (A^{1+p})_{kl} && (\because \text{主張 3.5 } (p \to 1,\ q \to p)) \\
&= (A^{p+1})_{kl} && (\because \mathbb{Z} \text{ の加法の可換則})
\end{aligned}
$$

であり、k, l は任意なので $(A^{p+1})^{\top} = A^{p+1}$ である。よって A^{p+1} は実対称である。 □

主張 8.11 ($\|A^*\| = \|A\|$ と極限の共役転置)**.** 共役転置は 定義 8.7、複素共役は 定義 5.1、行列積は 定義 1.6、行列の和・スカラー倍・差は 定義 2.4・定義 2.3・定義 1.92、ノルムと行列の列の収束は 定義 2.91 のものとする。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ および $(A_N)_{N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ を $\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ の列とする。このとき、

- (1) $(AB)^* = B^* A^*, \qquad (\alpha A + \beta B)^* = \overline{\alpha} A^* + \overline{\beta} B^*$
- (2) $\|A^*\| = \|A\|$（両辺は 定義 2.91 のとおり非負実数の有限和の非負の平方根であり、平方根を取るところで $\mathbb{R}$ を使う）
- (3) $A_N \to A \implies A_N^* \to A^*$（$N \to \infty$ の極限は $\mathbb{R}$ の数列 $\|A_N - A\|$ の極限であり、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出する）

証明. (1) の第 1 式。$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$\begin{aligned}
((AB)^*)_{kl} &= \overline{(AB)_{lk}} && (\because \text{ 定義 8.7}) \\
&= \overline{\textstyle\sum_{j=1}^{n} A_{lj} B_{jk}} && (\because \text{ 定義 1.6}) \\
&= \textstyle\sum_{j=1}^{n} \overline{A_{lj} B_{jk}} && (\because \text{ 主張 5.2 の } m = n) \\
&= \textstyle\sum_{j=1}^{n} \overline{A_{lj}}\ \overline{B_{jk}} && (\because \text{ 主張 5.3 を各項へ}) \\
&= \textstyle\sum_{j=1}^{n} \overline{B_{jk}}\ \overline{A_{lj}} && (\because \text{ 積の可換性。主張 1.56 を各項へ}) \\
&= \textstyle\sum_{j=1}^{n} (B^*)_{kj} (A^*)_{jl} && (\because \text{ 定義 8.7 を各項へ}) \\
&= (B^* A^*)_{kl} && (\because \text{ 定義 1.6})
\end{aligned}$$

すべての成分が等しいので $(AB)^* = B^* A^*$ である。

(1) の第 2 式。$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$\begin{aligned}
((\alpha A + \beta B)^*)_{kl} &= \overline{(\alpha A + \beta B)_{lk}} && (\because \text{ 定義 8.7}) \\
&= \overline{(\alpha A)_{lk} + (\beta B)_{lk}} && (\because \text{ 定義 2.4}) \\
&= \overline{\alpha A_{lk} + \beta B_{lk}} && (\because \text{ 定義 2.3}) \\
&= \overline{\alpha A_{lk}} + \overline{\beta B_{lk}} && (\because \text{ 主張 5.2 の } m = 2) \\
&= \overline{\alpha}\ \overline{A_{lk}} + \overline{\beta}\ \overline{B_{lk}} && (\because \text{ 主張 5.3 を各項へ}) \\
&= \overline{\alpha}\, (A^*)_{kl} + \overline{\beta}\, (B^*)_{kl} && (\because \text{ 定義 8.7 を各項へ}) \\
&= (\overline{\alpha} A^*)_{kl} + (\overline{\beta} B^*)_{kl} && (\because \text{ 定義 2.3}) \\
&= (\overline{\alpha} A^* + \overline{\beta} B^*)_{kl} && (\because \text{ 定義 2.4})
\end{aligned}$$

すべての成分が等しいので $(\alpha A + \beta B)^* = \overline{\alpha} A^* + \overline{\beta} B^*$ である。

(2) $A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}
\|A^*\| &= \sqrt{\textstyle\sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} |(A^*)_{kl}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 定義 2.91}) \\
&= \sqrt{\textstyle\sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} |\overline{A_{lk}}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 定義 8.7 を各項へ}) \\
&= \sqrt{\textstyle\sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} |A_{lk}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 主張 5.5 を各項へ}) \\
&= \sqrt{\textstyle\sum_{l=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} |A_{lk}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \mathbb{R} \text{ の有限和の順序の入れ替え}) \\
&= \|A\| && (\because \text{ 定義 2.91 の } i = l,\ j = k)
\end{aligned}$$

(3) 準備として、$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$\begin{aligned}(A_N^* - A^*)_{kl} &= (A_N^*)_{kl} - (A^*)_{kl} && (\because \text{定義 1.92})\\ &= \overline{(A_N)_{lk}} - \overline{A_{lk}} && (\because \text{定義 8.7 を各項へ})\\ &= \overline{(A_N)_{lk} - A_{lk}} && (\because \text{主張 5.4})\\ &= \overline{(A_N - A)_{lk}} && (\because \text{定義 1.92})\\ &= ((A_N - A)^*)_{kl} && (\because \text{定義 8.7})\end{aligned}$$

なので $A_N^* - A^* = (A_N - A)^*$ である。$A_N \to A$、すなわち $\|A_N - A\| \to 0$（定義 2.91）と仮定する。各 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned}\|A_N^* - A^*\| &= \|(A_N - A)^*\| && (\because \text{準備の } A_N^* - A^* = (A_N - A)^*)\\ &= \|A_N - A\| && (\because (2) \text{ の } A \text{ に } A_N - A \text{ を入れたもの})\end{aligned}$$

なので、$\mathbb{R}$ の数列 $(\|A_N^* - A^*\|)_N$ と $(\|A_N - A\|)_N$ はすべての項が等しく、仮定より $\|A_N^* - A^*\| \to 0$ である。定義 2.91 の収束の定義より $A_N^* \to A^*$ である。 □

主張 8.12 ($(\alpha_{\mathbb{C}} A)^* = \alpha_{\mathbb{C}} A$ エルミート行列の実数倍はエルミート)**.** 共役転置とエルミート性は 定義 8.7、スカラー倍は 定義 2.3、$\alpha_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$\alpha \in \mathbb{R}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $A^* = A$ を満たすとき、

$$(\alpha_{\mathbb{C}} A)^* = \alpha_{\mathbb{C}} A$$

が成り立つ。

証明. $k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$\begin{aligned}((\alpha_{\mathbb{C}} A)^*)_{kl} &= \overline{(\alpha_{\mathbb{C}} A)_{lk}} && (\because \text{定義 8.7})\\ &= \overline{\alpha_{\mathbb{C}} A_{lk}} && (\because \text{定義 2.3})\\ &= \overline{\alpha_{\mathbb{C}}}\, \overline{A_{lk}} && (\because \text{主張 5.3})\\ &= \alpha_{\mathbb{C}}\, \overline{A_{lk}} && (\because \text{主張 5.6})\\ &= \alpha_{\mathbb{C}}\, (A^*)_{kl} && (\because \text{定義 8.7})\\ &= \alpha_{\mathbb{C}}\, A_{kl} && (\because A^* = A)\\ &= (\alpha_{\mathbb{C}} A)_{kl} && (\because \text{定義 2.3})\end{aligned}$$

すべての成分が等しいので $(\alpha_{\mathbb{C}} A)^* = \alpha_{\mathbb{C}} A$ である。 □

主張 8.13 ($x^*(B^*(AB))y = (Bx)^* A (By)$)**.** 記号 $x^* A y$ は 定義 8.6、共役転置は 定義 8.7、行列の積と行列と数ベクトルの積は 定義 1.6 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$x, y \in \mathbb{C}^n$ について

$$x^* \big(B^*(AB)\big) y = (Bx)^* A (By)$$

が成り立つ。

証明. 5 つの複素数の積は左から順に掛けたものとする。

$$
\begin{aligned}
x^*\big(B^*(AB)\big)y &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\,\big(B^*(AB)\big)_{kl}\,y_l && (\because \text{定義 8.6})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\,\Big(\sum_{j=1}^{n}(B^*)_{kj}\,(AB)_{jl}\Big)\,y_l && (\because \text{定義 1.6})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\,\Big(\sum_{j=1}^{n}\overline{B_{jk}}\,(AB)_{jl}\Big)\,y_l && (\because \text{定義 8.7 を各項へ})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\,\Big(\sum_{j=1}^{n}\overline{B_{jk}}\,\Big(\sum_{m=1}^{n}A_{jm}B_{ml}\Big)\Big)\,y_l && (\because \text{定義 1.6 を各項へ})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n} \Big(\overline{x_k}\,\Big(\overline{B_{jk}}\,(A_{jm}B_{ml})\Big)\Big)\,y_l && (\because \text{分配律を項の数だけ繰り返す。主張 1.56})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n} \overline{x_k}\,\overline{B_{jk}}\,A_{jm}\,B_{ml}\,y_l && (\because \text{積の結合律を各項へ。主張 1.56})\\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\,\overline{B_{jk}}\,A_{jm}\,B_{ml}\,y_l && (\because \text{加法の結合律・交換律による有限和の順序の入れ替え。主張 1.56})\\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{B_{jk}}\,\overline{x_k}\,A_{jm}\,B_{ml}\,y_l && (\because \text{積の可換律を各項へ。主張 1.56})\\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \Big((\overline{B_{jk}}\,\overline{x_k})A_{jm}\Big)(B_{ml}\,y_l) && (\because \text{積の結合律を各項へ。主張 1.56})\\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n}\Big(\sum_{k=1}^{n}\overline{B_{jk}}\,\overline{x_k}\Big)\,A_{jm}\,\Big(\sum_{l=1}^{n}B_{ml}\,y_l\Big) && (\because \text{分配律を項の数だけ繰り返す。主張 1.56})\\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n}\Big(\sum_{k=1}^{n}\overline{B_{jk}\,x_k}\Big)\,A_{jm}\,\Big(\sum_{l=1}^{n}B_{ml}\,y_l\Big) && (\because \text{主張 5.3 を各項へ})\\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n}\overline{\sum_{k=1}^{n}B_{jk}\,x_k}\,A_{jm}\,\Big(\sum_{l=1}^{n}B_{ml}\,y_l\Big) && (\because \text{主張 5.2 の } m=n)\\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n}\overline{(Bx)_j}\,A_{jm}\,(By)_m && (\because \text{定義 1.6})\\
&= (Bx)^*A(By) && (\because \text{定義 8.6})
\end{aligned}
$$

□

主張 8.14 (左逆行列をもつB による$B^*(AB)$ は正定値)**.** 共役転置・エルミート性・正定値性は 定義 8.7、行列の積は 定義 1.6、単位行列 $I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ は 定義 2.2 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B, B' \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ とし、A は正定値、$B'B = I$ とする。このとき $B^*(AB)$ は正定値である。

証明. 準備として、$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について $B_{kl} = (a, b)$（$a, b \in \mathbb{R}$）と書くと

$$
\begin{aligned}
((B^*)^*)_{kl} &= \overline{(B^*)_{lk}} && (\because \text{定義 8.7})\\
&= \overline{\overline{B_{kl}}} && (\because \text{定義 8.7})\\
&= \overline{(a, -b)} && (\because \text{定義 5.1})\\
&= (a, -(-b)) && (\because \text{定義 5.1})\\
&= (a, b) && (\because \mathbb{R} \text{ で } -(-b) = b)\\
&= B_{kl} && (\because B_{kl} = (a, b) \text{ の置き方})
\end{aligned}
$$

なので $(B^*)^* = B$ である。また $k \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$
\begin{aligned}
(B'0)_k &= \sum_{j=1}^{n} B'_{kj}\, 0_j && (\because \text{ 定義 1.6}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} B'_{kj}\, 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.93 を各項へ}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.59 を各項へ}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.18}) \\
&= 0_k && (\because \text{ 定義 1.93})
\end{aligned}
$$

なので $B'0 = 0$ である。

エルミート性。

$$
\begin{aligned}
\big(B^*(AB)\big)^* &= (AB)^*\,(B^*)^* && (\because \text{ 主張 8.11 (1) の第 1 式}) \\
&= (B^*A^*)\,(B^*)^* && (\because \text{ 主張 8.11 (1) の第 1 式}) \\
&= (B^*A)\,(B^*)^* && (\because A \text{ は正定値なのでエルミート、} A^* = A) \\
&= (B^*A)\,B && (\because \text{ 準備の } (B^*)^* = B) \\
&= B^*(AB) && (\because \text{ 主張 2.15})
\end{aligned}
$$

正値性。$x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ とする。$Bx = 0$ と仮定すると

$$
\begin{aligned}
x &= Ix && (\because \text{ 主張 2.16}) \\
&= (B'B)\,x && (\because B'B = I) \\
&= B'(Bx) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= B'0 && (\because Bx = 0 \text{ の仮定}) \\
&= 0 && (\because \text{ 準備の } B'0 = 0)
\end{aligned}
$$

となり $x \neq 0$ に反する。よって $Bx \neq 0$ であり、A が正定値なので $(Bx)^*A(Bx) = r_{\mathbb{C}}$ を満たす $r \in \mathbb{R}_{>0}$ がある（定義 8.7）。

$$
\begin{aligned}
x^*\big(B^*(AB)\big)x &= (Bx)^*A(Bx) && (\because \text{ 主張 8.13 の } y = x) \\
&= r_{\mathbb{C}} && (\because r \text{ の取り方})
\end{aligned}
$$

したがって $x^*\big(B^*(AB)\big)x \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、$B^*(AB)$ は正定値である。 □

主張 8.15 (単位行列は正定値)**.** 共役転置・エルミート性・正定値性は 定義 8.7、単位行列は定義 2.2 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について、$I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ は正定値である。

証明. エルミート性。$i, j \in \{1, \ldots, n\}$ について、定義 2.1 より δ_{ij} は $1_{\mathbb{C}}$ か $0_{\mathbb{C}}$ なので 主張 5.6 より $\overline{\delta_{ij}} = \delta_{ij}$、また $i = j \iff j = i$ なので $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ である。$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$
\begin{aligned}
(I^*)_{kl} &= \overline{I_{lk}} && (\because \text{ 定義 8.7}) \\
&= \overline{\delta_{lk}} && (\because \text{ 定義 2.2}) \\
&= \delta_{lk} && (\because \overline{\delta_{lk}} = \delta_{lk}) \\
&= \delta_{kl} && (\because \delta_{lk} = \delta_{kl}) \\
&= I_{kl} && (\because \text{ 定義 2.2})
\end{aligned}
$$

なので $I^* = I$ である。正値性。$x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ とする。

$$
\begin{aligned}
x^*Ix &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\, I_{kl}\, x_l && (\because \text{ 定義 8.6}) \\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\, \big(I_{kl}\, x_l\big) && (\because \text{ 積の結合律を各項へ。主張 1.56}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{x_k}\, \Big(\sum_{l=1}^{n} I_{kl}\, x_l\Big) && (\because \text{ 分配律を項の数だけ繰り返す。主張 1.56}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{x_k}\, (Ix)_k && (\because \text{ 定義 1.6}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{x_k}\, x_k && (\because \text{ 主張 2.16}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \big(|x_k|^2\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 5.7 を各項へ}) \\
&= \Big(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^2\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.20})
\end{aligned}
$$

$x \neq 0$ なので、定義 1.93 より $x_{k_0} \neq 0_{\mathbb{C}}$ を満たす $k_0 \in \{1, \ldots, n\}$ がある。主張 1.75 (3) より $|x_{k_0}| \neq 0$ であり、$|x_k| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$（定義 1.74）なので

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} |x_k|^2 &\geq |x_{k_0}|^2 && (\because\ k \neq k_0 \text{ の項は実数の二乗で } \geq 0) \\
&> 0 && (\because \text{ 非零の実数の二乗は正})
\end{aligned}
$$

である。したがって $x^*Ix \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、I は正定値である。 □

主張 8.16 (正定値行列の正の実数倍は正定値)**.** 正定値性は 定義 8.7、スカラー倍は 定義 2.3、$\alpha_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が正定値、$\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき、$\alpha_{\mathbb{C}} A$ は正定値である。

証明. エルミート性。A は正定値なのでエルミートであり、主張 8.12 より $(\alpha_{\mathbb{C}} A)^* = \alpha_{\mathbb{C}} A$ である。

正値性。$x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ とする。A が正定値なので $x^*Ax = r_{\mathbb{C}}$ を満たす $r \in \mathbb{R}_{>0}$ がある。

$$
\begin{aligned}
x^*(\alpha_{\mathbb{C}}A)x &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\,(\alpha_{\mathbb{C}}A)_{kl}\,x_l && (\because \text{定義 8.6})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\,\big(\alpha_{\mathbb{C}}A_{kl}\big)\,x_l && (\because \text{定義 2.3 を各項へ})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \big(\big(\overline{x_k}\,\alpha_{\mathbb{C}}\big)A_{kl}\big)\,x_l && (\because \text{積の結合律を各項へ。主張 1.56})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \big(\big(\alpha_{\mathbb{C}}\,\overline{x_k}\big)A_{kl}\big)\,x_l && (\because \text{積の可換律を各項へ。主張 1.56})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \big(\alpha_{\mathbb{C}}\big(\overline{x_k}\,A_{kl}\big)\big)\,x_l && (\because \text{積の結合律を各項へ。主張 1.56})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \alpha_{\mathbb{C}}\,\big(\overline{x_k}\,A_{kl}\,x_l\big) && (\because \text{積の結合律を各項へ。主張 1.56})\\
&= \alpha_{\mathbb{C}}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{x_k}\,A_{kl}\,x_l && (\because \text{分配律を項の数だけ繰り返す。主張 1.56})\\
&= \alpha_{\mathbb{C}}\,\big(x^*Ax\big) && (\because \text{定義 8.6})\\
&= \alpha_{\mathbb{C}}\,r_{\mathbb{C}} && (\because r \text{ の取り方})\\
&= (\alpha,0)\,(r,0) && (\because \text{定義 1.13})\\
&= (\alpha r - 0\cdot 0,\ \alpha\cdot 0 + 0\cdot r) && (\because \text{定義 1.12 の積})\\
&= (\alpha r,\ 0) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= (\alpha r)_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.13})
\end{aligned}
$$

$\alpha, r \in \mathbb{R}_{>0}$ なので $\alpha r \in \mathbb{R}_{>0}$（正の実数の積は正）であり、$x^*(\alpha_{\mathbb{C}}A)x \in \mathbb{R}_{>0}$ である。よって $\alpha_{\mathbb{C}}A$ は正定値である。 □

主張 8.17 (正定値行列のトレースは正)**.** 正定値性は 定義 8.7、トレースは 定義 8.1 による。
$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ が正定値なら $\mathrm{tr}(A) \in \mathbb{R}_{>0}$ である。

証明. $k \in \{1,\dots,n\}$ について $b^{(k)} \in \mathbb{C}^n$ を $b^{(k)}_i := \delta_{ik}$ (定義 2.1) で定める。$b^{(k)}_k = 1_{\mathbb{C}} = (1,0) \neq (0,0) = 0_{\mathbb{C}}$ なので $b^{(k)} \neq 0$ である。また $i,j \in \{1,\dots,n\}$ について、δ_{ij} は $1_{\mathbb{C}}$ か $0_{\mathbb{C}}$ なので 主張 5.6 より $\overline{\delta_{ij}} = \delta_{ij}$、$i = j \iff j = i$ なので $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ である。単位行列 $I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ は 定義 2.2 による。

$$
\begin{aligned}
b^{(k)*}Ab^{(k)} &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{\delta_{ik}}\, A_{il}\, \delta_{lk} && (\because \text{ 定義 8.6 と } b^{(k)} \text{ の定義})\\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \delta_{ik}\, A_{il}\, \delta_{lk} && (\because \overline{\delta_{ik}} = \delta_{ik} \text{ を各項へ})\\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \delta_{ik}\, \big(A_{il}\, \delta_{lk}\big) && (\because \text{ 積の結合律を各項へ。主張 1.56})\\
&= \sum_{i=1}^{n} \delta_{ik} \Big(\sum_{l=1}^{n} A_{il}\, \delta_{lk}\Big) && (\because \text{ 分配律を項の数だけ繰り返す。主張 1.56})\\
&= \sum_{i=1}^{n} \delta_{ik} \Big(\sum_{l=1}^{n} A_{il}\, I_{lk}\Big) && (\because \text{ 定義 2.2 を各項へ})\\
&= \sum_{i=1}^{n} \delta_{ik}\, (AI)_{ik} && (\because \text{ 定義 1.6})\\
&= \sum_{i=1}^{n} \delta_{ik}\, A_{ik} && (\because \text{ 主張 2.17})\\
&= \sum_{i=1}^{n} \delta_{ki}\, A_{ik} && (\because \delta_{ik} = \delta_{ki} \text{ を各項へ})\\
&= \sum_{i=1}^{n} I_{ki}\, A_{ik} && (\because \text{ 定義 2.2 を各項へ})\\
&= (IA)_{kk} && (\because \text{ 定義 1.6})\\
&= A_{kk} && (\because \text{ 主張 2.16})
\end{aligned}
$$

A が正定値で $b^{(k)} \neq 0$ なので、$A_{kk} = b^{(k)*}Ab^{(k)} = (r_k)_{\mathbb{C}}$ を満たす $r_k \in \mathbb{R}_{>0}$ がある（定義 8.7)。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(A) &= \sum_{k=1}^{n} A_{kk} && (\because \text{ 定義 8.1})\\
&= \sum_{k=1}^{n} (r_k)_{\mathbb{C}} && (\because \ r_k \text{ の取り方を各項へ})\\
&= \Big(\sum_{k=1}^{n} r_k\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.20})
\end{aligned}
$$

$n \geq 1$ なので r_1 があり、

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} r_k &\geq r_1 \quad \big(\because \text{ 主張 1.25 を } m = n,\ a_j = r_j,\ k = 1 \text{ へ。各 } r_j \in \mathbb{R}_{>0} \text{ なので } r_j \geq 0\big)\\
&> 0 \quad (\because \ r_1 \in \mathbb{R}_{>0})
\end{aligned}
$$

であり、$\mathrm{tr}(A) \in \mathbb{R}_{>0}$ である。 □

主張 8.18 $(\exp(-A)\exp(A) = I)$**.** 指数は 定義 3.4、符号反転は 定義 1.94、行列の積は 定義 1.6、単位行列 $I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ は 定義 2.2 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について

$$\exp(-A)\exp(A) = I$$

が成り立つ。exp は 定義 3.4 の級数の極限（部分和と exp の値の差のノルムという $\mathbb{R}$ の数列の極限）であり、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出する。

証明. 準備として、$k, l \in \{1, \dots, n\}$ について

$$\begin{aligned}
((-A)A)_{kl} &= \sum_{j=1}^{n} (-A)_{kj}\, A_{jl} && (\because \text{ 定義 1.6}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-A_{kj})\, A_{jl} && (\because \text{ 定義 1.94 を各項へ}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \big((-1_{\mathbb{C}})A_{kj}\big)\, A_{jl} && (\because \text{ 定義 1.14 を各項へ}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \big(A_{kj}(-1_{\mathbb{C}})\big)\, A_{jl} && (\because \text{ 積の可換律を各項へ。主張 1.56}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{kj}\, \big((-1_{\mathbb{C}})A_{jl}\big) && (\because \text{ 積の結合律を各項へ。主張 1.56}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{kj}\, (-A_{jl}) && (\because \text{ 定義 1.14 を各項へ}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{kj}\, (-A)_{jl} && (\because \text{ 定義 1.94 を各項へ}) \\
&= (A(-A))_{kl} && (\because \text{ 定義 1.6})
\end{aligned}$$

なので $(-A)A = A(-A)$ であり、また

$$\begin{aligned}
((-A) + A)_{kl} &= (-A)_{kl} + A_{kl} && (\because \text{ 定義 2.4}) \\
&= (-A_{kl}) + A_{kl} && (\because \text{ 定義 1.94}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})A_{kl} + A_{kl} && (\because \text{ 定義 1.14}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})A_{kl} + 1_{\mathbb{C}}A_{kl} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56}) \\
&= \big((-1_{\mathbb{C}}) + 1_{\mathbb{C}}\big)A_{kl} && (\because \text{ 分配律。主張 1.56}) \\
&= \big((-1, 0) + (1, 0)\big)A_{kl} && (\because \text{ 定義 1.13}) \\
&= (-1 + 1,\ 0 + 0)\, A_{kl} && (\because \text{ 定義 1.12 の和}) \\
&= (0, 0)\, A_{kl} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= 0_{\mathbb{C}}\, A_{kl} && (\because \text{ 定義 1.13}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.58}) \\
&= O_{kl} && (\because \text{ 定義 1.93})
\end{aligned}$$

なので $(-A) + A = O$ である。

$$\begin{aligned}
\exp(-A)\exp(A) &= \exp\big((-A) + A\big) && (\because \text{ 定理 3.7 の } K = \mathbb{C} \text{ と準備の } (-A)A = A(-A)) \\
&= \exp(O) && (\because \text{ 準備の } (-A) + A = O) \\
&= I && (\because \text{ 定理 3.8})
\end{aligned}$$

□

主張 8.19 (エルミート行列の exp はエルミート)**.** 指数と冪は 定義 3.4、共役転置は 定義 8.7、行列の積は 定義 1.6、和とスカラー倍は 定義 2.4・定義 2.3、ノルムと行列の列の収束は 定義 2.91 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$S \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $S^* = S$ を満たすとき、

$$\exp(S)^* = \exp(S)$$

が成り立つ。$\exp(S)$ は 定義 3.4 の部分和の極限（部分和と $\exp(S)$ の差のノルムという $\mathbb{R}$ の数列の極限）であり、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出する。

証明. 単位行列を $I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$（定義 2.2）と書く。主張 8.15 より I は正定値なのでエルミートであり、$I^* = I$ である。

準備として、すべての $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $SS^m = S^m S$ を m についての帰納法で示す。$m = 0$ のとき

$$\begin{aligned} SS^0 &= SI && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I) \\ &= S && (\because \text{主張 2.17}) \\ &= IS && (\because \text{主張 2.16}) \\ &= S^0 S && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I) \end{aligned}$$

m で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned} SS^{m+1} &= S(S^m S) && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A) \\ &= (SS^m)S && (\because \text{主張 2.15}) \\ &= (S^m S)S && (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= S^{m+1} S && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A) \end{aligned}$$

次に、すべての $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $(S^m)^* = S^m$ を m についての帰納法で示す。$m = 0$ のとき

$$\begin{aligned} (S^0)^* &= I^* && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I) \\ &= I && (\because I^* = I) \\ &= S^0 && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I) \end{aligned}$$

m で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned} (S^{m+1})^* &= (S^m S)^* && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A) \\ &= S^*(S^m)^* && (\because \text{主張 8.11 (1) の第 1 式}) \\ &= S(S^m)^* && (\because S^* = S) \\ &= SS^m && (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= S^m S && (\because \text{準備の } SS^m = S^m S) \\ &= S^{m+1} && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A) \end{aligned}$$

$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について部分和を $E_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} S^m$（定義 3.4 (1) の部分和。係数は $(1/m!)_{\mathbb{C}}$、定義 1.13）と置く。定義 2.4 を項の数についての帰納法で、定義 2.3 を各項へ当てはめると、$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について $(E_N)_{kl} = \sum_{m=0}^{N} (1/m!)_{\mathbb{C}} \, (S^m)_{kl}$ である。

$$\begin{aligned} ((E_N)^*)_{kl} &= \overline{(E_N)_{lk}} && (\because \text{定義 8.7}) \\ &= \overline{\textstyle\sum_{m=0}^{N} (1/m!)_{\mathbb{C}} \, (S^m)_{lk}} && (\because (E_N)_{lk} \text{ の成分の式}) \\ &= \textstyle\sum_{m=0}^{N} \overline{(1/m!)_{\mathbb{C}} \, (S^m)_{lk}} && (\because \text{主張 5.2 の } m = N+1) \\ &= \textstyle\sum_{m=0}^{N} \overline{(1/m!)_{\mathbb{C}}} \; \overline{(S^m)_{lk}} && (\because \text{主張 5.3 を各項へ}) \\ &= \textstyle\sum_{m=0}^{N} (1/m!)_{\mathbb{C}} \, \overline{(S^m)_{lk}} && (\because \text{主張 5.6 を各項へ}) \\ &= \textstyle\sum_{m=0}^{N} (1/m!)_{\mathbb{C}} \, ((S^m)^*)_{kl} && (\because \text{定義 8.7 を各項へ}) \\ &= \textstyle\sum_{m=0}^{N} (1/m!)_{\mathbb{C}} \, (S^m)_{kl} && (\because \text{上で示した } (S^m)^* = S^m \text{ を各項へ}) \\ &= (E_N)_{kl} && (\because (E_N)_{kl} \text{ の成分の式}) \end{aligned}$$

なので、すべての N で $E_N^* = E_N$ である。定義 3.4 (1) より $E_N \to \exp(S)$ であり、主張 8.11 (3) より $E_N^* \to \exp(S)^*$ である。$E_N^* = E_N$ なので $E_N \to \exp(S)^*$ でもあり、主張 2.92 (4)（極限の一意性）より $\exp(S)^* = \exp(S)$ である。 □

主張 8.20 (エルミート行列の exp は正定値)**.** 指数は 定義 3.4、共役転置と正定値性は 定義 8.7、スカラー倍は 定義 2.3 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$S \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $S^* = S$ を満たすとき、$\exp(S)$ は正定値である（正定値の定義より、とくにエルミートである）。exp は 定義 3.4 の級数の極限であり、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出する。

証明. $H := (1/2)_{\mathbb{C}}\, S$（定義 1.13）、$T := \exp(H)$、$T' := \exp(-H)$、$I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ と置く。主張 8.12 の $\alpha = 1/2$ より $H^* = H$、主張 8.19 を H に当てはめて $T^* = T$、主張 8.18 を H に当てはめて $T'T = I$ である。また $k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について

$$\begin{aligned}
(H+H)_{kl} &= H_{kl} + H_{kl} && (\because \text{ 定義 2.4}) \\
&= (1/2)_{\mathbb{C}} S_{kl} + (1/2)_{\mathbb{C}} S_{kl} && (\because \text{ 定義 2.3}) \\
&= \big((1/2)_{\mathbb{C}} + (1/2)_{\mathbb{C}}\big) S_{kl} && (\because \text{ 分配律。主張 1.56}) \\
&= \big((1/2, 0) + (1/2, 0)\big) S_{kl} && (\because \text{ 定義 1.13}) \\
&= (1/2 + 1/2,\ 0 + 0)\, S_{kl} && (\because \text{ 定義 1.12 の和}) \\
&= (1, 0)\, S_{kl} && (\because \text{ } \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} S_{kl} && (\because \text{ 定義 1.13}) \\
&= S_{kl} && (\because \text{ } 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}$$

なので $H + H = S$ である。

$$\begin{aligned}
\exp(S) &= \exp(H+H) && (\because \text{ } H+H=S) \\
&= \exp(H)\exp(H) && (\because \text{ 定理 3.7 の } K=\mathbb{C} \text{ と } HH=HH) \\
&= TT && (\because \text{ } T \text{ の定義}) \\
&= T^*T && (\because \text{ } T^*=T) \\
&= T^*(IT) && (\because \text{ 主張 2.16})
\end{aligned}$$

主張 8.15 より I は正定値であり、$T'T = I$ なので、主張 8.14 の $A = I$、$B = T$、$B' = T'$ より $T^*(IT)$ は正定値である。上の鎖より $\exp(S) = T^*(IT)$ なので、$\exp(S)$ は正定値である。 □

9 半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式

定義 9.1 (実数の数ベクトルと実数の行列から作る数$x^\top P y$)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。$\mathbb{R}^n$ は実数の n 個の組 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ の全体、$\mathrm{Mat}(n, \mathbb{R})$ は成分 P_{kl}（$k, l \in \{1, \ldots, n\}$）が実数である n 行 n 列の行列の全体である。$x, y \in \mathbb{R}^n$、$P \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{R})$ に対し、

$$x^\top P y := \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} x_k\, P_{kl}\, y_l \in \mathbb{R}$$

と定める。$x_k\, P_{kl}\, y_l := \big(x_k\, P_{kl}\big)\, y_l$ は $\mathbb{R}$ の積、$\sum$ は $\mathbb{R}$ の有限和で、定義 1.16 と同じく左から順に足したものとする。$x^\top P y$ はこの式で定める一つの記号であり、数ベクトルの転置と行列の積を組み合わせたものとしては読まない。

定義 9.2 (実数の行列が対称であること)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$P \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{R})$（定義 9.1 の記号）とする。$P$ が対称であるとは、すべての $k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について $P_{kl} = P_{lk}$ であることをいう。

主張 9.3 (半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$P \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{R})$ が対称（定義 9.2）かつ半正定値（$\forall x \in \mathbb{R}^n : x^\top P x \geq 0$。$x^\top P x$ は 定義 9.1 の $y = x$ の値）とする。このとき任意の $x, y \in \mathbb{R}^n$ について

$$\left(y^\top P x\right)^2 \le \left(x^\top P x\right)\left(y^\top P y\right)$$

が成り立つ。$\mathbb{R}$ を使うのは、熱力学極限の章で、成分が実数の値をとる行列にこの主張を使うためである。証明は $\mathbb{R}$ の四則演算と大小関係だけを使い、極限・完備性を使わない。

証明. 準備として、$u, v \in \mathbb{R}^n$ について $u^\top P v = v^\top P u$ を示す。

$$\begin{aligned}
u^\top P v &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} u_k\, P_{kl}\, v_l && (\because \text{ 定義 } 9.1)\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} u_k\, P_{lk}\, v_l && (\because \ P \text{ は対称 定義 } 9.2)\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} v_l\, P_{lk}\, u_k && (\because \ \mathbb{R} \text{ の乗法の結合則・可換則})\\
&= \sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} v_l\, P_{lk}\, u_k && (\because \ \mathbb{R} \text{ の加法の結合則・可換則による有限和の順序の入れ替え})\\
&= v^\top P u && (\because \text{ 定義 } 9.1)
\end{aligned}$$

$t \in \mathbb{R}$ について $w(t) \in \mathbb{R}^n$ を $w(t)_k := y_k + t\, x_k$ $(k \in \{1, \dots, n\})$ で定め、$q(t) := w(t)^\top P\, w(t) \in \mathbb{R}$ と置く。

$$\begin{aligned}
q(t) &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} (y_k + t\, x_k)\, P_{kl}\, (y_l + t\, x_l) && (\because \ q(t),\ w(t) \text{ の定義と 定義 } 9.1)\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \left(y_k P_{kl} y_l + t\, y_k P_{kl} x_l + t\, x_k P_{kl} y_l + t^2\, x_k P_{kl} x_l\right) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の分配則・乗法の結合則・可換則})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} y_k P_{kl} y_l + \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} t\, y_k P_{kl} x_l\\
&\quad + \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} t\, x_k P_{kl} y_l + \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} t^2\, x_k P_{kl} x_l && (\because \ \mathbb{R} \text{ の加法の結合則・可換則による有限和の項の並べ替え})\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} y_k P_{kl} y_l + t \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} y_k P_{kl} x_l\\
&\quad + t \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} x_k P_{kl} y_l + t^2 \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} x_k P_{kl} x_l && (\because \ \mathbb{R} \text{ の分配則で } t,\ t^2 \text{ を有限和の外へ出す})\\
&= y^\top P y + t\, y^\top P x + t\, x^\top P y + t^2\, x^\top P x && (\because \text{ 定義 } 9.1)\\
&= y^\top P y + t\, y^\top P x + t\, y^\top P x + t^2\, x^\top P x && (\because \text{ 準備の } u^\top P v = v^\top P u \text{ を } u = x,\ v = y \text{ で})\\
&= (x^\top P x)\, t^2 + 2\, (y^\top P x)\, t + y^\top P y && (\because \ \mathbb{R} \text{ の加法と乗法の可換則・分配則})
\end{aligned}$$

仮定の半正定値性を $w(t)$ に当てはめると、すべての $t \in \mathbb{R}$ について $0 \le q(t)$ である。$a := x^\top P x \in \mathbb{R}$、$b := y^\top P x \in \mathbb{R}$、$c := y^\top P y \in \mathbb{R}$ と置くと、半正定値性を x に当てはめて $0 \le a$、y に当てはめて $0 \le c$ であり、$0 \le a$ より $a > 0$ か $a = 0$ のどちらかである。

(i) $a > 0$ のとき。

$$\begin{aligned}
0 &\le q(-b/a) && (\because \ P \text{ の半正定値性を } w(-b/a) \text{ に当てはめる。 } a \ne 0 \text{ なので } -b/a \in \mathbb{R} \text{ が定まる})\\
&= a\left(-\frac{b}{a}\right)^2 + 2b\left(-\frac{b}{a}\right) + c && (\because \text{ 上の } q(t) \text{ の表示へ } t = -b/a \text{ を代入})\\
&= \frac{b^2}{a} - \frac{2b^2}{a} + c && (\because \ a \ne 0 \text{ のもとでの } \mathbb{R} \text{ の四則演算})\\
&= c - \frac{b^2}{a} && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則演算})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
(y^\top Px)^2 &= b^2 && \bigl(\because\ b = y^\top Px\bigr)\\
&= a\cdot\frac{b^2}{a} && \bigl(\because\ a \neq 0\bigr)\\
&\le a\,c && \bigl(\because\ 0 \le c - b^2/a \text{ の移項で } b^2/a \le c \text{ とし、 } a > 0 \text{ を両辺へ掛ける}\bigr)\\
&= (x^\top Px)(y^\top Py) && \bigl(\because\ a = x^\top Px,\ c = y^\top Py\bigr)
\end{aligned}
$$

(ii) $a = 0$ のとき。すべての $t \in \mathbb{R}$ について

$$
\begin{aligned}
q(t) &= 0\cdot t^2 + 2bt + c && \bigl(\because\ \text{上の } q(t) \text{ の表示と } a = 0\bigr)\\
&= 2bt + c && \bigl(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則演算}\bigr)
\end{aligned}
$$

$b \neq 0$ と仮定し、$t_0 := -(c+1)/(2b) \in \mathbb{R}$ と置くと

$$
\begin{aligned}
q(t_0) &= 2b\left(-\frac{c+1}{2b}\right) + c && \bigl(\because\ q(t) = 2bt + c \text{ へ } t = t_0 \text{ を代入}\bigr)\\
&= -(c+1) + c && \bigl(\because\ b \neq 0 \text{ のもとでの } \mathbb{R} \text{ の四則演算}\bigr)\\
&= -1 && \bigl(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則演算}\bigr)\\
&< 0 && \bigl(\because\ -1 < 0\bigr)
\end{aligned}
$$

これは $0 \le q(t_0)$ と矛盾するので $b = 0$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
(y^\top Px)^2 &= b^2 && \bigl(\because\ b = y^\top Px\bigr)\\
&= 0 && \bigl(\because\ b = 0\bigr)\\
&= 0\cdot c && \bigl(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則演算}\bigr)\\
&= (x^\top Px)(y^\top Py) && \bigl(\because\ a = x^\top Px = 0,\ c = y^\top Py\bigr)
\end{aligned}
$$

(i)(ii) のどちらでも $\bigl(y^\top Px\bigr)^2 \le \bigl(x^\top Px\bigr)\bigl(y^\top Py\bigr)$ が成り立つ。 □

10 等間隔点の平均の積分への収束

定理 10.1 (等間隔点の平均は積分に収束する)**.** 以下では、次を外部前提として用いる。有界閉区間 $[a,b] \subset \mathbb{R}$ 上の連続実関数 g は一様連続である。すなわち任意の $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して $\eta \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在して、$s,t \in [a,b]$、$|s-t| \le \eta$ なら $|g(s) - g(t)| \le \epsilon$ である。

また、有界閉区間上の連続実関数の Riemann 可積分性、積分の線型性と区間加法性、定数の積分、および積分の絶対値が区間の長さと関数の絶対値の上限の積以下であることを、積分の基本性質として用いる。

この主張は積分・上限・極限を扱うので、現れる数はすべて $\mathbb{R}$ の元である（$\mathbb{R}$ への脱出。上限の存在には $\mathbb{R}$ の完備性を、整数の取り方には $\mathbb{R}$ のアルキメデス性を使う)。

実数列 $(c_M)_{M\in\mathbb{Z}_{\ge 1}}$ と $L \in \mathbb{R}$ について $\lim_{M\to\infty} c_M = L$ とは、任意の $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して $N \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ が存在し、$M \ge N$ なら $|c_M - L| \le \epsilon$ となることをいう。

$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を連続関数とし、$\delta \in [0,1]$ を固定する（** 周期性は仮定しない **)。$M \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ に対して

$$
t_\mu^{(M)} := \frac{2\pi(\mu - \delta)}{M} \in \mathbb{R} \qquad (\mu \in \{1,\dots,M\})
$$

とおく。このとき

$$
\lim_{M\to\infty} \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Bigl(t_\mu^{(M)}\Bigr) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(t)\,dt
$$

が成り立つ。より詳しく、$h \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して g の $[0,2\pi]$ 上の連続度を

$$\omega(h) := \sup\{\, |g(s)-g(t)| \mid s,t \in [0,2\pi],\ |s-t| \le h \,\}$$

とおくと、$\omega(h)$ は $\mathbb{R}_{\ge 0}$ の元として定まり

$$\left| \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t)\,dt \right| \ \le\ \omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big)$$

であり、$\omega(h) \to 0$ $(h \to +0)$（任意の $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して $\eta \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し、$0 < h \le \eta$ なら $0 \le \omega(h) \le \epsilon$）である。

とくに $\delta = 0$（整数点 $2\pi\mu/M$）と $\delta = 1/2$（半整数点 $2\pi(\mu - \frac{1}{2})/M$）のどちらでも、極限は同じ値である。

証明. Step 0（区間への分割）。g は $\mathbb{R}$ 上連続なので、とくに有界閉区間 $[0,2\pi]$ 上で連続であり、積分の基本性質より $\int_0^{2\pi} g(t)\,dt \in \mathbb{R}$ が定まる。$M \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ を固定し

$$x_\nu := \frac{2\pi\nu}{M} \in \mathbb{R} \quad (\nu \in \{0,\dots,M\}), \qquad I_\mu := [x_{\mu-1},\ x_\mu] \subset \mathbb{R} \quad (\mu \in \{1,\dots,M\})$$

とおく。両端と区間の長さを確かめる。

$$\begin{aligned}
x_0 &= \frac{2\pi\cdot 0}{M} && (\because\ x_\nu \text{ の定義}) \\
&= 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}), \\
x_M &= \frac{2\pi M}{M} && (\because\ x_\nu \text{ の定義}) \\
&= 2\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}), \\
x_\mu - x_{\mu-1} &= \frac{2\pi\mu}{M} - \frac{2\pi(\mu-1)}{M} && (\because\ x_\nu \text{ の定義}) \\
&= \frac{2\pi}{M} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}$$

区間の長さを右端から左端を引いた数で定め、$\mathrm{len}(I_\mu) := x_\mu - x_{\mu-1}$ と書く。したがって $\mathrm{len}(I_\mu) = 2\pi/M > 0$ であり、I_μ の右端 x_μ は $I_{\mu+1}$ の左端と同じ点である $(\mu \in \{1,\dots,M-1\})$。これらを使い、積分を区間ごとに分ける。

$$\begin{aligned}
\int_0^{2\pi} g(t)\,dt &= \int_{x_0}^{x_M} g(t)\,dt && (\because\ x_0 = 0,\ x_M = 2\pi) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M} \int_{x_{\mu-1}}^{x_\mu} g(t)\,dt && (\because\ x_\mu - x_{\mu-1} = 2\pi/M > 0 \text{ より} x_0 < x_1 < \cdots < x_M \text{。積分の基本性質の区間加法性}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M} \int_{I_\mu} g(t)\,dt && (\because\ I_\mu \text{ の定義}).
\end{aligned}$$

$I_\mu \subset [0,2\pi]$ であることを、両端について確かめる（$2\pi/M > 0$、$0 \le \mu - 1$、$\mu \le M$ を使う）。

$$
\begin{aligned}
0 &= \frac{2\pi}{M} \cdot 0 && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right) \\
&\leq \frac{2\pi}{M}(\mu - 1) && \left(\because\ 0 \leq \mu - 1 \text{ の両辺に正の} 2\pi/M \text{ を掛ける}\right) \\
&= x_{\mu-1} && \left(\because\ x_\nu \text{ の定義}\right), \\
x_\mu &= \frac{2\pi}{M}\mu && \left(\because\ x_\nu \text{ の定義}\right) \\
&\leq \frac{2\pi}{M}M && \left(\because\ \mu \leq M \text{ の両辺に正の} 2\pi/M \text{ を掛ける}\right) \\
&= 2\pi && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right).
\end{aligned}
$$

Step 1（連続度が実数として定まること）。一様連続性を $\epsilon = 1$ で $[0, 2\pi]$ 上の g に適用し、$s', t' \in [0, 2\pi]$、$|s' - t'| \leq \eta_1$ なら $|g(s') - g(t')| \leq 1$ となる $\eta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ を取る。$\mathbb{R}$ のアルキメデス性より $K\eta_1 \geq 2\pi$ となる $K \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を取る。$s, t \in [0, 2\pi]$ を取る。まず $|t - s| \leq 2\pi$ を、$s \leq t$ と $t < s$ に分けて示す。

$$
\begin{aligned}
& s \leq t \text{ のとき：} \\
|t - s| &= t - s && (\because\ t - s \geq 0) \\
&\leq 2\pi - s && (\because\ t \leq 2\pi) \\
&\leq 2\pi - 0 && (\because\ 0 \leq s) \\
&= 2\pi && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right), \\
& t < s \text{ のとき：} \\
|t - s| &= s - t && (\because\ t - s < 0) \\
&\leq 2\pi - t && (\because\ s \leq 2\pi) \\
&\leq 2\pi - 0 && (\because\ 0 \leq t) \\
&= 2\pi && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right).
\end{aligned}
$$

$j \in \{0, \ldots, K\}$ に対して $u_j := \left(1 - \frac{j}{K}\right) s + \frac{j}{K} t \in \mathbb{R}$ とおく。$0 \leq 1 - \frac{j}{K}$、$0 \leq \frac{j}{K}$ と $0 \leq s \leq 2\pi$、$0 \leq t \leq 2\pi$ の各辺に非負の数を掛けて、準備として

$$
\begin{aligned}
&\left(1 - \tfrac{j}{K}\right) 0 \leq \left(1 - \tfrac{j}{K}\right) s \leq \left(1 - \tfrac{j}{K}\right) 2\pi && \left(\because\ 0 \leq s \leq 2\pi \text{ の各辺に非負の} 1 - \tfrac{j}{K} \text{ を掛ける}\right), \\
&\tfrac{j}{K} 0 \leq \tfrac{j}{K} t \leq \tfrac{j}{K} 2\pi && \left(\because\ 0 \leq t \leq 2\pi \text{ の各辺に非負の} \tfrac{j}{K} \text{ を掛ける}\right)
\end{aligned}
$$

を得る。これらを使い、$u_j \in [0, 2\pi]$ を示す。

$$
\begin{aligned}
0 &= \left(1 - \tfrac{j}{K}\right) 0 + \tfrac{j}{K} 0 && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right) \\
&\leq \left(1 - \tfrac{j}{K}\right) s + \tfrac{j}{K} 0 && \left(\because\ \text{準備の第一の左の不等式の両辺に} \tfrac{j}{K} 0 \text{ を足す}\right) \\
&\leq \left(1 - \tfrac{j}{K}\right) s + \tfrac{j}{K} t && \left(\because\ \text{準備の第二の左の不等式の両辺に} \left(1 - \tfrac{j}{K}\right) s \text{ を足す}\right) \\
&= u_j && \left(\because\ u_j \text{ の定義}\right), \\
u_j &= \left(1 - \tfrac{j}{K}\right) s + \tfrac{j}{K} t && \left(\because\ u_j \text{ の定義}\right) \\
&\leq \left(1 - \tfrac{j}{K}\right) 2\pi + \tfrac{j}{K} t && \left(\because\ \text{準備の第一の右の不等式の両辺に} \tfrac{j}{K} t \text{ を足す}\right) \\
&\leq \left(1 - \tfrac{j}{K}\right) 2\pi + \tfrac{j}{K} 2\pi && \left(\because\ \text{準備の第二の右の不等式の両辺に} \left(1 - \tfrac{j}{K}\right) 2\pi \text{ を足す}\right) \\
&= 2\pi && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right).
\end{aligned}
$$

$j \in \{0, \dots, K-1\}$ について

$$\begin{aligned}
|u_{j+1} - u_j| &= \left| \frac{t-s}{K} \right| && (\because\ u_j \text{ の定義と} \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \frac{|t-s|}{K} && (\because\ K > 0 \text{ による絶対値の商}) \\
&\leq \frac{2\pi}{K} && (\because\ |t-s| \leq 2\pi \text{ の両辺を正の} K \text{ で割る}) \\
&\leq \eta_1 && (\because\ 2\pi \leq K\eta_1 \text{ の両辺を正の} K \text{ で割る})
\end{aligned}$$

であり、$u_0 = s$、$u_K = t$ だから

$$\begin{aligned}
|g(t) - g(s)| &= \left| \sum_{j=0}^{K-1} \big(g(u_{j+1}) - g(u_j) \big) \right| && (\because\ \text{隣り合う項が打ち消し合う和}) \\
&\leq \sum_{j=0}^{K-1} \big| g(u_{j+1}) - g(u_j) \big| && (\because\ \text{三角不等式}) \\
&\leq \sum_{j=0}^{K-1} 1 && (\because\ u_j, u_{j+1} \in [0, 2\pi],\ |u_{j+1} - u_j| \leq \eta_1 \text{ と} \eta_1 \text{ の取り方}) \\
&= K && (\because\ 1 \text{ の} K \text{ 個の和}) .
\end{aligned}$$

したがって $\omega(h)$ の定義の集合は上に K で抑えられる。$s = t = 0$ のとき $|g(0) - g(0)| = 0$ なので、この集合は 0 を元に持ち、空でない。上限の存在（$\mathbb{R}$ の完備性）より $\omega(h) \in \mathbb{R}$ が定まり、上限は元以上で上界以下なので $0 \leq \omega(h) \leq K$ である。

Step 2（代表点が区間に入ること）。$\mu \in \{1, \dots, M\}$ とする。$\delta \in [0, 1]$ より $0 \leq 1 - \delta \leq 1$ である。$2\pi/M > 0$ を用いると、準備として

$$\begin{aligned}
0 &\leq \frac{2\pi}{M}(1-\delta) && (\because\ 0 \leq 1-\delta \text{ の両辺に正の} 2\pi/M \text{ を掛ける}) , \\
\frac{2\pi}{M}(1-\delta) &\leq \frac{2\pi}{M} && (\because\ 1-\delta \leq 1 \text{ の両辺に正の} 2\pi/M \text{ を掛ける})
\end{aligned}$$

を得る。これらを使い、代表点の左側と右側をそれぞれ評価する。

$$\begin{aligned}
x_{\mu-1} &= x_{\mu-1} + 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法単位元}) \\
&\leq x_{\mu-1} + \frac{2\pi}{M}(1-\delta) && (\because\ \text{準備の第一の不等式の両辺に} x_{\mu-1} \text{ を足す}) \\
&= \frac{2\pi(\mu-1)}{M} + \frac{2\pi}{M}(1-\delta) && (\because\ x_\nu \text{ の定義}) \\
&= \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= t_\mu^{(M)} && \left(\because\ t_\mu^{(M)} \text{ の定義}\right) ,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
t_\mu^{(M)} &= \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M} && \left(\because\ t_\mu^{(M)} \text{ の定義}\right) \\
&= \frac{2\pi(\mu-1)}{M} + \frac{2\pi}{M}(1-\delta) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= x_{\mu-1} + \frac{2\pi}{M}(1-\delta) && (\because\ x_\nu \text{ の定義}) \\
&\leq x_{\mu-1} + \frac{2\pi}{M} && (\because\ \text{準備の第二の不等式の両辺に} x_{\mu-1} \text{ を足す}) \\
&= x_\mu && (\because\ \text{Step 0 の} x_\mu - x_{\mu-1} = 2\pi/M) .
\end{aligned}$$

すなわち $t_\mu^{(M)} \in I_\mu$ であり、Step 0 の $I_\mu \subset [0, 2\pi]$ より $t_\mu^{(M)} \in [0, 2\pi]$ である。$t \in I_\mu$ との距離を、$t \geq t_\mu^{(M)}$ と $t < t_\mu^{(M)}$ に分けて評価する。

$$
\begin{aligned}
& t \geq t_\mu^{(M)} \text{ のとき：} \\
\left| t - t_\mu^{(M)} \right| &= t - t_\mu^{(M)} && \left(\because\ t - t_\mu^{(M)} \geq 0 \right) \\
&\leq x_\mu - t_\mu^{(M)} && (\because\ t \leq x_\mu\ (t \in I_\mu)) \\
&\leq x_\mu - x_{\mu-1} && \left(\because\ x_{\mu-1} \leq t_\mu^{(M)}\ (t_\mu^{(M)} \in I_\mu) \right) \\
&= \frac{2\pi}{M} && (\because\ \text{Step 0})\,, \\
& t < t_\mu^{(M)} \text{ のとき：} \\
\left| t - t_\mu^{(M)} \right| &= t_\mu^{(M)} - t && \left(\because\ t - t_\mu^{(M)} < 0 \right) \\
&\leq x_\mu - t && \left(\because\ t_\mu^{(M)} \leq x_\mu\ (t_\mu^{(M)} \in I_\mu) \right) \\
&\leq x_\mu - x_{\mu-1} && (\because\ x_{\mu-1} \leq t\ (t \in I_\mu)) \\
&= \frac{2\pi}{M} && (\because\ \text{Step 0})\,.
\end{aligned}
$$

Step 3（各区間での誤差）。$\mu \in \{1, \ldots, M\}$ を固定する。$t \in I_\mu$ なら、$t \in [0, 2\pi]$（Step 0 の $I_\mu \subset [0, 2\pi]$）、$t_\mu^{(M)} \in [0, 2\pi]$（Step 2）、$\left| t - t_\mu^{(M)} \right| \leq 2\pi/M$（Step 2）なので、$\left| g(t) - g\left(t_\mu^{(M)} \right) \right|$ は $\omega(2\pi/M)$ の定義の集合の元であり、$\omega(2\pi/M)$（Step 1 で実数として定まった）以下である。$t = t_\mu^{(M)} \in I_\mu$ のとき値は 0 なので集合 $\left\{ \left| g(t) - g\left(t_\mu^{(M)} \right) \right| \;\middle|\; t \in I_\mu \right\}$ は空でなく、上限の存在より $\sup_{t \in I_\mu} \left| g(t) - g\left(t_\mu^{(M)} \right) \right| \in \mathbb{R}$ が定まり、上限は上界以下なので $\omega(2\pi/M)$ 以下である。また積分の基本性質の定数の積分と Step 0 の $\mathrm{len}(I_\mu) = 2\pi/M$ より $\int_{I_\mu} g\left(t_\mu^{(M)} \right) dt = \dfrac{2\pi}{M} g\left(t_\mu^{(M)} \right)$ である。各区間での誤差を一続きに評価する。

$$
\begin{aligned}
& \left| \int_{I_\mu} g(t)\, dt - \frac{2\pi}{M} g\left(t_\mu^{(M)} \right) \right| \\
&= \left| \int_{I_\mu} g(t)\, dt - \int_{I_\mu} g\left(t_\mu^{(M)} \right) dt \right| && (\because\ \text{積分の基本性質の定数の積分}) \\
&= \left| \int_{I_\mu} \left(g(t) - g\left(t_\mu^{(M)} \right) \right) dt \right| && (\because\ \text{積分の線型性}) \\
&\leq \frac{2\pi}{M} \sup_{t \in I_\mu} \left| g(t) - g\left(t_\mu^{(M)} \right) \right| && \left(\because\ \left| \int_I f \right| \leq \mathrm{len}(I) \sup_I |f| \text{ を} f := g - g\left(t_\mu^{(M)} \right),\ I := I_\mu,\ \mathrm{len}(I_\mu) = \tfrac{2\pi}{M} \text{ で} \right) \\
&\leq \frac{2\pi}{M} \omega\left(\frac{2\pi}{M} \right) && (\because\ \text{上の上限は} \omega(2\pi/M) \text{ 以下で、両辺に正の} \tfrac{2\pi}{M} \text{ を掛ける})\,.
\end{aligned}
$$

Step 4（総和）。全区間にわたる誤差を一続きに評価する。

$$
\begin{aligned}
&\left|\int_0^{2\pi} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right| \\
&= \left|\sum_{\mu=1}^{M}\int_{I_\mu} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right| && (\because \text{ Step 0 の積分を区間ごとに分けた式}) \\
&= \left|\sum_{\mu=1}^{M}\int_{I_\mu} g(t)\,dt - \sum_{\mu=1}^{M}\frac{2\pi}{M}\, g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right| && (\because \text{ 分配法則}) \\
&= \left|\sum_{\mu=1}^{M}\left(\int_{I_\mu} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\, g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right)\right| && (\because \text{ 和の差は差の和}) \\
&\le \sum_{\mu=1}^{M}\left|\int_{I_\mu} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\, g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right| && (\because \text{ 三角不等式}) \\
&\le \sum_{\mu=1}^{M}\frac{2\pi}{M}\,\omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big) && (\because \text{ Step 3 の評価}) \\
&= M\cdot\frac{2\pi}{M}\,\omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big) && (\because \mu \text{ に依らない同一の項の} M \text{ 個の和}) \\
&= 2\pi\,\omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

Step 5（主張の評価）。主張の左辺から始めて評価する。

$$
\begin{aligned}
&\left|\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(t)\,dt\right| \\
&= \left|\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\pi}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(t)\,dt\right| && \Big(\because\ \tfrac{1}{M} = \tfrac{1}{2\pi}\cdot\tfrac{2\pi}{M}\Big) \\
&= \left|\frac{1}{2\pi}\left(\frac{2\pi}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) - \int_0^{2\pi} g(t)\,dt\right)\right| && (\because \text{ 分配法則}) \\
&= \frac{1}{2\pi}\left|\frac{2\pi}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) - \int_0^{2\pi} g(t)\,dt\right| && \Big(\because\ |cy| = c|y|\ (c = \tfrac{1}{2\pi} > 0)\Big) \\
&= \frac{1}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right| && (\because\ |-y| = |y|) \\
&\le \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi\,\omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big) && (\because \text{ Step 4 の評価の両辺に正の} \tfrac{1}{2\pi} \text{ を掛ける}) \\
&= \omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

Step 6（収束）。$\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ を任意に取る。一様連続性を $[0,2\pi]$ 上の g に適用し、$s,t \in [0,2\pi]$、$|s-t| \le \eta_0$ なら $|g(s)-g(t)| \le \epsilon$ となる $\eta_0 \in \mathbb{R}_{>0}$ を取る。$0 < h \le \eta_0$ なら、$\omega(h)$ の定義の集合の元 $|g(s)-g(t)|$ $(|s-t| \le h \le \eta_0)$ はすべて ϵ 以下なので、上限は上界以下であることと Step 1

より $0 \leq \omega(h) \leq \epsilon$ である。これで $\omega(h) \to 0$ $(h \to +0)$ が示せた。次に $N := \lfloor 2\pi/\eta_0 \rfloor + 1 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$（$\lfloor y \rfloor$ は y 以下の最大の整数。$\mathbb{R}$ のアルキメデス性で定まる）とおく。$M \geq N$ なる $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$\begin{aligned}
M &\geq \left\lfloor \frac{2\pi}{\eta_0} \right\rfloor + 1 && \left(\because\ M \geq N \text{ と} N \text{ の定義}\right) \\
&> \frac{2\pi}{\eta_0} && \left(\because\ y < \lfloor y \rfloor + 1\right), \\
\frac{2\pi}{M} &= \frac{\eta_0}{M} \cdot \frac{2\pi}{\eta_0} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right) \\
&< \frac{\eta_0}{M} \cdot M && \left(\because\ \tfrac{2\pi}{\eta_0} < M \text{ の両辺に正の} \tfrac{\eta_0}{M} \text{ を掛ける}\right) \\
&= \eta_0 && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right)
\end{aligned}$$

なので

$$\begin{aligned}
\left| \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^{M} g\left(t_\mu^{(M)}\right) - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t)\, dt \right| &\leq \omega\left(\frac{2\pi}{M}\right) && \left(\because\ \text{Step 5 の評価}\right) \\
&\leq \epsilon && \left(\because\ 0 < 2\pi/M < \eta_0 \text{ と上の} \omega \text{ の評価}\right).
\end{aligned}$$

$\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ は任意だったので、主張の前に置いた極限の意味で、主張の極限が成り立つ。

（証明で g について使ったのは、有界閉区間 $[0, 2\pi]$ 上の連続性だけである。$\delta = 0$ のとき代表点 $t_M^{(M)} = 2\pi$ は区間 I_M の右端、$\delta = 1$ のとき $t_1^{(M)} = 0$ は I_1 の左端であり、どちらも $[0, 2\pi]$ に属するので Step 3 の評価がそのまま通る。$g(2\pi)$ と $g(0)$ を比べる必要はどこにも生じない。） □

11 $\cosh, \sinh$ の加法定理と、正弦およびそれを含む積分の評価

注意 11.1 (積分の評価で持ち込む実数解析の事実（(R3)・(R4)・微分の公式・円周率の数値）). 以下の双曲線関数の主張と、正弦・余弦の評価（主張 11.27・主張 11.28・主張 11.29）と、主張 11.38・主張 11.41・主張 11.42・主張 11.44・主張 11.48 は、実数の区間上の関数の微分と積分を扱うので、次の事実を外部から持ち込む。(R3)(R4) と微分の公式は実数解析の一般の事実であり、正弦・余弦の導関数と円周率の数値の評価は本文の正弦・余弦・円周率についての主張である。円周率の数値の評価は、主張 11.30・主張 11.42・主張 11.44・主張 11.48 が使う。

- (R3) ** 積分の線型性と単調性 **：$[a, b]$ 上の連続関数 g, h と $\lambda, \nu \in \mathbb{R}$ について $\int_a^b (\lambda g + \nu h) = \lambda \int_a^b g + \nu \int_a^b h$、および $g \leq h$（各点で）ならば $\int_a^b g \leq \int_a^b h$。
- (R4) ** 微分積分学の基本定理 **：F が $[a, b]$ 上微分可能で $F' = g$ が連続なら $\int_a^b g(t)\, dt = F(b) - F(a)$。
- ** 微分の公式 **：定義 3.11 の実数の exp は $\mathbb{R}$ 上微分可能で $\exp' = \exp$。定義 12.21 の log は $\mathbb{R}_{>0}$ 上微分可能で $\log'(w) = \frac{1}{w}$。定義 1.4 の平方根は $\mathbb{R}_{>0}$ 上微分可能で $(\sqrt{\ })'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}}$。定数関数と恒等関数 $u \mapsto u$ は微分可能で、導関数はそれぞれ 0 と 1。微分可能な関数の和・定数倍・積・商（分母が 0 でないところ）・合成は微分可能で、導関数は和・定数倍・積・商・合成の微分の公式で与えられる。微分可能な関数は連続である。
- ** 正弦・余弦の導関数 **（本文の正弦・余弦についての主張で、本文では証明しない）：定義 1.38 の sin（定義 1.36 の弧の長さで定めた arcsin の逆関数）と 定義 1.41 の cos は

$[-\pi/2, \pi/2]$ 上微分可能で（端点では片側の微分）、$\sin' = \cos$、$\cos' = -\sin$。これは、本文の sin・cos が、弧の長さで定める正弦・余弦として齋藤微積分（定義 1.33・主張 1.37 が引く文献）で扱われているものと一致することを前提にしている。

- ** 円周率の数値の評価 **（本文の π についての主張で、本文では証明しない）：主張 1.37 が齋藤微積分から持ち込んだ $\pi \in \mathbb{R}$（$\arcsin(1) = \pi/2$ となる実数、すなわち単位円の弧 $(1,0)$ から $(0,1)$ までの長さの 2 倍）について $3.141592 \leq \pi \leq 3.141593$。

どの段でどれを使うかは次のとおりである。

- (R3) は 主張 11.22、主張 11.23、主張 11.27、主張 11.28、主張 11.29、主張 11.38、主張 11.48 で、被積分関数の各点評価を積分へ持ち上げる段と積分を足し合わせる段に使う。
- (R4) は 主張 11.22、主張 11.23、主張 11.27、主張 11.28、主張 11.29、主張 11.38、主張 11.41、主張 11.44、主張 11.48 で、導関数が分かっている関数の積分値を求める段に使う。
- 微分の公式は 主張 11.11、主張 11.12、主張 11.19、主張 11.22、主張 11.23、主張 11.27、主張 11.28、主張 11.29、主張 11.38、主張 11.41、主張 11.44、主張 11.48 で、(R4) に渡す導関数を求める段と、被積分関数の連続性を言う段に使う。正弦・余弦の導関数は、そのうち 主張 11.27、主張 11.28、主張 11.29、主張 11.48 で使う。

** これ以外の解析的道具（広義積分、一様収束、優収束、実解析性、平均値の定理）は使わない。** とくに以下に現れる積分はすべて有界閉区間上の連続関数の積分であり、広義積分は現れない。

主張 11.2 (cosh は偶関数)**.** 定義 3.19 の $x \in \mathbb{R}$ について

$$\cosh(-x) = \cosh x$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明.

$$\begin{aligned}
\cosh(-x) &= \frac{\exp(-x) + \exp(-(-x))}{2} && (\because \text{ cosh の定義。定義 3.19}) \\
&= \frac{\exp(-x) + \exp(x)}{2} && (\because -(-x) = x) \\
&= \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の交換律}) \\
&= \cosh x && (\because \text{ cosh の定義。定義 3.19})
\end{aligned}$$

□

主張 11.3 (sinh は奇関数)**.** 定義 3.19 の $x \in \mathbb{R}$ について

$$\sinh(-x) = -\sinh x$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明.

$$\begin{aligned}
\sinh(-x) &= \frac{\exp(-x) - \exp(-(-x))}{2} && (\because \text{ sinh の定義。定義 3.19}) \\
&= \frac{\exp(-x) - \exp(x)}{2} && (\because -(-x) = x) \\
&= \frac{-(\exp(x) - \exp(-x))}{2} && (\because a - b = -(b - a)) \\
&= -\frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} && (\because \text{ 分子の符号を分数の外へ出す}) \\
&= -\sinh x && (\because \text{ sinh の定義。定義 3.19})
\end{aligned}$$

□

主張 11.4 (cosh の加法定理)**.** 定義 3.19 の $x, y \in \mathbb{R}$ について（複号同順）

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明. 以下の exp はすべて 定義 3.11 の実数の exp である。記号 $E_x := \exp(x),\ E_{-x} := \exp(-x),\ E_y := \exp(y),\ E_{-y} := \exp(-y)$ を置く（$E_x, E_{-x}, E_y, E_{-y} \in \mathbb{R}$）。複号が $+$ の場合。

$$\begin{aligned}
\cosh(x+y) &= \frac{\exp(x+y) + \exp(-(x+y))}{2} && (\because \text{ cosh の定義。定義 3.19}) \\
&= \frac{\exp(x+y) + \exp((-x)+(-y))}{2} && (\because -(x+y) = (-x)+(-y)) \\
&= \frac{E_xE_y + E_{-x}E_{-y}}{2} && (\because \exp(s+t) = \exp(s)\exp(t) \text{ を 2 箇所へ。主張 3.13}) \\
&= \frac{2E_xE_y + 2E_{-x}E_{-y}}{4} && (\because \text{ 分母と分子に2 を掛ける}) \\
&= \frac{(E_xE_y + E_xE_{-y} + E_{-x}E_y + E_{-x}E_{-y}) + (E_xE_y - E_xE_{-y} - E_{-x}E_y + E_{-x}E_{-y})}{4} && (\because E_xE_{-y} \text{ と } E_{-x}E_y \text{ を足して引く}) \\
&= \frac{(E_x + E_{-x})(E_y + E_{-y}) + (E_x - E_{-x})(E_y - E_{-y})}{4} && (\because \text{ 分配則}) \\
&= \frac{E_x + E_{-x}}{2} \cdot \frac{E_y + E_{-y}}{2} + \frac{E_x - E_{-x}}{2} \cdot \frac{E_y - E_{-y}}{2} && (\because \text{ 分数の和と積}) \\
&= \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y && (\because \text{ cosh, sinh の定義を 4 箇所へ。定義 3.19})
\end{aligned}$$

複号が $-$ の場合。

$$\begin{aligned}
\cosh(x-y) &= \cosh(x+(-y)) && (\because\ x - y = x + (-y)) \\
&= \cosh x \cosh(-y) + \sinh x \sinh(-y) && (\because \text{ 複号が } + \text{ の場合を } -y \in \mathbb{R} \text{ に当てはめる}) \\
&= \cosh x \cosh y + \sinh x\,(-\sinh y) && (\because \text{ 主張 11.2, 主張 11.3}) \\
&= \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

□

主張 11.5 (sinh の加法定理)**.** 定義 3.19 の $x, y \in \mathbb{R}$ について（複号同順）

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明. 記号 $E_x, E_{-x}, E_y, E_{-y} \in \mathbb{R}$ は 主張 11.4 の証明と同じく、定義 3.11 の実数の exp の値 $\exp(x), \exp(-x), \exp(y), \exp(-y)$ とする。複号が $+$ の場合。

$$\begin{aligned}
\sinh(x+y) &= \frac{\exp(x+y) - \exp(-(x+y))}{2} && (\because \text{ sinh の定義。定義 3.19}) \\
&= \frac{\exp(x+y) - \exp((-x)+(-y))}{2} && (\because -(x+y) = (-x)+(-y)) \\
&= \frac{E_xE_y - E_{-x}E_{-y}}{2} && (\because \exp(s+t) = \exp(s)\exp(t) \text{ を 2 箇所へ。主張 3.13}) \\
&= \frac{2E_xE_y - 2E_{-x}E_{-y}}{4} && (\because \text{ 分母と分子に2 を掛ける}) \\
&= \frac{(E_xE_y + E_xE_{-y} - E_{-x}E_y - E_{-x}E_{-y}) + (E_xE_y - E_xE_{-y} + E_{-x}E_y - E_{-x}E_{-y})}{4} && (\because E_xE_{-y} \text{ と } E_{-x}E_y \text{ を足して引く}) \\
&= \frac{(E_x - E_{-x})(E_y + E_{-y}) + (E_x + E_{-x})(E_y - E_{-y})}{4} && (\because \text{ 分配則}) \\
&= \frac{E_x - E_{-x}}{2} \cdot \frac{E_y + E_{-y}}{2} + \frac{E_x + E_{-x}}{2} \cdot \frac{E_y - E_{-y}}{2} && (\because \text{ 分数の和と積}) \\
&= \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y && (\because \text{ cosh, sinh の定義を 4 箇所へ。定義 3.19})
\end{aligned}$$

複号が $-$ の場合。

$$\begin{aligned}
\sinh(x-y) &= \sinh(x+(-y)) && (\because\ x-y=x+(-y))\\
&= \sinh x\cosh(-y)+\cosh x\sinh(-y) && (\because\ \text{複号が}+\ \text{の場合を}-y\in\mathbb{R}\ \text{に当てはめる})\\
&= \sinh x\cosh y+\cosh x\,(-\sinh y) && (\because\ \text{主張 11.2, 主張 11.3})\\
&= \sinh x\cosh y-\cosh x\sinh y && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則})
\end{aligned}$$

□

主張 11.6 (cosh の半角公式)**.** 定義 3.19 の $x\in\mathbb{R}$ について

$$\cosh x = 1+2\sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right)$$

ここで $\sinh^2(a) := (\sinh a)^2$ である。

$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明.

$$\begin{aligned}
\cosh x &= \cosh\left(\tfrac{x}{2}+\tfrac{x}{2}\right) && (\because\ x=\tfrac{x}{2}+\tfrac{x}{2})\\
&= \cosh\left(\tfrac{x}{2}\right)\cosh\left(\tfrac{x}{2}\right)+\sinh\left(\tfrac{x}{2}\right)\sinh\left(\tfrac{x}{2}\right) && (\because\ \text{主張 11.4 の複号}+\ \text{を}x\to\tfrac{x}{2},\ y\to\tfrac{x}{2}\ \text{で})\\
&= \left(\cosh\tfrac{x}{2}\right)^2+\left(\sinh\tfrac{x}{2}\right)^2 && (\because\ \text{二乗の記法})\\
&= \left(1+\left(\sinh\tfrac{x}{2}\right)^2\right)+\left(\sinh\tfrac{x}{2}\right)^2 && (\because\ \text{主張 3.21 (2) を}\tfrac{x}{2}\ \text{で移項})\\
&= 1+2\sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) && (\because\ \text{同類項をまとめる})
\end{aligned}$$

□

主張 11.7 (sinh の倍角公式)**.** 定義 3.19 の $x\in\mathbb{R}$ について

$$\sinh x = 2\sinh\left(\tfrac{x}{2}\right)\cosh\left(\tfrac{x}{2}\right)$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明.

$$\begin{aligned}
\sinh x &= \sinh\left(\tfrac{x}{2}+\tfrac{x}{2}\right) && (\because\ x=\tfrac{x}{2}+\tfrac{x}{2})\\
&= \sinh\left(\tfrac{x}{2}\right)\cosh\left(\tfrac{x}{2}\right)+\cosh\left(\tfrac{x}{2}\right)\sinh\left(\tfrac{x}{2}\right) && (\because\ \text{主張 11.5 の複号}+\ \text{を}x\to\tfrac{x}{2},\ y\to\tfrac{x}{2}\ \text{で})\\
&= \sinh\left(\tfrac{x}{2}\right)\cosh\left(\tfrac{x}{2}\right)+\sinh\left(\tfrac{x}{2}\right)\cosh\left(\tfrac{x}{2}\right) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の乗法の交換律})\\
&= 2\sinh\left(\tfrac{x}{2}\right)\cosh\left(\tfrac{x}{2}\right) && (\because\ \text{同類項をまとめる})
\end{aligned}$$

□

主張 11.8 ($\sinh 0=0$)**.** 定義 3.19 の sinh について

$$\sinh 0 = 0$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明.

$$\begin{aligned}
\sinh 0 &= \frac{\exp(0)-\exp(-0)}{2} && (\because\ \text{sinh の定義。定義 3.19})\\
&= \frac{\exp(0)-\exp(0)}{2} && (\because\ -0=0)\\
&= \frac{1-1}{2} && (\because\ \text{主張 3.14 を 2 箇所へ})\\
&= 0 && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則})
\end{aligned}$$

□

主張 11.9 (sinh は狭義単調増加)**.** 定義 3.19 の $x, y \in \mathbb{R}$ が $x < y$ を満たすなら $\sinh x < \sinh y$。
$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明. 準備として、二つの exp の大小を作る。

$$
\begin{aligned}
&x < y \Longrightarrow \exp(x) < \exp(y) && (\because \text{ 主張 3.17})\\
&x < y \Longrightarrow -y < -x && (\because \text{ 両辺に } -1 < 0 \text{ を掛けると不等号の向きが反転する})\\
&\quad \Longrightarrow \exp(-y) < \exp(-x) && (\because \text{ 主張 3.17})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\exp(x) < \exp(y) &\Longrightarrow \exp(y) - \exp(x) > 0 && (\because \text{ 両辺に } -\exp(x) \text{ を加える})\\
\exp(-y) < \exp(-x) &\Longrightarrow \exp(-x) - \exp(-y) > 0 && (\because \text{ 両辺に } -\exp(-y) \text{ を加える})\\
\exp(y) - \exp(x) > 0 \ \wedge\ \exp(-x) - \exp(-y) > 0 &\Longrightarrow (\exp(y) - \exp(x)) + (\exp(-x) - \exp(-y)) > 0 && (\because \text{ 正の実数の和は正})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sinh y - \sinh x &= \frac{\exp(y) - \exp(-y)}{2} - \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} && (\because \text{ sinh の定義を 2 箇所へ。定義 3.19})\\
&= \frac{(\exp(y) - \exp(-y)) - (\exp(x) - \exp(-x))}{2} && (\because \text{ 分母の等しい分数の差})\\
&= \frac{(\exp(y) - \exp(x)) + (\exp(-x) - \exp(-y))}{2} && (\because \text{ 分子の項の並べ替え})\\
&> 0 && (\because \text{ 上の分子の正値性と、正の数を} 2 > 0 \text{ で割ると正})
\end{aligned}
$$

$$\sinh y - \sinh x > 0 \Longrightarrow \sinh x < \sinh y \quad (\because \text{ 両辺に } \sinh x \text{ を加える})$$

□

主張 11.10 (sinh は単射)**.** 定義 3.19 の $u, v \in \mathbb{R}$ が $\sinh u = \sinh v$ を満たすなら $u = v$。
$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明. 対偶を示す。

$$
\begin{aligned}
u \neq v &\Longrightarrow u < v \ \vee\ v < u && (\because \mathbb{R} \text{ の順序は全順序})\\
&\Longrightarrow \sinh u < \sinh v \ \vee\ \sinh v < \sinh u && (\because \text{ 主張 11.9 をそれぞれの場合へ})\\
&\Longrightarrow \sinh u \neq \sinh v && (\because\ a < b \text{ なら } a \neq b)
\end{aligned}
$$

□

主張 11.11 ($\sinh' = \cosh$)**.** 定義 3.19 の $\sinh : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ は微分可能で、$x \in \mathbb{R}$ について $\sinh'(x) = \cosh x$。$\mathbb{R}$ を使うのは、微分が実数の極限で定まるからである（注意 11.1 の微分の公式）。

証明. $n : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ n(x) := -x$ と置くと、$\sinh = \frac{1}{2}(\exp - \exp \circ n)$ である（定義 3.19）。

$$
\begin{aligned}
\sinh'(x) &= \left(\tfrac{1}{2}(\exp - \exp \circ n)\right)'(x) && (\because \sinh = \tfrac{1}{2}(\exp - \exp \circ n))\\
&= \tfrac{1}{2}(\exp - \exp \circ n)'(x) && (\because \text{ 微分の公式の定数倍})\\
&= \tfrac{1}{2}\left(\exp'(x) - (\exp \circ n)'(x)\right) && (\because \text{ 微分の公式の和（差は } -1 \text{ 倍との和）})\\
&= \tfrac{1}{2}\left(\exp'(x) - \exp'(n(x)) \cdot n'(x)\right) && (\because \text{ 微分の公式の合成})\\
&= \tfrac{1}{2}\left(\exp(x) - \exp(n(x)) \cdot n'(x)\right) && (\because \text{ 微分の公式の } \exp' = \exp \text{ を 2 箇所へ})\\
&= \tfrac{1}{2}\left(\exp(x) - \exp(-x) \cdot n'(x)\right) && (\because\ n(x) = -x)\\
&= \tfrac{1}{2}(\exp(x) - \exp(-x) \cdot (-1)) && (\because\ n = (-1) \cdot \mathrm{id} \text{ に微分の公式の定数倍と恒等関数の導関数1})\\
&= \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= \cosh x && (\because \cosh \text{ の定義。定義 3.19})
\end{aligned}
$$

□

主張 11.12 ($\cosh' = \sinh$)**.** 定義 3.19 の $\cosh : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ は微分可能で、$x \in \mathbb{R}$ について $\cosh'(x) = \sinh x$。$\mathbb{R}$ を使うのは、微分が実数の極限で定まるからである（注意 11.1 の微分の公式）。

証明. $n : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ n(x) := -x$ と置くと、$\cosh = \frac{1}{2}(\exp + \exp \circ n)$ である（定義 3.19）。微分可能であることは、注意 11.1 の微分の公式（exp と恒等関数は微分可能で、和・定数倍・合成は微分可能）による。

$$
\begin{aligned}
\cosh'(x) &= \left(\tfrac{1}{2}(\exp + \exp \circ n)\right)'(x) && (\because\ \cosh = \tfrac{1}{2}(\exp + \exp \circ n)) \\
&= \tfrac{1}{2}(\exp + \exp \circ n)'(x) && (\because\ \text{微分の公式の定数倍}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\exp'(x) + (\exp \circ n)'(x)\right) && (\because\ \text{微分の公式の和}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\exp'(x) + \exp'(n(x)) \cdot n'(x)\right) && (\because\ \text{微分の公式の合成}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\exp(x) + \exp(n(x)) \cdot n'(x)\right) && (\because\ \text{微分の公式の } \exp' = \exp \text{ を 2 箇所へ}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\exp(x) + \exp(-x) \cdot n'(x)\right) && (\because\ n(x) = -x) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\exp(x) + \exp(-x) \cdot (-1)\right) && (\because\ n = (-1) \cdot \mathrm{id} \text{ に微分の公式の定数倍と恒等関数の導関数1}) \\
&= \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \sinh x && (\because\ \sinh \text{ の定義。定義 3.19})
\end{aligned}
$$

□

主張 11.13 ($\sqrt{y^2+1} > 0$)**.** $y \in \mathbb{R}$ について $y^2 + 1 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ であり、定義 1.4 の平方根について $\sqrt{y^2+1} > 0$。

証明. 実数の平方は非負なので $y^2 \geq 0$ である。

$$
\begin{aligned}
y^2 + 1 &\geq 0 + 1 && (\because\ y^2 \geq 0 \text{ の両辺に1 を加える}) \\
&= 1 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&> 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の順序})
\end{aligned}
$$

とくに $y^2 + 1 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ なので $s := \sqrt{y^2+1}$ が定まり、定義 1.4 より $s \geq 0$ かつ $s^2 = y^2 + 1$ である。$s = 0$ と仮定すると

$$
\begin{aligned}
s = 0 &\Longrightarrow s^2 = 0 && (\because\ 0^2 = 0) \\
&\Longrightarrow y^2 + 1 = 0 && (\because\ s^2 = y^2 + 1)
\end{aligned}
$$

となり $y^2 + 1 \geq 1$ に反する。よって $s \neq 0$ であり、$s \geq 0$ と合わせて $\sqrt{y^2+1} = s > 0$ である。 □

主張 11.14 ($\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)\left(\sqrt{y^2+1} - y\right) = 1$)**.** $y \in \mathbb{R}$ について（平方根は 主張 11.13 により定まる）

$$
\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)\left(\sqrt{y^2+1} - y\right) = 1
$$

証明. $s := \sqrt{y^2+1} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ と置く。定義 1.4 より $s^2 = y^2 + 1$ である。

$$
\begin{aligned}
(y+s)(s-y) &= ys - y^2 + s^2 - sy && (\because\ \text{分配則}) \\
&= s^2 - y^2 && (\because\ ys = sy \text{ と項の並べ替え}) \\
&= (y^2 + 1) - y^2 && (\because\ s^2 = y^2 + 1) \\
&= 1 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

□

主張 11.15 ($y+\sqrt{y^2+1}>0$)**.** $y\in\mathbb{R}$ について（平方根は 主張 11.13 により定まる）

$$y+\sqrt{y^2+1}>0$$

証明. $s:=\sqrt{y^2+1}$、$p:=y+s,\ q:=s-y\in\mathbb{R}$ と置く。主張 11.14 より $pq=1$ である。

$$\begin{aligned}
p+q&=(y+s)+(s-y) && (\because\ p,\ q\ \text{の置き方})\\
&=2s && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則})\\
&>2\cdot 0 && (\because\ \text{主張 11.13 の}s>0\ \text{の両辺に}2>0\ \text{を掛ける})\\
&=0 && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則})
\end{aligned}$$

背理法で $p>0$ を示す。$p\le 0$ と仮定する。

$$\begin{aligned}
p\le 0\ \wedge\ pq=1&\Longrightarrow p<0 && (\because\ p=0\ \text{なら}\ pq=0\neq 1)\\
p<0\ \wedge\ pq=1&\Longrightarrow q<0 && (\because\ q\ge 0\ \text{なら}\ pq\le 0<1)\\
p<0\ \wedge\ q<0&\Longrightarrow p+q<0 && (\because\ \text{負の実数の和は負})
\end{aligned}$$

これは $p+q>0$ に反する。よって $y+\sqrt{y^2+1}=p>0$ である。 □

定義 11.16 (arcsinh)**.** $y\in\mathbb{R}$ について、主張 11.15 より $y+\sqrt{y^2+1}\in\mathbb{R}_{>0}$ なので、定義 12.21 の実対数を使い

$$\operatorname{arcsinh}(y):=\log\left(y+\sqrt{y^2+1}\right)\in\mathbb{R}$$

と定める。これにより写像 $\operatorname{arcsinh}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ が定まる。$\mathbb{R}$ を使うのは、実対数と平方根の値が実数だからである。

主張 11.17 ($\sinh(\operatorname{arcsinh}(y))=y$)**.** 定義 11.16 の arcsinh と 定義 3.19 の sinh について、$y\in\mathbb{R}$ なら

$$\sinh(\operatorname{arcsinh}(y))=y$$

証明. 準備。$s:=\sqrt{y^2+1}\in\mathbb{R}_{\ge 0}$（$s^2=y^2+1$）、$u:=\operatorname{arcsinh}(y)=\log(y+s)\in\mathbb{R}$ と置く。主張 11.14 より $(y+s)(s-y)=1$ である。

$$\begin{aligned}
\exp(u)&=\exp(\log(y+s)) && (\because\ u\ \text{の置き方})\\
&=y+s && (\because\ \text{定義 12.21 の}\exp(\log w)=w\text{。}y+s>0\ \text{は 主張 11.15})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\exp(-u)&=\exp(-u)\cdot 1 && (\because\ 1\ \text{は乗法の単位元})\\
&=\exp(-u)\left((y+s)(s-y)\right) && (\because\ \text{主張 11.14})\\
&=\left(\exp(-u)\,(y+s)\right)(s-y) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の乗法の結合律})\\
&=\left(\exp(-u)\exp(u)\right)(s-y) && (\because\ \exp(u)=y+s)\\
&=\exp((-u)+u)\,(s-y) && (\because\ \text{主張 3.13})\\
&=\exp(0)\,(s-y) && (\because\ (-u)+u=0)\\
&=s-y && (\because\ \text{主張 3.14})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sinh(\operatorname{arcsinh}(y))&=\sinh u && (\because\ u\ \text{の置き方})\\
&=\frac{\exp(u)-\exp(-u)}{2} && (\because\ \sinh\ \text{の定義。定義 3.19})\\
&=\frac{(y+s)-(s-y)}{2} && (\because\ \text{上の二つの鎖})\\
&=\frac{2y}{2} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則})\\
&=y && (\because\ \text{約分})
\end{aligned}$$

□

主張 11.18 ($\sinh u = y \iff u = \operatorname{arcsinh}(y)$)**.** 定義 11.16 の arcsinh と 定義 3.19 の sinh について、$u, y \in \mathbb{R}$ なら

$$\sinh u = y \iff u = \operatorname{arcsinh}(y)$$

証明. 両方向を別々に示すので、ここは一続きの式にしない。

$$\begin{aligned} u = \operatorname{arcsinh}(y) &\Longrightarrow \sinh u = \sinh(\operatorname{arcsinh}(y)) && (\because \text{ 等しい実数の } \sinh \text{ は等しい}) \\ &\Longrightarrow \sinh u = y && (\because \text{ 主張 11.17}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sinh u = y &\Longrightarrow \sinh u = \sinh(\operatorname{arcsinh}(y)) && (\because \text{ 主張 11.17}) \\ &\Longrightarrow u = \operatorname{arcsinh}(y) && (\because \text{ 主張 11.10}) \end{aligned}$$

□

主張 11.19 ($\operatorname{arcsinh}'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}$)**.** 定義 11.16 の $\operatorname{arcsinh} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ は微分可能で、$y \in \mathbb{R}$ について

$$\operatorname{arcsinh}'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}$$

右辺の分母は 主張 11.13 より正である。$\mathbb{R}$ を使うのは、微分が実数の極限で定まるからである（注意 11.1 の微分の公式）。

証明. 準備。$r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0},\ r(y) := y^2 + 1$、$s : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0},\ s(y) := \sqrt{r(y)}$、$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0},\ p(y) := y + s(y)$ と置く（値が正であることは 主張 11.13 と 主張 11.15 による）。定義 11.16 より $\operatorname{arcsinh} = \log \circ p$ である。

$$\begin{aligned} r'(y) &= (\mathrm{id} \cdot \mathrm{id})'(y) + 0 && (\because\ r = \mathrm{id} \cdot \mathrm{id} + 1 \text{ に微分の公式の和と定数関数}) \\ &= 1 \cdot y + y \cdot 1 && (\because \text{ 微分の公式の積と恒等関数の導関数1}) \\ &= 2y && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ s'(y) &= (\sqrt{\ })'(r(y)) \cdot r'(y) && (\because \text{ 微分の公式の合成}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{r(y)}} \cdot r'(y) && (\because \text{ 微分の公式の平方根。} r(y) > 0) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y^2+1}} \cdot 2y && (\because\ r \text{ の置き方と、上の} r' \text{ の鎖}) \\ &= \frac{y}{\sqrt{y^2+1}} && (\because \text{ 約分}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{arcsinh}'(y) &= \log'(p(y)) \cdot p'(y) && (\because \text{ 微分の公式の合成。} p(y) > 0) \\ &= \frac{1}{y + \sqrt{y^2+1}} \cdot p'(y) && (\because \text{ 微分の公式の} \log'(w) = \tfrac{1}{w}) \\ &= \frac{1}{y + \sqrt{y^2+1}} \cdot \big(1 + s'(y)\big) && (\because\ p = \mathrm{id} + s \text{ に微分の公式の和と恒等関数の導関数1}) \\ &= \frac{1}{y + \sqrt{y^2+1}} \cdot \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2+1}}\right) && (\because \text{ 上の} s'(y)) \\ &= \frac{1}{y + \sqrt{y^2+1}} \cdot \frac{\sqrt{y^2+1} + y}{\sqrt{y^2+1}} && (\because \text{ 通分。主張 11.13}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{y^2+1}} && (\because \text{ 約分。主張 11.15}) \end{aligned}$$

□

主張 11.20 ($\cosh x \geq 1$)**.** 定義 3.19 の $x \in \mathbb{R}$ について $\cosh x \geq 1$。
$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明. 実数の平方は非負なので $\sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \geq 0$ である。

$$\begin{aligned}
\sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) \geq 0 &\Longrightarrow 2\sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) \geq 2 \cdot 0 && (\because \text{ 両辺に} 2 > 0 \text{ を掛ける}) \\
&\Longrightarrow 1 + 2\sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) \geq 1 + 2 \cdot 0 && (\because \text{ 両辺に} 1 \text{ を加える})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cosh x &= 1 + 2\sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) && (\because \text{ 主張 } 11.6) \\
&\geq 1 + 2 \cdot 0 && (\because \text{ 上の含意の鎖}) \\
&= 1 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

□

主張 11.21 (cosh は$\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上で単調増加)**.** 定義 3.19 の $u, t \in \mathbb{R}$ が $0 \leq u \leq t$ を満たすなら $\cosh u \leq \cosh t$。
$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

証明. 準備。$a := \frac{t+u}{2},\ b := \frac{t-u}{2} \in \mathbb{R}$ と置く。$a + b = t$、$a - b = u$ であり、$t + u \geq 0$・$t - u \geq 0$ より $a \geq 0$・$b \geq 0$ である。$c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について $\sinh c \geq 0$ である。実際 $c = 0$ なら 主張 11.8 より $\sinh c = 0$、$c > 0$ なら 主張 3.21 (3) より $\sinh c > 0$。

$$\begin{aligned}
a \geq 0 \ \wedge\ b \geq 0 &\Longrightarrow \sinh a \geq 0 \ \wedge\ \sinh b \geq 0 && (\because \text{ 準備}) \\
&\Longrightarrow \sinh a \sinh b \geq 0 && (\because \text{ 非負の実数の積は非負}) \\
&\Longrightarrow 2\sinh a \sinh b \geq 0 && (\because \text{ 両辺に} 2 > 0 \text{ を掛ける})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cosh t - \cosh u &= \cosh(a+b) - \cosh(a-b) && (\because\ a+b=t,\ a-b=u) \\
&= (\cosh a \cosh b + \sinh a \sinh b) - (\cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b) && (\because \text{ 主張 } 11.4 \text{ の複号 } \pm \text{ を } 1 \text{ 箇所ずつ}) \\
&= 2\sinh a \sinh b && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\geq 0 && (\because \text{ 上の含意の鎖})
\end{aligned}$$

$$\cosh t - \cosh u \geq 0 \Longrightarrow \cosh u \leq \cosh t \quad (\because \text{ 両辺に} \cosh u \text{ を加える})$$

□

主張 11.22 ($t \leq \sinh t \quad (t \geq 0)$)**.** 定義 3.19 の $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について $t \leq \sinh t$。$\mathbb{R}$ を使うのは、証明で区間 $[0, t]$ 上の積分を使うからである（注意 11.1 の (R3)(R4)）。

証明. $t = 0$ なら 主張 11.8 より $\sinh t = 0 = t$。以下 $t > 0$ とする。主張 11.11 より sinh は微分可能で $\sinh' = \cosh$、cosh は微分の公式（和・定数倍・合成と $\exp' = \exp$）より微分可能なので連続である。

$$\begin{aligned}
t &= t - 0 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \int_0^t 1\, du && (\because \text{ (R4) を} F(u) = u \text{ に。微分の公式で} F' = 1) \\
&\leq \int_0^t \cosh u\, du && (\because \text{ (R3) の単調性と、} u \in [0,t] \text{ で} 1 \leq \cosh u \text{。主張 } 11.20) \\
&= \sinh t - \sinh 0 && (\because \text{ (R4) を} F = \sinh \text{ に。主張 } 11.11) \\
&= \sinh t - 0 && (\because \text{ 主張 } 11.8) \\
&= \sinh t && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

□

主張 11.23 ($\sinh t \leq t\cosh t \quad (t \geq 0)$)**.** 定義 3.19 の $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について $\sinh t \leq t\cosh t$。$\mathbb{R}$ を使うのは、証明で区間 $[0,t]$ 上の積分を使うからである（注意 11.1 の (R3)(R4)）。

証明. $t = 0$ なら 主張 11.8 より $\sinh t = 0 = t\cosh t$。以下 $t > 0$ とする。主張 11.22 の証明と同じく cosh は連続である。

$$\begin{aligned}
\sinh t &= \sinh t - 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \sinh t - \sinh 0 && (\because\ \text{主張 11.8}) \\
&= \int_0^t \cosh u\, du && (\because\ \text{(R4) を} F = \sinh \text{ に。主張 11.11}) \\
&\leq \int_0^t \cosh t\, du && (\because\ \text{(R3) の単調性と、} u \in [0,t] \text{ で} \cosh u \leq \cosh t\text{。主張 11.21}) \\
&= t\cosh t - 0 \cdot \cosh t && (\because\ \text{(R4) を} F(u) = u\cosh t \text{ に。微分の公式で} F' = \cosh t) \\
&= t\cosh t && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

□

主張 11.24 ($\sin 0 = 0$)**.** 定義 1.38 の sin について $\sin 0 = 0$。

証明. $y_0 := \sin 0 \in [-1,1]$ とおく。定義 1.38 より $\arcsin(y_0) = 0$ である。$y_0 > 0$ と仮定すると $-y_0 \in [-1,0)$ であり、

$$\begin{aligned}
\arcsin(-y_0) &= -\arcsin(-(-y_0)) && (\because\ \text{定義 1.36 の第二の式。}\ -1 \leq -y_0 < 0) \\
&= -\arcsin(y_0) && (\because\ -(-y_0) = y_0) \\
&= -0 && (\because\ \arcsin(y_0) = 0) \\
&= 0
\end{aligned}$$

となる。一方 $-y_0 < y_0$ なので 主張 1.37 の狭義単調増加より $\arcsin(-y_0) < \arcsin(y_0) = 0$ であり、矛盾する。$y_0 < 0$ と仮定すると $y_0 \in [-1,0)$ であり、

$$\begin{aligned}
\arcsin(-y_0) &= -(-\arcsin(-y_0)) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= -\arcsin(y_0) && (\because\ \text{定義 1.36 の第二の式。}\ -1 \leq y_0 < 0) \\
&= -0 && (\because\ \arcsin(y_0) = 0) \\
&= 0
\end{aligned}$$

となる。一方 $y_0 < -y_0$ なので 主張 1.37 の狭義単調増加より $0 = \arcsin(y_0) < \arcsin(-y_0)$ であり、矛盾する。よって $y_0 = 0$、すなわち $\sin 0 = 0$ である。 □

主張 11.25 ($\cos 0 = 1$)**.** 定義 1.41 の cos について $\cos 0 = 1$。

証明.

$$\begin{aligned}
\cos 0 &= \sqrt{1 - (\sin 0)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \text{定義 1.41}) \\
&= \sqrt{1 - 0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \text{主張 11.24}) \\
&= \sqrt{1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= 1 && (\because\ 1 \geq 0 \text{ かつ } 1^2 = 1 \text{ なので、定義 1.4 のただ一つの元は 1})
\end{aligned}$$

□

主張 11.26 ($\cos v \leq 1$)**.** 定義 1.41 の cos について、$v \in [-\pi/2, \pi/2]$ ならば $\cos v \leq 1$。

証明. $c := \cos v \in \mathbb{R}$ とおく。定義 1.41 と 定義 1.4 より $c \geq 0$ であり、

$$\begin{aligned} c^2 &= \left(\sqrt{1-(\sin v)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 && (\because \text{ 定義 1.41}) \\ &= 1-(\sin v)^2 && (\because \text{ 定義 1.4}) \\ &\leq 1 && (\because\ (\sin v)^2 \geq 0) \end{aligned}$$

である。$1 < c$ と仮定すると $c > 1 > 0$ であり、

$$\begin{aligned} c^2 &= c \cdot c \\ &> 1 \cdot c \quad (\because\ 1 < c \text{ の両辺に } c > 0 \text{ を掛ける}) \\ &> 1 \cdot 1 \quad (\because\ 1 < c \text{ の両辺に } 1 > 0 \text{ を掛ける}) \\ &= 1 \end{aligned}$$

となって $c^2 \leq 1$ に反する。よって $c \leq 1$ である。 □

主張 11.27 ($t - \sin t \geq 0 \quad (0 \leq t \leq \pi/2)$)**.** 定義 1.38 の sin について、$t \in [0, \pi/2]$ ならば $t - \sin t \geq 0$。$\mathbb{R}$ を使うのは、証明で区間 $[0,t]$ 上の積分を使うからである（注意 11.1 の (R3)(R4)）。

証明. $t = 0$ なら 主張 11.24 より $t - \sin t = 0 - 0 = 0$。以下 $t > 0$ とする。$[0,t] \subset [-\pi/2, \pi/2]$ なので、注意 11.1 の微分の公式と正弦・余弦の導関数より $F(u) := u - \sin u$ は $[0,t]$ 上微分可能で $F'(u) = 1 - \cos u$ であり、cos は微分可能なので F' は連続である。

$$\begin{aligned} t - \sin t &= (t - \sin t) - (0 - \sin 0) && (\because \text{ 主張 11.24 より } 0 - \sin 0 = 0) \\ &= \int_0^t (1 - \cos u)\, du && (\because \text{ (R4) を } F \text{ に}) \\ &\geq \int_0^t 0\, du && (\because \text{ (R3) の単調性と、} u \in [0,t] \text{ で } 1 - \cos u \geq 0\text{。主張 11.26}) \\ &= 0 - 0 && (\because \text{ (R4) を定数関数 0 に。微分の公式で導関数は 0}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

主張 11.28 ($\cos t - 1 + \frac{t^2}{2} \geq 0 \quad (0 \leq t \leq \pi/2)$)**.** 定義 1.41 の cos について、$t \in [0, \pi/2]$ ならば $\cos t - 1 + \frac{t^2}{2} \geq 0$。$\mathbb{R}$ を使うのは、証明で区間 $[0,t]$ 上の積分を使うからである（注意 11.1 の (R3)(R4)）。

証明. $t = 0$ なら 主張 11.25 より $\cos t - 1 + \frac{t^2}{2} = 1 - 1 + 0 = 0$。以下 $t > 0$ とする。$[0,t] \subset [-\pi/2, \pi/2]$ なので、注意 11.1 の微分の公式と正弦・余弦の導関数より $G(u) := \cos u - 1 + \frac{u^2}{2}$ は $[0,t]$ 上微分可能で $G'(u) = -\sin u + u = u - \sin u$ であり、sin は微分可能なので G' は連続である。

$$\begin{aligned} \cos t - 1 + \frac{t^2}{2} &= \left(\cos t - 1 + \frac{t^2}{2}\right) - \left(\cos 0 - 1 + \frac{0^2}{2}\right) && (\because \text{ 主張 11.25 より } \cos 0 - 1 + \tfrac{0^2}{2} = 0) \\ &= \int_0^t (u - \sin u)\, du && (\because \text{ (R4) を } G \text{ に}) \\ &\geq \int_0^t 0\, du && (\because \text{ (R3) の単調性と、} u \in [0,t] \text{ で } u - \sin u \geq 0\text{。主張 11.27}) \\ &= 0 - 0 && (\because \text{ (R4) を定数関数 0 に。微分の公式で導関数は 0}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

主張 11.29 ($\sin t - t + \frac{t^3}{6} \geq 0 \quad (0 \leq t \leq \pi/2)$)**.** 定義 1.38 の sin について、$t \in [0, \pi/2]$ ならば $\sin t - t + \frac{t^3}{6} \geq 0$。$\mathbb{R}$ を使うのは、証明で区間 $[0,t]$ 上の積分を使うからである（注意 11.1 の (R3)(R4)）。

証明. $t = 0$ なら 主張 11.24 より $\sin t - t + \frac{t^3}{6} = 0 - 0 + 0 = 0$。以下 $t > 0$ とする。$[0,t] \subset [-\pi/2, \pi/2]$ なので、注意 11.1 の微分の公式と正弦・余弦の導関数より $H(v) := \sin v - v + \frac{v^3}{6}$ は $[0,t]$ 上微分可能で $H'(v) = \cos v - 1 + \frac{v^2}{2}$ であり、cos は微分可能なので H' は連続である。

$$
\begin{aligned}
\sin t - t + \frac{t^3}{6} &= \left(\sin t - t + \frac{t^3}{6}\right) - \left(\sin 0 - 0 + \frac{0^3}{6}\right) && (\because \text{ 主張 11.24 より } \sin 0 - 0 + \tfrac{0^3}{6} = 0) \\
&= \int_0^t \left(\cos v - 1 + \frac{v^2}{2}\right) dv && (\because \text{ (R4) を } H \text{ に}) \\
&\geq \int_0^t 0 \, dv && (\because \text{ (R3) の単調性と、} v \in [0,t] \text{ で } \cos v - 1 + \tfrac{v^2}{2} \geq 0\text{。主張 11.28}) \\
&= 0 - 0 && (\because \text{ (R4) を定数関数 0 に。微分の公式で導関数は 0}) \\
&= 0
\end{aligned}
$$

□

主張 11.30 ($9.8696 \leq \pi^2 \leq 9.8697$)**.** 注意 11.1 の円周率の数値の評価の下で、$9.8696 \leq \pi^2 \leq 9.8697$（$\pi \in \mathbb{R}$）。

証明. 円周率の数値の評価より $0 < 3.141592 \leq \pi \leq 3.141593$ である。

$$
\begin{aligned}
\pi^2 &= \pi \cdot \pi \\
&\geq 3.141592 \cdot \pi && (\because \ 3.141592 \leq \pi \text{ の両辺に } \pi > 0 \text{ を掛ける}) \\
&\geq 3.141592 \cdot 3.141592 && (\because \ 3.141592 \leq \pi \text{ の両辺に } 3.141592 > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= 9.869600294464 && (\because \ \mathbb{Q} \text{ の積}) \\
&\geq 9.8696 && (\because \ \mathbb{Q} \text{ の大小比較})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\pi^2 &= \pi \cdot \pi \\
&\leq 3.141593 \cdot \pi && (\because \ \pi \leq 3.141593 \text{ の両辺に } \pi > 0 \text{ を掛ける}) \\
&\leq 3.141593 \cdot 3.141593 && (\because \ \pi \leq 3.141593 \text{ の両辺に } 3.141593 > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= 9.869606577649 && (\because \ \mathbb{Q} \text{ の積}) \\
&\leq 9.8697 && (\because \ \mathbb{Q} \text{ の大小比較})
\end{aligned}
$$

□

定義 11.31 ($c_0 := 1 - \frac{\pi^2}{24}$)**.** $c_0 := 1 - \dfrac{\pi^2}{24} \in \mathbb{R}$ と定める（$\mathbb{R}$ を使うのは π が実数だからである）。

主張 11.32 ($0.5887 \leq c_0 \leq 0.5888$)**.** 定義 11.31 の c_0 について $0.5887 \leq c_0 \leq 0.5888$。

証明. 主張 11.30 の $9.8696 \leq \pi^2 \leq 9.8697$ から、次を得る。

$$\frac{9.8696}{24} \leq \frac{\pi^2}{24} \leq \frac{9.8697}{24} \qquad (\because \text{ 各辺を } 24 > 0 \text{ で割る})$$

$$-\frac{9.8697}{24} \leq -\frac{\pi^2}{24} \leq -\frac{9.8696}{24} \qquad (\because \text{ 各辺に } -1 < 0 \text{ を掛けると向きが反転する})$$

$$1 - \frac{9.8697}{24} \leq 1 - \frac{\pi^2}{24} \leq 1 - \frac{9.8696}{24} \qquad (\because \text{ 各辺に } 1 \text{ を足す})$$

$$
\begin{aligned}
c_0 &= 1 - \frac{\pi^2}{24} && (\because \text{ 定義 11.31}) \\
&\geq 1 - \frac{9.8697}{24} && (\because \text{ 上の三つ目の不等式の左側}) \\
&= \frac{14.1303}{24} && (\because \mathbb{Q} \text{ の四則}) \\
&\geq \frac{14.1288}{24} && (\because \ 14.1288 \leq 14.1303 \text{ の両辺を } 24 > 0 \text{ で割る}) \\
&= 0.5887 && (\because \mathbb{Q} \text{ の四則。} 0.5887 \cdot 24 = 14.1288)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
c_0 &= 1 - \frac{\pi^2}{24} && (\because \text{ 定義 11.31}) \\
&\leq 1 - \frac{9.8696}{24} && (\because \text{ 上の三つ目の不等式の右側}) \\
&= \frac{14.1304}{24} && (\because \mathbb{Q} \text{ の四則}) \\
&\leq \frac{14.1312}{24} && (\because \ 14.1304 \leq 14.1312 \text{ の両辺を } 24 > 0 \text{ で割る}) \\
&= 0.5888 && (\because \mathbb{Q} \text{ の四則。} 0.5888 \cdot 24 = 14.1312)
\end{aligned}
$$

□

主張 11.33 ($\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2} \leq \frac{\theta^3}{48} \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$)**.** 定義 1.38 の sin について、$\theta \in [0, \pi]$ ならば $\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2} \leq \frac{\theta^3}{48}$。

証明. $0 \leq \theta \leq \pi$ の各辺を $2 > 0$ で割って $\frac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ である。

$$
\begin{aligned}
\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2} &= \frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^3 - \left(\sin\frac{\theta}{2} - \frac{\theta}{2} + \frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^3\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\leq \frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^3 - 0 && (\because \text{ 主張 11.29 を } t = \tfrac{\theta}{2} \text{ に}) \\
&= \frac{\theta^3}{48} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

□

主張 11.34 ($c_0\frac{\theta}{2} \leq \sin\frac{\theta}{2} \leq \frac{\theta}{2} \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$)**.** 定義 1.38 の sin と 定義 11.31 の c_0 について、$\theta \in [0, \pi]$ ならば $c_0\frac{\theta}{2} \leq \sin\frac{\theta}{2} \leq \frac{\theta}{2}$。

証明. $0 \leq \theta \leq \pi$ の各辺を $2 > 0$ で割って $0 \leq \frac{\theta}{2} \leq \frac{\pi}{2}$ である。これから次を得る。

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{\theta}{2}\right)^2 &= \frac{\theta}{2} \cdot \frac{\theta}{2} \\
&\leq \frac{\theta}{2} \cdot \frac{\pi}{2} && (\because \ \tfrac{\theta}{2} \leq \tfrac{\pi}{2} \text{ の両辺に } \tfrac{\theta}{2} \geq 0 \text{ を掛ける}) \\
&\leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2} && (\because \ \tfrac{\theta}{2} \leq \tfrac{\pi}{2} \text{ の両辺に } \tfrac{\pi}{2} > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{\pi^2}{4} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

これを使って次を得る。

$$
-\frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^2 \geq -\frac{1}{6} \cdot \frac{\pi^2}{4} \qquad (\because \ (\tfrac{\theta}{2})^2 \leq \tfrac{\pi^2}{4} \text{ の両辺に } -\tfrac{1}{6} < 0 \text{ を掛けると向きが反転する})
$$

$$1-\frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^2 \geq 1-\frac{1}{6}\cdot\frac{\pi^2}{4} \qquad (\because \text{直前の不等式の両辺に } 1 \text{ を足す})$$

上からの評価は次のとおりである。

$$\begin{aligned}
\sin\frac{\theta}{2} &= \frac{\theta}{2}-\left(\frac{\theta}{2}-\sin\frac{\theta}{2}\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\leq \frac{\theta}{2}-0 && (\because \text{主張 } 11.27 \text{ を } t=\tfrac{\theta}{2} \text{ に}) \\
&= \frac{\theta}{2}
\end{aligned}$$

下からの評価は次のとおりである。

$$\begin{aligned}
\sin\frac{\theta}{2} &= \left(\frac{\theta}{2}-\frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^3\right)+\left(\sin\frac{\theta}{2}-\frac{\theta}{2}+\frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^3\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\geq \frac{\theta}{2}-\frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^3+0 && (\because \text{主張 } 11.29 \text{ を } t=\tfrac{\theta}{2} \text{ に}) \\
&= \frac{\theta}{2}\left(1-\frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^2\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\
&\geq \frac{\theta}{2}\left(1-\frac{1}{6}\cdot\frac{\pi^2}{4}\right) && (\because \text{上の } 1-\tfrac{1}{6}(\tfrac{\theta}{2})^2 \geq 1-\tfrac{1}{6}\cdot\tfrac{\pi^2}{4} \text{ の両辺に } \tfrac{\theta}{2}\geq 0 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{\theta}{2}\left(1-\frac{\pi^2}{24}\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= c_0\frac{\theta}{2} && (\because \text{定義 } 11.31 \text{ と } \mathbb{R} \text{ の積の可換性})
\end{aligned}$$

□

主張 11.35 ($\log(ab)=\log a+\log b$)**.** 定義 12.21 の $\log:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}$ について、$a,b\in\mathbb{R}_{>0}$ なら $ab\in\mathbb{R}_{>0}$ であり

$$\log(ab)=\log a+\log b$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、実対数の値が実数だからである。

証明. 準備。$a>0$ と $b>0$ より、正の数の積は正なので $ab>0$ である。$\log a,\log b\in\mathbb{R}$ である（定義 12.21）。

$$\begin{aligned}
\exp(\log a+\log b) &= \exp(\log a)\exp(\log b) && (\because \text{主張 } 3.13 \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= ab && (\because \text{定義 } 12.21 \text{ の } \exp(\log y)=y \text{ を } 2 \text{ 箇所へ})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\log(ab) &= \log\left(\exp(\log a+\log b)\right) && (\because \text{準備の鎖}) \\
&= \log a+\log b && (\because \text{定義 } 12.21 \text{ の } \log(\exp x)=x)
\end{aligned}$$

□

定義 11.36 (実数の冪)**.** $a\in\mathbb{R}$ と $m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について、冪 $a^m\in\mathbb{R}$ を m についての帰納法で

$$a^0:=1, \qquad a^{m+1}:=a^m a$$

と定める。積は $\mathbb{R}$ の積、1 は $\mathbb{R}$ の乗法の単位元である。定義 1.64 の $\mathbb{C}$ の冪とは別の写像であり、両者を同じものとして使わない。

主張 11.37 ($\log(a^n) = n\log a$)**.** 定義 12.21 の $\log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ と 定義 11.36 の冪について、$a \in \mathbb{R}_{>0}$ と $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ なら $a^n \in \mathbb{R}_{>0}$ であり

$$\log(a^n) = n\log a$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、実対数の値が実数だからである。

証明. n についての帰納法で、$a^n \in \mathbb{R}_{>0}$ と $\log(a^n) = n\log a$ を同時に示す。$n = 1$ のとき

$$\begin{aligned} a^1 &= a^0 a && (\because \text{定義 11.36 の } a^{m+1} := a^m a \text{ を } m = 0 \text{ で}) \\ &= 1 \cdot a && (\because \text{定義 11.36 の } a^0 := 1) \\ &= a && (\because \mathbb{R} \text{ の乗法の単位元}) \end{aligned}$$

なので $a^1 \in \mathbb{R}_{>0}$ であり

$$\begin{aligned} \log(a^1) &= \log a && (\because \text{上の } a^1 = a) \\ &= 1 \cdot \log a && (\because \mathbb{R} \text{ の乗法の単位元}) \end{aligned}$$

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $a^n \in \mathbb{R}_{>0}$ と $\log(a^n) = n\log a$ を仮定する。$a^{n+1} = a^n a$（定義 11.36）は正の数 a^n と a の積なので $a^{n+1} \in \mathbb{R}_{>0}$ であり（主張 11.35）

$$\begin{aligned} \log(a^{n+1}) &= \log(a^n\, a) && (\because \text{定義 11.36 の } a^{n+1} := a^n\, a) \\ &= \log(a^n) + \log a && (\because \text{主張 11.35 を } a^n, a \in \mathbb{R}_{>0} \text{ に}) \\ &= n\log a + \log a && (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= (n+1)\log a && (\because \mathbb{R} \text{ の分配法則}) \end{aligned}$$

□

主張 11.38 ($\log(1+x) \leq x \quad (x \geq 0)$)**.** 定義 12.21 の log について、$x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ なら $1 + x \in \mathbb{R}_{>0}$ であり $\log(1+x) \leq x$。$\mathbb{R}$ を使うのは、実対数の値が実数であり、証明で区間 $[0, x]$ 上の積分を使うからである（注意 11.1 の (R3)(R4) と微分の公式）。

証明. 準備。

$$\begin{aligned} \log(1+0) &= \log 1 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &= \log(\exp 0) && (\because \text{主張 3.14}) \\ &= 0 && (\because \text{定義 12.21 の } \log(\exp x) = x) \end{aligned}$$

$x = 0$ なら $\log(1+x) = \log(1+0) = 0 = x$ である。以下 $x > 0$ とする。$v \in [0, x]$ なら $1 + v \geq 1 > 0$ なので、注意 11.1 の微分の公式（恒等関数・定数関数・和・差・$\log'(w) = \frac{1}{w}$・合成）より $H(v) := v - \log(1+v)$ は $[0, x]$ 上微分可能で、

$$\begin{aligned} H'(v) &= 1 - \log'(1+v) \cdot (0+1) && (\because \text{微分の公式の差・合成・和と、恒等関数の導関数 1、定数関数の導関数 0}) \\ &= 1 - \frac{1}{1+v} \cdot 1 && (\because \text{微分の公式の } \log'(w) = \tfrac{1}{w} \text{。} 1 + v > 0) \\ &= 1 - \frac{1}{1+v} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

であり、H' は微分可能な関数の差と商（分母 $1 + v \neq 0$）なので微分可能、したがって連続である。さらに $v \in [0, x]$ について

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{1+v} &= \frac{(1+v)-1}{1+v} && (\because \text{通分。} 1 + v \neq 0) \\ &= \frac{v}{1+v} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &\geq 0 && (\because v \geq 0 \text{ と } 1 + v > 0) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
x-\log(1+x) &= (x-\log(1+x))-(0-\log(1+0)) && (\because \text{準備の鎖より } 0-\log(1+0)=0)\\
&= \int_0^x \left(1-\frac{1}{1+v}\right) dv && (\because \text{(R4) を } H \text{ に})\\
&\geq \int_0^x 0\, dv && (\because \text{(R3) の単調性と、直前の鎖の各点の評価})\\
&= 0-0 && (\because \text{(R4) を定数関数 } 0 \text{ に。微分の公式で導関数は } 0)\\
&= 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\log(1+x) &= x-(x-\log(1+x)) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&\leq x-0 && (\because \text{直前の鎖})\\
&= x
\end{aligned}
$$

□

主張 11.39 ($2y \leq y+\sqrt{y^2+1} \leq 2y+\frac{1}{2y} \quad (y>0)$)**.** 非負実数の平方根は 定義 1.4 を用いる。$y \in \mathbb{R}_{>0}$ なら

$$
2y \ \leq \ y+\sqrt{y^2+1} \ \leq \ 2y+\frac{1}{2y}
$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、平方根の値が実数だからである。

証明. 準備。$s := \sqrt{y^2+1} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ と置く。主張 11.15 より $y+s>0$、主張 11.14 より $(y+s)(s-y)=1$ である。

$$
\begin{aligned}
s-y &= \frac{(y+s)(s-y)}{y+s} && (\because\ y+s \neq 0 \text{ で約分の逆})\\
&= \frac{1}{y+s} && (\because \text{主張 11.14})
\end{aligned}
$$

下からの評価。

$$
\begin{aligned}
y+s &= 2y+(s-y) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= 2y+\frac{1}{y+s} && (\because \text{準備の鎖})\\
&\geq 2y && (\because\ y+s>0 \text{ より } \tfrac{1}{y+s}>0)
\end{aligned}
$$

上からの評価。下からの評価と $2y>0$ より $y+s \geq 2y>0$ である。

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{y+s} &= 2y \cdot \frac{1}{(y+s)\,2y} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則。} y+s \neq 0,\ 2y \neq 0)\\
&\leq (y+s) \cdot \frac{1}{(y+s)\,2y} && (\because\ 2y \leq y+s \text{ の両辺に正の数 } \tfrac{1}{(y+s)\,2y} \text{ を掛ける})\\
&= \frac{1}{2y} && (\because \text{約分})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
y+s &= 2y+(s-y) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= 2y+\frac{1}{y+s} && (\because \text{準備の鎖})\\
&\leq 2y+\frac{1}{2y} && (\because\ \tfrac{1}{y+s} \leq \tfrac{1}{2y})
\end{aligned}
$$

□

主張 11.40 ($\log(2y) \le \operatorname{arcsinh}(y) \le \log(2y)+\frac{1}{4y^2} \quad (y>0)$)**.** 定義 11.16 の arcsinh と 定義 12.21 の log について、$y \in \mathbb{R}_{>0}$ なら

$$\log(2y) \ \le \ \operatorname{arcsinh}(y) \ \le \ \log(2y) + \frac{1}{4y^2}$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、実対数と平方根の値が実数だからである。

証明. 準備。$s := \sqrt{y^2+1} \in \mathbb{R}_{\ge 0}$ と置く。$2y>0$、$y+s>0$（主張 11.15）、$1+\frac{1}{4y^2}>0$、$2y+\frac{1}{2y}>0$ なので、以下の log の引数はどれも正である。

下からの評価。

$$\begin{aligned}
\operatorname{arcsinh}(y) &= \log(y+s) && (\because \text{ 定義 11.16}) \\
&\ge \log(2y) && (\because \text{ 主張 11.39 の } 2y \le y+s\text{。} 2y<y+s \text{ なら 主張 12.22 の log の狭義単調増加、} 2y=y+s \text{ なら等号})
\end{aligned}$$

上からの評価。

$$\begin{aligned}
\operatorname{arcsinh}(y) &= \log(y+s) && (\because \text{ 定義 11.16}) \\
&\le \log\left(2y+\frac{1}{2y}\right) && (\because \text{ 主張 11.39 の } y+s \le 2y+\tfrac{1}{2y}\text{。狭義なら 主張 12.22 の log の狭義単調増加、等しければ等号}) \\
&= \log\left(2y+2y\cdot\frac{1}{4y^2}\right) && (\because \tfrac{1}{2y}=2y\cdot\tfrac{1}{4y^2}\text{。} \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \log\left(2y\left(1+\frac{1}{4y^2}\right)\right) && (\because \text{ 分配則}) \\
&= \log(2y)+\log\left(1+\frac{1}{4y^2}\right) && (\because \text{ 主張 11.35}) \\
&\le \log(2y)+\frac{1}{4y^2} && (\because \text{ 主張 11.38 を } x=\tfrac{1}{4y^2}\ge 0 \text{ に})
\end{aligned}$$

□

主張 11.41 ($\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} = 2\operatorname{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)$)**.** 非負実数の平方根は 定義 1.4 を、arcsinh は 定義 11.16 を用いる。$\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ なら

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} = 2\operatorname{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、区間 $[0,\pi]$ 上の積分と微分を使うからである（注意 11.1 の (R4) と微分の公式）。

証明. 準備。$\theta \in [0,\pi]$ について $q(\theta) := \dfrac{\theta}{2\delta} \in \mathbb{R}$、$F(\theta) := 2\operatorname{arcsinh}(q(\theta)) \in \mathbb{R}$、$W(\theta) := \sqrt{\delta^2+\theta^2/4} \in \mathbb{R}_{\ge 0}$ と置く。$\delta^2+\theta^2/4 \ge \delta^2 > 0$ と $W(\theta)^2 = \delta^2+\theta^2/4$ より $W(\theta)\ne 0$、したがって $W(\theta)>0$ である。$\frac{W(\theta)}{\delta} \ge 0$ であり

$$\begin{aligned}
\left(\frac{W(\theta)}{\delta}\right)^2 &= \frac{W(\theta)^2}{\delta^2} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \frac{\delta^2+\theta^2/4}{\delta^2} && (\because \text{ 定義 1.4}) \\
&= \left(\frac{\theta}{2\delta}\right)^2+1 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則。} \delta\ne 0) \\
&= q(\theta)^2+1 && (\because q \text{ の置き方})
\end{aligned}$$

なので、主張 1.3 の一意性より $\sqrt{q(\theta)^2+1} = \frac{W(\theta)}{\delta}$ である。同じ一意性と $1\ge 0$、$1^2=1$ より $\sqrt{1}=1$ である。注意 11.1 の微分の公式（定数倍と恒等関数）より q は微分可能で $q'(\theta)=\frac{1}{2\delta}$ である。

$$
\begin{aligned}
F'(\theta) &= 2\operatorname{arcsinh}'(q(\theta))\,q'(\theta) && (\because \text{ 微分の公式の定数倍と合成。主張 11.19 より arcsinh は微分可能})\\
&= 2\cdot\frac{1}{\sqrt{q(\theta)^2+1}}\cdot q'(\theta) && (\because \text{ 主張 11.19})\\
&= 2\cdot\frac{1}{\sqrt{q(\theta)^2+1}}\cdot\frac{1}{2\delta} && (\because\ q'(\theta)=\tfrac{1}{2\delta})\\
&= 2\cdot\frac{1}{W(\theta)/\delta}\cdot\frac{1}{2\delta} && (\because\ \sqrt{q(\theta)^2+1}=\tfrac{W(\theta)}{\delta})\\
&= 2\cdot\frac{\delta}{W(\theta)}\cdot\frac{1}{2\delta} && (\because\ \mathbb{R}\text{ の四則。}W(\theta)\neq 0)\\
&= \frac{1}{W(\theta)} && (\because \text{ 約分})
\end{aligned}
$$

W は平方根と $\mathbb{R}_{>0}$ に値をとる微分可能な関数 $\theta\mapsto\delta^2+\theta^2/4$ の合成なので微分可能で、$F'=\frac{1}{W}$ は分母が 0 でない商なので微分可能、したがって連続である（微分の公式）。

$$
\begin{aligned}
F(0) &= 2\operatorname{arcsinh}(0) && (\because\ q(0)=0)\\
&= 2\log\left(0+\sqrt{0^2+1}\right) && (\because \text{ 定義 11.16})\\
&= 2\log\left(\sqrt{1}\right) && (\because\ \mathbb{R}\text{ の四則})\\
&= 2\log 1 && (\because\ \sqrt{1}=1)\\
&= 2\log(\exp 0) && (\because \text{ 主張 3.14})\\
&= 2\cdot 0 && (\because \text{ 定義 12.21 の } \log(\exp x)=x)\\
&= 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} &= \int_0^\pi F'(\theta)\,d\theta && (\because\ W\text{ の置き方と }F'(\theta)=\tfrac{1}{W(\theta)})\\
&= F(\pi)-F(0) && (\because\ \text{(R4) を } F \text{ に})\\
&= 2\operatorname{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)-F(0) && (\because\ F\text{ と }q\text{ の置き方})\\
&= 2\operatorname{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)-0 && (\because\ F(0)=0)\\
&= 2\operatorname{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)
\end{aligned}
$$

□

主張 11.42 ($2\log\frac{\pi}{\delta}\le\int_0^\pi\frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}}\le 2\log\frac{\pi}{\delta}+\frac{2\delta^2}{\pi^2}$)**.** 非負実数の平方根は 定義 1.4 を、log は定義 12.21 を用いる。$\delta\in\mathbb{R}_{>0}$ なら

$$
2\log\frac{\pi}{\delta}\ \le\ \int_0^\pi\frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}}\ \le\ 2\log\frac{\pi}{\delta}+\frac{2\delta^2}{\pi^2}
$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、区間 $[0,\pi]$ 上の積分と実対数を使うからである。

証明. 準備。注意 11.1 の円周率の数値の評価より $\pi\ge 3.141592>0$ である。$y:=\dfrac{\pi}{2\delta}\in\mathbb{R}_{>0}$ と置くと、$\mathbb{R}$ の四則より $2y=\dfrac{\pi}{\delta}$、$\dfrac{1}{4y^2}=\dfrac{\delta^2}{\pi^2}$ である。

下からの評価。

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} &= 2\,\mathrm{arcsinh}(y) && (\because \text{ 主張 11.41 と } y \text{ の置き方})\\ &\geq 2\log(2y) && (\because \text{ 主張 11.40 の下からの評価に } 2>0 \text{ を掛ける})\\ &= 2\log\frac{\pi}{\delta} && (\because\ 2y=\tfrac{\pi}{\delta})\end{aligned}$$

上からの評価。

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} &= 2\,\mathrm{arcsinh}(y) && (\because \text{ 主張 11.41 と } y \text{ の置き方})\\ &\leq 2\left(\log(2y)+\frac{1}{4y^2}\right) && (\because \text{ 主張 11.40 の上からの評価に } 2>0 \text{ を掛ける})\\ &= 2\left(\log\frac{\pi}{\delta}+\frac{\delta^2}{\pi^2}\right) && (\because\ 2y=\tfrac{\pi}{\delta},\ \tfrac{1}{4y^2}=\tfrac{\delta^2}{\pi^2})\\ &= 2\log\frac{\pi}{\delta}+\frac{2\delta^2}{\pi^2} && (\because \text{ 分配則})\end{aligned}$$

□

定義 11.43 ($w^{3/2} := w\sqrt{w}$)**.** $w \in \mathbb{R}_{>0}$ について、定義 1.4 の平方根を使い

$$w^{3/2} := w\sqrt{w} \in \mathbb{R}_{>0}$$

と定める。値が正であるのは、$\sqrt{w} \geq 0$ と $(\sqrt{w})^2 = w > 0$ より $\sqrt{w} > 0$ であり、正の数の積は正だからである。$\mathbb{R}$ を使うのは、平方根の値が実数だからである。

主張 11.44 ($\int_0^\pi \frac{d\theta}{(\delta^2+a^2\theta^2/4)^{3/2}} \leq \frac{2}{a\,\delta^2}$)**.** 定義 11.43 の 3/2 乗について、$\delta, a \in \mathbb{R}_{>0}$ なら

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{\left(\delta^2+a^2\theta^2/4\right)^{3/2}} \ \leq\ \frac{2}{a\,\delta^2}$$

$\mathbb{R}$ を使うのは、区間 $[0,\pi]$ 上の積分と微分を使うからである（注意 11.1 の (R4) と微分の公式）。

証明. 準備。$\theta \in [0,\pi]$ について $w(\theta) := \delta^2 + a^2\theta^2/4$、$r(\theta) := \sqrt{w(\theta)}$、$G(\theta) := \dfrac{\theta}{\delta^2\, r(\theta)}$ と置く。$w(\theta) \geq \delta^2 > 0$ なので、定義 11.43 と同じ理由で $r(\theta) > 0$ であり、$r(\theta)^2 = w(\theta)$（定義 1.4）である。注意 11.1 の微分の公式（定数倍・積・和・平方根・合成・商）より w, r, G は微分可能で、

$$\begin{aligned}w'(\theta) &= 0 + \frac{a^2}{4}\,(1\cdot\theta+\theta\cdot 1) && (\because \text{ 微分の公式の和・定数倍・積と、定数関数の導関数 0、恒等関数の導関数 1})\\ &= \frac{a^2\theta}{2} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r'(\theta) &= \frac{1}{2\sqrt{w(\theta)}}\,w'(\theta) && (\because \text{ 微分の公式の平方根と合成。} w(\theta)>0)\\ &= \frac{1}{2\,r(\theta)}\cdot\frac{a^2\theta}{2} && (\because\ r \text{ の置き方と } w'(\theta)=\tfrac{a^2\theta}{2})\\ &= \frac{a^2\theta}{4\,r(\theta)} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則})\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
G'(\theta) &= \frac{1 \cdot \delta^2 r(\theta) - \theta \cdot \delta^2 r'(\theta)}{\left(\delta^2 r(\theta)\right)^2} && (\because \text{ 微分の公式の商と定数倍。} \delta^2 r(\theta) \neq 0) \\
&= \frac{\delta^2 r(\theta) - \theta \cdot \delta^2 \dfrac{a^2\theta}{4\, r(\theta)}}{\left(\delta^2 r(\theta)\right)^2} && (\because \ r'(\theta) = \tfrac{a^2\theta}{4r(\theta)}) \\
&= \frac{\delta^2 r(\theta) - \delta^2 \dfrac{a^2\theta^2}{4\, r(\theta)}}{\delta^4\, r(\theta)^2} && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \frac{\delta^2 r(\theta)^2 - \delta^2 \dfrac{a^2\theta^2}{4}}{\delta^4\, r(\theta)^3} && (\because \text{ 分子と分母に } r(\theta) \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{\delta^2 \left(r(\theta)^2 - \dfrac{a^2\theta^2}{4} \right)}{\delta^4\, r(\theta)^3} && (\because \text{ 分配則}) \\
&= \frac{\delta^2 \cdot \delta^2}{\delta^4\, r(\theta)^3} && (\because \ r(\theta)^2 = w(\theta) = \delta^2 + \tfrac{a^2\theta^2}{4}) \\
&= \frac{1}{r(\theta)^2\, r(\theta)} && (\because \text{ 約分}) \\
&= \frac{1}{w(\theta)\sqrt{w(\theta)}} && (\because \ r(\theta)^2 = w(\theta) \text{ と } r \text{ の置き方}) \\
&= \frac{1}{w(\theta)^{3/2}} && (\because \text{ 定義 11.43})
\end{aligned}
$$

G' は分母が 0 でない微分可能な関数の商なので微分可能、したがって連続である（微分の公式）。注意 11.1 の円周率の数値の評価より $\pi > 0$、したがって $\frac{a\pi}{2} > 0$ である。$r(\pi) \leq \frac{a\pi}{2}$ と仮定すると

$$
\begin{aligned}
r(\pi)^2 &= r(\pi) \cdot r(\pi) \\
&\leq \frac{a\pi}{2} \cdot r(\pi) && (\because \text{ 仮定の両辺に } r(\pi) > 0 \text{ を掛ける}) \\
&\leq \frac{a\pi}{2} \cdot \frac{a\pi}{2} && (\because \text{ 仮定の両辺に } \tfrac{a\pi}{2} > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{a^2\pi^2}{4} \\
&< \delta^2 + \frac{a^2\pi^2}{4} && (\because \ \delta^2 > 0) \\
&= r(\pi)^2 && (\because \ r(\pi)^2 = w(\pi))
\end{aligned}
$$

となり矛盾する。よって $r(\pi) > \frac{a\pi}{2} > 0$ である。

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{r(\pi)} &= \frac{a\pi}{2} \cdot \frac{2}{a\pi\, r(\pi)} && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則。} a\pi \neq 0,\ r(\pi) \neq 0) \\
&\leq r(\pi) \cdot \frac{2}{a\pi\, r(\pi)} && (\because \ \tfrac{a\pi}{2} < r(\pi) \text{ の両辺に正の数 } \tfrac{2}{a\pi\, r(\pi)} \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{2}{a\pi} && (\because \text{ 約分})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{(\delta^2 + a^2\theta^2/4)^{3/2}} &= \int_0^{\pi} G'(\theta)\, d\theta && (\because\ w \text{ の置き方と } G'(\theta) = \tfrac{1}{w(\theta)^{3/2}}) \\
&= G(\pi) - G(0) && (\because\ \text{(R4) を } G \text{ に}) \\
&= \frac{\pi}{\delta^2\, r(\pi)} - \frac{0}{\delta^2\, r(0)} && (\because\ G \text{ の置き方}) \\
&= \frac{\pi}{\delta^2} \cdot \frac{1}{r(\pi)} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\le \frac{\pi}{\delta^2} \cdot \frac{2}{a\pi} && (\because\ \tfrac{1}{r(\pi)} \le \tfrac{2}{a\pi} \text{ の両辺に } \tfrac{\pi}{\delta^2} > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{2}{a\,\delta^2} && (\because\ \text{約分})
\end{aligned}
$$

□

主張 11.45 ($u^2 \le v^2 \Longrightarrow u \le v \quad (u, v \in \mathbb{R}_{\ge 0})$)**.** $u, v \in \mathbb{R}_{\ge 0}$ が $u^2 \le v^2$ を満たすならば $u \le v$。

証明. $v < u$ と仮定する。$0 \le v < u$ なので $u > 0$ である。

$$
\begin{aligned}
v^2 &= v \cdot v \\
&\le v \cdot u \quad (\because\ \text{仮定 } v < u \text{ の両辺に } v \ge 0 \text{ を掛ける}) \\
&< u \cdot u \quad (\because\ \text{仮定 } v < u \text{ の両辺に } u > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= u^2
\end{aligned}
$$

となり、$u^2 \le v^2$ に矛盾する。よって $u \le v$ である。 □

定義 11.46 ($B := \frac{\pi^2}{12\, c_0(1+c_0)}$)**.** 定義 11.31 の c_0 を用いて

$$B := \frac{\pi^2}{12\, c_0\,(1 + c_0)} \in \mathbb{R}$$

と定める。主張 11.32 より $c_0 \ge 0.5887 > 0$、したがって $1 + c_0 > 0$ で、分母 $12\, c_0(1 + c_0)$ は正の実数の積なので 0 でない。$\mathbb{R}$ を使うのは π が実数だからである。

主張 11.47 ($B \le 0.88$)**.** 定義 11.46 の B について $B \le 0.88$。

証明. 準備。主張 11.32 の $c_0 \ge 0.5887$ の両辺に 1 を足して $1 + c_0 \ge 1.5887 > 0$ である。これらから次を得る。

$$
\begin{aligned}
12\, c_0\,(1 + c_0) &\ge 12 \cdot 0.5887 \cdot (1 + c_0) && (\because\ c_0 \ge 0.5887 \text{ の両辺に } 12\,(1 + c_0) > 0 \text{ を掛ける}) \\
&\ge 12 \cdot 0.5887 \cdot 1.5887 && (\because\ 1 + c_0 \ge 1.5887 \text{ の両辺に } 12 \cdot 0.5887 > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= 11.22321228 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の四則}) \\
&\ge 11.22 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の大小比較})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{12\, c_0\,(1 + c_0)} &= \frac{11.22}{12\, c_0\,(1 + c_0)} \cdot \frac{1}{11.22} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\le \frac{12\, c_0\,(1 + c_0)}{12\, c_0\,(1 + c_0)} \cdot \frac{1}{11.22} && (\because\ 11.22 \le 12\, c_0(1 + c_0) \text{ の両辺に } \tfrac{1}{12c_0(1+c_0)\cdot 11.22} > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{1}{11.22} && (\because\ \text{約分})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
B &= \frac{\pi^2}{12\,c_0\,(1+c_0)} && (\because \text{ 定義 11.46})\\
&\le \frac{9.8697}{12\,c_0\,(1+c_0)} && (\because \text{ 主張 11.30 の } \pi^2 \le 9.8697 \text{ の両辺を } 12\,c_0(1+c_0) > 0 \text{ で割る})\\
&\le \frac{9.8697}{11.22} && (\because \text{ 準備の } \tfrac{1}{12c_0(1+c_0)} \le \tfrac{1}{11.22} \text{ の両辺に } 9.8697 > 0 \text{ を掛ける})\\
&= \frac{98697}{112200} && (\because \mathbb{Q} \text{ の四則})\\
&\le \frac{98736}{112200} && (\because \text{ } 98697 \le 98736 \text{ の両辺を } 112200 > 0 \text{ で割る})\\
&= 0.88 && (\because \mathbb{Q} \text{ の四則。} 0.88 \cdot 112200 = 98736)
\end{aligned}
$$

□

主張 11.48 ($2\log\frac{\pi}{\delta} \le \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\sin^2(\theta/2)}} \le 2\log\frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$)**.** 平方根は 定義 1.4、正弦は 定義 1.38、log は 定義 12.21、B は 定義 11.46 のものを用いる。$\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ なら

$$
2\log\frac{\pi}{\delta} \;\le\; \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}} \;\le\; 2\log\frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B
$$

$\theta \in [0,\pi]$ なら $\frac{\theta}{2} \in [0,\frac{\pi}{2}]$ なので $\sin\frac{\theta}{2}$ は定まり、平方根の中身は $\delta^2 > 0$ 以上なので平方根も定まる。$\mathbb{R}$ を使うのは、区間 $[0,\pi]$ 上の積分と実対数を使うからである（注意 11.1 の (R3)(R4) と微分の公式）。

証明. 準備。注意 11.1 の円周率の数値の評価より $\pi > 0$、主張 11.32 より $c_0 \ge 0.5887 > 0$ である。$\theta \in [0,\pi]$ について $p := \frac{\theta}{2} \in [0,\frac{\pi}{2}]$、$s := \sin p$、$D_1 := \sqrt{\delta^2+p^2}$、$D_2 := \sqrt{\delta^2+s^2}$ と置く（p, s, D_1, D_2 は θ の関数で、値は $\mathbb{R}$ の元）。主張 11.34 より $c_0 p \le s \le p$、定義 1.4 より $D_1, D_2 \ge 0$、$D_1^2 = \delta^2+p^2$、$D_2^2 = \delta^2+s^2$ である。また $p^2 = \frac{\theta^2}{4}$ なので $D_1 = \sqrt{\delta^2+\theta^2/4}$ である。

$$
0 \le c_0 p \le s \qquad (\because \; c_0 > 0,\; p \ge 0 \text{ より } c_0 p \ge 0\text{。主張 11.34})
$$

$$
\delta^2 \le \delta^2+p^2 = D_1^2, \quad \delta^2 \le \delta^2+s^2 = D_2^2 \qquad (\because \; p^2, s^2 \ge 0)
$$

$$
0 < \delta \le D_1, \quad 0 < \delta \le D_2 \qquad (\because \text{ 主張 11.45 を } (u,v) = (\delta, D_1), (\delta, D_2) \text{ に})
$$

注意 11.1 の微分の公式（定数関数・恒等関数・定数倍・積・和・平方根・合成・商）と正弦の導関数より、$\theta \mapsto \frac{1}{D_1}$、$\theta \mapsto \frac{1}{D_2}$ は $[0,\pi]$ 上微分可能（平方根の中身は $\delta^2 > 0$ 以上、分母は $\delta > 0$ 以上）、したがって連続であり、その差も連続である。

各点の大小。

$$
\begin{aligned}
s^2 &= s \cdot s\\
&\le s \cdot p \quad (\because \; s \le p \text{ の両辺に } s \ge 0 \text{ を掛ける})\\
&\le p \cdot p \quad (\because \; s \le p \text{ の両辺に } p \ge 0 \text{ を掛ける})\\
&= p^2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
D_2^2 &= \delta^2+s^2 \quad (\because \text{ 定義 1.4})\\
&\le \delta^2+p^2 \quad (\because \; s^2 \le p^2 \text{ の両辺に } \delta^2 \text{ を足す})\\
&= D_1^2 \qquad (\because \text{ 定義 1.4})
\end{aligned}
$$

$$D_2 \le D_1 \qquad (\because \text{ 主張 11.45 を } (u,v) = (D_2, D_1) \text{ に})$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{D_1} &= D_2 \cdot \frac{1}{D_1 D_2} && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則。} D_1 D_2 \neq 0) \\
&\le D_1 \cdot \frac{1}{D_1 D_2} && (\because \ D_2 \le D_1 \text{ の両辺に } \tfrac{1}{D_1 D_2} > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{1}{D_2} && (\because \text{ 約分})
\end{aligned}$$

下からの評価。

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \sin^2(\theta/2)}} &= \int_0^\pi \frac{d\theta}{D_2} && (\because \ p, s, D_2 \text{ の置き方}) \\
&\ge \int_0^\pi \frac{d\theta}{D_1} && (\because \ \text{(R3) の単調性と、各点で } \tfrac{1}{D_1} \le \tfrac{1}{D_2}) \\
&= \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \theta^2/4}} && (\because \ D_1 = \sqrt{\delta^2 + \theta^2/4}) \\
&\ge 2 \log \frac{\pi}{\delta} && (\because \text{ 主張 11.42 の下からの評価})
\end{aligned}$$

差の各点評価の準備。$\theta^3 = (2p)^3 = 8p^3$ なので

$$\begin{aligned}
p - s &= \frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2} && (\because \ p, s \text{ の置き方}) \\
&\le \frac{\theta^3}{48} && (\because \text{ 主張 11.33}) \\
&= \frac{p^3}{6} && (\because \ \theta^3 = 8p^3 \text{ と } \mathbb{Q} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

$$0 \le p + s \le p + p = 2p \qquad (\because \ 0 \le s \le p)$$

$$p \le D_1 \qquad (\because \ p^2 \le \delta^2 + p^2 = D_1^2 \text{ と 主張 11.45 を } (u,v) = (p, D_1) \text{ に})$$

$$\begin{aligned}
(c_0 p)^2 &= c_0 p \cdot c_0 p \\
&\le c_0 p \cdot s && (\because \ c_0 p \le s \text{ の両辺に } c_0 p \ge 0 \text{ を掛ける}) \\
&\le s \cdot s && (\because \ c_0 p \le s \text{ の両辺に } s \ge 0 \text{ を掛ける}) \\
&\le \delta^2 + s^2 && (\because \ \delta^2 \ge 0) \\
&= D_2^2 && (\because \text{ 定義 1.4})
\end{aligned}$$

$$c_0 p \le D_2 \qquad (\because \text{ 主張 11.45 を } (u,v) = (c_0 p, D_2) \text{ に})$$

$$p + c_0 p \le D_1 + D_2 \qquad (\because \ p \le D_1 \text{ と } c_0 p \le D_2 \text{ を辺ごとに足す})$$

$$\begin{aligned}
D_1 D_2 (D_1 + D_2) &\ge p \cdot D_2 (D_1 + D_2) && (\because \ p \le D_1 \text{ の両辺に } D_2(D_1 + D_2) > 0 \text{ を掛ける}) \\
&\ge p \cdot c_0 p \cdot (D_1 + D_2) && (\because \ c_0 p \le D_2 \text{ の両辺に } p(D_1 + D_2) \ge 0 \text{ を掛ける}) \\
&\ge p \cdot c_0 p \cdot (p + c_0 p) && (\because \ p + c_0 p \le D_1 + D_2 \text{ の両辺に } p \cdot c_0 p \ge 0 \text{ を掛ける}) \\
&= c_0 (1 + c_0) p^3 && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

差の各点評価。$p > 0$ のとき、$c_0(1+c_0)p^3 > 0$ なので、分母の逆数の評価

$$\begin{aligned}
\frac{1}{D_1 D_2 (D_1+D_2)} &= \frac{c_0(1+c_0)p^3}{D_1 D_2 (D_1+D_2)} \cdot \frac{1}{c_0(1+c_0)p^3} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\leq \frac{D_1 D_2 (D_1+D_2)}{D_1 D_2 (D_1+D_2)} \cdot \frac{1}{c_0(1+c_0)p^3} && (\because\ c_0(1+c_0)p^3 \leq D_1 D_2 (D_1+D_2) \text{ の両辺に } \tfrac{1}{D_1 D_2 (D_1+D_2) c_0(1+c_0)p^3} > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{1}{c_0(1+c_0)p^3} && (\because\ \text{約分})
\end{aligned}$$

を使って

$$\begin{aligned}
\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} &= \frac{D_1 - D_2}{D_1 D_2} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則。} D_1 D_2 \neq 0) \\
&= \frac{(D_1 - D_2)(D_1 + D_2)}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} && (\because\ \text{分子と分母に } D_1 + D_2 > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{D_1^2 - D_2^2}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} && (\because\ \text{分配則}) \\
&= \frac{\left(\delta^2 + p^2\right) - \left(\delta^2 + s^2\right)}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} && (\because\ \text{定義 1.4}) \\
&= \frac{p^2 - s^2}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \frac{(p-s)(p+s)}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} && (\because\ \text{分配則}) \\
&\leq \frac{\frac{p^3}{6}(p+s)}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} && (\because\ p - s \leq \tfrac{p^3}{6} \text{ の両辺に } \tfrac{p+s}{D_1 D_2 (D_1+D_2)} \geq 0 \text{ を掛ける}) \\
&\leq \frac{\frac{p^3}{6} \cdot 2p}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} && (\because\ p + s \leq 2p \text{ の両辺に } \tfrac{p^3/6}{D_1 D_2 (D_1+D_2)} \geq 0 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{p^4}{3} \cdot \frac{1}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\leq \frac{p^4}{3} \cdot \frac{1}{c_0(1+c_0)p^3} && (\because\ \text{分母の逆数の評価の両辺に } \tfrac{p^4}{3} \geq 0 \text{ を掛ける}) \\
&= \frac{p}{3c_0(1+c_0)} && (\because\ \text{約分。} p \neq 0) \\
&= \frac{\theta}{6c_0(1+c_0)} && (\because\ p = \tfrac{\theta}{2})
\end{aligned}$$

$p = 0$ のとき、主張 11.24 より $s = \sin 0 = 0 = p$ なので $D_2 = D_1$ で、$\theta = 2p = 0$ なので

$$\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} = 0 = \frac{\theta}{6c_0(1+c_0)} \qquad (\because\ D_2 = D_1,\ \theta = 0)$$

したがって $[0, \pi]$ の各点で $\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} \leq \frac{\theta}{6c_0(1+c_0)}$ である。$F(\theta) := \frac{\theta^2}{2}$ は微分の公式（定数倍・積・恒等関数）より微分可能で $F'(\theta) = \frac{1}{2}(1 \cdot \theta + \theta \cdot 1) = \theta$、$F'$ は恒等関数なので連続である。$\theta \mapsto \frac{\theta}{6c_0(1+c_0)}$ も恒等関数の定数倍なので微分可能、したがって連続である（微分の公式）。

$$
\begin{aligned}
\int_0^\pi \left(\frac{1}{D_2}-\frac{1}{D_1}\right) d\theta &\le \int_0^\pi \frac{\theta}{6c_0\,(1+c_0)}\, d\theta && (\because \text{(R3) の単調性と、差の各点評価})\\
&= \frac{1}{6c_0\,(1+c_0)} \int_0^\pi \theta\, d\theta && (\because \text{(R3) の線型性を } \lambda = \tfrac{1}{6c_0(1+c_0)},\ \nu = 0 \text{ で})\\
&= \frac{1}{6c_0\,(1+c_0)} \left(\frac{\pi^2}{2}-\frac{0^2}{2}\right) && (\because \text{(R4) を } F \text{ に})\\
&= \frac{\pi^2}{12c_0\,(1+c_0)} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= B && (\because \text{定義 11.46})
\end{aligned}
$$

上からの評価。

$$
\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\sin^2(\theta/2)}} &= \int_0^\pi \frac{d\theta}{D_2} && (\because p, s, D_2 \text{ の置き方})\\
&= \int_0^\pi \left(\frac{1}{D_1}+\left(\frac{1}{D_2}-\frac{1}{D_1}\right)\right) d\theta && (\because \mathbb{R} \text{ の四則を各点で})\\
&= \int_0^\pi \frac{d\theta}{D_1} + \int_0^\pi \left(\frac{1}{D_2}-\frac{1}{D_1}\right) d\theta && (\because \text{(R3) の線型性を } \lambda = \nu = 1 \text{ で})\\
&= \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} + \int_0^\pi \left(\frac{1}{D_2}-\frac{1}{D_1}\right) d\theta && (\because D_1 = \sqrt{\delta^2+\theta^2/4})\\
&\le \left(2\log\frac{\pi}{\delta}+\frac{2\delta^2}{\pi^2}\right) + \int_0^\pi \left(\frac{1}{D_2}-\frac{1}{D_1}\right) d\theta && (\because \text{主張 11.42 の上からの評価})\\
&\le \left(2\log\frac{\pi}{\delta}+\frac{2\delta^2}{\pi^2}\right) + B && (\because \text{差の積分の評価 } \textstyle\int_0^\pi (\frac{1}{D_2}-\frac{1}{D_1})\, d\theta \le B)\\
&= 2\log\frac{\pi}{\delta}+\frac{2\delta^2}{\pi^2}+B
\end{aligned}
$$

□

部 II
分配関数

12　転送行列による表示

定義 12.1 (格子サイズ)**.** $M_{\mathrm{col}}, N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、これらを格子のサイズとする。格子は N_{row} 本の行と M_{col} 本の列からなる。すなわち M_{col} は 1 つの行に並ぶサイトの数（列数）、N_{row} は行の数（行数）である。

定義 12.2 (2 次元 ising 模型の分配関数)**.** 定義 12.1 の列数 M_{col} と行数 N_{row} を固定する。$Z : \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ を以下のように定める。

スピン配置の全体を

$$
\mathfrak{S} := \mathrm{Map}(\{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\} \times \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}, \{-1,1\})
$$

とおく。$s \in \mathfrak{S}$ の値 $s(i,j)$ の第 1 引数 $i \in \{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}$ は行、第 2 引数 $j \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ は列を表す。

s の定義域は $\{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\} \times \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ であって $s(N_{\mathrm{row}}+1, j)$、$s(i, M_{\mathrm{col}}+1)$ はそのままでは定義されない。以下では s を両方向に周期的に延長したもの（周期境界条件）を用いる。すなわち $i \in \{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}$、$j \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ に対して

$$s(N_{\mathrm{row}}+1,j) := s(1,j), \qquad s(i,M_{\mathrm{col}}+1) := s(i,1)$$

と定める。結合定数 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ のうち、K_1 は同じ行の隣り合うサイトの組 $s(i,j)\,s(i,j+1)$ を、K_2 は隣り合う行の同じ列のサイトの組 $s(i,j)\,s(i+1,j)$ を結ぶ。

$$Z(K_1,K_2) := \sum_{s\in\mathfrak{S}} \exp\left(\sum_{\substack{i\in\{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}\\ j\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}}} \bigl(K_1\, s(i,j)\,s(i,j+1) + K_2\, s(i,j)\,s(i+1,j)\bigr) \right)$$

周期境界条件のもとで被加数の指数の肩はすべて $\mathbb{R}$ の元として定まる。$\mathfrak{S}$ は有限集合（$|\mathfrak{S}| = 2^{M_{\mathrm{col}}N_{\mathrm{row}}}$）であり、各項は $\mathbb{R}_{>0}$ の元であるから、右辺は有限和として無条件に定まる（収束の議論を要しない）。

定義 12.3 (1 行ぶんのスピン配置の全体)**.** 定義 12.1 の列数 M_{col} について、1 つの行に並ぶ M_{col} 個のサイトのスピン配置の全体を

$$\mathfrak{M} := \mathrm{Map}(\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\},\{-1,1\})$$

と定める。

定義 12.4 (1 行ぶんのスピン配置の番号付け)**.** 定義 12.3 の $\mathfrak{M}$ について、写像 $\mathrm{ord}:\mathfrak{M}\to\mathbb{Z}$ を

$$\mathrm{ord}(\mu) := 1 + \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \frac{1-\mu(m)}{2}\cdot 2^{M_{\mathrm{col}}-m} \qquad (\mu\in\mathfrak{M})$$

で定める。$\mu(m)\in\{-1,1\}$ より $\frac{1-\mu(m)}{2}$ は $\mu(m)=1$ のとき 0、$\mu(m)=-1$ のとき 1 であり、右辺は整数の有限和である。

主張 12.5 (1 行ぶんのスピン配置の番号付けは全単射)**.** 定義 12.4 の ord の値はすべて $\{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ に属し、$\mathrm{ord}:\mathfrak{M}\to\{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ は全単射である。

証明. 証明の中だけで $b_m(\mu) := \frac{1-\mu(m)}{2} \in \{0,1\}$（$\mu\in\mathfrak{M}$、$m\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$）と書く。$b_m(\mu)=0 \iff \mu(m)=1$ である。

準備として、$n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1$ を n についての帰納法で示す。$n=0$ のときは空和で $0 = 2^0 - 1$。n で成り立つとする。

$$\begin{aligned}
\sum_{t=0}^{n} 2^t &= \sum_{t=0}^{n-1} 2^t + 2^n && (\because \text{有限和の最後の項を分ける})\\
&= (2^n-1) + 2^n && (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= 2\cdot 2^n - 1 && (\because \text{加法の結合則と} 2^n+2^n = 2\cdot 2^n)\\
&= 2^{n+1} - 1 && (\because \text{指数法則 } 2\cdot 2^n = 2^{n+1})
\end{aligned}$$

中間目標: 値域。$\mu\in\mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$
\begin{aligned}
0 &\le \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} b_m(\mu)\, 2^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{各項は} b_m(\mu)\ge 0 \text{ と} 2^{M_{\mathrm{col}}-m}>0 \text{ の積で非負})\\
&\le \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{各項で} b_m(\mu)\le 1 \text{ かつ} 2^{M_{\mathrm{col}}-m}>0)\\
&= \sum_{t=0}^{M_{\mathrm{col}}-1} 2^{t} && (\because \text{添字の置き換え} t := M_{\mathrm{col}}-m)\\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}}-1 && (\because \text{準備の等比和を} n := M_{\mathrm{col}} \text{ で})
\end{aligned}
$$

よって $1 \le \mathrm{ord}(\mu) \le 2^{M_{\mathrm{col}}}$ であり、$\mathrm{ord}(\mu)\in\mathbb{Z}$ だから $\mathrm{ord}(\mu)\in\{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$。

中間目標: 単射性。$\mu,\mu'\in\mathfrak{M}$、$\mu\neq\mu'$ とし、$\mu(k)\neq\mu'(k)$ となる最小の $k\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ をとる。必要なら μ と μ' を入れ替えて $\mu(k)=-1,\ \mu'(k)=1$、すなわち $b_k(\mu)=1,\ b_k(\mu')=0$ としてよい。$l<k$ では $b_l(\mu)=b_l(\mu')$ である。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{ord}(\mu)-\mathrm{ord}(\mu') &= \sum_{l=1}^{M_{\mathrm{col}}} \big(b_l(\mu)-b_l(\mu')\big)2^{M_{\mathrm{col}}-l} && (\because \text{定義 12.4 の差を項ごとに取る})\\
&= \sum_{l=k}^{M_{\mathrm{col}}} \big(b_l(\mu)-b_l(\mu')\big)2^{M_{\mathrm{col}}-l} && (\because l<k \text{ では項が}0)\\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}-k} + \sum_{l=k+1}^{M_{\mathrm{col}}} \big(b_l(\mu)-b_l(\mu')\big)2^{M_{\mathrm{col}}-l} && (\because l=k \text{ の項を分ける。} b_k(\mu)-b_k(\mu')=1)
\end{aligned}
$$

$b_l(\mu)-b_l(\mu')\in\{-1,0,1\}$ より、残りの和について次が成り立つ。

$$
\begin{aligned}
\left|\sum_{l=k+1}^{M_{\mathrm{col}}} \big(b_l(\mu)-b_l(\mu')\big)2^{M_{\mathrm{col}}-l}\right| &\le \sum_{l=k+1}^{M_{\mathrm{col}}} \big|b_l(\mu)-b_l(\mu')\big|\, 2^{M_{\mathrm{col}}-l} && (\because \text{三角不等式と} 2^{M_{\mathrm{col}}-l}>0)\\
&\le \sum_{l=k+1}^{M_{\mathrm{col}}} 2^{M_{\mathrm{col}}-l} && (\because \text{各項で} |b_l(\mu)-b_l(\mu')|\le 1)\\
&= \sum_{t=0}^{M_{\mathrm{col}}-k-1} 2^{t} && (\because \text{添字の置き換え} t := M_{\mathrm{col}}-l)\\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}-k}-1 && (\because \text{準備の等比和を} n := M_{\mathrm{col}}-k \text{ で})\\
&< 2^{M_{\mathrm{col}}-k} && (\because 2^{M_{\mathrm{col}}-k}-1<2^{M_{\mathrm{col}}-k})
\end{aligned}
$$

よって $\mathrm{ord}(\mu)-\mathrm{ord}(\mu')\neq 0$ であり、ord は単射である。

中間目標: 全単射性。$\mathfrak{M}$ の元は M_{col} 個の各サイトに $\{-1,1\}$ の 2 通りの値を独立に割り当てたものだから $|\mathfrak{M}|=2^{M_{\mathrm{col}}}=|\{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}|$ である。元数の等しい有限集合の間の単射は全射でもある（像は $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の元をもつ $\{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ の部分集合、すなわち全体）。ゆえに ord は全単射である。 □

定義 12.6 (転送行列)**.** 定義 12.2 の結合定数 $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$、定義 12.3 の $\mathfrak{M}$、定義 12.4 の ord を用いる。$\mu\in\mathfrak{M}$ の定義域は $\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ であって $\mu(M_{\mathrm{col}}+1)$ はそのままでは定義されないため、定義 12.2 と同じく周期的に延長して

$$\mu(M_{\mathrm{col}}+1) := \mu(1)$$

とする。$V_1,V_2\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を、$\mu,\mu'\in\mathfrak{M}$ について

$$(V_1)_{\mathrm{ord}(\mu),\,\mathrm{ord}(\mu')} := \delta_{\mu=\mu'} \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\,\mu(m+1) \right)$$

$$(V_2)_{\mathrm{ord}(\mu),\,\mathrm{ord}(\mu')} := \exp\left(K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\,\mu'(m) \right)$$

で定める。主張 12.5 より $\mathrm{ord} : \mathfrak{M} \to \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ は全単射なので、各 $(k,l) \in \{1,\ldots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}^2$ はただ 1 つの $(\mu,\mu') \in \mathfrak{M} \times \mathfrak{M}$ について $(k,l) = (\mathrm{ord}(\mu), \mathrm{ord}(\mu'))$ と書ける。ゆえにこの式ですべての成分がただ 1 通りに定まる。

ここで $\delta_{\mu=\mu'} \in \{0,1\}$ は、$\mu = \mu'$（写像として一致、すなわち $\forall m \in \{1,\ldots,M_{\mathrm{col}}\},\ \mu(m) = \mu'(m)$）のとき 1、そうでないとき 0 とする。

指数の肩は $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ と $\mu(m), \mu'(m) \in \{-1,1\} \subset \mathbb{R}$ の有限個の積和なので $\mathbb{R}$ の元であり、exp の値は $\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$ に属する。

主張 12.7 (転送行列による分配関数の表式)**.** 定義 12.2 の Z と 定義 12.6 の $V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき

$$Z(K_1, K_2) = \mathrm{tr}\big((V_1 V_2)^{N_{\mathrm{row}}} \big)$$

証明. 以下、定義 12.3 の $\mathfrak{M}$、定義 12.4 の ord、定義 12.6 の周期規約 $\mu(M_{\mathrm{col}}+1) = \mu(1)$ を用い、$A := V_1 V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ とおく。行方向の周期規約として、$(\mu^{(1)}, \ldots, \mu^{(N_{\mathrm{row}})}) \in \mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}$ に対し $\mu^{(N_{\mathrm{row}}+1)} := \mu^{(1)}$ と置く。

本証明に現れる総和はすべて有限集合上の和であり、値は $\mathbb{C}$ の元である。したがって和の順序交換・結合・分配は $\mathbb{C}$ の可換環の公理から有限帰納法で従い、収束や極限の議論を一切要しない。

準備として、写像 $g : \{1,\ldots,2^{M_{\mathrm{col}}}\} \to \mathbb{C}$ について

$$\sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} g(k) = \sum_{\nu \in \mathfrak{M}} g(\mathrm{ord}(\nu)) \qquad \big(\because \text{ 主張 12.5 の全単射による有限和の添字の付け替え}\big) \quad \text{(R)}$$

中間目標: 転送行列の積の成分。

$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$\begin{aligned}
A_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\mu')} &= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (V_1)_{\mathrm{ord}(\mu),k}\,(V_2)_{k,\mathrm{ord}(\mu')} && (\because \text{ 定義 1.6}) \\
&= \sum_{\nu \in \mathfrak{M}} (V_1)_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\nu)}\,(V_2)_{\mathrm{ord}(\nu),\mathrm{ord}(\mu')} && (\because \text{ (R)}) \\
&= \sum_{\nu \in \mathfrak{M}} \delta_{\mu=\nu} \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1) \right) \exp\left(K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \nu(m)\mu'(m) \right) && (\because \text{ 定義 12.6}) \\
&= \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1) \right) \exp\left(K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu'(m) \right) && (\because \delta_{\mu=\nu} \text{ は } \nu=\mu \text{ のときだけ 1 で他は 0}) \\
&= \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1) + K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu'(m) \right) && (\because \text{ 定理 3.7 を } n=1,\ K=\mathbb{R} \text{ へ適用する}) \\
&= \exp\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \big(K_1\,\mu(m)\mu(m+1) + K_2\,\mu(m)\mu'(m) \big) \right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則と有限和の項別加法})
\end{aligned}$$

中間目標: 行列の冪の成分。

任意の $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ と $\mu^{(1)}, \mu^{(r+1)} \in \mathfrak{M}$ に対して次が成り立つことを、r についての帰納法で示す。

$$\left(A^r\right)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+1)})} = \sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(r)})\in\mathfrak{M}^{r-1}} \prod_{k=1}^{r} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} \qquad (*)$$

$r=1$ の場合である。

$$\begin{aligned}
\left(A^1\right)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(2)})} &= A_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(2)})} && (\because \text{行列の 1 乗はその行列自身である})\\
&= \prod_{k=1}^{1} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} && (\because \text{因子が 1 つの有限積はその因子である})\\
&= \sum_{(\ )\in\mathfrak{M}^0} \prod_{k=1}^{1} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} && (\because \mathfrak{M}^0 \text{ は空列のみからなる 1 点集合である})
\end{aligned}$$

r で $(*)$ が成り立つと仮定し、$\mu^{(1)},\mu^{(r+2)}\in\mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$\begin{aligned}
\left(A^{r+1}\right)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+2)})} &= \sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(A^r\right)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),l}\, A_{l,\mathrm{ord}(\mu^{(r+2)})} && (\because A^{r+1}=A^rA \text{ と 定義 1.6})\\
&= \sum_{\mu^{(r+1)}\in\mathfrak{M}} \left(A^r\right)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+1)})}\, A_{\mathrm{ord}(\mu^{(r+1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+2)})} && (\because \text{(R)})\\
&= \sum_{\mu^{(r+1)}\in\mathfrak{M}} \left(\sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(r)})\in\mathfrak{M}^{r-1}} \prod_{k=1}^{r} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} \right) A_{\mathrm{ord}(\mu^{(r+1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+2)})} && (\because \text{帰納法の仮定 } (*))\\
&= \sum_{\mu^{(r+1)}\in\mathfrak{M}} \sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(r)})\in\mathfrak{M}^{r-1}} \left(\prod_{k=1}^{r} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} \right) A_{\mathrm{ord}(\mu^{(r+1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+2)})} && (\because \text{有限和に対する分配則 } (\textstyle\sum_\lambda x_\lambda)\,y=\sum_\lambda x_\lambda y)\\
&= \sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(r+1)})\in\mathfrak{M}^r} \prod_{k=1}^{r+1} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} && (\because \mathfrak{M}\times\mathfrak{M}^{r-1}\to\mathfrak{M}^r \text{ の全単射による添え字の付け替えと、末尾の因子を有限積へ入れること})
\end{aligned}$$

よってすべての $r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $(*)$ が成り立つ。

中間目標: トレースの展開。

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\left(A^{N_{\mathrm{row}}}\right) &= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(A^{N_{\mathrm{row}}}\right)_{k,k} && (\because \text{定義 8.1})\\
&= \sum_{\mu^{(1)}\in\mathfrak{M}} \left(A^{N_{\mathrm{row}}}\right)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(1)})} && (\because \text{(R)})\\
&= \sum_{\mu^{(1)}\in\mathfrak{M}} \sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})})\in\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}-1}} \prod_{k=1}^{N_{\mathrm{row}}} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} && (\because (*) \text{ を } r=N_{\mathrm{row}},\ \mu^{(N_{\mathrm{row}}+1)}=\mu^{(1)} \text{ として})\\
&= \sum_{(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})})\in\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}} \prod_{k=1}^{N_{\mathrm{row}}} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} && (\because \mathfrak{M}\times\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}-1}\to\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}} \text{ の全単射による添え字の付け替え})
\end{aligned}$$

中間目標: 指数の積を指数の和へ。

準備として、任意の $n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ と $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{R}$ について $\prod_{k=1}^{n}\exp(x_k)=\exp(\sum_{k=1}^{n}x_k)$ を n についての帰納法で示す。$n=1$ のときは両辺とも $\exp(x_1)$ である。n で成り立つとする。

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n+1}\exp(x_k) &= \left(\prod_{k=1}^{n}\exp(x_k)\right)\exp(x_{n+1}) && (\because \text{有限積から末尾の因子を分けること})\\
&= \exp\left(\sum_{k=1}^{n}x_k\right)\exp(x_{n+1}) && (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= \exp\left(\sum_{k=1}^{n+1}x_k\right) && (\because \text{定理 3.7 を } n=1,\ K=\mathbb{R} \text{ へ適用する})
\end{aligned}$$

$(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})})\in\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}$（および $\mu^{(N_{\mathrm{row}}+1)}=\mu^{(1)}$）を任意に取る。

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{N_{\mathrm{row}}} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} &= \prod_{k=1}^{N_{\mathrm{row}}} \exp\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(K_1\,\mu^{(k)}(m)\mu^{(k)}(m+1) + K_2\,\mu^{(k)}(m)\mu^{(k+1)}(m)\right)\right) && (\because \text{上で示した転送行列の積の成分})\\
&= \exp\left(\sum_{k=1}^{N_{\mathrm{row}}}\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(K_1\,\mu^{(k)}(m)\mu^{(k)}(m+1) + K_2\,\mu^{(k)}(m)\mu^{(k+1)}(m)\right)\right) && (\because \text{直前に示した指数の積の法則})\\
&= \exp\left(\sum_{\substack{k\in\{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}\\ m\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}}} \left(K_1\,\mu^{(k)}(m)\mu^{(k)}(m+1) + K_2\,\mu^{(k)}(m)\mu^{(k+1)}(m)\right)\right) && (\because \text{有限集合 } \{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}\times\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\} \text{ 上の和を二重和として書き直すこと})
\end{aligned}$$

中間目標: $\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}$ と $\mathfrak{S}$ の全単射。全単射の構成なので、一続きの式変形にはしない。

写像 $\Phi : \mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}} \to \mathfrak{S}$ を、$(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})}) \in \mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}$ に対し

$$\Phi(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})}) := s, \qquad s(i,j) := \mu^{(i)}(j) \quad (i \in \{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\},\ j \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\})$$

で定める。すなわち第 i 行のスピン配置が $\mu^{(i)}$ である。

（well-defined 性）各 $\mu^{(i)}$ は $\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\} \to \{-1,1\}$ の写像だから、s は $\{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\} \times \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ の各元に $\{-1,1\}$ の元をただ 1 つ対応させる。ゆえに $s \in \mathfrak{S}$。

（単射性）$\Phi(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})}) = \Phi(\nu^{(1)},\dots,\nu^{(N_{\mathrm{row}})})$ とすると、すべての $i \in \{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}$、$j \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について $\mu^{(i)}(j) = \nu^{(i)}(j)$。写像の外延性より各 i で $\mu^{(i)} = \nu^{(i)}$ であり、組として $(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})}) = (\nu^{(1)},\dots,\nu^{(N_{\mathrm{row}})})$。

（全射性）$s \in \mathfrak{S}$ を任意にとり、$i \in \{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}$ ごとに $\mu^{(i)} : \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\} \to \{-1,1\}$ を $\mu^{(i)}(j) := s(i,j)$ で定めれば $\mu^{(i)} \in \mathfrak{M}$ であり、$\Phi(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})}) = s$。

よって Φ は全単射である。

（周期規約の整合）$s = \Phi(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})})$ とし、s を 定義 12.2 の規約で周期的に延長する。$j \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、行方向の端では

$$\begin{aligned}
s(N_{\mathrm{row}}+1, j) &= s(1,j) && \big(\because \text{定義 12.2 の周期境界条件}\big)\\
&= \mu^{(1)}(j) && \big(\because\ \Phi \text{ の定義}\big)\\
&= \mu^{(N_{\mathrm{row}}+1)}(j) && \big(\because\ \mu^{(N_{\mathrm{row}}+1)} = \mu^{(1)} \text{(行方向の周期規約)}\big)
\end{aligned}$$

であり、$i \in \{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}$ について、列方向の端では

$$\begin{aligned}
s(i, M_{\mathrm{col}}+1) &= s(i,1) && \big(\because \text{定義 12.2 の周期境界条件}\big)\\
&= \mu^{(i)}(1) && \big(\because\ \Phi \text{ の定義}\big)\\
&= \mu^{(i)}(M_{\mathrm{col}}+1) && \big(\because \text{定義 12.6 の周期規約 } \mu(M_{\mathrm{col}}+1) = \mu(1)\big)
\end{aligned}$$

である。端でない添字では Φ の定義そのものなので、すべての $i \in \{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}$、$j \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について

$$s(i,j) = \mu^{(i)}(j), \qquad s(i,j+1) = \mu^{(i)}(j+1), \qquad s(i+1,j) = \mu^{(i+1)}(j) \tag{P}$$

が成り立つ。

中間目標: 分配関数との一致。

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\big((V_1V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big) &= \sum_{(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})})\in\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}} \exp\left(\sum_{\substack{k\in\{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}\\ m\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}}} \left(K_1\,\mu^{(k)}(m)\mu^{(k)}(m+1) + K_2\,\mu^{(k)}(m)\mu^{(k+1)}(m)\right)\right) && (\because \text{上で示したトレースの展開と、直前に示した積の表式})\\
&= \sum_{s\in\mathfrak{S}} \exp\left(\sum_{\substack{i\in\{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}\\ j\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}}} \left(K_1\,s(i,j)\,s(i,j+1) + K_2\,s(i,j)\,s(i+1,j)\right)\right) && (\because\ \Phi \text{ が全単射であることによる添え字の付け替えと (P)})\\
&= Z(K_1,K_2) && (\because \text{定義 12.2})
\end{aligned}$$

□

定義 12.8 (サイトごとの Pauli 行列族)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。主張 6.1 で定めた二次の Pauli 行列 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z$ と単位行列 $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$、および 定義 2.72 のクロネッカー積を用いる。

$1 \leq k \leq M_{\mathrm{col}}$ と $a \in \{x, y, z\}$ に対して、サイト k だけに σ^a を置く行列を

$$\sigma^a_k := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。これにより $(\sigma^a_k)_{\substack{1 \leq k \leq M_{\mathrm{col}} \\ a \in \{x,y,z\}}}$ は一つの添字つき行列族として定まる。

定義 12.9 (サイトごとの Pauli 行列族の周期的な延長)**.** 定義 12.8 のサイトごとの Pauli 行列族 $(\sigma^z_k)_{1 \leq k \leq M_{\mathrm{col}}}$ の添字は $\{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に限られ、$\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1}$ はそのままでは定義されない。定義 12.6 の周期規約 $\mu(M_{\mathrm{col}} + 1) := \mu(1)$ と同じく周期的に延長して

$$\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1} := \sigma^z_1 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。

主張 12.10 (相異なるサイトに置いた Pauli 行列は可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 12.8 のサイトごとの Pauli 行列 $\sigma^a_k \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用いる。$j, k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ が $j \neq k$ を満たし、$a, b \in \{x, y, z\}$ ならば、

$$\sigma^a_j \, \sigma^b_k = \sigma^b_k \, \sigma^a_j$$

が成り立つ。

証明. 準備として、$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書き、$i \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対して $x_i, y_i \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ を

$$x_i := \begin{cases} \sigma^a & (i = j) \\ I & (i \neq j) \end{cases}, \qquad y_i := \begin{cases} \sigma^b & (i = k) \\ I & (i \neq k) \end{cases}$$

と置く。

$$\sigma^a_j = x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_{M_{\mathrm{col}}}, \qquad \sigma^b_k = y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{定義 12.8})$$

各 $i \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について $y_i x_i = x_i y_i$ を、i の場合に分けて示す。$i = j$ のとき（$j \neq k$ より $i \neq k$）、

$$\begin{aligned} y_i x_i &= I \, \sigma^a \quad (\because x_i,\ y_i \text{ の定義}) \\ &= \sigma^a \quad (\because \text{主張 2.16 } (m \to 2,\ n \to 2,\ A \to \sigma^a)) \\ &= \sigma^a \, I \quad (\because \text{主張 2.17 } (m \to 2,\ n \to 2,\ A \to \sigma^a) \text{ を右辺から左辺へ}) \\ &= x_i y_i \quad (\because x_i,\ y_i \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$i = k$ のとき（$j \neq k$ より $i \neq j$）、

$$\begin{aligned} y_i x_i &= \sigma^b \, I \quad (\because x_i,\ y_i \text{ の定義}) \\ &= \sigma^b \quad (\because \text{主張 2.17 } (m \to 2,\ n \to 2,\ A \to \sigma^b)) \\ &= I \, \sigma^b \quad (\because \text{主張 2.16 } (m \to 2,\ n \to 2,\ A \to \sigma^b) \text{ を右辺から左辺へ}) \\ &= x_i y_i \quad (\because x_i,\ y_i \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$i \neq j$ かつ $i \neq k$ のとき、

$$\begin{aligned} y_i x_i &= I \, I \quad (\because x_i,\ y_i \text{ の定義}) \\ &= x_i y_i \quad (\because x_i,\ y_i \text{ の定義}) \end{aligned}$$

これらを使うと、

$\sigma_j^a\,\sigma_k^b = (x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_{M_{\mathrm{col}}})(y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_{M_{\mathrm{col}}})$ ($\because$ 準備の $\sigma_j^a,\ \sigma_k^b$ の表示)
$= (y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_{M_{\mathrm{col}}})(x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_{M_{\mathrm{col}}})$ ($\because$ 主張 6.15 ($M \to M_{\mathrm{col}}$) と、全ての i についての $y_i x_i = x_i y_i$)
$= \sigma_k^b\,\sigma_j^a$ ($\because$ 準備の $\sigma_j^a,\ \sigma_k^b$ の表示)

□

定義 12.11 (スピン配置から多重添字への写像)**.** 定義 12.3 の $\mathfrak{M} = \mathrm{Map}(\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\},\{-1,1\})$ と、定義 4.1 を $M := M_{\mathrm{col}}$ として用いたときの多重添字の集合 $\mathcal{I} = \{1,2\}^{M_{\mathrm{col}}}$・基底 $f_I = e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} \in \mathcal{F} = \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ を用いる。写像 $\iota : \mathfrak{M} \to \mathcal{I}$ を

$$\iota(\mu) := (i_1,\dots,i_{M_{\mathrm{col}}}), \qquad i_m := \begin{cases} 1 & (\mu(m) = +1) \\ 2 & (\mu(m) = -1) \end{cases} \qquad (m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\})$$

で定める。以後、スピン配置 $\mu \in \mathfrak{M}$ に対応する $\mathcal{F}$ の基底ベクトルを $f_{\iota(\mu)}$ と書く。

主張 12.12 (スピン配置の番号付けはクロネッカー積の番号付けと一致する)**.** 定義 12.4 の ord、定義 2.72 を $M := M_{\mathrm{col}}$ として用いたときの番号付け $\nu : \{1,2\}^{M_{\mathrm{col}}} \to \{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$、定義 12.11 の ι について、任意の $\mu \in \mathfrak{M}$ で

$$\mathrm{ord}(\mu) = \nu(\iota(\mu))$$

が成り立つ。

証明. $\iota(\mu) = (i_1,\dots,i_{M_{\mathrm{col}}})$ とおく。各 $m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、$\mu(m) = 1$ なら $i_m - 1 = 0 = \frac{1-\mu(m)}{2}$、$\mu(m) = -1$ なら $i_m - 1 = 1 = \frac{1-\mu(m)}{2}$ であるから（定義 12.11)、$i_m - 1 = \frac{1-\mu(m)}{2}$ である。

$$\begin{aligned} \nu(\iota(\mu)) &= 1 + \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} (i_m - 1)\, 2^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{定義 2.72 の} \nu \text{ の定義}) \\ &= 1 + \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \frac{1-\mu(m)}{2} \cdot 2^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{各} m \text{で} i_m - 1 = \tfrac{1-\mu(m)}{2}) \\ &= \mathrm{ord}(\mu) && (\because \text{定義 12.4}) \end{aligned}$$

□

主張 12.13 (σ_m^z の基底$f_{\iota(\mu)}$ への作用)**.** $\mu \in \mathfrak{M}$、$m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、

$$\sigma_m^z\, f_{\iota(\mu)} = \mu(m)_{\mathbb{C}}\, f_{\iota(\mu)}$$

が成り立つ。ここで $\mu(m) \in \{-1,1\} \subset \mathbb{R}$、$\mu(m)_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(\mu(m))$ は 定義 1.13 の略記、右辺は定義 2.3 のスカラー倍、左辺の積は 定義 1.6 の数ベクトルへの作用である。

証明. 準備。主張 6.1 の $\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ と 定義 4.1 の $e_1 = (1,0),\ e_2 = (0,1)$ について（成分の $1, 0, -1$ は 定義 1.13 の略記の $1_{\mathbb{C}}, 0_{\mathbb{C}}, -1_{\mathbb{C}}$ である)、$\mathbb{C}^2$ の中で

$$
\begin{aligned}
\sigma^z e_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 } 6.1, \text{定義 } 4.1) \\
&= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 } 1.6) \\
&= \begin{pmatrix} 1 + 0 \\ 0 + 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 } 1.56 \text{ の乗法の単位元, 主張 } 1.58, \text{ 主張 } 1.59) \\
&= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 } 1.56 \text{ の加法の単位元}) \\
&= e_1 \quad (\because \text{定義 } 4.1), \\
\sigma^z e_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 } 6.1, \text{定義 } 4.1) \\
&= \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 } 1.6) \\
&= \begin{pmatrix} 0 + 0 \\ 0 + (-1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 } 1.59, \text{ 主張 } 1.58, \text{ 主張 } 1.56 \text{ の乗法の単位元}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 } 1.56 \text{ の加法の単位元}) \\
&= \begin{pmatrix} (-1_{\mathbb{C}})\, 0_{\mathbb{C}} \\ (-1_{\mathbb{C}})\, 1_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 } 1.59, \text{ 主張 } 1.56 \text{ の乗法の単位元}) \\
&= \begin{pmatrix} -(0_{\mathbb{C}}) \\ -(1_{\mathbb{C}}) \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 } 1.14) \\
&= -e_2 \quad (\because \text{定義 } 4.1, \text{定義 } 1.94).
\end{aligned}
$$

定義 12.11 の $\iota(\mu) = (i_1, \ldots, i_{M_{\mathrm{col}}})$ の第 m 成分 i_m について、二つの場合に分ける。$\mu(m) = 1$ のとき、

$$
\begin{aligned}
\sigma^z e_{i_m} &= \sigma^z e_1 \quad (\because \text{定義 } 12.11 \text{ より} i_m = 1) \\
&= e_1 \quad (\because \text{上の} \sigma^z e_1 = e_1) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\, e_1 \quad (\because \text{主張 } 2.42) \\
&= \mu(m)_{\mathbb{C}}\, e_{i_m} \quad (\because \mu(m) = 1 \text{ より} \mu(m)_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) = 1_{\mathbb{C}} \text{ 定義 } 1.13,\ i_m = 1).
\end{aligned}
$$

$\mu(m) = -1$ のとき、

$$
\begin{aligned}
\sigma^z e_{i_m} &= \sigma^z e_2 \quad (\because \text{定義 } 12.11 \text{ より} i_m = 2) \\
&= -e_2 \quad (\because \text{上の} \sigma^z e_2 = -e_2) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\, e_2 \quad (\because \text{主張 } 2.25) \\
&= \mu(m)_{\mathbb{C}}\, e_{i_m} \quad (\because \mu(m) = -1 \text{ より} \mu(m)_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1) = -1_{\mathbb{C}} \text{ 定義 } 1.13,\ i_m = 2).
\end{aligned}
$$

どちらの場合も $\sigma^z e_{i_m} = \mu(m)_{\mathbb{C}}\, e_{i_m}$ である。これを使って、

$$
\begin{aligned}
\sigma^z_m f_{\iota(\mu)} &= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^z \boxtimes \cdots \boxtimes I) f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{定義 12.8}) \\
&= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^z \boxtimes \cdots \boxtimes I) \left(e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_m} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} \right) \quad (\because \text{定義 12.11}) \\
&= (Ie_{i_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^z e_{i_m}) \boxtimes \cdots \boxtimes (Ie_{i_{M_{\mathrm{col}}}}) \quad (\because \text{主張 2.73 (3)}) \\
&= e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^z e_{i_m}) \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} \quad (\because \text{主張 2.16 を第} m \text{ 因子以外へ同時に適用}) \\
&= e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes (\mu(m)_{\mathbb{C}}\, e_{i_m}) \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} \quad (\because \text{上の} \sigma^z e_{i_m} = \mu(m)_{\mathbb{C}}\, e_{i_m}) \\
&= \mu(m)_{\mathbb{C}} \left(e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} \right) \quad (\because \text{主張 2.74 の数ベクトルの場合を} c = \mu(m)_{\mathbb{C}} \text{ で}) \\
&= \mu(m)_{\mathbb{C}}\, f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{定義 12.11})
\end{aligned}
$$

□

主張 12.14 ($\sigma^z_m \sigma^z_{m'}$ の基底$f_{\iota(\mu)}$ への作用)**.** $\mu \in \mathfrak{M}$、$m, m' \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について、

$$\sigma^z_m \sigma^z_{m'} f_{\iota(\mu)} = \mu(m)_{\mathbb{C}}\, \mu(m')_{\mathbb{C}}\, f_{\iota(\mu)}$$

が成り立つ。記号は 主張 12.13 のものである。

証明.

$$
\begin{aligned}
\sigma^z_m \sigma^z_{m'} f_{\iota(\mu)} &= \sigma^z_m \left(\sigma^z_{m'} f_{\iota(\mu)} \right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \sigma^z_m \left(\mu(m')_{\mathbb{C}}\, f_{\iota(\mu)} \right) \quad (\because \text{主張 12.13 を} m' \text{ で}) \\
&= \mu(m')_{\mathbb{C}} \left(\sigma^z_m f_{\iota(\mu)} \right) \quad (\because \text{主張 2.19}) \\
&= \mu(m')_{\mathbb{C}} \left(\mu(m)_{\mathbb{C}}\, f_{\iota(\mu)} \right) \quad (\because \text{主張 12.13 を} m \text{ で}) \\
&= \left(\mu(m')_{\mathbb{C}}\, \mu(m)_{\mathbb{C}} \right) f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{主張 2.41}) \\
&= \mu(m)_{\mathbb{C}}\, \mu(m')_{\mathbb{C}}\, f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{主張 1.56 の乗法の交換律}).
\end{aligned}
$$

□

主張 12.15 (σ^z_m は対角行列)**.** $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について、定義 12.8 の $\sigma^z_m \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ は対角行列（定義 4.2）である。

証明. 準備。$s, t \in \{1, 2\}$、$s \neq t$ について $(I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})})_{st} = \delta_{st} = 0_{\mathbb{C}}$（定義 2.2、定義 2.1）、$(\sigma^z)_{st} = 0_{\mathbb{C}}$（主張 6.1）である。第 p 因子 ($p \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$) を $A_p := \sigma^z$ $(p = m)$、$A_p := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ $(p \neq m)$ とおくと、どの p についても $s \neq t \Rightarrow (A_p)_{st} = 0_{\mathbb{C}}$ である。

$k, l \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$、$k \neq l$ を取る。定義 2.72 の ν は全単射なので $k = \nu(K)$、$l = \nu(L)$ となる $K = (k_1, \ldots, k_{M_{\mathrm{col}}})$, $L = (l_1, \ldots, l_{M_{\mathrm{col}}}) \in \mathcal{I}$ がある。$k \neq l$ より $K \neq L$ なので、$k_n \neq l_n$ となる $n \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ がある。

$$
\begin{aligned}
(\sigma^z_m)_{kl} &= (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})_{\nu(K),\nu(L)} \quad (\because \text{定義 12.8}) \\
&= \prod_{p=1}^{M_{\mathrm{col}}} (A_p)_{k_p l_p} \quad (\because \text{定義 2.72 (2)}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 1.65 を、準備の} (A_n)_{k_n l_n} = 0_{\mathbb{C}}\ (k_n \neq l_n) \text{ で}).
\end{aligned}
$$

□

主張 12.16 ($\sigma^z_m \sigma^z_{m'}$ は対角行列)**.** $m, m' \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について、$\sigma^z_m \sigma^z_{m'} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（定義 1.6 の積）は対角行列（定義 4.2）である。

証明. $k,l \in \{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$、$k \neq l$ を取る。$q \in \{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について、$q \neq k$ なら $(\sigma^z_m)_{kq} = 0_{\mathbb{C}}$（主張 12.15）なので $(\sigma^z_m)_{kq}(\sigma^z_{m'})_{ql} = 0_{\mathbb{C}}\,(\sigma^z_{m'})_{ql} = 0_{\mathbb{C}}$（主張 1.58）、$q = k$ なら $(\sigma^z_{m'})_{ql} = (\sigma^z_{m'})_{kl} = 0_{\mathbb{C}}$（主張 12.15 を m' で）なので $(\sigma^z_m)_{kq}(\sigma^z_{m'})_{ql} = (\sigma^z_m)_{kq}\,0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}}$（主張 1.59）である。したがって

$$\begin{aligned}
(\sigma^z_m\sigma^z_{m'})_{kl} &= \sum_{q=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (\sigma^z_m)_{kq}(\sigma^z_{m'})_{ql} \quad (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \sum_{q=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の各項が} 0_{\mathbb{C}} \text{ であることを各} q \text{ へ同時に適用}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 1.18}).
\end{aligned}$$

□

主張 12.17 (f_I の第$\nu(I)$ 成分は1)**.** 定義 4.1 を $M := M_{\mathrm{col}}$ として用いたときの $f_I \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ と、定義 2.72 の番号付け ν について、$I = (i_1,\dots,i_{M_{\mathrm{col}}}) \in \mathcal{I}$ ならば

$$(f_I)_{\nu(I)} = 1_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。$1_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記である。

証明.

$$\begin{aligned}
(f_I)_{\nu(I)} &= \left(e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}}\right)_{\nu(I)} \quad (\because \text{定義 4.1}) \\
&= \prod_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} (e_{i_k})_{i_k} \quad (\because \text{定義 2.72 (1)}) \\
&= \prod_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} 1_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 4.1 の} e_1 = (1,0),\ e_2 = (0,1) \text{ より} (e_1)_1 = (e_2)_2 = 1_{\mathbb{C}} \text{ を各因子へ同時に適用}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 1.66}).
\end{aligned}$$

□

主張 12.18 ($\sigma^z_m\sigma^z_{m'}$ の対角成分)**.** $\mu \in \mathfrak{M}$、$m,m' \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、$k := \nu(\iota(\mu)) \in \{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$（定義 2.72 の ν、定義 12.11 の ι）とおくと

$$(\sigma^z_m\sigma^z_{m'})_{kk} = \mu(m)_{\mathbb{C}}\,\mu(m')_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。記号は 主張 12.13 のものである。

証明. 準備。$l \in \{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$、$l \neq k$ について、主張 12.16 より $(\sigma^z_m\sigma^z_{m'})_{kl} = 0_{\mathbb{C}}$ なので、主張 1.58 より $(\sigma^z_m\sigma^z_{m'})_{kl}\,(f_{\iota(\mu)})_l = 0_{\mathbb{C}}$ である。

$$\begin{aligned}
(\sigma^z_m\sigma^z_{m'})_{kk} &= (\sigma^z_m\sigma^z_{m'})_{kk}\,1_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 1.56 の乗法の単位元}) \\
&= (\sigma^z_m\sigma^z_{m'})_{kk}\,(f_{\iota(\mu)})_k \quad (\because \text{主張 12.17 を} I = \iota(\mu) \text{ で}) \\
&= \sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (\sigma^z_m\sigma^z_{m'})_{kl}\,(f_{\iota(\mu)})_l \quad (\because \text{主張 1.68 を、準備の} l \neq k \text{ の項が} 0_{\mathbb{C}} \text{ であることで}) \\
&= \left(\sigma^z_m\sigma^z_{m'}\,f_{\iota(\mu)}\right)_k \quad (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \left(\mu(m)_{\mathbb{C}}\,\mu(m')_{\mathbb{C}}\,f_{\iota(\mu)}\right)_k \quad (\because \text{主張 12.14}) \\
&= \mu(m)_{\mathbb{C}}\,\mu(m')_{\mathbb{C}}\,(f_{\iota(\mu)})_k \quad (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \mu(m)_{\mathbb{C}}\,\mu(m')_{\mathbb{C}}\,1_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 12.17 を} I = \iota(\mu) \text{ で}) \\
&= \mu(m)_{\mathbb{C}}\,\mu(m')_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 1.56 の乗法の単位元}).
\end{aligned}$$

□

主張 12.19 (V_1 のパウリ行列表示)**.** 定義 12.6 で成分により定めた $V_1 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（結合定数 $K_1 \in \mathbb{R}_{>0}$）は、定義 12.8 のサイトごとの Pauli 行列族と 定義 12.9 の周期的な延長を用いて

$$V_1 = \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) = \exp\bigl(K_1 \left(\sigma_1^z \sigma_2^z + \sigma_2^z \sigma_3^z + \cdots + \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z \sigma_1^z \right) \bigr)$$

と表せる。ここに現れる exp は、定義 3.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

証明. $D := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（定義 2.5 の有限和）とおく。$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について $m^+ := m+1$ $(m \leq M_{\mathrm{col}} - 1)$、$m^+ := 1$ $(m = M_{\mathrm{col}})$ とおく。$m^+ \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ であり、定義 12.9 より $\sigma_{m+1}^z = \sigma_{m^+}^z$、定義 12.6 の周期規約 $\mu(M_{\mathrm{col}}+1) := \mu(1)$ より $\mu(m+1) = \mu(m^+)$ である。$\mu \in \mathfrak{M}$ について $d(\mu) := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1) \in \mathbb{R}$ とおく。

中間目標: D は対角行列（定義 4.2）である。$k, l \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$、$k \neq l$ を取る。

$$\begin{aligned}
D_{kl} &= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right)_{kl} && (\because \text{主張 2.7}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\sigma_m^z \sigma_{m^+}^z \right)_{kl} && (\because \sigma_{m+1}^z = \sigma_{m^+}^z \text{ を各項へ同時に適用}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 12.16 を各} (m, m^+) \text{ へ同時に適用}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.18}).
\end{aligned}$$

中間目標: D の対角成分。$\mu \in \mathfrak{M}$ を任意に取り、$k := \nu(\iota(\mu))$ とおく。

$$\begin{aligned}
D_{kk} &= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right)_{kk} && (\because \text{主張 2.7}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\sigma_m^z \sigma_{m^+}^z \right)_{kk} && (\because \sigma_{m+1}^z = \sigma_{m^+}^z \text{ を各項へ同時に適用}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)_{\mathbb{C}}\, \mu(m^+)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 12.18 を各} (m, m^+) \text{ へ同時に適用}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\mu(m)\, \mu(m^+) \right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29 を各項へ同時に適用}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\, \mu(m^+) \right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.20}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\, \mu(m+1) \right)_{\mathbb{C}} && (\because \mu(m+1) = \mu(m^+) \text{ を各項へ同時に適用}) \\
&= d(\mu)_{\mathbb{C}} && (\because d(\mu) \text{ の定義}).
\end{aligned}$$

中間目標: $K_1 D$（定義 2.3 の $(K_1)_{\mathbb{C}}$ 倍）も対角行列で、対角成分は $(K_1)_{\mathbb{C}}\, d(\mu)_{\mathbb{C}}$ である。$k \neq l$ について

$$\begin{aligned}
(K_1 D)_{kl} &= (K_1)_{\mathbb{C}}\, D_{kl} && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= (K_1)_{\mathbb{C}}\, 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{上の} D \text{ が対角行列であること}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.59}),
\end{aligned}$$

であり、$k = \nu(\iota(\mu))$ について

$$\begin{aligned}(K_1 D)_{kk} &= (K_1)_{\mathbb{C}}\, D_{kk} && (\because \text{定義 2.3})\\ &= (K_1)_{\mathbb{C}}\, d(\mu)_{\mathbb{C}} && (\because \text{上の} D \text{ の対角成分}).\end{aligned}$$

定義 2.72 の ν と 主張 12.12・主張 12.5 より、どの $k \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ も $\nu(\iota(\mu))$ の形に書ける。

中間目標: 成分の一致。$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$\begin{aligned}(\exp(K_1 D))_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\mu')} &= (\exp(K_1 D))_{\nu(\iota(\mu)),\nu(\iota(\mu'))} && (\because \text{主張 12.12})\\ &= \begin{cases}\exp((K_1)_{\mathbb{C}}\, d(\mu)_{\mathbb{C}}) & (\nu(\iota(\mu)) = \nu(\iota(\mu')))\\ 0_{\mathbb{C}} & (\nu(\iota(\mu)) \neq \nu(\iota(\mu')))\end{cases} && (\because \text{主張 4.3 を、上の対角行列} K_1 D \text{ とその対角成分へ})\\ &= \begin{cases}\exp((K_1\, d(\mu))_{\mathbb{C}}) & (\nu(\iota(\mu)) = \nu(\iota(\mu')))\\ 0_{\mathbb{C}} & (\nu(\iota(\mu)) \neq \nu(\iota(\mu')))\end{cases} && (\because \text{主張 1.29})\\ &= \begin{cases}(\exp(K_1 d(\mu)))_{\mathbb{C}} & (\nu(\iota(\mu)) = \nu(\iota(\mu')))\\ 0_{\mathbb{C}} & (\nu(\iota(\mu)) \neq \nu(\iota(\mu')))\end{cases} && (\because \text{主張 3.18})\\ &= \begin{cases}(\exp(K_1 d(\mu)))_{\mathbb{C}} & (\mathrm{ord}(\mu) = \mathrm{ord}(\mu'))\\ 0_{\mathbb{C}} & (\mathrm{ord}(\mu) \neq \mathrm{ord}(\mu'))\end{cases} && (\because \text{主張 12.12})\\ &= \delta_{\mu=\mu'} \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1)\right) && (\because \text{主張 12.5 の単射性より} \mathrm{ord}(\mu) = \mathrm{ord}(\mu') \iff \mu = \mu')\\ &= (V_1)_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\mu')} && (\because \text{定義 12.6})\end{aligned}$$

主張 12.5 の全射性より、すべての行・列番号の組 $(k, l) \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}^2$ は $(\mathrm{ord}(\mu), \mathrm{ord}(\mu'))$ の形に書ける。したがってすべての成分が一致し、$V_1 = \exp(K_1 D)$ である。 □

定義 12.20 (正の結合定数上の双曲線正接)**.** 定義 3.19 の双曲線余弦・双曲線正弦を用いる。このイジング模型で用いる正の結合定数を $K \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。このとき

$$\tanh K := \frac{\sinh K}{\cosh K} \in \{y \in \mathbb{R} \mid 0 < y < 1\}$$

と定める。右辺が指定した集合の元になることを以下で確認する。

証明. 主張 3.21 の (3) を次の行で用いる。

$$\cosh K > \sinh K > 0 \quad (\because \text{主張 3.21 の (3)})$$

$$\cosh K > 0 \Longrightarrow \cosh K \neq 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の正の元は零でない})$$

$$K \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow K \in \mathbb{R} \quad (\because \mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{R})$$

$$K \in \mathbb{R} \Longrightarrow \sinh K, \cosh K \in \mathbb{R} \quad (\because \text{定義 3.19})$$

$$\sinh K, \cosh K \in \mathbb{R} \ \wedge\ \cosh K \neq 0 \Longrightarrow \frac{\sinh K}{\cosh K} \in \mathbb{R} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の零でない元による除法の閉性})$$

定義した実数の商の正値性は

$$\begin{aligned}\tanh K &= \frac{\sinh K}{\cosh K} && (\because \tanh \text{ の定義})\\ &> 0 && (\because \sinh K > 0 \text{ かつ } \cosh K > 0)\end{aligned}$$

上側の評価は

$$\begin{aligned}\tanh K &= \frac{\sinh K}{\cosh K} && (\because\ \tanh\ \text{の定義})\\ &< \frac{\cosh K}{\cosh K} && (\because\ \sinh K < \cosh K\ \text{かつ}\ \cosh K > 0)\\ &= 1 && (\because\ \cosh K \neq 0)\end{aligned}$$

である。以上より $\tanh K \in \{y \in \mathbb{R} \mid 0 < y < 1\}$ であり、定義可能性が確認できた。この項は実数の指数関数から定めた双曲線関数を正の実数上で割るため、有限な複素行列計算から実数解析へ移る先行定義である。 □

定義 12.21 (正の実数上の実対数)**.** 定義 3.11 の実数の exp を考える。主張 3.16 と 主張 3.17 より、$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}$ は狭義単調増加な単射である。全射であることは実解析の標準的な事実（連続性と中間値の定理）として用いる。その逆写像を正の実数上の実対数と呼び、

$$\log : \mathbb{R}_{>0} \longrightarrow \mathbb{R}$$

と書く。したがって、任意の $y \in \mathbb{R}_{>0}$ と $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$\exp(\log y) = y, \qquad \log(\exp x) = x$$

が成り立つ（逆写像の定義）。（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）この項は実数指数関数の全単射性と実対数を用いるため、有限な複素行列計算から実数解析へ移る先行定義である。

主張 12.22 (正の実数上の実対数は狭義単調増加)**.** 定義 12.21 の実対数について、$u, v \in \mathbb{R}_{>0}$ が $u < v$ を満たすなら $\log u < \log v$ である。

証明.（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）$u, v \in \mathbb{R}_{>0}$、$u < v$ とする。定義 12.21 より $\log u, \log v \in \mathbb{R}$ である。$\log u < \log v$ でないと仮定する。$\mathbb{R}$ の順序の三分律より、$\log v < \log u$ または $\log v = \log u$ である。

$\log v < \log u$ の場合。

$$\begin{aligned}v &= \exp(\log v) && \big(\because\ \text{定義 12.21 の}\ \exp(\log y) = y\big)\\ &< \exp(\log u) && \big(\because\ \log v < \log u\ \text{と主張 3.17}\big)\\ &= u && \big(\because\ \text{定義 12.21 の}\ \exp(\log y) = y\big)\end{aligned}$$

これは $u < v$ と両立しない（$\mathbb{R}$ の順序の非対称性）。

$\log v = \log u$ の場合。

$$\begin{aligned}v &= \exp(\log v) && \big(\because\ \text{定義 12.21 の}\ \exp(\log y) = y\big)\\ &= \exp(\log u) && (\because\ \log v = \log u)\\ &= u && \big(\because\ \text{定義 12.21 の}\ \exp(\log y) = y\big)\end{aligned}$$

これは $u < v$ と両立しない（$\mathbb{R}$ の順序の非反射性）。どちらの場合も矛盾するので、$\log u < \log v$ である。 □

主張 12.23 (1 より小さい正の実数の実対数は負)**.** 定義 12.21 の実対数について、$y \in \mathbb{R}$ が $0 < y < 1$ を満たすなら $\log y < 0$ である。

証明.（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）$y \in \mathbb{R}$、$0 < y < 1$ とする。$0 < y$ と $0 < 1$ より $y, 1 \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、定義 12.21 より $\log y, \log 1 \in \mathbb{R}$ である。

$$\begin{aligned}\log y &< \log 1 && \big(\because\ y < 1\ \text{と主張 12.22}\big)\\ &= \log(\exp 0) && \big(\because\ \text{主張 3.14}\big)\\ &= 0 && \big(\because\ \text{定義 12.21 の}\ \log(\exp x) = x\big)\end{aligned}$$

□

定義 12.24 (第一の双対結合定数)**.** 定義 12.2 の正の結合定数 $K_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ をとる。定義 12.20 の双曲線正接と 定義 12.21 の実対数を用いて、第一の双対結合定数を

$$K_1^* := -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \in \mathbb{R}_{>0}$$

と定める。右辺の定義可能性と正値性を以下で確認する。

証明.（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）この証明では、実数値の双曲線正接と実対数、および実数の順序を用いる。以下の各量の所属と符号を一段ずつ確認する。

$$K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow 0 < \tanh K_1 < 1 \quad (\because \text{ 定義 } 12.20)$$

$$0 < \tanh K_1 \Longrightarrow \tanh K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \mathbb{R}_{>0} \text{ の定義})$$

$$\tanh K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow \log(\tanh K_1) \in \mathbb{R} \quad (\because \text{ 定義 } 12.21 \text{ の } \log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R})$$

$$0 < \tanh K_1 < 1 \Longrightarrow \log(\tanh K_1) < 0 \quad (\because \text{ 主張 } 12.23)$$

$$-\frac{1}{2} \in \mathbb{R} \quad (\because \mathbb{R} \text{ は体であり、逆元と符号反転について閉じている})$$

$$-\frac{1}{2} < 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分数の大小})$$

$$-\frac{1}{2} \in \mathbb{R} \ \wedge \ \log(\tanh K_1) \in \mathbb{R} \Longrightarrow -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \in \mathbb{R} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の乗法についての閉性})$$

$$-\frac{1}{2} < 0 \ \wedge \ \log(\tanh K_1) < 0 \Longrightarrow -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) > 0 \quad (\because \text{ 負の実数二つの積は正である})$$

$$K_1^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \quad (\because K_1^* \text{ の定義})$$

$$K_1^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \ \wedge \ -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \in \mathbb{R} \Longrightarrow K_1^* \in \mathbb{R} \quad (\because \text{ 等しい対象による所属の置換})$$

$$K_1^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \ \wedge \ -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) > 0 \Longrightarrow K_1^* > 0 \quad (\because \text{ 等しい実数による左辺の置換})$$

$$K_1^* \in \mathbb{R} \ \wedge \ K_1^* > 0 \Longrightarrow K_1^* \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \mathbb{R}_{>0} \text{ の定義})$$

以上により、第一の双対結合定数は正の実数として定まる。 □

定義 12.25 (第二の双対結合定数)**.** 定義 12.2 の正の結合定数 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ をとる。定義 12.20 の双曲線正接と 定義 12.21 の実対数を用いて、第二の双対結合定数を

$$K_2^* := -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \in \mathbb{R}_{>0}$$

と定める。右辺の定義可能性と正値性を以下で確認する。

証明.（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）この証明では、実数値の双曲線正接と実対数、および実数の順序を用いる。以下の各量の所属と符号を一段ずつ確認する。

$$K_2 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow 0 < \tanh K_2 < 1 \quad (\because \text{ 定義 } 12.20)$$

$$0 < \tanh K_2 \Longrightarrow \tanh K_2 \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \mathbb{R}_{>0} \text{ の定義})$$

$$\tanh K_2 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow \log(\tanh K_2) \in \mathbb{R} \quad (\because \text{ 定義 } 12.21 \text{ の } \log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R})$$

$$0 < \tanh K_2 < 1 \Longrightarrow \log(\tanh K_2) < 0 \quad (\because \text{ 主張 } 12.23)$$

$$-\frac{1}{2} \in \mathbb{R} \quad (\because \mathbb{R} \text{ は体であり、逆元と符号反転について閉じている})$$

$$-\frac{1}{2} < 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分数の大小})$$

$$-\frac{1}{2} \in \mathbb{R} \ \wedge \ \log(\tanh K_2) \in \mathbb{R} \Longrightarrow -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \in \mathbb{R} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の乗法についての閉性})$$

$$-\frac{1}{2} < 0 \ \wedge \ \log(\tanh K_2) < 0 \Longrightarrow -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) > 0 \quad (\because \text{ 負の実数二つの積は正である})$$

$$K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \quad (\because K_2^* \text{ の定義})$$

$$K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \ \wedge \ -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \in \mathbb{R} \Longrightarrow K_2^* \in \mathbb{R} \quad (\because \text{ 等しい対象による所属の置換})$$

$$K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \ \wedge \ -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) > 0 \Longrightarrow K_2^* > 0 \quad (\because \text{ 等しい実数による左辺の置換})$$

$$K_2^* \in \mathbb{R} \ \wedge \ K_2^* > 0 \Longrightarrow K_2^* \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \mathbb{R}_{>0} \text{ の定義})$$

以上により、第二の双対結合定数は正の実数として定まる。 □

定義 12.26 (双曲線関数の添字つき略記)**.** 定義 12.2 の正の結合定数 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、および定義 12.24 と 定義 12.25 で定めた双対結合定数 K_1^*, K_2^* に対し、各 $i \in \{1, 2\}$ について次の略記を定める。

- $c_i := \cosh 2K_i, \quad s_i := \sinh 2K_i, \quad c_i^* := \cosh 2K_i^*, \quad s_i^* := \sinh 2K_i^*$

右辺の双曲線余弦と双曲線正弦は 定義 3.19 で定めた実数値関数である。したがって各 $i \in \{1, 2\}$ について $c_i, s_i, c_i^*, s_i^* \in \mathbb{R}$ である。

主張 12.27 (2×2 の転送行列の恒等式)**.** $K_2\in\mathbb{R}_{>0}$ とし、定義 12.25 の $K_2^*=-\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$、定義 12.26 の $s_2=\sinh 2K_2$ を用いる。この主張では、複素行列の成分に書いた実数 a は 定義 1.13 の像 $a_{\mathbb{C}}$ の略記であり、実数 a と複素行列 X の積 aX は 定義 2.3 のスカラー倍 $a_{\mathbb{C}}X$ の略記である（証明では $a_{\mathbb{C}}$ と明示して書く）。$A\in\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ を

$$A:=\begin{pmatrix}\exp(K_2) & \exp(-K_2)\\ \exp(-K_2) & \exp(K_2)\end{pmatrix}$$

（すなわち $A_{ij}=\exp(K_2\varsigma_i\varsigma_j)$、$\varsigma_1:=+1,\ \varsigma_2:=-1$）と定めると、

$$A=(2s_2)^{1/2}\exp(K_2^*\,\sigma^x)$$

が成り立つ。ここで $(2s_2)^{1/2}$ は正の実数 $2s_2$（主張 13.14）の非負平方根 $\sqrt{2s_2}^{(\mathbb{R}_{\geq0})}$（定義 1.4）、$\sigma^x$ は 主張 6.1 の Pauli 行列、exp は 定義 3.4 (1) の行列の exp である。

証明. 証明の中で使う記号を先に置く。$\tau\in\mathbb{R}$ とし、$B_\tau:=\tau_{\mathbb{C}}\,\sigma^x\in\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ とおく。$m\in\mathbb{Z}_{\geq0}$ について $b^{(m)}\in\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ を、m が偶数なら $b^{(m)}:=I$、奇数なら $b^{(m)}:=\sigma^x$ と定め、実数 $\beta_{ij}^{(m)}\in\mathbb{R}$ $(i,j\in\{1,2\})$ を

$$\beta_{11}^{(m)}=\beta_{22}^{(m)}:=\frac{1+(-1)^m}{2},\qquad \beta_{12}^{(m)}=\beta_{21}^{(m)}:=\frac{1-(-1)^m}{2}$$

と定める。主張 6.1 の σ^x の成分と、定義 2.2・定義 2.1 の $I_{ij}=\delta_{ij}$ より、$(b^{(m)})_{ij}=\big(\beta_{ij}^{(m)}\big)_{\mathbb{C}}$ である。4 通りを書き下すと、定義 1.13 の略記 $1_{\mathbb{C}}=(1)_{\mathbb{C}}$、$0_{\mathbb{C}}=(0)_{\mathbb{C}}$ により

	$i=j$	$i\neq j$
m 偶数	$(b^{(m)})_{ij}=I_{ij}=\delta_{ij}=1_{\mathbb{C}}=(1)_{\mathbb{C}}=\big(\beta_{ij}^{(m)}\big)_{\mathbb{C}}$	$(b^{(m)})_{ij}=I_{ij}=\delta_{ij}=0_{\mathbb{C}}=(0)_{\mathbb{C}}=\big(\beta_{ij}^{(m)}\big)_{\mathbb{C}}$
m 奇数	$(b^{(m)})_{ij}=(\sigma^x)_{ij}=0_{\mathbb{C}}=(0)_{\mathbb{C}}=\big(\beta_{ij}^{(m)}\big)_{\mathbb{C}}$	$(b^{(m)})_{ij}=(\sigma^x)_{ij}=1_{\mathbb{C}}=(1)_{\mathbb{C}}=\big(\beta_{ij}^{(m)}\big)_{\mathbb{C}}$

である。$x\in\mathbb{R}$ と $N\in\mathbb{Z}_{\geq0}$ について $E_N(x):=\sum_{m=0}^{N}\frac{x^m}{m!}\in\mathbb{R}$（主張 3.12 の部分和）とおく。さらに $t:=\tanh K_2\in\mathbb{R}$、$r:=\sqrt{t}^{(\mathbb{R}_{\geq0})}\in\mathbb{R}_{\geq0}$、$q:=(2s_2)^{1/2}=\sqrt{2s_2}^{(\mathbb{R}_{\geq0})}\in\mathbb{R}_{\geq0}$ とおく。定義 12.20 より $0<t<1$、定義 1.4 より $r^2=t$・$q^2=2s_2$ である。$r=0$ なら $t=r^2=0$ となって $0<t$ に反するので $r>0$ である。定義 12.25 より $K_2^*\in\mathbb{R}_{>0}$ なので 主張 13.14 が当てはまり、$s_2>0$ から同じく $q>0$ である。最後に、$x,y\in\mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}
x_{\mathbb{C}}-y_{\mathbb{C}}&=x_{\mathbb{C}}+\big(-y_{\mathbb{C}}\big) && (\because \text{定義 1.15})\\
&=x_{\mathbb{C}}+(-1_{\mathbb{C}})\,y_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.14})\\
&=x_{\mathbb{C}}+(-1)_{\mathbb{C}}\,y_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.13 の } -1_{\mathbb{C}}=\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1)=(-1)_{\mathbb{C}})\\
&=x_{\mathbb{C}}+\big((-1)\,y\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29})\\
&=\big(x+(-1)\,y\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.20 を 2 項へ当てた})\\
&=(x-y)_{\mathbb{C}} && (\because \text{実数の四則})
\end{aligned}$$

である。

中間目標: B_τ の冪 $B_\tau^m=(\tau^m)_{\mathbb{C}}\,b^{(m)}$。$p\in\mathbb{Z}_{\geq0}$ について $B_\tau^{2p}=(\tau^{2p})_{\mathbb{C}}\,I$ かつ $B_\tau^{2p+1}=(\tau^{2p+1})_{\mathbb{C}}\,\sigma^x$ を p の帰納法で示す。冪は 定義 3.4 (1) の $A^0:=I,\ A^{m+1}:=A^mA$ である。$p=0$ の偶数の冪は

$$\begin{aligned}
B_\tau^0&=I && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0:=I)\\
&=1_{\mathbb{C}}\,I && (\because \text{主張 2.42})\\
&=(\tau^0)_{\mathbb{C}}\,I && (\because \tau^0=1)
\end{aligned}$$

である。$B_\tau^{2p}=(\tau^{2p})_{\mathbb{C}}\,I$ を仮定すると

$$
\begin{aligned}
B_\tau^{2p+1} &= B_\tau^{2p}\, B_\tau && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A)\\
&= \big((\tau^{2p})_{\mathbb{C}}\, I\big)\, B_\tau && (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= \big((\tau^{2p})_{\mathbb{C}}\, I\big)\big(\tau_{\mathbb{C}}\, \sigma^x\big) && (\because B_\tau \text{ の定義})\\
&= (\tau^{2p})_{\mathbb{C}}\big(I\,(\tau_{\mathbb{C}}\, \sigma^x)\big) && (\because \text{主張 2.18})\\
&= (\tau^{2p})_{\mathbb{C}}\big(\tau_{\mathbb{C}}\, \sigma^x\big) && (\because \text{主張 2.16})\\
&= \big((\tau^{2p})_{\mathbb{C}}\, \tau_{\mathbb{C}}\big)\sigma^x && (\because \text{主張 2.41})\\
&= (\tau^{2p}\, \tau)_{\mathbb{C}}\, \sigma^x && (\because \text{主張 1.29})\\
&= (\tau^{2p+1})_{\mathbb{C}}\, \sigma^x && (\because \text{実数の冪 } \tau^k\tau = \tau^{k+1})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
B_\tau^{2p+2} &= B_\tau^{2p+1}\, B_\tau && (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A)\\
&= \big((\tau^{2p+1})_{\mathbb{C}}\, \sigma^x\big)\, B_\tau && (\because \text{直前の式})\\
&= \big((\tau^{2p+1})_{\mathbb{C}}\, \sigma^x\big)\big(\tau_{\mathbb{C}}\, \sigma^x\big) && (\because B_\tau \text{ の定義})\\
&= (\tau^{2p+1})_{\mathbb{C}}\big(\sigma^x\,(\tau_{\mathbb{C}}\, \sigma^x)\big) && (\because \text{主張 2.18})\\
&= (\tau^{2p+1})_{\mathbb{C}}\big(\tau_{\mathbb{C}}\,(\sigma^x\sigma^x)\big) && (\because \text{主張 2.19})\\
&= (\tau^{2p+1})_{\mathbb{C}}\big(\tau_{\mathbb{C}}\, I\big) && (\because \text{主張 6.1 の } \sigma^x\sigma^x = I)\\
&= \big((\tau^{2p+1})_{\mathbb{C}}\, \tau_{\mathbb{C}}\big) I && (\because \text{主張 2.41})\\
&= (\tau^{2p+1}\, \tau)_{\mathbb{C}}\, I && (\because \text{主張 1.29})\\
&= (\tau^{2p+2})_{\mathbb{C}}\, I && (\because \text{実数の冪 } \tau^k\tau = \tau^{k+1})
\end{aligned}
$$

であり、p での二つの等式が p の奇数の冪と $p+1$ の偶数の冪の等式を与える。$b^{(m)}$ の定義により、これは $B_\tau^m = (\tau^m)_{\mathbb{C}}\, b^{(m)}$ $(m \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$ である。

中間目標: 指数級数の各項の成分。$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$i, j \in \{1, 2\}$ について

$$
\begin{aligned}
\Big(\tfrac{1}{m!}\, B_\tau^m\Big)_{ij} &= \Big(\tfrac{1}{m!}\Big)_{\mathbb{C}} \big(B_\tau^m\big)_{ij} && (\because \text{定義 2.3})\\
&= \Big(\tfrac{1}{m!}\Big)_{\mathbb{C}} \big((\tau^m)_{\mathbb{C}}\, b^{(m)}\big)_{ij} && (\because \text{冪の中間目標})\\
&= \Big(\tfrac{1}{m!}\Big)_{\mathbb{C}} \Big((\tau^m)_{\mathbb{C}}\, \big(b^{(m)}\big)_{ij}\Big) && (\because \text{定義 2.3})\\
&= \Big(\tfrac{1}{m!}\Big)_{\mathbb{C}} \Big((\tau^m)_{\mathbb{C}}\, \big(\beta_{ij}^{(m)}\big)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because (b^{(m)})_{ij} = (\beta_{ij}^{(m)})_{\mathbb{C}})\\
&= \Big(\tfrac{1}{m!}\Big)_{\mathbb{C}} \big(\tau^m\, \beta_{ij}^{(m)}\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29})\\
&= \Big(\tfrac{1}{m!}\, \tau^m\, \beta_{ij}^{(m)}\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29})
\end{aligned}
$$

であり、その実数は

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{m!}\, \tau^m\, \beta_{11}^{(m)} &= \tfrac{1}{m!}\, \tau^m\, \frac{1 + (-1)^m}{2} && (\because \beta_{11}^{(m)} \text{ の定義})\\
&= \frac{\tau^m + (-1)^m \tau^m}{2 \cdot m!} && (\because \text{実数の分配則})\\
&= \frac{\tau^m + (-\tau)^m}{2 \cdot m!} && (\because \text{実数の冪 } (-1)^m\tau^m = (-\tau)^m),\\
\tfrac{1}{m!}\, \tau^m\, \beta_{12}^{(m)} &= \tfrac{1}{m!}\, \tau^m\, \frac{1 - (-1)^m}{2} && (\because \beta_{12}^{(m)} \text{ の定義})\\
&= \frac{\tau^m - (-1)^m \tau^m}{2 \cdot m!} && (\because \text{実数の分配則})\\
&= \frac{\tau^m - (-\tau)^m}{2 \cdot m!} && (\because \text{実数の冪 } (-1)^m\tau^m = (-\tau)^m)
\end{aligned}
$$

である ($\beta_{22}^{(m)} = \beta_{11}^{(m)}$、$\beta_{21}^{(m)} = \beta_{12}^{(m)}$)。

中間目標: 部分和の成分。$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $S_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} B_\tau^m \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ とおく。$(i,j) = (1,1), (2,2)$ について

$$\begin{aligned}
(S_N)_{ij} &= \sum_{m=0}^{N} \Big(\tfrac{1}{m!}\, B_\tau^m \Big)_{ij} && (\because \text{主張 2.7}) \\
&= \sum_{m=0}^{N} \Big(\frac{\tau^m + (-\tau)^m}{2 \cdot m!} \Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{各項の成分の中間目標}) \\
&= \Big(\sum_{m=0}^{N} \frac{\tau^m + (-\tau)^m}{2 \cdot m!} \Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.20}) \\
&= \Big(\frac{1}{2} \Big(\sum_{m=0}^{N} \frac{\tau^m}{m!} + \sum_{m=0}^{N} \frac{(-\tau)^m}{m!} \Big) \Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{実数の有限和の分配則}) \\
&= \Big(\frac{E_N(\tau) + E_N(-\tau)}{2} \Big)_{\mathbb{C}} && (\because E_N \text{ の定義})
\end{aligned}$$

であり、$(i,j) = (1,2), (2,1)$ について

$$\begin{aligned}
(S_N)_{ij} &= \sum_{m=0}^{N} \Big(\tfrac{1}{m!}\, B_\tau^m \Big)_{ij} && (\because \text{主張 2.7}) \\
&= \sum_{m=0}^{N} \Big(\frac{\tau^m - (-\tau)^m}{2 \cdot m!} \Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{各項の成分の中間目標}) \\
&= \Big(\sum_{m=0}^{N} \frac{\tau^m - (-\tau)^m}{2 \cdot m!} \Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.20}) \\
&= \Big(\frac{1}{2} \Big(\sum_{m=0}^{N} \frac{\tau^m}{m!} - \sum_{m=0}^{N} \frac{(-\tau)^m}{m!} \Big) \Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{実数の有限和の分配則}) \\
&= \Big(\frac{E_N(\tau) - E_N(-\tau)}{2} \Big)_{\mathbb{C}} && (\because E_N \text{ の定義})
\end{aligned}$$

である。

中間目標: 部分和の成分の極限。$u_N := \big| E_N(\tau) - \exp(\tau) \big|$、$v_N := \big| E_N(-\tau) - \exp(-\tau) \big|$ とおく ($\mathbb{R}$ の絶対値)。$(i,j) = (1,1), (2,2)$ について

$$\begin{aligned}
\big| (S_N)_{ij} - (\cosh \tau)_{\mathbb{C}} \big| &= \Big| \Big(\frac{E_N(\tau) + E_N(-\tau)}{2} \Big)_{\mathbb{C}} - (\cosh \tau)_{\mathbb{C}} \Big| && (\because \text{部分和の成分の中間目標}) \\
&= \Big| \Big(\frac{E_N(\tau) + E_N(-\tau)}{2} - \cosh \tau \Big)_{\mathbb{C}} \Big| && (\because \text{準備の } x_{\mathbb{C}} - y_{\mathbb{C}} = (x-y)_{\mathbb{C}}) \\
&= \Big| \frac{E_N(\tau) + E_N(-\tau)}{2} - \cosh \tau \Big| && (\because \text{主張 1.75 (6)}) \\
&= \Big| \frac{E_N(\tau) + E_N(-\tau)}{2} - \frac{\exp(\tau) + \exp(-\tau)}{2} \Big| && (\because \text{定義 3.19}) \\
&= \Big| \frac{\big(E_N(\tau) - \exp(\tau) \big) + \big(E_N(-\tau) - \exp(-\tau) \big)}{2} \Big| && (\because \text{実数の四則}) \\
&\leq \frac{u_N + v_N}{2} && (\because \text{実数の絶対値の三角不等式})
\end{aligned}$$

であり、$(i,j) = (1,2), (2,1)$ について

$$
\begin{aligned}
\big|(S_N)_{ij} - (\sinh\tau)_{\mathbb{C}}\big| &= \Big|\Big(\frac{E_N(\tau)-E_N(-\tau)}{2}\Big)_{\mathbb{C}} - (\sinh\tau)_{\mathbb{C}}\Big| && (\because \text{部分和の成分の中間目標})\\
&= \Big|\Big(\frac{E_N(\tau)-E_N(-\tau)}{2} - \sinh\tau\Big)_{\mathbb{C}}\Big| && (\because \text{準備の } x_{\mathbb{C}} - y_{\mathbb{C}} = (x-y)_{\mathbb{C}})\\
&= \Big|\frac{E_N(\tau)-E_N(-\tau)}{2} - \sinh\tau\Big| && (\because \text{主張 1.75 (6)})\\
&= \Big|\frac{E_N(\tau)-E_N(-\tau)}{2} - \frac{\exp(\tau)-\exp(-\tau)}{2}\Big| && (\because \text{定義 3.19})\\
&= \Big|\frac{\big(E_N(\tau)-\exp(\tau)\big)-\big(E_N(-\tau)-\exp(-\tau)\big)}{2}\Big| && (\because \text{実数の四則})\\
&\le \frac{u_N+v_N}{2} && (\because \text{実数の絶対値の三角不等式})
\end{aligned}
$$

である。主張 3.12 を $K=\mathbb{R}$、$x=\tau$ と $x=-\tau$ へ当てると、定義 2.91 の K の列の収束の意味で $u_N\to 0$、$v_N\to 0$ である。$\varepsilon\in\mathbb{R}_{>0}$ に対し、$N\ge N_1$ で $u_N<\varepsilon$、$N\ge N_2$ で $v_N<\varepsilon$ となる $N_1,N_2\in\mathbb{Z}_{\ge 0}$ を取ると、$N\ge\max(N_1,N_2)$ で $(u_N+v_N)/2<\varepsilon$ である。よって 定義 2.91 の $\mathbb{C}$ の列の収束の意味で $(S_N)_{ij}\to(\cosh\tau)_{\mathbb{C}}$ $((i,j)=(1,1),(2,2))$、$(S_N)_{ij}\to(\sinh\tau)_{\mathbb{C}}$ $((i,j)=(1,2),(2,1))$ である（$\mathbb{R}$ への脱出: 極限）。一方 定理 3.3 (1b) より $(S_N)_{ij}\to\big(\exp(B_\tau)\big)_{ij}$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
\exp(\tau\sigma^x) &= \exp(B_\tau) && (\because \text{主張の記法の約束と } B_\tau \text{ の定義})\\
&= \begin{pmatrix}(\cosh\tau)_{\mathbb{C}} & (\sinh\tau)_{\mathbb{C}}\\ (\sinh\tau)_{\mathbb{C}} & (\cosh\tau)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix} && (\because \text{四つの成分へ 主張 3.10 を同時適用。行列は成分で定まる})
\end{aligned}
$$

である。$\tau=K_2^*$ として

$$
\begin{aligned}
(2s_2)^{1/2}\exp(K_2^*\sigma^x) &= q_{\mathbb{C}}\,\exp\big(B_{K_2^*}\big) && (\because q \text{ の定義と主張の記法の約束})\\
&= q_{\mathbb{C}}\begin{pmatrix}(\cosh K_2^*)_{\mathbb{C}} & (\sinh K_2^*)_{\mathbb{C}}\\ (\sinh K_2^*)_{\mathbb{C}} & (\cosh K_2^*)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix} && (\because \text{直前の式に } \tau=K_2^* \text{ を代入})\\
&= \begin{pmatrix}q_{\mathbb{C}}(\cosh K_2^*)_{\mathbb{C}} & q_{\mathbb{C}}(\sinh K_2^*)_{\mathbb{C}}\\ q_{\mathbb{C}}(\sinh K_2^*)_{\mathbb{C}} & q_{\mathbb{C}}(\cosh K_2^*)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.3})\\
&= \begin{pmatrix}(q\cosh K_2^*)_{\mathbb{C}} & (q\sinh K_2^*)_{\mathbb{C}}\\ (q\sinh K_2^*)_{\mathbb{C}} & (q\cosh K_2^*)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.29})
\end{aligned}
$$

である。以下で次の 2 つの実数の等式を示す。

$$
q\cosh K_2^* = \exp(K_2),\qquad q\sinh K_2^* = \exp(-K_2)
$$

中間目標: $\exp(\pm K_2^*)$ を r で書く。

$$
\begin{aligned}
\exp(-2K_2^*) &= \exp\Big(-2\cdot\big(-\tfrac{1}{2}\log(\tanh K_2)\big)\Big) && (\because \text{定義 12.25})\\
&= \exp\Big(-2\cdot\big(-\tfrac{1}{2}\log t\big)\Big) && (\because t \text{ の定義})\\
&= \exp(\log t) && (\because -2\cdot\big(-\tfrac{1}{2}\big)=1)\\
&= t && (\because \text{定義 12.21 の } \exp(\log y)=y)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\big(\exp(-K_2^*)\big)^2 &= \exp(-K_2^*)\exp(-K_2^*) && (\because \text{実数の二乗})\\
&= \exp(-2K_2^*) && (\because \text{主張 3.13})\\
&= t && (\because \text{直前の式})
\end{aligned}
$$

主張 3.16 より $\exp(-K_2^*) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ であり、その二乗は t なので、主張 1.3 の一意性と 定義 1.4 より $\exp(-K_2^*) = r$ である。また

$$\begin{aligned} \exp(K_2^*)\, r &= \exp(K_2^*) \exp(-K_2^*) && (\because \exp(-K_2^*) = r) \\ &= \exp(0) && (\because \text{主張 3.13}) \\ &= 1 && (\because \text{主張 3.14}) \end{aligned}$$

であり $r > 0$ なので $\exp(K_2^*) = 1/r$ である。よって

$$\begin{aligned} \cosh K_2^* &= \frac{\exp(K_2^*) + \exp(-K_2^*)}{2} && (\because \text{定義 3.19}) \\ &= \frac{1/r + r}{2} && (\because \exp(K_2^*) = 1/r,\ \exp(-K_2^*) = r \text{ を同時に代入}) \\ &= \frac{1 + r^2}{2r} && (\because \text{分子・分母に } r \text{ を掛ける}) \\ &= \frac{1 + t}{2r} && (\because r^2 = t), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sinh K_2^* &= \frac{\exp(K_2^*) - \exp(-K_2^*)}{2} && (\because \text{定義 3.19}) \\ &= \frac{1/r - r}{2} && (\because \exp(K_2^*) = 1/r,\ \exp(-K_2^*) = r \text{ を同時に代入}) \\ &= \frac{1 - r^2}{2r} && (\because \text{分子・分母に } r \text{ を掛ける}) \\ &= \frac{1 - t}{2r} && (\because r^2 = t) \end{aligned}$$

である。主張 3.21 (3) より $\cosh K_2 > 0$、$\sinh K_2 > 0$ なので

$$\begin{aligned} 1 + t &= 1 + \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2} && (\because \text{定義 12.20}) \\ &= \frac{\cosh K_2 + \sinh K_2}{\cosh K_2} && (\because \text{通分}) \\ &= \frac{\exp(K_2)}{\cosh K_2} && (\because \text{主張 3.21 (1)}), \\ 1 - t &= 1 - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2} && (\because \text{定義 12.20}) \\ &= \frac{\cosh K_2 - \sinh K_2}{\cosh K_2} && (\because \text{通分}) \\ &= \frac{\exp(-K_2)}{\cosh K_2} && (\because \text{主張 3.21 (1)}) \end{aligned}$$

である。

中間目標: 前因子 $q/(2r) = \cosh K_2$。

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{q}{2r}\right)^2 &= \frac{q^2}{4r^2} && (\because \text{分数の二乗})\\
&= \frac{2s_2}{4r^2} && (\because q^2 = 2s_2)\\
&= \frac{2s_2}{4t} && (\because r^2 = t)\\
&= \frac{2\sinh 2K_2}{4t} && (\because \text{定義 } 12.26 \text{ の } s_2 = \sinh 2K_2)\\
&= \frac{2\cdot 2\sinh\left(\frac{2K_2}{2}\right)\cosh\left(\frac{2K_2}{2}\right)}{4t} && (\because \text{主張 } 11.7 \text{ を } x = 2K_2 \text{ へ当てた})\\
&= \frac{2\cdot 2\sinh K_2\cosh K_2}{4t} && (\because \tfrac{2K_2}{2} = K_2)\\
&= \frac{\sinh K_2\cosh K_2}{t} && (\because 2\cdot 2 = 4 \text{ で約分})\\
&= \sinh K_2\cosh K_2\cdot\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} && (\because \text{定義 } 12.20 \text{ の } t = \tfrac{\sinh K_2}{\cosh K_2})\\
&= (\cosh K_2)^2 && (\because \sinh K_2 \neq 0 \text{ で約分})
\end{aligned}
$$

$q > 0$、$r > 0$ より $q/(2r) > 0$、また $\cosh K_2 > 0$ なので、主張 3.21 (4) より $q/(2r) = \cosh K_2$ である。

中間目標: 示すべき 2 つの等式。

$$
\begin{aligned}
q\cosh K_2^* &= q\,\frac{1+t}{2r} && (\because \cosh K_2^* = \tfrac{1+t}{2r})\\
&= \frac{q}{2r}\,(1+t) && (\because \text{積の並べ替え})\\
&= \cosh K_2\cdot(1+t) && (\because \tfrac{q}{2r} = \cosh K_2)\\
&= \cosh K_2\cdot\frac{\exp(K_2)}{\cosh K_2} && (\because 1+t = \tfrac{\exp(K_2)}{\cosh K_2})\\
&= \exp(K_2) && (\because \cosh K_2 \neq 0 \text{ で約分}),\\
q\sinh K_2^* &= q\,\frac{1-t}{2r} && (\because \sinh K_2^* = \tfrac{1-t}{2r})\\
&= \frac{q}{2r}\,(1-t) && (\because \text{積の並べ替え})\\
&= \cosh K_2\cdot(1-t) && (\because \tfrac{q}{2r} = \cosh K_2)\\
&= \cosh K_2\cdot\frac{\exp(-K_2)}{\cosh K_2} && (\because 1-t = \tfrac{\exp(-K_2)}{\cosh K_2})\\
&= \exp(-K_2) && (\because \cosh K_2 \neq 0 \text{ で約分})
\end{aligned}
$$

中間目標: 結論。

$$
\begin{aligned}
A &= \begin{pmatrix} (\exp K_2)_{\mathbb{C}} & (\exp(-K_2))_{\mathbb{C}} \\ (\exp(-K_2))_{\mathbb{C}} & (\exp K_2)_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because A \text{ の定義と主張の記法の約束})\\
&= \begin{pmatrix} (q\cosh K_2^*)_{\mathbb{C}} & (q\sinh K_2^*)_{\mathbb{C}} \\ (q\sinh K_2^*)_{\mathbb{C}} & (q\cosh K_2^*)_{\mathbb{C}} \end{pmatrix} && (\because \text{示すべき 2 つの等式を四つの成分へ同時に代入})\\
&= (2s_2)^{1/2}\exp(K_2^*\sigma^x) && (\because \text{上で求めた } (2s_2)^{1/2}\exp(K_2^*\sigma^x) \text{ の成分})
\end{aligned}
$$

□

定義 12.28 (第二の転送行列のパウリ行列表示の前係数)**.** 定義 12.2 の結合定数 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ と定義 12.1 の列数 M_{col} について、定義 1.4 の非負平方根を用いて

$$(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} := \left(\sqrt{2\sinh 2K_2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}_{>0}$$

と定める。ここに現れる sinh は 定義 3.19 の双曲線正弦である。$K_2 > 0$ と 主張 3.21 より $2\sinh 2K_2 > 0$ なので、平方根は正の実数として定まり、その M_{col} 乗も正の実数である。

主張 12.29 (V_2 のパウリ行列表示)**.** 定義 12.6 で成分により定めた $V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（結合定数 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$）は、定義 12.25 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 12.28 の前係数、定義 12.8 のサイトごとの Pauli 行列族を用いて

$$V_2 = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\right) = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(K_2^* \left(\sigma_1^x + \sigma_2^x + \cdots + \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x\right)\right)$$

と表せる。ここに現れる exp は、定義 3.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

証明. 主張 12.27 の $A \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$（$A_{ij} = \exp(K_2 \varsigma_i \varsigma_j)$、$\varsigma_1 = +1,\ \varsigma_2 = -1$）と、定義 12.26 の $s_2 = \sinh 2K_2$ を用いる。$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ について 定義 12.11 の $\iota(\mu) = (i_1, \ldots, i_{M_{\mathrm{col}}})$、$\iota(\mu') = (j_1, \ldots, j_{M_{\mathrm{col}}})$ と書くと、ι の定義より $\varsigma_{i_m} = \mu(m)$、$\varsigma_{j_m} = \mu'(m)$ である。

中間目標: V_2 を A のクロネッカー冪で書く。$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$\begin{aligned}
(V_2)_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\mu')} &= \exp\left(K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu'(m)\right) && (\because \text{定義 12.6}) \\
&= \exp\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} K_2\, \mu(m)\mu'(m)\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\
&= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\big(K_2\, \mu(m)\mu'(m)\big) && (\because \text{定理 3.7 を} n = 1,\ K = \mathbb{R} \text{ で有限和へ繰り返し適用}) \\
&= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} A_{i_m j_m} && (\because A \text{ の成分と} \varsigma_{i_m} = \mu(m),\ \varsigma_{j_m} = \mu'(m) \text{ を全因子へ同時適用}) \\
&= \left(\underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_{M_{\mathrm{col}}}\right)_{\nu(\iota(\mu)),\nu(\iota(\mu'))} && (\because \text{定義 2.72 (2) のクロネッカー積の成分}) \\
&= \left(\underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_{M_{\mathrm{col}}}\right)_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\mu')} && (\because \text{主張 12.12})
\end{aligned}$$

主張 12.5 の全射性より、すべての行・列番号の組は $(\mathrm{ord}(\mu), \mathrm{ord}(\mu'))$ の形に書けるので、$V_2 = A \boxtimes \cdots \boxtimes A$（$M_{\mathrm{col}}$ 個）である。

中間目標: 1 因子の exp をサイト演算子の exp にする。$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ を固定する。定義 12.8 の $\sigma_m^x = I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes I$（第 m 因子だけが σ^x）について、主張 2.73 (1) を繰り返し使うと $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ で

$$(\sigma_m^x)^p = I \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x)^p \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{主張 2.73 (1) と} I^p = I)$$

であり（$I \cdot I = I$ なので他の因子は I のまま）、部分和と 主張 2.74 の線型性、および 定義 2.72 (2) の成分表示による成分ごとの収束（主張 4.3 の極限の段と同じ評価 $|B_{kl}| \leq \|B\|$）から

$$\exp(K_2^* \sigma_m^x) = I \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{指数級数の部分和へ直前の冪の等式を適用し、成分ごとの極限を取る})$$

中間目標: 積にまとめる。相異なる $m \neq m'$ について σ_m^x と $\sigma_{m'}^x$ は可換である（主張 2.73 (1) より、積はどちらの順でも「第 m 因子と第 m' 因子が σ^x、他が I」になる）。

$$\exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\right) = \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(K_2^* \sigma_m^x) \qquad (\because \text{定理 3.7 を互いに可換な} K_2^*\sigma_m^x \text{ の有限和へ繰り返し適用})$$

$$= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} (I \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes I) \qquad (\because \text{直前の中間目標の等式を全因子へ同時適用})$$

$$= \underbrace{\exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x)}_{M_{\mathrm{col}}} \qquad (\because \text{主張 2.73 (1) で因子ごとの積にまとめる})$$

中間目標: 結論。

$$V_2 = \underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_{M_{\mathrm{col}}} \qquad (\because V_2 \text{ を} A \text{ のクロネッカー冪で書いた式})$$

$$= \underbrace{\left((2s_2)^{1/2} \exp(K_2^* \sigma^x)\right) \boxtimes \cdots \boxtimes \left((2s_2)^{1/2} \exp(K_2^* \sigma^x)\right)}_{M_{\mathrm{col}}} \qquad (\because \text{主張 12.27 を全因子へ同時適用})$$

$$= \left((2s_2)^{1/2}\right)^{M_{\mathrm{col}}} \underbrace{\exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x)}_{M_{\mathrm{col}}} \qquad (\because \text{主張 2.74 で各因子のスカラーを前へ出す})$$

$$= (2 \sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \underbrace{\exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x)}_{M_{\mathrm{col}}} \qquad (\because s_2 = \sinh 2K_2 \text{ と定義 12.28})$$

$$= (2 \sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\right) \qquad (\because \text{積にまとめた式})$$

□

主張 12.30 (Pauli 行列で書いた転送行列による分配関数の表式)**.** 定義 12.2 の Z、定義 12.8 のサイトごとの Pauli 行列族 $\sigma_m^x, \sigma_m^z \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と 定義 12.9 の周期的な延長、定義 12.25 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 12.28 の前係数 $(2 \sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ について、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき

$$Z(K_1, K_2) = \mathrm{tr}\left(\left(\exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) (2 \sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\right)\right)^{N_{\mathrm{row}}}\right)$$

が成り立つ。ここに現れる exp は、定義 3.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

証明. 定義 12.6 の $V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用いる。

$$Z(K_1, K_2) = \mathrm{tr}\big((V_1 V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big) \qquad (\because \text{主張 12.7})$$

$$= \mathrm{tr}\left(\left(\exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) V_2\right)^{N_{\mathrm{row}}}\right) \qquad (\because \text{主張 12.19})$$

$$= \mathrm{tr}\left(\left(\exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) (2 \sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\right)\right)^{N_{\mathrm{row}}}\right) \qquad (\because \text{主張 12.29})$$

□

13 ε の固有値 $+1$ の固有空間への射影と Jordan–Wigner 表示

定義 13.1 (Jordan–Wigner 行列族 Z_m)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 12.8 で定めたサイトごとの Pauli 行列族を用いる。各 $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対して、Jordan–Wigner 行列 Z_m を

$$Z_m := \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。$m = 1$ では左側の積を空積とし、$Z_1 := \sigma_1^z$ とする。また周期端では $Z_{M_{\mathrm{col}}+1} := Z_1$ と定める。ホロノミック量子場では Z_m を p_m と書く。

定義 13.2 (Jordan–Wigner 行列族 Y_m)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 12.8 で定めたサイトごとの Pauli 行列族を用いる。各 $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対して、Jordan–Wigner 行列 Y_m を

$$Y_m := \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。$m = 1$ では左側の積を空積とし、$Y_1 := \sigma_1^y$ とする。また周期端では $Y_{M_{\mathrm{col}}+1} := Y_1$ と定める。ホロノミック量子場では Y_m を q_m と書く。

定義 13.3 (全スピン反転行列)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 12.8 で定めたサイトごとの Pauli 行列族を用いて、全スピン反転行列を

$$\varepsilon := \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。積はサイト番号の昇順に取る。

主張 13.4 (先頭から並べたサイトの Pauli 行列の積のクロネッカー積表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$r \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$、$a_1, \ldots, a_r \in \{x, y, z\}$ とし、定義 12.8 の $\sigma_k^a \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、主張 6.1 の $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z$, $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$、定義 2.72 のクロネッカー積 $\boxtimes$ を用いる。積 $\sigma_1^{a_1} \sigma_2^{a_2} \cdots \sigma_r^{a_r}$ は左から順に掛けたもの、すなわち $P_1 := \sigma_1^{a_1}$、$P_{s+1} := P_s\, \sigma_{s+1}^{a_{s+1}}$（$1 \leq s < r$）で定めた P_r とする。このとき

$$\sigma_1^{a_1} \sigma_2^{a_2} \cdots \sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}} - r}$$

が成り立つ（$r = M_{\mathrm{col}}$ のとき I の因子は無い）。

証明. $s \in \{1, \ldots, r\}$ について $P_s = \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_s} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I$（$I$ は $M_{\mathrm{col}} - s$ 個）を s についての帰納法で示す。$s = r$ が主張である。$s = 1$ のとき、

$$\begin{aligned} P_1 &= \sigma_1^{a_1} && (\because\ P_1 \text{ の定義}) \\ &= \sigma^{a_1} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because\ \text{定義 12.8 の } k = 1) \end{aligned}$$

$s < r$ で成り立つとすると、

$$\begin{aligned} P_{s+1} &= P_s\, \sigma_{s+1}^{a_{s+1}} && (\because\ P_{s+1} \text{ の定義}) \\ &= \Big(\sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_s} \boxtimes \overbrace{I}^{(s+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I\Big)\Big(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{\sigma^{a_{s+1}}}^{(s+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I\Big) && (\because\ \text{帰納法の仮定と 定義 12.8 の } k = s+1) \\ &= (\sigma^{a_1} I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^{a_s} I) \boxtimes (I\sigma^{a_{s+1}}) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) && (\because\ \text{主張 2.73 (1)}) \\ &= \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_s} \boxtimes (I\sigma^{a_{s+1}}) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) && (\because\ \text{主張 2.17 を第 1 から第 } s \text{ 因子へ同時に適用}) \\ &= \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_s} \boxtimes \sigma^{a_{s+1}} \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) && (\because\ \text{主張 2.16 } (A \to \sigma^{a_{s+1}})) \\ &= \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_{s+1}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because\ \text{主張 2.16 } (A \to I) \text{ を第 } s+2 \text{ 以降の因子へ同時に適用}) \end{aligned}$$

□

主張 13.5 (全スピン反転行列のクロネッカー積表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.3 の ε、主張 6.1 の σ^x、定義 2.72 のクロネッカー積を用いる。このとき

$$\varepsilon = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}}$$

が成り立つ。

証明.

$\varepsilon = \sigma^x_1 \sigma^x_2 \cdots \sigma^x_{M_{\mathrm{col}}}$ ($\because$ 定義 13.3 (積はサイト番号の昇順)。括弧は左から掛ける形に付け替える。主張 2.15)

$= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}}$ ($\because$ 主張 13.4 ($r \to M_{\mathrm{col}},\ a_1 = \cdots = a_{M_{\mathrm{col}}} = x$))

□

主張 13.6 (ε とσ^x_k は可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 12.8 の σ^x_k について

$$\varepsilon\, \sigma^x_k = \sigma^x_k\, \varepsilon$$

が成り立つ。

証明. $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。主張 13.5 より ε の第 i 因子は $x_i := \sigma^x$、定義 12.8 より σ^x_k の第 i 因子は $y_k := \sigma^x$、$y_i := I$（$i \neq k$）である。$i \neq k$ について

$$\begin{aligned} y_i x_i &= I\sigma^x && (\because\ x_i, y_i \text{ の定義}) \\ &= \sigma^x && (\because\ \text{主張 2.16}) \\ &= \sigma^x I && (\because\ \text{主張 2.17}) \\ &= x_i y_i && (\because\ x_i, y_i \text{ の定義}) \end{aligned}$$

であり、$y_k x_k = \sigma^x \sigma^x = x_k y_k$ である。よって

$$\begin{aligned} \varepsilon\, \sigma^x_k &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I) && (\because\ \text{主張 13.5 と 定義 12.8}) \\ &= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I)(\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) && (\because\ \text{主張 6.15 } (X \to \varepsilon,\ Y \to \sigma^x_k)) \\ &= \sigma^x_k\, \varepsilon && (\because\ \text{定義 12.8 と 主張 13.5}) \end{aligned}$$

□

主張 13.7 (ε とσ^z_k は反可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 12.8 の σ^z_k について

$$\varepsilon\, \sigma^z_k = -\big(\sigma^z_k\, \varepsilon\big)$$

が成り立つ。

証明. $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。主張 13.5 より ε の第 i 因子は $x_i := \sigma^x$、定義 12.8 より σ^z_k の第 i 因子は $y_k := \sigma^z$、$y_i := I$（$i \neq k$）である。$i \neq k$ について

$$\begin{aligned} y_i x_i &= I\sigma^x && (\because\ x_i, y_i \text{ の定義}) \\ &= \sigma^x && (\because\ \text{主張 2.16}) \\ &= \sigma^x I && (\because\ \text{主張 2.17}) \\ &= x_i y_i && (\because\ x_i, y_i \text{ の定義}) \end{aligned}$$

であり、$y_k x_k = \sigma^z \sigma^x = -(\sigma^x \sigma^z) = -(x_k y_k)$（主張 6.1）である。よって

$$\begin{aligned} \varepsilon\, \sigma^z_k + \sigma^z_k\, \varepsilon &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I) + (I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I)(\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) && (\because\ \text{主張 13.5 と 定義 12.8}) \\ &= O && (\because\ \text{主張 6.14 } (X \to \varepsilon,\ Y \to \sigma^z_k,\ j \to k)) \end{aligned}$$

であり、主張 2.43 を $X \to \varepsilon\, \sigma^z_k$、$Y \to \sigma^z_k\, \varepsilon$ で引いて主張を得る。 □

主張 13.8 (ε とσ_k^y は反可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 12.8 の σ_k^y について

$$\varepsilon\, \sigma_k^y = -\big(\sigma_k^y\, \varepsilon\big)$$

が成り立つ。

証明. $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。主張 13.5 より ε の第 i 因子は $x_i := \sigma^x$、定義 12.8 より σ_k^y の第 i 因子は $y_k := \sigma^y$、$y_i := I$（$i \neq k$）である。$i \neq k$ について

$$\begin{aligned} y_i x_i &= I\sigma^x && (\because\ x_i, y_i \text{ の定義}) \\ &= \sigma^x && (\because\ \text{主張 2.16}) \\ &= \sigma^x I && (\because\ \text{主張 2.17}) \\ &= x_i y_i && (\because\ x_i, y_i \text{ の定義}) \end{aligned}$$

であり、$y_k x_k = \sigma^y \sigma^x = -(\sigma^x \sigma^y) = -(x_k y_k)$（主張 6.1）である。よって

$$\begin{aligned} \varepsilon\, \sigma_k^y + \sigma_k^y\, \varepsilon &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I) + (I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I)(\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) && (\because\ \text{主張 13.5 と 定義 12.8}) \\ &= O && (\because\ \text{主張 6.14 } (X \to \varepsilon,\ Y \to \sigma_k^y,\ j \to k)) \end{aligned}$$

であり、主張 2.43 を $X \to \varepsilon\, \sigma_k^y$、$Y \to \sigma_k^y\, \varepsilon$ で引いて主張を得る。 □

主張 13.9 (ε とZ_m は反可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 13.1 の Z_m について

$$\varepsilon\, Z_m = -\big(Z_m\, \varepsilon\big)$$

が成り立つ。

証明. $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。まず

$$\begin{aligned} Z_m &= \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z && (\because\ \text{定義 13.1 } (m = 1 \text{ では } \sigma_1^z)\text{。括弧は左から掛ける形に付け替える。主張 2.15}) \\ &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \text{主張 13.4 } (r \to m,\ a_1 = \cdots = a_{m-1} = x,\ a_m = z)) \end{aligned}$$

である。主張 13.5 より ε の第 i 因子は $x_i := \sigma^x$、上の表示より Z_m の第 i 因子 y_i は $i < m$ で σ^x、$i = m$ で σ^z、$i > m$ で I である。$i < m$ では $y_i x_i = \sigma^x \sigma^x = x_i y_i$、$i > m$ では

$$\begin{aligned} y_i x_i &= I\sigma^x && (\because\ x_i, y_i \text{ の定義}) \\ &= \sigma^x && (\because\ \text{主張 2.16}) \\ &= \sigma^x I && (\because\ \text{主張 2.17}) \\ &= x_i y_i && (\because\ x_i, y_i \text{ の定義}) \end{aligned}$$

であり、$y_m x_m = \sigma^z \sigma^x = -(\sigma^x \sigma^z) = -(x_m y_m)$（主張 6.1）である。よって

$$\begin{aligned} \varepsilon\, Z_m + Z_m\, \varepsilon &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)\big(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\big) + \big(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\big)(\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) && (\because\ \text{主張 13.5 と上の } Z_m \text{ の表示}) \\ &= O && (\because\ \text{主張 6.14 } (X \to \varepsilon,\ Y \to Z_m,\ j \to m)) \end{aligned}$$

であり、主張 2.43 を $X \to \varepsilon\, Z_m$、$Y \to Z_m\, \varepsilon$ で引いて主張を得る。 □

主張 13.10 (ε とY_m は反可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 13.2 の Y_m について

$$\varepsilon\, Y_m = -\big(Y_m\, \varepsilon\big)$$

が成り立つ。

証明. $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。まず

$$
\begin{aligned}
Y_m &= \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y && (\because \text{ 定義 13.2 ($m=1$ では } \sigma_1^y\text{)。括弧は左から掛ける形に付け替える。主張 2.15)}\\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{ 主張 13.4 } (r \to m,\ a_1 = \cdots = a_{m-1} = x,\ a_m = y))
\end{aligned}
$$

である。主張 13.5 より ε の第 i 因子は $x_i := \sigma^x$、上の表示より Y_m の第 i 因子 y_i は $i < m$ で σ^x、$i = m$ で σ^y、$i > m$ で I である。$i < m$ では $y_i x_i = \sigma^x \sigma^x = x_i y_i$、$i > m$ では

$$
\begin{aligned}
y_i x_i &= I\sigma^x && (\because\ x_i, y_i \text{ の定義})\\
&= \sigma^x && (\because \text{ 主張 2.16})\\
&= \sigma^x I && (\because \text{ 主張 2.17})\\
&= x_i y_i && (\because\ x_i, y_i \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

であり、$y_m x_m = \sigma^y \sigma^x = -(\sigma^x \sigma^y) = -(x_m y_m)$（主張 6.1）である。よって

$$
\begin{aligned}
\varepsilon Y_m + Y_m \varepsilon &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)\big(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\big) + \big(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\big)(\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) && (\because \text{ 主張 13.5 と上の } Y_m \text{ の表示})\\
&= O && (\because \text{ 主張 6.14 } (X \to \varepsilon,\ Y \to Y_m,\ j \to m))
\end{aligned}
$$

であり、主張 2.43 を $X \to \varepsilon Y_m$、$Y \to Y_m \varepsilon$ で引いて主張を得る。 □

主張 13.11 (全スピン反転行列の Jordan–Wigner 表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 13.1 の $Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}$、定義 13.2 の $Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}}$、および 定義 13.3 の全スピン反転行列 ε について、

$$
\varepsilon = i^{M_{\mathrm{col}}} (Z_1 Y_1)(Z_2 Y_2) \cdots (Z_{M_{\mathrm{col}}} Y_{M_{\mathrm{col}}}) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})
$$

が成り立つ。右辺は $Z_m Y_m$ の積であって、和ではない。

証明. 主張 6.1 の Pauli 行列の成分表示、定義 1.6 の行列積、および 主張 1.56 の複素数の四則から、

$$
\begin{aligned}
\sigma^z \sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{ Pauli 行列の定義。主張 6.1})\\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} && (\because\ 2 \times 2 \text{ 行列の積の定義。定義 1.6})\\
&= -i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の四則})\\
&= -i\, \sigma^x && (\because \text{ Pauli 行列の定義。主張 6.1})
\end{aligned}
$$

を得る。次に任意の $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ を固定する。まず $r \in \{0, 1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対して $P_r := \sigma_1^x \cdots \sigma_r^x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と置き、$P_0 := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}$ とする。定義 12.8 と 主張 2.73 を用いる有限帰納法で、次の表示を示す。後で一因子の複素スカラーを外へ出すときは 主張 2.74 の各因子についての線型性を用いる。

$$
P_r = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r} \qquad (0 \leq r \leq M_{\mathrm{col}})
$$

を示す。初項では

$$
\begin{aligned}
P_0 &= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})} && (\because\ P_0 \text{ の定義})\\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{ 単位因子のクロネッカー積。主張 2.73})
\end{aligned}
$$

である。$0 \leq r < M_{\mathrm{col}}$ で帰納法の仮定が成り立つとする。このとき

$$
\begin{aligned}
P_{r+1} &= P_r \sigma^x_{r+1} && (\because\ P_{r+1}\ \text{の定義}) \\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r} \right) \sigma^x_{r+1} && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r} \right) \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{r} \boxtimes \sigma^x \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r-1} \right) && (\because\ \text{サイト行列の定義。定義 12.8}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{r} \boxtimes (I\sigma^x) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-r-1} && (\because\ \text{クロネッカー積の積の規則。主張 2.73}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{r+1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r-1} && (\because\ AI = IA = A)
\end{aligned}
$$

となる。よって有限帰納法により上の P_r の表示がすべての $0 \leq r \leq M_{\mathrm{col}}$ で成り立つ。特に定義 13.1 と 定義 13.2 から、

$$
\begin{aligned}
Z_m &= P_{m-1} \sigma^z_m && (\because\ Z_m\ \text{の定義。定義 13.1}) \\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m+1} \right) \sigma^z_m && (\because\ P_{m-1}\ \text{の表示}) \\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m+1} \right) \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} \right) && (\because\ \text{サイト行列の定義。定義 12.8}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{m-1} \boxtimes (I\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \text{クロネッカー積の積の規則。主張 2.73}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ AI = IA = A)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_m &= P_{m-1} \sigma^y_m && (\because\ Y_m\ \text{の定義。定義 13.2}) \\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m+1} \right) \sigma^y_m && (\because\ P_{m-1}\ \text{の表示}) \\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m+1} \right) \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} \right) && (\because\ \text{サイト行列の定義。定義 12.8}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{m-1} \boxtimes (I\sigma^y) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \text{クロネッカー積の積の規則。主張 2.73}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ AI = IA = A)
\end{aligned}
$$

を得る。したがって

$$
\begin{aligned}
Z_m Y_m &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} \right) \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} \right) && (\because\ \text{直前の} Z_m, Y_m\ \text{のクロネッカー積表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x \sigma^x)}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z \sigma^y) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \text{クロネッカー積の積の規則。主張 2.73}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z \sigma^y) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \sigma^x \sigma^x = I.\ \text{主張 6.1}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z \sigma^y) \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ II = I) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (-i\,\sigma^x) \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \text{上の} \sigma^z \sigma^y = -i\sigma^x) \\
&= -i \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^x \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} \right) && (\because\ \text{クロネッカー積の線型性。主張 2.74}) \\
&= -i\,\sigma^x_m && (\because\ \text{サイト行列の定義。定義 12.8})
\end{aligned}
$$

$m=1$ では先頭の $m-1$ 因子を空積、$m=M_{\mathrm{col}}$ では末尾の $M_{\mathrm{col}}-m$ 因子を空積と読む。ここで $Q_0 := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$Q_r := (Z_1Y_1)\cdots(Z_rY_r) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ と置く。$Q_r = (-i)^r P_r$ を $r=0,\ldots,M_{\mathrm{col}}$ について有限帰納法で示す。初項は

$$\begin{aligned} Q_0 &= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because\ Q_0 \text{ の定義}) \\ &= (-i)^0 I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because\ (-i)^0 = 1) \\ &= (-i)^0 P_0 && (\because\ P_0 \text{ の定義}) \end{aligned}$$

である。$0 \le r < M_{\mathrm{col}}$ で帰納法の仮定が成り立つとすると、因子を並べ替えずに

$$\begin{aligned} Q_{r+1} &= Q_r(Z_{r+1}Y_{r+1}) && (\because\ Q_{r+1} \text{ の定義}) \\ &= (-i)^r P_r(Z_{r+1}Y_{r+1}) && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\ &= (-i)^r P_r(-i\,\sigma^x_{r+1}) && (\because\ Z_{r+1}Y_{r+1} = -i\sigma^x_{r+1}) \\ &= (-i)^r \big(P_r(-i\,\sigma^x_{r+1})\big) && (\because\ \text{左側のスカラー倍と行列積の両立}) \\ &= (-i)^r \big((-i)(P_r\sigma^x_{r+1})\big) && (\because\ \text{右側のスカラー倍と行列積の両立}) \\ &= \big((-i)^r(-i)\big)(P_r\sigma^x_{r+1}) && (\because\ \text{スカラー倍の結合律}) \\ &= (-i)^{r+1} P_r\sigma^x_{r+1} && (\because\ \text{冪の再帰}) \\ &= (-i)^{r+1} P_{r+1} && (\because\ P_{r+1} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

となる。したがって有限帰納法の終端 $r=M_{\mathrm{col}}$ で $Q_{M_{\mathrm{col}}} = (-i)^{M_{\mathrm{col}}} P_{M_{\mathrm{col}}}$ を得る。ゆえに

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \sigma^x_1\sigma^x_2\cdots\sigma^x_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \text{全スピン反転行列の定義。定義 13.3}) \\ &= P_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ P_{M_{\mathrm{col}}} \text{ の定義}) \\ &= 1^{M_{\mathrm{col}}} P_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ 1^{M_{\mathrm{col}}} = 1) \\ &= (i(-i))^{M_{\mathrm{col}}} P_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ i(-i) = 1) \\ &= i^{M_{\mathrm{col}}}(-i)^{M_{\mathrm{col}}} P_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の乗法の可換律と冪の法則}) \\ &= i^{M_{\mathrm{col}}} Q_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \text{有限帰納法の終端}) \\ &= i^{M_{\mathrm{col}}} (Z_1Y_1)(Z_2Y_2)\cdots(Z_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}) && (\because\ Q_{M_{\mathrm{col}}} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

ゆえに主張が示された。 □

主張 13.12 (第一の結合定数と双対結合定数の双対関係)**.** 定義 12.24 の $K_1, K_1^* \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して、

$$\sinh(2K_1)\sinh(2K_1^*) = 1$$

が成り立つ。

証明.（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）この証明では、定義 12.20 の実数値の双曲線正接、定義 12.21 の実対数、定義 3.19 の双曲線関数の定義、および 主張 3.21 の実双曲線関数の基本性質を用いる。まず、各分母が零でないことを確認する。

$$K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow \cosh K_1 > \sinh K_1 > 0 \quad \big(\because\ \text{主張 3.21 の (3)}\big)$$

$$\cosh K_1 > \sinh K_1 > 0 \Longrightarrow \sinh K_1 \neq 0 \ \wedge\ \cosh K_1 \neq 0 \quad \big(\because\ \mathbb{R} \text{ の正の元は零でない}\big)$$

$$\sinh K_1 \neq 0 \ \wedge\ \cosh K_1 \neq 0 \Longrightarrow \sinh K_1 \cosh K_1 \neq 0 \quad \big(\because\ \mathbb{R} \text{ は体である}\big)$$

$$K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow 0 < \tanh K_1 < 1 \quad (\because \text{ 定義 } 12.20)$$

$$0 < \tanh K_1 \Longrightarrow \tanh K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \mathbb{R}_{>0} \text{ の定義})$$

$$\tanh K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow \tanh K_1 \neq 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の正の元は零でない})$$

双対結合定数の定義を指数関数へ戻すと、

$$\begin{aligned} K_1^* &= -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) && (\because \text{ 定義 } 12.24) \\ 2K_1^* &= -\log(\tanh K_1) && (\because \mathbb{R} \text{ の等式の両辺を2 倍}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\exp(-\log(\tanh K_1))\tanh K_1 \\ &\quad = \exp(-\log(\tanh K_1))\exp(\log(\tanh K_1)) && (\because \text{ 定義 } 12.21 \text{ の } \exp(\log y) = y) \\ &\quad = \exp(-\log(\tanh K_1) + \log(\tanh K_1)) && (\because \exp(x)\exp(y) = \exp(x+y) \text{ 主張 } 3.13) \\ &\quad = \exp(0) && (\because \mathbb{R} \text{ の加法逆元}) \\ &\quad = 1 && (\because \exp(0) = 1 \text{ 主張 } 3.14) \end{aligned}$$

$$\exp(-\log(\tanh K_1)) = \frac{1}{\tanh K_1} \quad (\because \text{ 直前の等式の両辺を } \tanh K_1 \neq 0 \text{ で割る})$$

$$\begin{aligned} \exp(2K_1^*) &= \exp(-\log(\tanh K_1)) && (\because \ 2K_1^* = -\log(\tanh K_1)) \\ &= \frac{1}{\tanh K_1} && (\because \text{ 直前の等式}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2K_1^* &= \log(\tanh K_1) && (\because \ 2K_1^* = -\log(\tanh K_1) \text{ の両辺を符号反転}) \\ \exp(-2K_1^*) &= \exp(\log(\tanh K_1)) && (\because \text{ 等しい実数への指数関数の適用}) \\ &= \tanh K_1 && (\because \text{ 定義 } 12.21 \text{ の } \exp(\log y) = y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sinh(2K_1^*) &= \frac{\exp(2K_1^*) - \exp(-2K_1^*)}{2} && (\because \text{ 定義 } 3.19) \\ &= \frac{\frac{1}{\tanh K_1} - \exp(-2K_1^*)}{2} && \left(\because \ \exp(2K_1^*) = \frac{1}{\tanh K_1}\right) \\ &= \frac{\frac{1}{\tanh K_1} - \tanh K_1}{2} && (\because \ \exp(-2K_1^*) = \tanh K_1) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_1} - \tanh K_1\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配法則}) \end{aligned}$$

一方、倍角の双曲線正弦は定義から

$$\begin{aligned} 2\sinh K_1 \cosh K_1 &= 2\frac{\exp(K_1) - \exp(-K_1)}{2}\frac{\exp(K_1) + \exp(-K_1)}{2} && (\because \text{ 定義 } 3.19) \\ &= \frac{1}{2}\left(\exp(K_1) - \exp(-K_1)\right)\left(\exp(K_1) + \exp(-K_1)\right) && \left(\because \ 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{\exp(K_1)^2 - \exp(-K_1)^2}{2} && (\because \ (a-b)(a+b) = a^2 - b^2) \\ &= \frac{\exp(2K_1) - \exp(-2K_1)}{2} && (\because \ \exp(x)\exp(y) = \exp(x+y) \text{ 主張 } 3.13) \\ &= \sinh(2K_1) && (\because \text{ 定義 } 3.19) \end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned}
\sinh(2K_1)\sinh(2K_1^*) &= 2\sinh K_1\cosh K_1\sinh(2K_1^*) && (\because\ \sinh(2K_1) = 2\sinh K_1\cosh K_1)\\
&= 2\sinh K_1\cosh K_1\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_1}-\tanh K_1\right) && \left(\because\ \sinh(2K_1^*) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_1}-\tanh K_1\right)\right)\\
&= \sinh K_1\cosh K_1\left(\frac{1}{\tanh K_1}-\tanh K_1\right) && \left(\because\ 2\cdot\frac{1}{2}=1\right)\\
&= \sinh K_1\cosh K_1\left(\frac{1}{\sinh K_1/\cosh K_1}-\frac{\sinh K_1}{\cosh K_1}\right) && (\because\ \text{定義 12.20})\\
&= \sinh K_1\cosh K_1\left(\frac{\cosh K_1}{\sinh K_1}-\frac{\sinh K_1}{\cosh K_1}\right) && (\because\ \sinh K_1\neq 0\ \wedge\ \cosh K_1\neq 0)\\
&= \sinh K_1\cosh K_1\frac{(\cosh K_1)^2-(\sinh K_1)^2}{\sinh K_1\cosh K_1} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分数の通分})\\
&= (\cosh K_1)^2-(\sinh K_1)^2 && (\because\ \sinh K_1\cosh K_1\neq 0)\\
&= 1 && (\because\ \text{主張 3.21 の (2)})
\end{aligned}$$

ゆえに第一の結合定数と双対結合定数の双対関係が示された。 □

主張 13.13 (第二の結合定数と双対結合定数の双対関係)**.** 定義 12.25 の $K_2, K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して、

$$\sinh(2K_2)\sinh(2K_2^*) = 1$$

が成り立つ。

証明.（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）この証明では、定義 12.20 の実数値の双曲線正接、定義 12.21 の実対数、定義 3.19 の双曲線関数の定義、および 主張 3.21 の実双曲線関数の基本性質を用いる。まず、各分母が零でないことを確認する。

$$K_2\in\mathbb{R}_{>0}\Longrightarrow \cosh K_2>\sinh K_2>0 \quad (\because\ \text{主張 3.21 の (3)})$$

$$\cosh K_2>\sinh K_2>0\Longrightarrow \sinh K_2\neq 0\ \wedge\ \cosh K_2\neq 0 \quad (\because\ \mathbb{R}\ \text{の正の元は零でない})$$

$$\sinh K_2\neq 0\ \wedge\ \cosh K_2\neq 0\Longrightarrow \sinh K_2\cosh K_2\neq 0 \quad (\because\ \mathbb{R}\ \text{は体である})$$

$$K_2\in\mathbb{R}_{>0}\Longrightarrow 0<\tanh K_2<1 \quad (\because\ \text{定義 12.20})$$

$$0<\tanh K_2\Longrightarrow \tanh K_2\in\mathbb{R}_{>0} \quad (\because\ \mathbb{R}_{>0}\ \text{の定義})$$

$$\tanh K_2\in\mathbb{R}_{>0}\Longrightarrow \tanh K_2\neq 0 \quad (\because\ \mathbb{R}\ \text{の正の元は零でない})$$

双対結合定数の定義を指数関数へ戻すと、

$$\begin{aligned}
K_2^* &= -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) && (\because\ \text{定義 12.25})\\
2K_2^* &= -\log(\tanh K_2) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の等式の両辺を2 倍})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\exp(-\log(\tanh K_2))\exp(\log(\tanh K_2))\\
&\quad= \exp(-\log(\tanh K_2)+\log(\tanh K_2)) && (\because\ \exp(x)\exp(y)=\exp(x+y)\ \text{主張 3.13})\\
&\quad= \exp(0) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の加法逆元})\\
&\quad= 1 && (\because\ \exp(0)=1\ \text{主張 3.14})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\exp(-\log(\tanh K_2))\tanh K_2 &= 1 && (\because \text{ 定義 12.21 の } \exp(\log y) = y)\\
\exp(-\log(\tanh K_2)) &= \frac{1}{\tanh K_2} && (\because \tanh K_2 \neq 0 \text{ と} \mathbb{R} \text{ の除法})\\
\exp(2K_2^*) &= \exp(-\log(\tanh K_2)) && (\because 2K_2^* = -\log(\tanh K_2))\\
&= \frac{1}{\tanh K_2} && (\because \text{ 直前の等式})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
-2K_2^* &= \log(\tanh K_2) && (\because 2K_2^* = -\log(\tanh K_2) \text{ の両辺を符号反転})\\
\exp(-2K_2^*) &= \exp(\log(\tanh K_2)) && (\because \text{ 等しい実数への指数関数の適用})\\
&= \tanh K_2 && (\because \text{ 定義 12.21 の } \exp(\log y) = y)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sinh(2K_2^*) &= \frac{\exp(2K_2^*) - \exp(-2K_2^*)}{2} && (\because \text{ 定義 3.19})\\
&= \frac{\frac{1}{\tanh K_2} - \exp(-2K_2^*)}{2} && \left(\because \exp(2K_2^*) = \frac{1}{\tanh K_2}\right)\\
&= \frac{\frac{1}{\tanh K_2} - \tanh K_2}{2} && (\because \exp(-2K_2^*) = \tanh K_2)\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_2} - \tanh K_2\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配法則})
\end{aligned}
$$

一方、倍角の双曲線正弦は定義から

$$
\begin{aligned}
2\sinh K_2 \cosh K_2 &= 2\frac{\exp(K_2) - \exp(-K_2)}{2}\frac{\exp(K_2) + \exp(-K_2)}{2} && (\because \text{ 定義 3.19})\\
&= \frac{1}{2}\left(\exp(K_2) - \exp(-K_2)\right)\left(\exp(K_2) + \exp(-K_2)\right) && \left(\because 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\right)\\
&= \frac{\exp(K_2)^2 - \exp(-K_2)^2}{2} && (\because (a-b)(a+b) = a^2 - b^2)\\
&= \frac{\exp(2K_2) - \exp(-2K_2)}{2} && (\because \exp(x)\exp(y) = \exp(x+y) \text{ 主張 3.13})\\
&= \sinh(2K_2) && (\because \text{ 定義 3.19})
\end{aligned}
$$

したがって、

$$
\begin{aligned}
\sinh(2K_2)\sinh(2K_2^*) &= 2\sinh K_2 \cosh K_2 \sinh(2K_2^*) && (\because \sinh(2K_2) = 2\sinh K_2 \cosh K_2)\\
&= 2\sinh K_2 \cosh K_2 \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_2} - \tanh K_2\right) && \left(\because \sinh(2K_2^*) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_2} - \tanh K_2\right)\right)\\
&= \sinh K_2 \cosh K_2 \left(\frac{1}{\tanh K_2} - \tanh K_2\right) && \left(\because 2 \cdot \frac{1}{2} = 1\right)\\
&= \sinh K_2 \cosh K_2 \left(\frac{1}{\sinh K_2/\cosh K_2} - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right) && (\because \text{ 定義 12.20})\\
&= \sinh K_2 \cosh K_2 \left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right) && (\because \sinh K_2 \neq 0 \ \wedge \ \cosh K_2 \neq 0)\\
&= \sinh K_2 \cosh K_2 \frac{(\cosh K_2)^2 - (\sinh K_2)^2}{\sinh K_2 \cosh K_2} && (\because \mathbb{R} \text{ の分数の通分})\\
&= (\cosh K_2)^2 - (\sinh K_2)^2 && (\because \sinh K_2 \cosh K_2 \neq 0)\\
&= 1 && (\because \text{ 主張 3.21 の } (2))
\end{aligned}
$$

ゆえに第二の結合定数と双対結合定数の双対関係が示された。 □

主張 13.14 (双曲線関数の添字つき略記の正値性)**.** 各 $i \in \{1,2\}$ について、$K_i, K_i^* \in \mathbb{R}_{>0}$ ならば、定義 12.26 の略記は $c_i, s_i, c_i^*, s_i^* \in \mathbb{R}$ であり、

$$c_i > 0, \qquad s_i > 0, \qquad c_i^* > 0, \qquad s_i^* > 0$$

を満たす。

証明. 任意の $i \in \{1,2\}$ を固定する。(実双曲線関数の評価と実数順序による実数への脱出) ここでは $K_i, K_i^* \in \mathbb{R}_{>0}$ を実双曲線関数へ入力し、実数の順序で値を比較する。したがって、以下は実双曲線関数の評価と実数順序を用いる実数上の主張である。

$$\begin{aligned} 2K_i > 0 \quad &(\because 2 > 0,\ K_i > 0,\ \text{正数の積}), \\ 2K_i^* > 0 \quad &(\because 2 > 0,\ K_i^* > 0,\ \text{正数の積}). \end{aligned}$$

主張 3.21 の (3) を二つの正の引数へ適用する。

$$\begin{aligned} \cosh(2K_i) > \sinh(2K_i) > 0 \quad &(\because \text{主張 3.21 の (3) と} 2K_i > 0), \\ \cosh(2K_i^*) > \sinh(2K_i^*) > 0 \quad &(\because \text{主張 3.21 の (3) と} 2K_i^* > 0). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_i > s_i > 0 \quad &(\because \text{定義 12.26 の定義で上の第 1 式を書き換えた}), \\ c_i^* > s_i^* > 0 \quad &(\because \text{定義 12.26 の定義で上の第 2 式を書き換えた}), \\ s_i > 0 \quad &(\because c_i > s_i > 0 \text{ の後半}), \\ s_i^* > 0 \quad &(\because c_i^* > s_i^* > 0 \text{ の後半}), \\ c_i > 0 \quad &(\because c_i > s_i \text{ と} s_i > 0 \text{ の推移律}), \\ c_i^* > 0 \quad &(\because c_i^* > s_i^* \text{ と} s_i^* > 0 \text{ の推移律}). \end{aligned}$$

である。 □

定義 13.15 (記号の定義)**.** 定義 12.6 で成分により定めた転送行列 V_1, V_2 と、主張 12.19 で示した V_1 のパウリ行列表示、主張 12.29 で示した V_2 のパウリ行列表示、定義 12.9 で定めた周期的な延長 $\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1} = \sigma^z_1$、主張 6.1 で定めた二次の Pauli 行列と単位行列、主張 2.73 の (2) で示した二次の単位行列のクロネッカー積、定義 12.8 で定めたサイトごとの Pauli 行列族、主張 13.11 で示した全スピン反転行列の Jordan–Wigner 表示、および 定義 3.19 で定めた双曲線余弦・双曲線正弦を用いる。また、双対結合定数の式に現れる双曲線正接は 定義 12.20 で定めたものを用いる。実対数は 定義 12.21 で定めたものを用いる。第一の双対結合定数は 定義 12.24 で定めたものを用いる。第一の双対関係は 主張 13.12 で示したものを用いる。第二の双対結合定数は 定義 12.25 で定めたものを用いる。第二の双対関係は 主張 13.13 で示したものに加え、双曲線関数の添字つき略記は 定義 12.26 で定めたものを用い、その正値性は 主張 13.14 で示したものを用いる。

ここで $\boxtimes$ は 定義 2.72 のクロネッカー積であり、$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ は $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の複素正方行列全体である。すなわち上の $\sigma^x_k, \sigma^y_k, \sigma^z_k, Z_m, Y_m, \varepsilon$ などはすべて具体的な $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の複素行列である。

主張 13.16 (V_1 を Z, Y, ε で表す)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.15 の $V_1, Z_m, Y_m, \varepsilon, K_1$ を考える。このとき $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の中で

$$V_1 = \exp(iK_1(Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}} - \varepsilon Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1))$$

が成り立つ ($i \in \mathbb{C}$ は虚数単位)。

証明. 証明の方針: exp の中身どうしが $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の元として等しいことを示す。exp は写像であるから、これが示されれば exp の値も等しく、主張が従う (したがって 定理 3.7 のような exp の分解は用いない)。

以下、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z, I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ は 主張 6.1 の Pauli 行列とし、クロネッカー積の積が各サイトごとの積であること (主張 2.73 (1))

$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_{M_{\mathrm{col}}}) = (A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_{M_{\mathrm{col}}} B_{M_{\mathrm{col}}})$ $(\because$ クロネッカー積の積の規則)

と、クロネッカー積が各因子について $\mathbb{C}$-線型であること（主張 2.74）

$$C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(cC_j)}^{j\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes C_{M_{\mathrm{col}}} = c\,(C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes C_{M_{\mathrm{col}}}) \quad (c \in \mathbb{C}) \quad (\because \text{第} j \text{ 因子についての} \mathbb{C}\text{-線型性})$$

を繰り返し用いる。

Step 0: 単一サイトの Pauli 行列の積。主張 6.1 の $\sigma^x \sigma^x = I$ に加えて、以下の 3 式を 2×2 行列の積の成分計算で確かめる。

$$\begin{aligned}
\sigma^y \sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + (-i) \cdot 1 & 0 \cdot 1 + (-i) \cdot 0 \\ i \cdot 0 + 0 \cdot 1 & i \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 + (-i) \cdot 1 & 0 + (-i) \cdot 0 \\ i \cdot 0 + 0 & i \cdot 1 + 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.58}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i) \cdot 1 & (-i) \cdot 0 \\ i \cdot 0 & i \cdot 1 \end{pmatrix} && (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は加法の単位元。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i) \cdot 1 & (-i) \cdot 0 \\ 0 & i \cdot 1 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i) \cdot 1 & (-i) \cdot 0 \\ (-i) \cdot 0 & i \cdot 1 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i) \cdot 1 & (-i) \cdot 0 \\ (-i) \cdot 0 & i \cdot \big((-1) \cdot (-1)\big) \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ で } (-1) \cdot (-1) = 1\text{。定義 1.12 の積}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i) \cdot 1 & (-i) \cdot 0 \\ (-i) \cdot 0 & \big(i \cdot (-1)\big) \cdot (-1) \end{pmatrix} && (\because \text{積の結合律。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i) \cdot 1 & (-i) \cdot 0 \\ (-i) \cdot 0 & \big((-1) \cdot i\big) \cdot (-1) \end{pmatrix} && (\because \text{積の可換律。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i) \cdot 1 & (-i) \cdot 0 \\ (-i) \cdot 0 & (-i) \cdot (-1) \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.14}) \\
&= -i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= -i\,\sigma^z && (\because \text{主張 6.1})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\sigma^x\sigma^y &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1}) \\
&= \begin{pmatrix} 0\cdot 0+1\cdot i & 0\cdot(-i)+1\cdot 0 \\ 1\cdot 0+0\cdot i & 1\cdot(-i)+0\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} 0+1\cdot i & 0+1\cdot 0 \\ 1\cdot 0+0 & 1\cdot(-i)+0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.58}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot i & 1\cdot 0 \\ 1\cdot 0 & 1\cdot(-i) \end{pmatrix} && (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は加法の単位元。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot i & 0 \\ 0 & 1\cdot(-i) \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot i & 0 \\ 0 & (-1)\cdot i \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.14}) \\
&= \begin{pmatrix} i\cdot 1 & 0 \\ 0 & i\cdot(-1) \end{pmatrix} && (\because \text{積の可換律。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} i\cdot 1 & i\cdot 0 \\ i\cdot 0 & i\cdot(-1) \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59}) \\
&= i\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= i\,\sigma^z && (\because \text{主張 6.1})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot 0+0\cdot i & 1\cdot(-i)+0\cdot 0 \\ 0\cdot 0+(-1)\cdot i & 0\cdot(-i)+(-1)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot 0+0 & 1\cdot(-i)+0 \\ 0+(-1)\cdot i & 0+(-1)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.58}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot 0 & 1\cdot(-i) \\ (-1)\cdot i & (-1)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は加法の単位元。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1\cdot(-i) \\ (-1)\cdot i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & 1\cdot(-i) \\ (-1)\cdot i & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & (-i)\cdot 1 \\ (-1)\cdot i & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{積の可換律。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & (-i)\cdot 1 \\ -i & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.14}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & (-i)\cdot 1 \\ (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 1.56}) \\
&= -i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= -i\,\sigma^x && (\because \text{主張 6.1})
\end{aligned}
$$

Step 1: $Z_m, Y_m, \varepsilon, \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z, \sigma_m^x$ のクロネッカー積による表示。まず $1 \leq r \leq M_{\mathrm{col}}$ と $a_1, \ldots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$\sigma_1^{a_1}\sigma_2^{a_2}\cdots\sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_r}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r}$$

が成り立つ。これを r に関する帰納法で示す。$r=1$ のときは 定義 13.15 の $\sigma_1^{a_1}$ の定義そのものである。r で成り立つとすると、

$$\begin{aligned}
\sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_r^{a_r}\sigma_{r+1}^{a_{r+1}} &= (\sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_r}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I)\left(I\boxtimes\cdots\boxtimes I\boxtimes\overbrace{\sigma^{a_{r+1}}}^{(r+1)\mathrm{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right) && (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= (\sigma^{a_1}I)\boxtimes\cdots\boxtimes(\sigma^{a_r}I)\boxtimes(I\sigma^{a_{r+1}})\boxtimes(II)\boxtimes\cdots\boxtimes(II) && (\because \text{クロネッカー積の積の規則})\\
&= \sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_{r+1}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-(r+1)} && (\because AI=IA=A)
\end{aligned}$$

これを 定義 13.1 の $Z_m=\sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^z$、定義 13.2 の $Y_m=\sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^y$、定義 13.15 の $\varepsilon=\sigma_1^x\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x$ に適用すると（$m=1$ のときは前半の積が空積で $Z_1=\sigma_1^z$、$Y_1=\sigma_1^y$。以下の式で σ^x の個数を 0 とすればよい）、

$$\begin{aligned}
Z_m &= \overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{m\mathrm{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{上の一般式と}Z_m\text{ の定義})\\
Y_m &= \overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^y}^{m\mathrm{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{上の一般式と}Y_m\text{ の定義定義 13.2})\\
\varepsilon &= \overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{上の一般式（}r=M_{\mathrm{col}}\text{）と}\varepsilon\text{ の定義})
\end{aligned}$$

また σ_m^x は第 m 因子のみ σ^x で他は I であり、$1\le m\le M_{\mathrm{col}}-1$ について（第 m 因子と第 $m+1$ 因子以外はすべて $II=I$）

$$\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z = \overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{m\mathrm{th}}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\mathrm{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

である。同様に $M_{\mathrm{col}}\ge 2$ より第 1 因子と第 M_{col} 因子は異なるので

$$\begin{aligned}
\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z &= \overbrace{\sigma^z}^{1\mathrm{st}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} && (\because \text{クロネッカー積の積の規則})\\
&= \sigma_1^z\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z && (\because \text{クロネッカー積の積の規則})
\end{aligned}$$

Step 2: $1\le m\le M_{\mathrm{col}}-1$ について $Y_mZ_{m+1}=-i\,\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z$。Step 1 の表示を用いて因子ごとに計算する。

$$\begin{aligned}
Y_mZ_{m+1} &= \left(\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^y}^{m\mathrm{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right)\left(\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^x}^{m\mathrm{th}}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\mathrm{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right) && (\because \text{Step 1})\\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)\boxtimes\cdots\boxtimes(\sigma^x\sigma^x)}^{m-1}\boxtimes\overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{m\mathrm{th}}\boxtimes\overbrace{(I\sigma^z)}^{(m+1)\mathrm{th}}\boxtimes(II)\boxtimes\cdots\boxtimes(II) && (\because \text{クロネッカー積の積の規則})\\
&= \overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{m-1}\boxtimes\overbrace{(-i\,\sigma^z)}^{m\mathrm{th}}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\mathrm{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I && (\because \sigma^x\sigma^x=I,\ \sigma^y\sigma^x=-i\,\sigma^z(\text{Step 0}))\\
&= (-i)\left(\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{m\mathrm{th}}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\mathrm{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right) && (\because \text{第}m\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性})\\
&= -i\,\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z && (\because \text{Step 1})\\
\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z &= \big(i\cdot(-i)\big)\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z && (\because\ i\cdot(-i)=1(\text{複素数の四則}))\\
&= i\big((-i)\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z\big) && (\because\ \text{複素数倍の結合則})\\
&= i\,Y_mZ_{m+1} && (\because\ \text{上の Step 2 の等式})\qquad (1\le m\le M_{\mathrm{col}}-1)
\end{aligned}$$

Step 3: 境界項 $\varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 = i\,\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1$。ここで Jordan–Wigner 文字列 $\sigma^x_1\cdots\sigma^x_{M_{\mathrm{col}}-1}$ が周期境界で一周し、$Z_1=\sigma^z_1$ の側に文字列が付いていないため、Step 2 の計算では第 1 因子の σ^x が相殺せずに残る。これを打ち消すのが $\varepsilon=\sigma^x_1\cdots\sigma^x_{M_{\mathrm{col}}}$ である。実際、$M_{\mathrm{col}}\geq 2$ のもとで 3 つの元の積を（クロネッカー積の積の規則を 2 回使って）因子ごとに計算すると、

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 &= \left(\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}}\right)\left(\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^y}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}}\right)\left(\overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-1}\right) && (\because \text{Step 1})\\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x\sigma^z)}^{1\text{st}}\boxtimes\overbrace{(\sigma^x\sigma^x I)\boxtimes\cdots\boxtimes(\sigma^x\sigma^x I)}^{2\text{nd},\ldots,(M_{\mathrm{col}}-1)\text{th}}\boxtimes\overbrace{(\sigma^x\sigma^y I)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \text{クロネッカー積の積の規則})\\
&= \overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes\overbrace{(i\,\sigma^z)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \sigma^x\sigma^x=I,\ AI=A,\ \sigma^x\sigma^y=i\,\sigma^z(\text{Step 0}))\\
&= i\left(\overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}}\right) && (\because \text{第}M_{\mathrm{col}}\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性})\\
&= i\,\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1 && (\because \text{Step 1 の最後の式})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1 &= \big((-i)\cdot i\big)\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1 && (\because\ (-i)\cdot i=1(\text{複素数の四則}))\\
&= (-i)\big(i\,\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1\big) && (\because\ \text{複素数倍の結合則})\\
&= -i\,\varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 && (\because\ \text{上の Step 3 の等式})
\end{aligned}
$$

Step 4: V_1 の表式。主張 12.19 の V_1 の指数の中身を、$\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1}=\sigma^z_1$ により最後の項 $\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1}=\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1$ だけ分けて書くと、

$$
\begin{aligned}
K_1\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_m\sigma^z_{m+1} &= K_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}\right)+K_1\,\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1 && (\because\ \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1}=\sigma^z_1\text{ として有限和の最後の項を分ける})\\
&= K_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} i\,Y_m Z_{m+1}\right)+K_1\,(-i\,\varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1) && (\because \text{Step 2, Step 3})\\
&= iK_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1}-\varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1\right) && (\because \mathbb{C}\text{-線型空間}\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})\text{ でのスカラー倍の分配律})\\
&= iK_1\,(Y_1Z_2+Y_2Z_3+\cdots+Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}}-\varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1) && (\because\ \text{有限和を項ごとに書く})
\end{aligned}
$$

両辺は $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の同一の元であるから、exp の値も等しく、

$$
\begin{aligned}
V_1 &= \exp\left(K_1\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}\right) && (\because\ \text{主張 12.19})\\
&= \exp(iK_1(Y_1Z_2+Y_2Z_3+\cdots+Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}}-\varepsilon Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)) && (\because\ \text{直前の指数の等式})
\end{aligned}
$$

以上で主張が示された。 □

主張 13.17 (V_2 をZ,Y で表す)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.15 の $V_2, Z_m, Y_m, K_2^*, s_2\ (=\sinh 2K_2)$ を考える。このとき $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の中で

$$
V_2=(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(iK_2^*(Z_1Y_1+Z_2Y_2+\cdots+Z_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}))
$$

が成り立つ（$i\in\mathbb{C}$ は虚数単位）。

証明. 証明の方針: exp の中身どうしが $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の元として等しいことを示す。以下、$\sigma^x,\sigma^y,\sigma^z,I:=I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ は 主張 6.1 の Pauli 行列とする。クロネッカー積の積の規則（主張 2.73 (1)）と各因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 2.74）を用いる。

Step 0: 単一サイトの積 $\sigma^z\sigma^y = -i\,\sigma^x$ を成分計算で確かめる。

$$
\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 6.1}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 0\cdot i & 1\cdot(-i) + 0\cdot 0 \\ 0\cdot 0 + (-1)\cdot i & 0\cdot(-i) + (-1)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 0 & 1\cdot(-i) + 0 \\ 0 + (-1)\cdot i & 0 + (-1)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.58}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot 0 & 1\cdot(-i) \\ (-1)\cdot i & (-1)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は加法の単位元。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1\cdot(-i) \\ (-1)\cdot i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & 1\cdot(-i) \\ (-1)\cdot i & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & (-i)\cdot 1 \\ (-1)\cdot i & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{積の可換律。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & (-i)\cdot 1 \\ -i & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 1.14}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & (-i)\cdot 1 \\ (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 1.56}) \\
&= -i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= -i\,\sigma^x && (\because \text{主張 6.1})
\end{aligned}
$$

Step 1: Z_m, Y_m, σ^x_m のクロネッカー積表示。まず $1 \le r \le M_{\mathrm{col}}$ と $a_1, \ldots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$
\sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r}
$$

が成り立つ。$r = 1$ は 定義 13.15 の定義である。r で成り立つと仮定して $\sigma_{r+1}^{a_{r+1}}$ を右から掛けると、

$$
\begin{aligned}
\sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_r^{a_r}\sigma_{r+1}^{a_{r+1}} &= (\sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I)\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{\sigma^{a_{r+1}}}^{(r+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I\right) && (\because \text{帰納法の仮定とサイト作用素の定義}) \\
&= (\sigma^{a_1} I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^{a_r} I) \boxtimes (I\sigma^{a_{r+1}}) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) && (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_{r+1}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-(r+1)} && (\because AI = IA = A)
\end{aligned}
$$

よって帰納法により一般式が成り立つ。定義へ適用すると

$$
\begin{aligned}
Z_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}, \\
Y_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}, \quad (\because \text{一般式とサイト作用素の定義}) \\
\sigma^x_m &= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}
\end{aligned}
$$

Step 2: $1 \le m \le M_{\mathrm{col}}$ について $Z_m Y_m = -i\,\sigma^x_m$。

$$
\begin{aligned}
Z_mY_m &= \left(\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\sigma^z\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right)\left(\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\sigma^y\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right) && (\because \text{Step 1})\\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)\boxtimes\cdots\boxtimes(\sigma^x\sigma^x)}^{m-1}\boxtimes(\sigma^z\sigma^y)\boxtimes(II)\boxtimes\cdots\boxtimes(II) && (\because \text{クロネッカー積の積の規則})\\
&= \overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{m-1}\boxtimes(-i\,\sigma^x)\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I && (\because \sigma^x\sigma^x=I \text{ と Step 0})\\
&= -i\,\sigma^x_m && (\because \text{第}m\text{ 因子についての複素線型性と Step 1})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sigma^x_m &= \big(i\cdot(-i)\big)\sigma^x_m && (\because i\cdot(-i)=1)\\
&= i\big((-i)\sigma^x_m\big) && (\because \text{複素数倍の結合則})\\
&= i\,Z_mY_m && (\because \text{Step 2})
\end{aligned}
$$

Step 3: V_2 の表式。指数の中身は

$$
\begin{aligned}
K_2^*\left(\sigma^x_1+\cdots+\sigma^x_{M_{\mathrm{col}}}\right) &= K_2^*\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}\sigma^x_m && (\because \text{有限和を } \textstyle\sum \text{ 記法で書く})\\
&= K_2^*\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} i\,Z_mY_m && (\because \text{Step 2 の直後の等式を各項へ適用})\\
&= iK_2^*\left(Z_1Y_1+\cdots+Z_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}\right) && (\because \text{スカラー倍の分配律と有限和を項ごとに書く})
\end{aligned}
$$

両辺へ行列指数関数を適用し、主張 12.29 の V_2 のパウリ行列表示と $s_2=\sinh 2K_2$ の定義を使うと

$$
\begin{aligned}
V_2 &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\big(K_2^*(\sigma^x_1+\cdots+\sigma^x_{M_{\mathrm{col}}})\big) && (\because \text{主張 12.29})\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\big(K_2^*(\sigma^x_1+\cdots+\sigma^x_{M_{\mathrm{col}}})\big) && (\because s_2=\sinh 2K_2)\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(iK_2^*(Z_1Y_1+\cdots+Z_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}})) && (\because \text{直前の指数の等式})
\end{aligned}
$$

□

定義 13.18 (ε の固有値 $+1$ の固有ベクトル全体)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.15 の $\varepsilon\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を考える。ε を $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 成分の複素数ベクトルへ 定義 1.6 の通常の行列と数ベクトルの積として作用させ、

$$
\mathcal{F}^{(+)} := \left\{ f\in\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \;\middle|\; \varepsilon f = f \right\}
$$

と定める。すなわち $\mathcal{F}^{(+)}$ は、全スピン反転行列を左から掛けても変わらない複素数ベクトルの全体である。

主張 13.19 (ε の二乗)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.15 の $\varepsilon\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ について、

$$
\varepsilon^2 = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}
$$

証明. まず $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と略記し、$P_0 := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$P_r := \sigma^x_1\cdots\sigma^x_r$ $(1\leq r\leq M_{\mathrm{col}})$ と置く。各 $r\in\{0,\ldots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、

$$
P_r = \underbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}_{r}\boxtimes\underbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}_{M_{\mathrm{col}}-r}
$$

を示す。ただし、因子が零個の部分は書かない。$r=0$ の場合は、主張 2.73 (2) を繰り返し使うと、右辺は $I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}},\mathbb{C})}}=P_0$ である。ある $r\in\{0,\ldots,M_{\mathrm{col}}-1\}$ についてこの式が成り立つと仮定する。このとき $r+1\leq M_{\mathrm{col}}$ なので、サイト作用素の定義と 主張 2.73 (1)(2) より、

$$
\begin{aligned}
P_{r+1} = P_r \sigma^x_{r+1} &= \left(\underbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}_{r} \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M_{\mathrm{col}}-r} \right) \left(\underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{r} \boxtimes \sigma^x \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M_{\mathrm{col}}-r-1} \right) && (\because \text{ 帰納法の仮定と } \sigma^x_{r+1} \text{ の定義}) \\
&= \underbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}_{r} \boxtimes (I\sigma^x) \boxtimes \underbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}_{M_{\mathrm{col}}-r-1} && (\because \text{ クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \underbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}_{r+1} \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M_{\mathrm{col}}-r-1} && (\because \sigma^x I = I\sigma^x = \sigma^x \text{ と } II = I).
\end{aligned}
$$

よって有限帰納法により一般式が成り立つ。$r = M_{\mathrm{col}}$ と 定義 13.15 の $\varepsilon = \sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{M_{\mathrm{col}}}$ の定義から $\varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x$ を得る。したがって、主張 6.1 の $\sigma^x\sigma^x = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$、および 主張 2.73 (1)(2) より

$$
\begin{aligned}
\varepsilon^2 &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)(\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) && (\because \ \varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) \\
&= (\sigma^x\sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x\sigma^x) && (\because \text{ クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \underbrace{I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \ \sigma^x\sigma^x = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \text{ を各因子へ同時に適用}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{ クロネッカー積の単位元の規則})
\end{aligned}
$$

□

主張 13.20 (V_1 の$\mathcal{F}^{(+)}$ への制限)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.15 の V_1、定義 4.1 の **end**、定義 13.18 の $\mathcal{F}^{(+)}$ について、

$$
(\mathbf{end}(V_1))\big|_{\mathcal{F}^{(+)}} = (\mathbf{end}(\exp(iK_1(Y_1Z_2 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1))))\big|_{\mathcal{F}^{(+)}}
$$

が成り立つ。両辺は $\mathcal{F}^{(+)}$ から $\mathcal{F}$ への写像として一致する、という意味である（右辺の $\exp(\cdots)$ をこの証明内で $V_1^{(+)}$ と略記する）。

証明. 記号を固定する。主張 13.16 より $V_1 = \exp(G)$、また上の略記より $V_1^{(+)} = \exp(G^{(+)})$。ここで

$$
\begin{aligned}
W &:= Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 \ \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) \\
G &:= iK_1 \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - \varepsilon W \right) \ \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) \\
G^{(+)} &:= iK_1 \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - W \right) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})
\end{aligned}
$$

である。以下 $A \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ に対し $\hat{A} := \mathbf{end}(A) \in \mathrm{End}(\mathcal{F})$ と書く。主張 4.4 より $\widehat{AB} = \hat{A} \circ \hat{B}$ かつ $A \mapsto \hat{A}$ は $\mathbb{C}$-線型である。

Step 1: ε は各 Z_m, Y_m（$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$）と反交換する。すなわち

$$
\varepsilon Z_m = -\, Z_m \varepsilon, \qquad \varepsilon Y_m = -\, Y_m \varepsilon
$$

主張 13.16 の証明 Step 1 と同じクロネッカー積による表示

$$
\varepsilon = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}}, \qquad Z_m = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}, \qquad Y_m = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}
$$

のもとで 主張 6.14 を $X = \varepsilon$、$Y = Z_m$ に適用する。第 k 因子の組 (x_k, y_k) は

- $k < m$ のとき (σ^x, σ^x)。$\sigma^x\sigma^x = \sigma^x\sigma^x$ より可換。
- $k = m$ のとき (σ^x, σ^z)。主張 6.1 の $\sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z$ より反可換。
- $k > m$ のとき (σ^x, I)。$I\sigma^x = \sigma^x I$ より可換。

であり、反可換なサイトはちょうど 1 つ（$k = m$）だから $[\varepsilon, Z_m]_+ = \varepsilon Z_m + Z_m\varepsilon = 0$、すなわち $\varepsilon Z_m = -Z_m\varepsilon$。$Y_m$ についても、$k = m$ の組が (σ^x, σ^y) で 主張 6.1 の $\sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y$ より反可換、他のサイトは同じく可換であるから $\varepsilon Y_m = -Y_m\varepsilon$。

Step 2: ε は W、各 Y_mZ_{m+1}、εW、および $G, G^{(+)}$ と可換である。実際、$a, b \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について Step 1 を 2 回使うと

$$\begin{aligned}
\varepsilon(Y_aZ_b) &= (\varepsilon Y_a)Z_b && (\because\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) \text{ の積の結合律}) \\
&= (-Y_a\varepsilon)Z_b && (\because\ \text{Step 1 の } \varepsilon Y_a = -Y_a\varepsilon) \\
&= -\left(Y_a\varepsilon\right)Z_b && (\because\ \text{スカラー倍と積の可換性}) \\
&= -Y_a(\varepsilon Z_b) && (\because\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) \text{ の積の結合律}) \\
&= -Y_a(-Z_b\varepsilon) && (\because\ \text{Step 1 の } \varepsilon Z_b = -Z_b\varepsilon) \\
&= (Y_aZ_b)\varepsilon && (\because\ \text{スカラー倍と積の可換性、および } -(-1) = 1)
\end{aligned}$$

が成り立つ。特に $\varepsilon W = W\varepsilon$ かつ $\varepsilon(Y_mZ_{m+1}) = (Y_mZ_{m+1})\varepsilon$。また

$$\begin{aligned}
\varepsilon(\varepsilon W) &= \varepsilon(W\varepsilon) && (\because\ \text{上で示した } \varepsilon W = W\varepsilon) \\
&= (\varepsilon W)\varepsilon && (\because\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) \text{ の積の結合律})
\end{aligned}$$

であるから、$G, G^{(+)}$ はいずれも ε と可換な元の $\mathbb{C}$-線型結合であり、積の双線型性より $\varepsilon G = G\varepsilon$、$\varepsilon G^{(+)} = G^{(+)}\varepsilon$。

Step 3: $\mathcal{F}^{(+)}$ は $\hat{W}, \hat{G}, \hat{G}^{(+)}$ で不変である。$A \in \{W, G, G^{(+)}\}$ は Step 2 より $\varepsilon A = A\varepsilon$ を満たすから、主張 4.4 (2) より次が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\hat{\varepsilon} \circ \hat{A} &= \widehat{\varepsilon A} && (\because\ \textbf{end} \text{ が積を保つこと}) \\
&= \widehat{A\varepsilon} && (\because\ \text{Step 2 の } \varepsilon A = A\varepsilon) \\
&= \hat{A} \circ \hat{\varepsilon} && (\because\ \textbf{end} \text{ が積を保つこと})
\end{aligned}$$

よって $f \in \mathcal{F}^{(+)}$（すなわち $\hat{\varepsilon} f = f$）に対し

$$\begin{aligned}
\hat{\varepsilon}\left(\hat{A}f\right) &= \hat{A}\left(\hat{\varepsilon}f\right) && (\because\ \hat{\varepsilon} \circ \hat{A} = \hat{A} \circ \hat{\varepsilon}) \\
&= \hat{A}f && (\because\ f \in \mathcal{F}^{(+)} \text{ すなわち } \hat{\varepsilon}f = f)
\end{aligned}$$

であり $\hat{A}f \in \mathcal{F}^{(+)}$。

Step 4: $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ に対し $\hat{G}f = \hat{G}^{(+)}f$。まず $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の中で

$$\begin{aligned}
G - G^{(+)} &= iK_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - \varepsilon W\right) - iK_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - W\right) && \left(\because\ G, G^{(+)} \text{ の定義}\right) \\
&= iK_1\left(\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - \varepsilon W\right) - \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - W\right)\right) && (\because\ \text{スカラー倍の分配則}) \\
&= iK_1\left(-\varepsilon W + W\right) && (\because\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) \text{ の加法の四則})
\end{aligned}$$

である。主張 4.4 の線型性と (2) より $\widehat{\varepsilon W} = \hat{\varepsilon} \circ \hat{W}$ だから、Step 3 の $\hat{W}f \in \mathcal{F}^{(+)}$ を使って

$$
\begin{aligned}
\left(\hat{G}-\hat{G}^{(+)}\right)f &= \left(\widehat{G-G^{(+)}}\right)f && (\because \textbf{end} \text{ の線型性（差の像は像の差）})\\
&= \left(iK_1\left(\widehat{-\varepsilon W}+W\right)\right)f && (\because \text{上で示した } G-G^{(+)} \text{ の表示})\\
&= iK_1\left(-\widehat{\varepsilon W}+\hat{W}\right)f && (\because \textbf{end} \text{ の線型性})\\
&= iK_1\left(-\hat{\varepsilon}\left(\hat{W}f\right)+\hat{W}f\right) && (\because \widehat{\varepsilon W}=\hat{\varepsilon}\circ\hat{W} \text{（}\textbf{end}\text{ が積を保つこと）と写像の値の書き下し})\\
&= iK_1\left(-\hat{W}f+\hat{W}f\right) && (\because \hat{W}f\in\mathcal{F}^{(+)} \text{ より } \hat{\varepsilon}(\hat{W}f)=\hat{W}f(\text{Step 3}))\\
&= iK_1\cdot 0 && (\because -x+x=0)\\
&= 0 && (\because \text{零ベクトルのスカラー倍は零ベクトル})
\end{aligned}
$$

が成り立つ。よって $\hat{G}f=\hat{G}^{(+)}f$。

Step 5: $n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $f\in\mathcal{F}^{(+)}$ について $\hat{G}^n f=\left(\hat{G}^{(+)}\right)^n f$（$\hat{G}^0:=\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$）。$n$ についての帰納法で示す。$n=0$ では

$$
\begin{aligned}
\hat{G}^0 f &= \mathrm{id}_{\mathcal{F}}(f) && (\because \text{写像の零乗の定義})\\
&= f && (\because \text{恒等写像の定義})\\
&= \mathrm{id}_{\mathcal{F}}(f) && (\because \text{恒等写像の定義})\\
&= \left(\hat{G}^{(+)}\right)^0 f && (\because \text{写像の零乗の定義})
\end{aligned}
$$

である。n で成立するとし $f\in\mathcal{F}^{(+)}$ を取ると、Step 4 より $g:=\hat{G}f=\hat{G}^{(+)}f$ であり、Step 3 より $g\in\mathcal{F}^{(+)}$ だから帰納法の仮定を g に適用でき、

$$
\begin{aligned}
\hat{G}^{n+1}f &= \hat{G}^n\left(\hat{G}f\right) && (\because \text{写像の冪の定義})\\
&= \hat{G}^n g && (\because g:=\hat{G}f)\\
&= \left(\hat{G}^{(+)}\right)^n g && (\because \text{帰納法の仮定を } g\in\mathcal{F}^{(+)} \text{ に適用})\\
&= \left(\hat{G}^{(+)}\right)^n\left(\hat{G}^{(+)}f\right) && (\because \text{Step 4 の } g=\hat{G}^{(+)}f)\\
&= \left(\hat{G}^{(+)}\right)^{n+1} f && (\because \text{写像の冪の定義})
\end{aligned}
$$

Step 6: exp への持ち上げ。主張 4.7 を $A=G$ と $A=G^{(+)}$ に適用する。任意の $f\in\mathcal{F}$ について、

$$
\begin{aligned}
(\mathbf{end}(V_1))(f) &= (\mathbf{end}(\exp(G)))(f) && (\because V_1=\exp(G))\\
&= \lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}\frac{1}{n!}\hat{G}^n f && \left(\because \text{行列表示と線型写像表示の間の指数関数保存}\right),
\end{aligned}
$$

および

$$
\begin{aligned}
\left(\mathbf{end}\left(V_1^{(+)}\right)\right)(f) &= \left(\mathbf{end}\left(\exp\left(G^{(+)}\right)\right)\right)(f) && \left(\because V_1^{(+)}=\exp(G^{(+)})\right)\\
&= \lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}\frac{1}{n!}\left(\hat{G}^{(+)}\right)^n f && (\because \text{行列表示と線型写像表示の間の指数関数保存})
\end{aligned}
$$

が成り立つ。ここで解析的操作（$\mathbb{C}$ 上の無限級数の極限）へ移行するのはこの箇所だけであり、Step 1〜5 はすべて有限個の元の代数的な等式である。

いま $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ を任意に取る。Step 5 より、各 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について部分和が

$$\begin{aligned} S_N := \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \hat{G}^n f &= \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \left(\hat{G}^{(+)}\right)^n f \quad (\because \text{ Step 5 を各 } n \in \{0,\dots,N\} \text{ に適用}) \\ &=: S_N^{(+)} \qquad\qquad (\because \ S_N^{(+)} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

と一致する。上の各点収束より $S_N \to (\mathbf{end}(V_1))(f)$ かつ $S_N^{(+)} = S_N \to \left(\mathbf{end}(V_1^{(+)})\right)(f)$ であり、同一の点列が 2 つの極限 α, β を持てば、ノルムの三角不等式と極限の定義から次の鎖を得る。主張 2.92 のノルムの非負性・三角不等式・非退化性を用いる。

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|\alpha - \beta\| && (\because \text{ ノルムの非負性}) \\ &\leq \|\alpha - S_N\| + \|S_N - \beta\| && (\because \ \alpha - \beta = (\alpha - S_N) + (S_N - \beta) \text{ と三角不等式}) \\ &\longrightarrow 0 && (\because \ S_N \to \alpha \text{ かつ } S_N \to \beta)\,. \end{aligned}$$

したがって次の鎖を得る。

$$\begin{aligned} \|\alpha - \beta\| &= 0 \quad (\because \ 0 \leq \|\alpha - \beta\| \leq \|\alpha - S_N\| + \|S_N - \beta\| \to 0) \\ \alpha &= \beta \quad (\because \ \|\alpha - \beta\| = 0 \text{ なら } \alpha - \beta = 0)\,. \end{aligned}$$

よって

$$(\mathbf{end}(V_1))\, f = \left(\mathbf{end}\left(V_1^{(+)}\right)\right) f \quad (\because \text{ 同一の点列 } S_N = S_N^{(+)} \text{ の極限の一意性})$$

$f \in \mathcal{F}^{(+)}$ は任意だったから、$\mathcal{F}^{(+)}$ 上の写像として

$$\begin{aligned} (\mathbf{end}(V_1))\,|_{\mathcal{F}^{(+)}} &= \left(\mathbf{end}\left(V_1^{(+)}\right)\right)|_{\mathcal{F}^{(+)}} && (\because \text{ 上の等式が任意の } f \in \mathcal{F}^{(+)} \text{ で成り立つこと}) \\ &= (\mathbf{end}(\exp(iK_1(Y_1Z_2 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1))))\,|_{\mathcal{F}^{(+)}} && (\because \ V_1^{(+)} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

が示された。 □

定義 13.21 ($V_1^{(+)}$ の定義)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.15 の K_1, Y_m, Z_m を用いて

$$V_1^{(+)} := \exp(iK_1(Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

とおく。exp は 定義 4.1 の同一視のもとでの 定義 3.4 の exp である。

定義 13.22 (一般生成子$H_1^{(+)}$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、各 $m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、定義 13.2 と定義 13.1 で定めた具体的な複素行列 $Y_m, Z_m \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用いる。$H_1^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を

$$H_1^{(+)} := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1$$

と定める。行列の積は 定義 1.6 の成分表示による。

定義 13.23 (一般生成子H_2)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、各 $m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、定義 13.1 と定義 13.2 で定めた具体的な複素行列 $Z_m, Y_m \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用い、$H_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を

$$H_2 := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_m Y_m$$

と定める。行列の積は 定義 1.6 の成分表示による。

主張 13.24 ($V_1^{(+)}$ の一般生成子による指数表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、定義 13.15 の $K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$、および虚数単位 $i \in \mathbb{C}$ を用いる。定義 13.22 の $H_1^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と 定義 13.21 の $V_1^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について、

$$V_1^{(+)} = \exp\Big(iK_1 H_1^{(+)}\Big)$$

証明. 定義 13.21 の表示中の $Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}}$ は、添字を省略しない有限和 $\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1}$ を表す。特に $M_{\mathrm{col}} = 2$ では一項 Y_1Z_2 だけである。したがって、

$$\begin{aligned} V_1^{(+)} &= \exp\left(iK_1 \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1\right)\right) && (\because \text{第一転送行列の定義と上の有限和記法。定義 13.21}) \\ &= \exp\Big(iK_1 H_1^{(+)}\Big) && (\because \text{一般生成子の定義。定義 13.22}) \end{aligned}$$

□

主張 13.25 (V_2 の一般生成子による指数表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、定義 13.15 の $K_2^*, s_2 \in \mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$、および虚数単位 $i \in \mathbb{C}$ を用いる。定義 13.23 の $H_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と同じ記号定義の $V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について、主張 13.17 と合わせると

$$V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2)$$

証明. 主張 13.17 の表示中の $Z_1Y_1 + Z_2Y_2 + \cdots + Z_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}$ は、添字を省略しない有限和 $\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_m Y_m$ を表す。特に $M_{\mathrm{col}} = 1$ では一項 Z_1Y_1 だけである。したがって、

$$\begin{aligned} V_2 &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(iK_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_m Y_m\right) && (\because \text{第二転送行列の Jordan–Wigner 表示と上の有限和記法。主張 13.17}) \\ &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2) && (\because \text{一般生成子の定義。定義 13.23}) \end{aligned}$$

□

定義 13.26 ($\mathcal{F}^{(+)}$ への射影子$P^{(+)}$)**.** 定義 13.15 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について

$$P^{(+)} := \tfrac{1}{2}(I + \varepsilon) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。ここで $I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}$ である。

主張 13.27 ($P^{(+)}$ の性質)**.** 定義 13.26 の $P^{(+)}$ と 定義 13.18 の $\mathcal{F}^{(+)}$ について、次の二つが成り立つ。ここで $X \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について $X^2 := XX$ と書く。

- (1) $\big(P^{(+)}\big)^2 = P^{(+)}$
- (2) $\mathrm{im}\, P^{(+)} := \left\{ P^{(+)}x \;\middle|\; x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \right\} = \mathcal{F}^{(+)}$

証明. 以下 $n := 2^{M_{\mathrm{col}}}$、$I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ と書き、$\mathbb{C}^n$ の元は 定義 1.6 のとおり n 行 1 列の行列として積に入れる。スカラー $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, 2 は、定義 1.13 の包含で実数 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, 2 を写した $\mathbb{C}$ の元であり、以下の数の等式はすべて $\mathbb{C}$ の中の等式である。

(1)

$$
\begin{aligned}
\left(P^{(+)}\right)^2 &= P^{(+)}P^{(+)} \quad (\because X^2 := XX) \\
&= \left(\tfrac{1}{2}\left(I+\varepsilon\right)\right)\left(\tfrac{1}{2}\left(I+\varepsilon\right)\right) \quad (\because \text{定義 13.26}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\left(I+\varepsilon\right)\left(\tfrac{1}{2}\left(I+\varepsilon\right)\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.18}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{2}\left(\left(I+\varepsilon\right)\left(I+\varepsilon\right)\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.19}) \\
&= \left(\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2}\right)\left(\left(I+\varepsilon\right)\left(I+\varepsilon\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.41}) \\
&= \tfrac{1}{4}\left(\left(I+\varepsilon\right)\left(I+\varepsilon\right)\right) \quad (\because \text{主張 1.29 と } \mathbb{R} \text{ での } \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{4}) \\
&= \tfrac{1}{4}\left(I\left(I+\varepsilon\right)+\varepsilon\left(I+\varepsilon\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.24}) \\
&= \tfrac{1}{4}\left(\left(II+I\varepsilon\right)+\left(\varepsilon I+\varepsilon\varepsilon\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.23 を二つの積へ同時に適用}) \\
&= \tfrac{1}{4}\left(\left(I+\varepsilon\right)+\left(\varepsilon I+\varepsilon\varepsilon\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.16 を } II,\ I\varepsilon \text{ へ同時に適用}) \\
&= \tfrac{1}{4}\left(\left(I+\varepsilon\right)+\left(\varepsilon+\varepsilon\varepsilon\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.17}) \\
&= \tfrac{1}{4}\left(\left(I+\varepsilon\right)+\left(\varepsilon+I\right)\right) \quad (\because \varepsilon\varepsilon=\varepsilon^2=I,\ \text{主張 13.19}) \\
&= \tfrac{1}{4}\left(\left(I+\varepsilon\right)+\left(I+\varepsilon\right)\right) \quad (\because \text{定義 2.4 による成分ごとの加法の可換性}) \\
&= \tfrac{1}{4}\left(2\left(I+\varepsilon\right)\right) \quad (\because \text{定義 2.4 と 定義 2.3 により成分ごとに } z+z=2z) \\
&= \left(\tfrac{1}{4}\cdot 2\right)\left(I+\varepsilon\right) \quad (\because \text{主張 2.41}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(I+\varepsilon\right) \quad (\because \text{主張 1.29 と } \mathbb{R} \text{ での } \tfrac{1}{4}\cdot 2=\tfrac{1}{2}) \\
&= P^{(+)} \quad (\because \text{定義 13.26})
\end{aligned}
$$

(2) 定義 13.18 より $\mathcal{F}^{(+)} = \{f \in \mathbb{C}^n \mid \varepsilon f = f\}$ である。
$(\subseteq)$ $y \in \operatorname{im} P^{(+)}$ とすると、ある $x \in \mathbb{C}^n$ について $y = P^{(+)}x$ と書ける。このとき

$$
\begin{aligned}
P^{(+)}y &= P^{(+)}\left(P^{(+)}x\right) \quad (\because y = P^{(+)}x) \\
&= \left(P^{(+)}P^{(+)}\right)x \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \left(P^{(+)}\right)^2 x \quad (\because X^2 := XX) \\
&= P^{(+)}x \quad (\because (1)) \\
&= y \quad (\because y = P^{(+)}x)
\end{aligned}
$$

であり、これを使うと

$$
\begin{aligned}
\varepsilon y &= \varepsilon\left(P^{(+)}y\right) \quad (\because \text{上の等式} P^{(+)}y = y) \\
&= \varepsilon\left(\left(\tfrac{1}{2}\left(I+\varepsilon\right)\right)y\right) \quad (\because \text{定義 13.26}) \\
&= \varepsilon\left(\tfrac{1}{2}\left(\left(I+\varepsilon\right)y\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.18}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\varepsilon\left(\left(I+\varepsilon\right)y\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.19}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\left(\varepsilon\left(I+\varepsilon\right)\right)y\right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\left(\varepsilon I+\varepsilon\varepsilon\right)y\right) \quad (\because \text{主張 2.23}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\left(\varepsilon+\varepsilon\varepsilon\right)y\right) \quad (\because \text{主張 2.17}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\left(\varepsilon+I\right)y\right) \quad (\because \varepsilon\varepsilon=\varepsilon^2=I,\ \text{主張 13.19}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\left(I+\varepsilon\right)y\right) \quad (\because \text{定義 2.4 による成分ごとの加法の可換性}) \\
&= \left(\tfrac{1}{2}\left(I+\varepsilon\right)\right)y \quad (\because \text{主張 2.18}) \\
&= P^{(+)}y \quad (\because \text{定義 13.26}) \\
&= y \quad (\because \text{上の等式} P^{(+)}y = y)
\end{aligned}
$$

となる。よって 定義 13.18 により $y \in \mathcal{F}^{(+)}$ である。

($\supseteq$) $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ とする。定義 13.18 により $\varepsilon f = f$ であり、

$$\begin{aligned}
P^{(+)}f &= \left(\tfrac{1}{2}\left(I+\varepsilon\right)\right) f \quad (\because \text{定義 13.26}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\left(I+\varepsilon\right) f\right) \quad (\because \text{主張 2.18}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(If+\varepsilon f\right) \quad (\because \text{主張 2.24}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(f+\varepsilon f\right) \quad (\because \text{主張 2.16}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(f+f\right) \quad (\because \text{仮定} \varepsilon f = f) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(2f\right) \quad (\because \text{定義 2.4 と 定義 2.3 により成分ごとに } z+z=2z) \\
&= \left(\tfrac{1}{2}\cdot 2\right) f \quad (\because \text{主張 2.41}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\, f \quad (\because \text{主張 1.29 と } \mathbb{R} \text{ での } \tfrac{1}{2}\cdot 2 = 1) \\
&= f \quad (\because \text{主張 2.42})
\end{aligned}$$

となる。よって $f = P^{(+)}f$ であり、$\operatorname{im} P^{(+)}$ の定義（$x := f$ と取る）により $f \in \operatorname{im} P^{(+)}$ である。 □

定義 13.28 ($V_1^{(+)}$ の平方根として用いる行列)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.15 の $K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$ と 定義 13.22 の $H_1^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用いて

$$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} := \exp\!\left(\tfrac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}\right) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。ここで $\frac{i}{2}$ は $i\,2_{\mathbb{C}}^{-1} \in \mathbb{C}$（$i$ は虚数単位、$2_{\mathbb{C}}^{-1}$ は $2_{\mathbb{C}} := (2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$ の 主張 1.56 の逆元。主張 14.24 の $\frac{i}{2}$ と同じ）を表し、$r_{\mathbb{C}}$ を 定義 1.13 の略記として、$\frac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}$ は、$\mathbb{C}$ の元 $\frac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}}$ による $H_1^{(+)}$ のスカラー倍 $\left(\frac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}}\right)H_1^{(+)}$ と読む。

定義 13.29 ($V^{(+)} := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$)**.** 定義 13.28 の $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と 主張 13.25 の $V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2)$ を用いて

$$V^{(+)} := \left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2\right) \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \ \in\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

積は 定義 1.6 による。主張 2.15 より括弧の付け方によらず同じ行列なので、以後括弧を省いて $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ とも書く。

主張 13.30 (ε は $\sum_m \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ と可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.3 の ε、定義 12.8 の σ_m^z と 定義 12.9 の $\sigma_{M_{\mathrm{col}}+1}^z := \sigma_1^z$ を用いて

$$D := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と置く（有限和は 定義 2.5)。このとき $\varepsilon D = D\varepsilon$ が成り立つ。

証明. $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ を取る。主張 13.7 を $k \to m$ で引いて $\varepsilon\sigma_m^z = -(\sigma_m^z \varepsilon)$。$m < M_{\mathrm{col}}$ なら同じ主張を $k \to m+1$ で、$m = M_{\mathrm{col}}$ なら 定義 12.9 の $\sigma_{M_{\mathrm{col}}+1}^z = \sigma_1^z$ と $k \to 1$ で引いて $\varepsilon\sigma_{m+1}^z = -(\sigma_{m+1}^z \varepsilon)$。よって 主張 2.68 ($G \to \varepsilon,\ X \to \sigma_m^z,\ Y \to \sigma_{m+1}^z$) より $\varepsilon(\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) = (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z)\varepsilon$ である。したがって

$$\begin{aligned}
\varepsilon D &= \varepsilon\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\Big) \quad (\because\ D \text{ の定義}) \\
&= \Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\Big)\varepsilon \quad (\because\ \text{主張 2.70 } (G \to \varepsilon,\ X_m \to \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z,\ r \to M_{\mathrm{col}})) \\
&= D\varepsilon \qquad\qquad (\because\ D \text{ の定義})
\end{aligned}$$

□

主張 13.31 (ε はV_1 と可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 12.6 の V_1（結合定数 $K_1 \in \mathbb{R}_{>0}$）について $\varepsilon V_1 = V_1 \varepsilon$ が成り立つ。

証明. $D := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$、$(K_1)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記とする。主張 13.30 より $\varepsilon D = D\varepsilon$、これと 主張 2.69（$G \to \varepsilon,\ c \to (K_1)_{\mathbb{C}},\ X \to D$）より $\varepsilon\big((K_1)_{\mathbb{C}} D\big) = \big((K_1)_{\mathbb{C}} D\big)\varepsilon$ である。よって

$$\begin{aligned}
\varepsilon V_1 &= \varepsilon \exp\big((K_1)_{\mathbb{C}} D\big) && (\because \text{ 主張 12.19}) \\
&= \exp\big((K_1)_{\mathbb{C}} D\big)\varepsilon && (\because \text{ 主張 3.6 } (A \to \varepsilon,\ B \to (K_1)_{\mathbb{C}} D)) \\
&= V_1 \varepsilon && (\because \text{ 主張 12.19})
\end{aligned}$$

□

主張 13.32 (ε はV_2 と可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 12.6 の V_2（結合定数 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$）について $\varepsilon V_2 = V_2 \varepsilon$ が成り立つ。

証明. 定義 12.25 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ について $R := (K_2^*)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x$、$\lambda := \big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$（定義 12.28 の前係数。sinh・平方根は実数の値をとるので、ここで $\mathbb{R}$ を使う）と置く（$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記）。主張 13.6 より各 m について $\varepsilon \sigma_m^x = \sigma_m^x \varepsilon$、主張 2.70（$G \to \varepsilon,\ X_m \to \sigma_m^x,\ r \to M_{\mathrm{col}}$）より $\varepsilon \sum_m \sigma_m^x = \big(\sum_m \sigma_m^x\big)\varepsilon$、主張 2.69（$c \to (K_2^*)_{\mathbb{C}}$）より $\varepsilon R = R\varepsilon$、主張 3.6（$A \to \varepsilon,\ B \to R$）より $\varepsilon \exp(R) = \exp(R)\varepsilon$ である。よって

$$\begin{aligned}
\varepsilon V_2 &= \varepsilon\big(\lambda \exp(R)\big) && (\because \text{ 主張 12.29 と } R, \lambda \text{ の定義}) \\
&= \big(\lambda \exp(R)\big)\varepsilon && (\because \text{ 主張 2.69 } (G \to \varepsilon,\ c \to \lambda,\ X \to \exp(R))) \\
&= V_2 \varepsilon && (\because \text{ 主張 12.29 と } R, \lambda \text{ の定義})
\end{aligned}$$

□

主張 13.33 (ε は$H_1^{(+)}$ と可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 13.22 の $H_1^{(+)}$ について $\varepsilon H_1^{(+)} = H_1^{(+)} \varepsilon$ が成り立つ。

証明. $a, b \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について、主張 13.10 より $\varepsilon Y_a = -(Y_a \varepsilon)$、主張 13.9 より $\varepsilon Z_b = -(Z_b \varepsilon)$ だから、主張 2.68（$G \to \varepsilon,\ X \to Y_a,\ Y \to Z_b$）より $\varepsilon(Y_a Z_b) = (Y_a Z_b)\varepsilon$ である。$M_{\mathrm{col}} - 1 \geq 1$ なので 主張 2.70（$X_m \to Y_m Z_{m+1},\ r \to M_{\mathrm{col}} - 1$）より $\varepsilon \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} = \big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1}\big)\varepsilon$ である。よって

$$\begin{aligned}
\varepsilon H_1^{(+)} &= \varepsilon\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1\Big) && (\because \text{ 定義 13.22}) \\
&= \Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1\Big)\varepsilon && (\because \text{ 主張 2.71 } (G \to \varepsilon,\ X \to \textstyle\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1},\ W \to Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1)) \\
&= H_1^{(+)} \varepsilon && (\because \text{ 定義 13.22})
\end{aligned}$$

□

主張 13.34 (ε は$V_1^{(+)}$ と可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 13.21 の $V_1^{(+)}$ について $\varepsilon V_1^{(+)} = V_1^{(+)} \varepsilon$ が成り立つ。

証明. $c := i\,(K_1)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$（$(K_1)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記）と置く。主張 13.33 と 主張 2.69（$G \to \varepsilon,\ X \to H_1^{(+)}$）より $\varepsilon\big(cH_1^{(+)}\big) = \big(cH_1^{(+)}\big)\varepsilon$ である。よって

$$\begin{aligned}
\varepsilon V_1^{(+)} &= \varepsilon \exp\big(cH_1^{(+)}\big) && (\because \text{ 主張 13.24}) \\
&= \exp\big(cH_1^{(+)}\big)\varepsilon && (\because \text{ 主張 3.6 } (A \to \varepsilon,\ B \to cH_1^{(+)})) \\
&= V_1^{(+)} \varepsilon && (\because \text{ 主張 13.24})
\end{aligned}$$

□

主張 13.35 (ε は $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 13.28 の $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ について $\varepsilon \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \varepsilon$ が成り立つ。

証明. $c := \frac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ ($(K_1)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記) と置く。主張 13.33 と 主張 2.69 $(G \to \varepsilon,\ X \to H_1^{(+)})$ より $\varepsilon\big(cH_1^{(+)}\big) = \big(cH_1^{(+)}\big)\varepsilon$ である。よって

$$\begin{aligned}
\varepsilon \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} &= \varepsilon \exp\big(cH_1^{(+)}\big) && (\because \text{ 定義 13.28}) \\
&= \exp\big(cH_1^{(+)}\big)\varepsilon && (\because \text{ 主張 3.6 } (A \to \varepsilon,\ B \to cH_1^{(+)})) \\
&= \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \varepsilon && (\because \text{ 定義 13.28})
\end{aligned}$$

□

主張 13.36 (ε と可換な行列は$P^{(+)}$ とも可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.3 の ε と 定義 13.26 の $P^{(+)}$ を用いる。$X \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ が $\varepsilon X = X\varepsilon$ を満たすならば、

$$P^{(+)}X = XP^{(+)}$$

が成り立つ。

証明. $I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ と書く。スカラー $\frac{1}{2}$ は、定義 1.13 の包含で実数 $\frac{1}{2}$ を写した $\mathbb{C}$ の元である。

$$\begin{aligned}
P^{(+)}X &= \left(\tfrac{1}{2}(I+\varepsilon)\right)X && (\because \text{ 定義 13.26}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left((I+\varepsilon)\,X\right) && (\because \text{ 主張 2.18}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(IX + \varepsilon X\right) && (\because \text{ 主張 2.24}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(X + \varepsilon X\right) && (\because \text{ 主張 2.16}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(X + X\varepsilon\right) && (\because \text{ 仮定 } \varepsilon X = X\varepsilon) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(XI + X\varepsilon\right) && (\because \text{ 主張 2.17}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(X\,(I+\varepsilon)\right) && (\because \text{ 主張 2.23}) \\
&= X\left(\tfrac{1}{2}(I+\varepsilon)\right) && (\because \text{ 主張 2.19}) \\
&= XP^{(+)} && (\because \text{ 定義 13.26})
\end{aligned}$$

□

主張 13.37 ($P^{(+)}$ はV_1 と可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.26 の $P^{(+)}$ と 定義 12.6 の V_1 (結合定数 $K_1 \in \mathbb{R}_{>0}$) について $P^{(+)}V_1 = V_1P^{(+)}$ が成り立つ。

証明.

$$P^{(+)}V_1 = V_1P^{(+)} \quad (\because \text{ 主張 13.36 } (X \to V_1),\ \text{その仮定は 主張 13.31})$$

□

主張 13.38 ($P^{(+)}$ はV_2 と可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.26 の $P^{(+)}$ と 定義 12.6 の V_2 (結合定数 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$) について $P^{(+)}V_2 = V_2P^{(+)}$ が成り立つ。

証明.

$$P^{(+)}V_2 = V_2P^{(+)} \quad (\because \text{ 主張 13.36 } (X \to V_2),\ \text{その仮定は 主張 13.32})$$

□

主張 13.39 ($P^{(+)}$ は$V_1^{(+)}$ と可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.26 の $P^{(+)}$ と 定義 13.21 の $V_1^{(+)}$ について $P^{(+)}V_1^{(+)} = V_1^{(+)}P^{(+)}$ が成り立つ。

証明.

$$P^{(+)}V_1^{(+)} = V_1^{(+)}P^{(+)} \quad (\because \text{ 主張 13.36 } (X \to V_1^{(+)}),\ \text{その仮定は 主張 13.34})$$

□

主張 13.40 ($P^{(+)}$ は $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と可換)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.26 の $P^{(+)}$ と 定義 13.28 の $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ について $P^{(+)}\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}P^{(+)}$ が成り立つ。

証明.

$$P^{(+)}\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}P^{(+)} \quad (\because \text{ 主張 13.36 } (X \to \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}),\ \text{その仮定は 主張 13.35})$$

□

定義 13.41 ($V_1^{1/2} := \exp\left(\frac{1}{2}K_1 D\right)$)**.** 主張 12.19 の $V_1 = \exp(K_1 D)$（$D := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$、$\sigma_{M_{\mathrm{col}}+1}^z := \sigma_1^z$）について

$$V_1^{1/2} := \exp\left(\tfrac{1}{2}K_1 D\right) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。定理 3.7 より $V_1^{1/2}V_1^{1/2} = \exp(K_1 D) = V_1$ であり、記号 $V_1^{1/2}$ はこの意味での平方根である（$\frac{1}{2}K_1 D$ は自分自身と可換)。

定義 13.42 (対称化転送行列W)**.** 定義 13.41 の $V_1^{1/2}$ と 定義 13.15 の V_2 を用いて

$$W := \left(V_1^{1/2} V_2\right) V_1^{1/2} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。積は 定義 1.6 による。主張 2.15 より括弧の付け方によらず同じ行列なので、以後括弧を省いて $V_1^{1/2}V_2V_1^{1/2}$ とも書く。

主張 13.43 ($WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、結合定数 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。定義 13.42 の W、定義 13.26 の $P^{(+)}$、定義 13.29 の $V^{(+)}$（いずれも $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の元）について、次が成り立つ。

$$WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$$

証明. $n := 2^{M_{\mathrm{col}}}$、$B := V_1^{1/2}$（定義 13.41)、$C := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$（定義 13.28)、$P := P^{(+)}$ と書く。$\mathbb{C}^n$ の元は 定義 1.6 のとおり n 行 1 列の行列として積に入れる。$V_1' \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ を、定義 12.6 の V_1 を結合定数 $\frac{1}{2}K_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ で作った行列とする。$D := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ は 定義 13.41 のもの、$H_1^{(+)}$ は 定義 13.22 のもの、$\mathcal{F}^{(+)}$ は 定義 13.18 のもので、実数 $\frac{1}{2}$, K_1, $\frac{1}{2}K_1$ は、行列のスカラー倍に入るときは 定義 1.13 の包含で写した $\mathbb{C}$ の元を同じ記号で書く（下の第一の鎖の後ろから 3〜6 行目の 4 行だけは、包含を $(\frac{1}{2})_{\mathbb{C}}$, $(K_1)_{\mathbb{C}}$ と書く)。任意の $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ について

$$\begin{aligned}
Bf &= \exp(\tfrac{1}{2}K_1 D)\, f && (\because \text{ 定義 13.41}) \\
&= V_1' f && (\because \text{ 主張 12.19 } (K_1 \to \tfrac{1}{2}K_1)) \\
&= \left(\mathbf{end}(V_1')\right)(f) && (\because \text{ 主張 4.6}) \\
&= \left(\mathbf{end}\left(\exp\left(i\left(\tfrac{1}{2}K_1\right)(Y_1 Z_2 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)\right)\right)\right)(f) && (\because \text{ 主張 13.20 } (K_1 \to \tfrac{1}{2}K_1),\ f \in \mathcal{F}^{(+)}) \\
&= \left(\mathbf{end}\left(\exp\left(i\left(\tfrac{1}{2}K_1\right) H_1^{(+)}\right)\right)\right)(f) && (\because \text{ 定義 13.22}) \\
&= \exp\left(i\left(\tfrac{1}{2}K_1\right) H_1^{(+)}\right) f && (\because \text{ 主張 4.6}) \\
&= \exp\left(\left(i((\tfrac{1}{2})_{\mathbb{C}}(K_1)_{\mathbb{C}})\right) H_1^{(+)}\right) f && (\because \text{ 主張 1.29 } (a \to \tfrac{1}{2},\ b \to K_1\text{。右辺から左辺へ)。実数の積}\tfrac{1}{2}K_1 \text{ の像は像どうしの}\mathbb{C}\text{ の積}) \\
&= \exp\left(\left((i(\tfrac{1}{2})_{\mathbb{C}})(K_1)_{\mathbb{C}}\right) H_1^{(+)}\right) f && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= \exp\left(\left((i\, 2_{\mathbb{C}}^{-1})(K_1)_{\mathbb{C}}\right) H_1^{(+)}\right) f && (\because \text{ 主張 1.57}) \\
&= \exp\left(\left(\tfrac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}}\right) H_1^{(+)}\right) f && (\because \text{ 定義 13.28 の読み } \tfrac{i}{2} = i\, 2_{\mathbb{C}}^{-1}) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) f && (\because \text{ 定義 13.28 の読み（}\mathbb{C}\text{ の元 } \tfrac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}} \text{ によるスカラー倍）}) \\
&= Cf && (\because \text{ 定義 13.28).}
\end{aligned}$$

任意の $x \in \mathbb{C}^n$ について、主張 13.27 (2) より $Px \in \mathcal{F}^{(+)}$ なので、

$$\begin{aligned}
(\mathbf{end}(BP))(x) &= (BP)x && (\because \text{主張 4.6}) \\
&= B(Px) && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= C(Px) && (\because \text{上の} Bf = Cf \text{ を} f \to Px \text{ で}) \\
&= (CP)x && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= (\mathbf{end}(CP))(x) && (\because \text{主張 4.6}).
\end{aligned}$$

これがすべての $x \in \mathbb{C}^n$ で成り立つので、$\mathcal{F} = \mathbb{C}^n$ 上の写像として $\mathbf{end}(BP) = \mathbf{end}(CP)$ であり、主張 4.4 (1) の単射性より $BP = CP$ である。これと 主張 13.40 の $PC = CP$、主張 13.38 の $PV_2 = V_2P$ を用いると、

$$\begin{aligned}
WP &= ((BV_2)B)\,P && (\because \text{定義 13.42}) \\
&= (BV_2)(BP) && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= (BV_2)(CP) && (\because BP = CP) \\
&= (BV_2)(PC) && (\because \text{主張 13.40}) \\
&= ((BV_2)P)\,C && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= (B(V_2P))\,C && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= (B(PV_2))\,C && (\because \text{主張 13.38}) \\
&= ((BP)V_2)\,C && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= ((CP)V_2)\,C && (\because BP = CP) \\
&= (C(PV_2))\,C && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= (C(V_2P))\,C && (\because \text{主張 13.38}) \\
&= ((CV_2)P)\,C && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= (CV_2)(PC) && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= (CV_2)(CP) && (\because \text{主張 13.40}) \\
&= ((CV_2)C)\,P && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= V^{(+)}P && (\because \text{定義 13.29}).
\end{aligned}$$

□

主張 13.44 ($V^{(+)}$ の$H_1^{(+)}$, H_2 による指数表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、虚数単位 $i \in \mathbb{C}$ を用いる。定義 13.29 の $V^{(+)}$、定義 13.22 の $H_1^{(+)}$、定義 13.23 の H_2（いずれも $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の元）と 定義 12.25 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ について、

$$V^{(+)} = \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(iK_2^*H_2)\exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)$$

が成り立つ。ここに現れる exp は、定義 3.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

証明. 定義 12.26 の略記 $s_2 := \sinh 2K_2$ を用いる。

$$\begin{aligned}
V^{(+)} &= \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} && (\because \text{定義 13.29}) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) V_2 \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) && (\because \text{定義 13.28}) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(iK_2^*H_2)\exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) && (\because \text{主張 13.25}) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(iK_2^*H_2)\exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) && (\because \text{定義 12.26})
\end{aligned}$$

□

主張 13.45 ($WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$、$\mathcal{F}^{(+)} = \operatorname{im} P^{(+)}$ と$V^{(+)}$ の指数表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、虚数単位 $i \in \mathbb{C}$ を用いる。定義 13.3 の $\varepsilon = \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x$、定義 13.26 の $P^{(+)} = \frac{1}{2}(I + \varepsilon)$ ($I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}$)、定義 13.42 の W、定義 13.29 の $V^{(+)}$、定義 13.22 の $H_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1$、定義 13.23 の $H_2 = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_m Y_m$ (いずれも $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の元)、定義 13.18 の $\mathcal{F}^{(+)} = \left\{ x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \;\middle|\; \varepsilon x = x \right\}$ と 定義 12.25 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ について、次の三つが成り立つ。

- (1) $WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$
- (2) $\mathcal{F}^{(+)} = \operatorname{im} P^{(+)} := \left\{ P^{(+)} x \;\middle|\; x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \right\}$
- (3) $V^{(+)} = \exp\left(\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}\right) (2 \sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(i K_2^* H_2) \exp\left(\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}\right)$

(3) に現れる exp は、定義 3.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

証明. (1) 主張 13.43 そのものである。
(2) 主張 13.27 の (2) の $\operatorname{im} P^{(+)} = \mathcal{F}^{(+)}$ の両辺を入れ替えたものである。
(3) 主張 13.44 そのものである。 □

部 III
固有値問題

14 離散 Fourier 変換による2×2 行列$A(\tilde{\theta}_\mu)$ への帰着

定義 14.1 ($\delta_{(\mu,\nu)}^{(M_{\mathrm{col}})}$ の定義)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ とし、$\mu, \nu \in \mathbb{Z}$ とする。

$$\delta^{M_{\mathrm{col}}} : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \delta_{(\mu,\nu)}^{(M_{\mathrm{col}})} := \begin{cases} 1 & (\mu \equiv \nu \pmod{M_{\mathrm{col}}}) \\ 0 & (\mu \not\equiv \nu \pmod{M_{\mathrm{col}}}) \end{cases}$$

主張 14.2. $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ とし、$k \in \mathbb{Z}$ について、

$$\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\left(\frac{2\pi i j k}{M_{\mathrm{col}}}\right) = M_{\mathrm{col}}\, \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})}$$

証明. $k \equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}}$ であるか否かで場合を分ける。
(a) $k \equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}}$ のとき。$k = l M_{\mathrm{col}}$ を満たす $l \in \mathbb{Z}$ を 1 つ取る。

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\left(\frac{2\pi ijk}{M_{\mathrm{col}}}\right) &= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\left(\frac{2\pi ij \cdot lM_{\mathrm{col}}}{M_{\mathrm{col}}}\right) && (\because\ k = lM_{\mathrm{col}}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(2\pi i\, lj) && (\because\ M_{\mathrm{col}} \geq 1 \text{ より } M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ なので約分した}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} (\cos 2\pi lj + i \sin 2\pi lj) && (\because\ \text{オイラーの公式、定理 1.88}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} (1 + i \cdot 0) && (\because\ lj \in \mathbb{Z} \text{ なので } \cos 2\pi lj = 1,\ \sin 2\pi lj = 0) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} 1 && (\because\ 1 + i \cdot 0 = 1) \\
&= M_{\mathrm{col}} && (\because\ \text{項数が } M_{\mathrm{col}} \text{ である}) \\
&= M_{\mathrm{col}}\, \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(k,0)} && (\because\ k \equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}} \text{ なので } \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(k,0)} = 1 \text{ である、定義 14.1})
\end{aligned}
$$

(*b*) $k \not\equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}}$ のとき。$r := \exp\left(\frac{2\pi ik}{M_{\mathrm{col}}}\right) \in \mathbb{C}$ と置く。$k \not\equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}}$ なので $r \neq 1$ である。

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\left(\frac{2\pi ijk}{M_{\mathrm{col}}}\right) &= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} r^j && (\because\ r \text{ の定義と } \exp(a)^j = \exp(ja)) \\
&= r \cdot \frac{1 - r^{M_{\mathrm{col}}}}{1 - r} && (\because\ \text{等比数列の和の公式（} r \neq 1\text{）}) \\
&= r \cdot \frac{1 - \exp(2\pi ik)}{1 - r} && (\because\ r^{M_{\mathrm{col}}} = \exp(2\pi ik)) \\
&= r \cdot \frac{1 - 1}{1 - r} && (\because\ k \in \mathbb{Z} \text{ なので } \exp(2\pi ik) = 1) \\
&= 0 && (\because\ 1 - 1 = 0 \text{ であり、分子が } 0 \text{ の分数は } 0 \text{ である（} 1 - r \neq 0\text{）}) \\
&= M_{\mathrm{col}}\, \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(k,0)} && (\because\ k \not\equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}} \text{ なので } \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(k,0)} = 0 \text{ である、定義 14.1})
\end{aligned}
$$

□

主張 14.3 (*Z*と*Y*の反交換関係)**.**

$$
[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu,\nu)}, \quad [Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0, \quad [Y_\mu, Y_\nu]_+ = 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu,\nu)}
$$

証明. 記号を固定する。$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$（2 次の単位行列）とし、$I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ を $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の単位行列とする。主張 2.73 (2) より $I \boxtimes \cdots \boxtimes I = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$（左辺は M_{col} 個のクロネッカー積）である。$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ は 主張 6.1 の Pauli 行列である。

添字について。定義 13.15 の Z_m, Y_m は $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対して定義され、$Z_{M_{\mathrm{col}}+1} := Z_1$、$Y_{M_{\mathrm{col}}+1} := Y_1$ と M_{col} 周期に拡張されている。よって Z_μ, Y_ν は添字の M_{col} を法とする剰余類のみで定まり、代表元を $\mu, \nu \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ にとってよい。この範囲では $\mu \equiv \nu \pmod{M}_{\mathrm{col}} \iff \mu = \nu$ であるから、

$$
\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu,\nu)} = \begin{cases} 1 & (\mu = \nu) \\ 0 & (\mu \neq \nu) \end{cases} \qquad (\mu, \nu \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}) \qquad (\because\ \text{定義 14.1 の定義})
$$

クロネッカー積による表示。$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対し、定義 13.15 の σ^a_k が「第 k 因子だけが σ^a で他は I であるクロネッカー積」であることと、主張 2.73 (1)（クロネッカー積どうしの積は各サイトごとの積）および $I\sigma^a = \sigma^a I = \sigma^a$ から、

$$\sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{m-1}\, \sigma^a_m = \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(m-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \quad (a \in \{x, y, z\})$$

が成り立つ。特に 定義 13.15 の定義により

$$Z_\mu = \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \quad (\because \text{定義 13.15 の} Z_\mu \text{ の定義と、直前の表示を} a = z \text{ で読む})$$

$$Y_\mu = \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \quad (\because \text{定義 13.15 の} Y_\mu \text{ の定義と、直前の表示を} a = y \text{ で読む})$$

($\mu = 1$ のときは第 1 因子の左に因子が無い)。この端の場合も次の一続きで定義と一致する。

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sigma^z \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{上のクロネッカー積表示を} \mu = 1 \text{ で読む}) \\ &= \sigma^z_1 && (\because \text{定義 13.15 の} \sigma^z_1 \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_1 &= \sigma^y \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{上のクロネッカー積表示を} \mu = 1 \text{ で読む}) \\ &= \sigma^y_1 && (\because \text{定義 13.15 の} \sigma^y_1 \text{ の定義}) \end{aligned}$$

また $\mu = M_{\text{col}}$ のときは第 M_{col} 因子の右に因子が無い。

以下、$\mu, \nu \in \{1, \ldots, M_{\text{col}}\}$ を固定して 3 つの式を順に示す。

【第 1 式】$[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 2I_{\text{Mat}(2^{M_{\text{col}}}, \mathbb{C})} \delta^{(M_{\text{col}})}_{(\mu,\nu)}$。

$\mu = \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$\begin{aligned} Z_\mu Z_\mu &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{主張 2.73 の積の規則}) \\ &= \overbrace{I}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \sigma^x\sigma^x = I. \text{ 主張 6.1}) \\ &= \overbrace{I}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \sigma^z\sigma^z = I. \text{ 主張 6.1}) \\ &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because II = I) \\ &= I_{\text{Mat}(2^{M_{\text{col}}}, \mathbb{C})} && (\because \text{主張 2.73 の単位行列の規則}) \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} [Z_\mu, Z_\mu]_+ &= Z_\mu Z_\mu + Z_\mu Z_\mu && (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= I_{\text{Mat}(2^{M_{\text{col}}}, \mathbb{C})} + I_{\text{Mat}(2^{M_{\text{col}}}, \mathbb{C})} && (\because \text{上の計算を 2 箇所へ適用}) \\ &= 2I_{\text{Mat}(2^{M_{\text{col}}}, \mathbb{C})} && (\because \text{同じ行列の和}) \\ &= 2I_{\text{Mat}(2^{M_{\text{col}}}, \mathbb{C})}\, \delta^{(M_{\text{col}})}_{(\mu,\mu)} && (\because \delta^{(M_{\text{col}})}_{(\mu,\mu)} = 1) \end{aligned}$$

$\mu < \nu$ のとき、Z_μ, Z_ν をクロネッカー積で表して各サイトごとに積をとると、

$$\begin{aligned} Z_\mu Z_\nu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\ &\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because \text{上のクロネッカー積による表示}) \\ &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{主張 2.73 の積の規則}) \\ &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^x\sigma^x = II = I,\ I\sigma^a = \sigma^a) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
Z_\nu Z_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because \text{上のクロネッカー積による表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^xI)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^xI)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^zI)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{主張 2.73 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^x\sigma^x = II = I,\ \sigma^aI = \sigma^a)
\end{aligned}
$$

2 つの結果は第 μ 因子のみが異なり、そこでは $\sigma^x\sigma^z = -\sigma^z\sigma^x$（主張 6.1）である。クロネッカー積の第 μ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 2.74）よりスカラー -1 が外へ出て、

$$
\begin{aligned}
Z_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^x\sigma^z = -\sigma^z\sigma^x.\ \text{主張 6.1}) \\
&= -\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{主張 2.74 の第}\mu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Z_\nu && (\because \text{上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Z_\mu, Z_\nu]_+ &= Z_\mu Z_\nu + Z_\nu Z_\mu && (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Z_\nu + (-Z_\mu Z_\nu) && (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 && (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}
$$

$\mu > \nu$ のときは、上と同じ計算で μ と ν の役割が入れ替わる。因子ごとの積は

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Z_\nu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{主張 2.73 の積の規則と } \sigma^x\sigma^x = II = I) \\
Z_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{主張 2.73 の積の規則と } \sigma^x\sigma^x = II = I)
\end{aligned}
$$

であり（第 $i < \nu$ 因子は $\sigma^x\sigma^x = I$、$\nu < i < \mu$ では一方が I なので σ^x、第 μ 因子は一方が I なので σ^z、$i > \mu$ では $II = I$）、食い違うのは第 ν 因子だけで $\sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z$（主張 6.1）である。クロネッカー積の第 ν 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 2.74）でスカラー -1 を外へ出すと

$$
\begin{aligned}
Z_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^x\sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z.\ \text{主張 6.1}) \\
&= -\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{主張 2.74 の第}\nu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Z_\nu && (\because \text{上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Z_\mu, Z_\nu]_+ &= Z_\mu Z_\nu + Z_\nu Z_\mu && (\because \text{ 反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Z_\nu + (-Z_\mu Z_\nu) && (\because \text{ 直前の等式}) \\
&= 0 && (\because \text{ 加法の逆元})
\end{aligned}
$$

よって $\mu \neq \nu$ では $[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 0 = 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\delta_{(\mu,\nu)}^{(M_{\mathrm{col}})}$ であり、第 1 式が示された。

【第 2 式】$[Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0$。この式は $\mu = \nu$ の場合も含めてすべての μ, ν で成り立つ（対角成分も消える）。$\mu = \nu$、$\mu < \nu$、$\mu > \nu$ の 3 通りに分ける。

$\mu = \nu$ のとき、Z_μ と Y_μ は第 μ 因子以外がすべて等しいので、因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Y_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} \right) && (\because \ Z_\mu,\ Y_\mu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} && (\because \text{ 主張 2.73 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} && (\because \ \sigma^x\sigma^x = I. \text{ 主張 6.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ II = I. \text{ 主張 2.16 を } A = I \text{ として各因子へ同時適用})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Z_\mu &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} && (\because \text{ 主張 2.73 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} && (\because \ \sigma^x\sigma^x = I. \text{ 主張 6.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ II = I. \text{ 主張 2.16 を } A = I \text{ として各因子へ同時適用})
\end{aligned}
$$

食い違うのは第 μ 因子だけであり、主張 6.1 より $\sigma^y\sigma^z = -\sigma^z\sigma^y$。クロネッカー積の第 μ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 2.74）でスカラー -1 を外へ出すと

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{ 上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ \sigma^y\sigma^z = -\sigma^z\sigma^y. \text{ 主張 6.1}) \\
&= -\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{ 主張 2.74 の第}\mu \text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Y_\mu && (\because \text{ 上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Z_\mu, Y_\mu]_+ &= Z_\mu Y_\mu + Y_\mu Z_\mu && (\because \text{ 反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Y_\mu + (-Z_\mu Y_\mu) && (\because \text{ 直前の等式}) \\
&= 0 && (\because \text{ 加法の逆元})
\end{aligned}
$$

（これは 主張 6.14 を $j = \mu$、x_i, y_i を上の各因子として適用した形でもある。）

$\mu < \nu$ のとき、

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Y_\nu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because\ Z_\mu,\ Y_\nu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ \text{主張 2.73 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 6.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ I\sigma^x = \sigma^x,\ I\sigma^y = \sigma^y.\ \text{主張 2.16 を各因子へ同時適用}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because\ II = I.\ \text{主張 2.16 を } A = I \text{ として各因子へ同時適用})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because\ Y_\nu,\ Z_\mu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^xI)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^xI)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^yI)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ \text{主張 2.73 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^xI)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^xI)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^yI)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 6.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ \sigma^xI = \sigma^x,\ \sigma^yI = \sigma^y.\ \text{主張 2.17 を各因子へ同時適用}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because\ II = I.\ \text{主張 2.16 を } A = I \text{ として各因子へ同時適用})
\end{aligned}
$$

第 i 因子を i の範囲ごとに比べると、$i < \mu$ では両者とも I、$\mu < i < \nu$ では両者とも σ^x、$i = \nu$ では両者とも σ^y、$i > \nu$ では両者とも I で一致する。食い違うのは第 μ 因子だけで、そこは $\sigma^z\sigma^x$ と $\sigma^x\sigma^z = -\sigma^z\sigma^x$（主張 6.1）である。クロネッカー積の第 μ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 2.74）でスカラー -1 を外へ出して

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because\ \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because\ \sigma^x\sigma^z = -\sigma^z\sigma^x.\ \text{主張 6.1}) \\
&= -\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because\ \text{主張 2.74 の第}\mu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Y_\nu && (\because\ \text{上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Z_\mu, Y_\nu]_+ &= Z_\mu Y_\nu + Y_\nu Z_\mu && (\because\ \text{反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Y_\nu + (-Z_\mu Y_\nu) && (\because\ \text{直前の等式}) \\
&= 0 && (\because\ \text{加法の逆元})
\end{aligned}
$$

$\mu > \nu$ のとき、$\nu < \mu$ なので第 ν 因子で Z_μ 側が σ^x、Y_ν 側が σ^y になる。因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Y_\nu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\nu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because\ Z_\mu,\ Y_\nu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z I)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ \text{主張 2.73 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z I)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 6.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ \sigma^x I = \sigma^x,\ \sigma^z I = \sigma^z.\ \text{主張 2.17 を各因子へ同時適用}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because\ II = I.\ \text{主張 2.16 を } A = I \text{ として各因子へ同時適用})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\nu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because\ Y_\nu,\ Z_\mu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ \text{主張 2.73 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 6.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because\ I\sigma^x = \sigma^x,\ I\sigma^z = \sigma^z.\ \text{主張 2.16 を各因子へ同時適用}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because\ II = I.\ \text{主張 2.16 を } A = I \text{ として各因子へ同時適用})
\end{aligned}
$$

食い違うのは第 ν 因子だけで、そこは $\sigma^x\sigma^y$ と $\sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y$（主張 6.1）である。よって同様に、クロネッカー積の第 ν 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 2.74）でスカラー -1 が外へ出て

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because\ \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because\ \sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y.\ \text{主張 6.1}) \\
&= -\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because\ \text{主張 2.74 の第}\nu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Y_\nu && (\because\ \text{上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Z_\mu, Y_\nu]_+ &= Z_\mu Y_\nu + Y_\nu Z_\mu && (\because\ \text{反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Y_\nu + (-Z_\mu Y_\nu) && (\because\ \text{直前の等式}) \\
&= 0 && (\because\ \text{加法の逆元})
\end{aligned}
$$

3 通りすべてで $[Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0$ が示されたので、第 2 式が成り立つ。

【第 3 式】$[Y_\mu, Y_\nu]_+ = 2I_{\text{Mat}(2^{M_{\text{col}}},\mathbb{C})}\delta^{(M_{\text{col}})}_{(\mu,\nu)}$。

$\mu = \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Y_\mu &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 2.73 の積の規則}) \\
&= \overbrace{I}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \ \sigma^x\sigma^x = I. \text{ 主張 6.1}) \\
&= \overbrace{I}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \ \sigma^y\sigma^y = I. \text{ 主張 6.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ II = I) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\text{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{ 主張 2.73 の単位行列の規則})
\end{aligned}
$$

であるから

$$
\begin{aligned}
[Y_\mu, Y_\mu]_+ &= Y_\mu Y_\mu + Y_\mu Y_\mu && (\because \text{ 反交換子の定義}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\text{col}}},\mathbb{C})} + I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\text{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{ 上の計算を 2 箇所へ適用}) \\
&= 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\text{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{ 同じ行列の和}) \\
&= 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\text{col}}},\mathbb{C})}\, \delta^{(M_{\text{col}})}_{(\mu,\mu)} && (\because \ \delta^{(M_{\text{col}})}_{(\mu,\mu)} = 1)
\end{aligned}
$$

$\mu < \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Y_\nu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because \text{ 上のクロネッカー積による表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 2.73 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ \sigma^x\sigma^x = II = I, \ I\sigma^a = \sigma^a)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Y_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because \text{ 上のクロネッカー積による表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y I)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 2.73 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ \sigma^x\sigma^x = II = I, \ \sigma^a I = \sigma^a)
\end{aligned}
$$

食い違うのは第 μ 因子だけで、そこは $\sigma^y\sigma^x$ と $\sigma^x\sigma^y = -\sigma^y\sigma^x$（主張 6.1）である。クロネッカー積の第 μ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 2.74）でスカラー -1 を外へ出すと

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Y_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{ 上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^y\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ \sigma^x\sigma^y = -\sigma^y\sigma^x. \text{ 主張 6.1}) \\
&= -\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{ 主張 2.74 の第}\mu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Y_\mu Y_\nu && (\because \text{ 上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$\begin{aligned}[Y_\mu, Y_\nu]_+ &= Y_\mu Y_\nu + Y_\nu Y_\mu && (\because \text{反交換子の定義})\\ &= Y_\mu Y_\nu + (-Y_\mu Y_\nu) && (\because \text{直前の等式})\\ &= 0 && (\because \text{加法の逆元})\end{aligned}$$

$\mu > \nu$ のときは、上の計算で μ と ν の役割を入れ替えればよい。因子ごとの積は

$$Y_\mu Y_\nu = I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{主張 2.73 の積の規則と } \sigma^x\sigma^x = II = I)$$

$$Y_\nu Y_\mu = I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{主張 2.73 の積の規則と } \sigma^x\sigma^x = II = I)$$

であり（第 $i < \nu$ 因子は $\sigma^x\sigma^x = I$、$\nu < i < \mu$ では一方が I なので σ^x、第 μ 因子は一方が I なので σ^y、$i > \mu$ では $II = I$）、食い違うのは第 ν 因子だけで $\sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y$ であるから、クロネッカー積の第 ν 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 2.74）でスカラー -1 を外へ出すと

$$\begin{aligned}Y_\nu Y_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{上の計算})\\ &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y.\ \text{主張 6.1})\\ &= -\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{主張 2.74 の第}\nu\text{ 因子についての線型性})\\ &= -Y_\mu Y_\nu && (\because \text{上の計算})\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}[Y_\mu, Y_\nu]_+ &= Y_\mu Y_\nu + Y_\nu Y_\mu && (\because \text{反交換子の定義})\\ &= Y_\mu Y_\nu + (-Y_\mu Y_\nu) && (\because \text{直前の等式})\\ &= 0 && (\because \text{加法の逆元})\end{aligned}$$

よって $\mu \neq \nu$ では $[Y_\mu, Y_\nu]_+ = 0 = 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu,\nu)}$ であり、第 3 式が示された。以上で 3 式すべてが証明された。 □

主張 14.4. $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X, Y \in \mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ とする。exp は定義 3.4、$\mathrm{ad}_X : \mathrm{Mat}(d,\mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}(d,\mathbb{C}),\ Z \mapsto [X,Z] = XZ - ZX$ は定義 5.11、$\mathrm{Ad}_g(Y) := gYg^{-1}$（$g$ は正則行列）も定義 5.11 の記号とする。このとき $\exp(X)$ は正則であり、右辺の級数は $\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ において収束して、

$$\exp(X)\,Y\,\exp(-X) = \mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) = \exp(\mathrm{ad}_X)(Y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{[X, [X, \ldots, [X, Y]\ldots]]}_{n}$$

が成り立つ（$n = 0$ のとき括弧なしで Y）。

証明. 本主張は行列環 $\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ 上の主張であり、Lie 群・Lie 環の理論を使わずに証明できる。定理 5.13 を $K := \mathbb{C}$、$n := d$ として適用する。同ブロックは 定理 5.10（純代数的な ad 展開公式）と 主張 3.1・主張 2.93・主張 3.2（指数級数の絶対収束と行列ノルムの劣乗法性）だけから証明されており、Lie 群論には依存しない。

Step 1: 定理 5.13 (1) より級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ において収束し、(2) より

$$\begin{aligned}\exp(X)\,Y\,\exp(-X) &= \sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y) && \big(\because\ \text{定理 5.13 (2)}\big)\\ &= \exp(\mathrm{ad}_X)\,(Y) && \big(\because\ \text{行列への線型写像}\mathrm{ad}_X\ \text{の exp の定義}\big)\end{aligned}$$

Step 2: 定理 5.10 の再帰の定義 $\mathrm{ad}_X^0(Y)=Y$、$\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y)=[X,\mathrm{ad}_X^m(Y)]$ を出発点にすると、

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}_X^0(Y) &= Y && \big(\because\ \mathrm{ad}_X\ \text{の反復の定義}\big),\\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) &= [X,\mathrm{ad}_X^m(Y)] && \big(\because\ \mathrm{ad}_X\ \text{の反復の定義}\big),\\ \mathrm{ad}_X^m(Y) &= \underbrace{[X,[X,\ldots,[X,Y]\ldots]]}_{m} && \big(\because\ m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}\ \text{について定理 5.10 の再帰を反復}\big)\end{aligned}$$

最後の式では $m=0$ のとき括弧なしで Y と読む。したがって Step 1 の中辺は主張の最右辺に一致する。

Step 3: 定理 5.13 (3) より $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1}=\exp(-X)$ であるから

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) &= \exp(X)\,Y\,\exp(X)^{-1} && \big(\because\ \mathrm{Ad}_g(Y)=gYg^{-1}\ \text{の定義}\big)\\ &= \exp(X)\,Y\,\exp(-X) && \big(\because\ \text{定理 5.13 (3)}\big)\end{aligned}$$

以上より主張のすべての等号が成り立つ。なお、本証明で非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の解析（極限）を使うのは 定理 5.13 の内部の収束議論だけであり、その根拠は 主張 2.95（$\mathbb{R}$ の完備性）である。 □

主張 14.5 (K_2 とK_2^* の双対関係)**.** 定義 13.15 の記号（$K_2\in\mathbb{R}_{>0}$、$K_2^*:=-\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$、$c_2:=\cosh 2K_2$、$s_2:=\sinh 2K_2$、$c_2^*:=\cosh 2K_2^*$、$s_2^*:=\sinh 2K_2^*$）について、

$$s_2^*=\frac{1}{s_2},\qquad c_2^*=\frac{c_2}{s_2},\qquad \text{したがって}\quad c_2^*=s_2^*\,c_2$$

証明. $K_2>0$ より $0<\tanh K_2<1$ であり $\log(\tanh K_2)$ は $\mathbb{R}$ の中で定義される。$K_2^*=-\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$ から必要な指数の表示を先に作る。

$$\begin{aligned}-2K_2^* &= \log(\tanh K_2) && (\because\ K_2^*=-\tfrac{1}{2}\log(\tanh K_2)\ \text{と}\mathbb{R}\ \text{の四則})\\ \exp(-2K_2^*) &= \exp(\log(\tanh K_2)) && (\because\ \text{直前の等式の両辺の指数})\\ &= \tanh K_2 && (\because\ 0<\tanh K_2\ \text{と実対数・指数の逆写像性})\\ \exp(2K_2^*) &= (\tanh K_2)^{-1} && (\because\ \text{直前の等式の逆数と}\ \tanh K_2\neq 0).\end{aligned}$$

$\sinh K_2>0,\ \cosh K_2>0$ であるから、以下の分母はいずれも 0 ではない。

$$\begin{aligned}s_2^* &= \sinh 2K_2^* && (\because\ s_2^*=\sinh 2K_2^*\ \text{の定義})\\ &= \frac{\exp(2K_2^*)-\exp(-2K_2^*)}{2} && (\because \sinh x=\tfrac{1}{2}(\exp(x)-\exp(-x)))\\ &= \frac{(\tanh K_2)^{-1}-\tanh K_2}{2} && (\because \text{準備の}\ \exp(2K_2^*)=(\tanh K_2)^{-1},\ \exp(-2K_2^*)=\tanh K_2)\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2}-\frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right) && (\because \tanh x=\tfrac{\sinh x}{\cosh x}\ \text{とその逆数})\\ &= \frac{\cosh^2 K_2-\sinh^2 K_2}{2\sinh K_2\cosh K_2} && (\because \text{通分。分母}\sinh K_2\cosh K_2\neq 0\ \text{は準備で確認済み})\\ &= \frac{1}{\sinh 2K_2} && (\because \cosh^2 x-\sinh^2 x=1,\ 2\sinh x\cosh x=\sinh 2x)\\ &= \frac{1}{s_2} && (\because s_2=\sinh 2K_2\ \text{の定義})\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
c_2^* &= \cosh 2K_2^* && (\because\ c_2^* = \cosh 2K_2^* \text{ の定義}) \\
&= \frac{\exp(2K_2^*) + \exp(-2K_2^*)}{2} && (\because \cosh x = \tfrac{1}{2}(\exp(x) + \exp(-x))) \\
&= \frac{(\tanh K_2)^{-1} + \tanh K_2}{2} && (\because \text{準備の } \exp(2K_2^*) = (\tanh K_2)^{-1},\ \exp(-2K_2^*) = \tanh K_2) \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} + \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right) && (\because \tanh x = \tfrac{\sinh x}{\cosh x} \text{ とその逆数}) \\
&= \frac{\cosh^2 K_2 + \sinh^2 K_2}{2\sinh K_2 \cosh K_2} && (\because \text{通分。分母} \sinh K_2 \cosh K_2 \neq 0 \text{ は準備で確認済み}) \\
&= \frac{\cosh 2K_2}{\sinh 2K_2} && (\because \cosh^2 x + \sinh^2 x = \cosh 2x,\ 2\sinh x \cosh x = \sinh 2x) \\
&= \frac{c_2}{s_2} && (\because\ c_2 = \cosh 2K_2 \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

この 2 式より

$$
\begin{aligned}
c_2^* &= \frac{c_2}{s_2} && (\because\ \text{上の鎖}) \\
&= c_2 \cdot \frac{1}{s_2} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の除法は逆数との積 } (s_2 \neq 0 \text{ は準備で確認済み})) \\
&= c_2\, s_2^* && (\because\ \text{もう一方の鎖の } s_2^* = \tfrac{1}{s_2}) \\
&= s_2^*\, c_2 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の可換性})
\end{aligned}
$$

□

定義 14.6 ($A(\theta)$ の定義)**.** $\theta \in \mathbb{C}$ について、

$$
A(\theta) := \begin{pmatrix} c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta & i\exp(i\theta) s_2^* (c_1 \cos\theta - i\sin\theta - s_1 c_2) \\ -i\exp(-i\theta) s_2^* (c_1 \cos\theta + i\sin\theta - s_1 c_2) & c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta \end{pmatrix}
$$

注意 14.7 ($\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ を導入する理由)**.** 生成子 $H_1^{(+)}$（定義 13.22）は

$$
H_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1
$$

であり、サイト M_{col} とサイト 1 をつなぐ境界項 $-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1$ だけが符号 -1 を持つ（反周期的な境界条件）。以下では、この符号に合わせた行列

$$
\check{Z}_\mu := \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_j\ \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu), \qquad \check{Y}_\mu := \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} Y_j\ \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu), \qquad \tilde{\theta}_\mu := \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}
$$

を導入する（正確な定義は 定義 14.9 と 定義 14.10）。

働く仕組みは 1 つの等式 $\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu) = -1$（主張 14.11、** 反周期性 **）に集約される。$H_1^{(+)}$ と Z_j の交換子は隣のサイトの Y_{j-1} を与えるが、$j = 1$ では添字がサイト M_{col} へ回り込み、境界項の符号のために $-Y_{M_{\mathrm{col}}}$ が現れる。一方、位相 $\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)$ は添字 $j = 0$ を $j = M_{\mathrm{col}}$ へ読み替えるときにちょうど $\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu) = -1$ 倍になる。この 2 つの符号が打ち消し合うので、$H_1^{(+)}$ との交換関係が $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の中で閉じる。

以下で示すのは次のことである。

- 添字集合 $\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$（定義 14.15）。

- $H_1^{(+)}, H_2$ と $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の交換関係（主張 14.16）。

主張 14.8 ($\tilde{\theta}_\mu$ と指数和 $\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(ik\tilde{\theta}_\mu)$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。自然数を整数へ送る標準包含 $\iota_{\mathbb{N}\to\mathbb{Z}} : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ と整数を実数へ送る標準包含 $\iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ は零、単位元、和、積、順序を保つものとする。また、定義 1.13 の実数から複素数への包含を用いる。

$$n_{\mathbb{Z}} := \iota_{\mathbb{N}\to\mathbb{Z}}(n) \quad (n \in \mathbb{N}), \qquad a_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}(a) \quad (a \in \mathbb{Z}), \qquad n_{\mathbb{R}} := (n_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}, \qquad a_{\mathbb{C}} := (a_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}, \qquad n_{\mathbb{C}} := (n_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$$

と書く。$M_{\mathrm{col}} \geq 2$ なので、$((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} = M_{\mathrm{col}}$ を満たす一意な $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ がある。有限和の項数と周期デルタの法には $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ を用いる。

順序を保つ包含写像により $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \geq 2_{\mathbb{R}} > 0_{\mathbb{R}}$ である。したがって $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ であり、さらに実数の零因子がないことから $2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ である。以下の分数はこの二つの非零性により定まる。

さらに、$\pi \in \mathbb{R}$ を円周率、$i := (0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}) \in \mathbb{C}$ を虚数単位とする。複素数の差、零元、単位元、逆元には 主張 1.56 の体構造を用いる。とくに $-1_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$ なので、$l \in \mathbb{Z}$ に対する $(-1_{\mathbb{C}})^l$ は、非負の指数では積、負の指数では逆元の積として定まる整数冪である。$\mu \in \mathbb{Z}$ について

$$\tilde{\theta}_\mu := \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} \in \mathbb{R}$$

とおく。ここで $\mu \in \mathbb{Z}$ としているのは記号 $\tilde{\theta}_\mu$ の定義域である。以下の指数和では μ を 1 から $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ までの自然数に限り、指数ではその整数像 $\mu_{\mathbb{Z}}$ を用いる。このとき $k \in \mathbb{Z}$ について

$$\sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i(k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}})_{\mathbb{C}}) = \begin{cases} (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\,(-1_{\mathbb{C}})^l & (k = lM_{\mathrm{col}},\ l \in \mathbb{Z}) \\ 0_{\mathbb{C}} & (k \not\equiv 0 \pmod{M)_{\mathrm{col}}} \end{cases}$$

とくに $|k| < M_{\mathrm{col}}$ かつ $k \neq 0$ なら和は $0_{\mathbb{C}}$、$k = 0$ なら $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}$ である。

証明. 最初に、自然数の項数と整数の格子幅の像を対応させる。包含写像の保存性より

$$\begin{aligned}
(2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} &= 2M_{\mathrm{col}} && \left(\because\ \iota_{\mathbb{N}\to\mathbb{Z}} \text{ は積を保つ},\ ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} = M_{\mathrm{col}}\right) \\
((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} && \left(\because\ ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} = M_{\mathrm{col}}\right) \\
(2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} &= 2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} && \left(\because\ \iota_{\mathbb{N}\to\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は積を保つ}\right) \\
(2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} &= 2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} && \left(\because\ \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は積を保つ}\right) \\
((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}} &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \left(\because\ ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\right) \\
(2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}} &= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \left(\because\ (2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} = 2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} = (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\right).
\end{aligned}$$

上で定めた像の記号により $k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu$ は実数である。

実数 $r \in \mathbb{R}$ の複素数への像は、定義 1.13 の略記 $r_{\mathbb{C}} := \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(r)$ で表す。主張の $(k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}$ は複素数であり、$i(k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ である。まず、$\mu \in \mathbb{Z}$ について指数の中の実数を計算する。

$$
\begin{aligned}
k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu} &= k_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ \tilde{\theta}_{\mu}\ \text{の定義}\right)\\
&= \frac{2\pi k_{\mathbb{R}}\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ \mathbb{R}\ \text{の積の交換律・結合律}\right)\\
&= \frac{2\pi k_{\mathbb{R}} \cdot 2_{\mathbb{R}}\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}},\ 2_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}\ \text{なので分子と分母に}2_{\mathbb{R}}\ \text{を掛ける}\right)\\
&= \frac{2\pi k_{\mathbb{R}}\left(2_{\mathbb{R}}\mu_{\mathbb{R}} - 2_{\mathbb{R}} \cdot \frac{1}{2}\right)}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配法則}\right)\\
&= \frac{2\pi k_{\mathbb{R}}(2_{\mathbb{R}}\mu_{\mathbb{R}} - 1_{\mathbb{R}})}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ 2_{\mathbb{R}} \cdot \frac{1}{2} = 1_{\mathbb{R}}\right)\\
&= \frac{2\pi(2_{\mathbb{R}}\mu_{\mathbb{R}} - 1_{\mathbb{R}})k_{\mathbb{R}}}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ \mathbb{R}\ \text{の積の交換律}\right).
\end{aligned}
$$

主張の左辺を

$$
S_{M_{\mathrm{col}},k} := \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i(k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}})_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C}
$$

とおくと、

$$
S_{M_{\mathrm{col}},k} = \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2\pi(2_{\mathbb{R}}(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}} - 1_{\mathbb{R}})k_{\mathbb{R}}}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) \quad \left(\because\ \text{直前の鎖を各項の}\mu_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\ \text{へ適用}\right).
$$

また、正の自然数 $N \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ については、順序を保つ包含写像により $N_{\mathbb{R}} \geq 1_{\mathbb{R}} > 0_{\mathbb{R}}$ なので $N_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ である。したがって

$$
T_{N,k} := \sum_{r=1}^{N} \exp(i\left(\frac{2\pi(r_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{N_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C} \qquad (N \in \mathbb{N}_{\geq 1})
$$

とおく。整数 $1, \ldots, 2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ は、ただ一通り $r = 2\mu - 1$ または $r = 2\mu$（$1 \leq \mu \leq (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$）と書ける。ゆえに有限和を奇数番目と偶数番目へ分けると

$$
\begin{aligned}
T_{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} &= \sum_{r=1}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2\pi(r_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{(2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) && \left(\because\ T_{N,k}\ \text{の定義に}N = 2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}\ \text{を代入}\right)\\
&= \sum_{r=1}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2\pi(r_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) && \left(\because\ (2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} = 2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\right)\\
&= \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2\pi((2\mu-1)_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) + \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2\pi((2\mu)_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) && \left(\because\ r\ \text{の奇偶による有限和の分割}\right)\\
&= \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2\pi(2_{\mathbb{R}}(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}} - 1_{\mathbb{R}})k_{\mathbb{R}}}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) + \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2\pi(2_{\mathbb{R}}(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}})k_{\mathbb{R}}}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) && \left(\because\ (2\mu-1)+1 = 2\mu\ \text{と、}\iota_{\mathbb{N}\to\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}\ \text{が単位元・和・積を保つことから}((2\mu-1)_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}} + 1_{\mathbb{R}} = 2_{\mathbb{R}}(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}\right)\\
&= S_{M_{\mathrm{col}},k} + \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2\pi(2_{\mathbb{R}}(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}})k_{\mathbb{R}}}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) && \left(\because\ S_{M_{\mathrm{col}},k}\ \text{の上の式}\right)\\
&= S_{M_{\mathrm{col}},k} + \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2_{\mathbb{R}}\,(2\pi(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}})}{2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) && \left(\because\ \mathbb{R}\ \text{の積の交換律・結合律}\right)\\
&= S_{M_{\mathrm{col}},k} + \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) && \left(\because\ 2_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}},\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}\ \text{による約分}\right)\\
&= S_{M_{\mathrm{col}},k} + \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i\left(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}) && \left(\because\ ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\right)\\
&= S_{M_{\mathrm{col}},k} + T_{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} && \left(\because\ T_{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k}\ \text{の定義}\right).
\end{aligned}
$$

主張 14.2 は像の記号を省いて書いており、左辺の項 $\exp(2\pi ijk/M_{\mathrm{col}})$ は $\exp(i(2\pi(j_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}/(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}})$、右辺の係数 M_{col} は $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}$ を表す。これを正の自然数 $2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ と $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ にそれぞれ適用し、定義 14.1 の記号を使うと

$$
\begin{aligned}
T_{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} &= (2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} && \big(\because \text{主張 14.2 を} 2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \text{ に適用}\big),\\
&= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} && \big(\because (2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}} = (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\big),\\
T_{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} &= ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} && \big(\because \text{主張 14.2 を} (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \text{ に適用}\big),\\
&= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} && \big(\because ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\big).
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
S_{M_{\mathrm{col}},k} &= T_{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} - T_{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} && \big(\because T_{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} = S_{M_{\mathrm{col}},k} + T_{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k}\big)\\
&= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} && \big(\because \text{直前の二つの指数和}\big).
\end{aligned}
$$

$k \not\equiv 0 \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ のときは、$2M_{\mathrm{col}} \mid k$ なら $M_{\mathrm{col}} \mid k$ となることの対偶から $2M_{\mathrm{col}} \nmid k$ でもある。$((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} = M_{\mathrm{col}}$、$(2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} = 2M_{\mathrm{col}}$ と 定義 14.1 により $\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 0_{\mathbb{C}}$ なので

$$
\begin{aligned}
S_{M_{\mathrm{col}},k} &= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} && \big(\because \delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 0_{\mathbb{C}}\big)\\
&= 0_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} && \big(\because (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)}\big)\\
&= 0_{\mathbb{C}} - 0_{\mathbb{C}} && \big(\because (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)}\big)\\
&= 0_{\mathbb{C}} + (-0_{\mathbb{C}}) && \big(\because \text{定義 1.15}\big)\\
&= -0_{\mathbb{C}} && \big(\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は和の単位元 (主張 1.56)}\big)\\
&= (-1_{\mathbb{C}}) \cdot 0_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{定義 1.14}\big)\\
&= 0_{\mathbb{C}} && \big(\because (-1_{\mathbb{C}}) \cdot 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)}\big).
\end{aligned}
$$

$k = lM_{\mathrm{col}}$（$l \in \mathbb{Z}$）のときは、$((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} = M_{\mathrm{col}}$ と 定義 14.1 により $\delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 1_{\mathbb{C}}$ である。また $M_{\mathrm{col}} \neq 0$ なので、

$$
\begin{aligned}
2M_{\mathrm{col}} \mid k &\iff 2M_{\mathrm{col}} \mid lM_{\mathrm{col}} && \big(\because k = lM_{\mathrm{col}}\big)\\
&\iff 2 \mid l && \big(\because M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ による整数の約分}\big).
\end{aligned}
$$

l が偶数なら、$(2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} = 2M_{\mathrm{col}} \mid k$ と 定義 14.1 により $\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 1_{\mathbb{C}}$ なので

$$
\begin{aligned}
S_{M_{\mathrm{col}},k} &= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \big(\because \delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 1_{\mathbb{C}}\big)\\
&= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \big(\because (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} = (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)}\big)\\
&= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)}\big)\\
&= (2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} = 2_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\big)\\
&= 2_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{主張 1.29}\big)\\
&= 2_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} - 1_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元 (主張 1.56)}\big)\\
&= (2_{\mathbb{C}} - 1_{\mathbb{C}})(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{主張 1.56 の分配法則}\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{定義 1.13, 定義 1.12 と定義 1.15 により} 2_{\mathbb{C}} - 1_{\mathbb{C}} = (2_{\mathbb{R}} - 1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = (1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{C}}\big)\\
&= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の交換律 (主張 1.56)}\big)\\
&= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}(-1_{\mathbb{C}})^{l} && \big(\because (-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}}) = 1_{\mathbb{C}} \text{ と} (-1_{\mathbb{C}})^{-1} = -1_{\mathbb{C}} \text{ から、すべての} l \in \mathbb{Z} \text{ で} (-1_{\mathbb{C}})^{l+2} = (-1_{\mathbb{C}})^{l} \text{ であり、} (-1_{\mathbb{C}})^{0} = 1_{\mathbb{C}} \text{ なので偶数の} l \text{ では} (-1_{\mathbb{C}})^{l} = 1_{\mathbb{C}}\big).
\end{aligned}
$$

l が奇数なら、$(2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} = 2M_{\mathrm{col}} \nmid k$ と 定義 14.1 により $\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 0_{\mathbb{C}}$ なので

$$
\begin{aligned}
S_{M_{\mathrm{col}},k} &= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \big(\because \delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 0_{\mathbb{C}},\ \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 1_{\mathbb{C}}\big)\\
&= 0_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \big(\because (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)}\big)\\
&= 0_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)}\big)\\
&= 0_{\mathbb{C}} + (-(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}) && \big(\because \text{定義 1.15}\big)\\
&= -(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は和の単位元 (主張 1.56)}\big)\\
&= (-1_{\mathbb{C}})(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{定義 1.14}\big)\\
&= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}(-1_{\mathbb{C}}) && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の交換律 (主張 1.56)}\big)\\
&= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}(-1_{\mathbb{C}})^{l} && \big(\because (-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}}) = 1_{\mathbb{C}} \text{ と} (-1_{\mathbb{C}})^{-1} = -1_{\mathbb{C}} \text{ から、すべての} l \in \mathbb{Z} \text{ で} (-1_{\mathbb{C}})^{l+2} = (-1_{\mathbb{C}})^{l} \text{ であり、} (-1_{\mathbb{C}})^{1} = -1_{\mathbb{C}} \text{ なので奇数の} l \text{ では} (-1_{\mathbb{C}})^{l} = -1_{\mathbb{C}}\big).
\end{aligned}
$$

最後に「とくに」を示す。$|k| < M_{\mathrm{col}}$ かつ $k \neq 0$ とする。もし $M_{\mathrm{col}} \mid k$ なら、ある $l \in \mathbb{Z}$ が存在して $k = lM_{\mathrm{col}}$ である。このとき

$$\begin{aligned} |lM_{\mathrm{col}}| &= |l|\,|M_{\mathrm{col}}| && \big(\because \text{ 積の絶対値}\big) \\ &= |l|M_{\mathrm{col}} && \big(\because\ M_{\mathrm{col}} > 0 \text{ なので} |M_{\mathrm{col}}| = M_{\mathrm{col}}\big) \\ &= |k| && \big(\because\ k = lM_{\mathrm{col}}\big) \\ &< M_{\mathrm{col}} && \big(\because\ |k| < M_{\mathrm{col}}\big), \end{aligned}$$

$M_{\mathrm{col}} > 0$ なので、整数における正数倍は狭義順序を反映する。したがって

$$|l| < 1 \quad \big(\because\ |l|M_{\mathrm{col}} < 1 \cdot M_{\mathrm{col}},\ M_{\mathrm{col}} > 0\big).$$

一方、整数 l の絶対値は非負整数なので、

$$\begin{aligned} |l| &= 0 \quad \big(\because\ |l| \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ |l| < 1\big) \\ l &= 0 \quad \big(\because\ |l| = 0\big). \end{aligned}$$

すると

$$\begin{aligned} k &= lM_{\mathrm{col}} && \big(\because\ k = lM_{\mathrm{col}}\big) \\ &= 0 \cdot M_{\mathrm{col}} && \big(\because\ l = 0\big) \\ &= 0 && \big(\because\ 0 \cdot M_{\mathrm{col}} = 0\big), \end{aligned}$$

となり 0 ではないという仮定 $k \neq 0$ に矛盾する。ゆえに $M_{\mathrm{col}} \nmid k$ であり、上の非整除の場合から和は $0_{\mathbb{C}}$ である。また $k = 0$ では $l = 0$ とした整除の場合により

$$\begin{aligned} (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}(-1_{\mathbb{C}})^0 &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \big(\because\ (-1_{\mathbb{C}})^0 = 1_{\mathbb{C}}\big) \\ &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)}\big). \end{aligned}$$

となる。 □

定義 14.9 ($\check{Z}_\mu(\tilde{\theta}_\mu$ によるZ_j の離散 Fourier 変換$)$**.** 定義 1.1 の記号で $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 14.8 で定めた $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \in \mathbb{N}_{\geq 2}$、整数・実数への像 $j_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{R}}$、および各 $\mu \in \mathbb{Z}$ に対する $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ を用いる。複素数と虚数単位は 定義 1.12 の $\mathbb{C}$ と $i = (0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}) \in \mathbb{C}$ である。

$j \in \{1, \ldots, (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}\}$ なら $j_{\mathbb{Z}} \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ なので、定義 13.1 から $Z_{j_{\mathbb{Z}}} \in \mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}, \mathbb{C})$ である。複素指数の定義と所属は現行本文では未整備なので、以下では $\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C}$ を仮定する。この複素数によるスカラー倍と同じ行列空間内の有限和を用いて

$$\check{Z}_\mu := \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) Z_{j_{\mathbb{Z}}} \in \mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}, \mathbb{C})$$

と定める。

定義 14.10 ($\check{Y}_\mu(\tilde{\theta}_\mu$ によるY_j の離散 Fourier 変換$)$**.** 定義 1.1 の記号で $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 14.8 で定めた $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \in \mathbb{N}_{\geq 2}$、整数・実数への像 $j_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{R}}$、および各 $\mu \in \mathbb{Z}$ に対する $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ を用いる。複素数と虚数単位は 定義 1.12 の $\mathbb{C}$ と $i = (0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}) \in \mathbb{C}$ である。

$j \in \{1, \ldots, (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}\}$ なら $j_{\mathbb{Z}} \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ なので、定義 13.2 から $Y_{j_{\mathbb{Z}}} \in \mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}, \mathbb{C})$ である。複素指数の定義と所属は現行本文では未整備なので、以下では $\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C}$ を仮定する。この複素数によるスカラー倍と同じ行列空間内の有限和を用いて

$$\check{Y}_\mu := \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) Y_{j_{\mathbb{Z}}} \in \mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}, \mathbb{C})$$

と定める。

主張 14.11 ($\tilde{\theta}_\mu$ の反周期性$\exp(-i((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) = -1_{\mathbb{C}}$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \mathbb{Z}$ とする。主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ と像の記号 $a_{\mathbb{R}}$（$a \in \mathbb{Z}$）、定義 1.13 の $r_{\mathbb{C}}$（$r \in \mathbb{R}$）を用いる。このとき

$$\exp(-i((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) = -1_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。証明は全実数上の $\cos, \sin$ の性質（2π 周期性、cos が偶関数で sin が奇関数であること、$\cos \pi = -1_{\mathbb{R}}$、$\sin \pi = 0_{\mathbb{R}}$）を使う。定義 1.38・定義 1.41 は $[-\pi/2, \pi/2]$ 上でしか定めておらず、全実数への拡張は 定理 1.88 の前置きのとおり未整備なので、この主張はその拡張を前提とする。

証明. 指数の中の実数を求める。主張 14.8 より $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ である。

$$\begin{aligned}
(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ \tilde{\theta}_\mu \text{ の定義。主張 14.8}\right) \\
&= 2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \tfrac{1}{2}\right) && \left(\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}} \text{ による約分}\right) \\
&= 2\pi\mu_{\mathbb{R}} - 2\pi \cdot \tfrac{1}{2} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の分配法則}\right) \\
&= 2\pi\mu_{\mathbb{R}} - \pi\left(2 \cdot \tfrac{1}{2}\right) && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の積の結合律と交換律}\right) \\
&= 2\pi\mu_{\mathbb{R}} - \pi && \left(\because\ 2 \cdot \tfrac{1}{2} = 1\right) \\
&= -\pi + 2\pi\mu_{\mathbb{R}} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の交換律}\right)
\end{aligned}$$

これを使って、主張の左辺から

$$\begin{aligned}
\exp(-i((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) &= (\cos((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu))_{\mathbb{C}} - i(\sin((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu))_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.89 を} \theta = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu \text{ で}) \\
&= (\cos(-\pi + 2\pi\mu_{\mathbb{R}}))_{\mathbb{C}} - i(\sin(-\pi + 2\pi\mu_{\mathbb{R}}))_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 上の鎖を 2 箇所へ同時代入}) \\
&= (\cos(-\pi))_{\mathbb{C}} - i(\sin(-\pi))_{\mathbb{C}} && (\because\ \mu \in \mathbb{Z} \text{ と } \cos, \sin \text{ の} 2\pi \text{ 周期性を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= (\cos\pi)_{\mathbb{C}} - i(\sin(-\pi))_{\mathbb{C}} && (\because\ \cos \text{ は偶関数}) \\
&= (\cos\pi)_{\mathbb{C}} - i(-\sin\pi)_{\mathbb{C}} && (\because\ \sin \text{ は奇関数}) \\
&= (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} - i(-\sin\pi)_{\mathbb{C}} && (\because\ \cos\pi = -1_{\mathbb{R}}) \\
&= (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} - i(-0_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} && (\because\ \sin\pi = 0_{\mathbb{R}}) \\
&= (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} - i(0_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} && (\because\ -0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}) \\
&= (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} - i \cdot 0_{\mathbb{C}} && (\because\ (0_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} = (0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{C}} \text{ (定義 1.13, 主張 1.56 の零元)}) \\
&= (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} - 0_{\mathbb{C}} && (\because\ i \cdot 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)}) \\
&= (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} + (-0_{\mathbb{C}}) && (\because \text{ 定義 1.15}) \\
&= (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{C}}) \cdot 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.14}) \\
&= (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} + 0_{\mathbb{C}} && (\because\ (-1_{\mathbb{C}}) \cdot 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)}) \\
&= (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} && (\because\ 0_{\mathbb{C}} \text{ は和の単位元 (主張 1.56)}) \\
&= -1_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.13 と定義 1.12 の和により} (1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) + (-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = (0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{C}} \text{ なので、} (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} = (-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) \text{ は} 1_{\mathbb{C}} \text{ の加法の逆元 } -1_{\mathbb{C}} \text{ (主張 1.56)})
\end{aligned}$$

となる。 □

主張 14.12 ($\tilde{\theta}_\mu$ の添字をずらした位相$\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}})_{\mathbb{C}}) = \exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}})$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \mathbb{Z}$、$j \in \mathbb{Z}$ とする。主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ と像の記号 $a_{\mathbb{R}}$（$a \in \mathbb{Z}$）、定義 1.13 の $r_{\mathbb{C}}$（$r \in \mathbb{R}$）を用いる。このとき

$$\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}})_{\mathbb{C}}) = \exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}})$$

が成り立つ。証明は全実数上の $\cos, \sin$ の 2π 周期性（$x \in \mathbb{R}$、$n \in \mathbb{Z}$ について $\cos(x + 2\pi n_{\mathbb{R}}) = \cos x$、$\sin(x + 2\pi n_{\mathbb{R}}) = \sin x$）を使う。全実数への拡張は 定理 1.88 の前置きのとおり未整備なので、この主張はその拡張を前提とする。

証明. 添字をずらした角度を求める。主張 14.8 より $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ である。

$$
\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} &= \frac{2\pi\left((\mu+M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}-\frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ \tilde{\theta}\text{ の定義を}\mu+M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}\text{ で。主張 14.8}\right)\\
&= \frac{2\pi\left((\mu_{\mathbb{R}}+(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}})-\frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}\text{ は和を保つ}\right)\\
&= \frac{2\pi\left(\left(\mu_{\mathbb{R}}-\frac{1}{2}\right)+(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ \mathbb{R}\text{ の加法の結合律と交換律}\right)\\
&= \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}}-\frac{1}{2}\right)+2\pi(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ \mathbb{R}\text{ の分配法則}\right)\\
&= \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}}-\frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}+\frac{2\pi(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\neq 0_{\mathbb{R}}\text{ を分母とする分数の和}\right)\\
&= \tilde{\theta}_{\mu}+\frac{2\pi(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \left(\because\ \tilde{\theta}_{\mu}\text{ の定義。主張 14.8}\right)\\
&= \tilde{\theta}_{\mu}+2\pi && \left(\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\neq 0_{\mathbb{R}}\text{ による約分}\right)
\end{aligned}
$$

これに $j_{\mathbb{R}}$ を掛けると

$$
\begin{aligned}
j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} &= j_{\mathbb{R}}\left(\tilde{\theta}_{\mu}+2\pi\right) && \left(\because\ \text{上の鎖}\right)\\
&= j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu}+j_{\mathbb{R}}\cdot 2\pi && \left(\because\ \mathbb{R}\text{ の分配法則}\right)\\
&= j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu}+2\pi j_{\mathbb{R}} && \left(\because\ \mathbb{R}\text{ の積の交換律}\right)
\end{aligned}
$$

となる。これを使って、主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}})_{\mathbb{C}}) &= (\cos(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}))_{\mathbb{C}}-i(\sin(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}))_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \text{主張 1.89 を}\theta=j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}\text{ で}\right)\\
&= (\cos(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu}+2\pi j_{\mathbb{R}}))_{\mathbb{C}}-i(\sin(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu}+2\pi j_{\mathbb{R}}))_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \text{上の鎖を 2 箇所へ同時代入}\right)\\
&= (\cos(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu}))_{\mathbb{C}}-i(\sin(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu}))_{\mathbb{C}} && \left(\because\ j\in\mathbb{Z}\text{ と }\cos,\sin\text{ の}2\pi\text{ 周期性を 2 箇所へ同時適用}\right)\\
&= \exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}}) && \left(\because\ \text{主張 1.89 を}\theta=j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu}\text{ で}\right)
\end{aligned}
$$

となる。 □

主張 14.13 ($\check{Z}_{\mu}$ の添字周期性$\check{Z}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}=\check{Z}_{\mu}$)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu\in\mathbb{Z}$ とする。主張 14.8 の $\tilde{\theta}_{\mu}$ と、定義 14.9 の Fourier 行列について、$\check{Z}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}=\check{Z}_{\mu}$ が成り立つ。この主張は 主張 14.12 を通じて、全実数上の $\cos,\sin$ の 2π 周期性（未整備）を前提とする。

証明. $j\in\{1,\ldots,(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}\}$ について $j_{\mathbb{Z}}\in\mathbb{Z}$ であり、主張 14.8 の記号で $(j_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}=j_{\mathbb{R}}$ である。主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
\check{Z}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} &= \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}})_{\mathbb{C}})Z_{j_{\mathbb{Z}}} && \left(\because\ \text{定義 14.9 を}\mu+M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}\text{ で}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}})Z_{j_{\mathbb{Z}}} && \left(\because\ \text{主張 14.12 を整数}j_{\mathbb{Z}}\text{ で全項へ同時適用}\right)\\
&= \check{Z}_{\mu} && \left(\because\ \text{定義 14.9 を}\mu\text{ で}\right)
\end{aligned}
$$

となる。 □

主張 14.14 ($\check{Y}_{\mu}$ の添字周期性$\check{Y}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}=\check{Y}_{\mu}$)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu\in\mathbb{Z}$ とする。主張 14.8 の $\tilde{\theta}_{\mu}$ と、定義 14.10 の Fourier 行列について、$\check{Y}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}=\check{Y}_{\mu}$ が成り立つ。この主張は 主張 14.12 を通じて、全実数上の $\cos,\sin$ の 2π 周期性（未整備）を前提とする。

証明. $j \in \{1, \dots, (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}\}$ について $j_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$ であり、主張 14.8 の記号で $(j_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}} = j_{\mathbb{R}}$ である。主張の左辺から

$$\begin{aligned}
\check{Y}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} &= \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}})_{\mathbb{C}})Y_{j_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{定義 14.10 を} \mu + M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z} \text{ で}) \\
&= \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}})Y_{j_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 14.12 を整数} j_{\mathbb{Z}} \text{ で全項へ同時適用}) \\
&= \check{Y}_{\mu} && (\because \text{定義 14.10 を} \mu \text{ で})
\end{aligned}$$

となる。 □

定義 14.15 (添字集合$\check{\mathcal{M}} := \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu$（$\mu \in \mathbb{Z}$ について定義されている）を用いる。

$$\check{\mathcal{M}} := \{1, 2, \dots, M_{\mathrm{col}}\} \subset \mathbb{Z}$$

と定め、** 半整数運動量の添字集合 ** と呼ぶ。

** 以降の主張は、とくに断らない限り $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ について述べる。** この章で $\mu \in \mathbb{Z}$ 全体について定める記号は、定義 14.1 の $\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu,\nu)}$（$\mu, \nu \in \mathbb{Z}$）、主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu$、定義 14.9 の $\check{Z}_\mu$、定義 14.10 の $\check{Y}_\mu$ である。この章で添字の周期性を述べる主張は 主張 14.13 と 主張 14.14 である。これらは、計算の途中で $\check{\mathcal{M}}$ の外に現れた添字を $\check{\mathcal{M}}$ の中へ引き戻すための橋渡しなので、$\mathbb{Z}$ で述べる必要がある。

次の 5 つの性質を後で繰り返し使う。

- (1) 相異なるM_{col} 個の運動量： $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}},\ \mu \neq \nu \implies \tilde{\theta}_\mu \neq \tilde{\theta}_\nu, \qquad 0 < \tilde{\theta}_\mu < 2\pi$
- (2) 共役添字の閉性： $\mu \in \check{\mathcal{M}} \implies M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$
- (3) 共役添字の言い換え： $(M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu) - (1 - \mu) = M_{\mathrm{col}}$, すなわち$1 - \mu \equiv M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \pmod{M}_{\mathrm{col}}$
- (4) 自己共役点： $\mu \in \check{\mathcal{M}},\ M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu = \mu \iff M_{\mathrm{col}}$ が奇数かつ$\mu = \frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}$。このとき $\tilde{\theta}_\mu = \pi$。
- (5) 対の判定： $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}} \implies (\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}_{\mathrm{col}} \iff \nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu)$。したがって $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ では $\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu+\nu,\,1)} = \delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ である（右辺は通常のクロネッカーのデルタ、すなわち $\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ のとき 1、そうでないとき 0）。

(5) は、$\check{\mathcal{M}}$ へ範囲を絞ったことで ** 合同式が消える ** ことを述べている。このため、以降の主張で対 $(\mu,\ M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu)$ を指定するのに合同式は要らない。

証明. (1) 主張 14.8 より $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}$ である。

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}_\nu - \tilde{\theta}_\mu &= \frac{2\pi\left(\nu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} - \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 14.8 の} \tilde{\theta} \text{ の定義}) \\
&= \frac{2\pi}{M_{\mathrm{col}}}(\nu - \mu) && (\because \text{通分と分配法則})
\end{aligned}$$

であり $\frac{2\pi}{M_{\mathrm{col}}} > 0$ なので、$\mu \neq \nu$ なら $\tilde{\theta}_\mu \neq \tilde{\theta}_\nu$。また同じ式は $\mu \mapsto \tilde{\theta}_\mu$ が狭義単調増加であることを与えるので、$1 \leq \mu \leq M_{\mathrm{col}}$ では

$$
\begin{aligned}
\tilde{\theta}_1 &= \frac{2\pi\left(1-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because \text{ 主張 14.8 の}\tilde{\theta}\text{ の定義}\right)\\
&= \frac{\pi}{M_{\mathrm{col}}} && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})\\
&\le \tilde{\theta}_\mu && \left(\because\ 1\le\mu\ \text{と}\mu\mapsto\tilde{\theta}_\mu\ \text{の単調増加}\right)\\
&\le \tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because\ \mu\le M_{\mathrm{col}}\ \text{と}\mu\mapsto\tilde{\theta}_\mu\ \text{の単調増加}\right)\\
&= \frac{2\pi\left(M_{\mathrm{col}}-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because \text{ 主張 14.8 の}\tilde{\theta}\text{ の定義}\right)\\
&= 2\pi - \frac{\pi}{M_{\mathrm{col}}} && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})
\end{aligned}
$$

であり、$M_{\mathrm{col}}\ge 2$ より $0<\frac{\pi}{M_{\mathrm{col}}}$ かつ $2\pi-\frac{\pi}{M_{\mathrm{col}}}<2\pi$ なので $0<\tilde{\theta}_\mu<2\pi$。

(2) $1\le\mu\le M_{\mathrm{col}}$ の各辺に -1 を掛けると $-M_{\mathrm{col}}\le-\mu\le-1$、さらに $M_{\mathrm{col}}+1$ を足すと $1\le M_{\mathrm{col}}+1-\mu\le M_{\mathrm{col}}$。$M_{\mathrm{col}}+1-\mu\in\mathbb{Z}$ なので $M_{\mathrm{col}}+1-\mu\in\check{\mathcal{M}}$。

(3) $(M_{\mathrm{col}}+1-\mu)-(1-\mu)=M_{\mathrm{col}}$ は展開するだけである。定義 14.1 の合同の意味により、差が M_{col} の倍数であることが $1-\mu\equiv M_{\mathrm{col}}+1-\mu\pmod{M}_{\mathrm{col}}$ である。

(4) $M_{\mathrm{col}}+1-\mu=\mu$ は $M_{\mathrm{col}}+1=2\mu$ と同値であり、これは $\mu=\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}$ と同値である。$\mu\in\mathbb{Z}$ なので $M_{\mathrm{col}}+1$ は偶数、すなわち M_{col} は奇数でなければならない。逆に M_{col} が奇数なら $\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}\in\mathbb{Z}$ であり、$M_{\mathrm{col}}\ge 2$ と併せて $1\le\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}\le M_{\mathrm{col}}$（右の不等式は $M_{\mathrm{col}}+1\le 2M_{\mathrm{col}}\iff 1\le M_{\mathrm{col}}$）なので $\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}\in\check{\mathcal{M}}$。このとき

$$
\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}} &= \frac{2\pi\left(\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 14.8 の}\tilde{\theta}\text{ の定義})\\
&= \frac{2\pi\cdot\frac{M_{\mathrm{col}}}{2}}{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because \tfrac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}-\tfrac{1}{2}=\tfrac{M_{\mathrm{col}}}{2}\right)\\
&= \pi && (\because \text{約分})
\end{aligned}
$$

(5) ($\Leftarrow$) $\nu=M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ なら $\mu+\nu=M_{\mathrm{col}}+1$ なので $(\mu+\nu)-1=M_{\mathrm{col}}$、すなわち $\mu+\nu\equiv 1\pmod{M}_{\mathrm{col}}$。

($\Rightarrow$) $1\le\mu\le M_{\mathrm{col}}$ と $1\le\nu\le M_{\mathrm{col}}$ を足すと $2\le\mu+\nu\le 2M_{\mathrm{col}}$、よって $1\le\mu+\nu-1\le 2M_{\mathrm{col}}-1$。仮定 $\mu+\nu\equiv 1\pmod{M}_{\mathrm{col}}$ は $\mu+\nu-1$ が M_{col} の倍数であることを意味する（定義 14.1 の合同の意味）。

M_{col} の倍数 lM_{col}（$l\in\mathbb{Z}$）が $1\le lM_{\mathrm{col}}\le 2M_{\mathrm{col}}-1$ を満たすのは $l=1$ のときに限る（$l\le 0$ なら $lM_{\mathrm{col}}\le 0<1$、$l\ge 2$ なら $lM_{\mathrm{col}}\ge 2M_{\mathrm{col}}>2M_{\mathrm{col}}-1$）。よって $\mu+\nu-1=M_{\mathrm{col}}$ すなわち $\nu=M_{\mathrm{col}}+1-\mu$。

デルタの等式は、定義 14.1 より $\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu+\nu,1)}=1\iff\mu+\nu\equiv 1\pmod{M}_{\mathrm{col}}$ であり、いま示した同値によりこれが $\nu=M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ と同値だからである。 □

主張 14.16 ($H_1^{(+)},H_2$ と$\check{Z},\check{Y}$ の交換関係)**.** $\mu\in\check{\mathcal{M}}$ (定義 14.15) について ($H_1^{(+)}$ は 定義 13.22 の定義により $H_1^{(+)}=\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}Y_mZ_{m+1}-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1$)、

$$
\text{(A)}\quad \left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right]=2\exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\,\check{Y}_\mu,\quad \text{(B)}\quad \left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right]=-2\exp(i\tilde{\theta}_\mu)\,\check{Z}_\mu,
$$
$$
\text{(C)}\quad \left[H_2,\ \check{Z}_\mu\right]=-2\,\check{Y}_\mu,\qquad\qquad \text{(D)}\quad \left[H_2,\ \check{Y}_\mu\right]=2\,\check{Z}_\mu
$$

が成り立つ。

証明. Step 1（サイトごとの交換関係)。$j\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について次を示す。

$$[H_2,\ Z_j] = -2Y_j, \qquad [H_2,\ Y_j] = 2Z_j,$$
$$\left[H_1^{(+)},\ Z_j\right] = 2\,Y_{j-1}^{\flat}, \quad \left[H_1^{(+)},\ Y_j\right] = -2\,Z_{j+1}^{\flat}$$

ここで ** 反周期的な延長 **

$$Y_0^{\flat} := -Y_{M_{\mathrm{col}}}, \quad Y_j^{\flat} := Y_j\ (1 \le j \le M_{\mathrm{col}}), \qquad Z_{M_{\mathrm{col}}+1}^{\flat} := -Z_1, \quad Z_j^{\flat} := Z_j\ (1 \le j \le M_{\mathrm{col}})$$

を用いた（定義 13.1 の $Z_{M_{\mathrm{col}}+1} := Z_1$ という ** 周期的 ** な規約とは符号が逆である点に注意）。

準備として、主張 14.3 から従う関係式をまとめる。$I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$j,k \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ とする。$j \neq k$ なら $1 \le j,k \le M_{\mathrm{col}}$ より $j \not\equiv k \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ なので $\delta_{(j,k)}^{(M_{\mathrm{col}})} = 0$、また $\delta_{(j,j)}^{(M_{\mathrm{col}})} = 1$ である。これを 主張 14.3 の 3 式へ代入して移項し、$2Z_jZ_j = 2I$、$2Y_jY_j = 2I$ の両辺を 2 で割ると

$$\begin{aligned}
&Z_jZ_k = -Z_kZ_j, \quad Y_jY_k = -Y_kY_j && \big(\because \text{ 主張 14.3, } j \neq k\big),\\
&Z_jY_k = -Y_kZ_j && \big(\because \text{ 主張 14.3}\big),\\
&Z_jZ_j = I, \quad Y_jY_j = I && \big(\because \text{ 主張 14.3, } \delta_{(j,j)}^{(M_{\mathrm{col}})} = 1,\ \mathbb{C} \text{ の四則}\big)
\end{aligned}$$

を得る。以下の鎖で 主張 14.3 を根拠とする行は、この 3 行のいずれかを適用している。

まず、相異なる添字の項が消えることを示す。$a,b,j \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ とする。$a \neq j$ のとき、一続きに

$$\begin{aligned}
[Z_aY_a,\ Z_j] &= (Z_aY_a)\,Z_j - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= Z_a\,(Y_aZ_j) - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= Z_a\,(-Z_jY_a) - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{主張 14.3 } (Y_aZ_j = -Z_jY_a))\\
&= -\,(Z_aZ_j)\,Y_a - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= -\,(-Z_jZ_a)\,Y_a - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{主張 14.3 } (Z_aZ_j = -Z_jZ_a,\ a \neq j))\\
&= (Z_jZ_a)\,Y_a - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because -(-1) = 1 \text{ の符号の消去})\\
&= Z_j\,(Z_aY_a) - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= O && (\because \text{主張 1.95 の } \Leftarrow \text{ を } A = B = Z_j\,(Z_aY_a) \text{ へ適用})
\end{aligned}$$

であり、同じく $a \neq j$ のとき

$$\begin{aligned}
[Z_aY_a,\ Y_j] &= (Z_aY_a)\,Y_j - Y_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= Z_a\,(Y_aY_j) - Y_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= Z_a\,(-Y_jY_a) - Y_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{主張 14.3 } (Y_aY_j = -Y_jY_a,\ a \neq j))\\
&= -\,(Z_aY_j)\,Y_a - Y_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= -\,(-Y_jZ_a)\,Y_a - Y_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{主張 14.3 } (Z_aY_j = -Y_jZ_a))\\
&= (Y_jZ_a)\,Y_a - Y_j\,(Z_aY_a) && (\because -(-1) = 1 \text{ の符号の消去})\\
&= Y_j\,(Z_aY_a) - Y_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= O && (\because \text{主張 1.95 の } \Leftarrow \text{ を } A = B = Y_j\,(Z_aY_a) \text{ へ適用})
\end{aligned}$$

である。$b \neq j$ のとき

$$
\begin{aligned}
[Y_a Z_b,\ Z_j] &= (Y_a Z_b)\, Z_j - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Y_a\, (Z_b Z_j) - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Y_a\, (-Z_j Z_b) - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{主張 14.3 } (Z_b Z_j = -Z_j Z_b,\ b \neq j)) \\
&= -\,(Y_a Z_j)\, Z_b - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -\,(-Z_j Y_a)\, Z_b - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{主張 14.3 } (Y_a Z_j = -Z_j Y_a)) \\
&= (Z_j Y_a)\, Z_b - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because -(-1) = 1 \text{ の符号の消去}) \\
&= Z_j\, (Y_a Z_b) - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= O && (\because \text{主張 1.95 の } \Leftarrow \text{ を } A = B = Z_j\, (Y_a Z_b) \text{ へ適用})
\end{aligned}
$$

であり、$a \neq j$ のとき

$$
\begin{aligned}
[Y_a Z_b,\ Y_j] &= (Y_a Z_b)\, Y_j - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Y_a\, (Z_b Y_j) - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Y_a\, (-Y_j Z_b) - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{主張 14.3 } (Z_b Y_j = -Y_j Z_b)) \\
&= -\,(Y_a Y_j)\, Z_b - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -\,(-Y_j Y_a)\, Z_b - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{主張 14.3 } (Y_a Y_j = -Y_j Y_a,\ a \neq j)) \\
&= (Y_j Y_a)\, Z_b - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because -(-1) = 1 \text{ の符号の消去}) \\
&= Y_j\, (Y_a Z_b) - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= O && (\because \text{主張 1.95 の } \Leftarrow \text{ を } A = B = Y_j\, (Y_a Z_b) \text{ へ適用})
\end{aligned}
$$

である。次に、同じ添字を含む項を計算する。$j \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について

$$
\begin{aligned}
[Z_j Y_j,\ Z_j] &= (Z_j Y_j)\, Z_j - Z_j\, (Z_j Y_j) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Z_j\, (Y_j Z_j) - (Z_j Z_j)\, Y_j && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Z_j\, (-Z_j Y_j) - (Z_j Z_j)\, Y_j && (\because \text{主張 14.3 } (Y_j Z_j = -Z_j Y_j)) \\
&= -\,(Z_j Z_j)\, Y_j - (Z_j Z_j)\, Y_j && (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -I\, Y_j - I\, Y_j && (\because \text{主張 14.3 } (Z_j Z_j = I)) \\
&= -Y_j - Y_j && (\because \text{主張 2.16 } (I\, Y_j = Y_j)) \\
&= -2Y_j && (\because \text{同類項をまとめる})
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
[Z_j Y_j,\ Y_j] &= (Z_j Y_j)\, Y_j - Y_j\, (Z_j Y_j) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Z_j\, (Y_j Y_j) - (Y_j Z_j)\, Y_j && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Z_j\, I - (Y_j Z_j)\, Y_j && (\because \text{主張 14.3 } (Y_j Y_j = I)) \\
&= Z_j - (Y_j Z_j)\, Y_j && (\because \text{主張 2.17 } (Z_j\, I = Z_j)) \\
&= Z_j - (-Z_j Y_j)\, Y_j && (\because \text{主張 14.3 } (Y_j Z_j = -Z_j Y_j)) \\
&= Z_j + Z_j\, (Y_j Y_j) && (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= Z_j + Z_j\, I && (\because \text{主張 14.3 } (Y_j Y_j = I)) \\
&= Z_j + Z_j && (\because \text{主張 2.17 } (Z_j\, I = Z_j)) \\
&= 2Z_j && (\because \text{同類項をまとめる})
\end{aligned}
$$

である。$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}} - 1\}$ について

$$
\begin{aligned}
[Y_m Z_{m+1},\ Z_{m+1}] &= (Y_m Z_{m+1})\, Z_{m+1} - Z_{m+1}\,(Y_m Z_{m+1}) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= Y_m\,(Z_{m+1} Z_{m+1}) - (Z_{m+1} Y_m)\, Z_{m+1} && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= Y_m\, I - (Z_{m+1} Y_m)\, Z_{m+1} && (\because \text{主張 14.3 } (Z_{m+1} Z_{m+1} = I))\\
&= Y_m - (Z_{m+1} Y_m)\, Z_{m+1} && (\because \text{主張 2.17 } (Y_m\, I = Y_m))\\
&= Y_m - (-Y_m Z_{m+1})\, Z_{m+1} && (\because \text{主張 14.3 } (Z_{m+1} Y_m = -Y_m Z_{m+1}))\\
&= Y_m + Y_m\,(Z_{m+1} Z_{m+1}) && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= Y_m + Y_m\, I && (\because \text{主張 14.3 } (Z_{m+1} Z_{m+1} = I))\\
&= Y_m + Y_m && (\because \text{主張 2.17 } (Y_m\, I = Y_m))\\
&= 2Y_m && (\because \text{同類項をまとめる})
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
[Y_m Z_{m+1},\ Y_m] &= (Y_m Z_{m+1})\, Y_m - Y_m\,(Y_m Z_{m+1}) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= Y_m\,(Z_{m+1} Y_m) - (Y_m Y_m)\, Z_{m+1} && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= Y_m\,(-Y_m Z_{m+1}) - (Y_m Y_m)\, Z_{m+1} && (\because \text{主張 14.3 } (Z_{m+1} Y_m = -Y_m Z_{m+1}))\\
&= -\,(Y_m Y_m)\, Z_{m+1} - (Y_m Y_m)\, Z_{m+1} && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= -I\, Z_{m+1} - I\, Z_{m+1} && (\because \text{主張 14.3 } (Y_m Y_m = I))\\
&= -Z_{m+1} - Z_{m+1} && (\because \text{主張 2.16 } (I\, Z_{m+1} = Z_{m+1}))\\
&= -2Z_{m+1} && (\because \text{同類項をまとめる})
\end{aligned}
$$

である。境界項については

$$
\begin{aligned}
[-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1] &= -\,[Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= -\,((Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1)\, Z_1 - Z_1\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1)) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}\,(Z_1 Z_1) - (Z_1 Y_{M_{\mathrm{col}}})\, Z_1) && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}\, I - (Z_1 Y_{M_{\mathrm{col}}})\, Z_1) && (\because \text{主張 14.3 } (Z_1 Z_1 = I))\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} - (Z_1 Y_{M_{\mathrm{col}}})\, Z_1) && (\because \text{主張 2.17 } (Y_{M_{\mathrm{col}}}\, I = Y_{M_{\mathrm{col}}}))\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} - (-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1)\, Z_1) && (\because \text{主張 14.3 } (Z_1 Y_{M_{\mathrm{col}}} = -Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1))\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} + Y_{M_{\mathrm{col}}}\,(Z_1 Z_1)) && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} + Y_{M_{\mathrm{col}}}\, I) && (\because \text{主張 14.3 } (Z_1 Z_1 = I))\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} + Y_{M_{\mathrm{col}}}) && (\because \text{主張 2.17 } (Y_{M_{\mathrm{col}}}\, I = Y_{M_{\mathrm{col}}}))\\
&= -2Y_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{同類項をまとめる})\\
&= 2\,(-Y_{M_{\mathrm{col}}}) && (\because \text{スカラー倍の符号の整理 } -2Y_{M_{\mathrm{col}}} = 2(-Y_{M_{\mathrm{col}}}))\\
&= 2\, Y_0^{\flat} && (\because Y_0^{\flat} := -Y_{M_{\mathrm{col}}})
\end{aligned}
$$

と

$$
\begin{aligned}
[-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] &= -[Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= -\left((Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)\,Y_{M_{\mathrm{col}}} - Y_{M_{\mathrm{col}}}\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)\right) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= -\left(Y_{M_{\mathrm{col}}}\,(Z_1Y_{M_{\mathrm{col}}}) - (Y_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}})\,Z_1\right) && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= -\left(Y_{M_{\mathrm{col}}}\,(-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1) - (Y_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}})\,Z_1\right) && (\because \text{主張 14.3 } (Z_1Y_{M_{\mathrm{col}}} = -Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1))\\
&= -\left(-(Y_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}})\,Z_1 - (Y_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}})\,Z_1\right) && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= -\left(-I\,Z_1 - I\,Z_1\right) && (\because \text{主張 14.3 } (Y_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}} = I))\\
&= -\left(-Z_1 - Z_1\right) && (\because \text{主張 2.16 } (I\,Z_1 = Z_1))\\
&= -\left(-2Z_1\right) && (\because \text{同類項をまとめる})\\
&= 2Z_1 && (\because \text{スカラー倍の符号の整理} -(-2Z_1) = 2Z_1)\\
&= -2\,(-Z_1) && (\because \text{スカラー倍の符号の整理} 2Z_1 = -2(-Z_1))\\
&= -2\,Z^{\flat}_{M_{\mathrm{col}}+1} && (\because Z^{\flat}_{M_{\mathrm{col}}+1} := -Z_1)
\end{aligned}
$$

である。以上を和へまとめる。H_2 について、一続きに

$$
\begin{aligned}
[H_2,\ Z_j] &= \left[\sum_{a=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_aY_a,\ Z_j\right] && (\because \text{定義 13.23})\\
&= \sum_{a=1}^{M_{\mathrm{col}}} [Z_aY_a,\ Z_j] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= [Z_jY_j,\ Z_j] + \sum_{\substack{1\le a\le M_{\mathrm{col}}\\ a\neq j}} [Z_aY_a,\ Z_j] && (\because a = j \text{ の項を有限和から分ける})\\
&= [Z_jY_j,\ Z_j] + \sum_{\substack{1\le a\le M_{\mathrm{col}}\\ a\neq j}} O && (\because \text{上で示した } [Z_aY_a, Z_j] = O\ (a\neq j) \text{ を各項へ同時適用})\\
&= [Z_jY_j,\ Z_j] + O && (\because \text{零行列の和は零行列（一つの添字を除いた集合の上の和。空の和を含む）})\\
&= [Z_jY_j,\ Z_j] && (\because \text{主張 2.8})\\
&= -2Y_j && (\because \text{上で示した } [Z_jY_j, Z_j] = -2Y_j)
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
[H_2,\ Y_j] &= \left[\sum_{a=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_aY_a,\ Y_j\right] && (\because \text{定義 13.23})\\
&= \sum_{a=1}^{M_{\mathrm{col}}} [Z_aY_a,\ Y_j] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= [Z_jY_j,\ Y_j] + \sum_{\substack{1\le a\le M_{\mathrm{col}}\\ a\neq j}} [Z_aY_a,\ Y_j] && (\because a = j \text{ の項を有限和から分ける})\\
&= [Z_jY_j,\ Y_j] + \sum_{\substack{1\le a\le M_{\mathrm{col}}\\ a\neq j}} O && (\because \text{上で示した } [Z_aY_a, Y_j] = O\ (a\neq j) \text{ を各項へ同時適用})\\
&= [Z_jY_j,\ Y_j] + O && (\because \text{零行列の和は零行列（一つの添字を除いた集合の上の和。空の和を含む）})\\
&= [Z_jY_j,\ Y_j] && (\because \text{主張 2.8})\\
&= 2Z_j && (\because \text{上で示した } [Z_jY_j, Y_j] = 2Z_j)
\end{aligned}
$$

である。$H_1^{(+)}$ と Z_j について、$2 \le j \le M_{\mathrm{col}}$ のときは一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ Z_j\right] &= \left[\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_j\right] && (\because \text{定義 13.22}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Z_j] - [Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_j] && (\because \text{交換子の第 1 引数についてのC 線型性}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Z_j] - O && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Z_j] = O\ (b \neq j) \text{ を} a = M_{\mathrm{col}},\ b = 1 \neq j \text{ に適用}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Z_j] && (\because \text{主張 2.10}) \\
&= [Y_{j-1} Z_j,\ Z_j] + \sum_{\substack{1 \le m \le M_{\mathrm{col}}-1 \\ m \neq j-1}} [Y_m Z_{m+1},\ Z_j] && (\because 1 \le j-1 \le M_{\mathrm{col}}-1 \text{ なので} m = j-1 \text{ の項を有限和から分ける}) \\
&= [Y_{j-1} Z_j,\ Z_j] + \sum_{\substack{1 \le m \le M_{\mathrm{col}}-1 \\ m \neq j-1}} O && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Z_j] = O\ (b \neq j) \text{ を} a = m,\ b = m+1 \neq j \text{ として各項へ同時適用}) \\
&= [Y_{j-1} Z_j,\ Z_j] + O && (\because \text{零行列の和は零行列（一つの添字を除いた集合の上の和。空の和を含む）}) \\
&= [Y_{j-1} Z_j,\ Z_j] && (\because \text{主張 2.8}) \\
&= 2Y_{j-1} && (\because \text{上で示した } [Y_m Z_{m+1}, Z_{m+1}] = 2Y_m \text{ を} m = j-1 \text{ に適用}) \\
&= 2Y_{j-1}^{\flat} && (\because 1 \le j-1 \le M_{\mathrm{col}} \text{ では} Y_{j-1}^{\flat} := Y_{j-1})
\end{aligned}
$$

$j = 1$ のときは一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ Z_1\right] &= \left[\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1\right] && (\because \text{定義 13.22}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Z_1] + [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての加法性}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} O + [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1] && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Z_j] = O\ (b \neq j) \text{ を} a = m,\ b = m+1 \geq 2,\ j = 1 \text{ として各項へ同時適用}) \\
&= O + [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1] && (\because \text{主張 2.11}) \\
&= [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1] && (\because \text{主張 2.9}) \\
&= 2\, Y_0^{\flat} && (\because \text{上で示した境界項の等式})
\end{aligned}
$$

であるから、両方の場合が $[H_1^{(+)}, Z_j] = 2Y_{j-1}^{\flat}$ にまとまる。$H_1^{(+)}$ と Y_j について、$1 \le j \le M_{\mathrm{col}}-1$ のときは一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ Y_j\right] &= \left[\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_j\right] && (\because \text{定義 13.22}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Y_j] - [Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_j] && (\because \text{交換子の第 1 引数についてのC 線型性}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Y_j] - O && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Y_j] = O\ (a \neq j) \text{ を} a = M_{\mathrm{col}} \neq j,\ b = 1 \text{ に適用}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Y_j] && (\because \text{主張 2.10}) \\
&= [Y_j Z_{j+1},\ Y_j] + \sum_{\substack{1 \le m \le M_{\mathrm{col}}-1 \\ m \neq j}} [Y_m Z_{m+1},\ Y_j] && (\because 1 \le j \le M_{\mathrm{col}}-1 \text{ なので} m = j \text{ の項を有限和から分ける}) \\
&= [Y_j Z_{j+1},\ Y_j] + \sum_{\substack{1 \le m \le M_{\mathrm{col}}-1 \\ m \neq j}} O && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Y_j] = O\ (a \neq j) \text{ を} a = m \neq j,\ b = m+1 \text{ として各項へ同時適用}) \\
&= [Y_j Z_{j+1},\ Y_j] + O && (\because \text{零行列の和は零行列（一つの添字を除いた集合の上の和。空の和を含む）}) \\
&= [Y_j Z_{j+1},\ Y_j] && (\because \text{主張 2.8}) \\
&= -2Z_{j+1} && (\because \text{上で示した } [Y_m Z_{m+1}, Y_m] = -2Z_{m+1} \text{ を} m = j \text{ に適用}) \\
&= -2Z_{j+1}^{\flat} && (\because 2 \le j+1 \le M_{\mathrm{col}} \text{ では} Z_{j+1}^{\flat} := Z_{j+1})
\end{aligned}
$$

$j = M_{\mathrm{col}}$ のときは一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ Y_{M_{\mathrm{col}}}\right] &= \left[\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}\right] && (\because \text{定義 13.22})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] + [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての加法性})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} O + [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Y_j] = O\ (a \neq j) \text{ を} a = m \leq M_{\mathrm{col}} - 1,\ b = m+1,\ j = M_{\mathrm{col}} \text{ として各項へ同時適用})\\
&= O + [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] && (\because \text{主張 2.11})\\
&= [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] && (\because \text{主張 2.9})\\
&= -2\, Z^{\flat}_{M_{\mathrm{col}}+1} && (\because \text{上で示した境界項の等式})
\end{aligned}
$$

であるから、両方の場合が $[H_1^{(+)}, Y_j] = -2Z^{\flat}_{j+1}$ にまとまる。

Step 2（(C)(D)）。交換子は第 2 引数について $\mathbb{C}$ 線型なので、Step 1 の第 1 式と 定義 14.9 と 定義 14.10 より

$$
\begin{aligned}
\left[H_2,\ \check{Z}_\mu\right] &= \left[H_2,\ \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j\right] && (\because \text{定義 14.9})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\, [H_2,\ Z_j] && (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C} \text{ 線型性})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\, (-2Y_j) && (\because \text{Step 1 の第 1 式})\\
&= -2 \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Y_j && (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す})\\
&= -2\, \check{Y}_\mu && (\because \text{定義 14.10})
\end{aligned}
$$

（最初と最後の等号は 定義 14.9 と 定義 14.10 の $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の定義による。）Step 1 の第 2 式 $[H_2, Y_j] = 2Z_j$ からも、一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_2,\ \check{Y}_\mu\right] &= \left[H_2,\ \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Y_j\right] && (\because \text{定義 14.10})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\, [H_2,\ Y_j] && (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C} \text{ 線型性})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \cdot 2Z_j && (\because \text{Step 1 の第 2 式})\\
&= 2 \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j && (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す})\\
&= 2\, \check{Z}_\mu && (\because \text{定義 14.9})
\end{aligned}
$$

を得る。

Step 3（(A)）。主計算に先立ち、添字を $l := j - 1$ と置き換える（$j = 1, \ldots, M_{\mathrm{col}}$ が $l = 0, \ldots, M_{\mathrm{col}} - 1$ に 1 対 1 で対応する）。また、主張 14.11 の $\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu) = -1$ と $Y_0^{\flat} = -Y_{M_{\mathrm{col}}}$ より、境界の二項は一続きに

$$
\begin{aligned}
\exp(-i\cdot 0\cdot\tilde{\theta}_\mu)\,Y_0^\flat &= 1\cdot Y_0^\flat && (\because \exp(0)=1)\\
&= 1\cdot(-Y_{M_{\mathrm{col}}}) && (\because Y_0^\flat := -Y_{M_{\mathrm{col}}})\\
&= (-1)\,Y_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \mathbb{C}\text{ の四則})\\
&= \exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu)\,Y_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 14.11})\\
&= \exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu)\,Y_{M_{\mathrm{col}}}^\flat && (\because Y_{M_{\mathrm{col}}}^\flat := Y_{M_{\mathrm{col}}}\ (1\le M_{\mathrm{col}}\le M_{\mathrm{col}}))
\end{aligned}
$$

となる。この境界項の等式と Step 1 の第 3 式、交換子の線型性を使うと、主張の左辺から一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] &= \left[H_1^{(+)},\ \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)Z_j\right] && (\because \text{定義 14.9})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\left[H_1^{(+)},\ Z_j\right] && (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\cdot 2\,Y_{j-1}^\flat && (\because \text{Step 1 の第 3 式})\\
&= 2\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\,Y_{j-1}^\flat && (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す})\\
&= 2\sum_{l=0}^{M_{\mathrm{col}}-1}\exp(-i(l+1)\tilde{\theta}_\mu)\,Y_l^\flat && (\because \text{有限和の添字の付け替え}l=j-1)\\
&= 2\sum_{l=0}^{M_{\mathrm{col}}-1}\exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\,Y_l^\flat && (\because \text{定理 3.7 }(n=1))\\
&= 2\,\exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\sum_{l=0}^{M_{\mathrm{col}}-1}\exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\,Y_l^\flat && (\because \text{分配則})\\
&= 2\,\exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\sum_{l=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\,Y_l^\flat && (\because \text{直前の displayMath による}l=0\text{ の項と}l=M_{\mathrm{col}}\text{ の項の入れ替え})\\
&= 2\,\exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\sum_{l=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\,Y_l && (\because 1\le l\le M_{\mathrm{col}}\text{ では}Y_l^\flat=Y_l)\\
&= 2\,\exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\,\check{Y}_\mu && (\because \text{定義 14.10})
\end{aligned}
$$

Step 4（(B)）。主計算に先立ち、添字を $l := j+1$ と置き換える（$j=1,\dots,M_{\mathrm{col}}$ が $l=2,\dots,M_{\mathrm{col}}+1$ に 1 対 1 で対応する）。また、主張 14.11 の $\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu)=-1$ と $Z_{M_{\mathrm{col}}+1}^\flat=-Z_1$ より、境界の二項は一続きに

$$
\begin{aligned}
\exp(-i(M_{\mathrm{col}}+1)\tilde{\theta}_\mu)\,Z_{M_{\mathrm{col}}+1}^\flat &= \exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu)\,\exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\,Z_{M_{\mathrm{col}}+1}^\flat && (\because \text{theorem_exp_product }(n=1))\\
&= \exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu)\,\exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\,(-Z_1) && (\because Z_{M_{\mathrm{col}}+1}^\flat := -Z_1)\\
&= (-1)\exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\,(-Z_1) && (\because \text{主張 14.11})\\
&= \exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\,Z_1 && (\because \mathbb{C}\text{ の四則})\\
&= \exp(-i\cdot 1\cdot\tilde{\theta}_\mu)\,Z_1^\flat && (\because Z_1^\flat := Z_1)
\end{aligned}
$$

となる。この境界項の等式と Step 1 の第 4 式、交換子の線型性を使うと、主張の左辺から一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right] &= \left[H_1^{(+)},\ \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Y_j\right] && (\because \text{定義 14.10})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \left[H_1^{(+)},\ Y_j\right] && (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \left(-2\, Z_{j+1}^{\flat}\right) && (\because \text{Step 1 の第 4 式})\\
&= -2 \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\, Z_{j+1}^{\flat} && (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す})\\
&= -2 \sum_{l=2}^{M_{\mathrm{col}}+1} \exp(-i(l-1)\tilde{\theta}_\mu)\, Z_l^{\flat} && (\because \text{有限和の添字の付け替え} l = j+1)\\
&= -2 \sum_{l=2}^{M_{\mathrm{col}}+1} \exp(i\tilde{\theta}_\mu) \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Z_l^{\flat} && (\because \text{定理 3.7 } (n=1))\\
&= -2 \exp(i\tilde{\theta}_\mu) \sum_{l=2}^{M_{\mathrm{col}}+1} \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Z_l^{\flat} && (\because \text{分配則})\\
&= -2 \exp(i\tilde{\theta}_\mu) \sum_{l=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Z_l^{\flat} && (\because \text{直前の displayMath による} l = M_{\mathrm{col}}+1 \text{ の項と} l = 1 \text{ の項の入れ替え})\\
&= -2 \exp(i\tilde{\theta}_\mu) \sum_{l=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Z_l && (\because 1 \le l \le M_{\mathrm{col}} \text{ では} Z_l^{\flat} = Z_l)\\
&= -2 \exp(i\tilde{\theta}_\mu)\, \check{Z}_\mu && (\because \text{定義 14.9})
\end{aligned}
$$

□

注意 14.17 ($T_{(V^{(+)})}$ の$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ への作用を求める道筋)**.** 主張 14.16 で、$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ が $H_1^{(+)}, H_2$ に対して満たす交換関係 (A)〜(D) を得た。以下では、そこから

$$
\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) A\left(\tilde{\theta}_\mu\right), \qquad A\left(\tilde{\theta}_\mu\right) = B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right) B_2 B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right)
$$

を得る。ここで $V^{(+)} = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は 定義 13.29 の行列（$H_1^{(+)}$ は 定義 13.22、$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は 定義 13.28）であり、$A(\theta)$ は 定義 14.6 の（$\theta \in \mathbb{C}$ について定義された）行列である。

道筋は次のとおりである。(A)〜(D) を繰り返し使って $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の n 重交換子を求め（主張 14.23）、指数関数の共役の級数展開（主張 14.4）で $T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}$ と T_{V_2} の作用を得て（主張 14.28）、それらを合成する（主張 14.35）。ここまでに用いるのは (A)〜(D)、交換子の双線型性、$\exp(i\theta)\exp(-i\theta) = 1$ と行列の計算だけである。最後に $V^{(+)}$ が可逆であること（主張 14.21）と、合成で定めた $T_{(V^{(+)})}$ が $V^{(+)}$ による共役 $X \mapsto V^{(+)} X \left(V^{(+)}\right)^{-1}$ に一致すること（主張 14.22）を使って、$V^{(+)}\check{Z}_\mu \left(V^{(+)}\right)^{-1}, V^{(+)}\check{Y}_\mu \left(V^{(+)}\right)^{-1}$ の表示として述べる（主張 14.36）。この最後の段で用いるのは、$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と V_2 の可逆性（主張 14.18、主張 14.19）、可逆な行列の積が可逆であること（定義 7.2 (ii)）、共役の合成則（主張 1.90）、定義 13.29・定義 14.20・定義 7.3 の定義である。$A(\tilde{\theta}_\mu)$ の分解 $A(\tilde{\theta}_\mu) = B_1(\tilde{\theta}_\mu) B_2 B_1(\tilde{\theta}_\mu)$ は 主張 14.34 による。

** 添字の量化について。** 定義 14.9 と 定義 14.10 は $\mu \in \mathbb{Z}$ について定義されているが、主張 14.13 の添字周期性 $\check{Z}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} = \check{Z}_\mu$ により本質的に相異なる添字は M_{col} 個である。** 以下の主張はすべて 定義 14.15 の $\mu \in \check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について述べる。**

主張 14.18 ($\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ の可逆性)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用いる。定義 13.28 で定めた $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in R$ は可逆である。すなわち $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in R^{\times}$ である。

証明. $X := \left(\frac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}}\right) H_1^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（$(K_1)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 による $K_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ の像、$\frac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ によるスカラー倍は 定義 2.3。定義 13.28 が $\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$ と書いて掛けている K_1 はこの像である）、$h := \exp(-X) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（$-X$ は 定義 1.94、exp は 定義 3.4）と置く。

$$
\begin{aligned}
\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} h &= \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \exp(-X) && (\because\ h \text{ の置き方}) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}\right) \exp(-X) && (\because\ \text{定義 13.28}) \\
&= \exp(X) \exp(-X) && (\because\ X \text{ の置き方 } (K_1 \text{ は 定義 1.13 の } (K_1)_{\mathbb{C}})) \\
&= \exp(-(-X)) \exp(-X) && (\because\ \text{主張 2.27 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to X)) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})} && (\because\ \text{主張 8.18 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to -X)),
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
h \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} &= \exp(-X) \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} && (\because\ h \text{ の置き方}) \\
&= \exp(-X) \exp\left(\tfrac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}\right) && (\because\ \text{定義 13.28}) \\
&= \exp(-X) \exp(X) && (\because\ X \text{ の置き方 } (K_1 \text{ は 定義 1.13 の } (K_1)_{\mathbb{C}})) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})} && (\because\ \text{主張 8.18 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to X))
\end{aligned}
$$

$$
\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in R^{\times} \qquad (\because\ \text{上の二つの積, 定義 7.2 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ g \to \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2},\ h \to \exp(-X)))
$$

□

主張 14.19 (V_2 の可逆性と逆元)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用いる。定義 13.15 で定めた $V_2 \in R$ と $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 13.23 の $H_2 \in R$、定義 12.28 の $a := (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$（$s_2$ は 定義 12.26）とその逆数 $a^{-1} \in \mathbb{R}$ を用い、$(K_2^*)_{\mathbb{C}}, (a^{-1})_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ は 定義 1.13 による像、$Y := \left(i(K_2^*)_{\mathbb{C}}\right) H_2 \in R$（スカラー倍は 定義 2.3、$-Y$ は 定義 1.94、exp は 定義 3.4）とする。V_2 は可逆であり、その逆元は

$$
V_2 \in R^{\times}, \qquad V_2^{-1} = (a^{-1})_{\mathbb{C}} \exp(-Y)
$$

である。

証明. 主張の Y を使う（主張 13.25 が $\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$ と書いて掛けている K_2^* と係数 $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ は、それぞれ $(K_2^*)_{\mathbb{C}}$ と下の $a_{\mathbb{C}}$ である）。主張の a について

$$
\begin{aligned}
a &= (2 \sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because\ \text{定義 12.26 の } s_2 = \sinh 2K_2) \\
&\in \mathbb{R}_{>0} && (\because\ \text{定義 12.28})
\end{aligned}
$$

なので $a \neq 0$ であり、$\mathbb{R}$ の逆数 $a^{-1} \in \mathbb{R}$ がある（$\mathbb{R}$ が現れるのは、sinh が実数の exp の値で、$(2 \sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ が正の実数の平方根の冪だからである）。定義 2.3 のスカラー倍は係数を $\mathbb{C}$ に取るので、実数 $a \cdot a^{-1}$ は 定義 1.13 の $a_{\mathbb{C}} \cdot (a^{-1})_{\mathbb{C}}$ として掛ける。$h := (a^{-1})_{\mathbb{C}} \exp(-Y) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（$-Y$ は 定義 1.94）と置く。

$$
\begin{aligned}
V_2 h &= V_2\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because\ h \text{ の置き方})\\
&= \Big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(iK_2^*H_2)\Big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because\ \text{主張 13.25})\\
&= \Big(a_{\mathbb{C}}\exp(iK_2^*H_2)\Big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because\ a \text{ の置き方 (係数は 定義 1.13 の } a_{\mathbb{C}})\big)\\
&= \big(a_{\mathbb{C}}\exp(Y)\big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because\ Y \text{ の置き方 } (K_2^* \text{ は 定義 1.13 の } (K_2^*)_{\mathbb{C}})\big)\\
&= a_{\mathbb{C}}\Big(\exp(Y)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big)\Big) && (\because\ \text{主張 2.18})\\
&= a_{\mathbb{C}}\Big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\big(\exp(Y)\exp(-Y)\big)\Big) && (\because\ \text{主張 2.19})\\
&= \big(a_{\mathbb{C}}(a^{-1})_{\mathbb{C}}\big)\big(\exp(Y)\exp(-Y)\big) && (\because\ \text{主張 2.41})\\
&= (aa^{-1})_{\mathbb{C}}\big(\exp(Y)\exp(-Y)\big) && (\because\ \text{主張 1.29 } (a\to a,\ b\to a^{-1}))\\
&= (1)_{\mathbb{C}}\big(\exp(Y)\exp(-Y)\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } aa^{-1}=1)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\big(\exp(Y)\exp(-Y)\big) && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は 定義 1.13 の略記 } r_{\mathbb{C}} \text{ の } r=1)\\
&= \exp(Y)\exp(-Y) && (\because\ \text{主張 2.42})\\
&= \exp(-(-Y))\exp(-Y) && (\because\ \text{主張 2.27 } (m\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to Y))\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because\ \text{主張 8.18 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to -Y)),
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
hV_2 &= \big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big)V_2 && (\because\ h \text{ の置き方})\\
&= \big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big)\Big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(iK_2^*H_2)\Big) && (\because\ \text{主張 13.25})\\
&= \big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big)\Big(a_{\mathbb{C}}\exp(iK_2^*H_2)\Big) && (\because\ a \text{ の置き方 (係数は 定義 1.13 の } a_{\mathbb{C}})\big)\\
&= \big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big)\big(a_{\mathbb{C}}\exp(Y)\big) && (\because\ Y \text{ の置き方 } (K_2^* \text{ は 定義 1.13 の } (K_2^*)_{\mathbb{C}})\big)\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\Big(\exp(-Y)\big(a_{\mathbb{C}}\exp(Y)\big)\Big) && (\because\ \text{主張 2.18})\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\Big(a_{\mathbb{C}}\big(\exp(-Y)\exp(Y)\big)\Big) && (\because\ \text{主張 2.19})\\
&= \big((a^{-1})_{\mathbb{C}}a_{\mathbb{C}}\big)\big(\exp(-Y)\exp(Y)\big) && (\because\ \text{主張 2.41})\\
&= (a^{-1}a)_{\mathbb{C}}\big(\exp(-Y)\exp(Y)\big) && (\because\ \text{主張 1.29 } (a\to a^{-1},\ b\to a))\\
&= (1)_{\mathbb{C}}\big(\exp(-Y)\exp(Y)\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } a^{-1}a=1)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\big(\exp(-Y)\exp(Y)\big) && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は 定義 1.13 の略記 } r_{\mathbb{C}} \text{ の } r=1)\\
&= \exp(-Y)\exp(Y) && (\because\ \text{主張 2.42})\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because\ \text{主張 8.18 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to Y))
\end{aligned}
$$

$V_2 \in R^{\times}$ $(\because$ 上の二つの積, 定義 7.2 の可逆の定義 $(M\to M_{\mathrm{col}},\ g\to V_2,\ h\to (a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)))$

$V_2^{-1} = (a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)$ $(\because$ 上の二つの積, 定義 7.2 の逆元の一意性と記号 $g^{-1})$

□

定義 14.20 $(T_{(V^{(+)})} := T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} \circ T_{V_2} \circ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}})$**.** 定義 13.29 で $V^{(+)}$ を作る三つの因子は、主張 14.18 と 主張 14.19 により可逆である。そこで 定義 7.3 の $T_g(X) = gXg^{-1}$ を用いて

$$
T_{(V^{(+)})}(X) := T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(X)\right)\right) \qquad \big(X\in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})\big)
$$

主張 14.21 $(V^{(+)}$ **の可逆性).** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を用いる。定義 13.29 で定めた $V^{(+)} \in R$ は可逆である。すなわち $V^{(+)} \in R^{\times}$ である。

証明. $B := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in R$（定義 13.28）と置く。

$$BV_2 \in R^\times \qquad \left(\because \text{ 主張 14.18, 主張 14.19, 定義 7.2 (ii) } (g_1 \to B,\ g_2 \to V_2)\right)$$

$$\begin{aligned} V^{(+)} &= (BV_2)B && \left(\because \text{ 定義 13.29}\right) \\ &\in R^\times && \left(\because \text{ 前の式の } BV_2 \in R^\times,\ \text{主張 14.18, 定義 7.2 (ii) } (g_1 \to BV_2,\ g_2 \to B)\right) \end{aligned}$$

□

主張 14.22 ($T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、$R := \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と書く（定義 7.2 の M を M_{col} に取ったもの）。定義 14.20 で合成として定めた写像 $T_{(V^{(+)})} : R \to R$ は、定義 13.29 の $V^{(+)}$（主張 14.21 により $V^{(+)} \in R^\times$）による 定義 7.3 の共役 $T_{V^{(+)}} : R \to R$ に、写像として一致する。

$$T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$$

証明. $S := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in R$（定義 13.28）と書く。四つの行列の可逆性を先に並べる。

$$\begin{aligned} S &\in R^\times && \left(\because \text{ 主張 14.18}\right) \\ V_2 &\in R^\times && \left(\because \text{ 主張 14.19}\right) \\ SV_2 &\in R^\times && \left(\because \text{ 定義 7.2 (ii) } (g_1 \to S,\ g_2 \to V_2)\right) \\ V^{(+)} &\in R^\times && \left(\because \text{ 主張 14.21}\right) \end{aligned}$$

$g \in R^\times$ について、定理 1.8 の n を $2^{M_{\mathrm{col}}}$、その変数 B を g に取った写像を $T'_g : R \to R$、$T'_g(X) := (gX)g^{-1}$ と書く（定理 1.8 の T_B と 定義 7.3 の T_g を記号で区別するため）。g^{-1} は定義 7.2 の逆元で $gg^{-1} = I$ かつ $g^{-1}g = I$ を満たすので、g は 主張 1.90 の意味で正則であり、g^{-1} はそこでの逆行列でもある。定義 7.3 の $g \cdot h \cdot g^{-1}$ は $(gh)g^{-1}$ と読む（主張 7.4 の証明と同じ読み方）。任意の $X \in R$ について、

$$\begin{aligned} T_g(X) &= (gX)g^{-1} && \left(\because \text{ 定義 7.3}\right) \\ &= T'_g(X) && \left(\because \ T'_g \text{ の定め方}\right) \end{aligned}$$

である（以下、これを $T_g = T'_g$ と書いて、X 以外の値へも当てる）。$X \in R$ を任意に取る。

$$\begin{aligned} T_{(V^{(+)})}(X) &= T_S\Big(T_{V_2}\big(T_S(X)\big)\Big) && \left(\because \text{ 定義 14.20}\right) \\ &= T'_S\Big(T'_{V_2}\big(T'_S(X)\big)\Big) && \left(\because \text{ 準備の}T_g = T'_g \text{ を}g \to S,\ V_2,\ S \text{ の 3 か所へ同時適用}\right) \\ &= \big(T'_S \circ T'_{V_2}\big)\big(T'_S(X)\big) && \left(\because \text{ 写像の合成の定義}\right) \\ &= T'_{SV_2}\big(T'_S(X)\big) && \left(\because \text{ 主張 1.90 の合成則 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ G \to S,\ H \to V_2)\right) \\ &= \big(T'_{SV_2} \circ T'_S\big)(X) && \left(\because \text{ 写像の合成の定義}\right) \\ &= T'_{(SV_2)S}(X) && \left(\because \text{ 主張 1.90 の合成則 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ G \to SV_2,\ H \to S)\right) \\ &= T'_{V^{(+)}}(X) && \left(\because \text{ 定義 13.29 の}V^{(+)} := (SV_2)S\right) \\ &= T_{V^{(+)}}(X) && \left(\because \text{ 準備の}T_g = T'_g \text{ を}g \to V^{(+)} \text{ に}\right) \end{aligned}$$

$X \in R$ は任意だったので、二つの写像 $T_{(V^{(+)})}, T_{V^{(+)}} : R \to R$ は全ての値が一致し、写像として等しい。 □

主張 14.23 ($\check{Z},\check{Y}$ についてのn 重交換子)**.** $n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$、$\mu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）とし、$\tilde{\theta}:=\tilde{\theta}_\mu\in\mathbb{R}$（主張 14.8）と略記し、$(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\in\mathbb{C}$ をその 定義 1.13 による像とする。$R:=\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ とし、$H_1^{(+)},H_2,\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu\in R$ は 定義 13.22・定義 13.23・定義 14.9・定義 14.10 のもの、$K_1,K_2^*\in\mathbb{R}$ は 定義 13.15 のスカラー、$(K_1)_{\mathbb{C}},(K_2^*)_{\mathbb{C}}\in\mathbb{C}$ はそれらの 定義 1.13 による像である。$(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)}$ などはスカラー倍（定義 2.3）である。交換子 $[X,W]:=XW-WX$ と、その反復 ad_X^n（$\mathrm{ad}_X^0(W)=W$、$\mathrm{ad}_X^{m+1}(W)=[X,\mathrm{ad}_X^m(W)]$）は 定義 5.11 のもので、$X,W\in R$ について

$$\underbrace{[X,\dots,[X,W]\dots]}_{n}:=\mathrm{ad}_X^n(W)$$

と書く。右辺の係数は $\mathbb{C}$ の元であり、係数に現れる 2 は $2_{\mathbb{C}}:=(2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$（定義 1.13）を表す。$n$ が偶数なら $n/2\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$、奇数なら $(n-1)/2,(n+1)/2\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ であり、$-1\in\mathbb{C}$ の冪と $\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n$ などの冪は 主張 3.12 の約束 $x^0:=1$、$x^{m+1}:=x^mx$ による。係数と行列の積はスカラー倍である。このとき次が成り立つ。

(h1.z)

$$\underbrace{\Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)},\dots,\Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)},\check{Z}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n}=\begin{cases}\big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ \big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}$$

(h1.y)

$$\underbrace{\Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)},\dots,\Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)},\check{Y}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n}=\begin{cases}\big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ \big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}$$

(h2.z)

$$\underbrace{\big[(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2,\dots,\big[(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2,\check{Z}_\mu\big]\dots\big]}_{n}=\begin{cases}\big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ \big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}$$

(h2.y)

$$\underbrace{\big[(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2,\dots,\big[(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2,\check{Y}_\mu\big]\dots\big]}_{n}=\begin{cases}\big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ \big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}$$

証明. 準備（前提の読み方）。主張 14.16 の (A)〜(D) の右辺の $\exp(\mp i\tilde{\theta}_\mu)$ は 定義 14.9 の位相と同じく $\exp\big(\mp i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\in\mathbb{C}$ を表し、右辺は係数を一つの複素数にまとめたスカラー倍 $\big(2\exp(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}})\big)\check{Y}_\mu$・$\big(-2\exp(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}})\big)\check{Z}_\mu$・$(-2)\check{Y}_\mu$・$(2)\check{Z}_\mu$ である。

準備（位相の積）。

$$\begin{aligned}\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)&=\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}+i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)&&\big(\because\text{ 主張 3.13 を}K=\mathbb{C}\text{ で}\big)\\&=\exp(0)&&\big(\because\ \mathbb{C}\text{ の加法の逆元}\big)\\&=1_{\mathbb{C}}&&\big(\because\text{ 主張 3.14 を}K=\mathbb{C}\text{ で}\big)\end{aligned}$$

(h1.z) の証明。$C_n:=\underbrace{\Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)},\dots,\Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)},\check{Z}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n}\in R$（$n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$）とおき、$n$ についての帰納法で示す。基底段階（$n=0$）。

$$
\begin{aligned}
C_0 &= \check{Z}_\mu && \big(\because\ \mathrm{ad}_X^0(W) = W\text{。定義 5.11}\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\,\check{Z}_\mu && \big(\because\ \text{主張 2.42}\big)\\
&= \big(1_{\mathbb{C}}1_{\mathbb{C}}\big)\check{Z}_\mu && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}}\ \text{は}\mathbb{C}\ \text{の積の単位元}\big)\\
&= \big((-1)^0\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^0\big)\check{Z}_\mu && \big(\because\ \text{冪の約束}x^0 := 1\ \text{を二か所へ。主張 3.12}\big)
\end{aligned}
$$

帰納段階（n が偶数）。$C_n = \big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Z}_\mu$ を仮定する。

$$
\begin{aligned}
C_{n+1} &= \Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)},\ C_n\Big] && \big(\because\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) = [X, \mathrm{ad}_X^m(W)]\ \text{の再帰。定義 5.11}\big)\\
&= \Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)},\ \big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Z}_\mu\Big] && \big(\because\ \text{帰納法の仮定}\big)\\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\Big[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\Big] && \big(\because\ \text{主張 5.12 を}\alpha = (K_1)_{\mathbb{C}},\ \beta = (-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\ \text{で}\big)\\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\big(\big(2\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu\big) && \big(\because\ \text{主張 14.16 の}(A)\text{(準備の読み方で）}\big)\\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big(2\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \text{主張 2.41}\big)\\
&= \big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律と結合律}\big)\\
&= \big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \text{冪の約束}x^{m+1} := x^m x\text{。主張 3.12}\big)\\
&= \big((-1)^{((n+1)-1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \tfrac{n}{2} = \tfrac{(n+1)-1}{2}\big)
\end{aligned}
$$

帰納段階（n が奇数）。$C_n = \big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu$ を仮定する。

$$
\begin{aligned}
C_{n+1} &= \Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)},\ C_n\Big] && \big(\because\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) = [X, \mathrm{ad}_X^m(W)]\ \text{の再帰。定義 5.11}\big)\\
&= \Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)},\ \big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu\Big] && \big(\because\ \text{帰納法の仮定}\big)\\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\big)\Big[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\Big] && \big(\because\ \text{主張 5.12 を}\alpha = (K_1)_{\mathbb{C}},\ \beta = (-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\ \text{で}\big)\\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\big)\big(\big(-2\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu\big) && \big(\because\ \text{主張 14.16 の}(B)\text{(準備の読み方で）}\big)\\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\big(-2\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\big)\check{Z}_\mu && \big(\because\ \text{主張 2.41}\big)\\
&= \big((-1)^{(n-1)/2}(-1)\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の四則}\big)\\
&= \big((-1)^{(n-1)/2+1}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu && \big(\because\ \text{冪の約束}x^{m+1} := x^m x\ \text{を}-1\ \text{と}2(K_1)_{\mathbb{C}}\ \text{の二か所へ。主張 3.12}\big)\\
&= \big((-1)^{(n-1)/2+1}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}1_{\mathbb{C}}\big)\check{Z}_\mu && \big(\because\ \text{準備の}\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big) = 1_{\mathbb{C}}\big)\\
&= \big((-1)^{(n-1)/2+1}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\big)\check{Z}_\mu && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}}\ \text{は}\mathbb{C}\ \text{の積の単位元}\big)\\
&= \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\big)\check{Z}_\mu && \big(\because\ \tfrac{n-1}{2} + 1 = \tfrac{n+1}{2}\big)
\end{aligned}
$$

最後の行は、$n+1$ の偶奇に応じた主張の右辺である。以上で (h1.z) が成り立つ。

(h1.y) の証明。$D_n := \underbrace{\Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)}, \ldots, \Big[(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu\Big]\ldots\Big]}_{n} \in R$（$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）とおき、$n$ についての帰納法で示す。基底段階（$n = 0$）。

$$
\begin{aligned}
D_0 &= \check{Y}_\mu && \big(\because\ \mathrm{ad}_X^0(W) = W\text{。定義 5.11}\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\,\check{Y}_\mu && \big(\because\ \text{主張 2.42}\big)\\
&= \big(1_{\mathbb{C}}1_{\mathbb{C}}\big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}}\ \text{は}\mathbb{C}\ \text{の積の単位元}\big)\\
&= \big((-1)^0\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^0\big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \text{冪の約束}x^0 := 1\ \text{を二か所へ。主張 3.12}\big)
\end{aligned}
$$

帰納段階（n が偶数）。$D_n = \big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Y}_\mu$ を仮定する。

$$
\begin{aligned}
D_{n+1} &= \Big[(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)},\ D_n\Big] && (\because\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) = [X, \mathrm{ad}_X^m(W)] \text{ の再帰。定義 5.11}) \\
&= \Big[(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)},\ \big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Y}_\mu\Big] && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\Big[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\Big] && (\because\ \text{主張 5.12 を} \alpha = (K_1)_{\mathbb{C}},\ \beta = (-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n \text{ で}) \\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\big(\big(-2\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu\big) && (\because\ \text{主張 14.16 の}(B)\text{(準備の読み方で)}) \\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big(-2\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{主張 2.41}) \\
&= \big((-1)^{n/2}(-1)\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= \big((-1)^{n/2+1}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{冪の約束} x^{m+1} := x^m x \text{ を} -1 \text{ と} 2(K_1)_{\mathbb{C}} \text{ の二か所へ。主張 3.12}) \\
&= \big((-1)^{((n+1)+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \tfrac{n}{2} + 1 = \tfrac{(n+1)+1}{2})
\end{aligned}
$$

帰納段階（n が奇数）。$D_n = \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n \exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu$ を仮定する。

$$
\begin{aligned}
D_{n+1} &= \Big[(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)},\ D_n\Big] && (\because\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) = [X, \mathrm{ad}_X^m(W)] \text{ の再帰。定義 5.11}) \\
&= \Big[(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)},\ \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n \exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu\Big] && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n \exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\big)\Big[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\Big] && (\because\ \text{主張 5.12 を} \alpha = (K_1)_{\mathbb{C}},\ \beta = (-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n \exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big) \text{ で}) \\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n \exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\big)\big(\big(2\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu\big) && (\because\ \text{主張 14.16 の}(A)\text{(準備の読み方で)}) \\
&= \big((K_1)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n \exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\big(2\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{主張 2.41}) \\
&= \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^n\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の可換律と結合律}) \\
&= \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{冪の約束} x^{m+1} := x^m x_\circ \text{ 主張 3.12}) \\
&= \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}1_{\mathbb{C}}\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{準備の} \exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big) = 1_{\mathbb{C}}) \\
&= \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_1)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\big)\check{Y}_\mu && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は} \mathbb{C} \text{ の積の単位元})
\end{aligned}
$$

最後の行は、$n+1$ の偶奇に応じた主張の右辺である。以上で (h1.y) が成り立つ。

(h2.z) の証明。$E_n := \underbrace{\big[(K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2, \ldots, \big[(K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2, \check{Z}_\mu\big] \ldots\big]}_{n} \in R$（$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）とおき、$n$ についての帰納法で示す。基底段階（$n = 0$）。

$$
\begin{aligned}
E_0 &= \check{Z}_\mu && (\because\ \mathrm{ad}_X^0(W) = W_\circ \text{ 定義 5.11}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\,\check{Z}_\mu && (\because\ \text{主張 2.42}) \\
&= \big(1_{\mathbb{C}} 1_{\mathbb{C}}\big)\check{Z}_\mu && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は} \mathbb{C} \text{ の積の単位元}) \\
&= \big((-1)^0\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^0\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{冪の約束} x^0 := 1 \text{ を二か所へ。主張 3.12})
\end{aligned}
$$

帰納段階（n が偶数）。$E_n = \big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Z}_\mu$ を仮定する。

$$
\begin{aligned}
E_{n+1} &= [(K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2,\ E_n] && (\because\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) = [X, \mathrm{ad}_X^m(W)] \text{ の再帰。定義 5.11}) \\
&= \Big[(K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2,\ \big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Z}_\mu\Big] && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\,[H_2,\ \check{Z}_\mu] && (\because\ \text{主張 5.12 を} \alpha = (K_2^*)_{\mathbb{C}},\ \beta = (-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n \text{ で}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\big((-2)\check{Y}_\mu\big) && (\because\ \text{主張 14.16 の}(C)\text{(準備の読み方で)}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)(-2)\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{主張 2.41}) \\
&= \big((-1)^{n/2}(-1)\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= \big((-1)^{n/2+1}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{冪の約束} x^{m+1} := x^m x \text{ を} -1 \text{ と} 2(K_2^*)_{\mathbb{C}} \text{ の二か所へ。主張 3.12}) \\
&= \big((-1)^{((n+1)+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \tfrac{n}{2} + 1 = \tfrac{(n+1)+1}{2})
\end{aligned}
$$

帰納段階（n が奇数）。$E_n = \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Y}_\mu$ を仮定する。

$$
\begin{aligned}
E_{n+1} &= [(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2,\ E_n] && (\because\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) = [X, \mathrm{ad}_X^m(W)] \text{ の再帰。定義 5.11}) \\
&= \Big[(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2,\ \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Y}_\mu\Big] && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\,[H_2,\ \check{Y}_\mu] && (\because\ \text{主張 5.12 を}\alpha = (K_2^*)_{\mathbb{C}},\ \beta = (-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n \text{ で}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\big((2)\check{Z}_\mu\big) && (\because\ \text{主張 14.16 の}(D)\text{(準備の読み方で)}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)(2)\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{主張 2.41}) \\
&= \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の可換律と結合律}) \\
&= \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{冪の約束}x^{m+1} := x^m x\text{。主張 3.12})
\end{aligned}
$$

最後の行は、$n+1$ の偶奇に応じた主張の右辺である。以上で (h2.z) が成り立つ。

(h2.y) の証明。$F_n := \underbrace{\big[(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2, \dots, \big[(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2, \check{Y}_\mu\big]\dots\big]}_{n} \in R$（$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）とおき、$n$ についての帰納法で示す。基底段階（$n = 0$）。

$$
\begin{aligned}
F_0 &= \check{Y}_\mu && (\because\ \mathrm{ad}_X^0(W) = W\text{。定義 5.11}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\,\check{Y}_\mu && (\because\ \text{主張 2.42}) \\
&= \big(1_{\mathbb{C}}1_{\mathbb{C}}\big)\check{Y}_\mu && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は}\mathbb{C} \text{ の積の単位元}) \\
&= \big((-1)^0\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^0\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{冪の約束}x^0 := 1 \text{ を二か所へ。主張 3.12})
\end{aligned}
$$

帰納段階（n が偶数）。$F_n = \big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Y}_\mu$ を仮定する。

$$
\begin{aligned}
F_{n+1} &= [(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2,\ F_n] && (\because\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) = [X, \mathrm{ad}_X^m(W)] \text{ の再帰。定義 5.11}) \\
&= \Big[(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2,\ \big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Y}_\mu\Big] && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\,[H_2,\ \check{Y}_\mu] && (\because\ \text{主張 5.12 を}\alpha = (K_2^*)_{\mathbb{C}},\ \beta = (-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n \text{ で}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\big((2)\check{Z}_\mu\big) && (\because\ \text{主張 14.16 の}(D)\text{(準備の読み方で)}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)(2)\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{主張 2.41}) \\
&= \big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の可換律と結合律}) \\
&= \big((-1)^{n/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{冪の約束}x^{m+1} := x^m x\text{。主張 3.12}) \\
&= \big((-1)^{((n+1)-1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \tfrac{n}{2} = \tfrac{(n+1)-1}{2})
\end{aligned}
$$

帰納段階（n が奇数）。$F_n = \big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Z}_\mu$ を仮定する。

$$
\begin{aligned}
F_{n+1} &= [(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2,\ F_n] && (\because\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) = [X, \mathrm{ad}_X^m(W)] \text{ の再帰。定義 5.11}) \\
&= \Big[(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2,\ \big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Z}_\mu\Big] && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\,[H_2,\ \check{Z}_\mu] && (\because\ \text{主張 5.12 を}\alpha = (K_2^*)_{\mathbb{C}},\ \beta = (-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n \text{ で}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\big)\big((-2)\check{Y}_\mu\big) && (\because\ \text{主張 14.16 の}(C)\text{(準備の読み方で)}) \\
&= \big((K_2^*)_{\mathbb{C}}\big((-1)^{(n-1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)(-2)\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{主張 2.41}) \\
&= \big((-1)^{(n-1)/2}(-1)\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= \big((-1)^{(n-1)/2+1}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{冪の約束}x^{m+1} := x^m x \text{ を} -1 \text{ と}2(K_2^*)_{\mathbb{C}} \text{ の二か所へ。主張 3.12}) \\
&= \big((-1)^{(n+1)/2}\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^{n+1}\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \tfrac{n-1}{2} + 1 = \tfrac{n+1}{2})
\end{aligned}
$$

最後の行は、$n+1$ の偶奇に応じた主張の右辺である。以上で (h2.y) が成り立つ。 □

主張 14.24 ($\check{Z}, \check{Y}$ についての $\cosh, \sinh$ の展開係数への変換)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）とし、$\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$（主張 14.8）と略記し、$(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ をその 定義 1.13 による像とする。$R := \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、$H_1^{(+)}, H_2, \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu \in R$、$K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$ とその像 $(K_1)_{\mathbb{C}}, (K_2^*)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$、$n$ 重交換子

の記法 $\underbrace{[X,\dots,[X,W]\dots]}_{n} := \mathrm{ad}_X^n(W)$（定義 5.11）は 主張 14.23 のものとする。$i := (0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}) \in \mathbb{C}$ を虚数単位、$-i := (-1_{\mathbb{C}})\, i$（定義 1.14）とし、$2_{\mathbb{C}} := (2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$ の逆元 $2_{\mathbb{C}}^{-1}$（主張 1.56）で $\frac{i}{2} := i\, 2_{\mathbb{C}}^{-1} \in \mathbb{C}$ と書く。冪は 主張 3.12 の約束 $x^0 := 1_{\mathbb{C}}$、$x^{m+1} := x^m x$ による。この主張の係数に現れる 2 は $2_{\mathbb{C}}$ を表す。係数と行列の積はスカラー倍（定義 2.3）である。このとき次が成り立つ。

(h1.z)

$$\underbrace{\Big[\tfrac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}\big),\dots,\Big[\tfrac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}\big),\check{Z}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n} = \begin{cases} \big(i\,(K_1)_{\mathbb{C}}^n \exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (K_1)_{\mathbb{C}}^n\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h1.y)

$$\underbrace{\Big[\tfrac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}\big),\dots,\Big[\tfrac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}\big),\check{Y}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n} = \begin{cases} \big((-i)\,(K_1)_{\mathbb{C}}^n \exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (K_1)_{\mathbb{C}}^n\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.z)

$$\underbrace{\big[i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2\big),\dots,\big[i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2\big),\check{Z}_\mu\big]\dots\big]}_{n} = \begin{cases} \big((-i)\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ \big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.y)

$$\underbrace{\big[i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2\big),\dots,\big[i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2\big),\check{Y}_\mu\big]\dots\big]}_{n} = \begin{cases} \big(i\big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\big)\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ \big(2(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

証明. 準備（生成子のスカラー倍）。$\alpha \in \mathbb{C}$、$X, W \in R$ とし、$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ についての帰納法で

$$\mathrm{ad}_{\alpha X}^m(W) = \alpha^m\, \mathrm{ad}_X^m(W) \qquad (\star)$$

を示す。基底段階（$m = 0$）。

$$\begin{aligned} \mathrm{ad}_{\alpha X}^0(W) &= W && \big(\because\ \mathrm{ad}_X^0(W) = W\text{。定義 5.11}\big) \\ &= 1_{\mathbb{C}}\, W && \big(\because\ \text{主張 2.42}\big) \\ &= \alpha^0\, W && \big(\because\ \text{冪の約束}x^0 := 1_{\mathbb{C}}\text{。主張 3.12}\big) \\ &= \alpha^0\, \mathrm{ad}_X^0(W) && \big(\because\ \mathrm{ad}_X^0(W) = W\text{。定義 5.11}\big) \end{aligned}$$

帰納段階。m で $(\star)$ を仮定する。

$$\begin{aligned} \mathrm{ad}_{\alpha X}^{m+1}(W) &= [\alpha X,\ \mathrm{ad}_{\alpha X}^m(W)] && \big(\because\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) = [X, \mathrm{ad}_X^m(W)]\ \text{の再帰。定義 5.11}\big) \\ &= [\alpha X,\ \alpha^m\, \mathrm{ad}_X^m(W)] && \big(\because\ \text{帰納法の仮定}\big) \\ &= \big(\alpha\, \alpha^m\big)\, [X,\ \mathrm{ad}_X^m(W)] && \big(\because\ \text{主張 5.12 を}\beta = \alpha^m,\ W \to \mathrm{ad}_X^m(W)\ \text{で}\big) \\ &= \big(\alpha^m\, \alpha\big)\, [X,\ \mathrm{ad}_X^m(W)] && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律。主張 1.56}\big) \\ &= \alpha^{m+1}\, [X,\ \mathrm{ad}_X^m(W)] && \big(\because\ \text{冪の約束}x^{m+1} := x^m x\text{。主張 3.12}\big) \\ &= \alpha^{m+1}\, \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) && \big(\because\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(W) = [X, \mathrm{ad}_X^m(W)]\ \text{の再帰。定義 5.11}\big) \end{aligned}$$

準備（$i\,i$ と $(-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})$）。

$$
\begin{aligned}
i\,i &= (0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}})(0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}) && (\because\ i \text{ の定義}) \\
&= \big(0_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}} - 1_{\mathbb{R}}1_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}}1_{\mathbb{R}} + 1_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}\big) && (\because\ \text{定義 1.12 の積}) \\
&= (-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= -1_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} = (1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) \text{ の加法の逆元。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}}) &= (-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}})(-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) && (\because\ 1_{\mathbb{C}} = (1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) \text{ の加法の逆元。主張 1.56}) \\
&= \big((-1_{\mathbb{R}})(-1_{\mathbb{R}}) - 0_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}},\ (-1_{\mathbb{R}})0_{\mathbb{R}} + 0_{\mathbb{R}}(-1_{\mathbb{R}})\big) && (\because\ \text{定義 1.12 の積}) \\
&= (1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

準備（係数の冪その一）。$k \in \mathbb{C}$ とし、$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ についての帰納法で

$$
\big(\tfrac{i}{2}\big)^m (2k)^m = i^m k^m \qquad (\dagger)
$$

を示す。基底段階（$m = 0$）。

$$
\begin{aligned}
\big(\tfrac{i}{2}\big)^0 (2k)^0 &= 1_{\mathbb{C}}\, 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{冪の約束} x^0 := 1_{\mathbb{C}} \text{ を二か所へ。主張 3.12}) \\
&= i^0 k^0 && (\because\ \text{冪の約束} x^0 := 1_{\mathbb{C}} \text{ を二か所へ。主張 3.12})
\end{aligned}
$$

帰納段階。m で $(\dagger)$ を仮定する。

$$
\begin{aligned}
\big(\tfrac{i}{2}\big)^{m+1} (2k)^{m+1} &= \Big(\big(\tfrac{i}{2}\big)^m \tfrac{i}{2}\Big)\big((2k)^m (2k)\big) && (\because\ \text{冪の約束} x^{m+1} := x^m x \text{ を二か所へ。主張 3.12}) \\
&= \Big(\big(\tfrac{i}{2}\big)^m (2k)^m\Big)\Big(\tfrac{i}{2}(2k)\Big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の可換律・結合律。主張 1.56}) \\
&= \big(i^m k^m\big)\Big(\tfrac{i}{2}(2k)\Big) && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= \big(i^m k^m\big)\Big(\big(i\, 2_{\mathbb{C}}^{-1}\big)(2_{\mathbb{C}} k)\Big) && (\because\ \tfrac{i}{2} := i\, 2_{\mathbb{C}}^{-1}) \\
&= \big(i^m k^m\big)\Big(\big(i\,(2_{\mathbb{C}}^{-1} 2_{\mathbb{C}})\big)k\Big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の結合律。主張 1.56}) \\
&= \big(i^m k^m\big)\big((i\, 1_{\mathbb{C}})k\big) && (\because\ 2_{\mathbb{C}}^{-1} \text{ は} 2_{\mathbb{C}} \text{ の逆元。主張 1.56}) \\
&= \big(i^m k^m\big)(ik) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の単位元。主張 1.56}) \\
&= \big(i^m i\big)\big(k^m k\big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の可換律・結合律。主張 1.56}) \\
&= i^{m+1} k^{m+1} && (\because\ \text{冪の約束} x^{m+1} := x^m x \text{ を二か所へ。主張 3.12})
\end{aligned}
$$

準備（係数の冪その二）。$l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ についての帰納法で

$$
i^{2l}(-1_{\mathbb{C}})^l = 1_{\mathbb{C}} \qquad (\ddagger)
$$

を示す。基底段階（$l = 0$）。

$$
\begin{aligned}
i^{2\cdot 0}(-1_{\mathbb{C}})^0 &= i^0 (-1_{\mathbb{C}})^0 && (\because\ 2 \cdot 0 = 0\ (\mathbb{Z})) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\, 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{冪の約束} x^0 := 1_{\mathbb{C}} \text{ を二か所へ。主張 3.12}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

帰納段階。l で $(\ddagger)$ を仮定する。

$$
\begin{aligned}
i^{2(l+1)}(-1_{\mathbb{C}})^{l+1} &= i^{(2l+1)+1}(-1_{\mathbb{C}})^{l+1} && \big(\because\ 2(l+1)=(2l+1)+1\ (\mathbb{Z})\big)\\
&= \big((i^{2l}\,i)i\big)\big((-1_{\mathbb{C}})^{l}(-1_{\mathbb{C}})\big) && \big(\because\ \text{冪の約束}x^{m+1}:=x^m x\ \text{を三か所へ。主張 3.12}\big)\\
&= \big(i^{2l}(-1_{\mathbb{C}})^{l}\big)\big((i\,i)(-1_{\mathbb{C}})\big) && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律・結合律。主張 1.56}\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\big((i\,i)(-1_{\mathbb{C}})\big) && \big(\because\ \text{帰納法の仮定}\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big) && \big(\because\ \text{準備の}i\,i=-1_{\mathbb{C}}\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\,1_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \text{準備の}(-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})=1_{\mathbb{C}}\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の単位元。主張 1.56}\big)
\end{aligned}
$$

以下、n が奇数のときは $l:=(n-1)/2\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$（このとき $n=2l+1$、$(n+1)/2=l+1$）、偶数のときは $l:=n/2\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$（このとき $n=2l$）とし、$k_1:=(K_1)_{\mathbb{C}}$、$k_2:=(K_2^*)_{\mathbb{C}}$、$e_{\mp}:=\exp\big(\mp i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\in\mathbb{C}$ と略記する。

(h1.z)、n が奇数のとき。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\Big[\tfrac{i}{2}\big(k_1H_1^{(+)}\big),\dots,\Big[\tfrac{i}{2}\big(k_1H_1^{(+)}\big),\check{Z}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n} &= \mathrm{ad}^n_{\frac{i}{2}(k_1H_1^{(+)})}(\check{Z}_\mu) && \big(\because\ n\ \text{重交換子の記法}\big)\\
&= \big(\tfrac{i}{2}\big)^n\,\mathrm{ad}^n_{k_1H_1^{(+)}}(\check{Z}_\mu) && \big(\because\ \text{準備の}(\star)\ \text{を}\alpha=\tfrac{i}{2},\ X=k_1H_1^{(+)},\ W=\check{Z}_\mu,\ m=n\ \text{で}\big)\\
&= \big(\tfrac{i}{2}\big)^n\Big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_1)^n e_-)\check{Y}_\mu\Big) && \big(\because\ \text{主張 14.23 (h1.z) の奇数の場合と}(n-1)/2=l\big)\\
&= \Big(\big(\tfrac{i}{2}\big)^n\,\big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_1)^n e_-\big)\Big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \text{主張 2.41}\big)\\
&= \Big(\Big(\big(\tfrac{i}{2}\big)^n\,(2k_1)^n\Big)\big((-1_{\mathbb{C}})^l e_-\big)\Big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律・結合律。主張 1.56}\big)\\
&= \Big(\big(i^n k_1^n\big)\big((-1_{\mathbb{C}})^l e_-\big)\Big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \text{準備の}(\dagger)\ \text{を}k=k_1,\ m=n\ \text{で}\big)\\
&= \Big(\big(i^{2l+1} k_1^n\big)\big((-1_{\mathbb{C}})^l e_-\big)\Big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ n=2l+1\big)\\
&= \Big(\big((i^{2l}\,i) k_1^n\big)\big((-1_{\mathbb{C}})^l e_-\big)\Big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \text{冪の約束}x^{m+1}:=x^m x_\circ\ \text{主張 3.12}\big)\\
&= \Big(\big(i^{2l}(-1_{\mathbb{C}})^l\big)\big(i\,k_1^n e_-\big)\Big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律・結合律。主張 1.56}\big)\\
&= \big(1_{\mathbb{C}}\big(i\,k_1^n e_-\big)\big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \text{準備の}(\ddagger)\big)\\
&= \big(i\,k_1^n e_-\big)\check{Y}_\mu && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の単位元。主張 1.56}\big)
\end{aligned}
$$

(h1.z)・(h1.y)、n が偶数のとき。$W_\mu\in\{\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu\}$ とする（$W_\mu=\check{Z}_\mu$ が (h1.z)、$W_\mu=\check{Y}_\mu$ が (h1.y) である）。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\Big[\tfrac{i}{2}\big(k_1H_1^{(+)}\big),\dots,\Big[\tfrac{i}{2}\big(k_1H_1^{(+)}\big),W_\mu\Big]\dots\Big]}_{n} &= \mathrm{ad}^n_{\frac{i}{2}(k_1H_1^{(+)})}(W_\mu) && \big(\because\ n\ \text{重交換子の記法}\big)\\
&= \big(\tfrac{i}{2}\big)^n\,\mathrm{ad}^n_{k_1H_1^{(+)}}(W_\mu) && \big(\because\ \text{準備の}(\star)\ \text{を}\alpha=\tfrac{i}{2},\ X=k_1H_1^{(+)},\ W=W_\mu,\ m=n\ \text{で}\big)\\
&= \big(\tfrac{i}{2}\big)^n\Big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_1)^n)W_\mu\Big) && \big(\because\ \text{主張 14.23 (h1.z)・(h1.y) の偶数の場合と}n/2=l\big)\\
&= \Big(\big(\tfrac{i}{2}\big)^n\,\big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_1)^n\big)\Big)W_\mu && \big(\because\ \text{主張 2.41}\big)\\
&= \Big(\Big(\big(\tfrac{i}{2}\big)^n\,(2k_1)^n\Big)(-1_{\mathbb{C}})^l\Big)W_\mu && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律・結合律。主張 1.56}\big)\\
&= \Big(\big(i^n k_1^n\big)(-1_{\mathbb{C}})^l\Big)W_\mu && \big(\because\ \text{準備の}(\dagger)\ \text{を}k=k_1,\ m=n\ \text{で}\big)\\
&= \Big(\big(i^{2l} k_1^n\big)(-1_{\mathbb{C}})^l\Big)W_\mu && \big(\because\ n=2l\big)\\
&= \Big(\big(i^{2l}(-1_{\mathbb{C}})^l\big)k_1^n\Big)W_\mu && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律・結合律。主張 1.56}\big)\\
&= \big(1_{\mathbb{C}}\,k_1^n\big)W_\mu && \big(\because\ \text{準備の}(\ddagger)\big)\\
&= k_1^n\,W_\mu && \big(\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の単位元。主張 1.56}\big)
\end{aligned}
$$

(h1.y)、n が奇数のとき。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\Big[\tfrac{i}{2}\big(k_1 H_1^{(+)}\big),\dots,\Big[\tfrac{i}{2}\big(k_1 H_1^{(+)}\big),\check{Y}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n} &= \mathrm{ad}^n_{\frac{i}{2}(k_1 H_1^{(+)})}(\check{Y}_\mu) && (\because\ n \text{ 重交換子の記法})\\
&= \big(\tfrac{i}{2}\big)^n \mathrm{ad}^n_{k_1 H_1^{(+)}}(\check{Y}_\mu) && (\because\ \text{準備の}(\star)\ \text{を}\alpha=\tfrac{i}{2},\ X=k_1H_1^{(+)},\ W=\check{Y}_\mu,\ m=n\ \text{で})\\
&= \big(\tfrac{i}{2}\big)^n \Big(\big((-1_{\mathbb{C}})^{l+1}(2k_1)^n e_+\big)\check{Z}_\mu\Big) && (\because\ \text{主張 14.23 (h1.y) の奇数の場合と}(n+1)/2=l+1)\\
&= \Big(\big(\tfrac{i}{2}\big)^n \big((-1_{\mathbb{C}})^{l+1}(2k_1)^n e_+\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{主張 2.41})\\
&= \Big(\Big(\big(\tfrac{i}{2}\big)^n (2k_1)^n\Big)\big((-1_{\mathbb{C}})^{l+1}e_+\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律・結合律。主張 1.56})\\
&= \Big(\big(i^n k_1^n\big)\big((-1_{\mathbb{C}})^{l+1}e_+\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{準備の}(\dagger)\ \text{を}k=k_1,\ m=n\ \text{で})\\
&= \Big(\big(i^{2l+1}k_1^n\big)\big((-1_{\mathbb{C}})^{l+1}e_+\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ n=2l+1)\\
&= \Big(\big(\big(i^{2l}\,i\big)k_1^n\big)\big(\big((-1_{\mathbb{C}})^l(-1_{\mathbb{C}})\big)e_+\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{冪の約束}x^{m+1}:=x^m x\ \text{を二か所へ。主張 3.12})\\
&= \Big(\big(i^{2l}(-1_{\mathbb{C}})^l\big)\big(\big((-1_{\mathbb{C}})\,i\big)k_1^n e_+\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律・結合律。主張 1.56})\\
&= \Big(1_{\mathbb{C}}\big(\big((-1_{\mathbb{C}})\,i\big)k_1^n e_+\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{準備の}(\ddagger))\\
&= \Big(1_{\mathbb{C}}\big((-i)\,k_1^n e_+\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ -i:=(-1_{\mathbb{C}})\,i_\circ\ \text{定義 1.14})\\
&= \big((-i)\,k_1^n e_+\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

(h2.z)、n が奇数のとき。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\Big[i\big(k_2H_2\big),\dots,\Big[i\big(k_2H_2\big),\check{Z}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n} &= \mathrm{ad}^n_{i(k_2H_2)}(\check{Z}_\mu) && (\because\ n \text{ 重交換子の記法})\\
&= i^n \mathrm{ad}^n_{k_2H_2}(\check{Z}_\mu) && (\because\ \text{準備の}(\star)\ \text{を}\alpha=i,\ X=k_2H_2,\ W=\check{Z}_\mu,\ m=n\ \text{で})\\
&= i^n\Big(\big((-1_{\mathbb{C}})^{l+1}(2k_2)^n\big)\check{Y}_\mu\Big) && (\because\ \text{主張 14.23 (h2.z) の奇数の場合と}(n+1)/2=l+1)\\
&= \Big(i^n\big((-1_{\mathbb{C}})^{l+1}(2k_2)^n\big)\Big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{主張 2.41})\\
&= \Big(i^{2l+1}\big((-1_{\mathbb{C}})^{l+1}(2k_2)^n\big)\Big)\check{Y}_\mu && (\because\ n=2l+1)\\
&= \Big(\big(i^{2l}\,i\big)\big(\big((-1_{\mathbb{C}})^l(-1_{\mathbb{C}})\big)(2k_2)^n\big)\Big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{冪の約束}x^{m+1}:=x^m x\ \text{を二か所へ。主張 3.12})\\
&= \Big(\big(i^{2l}(-1_{\mathbb{C}})^l\big)\big(\big((-1_{\mathbb{C}})\,i\big)(2k_2)^n\big)\Big)\check{Y}_\mu && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律・結合律。主張 1.56})\\
&= \Big(1_{\mathbb{C}}\big(\big((-1_{\mathbb{C}})\,i\big)(2k_2)^n\big)\Big)\check{Y}_\mu && (\because\ \text{準備の}(\ddagger))\\
&= \Big(1_{\mathbb{C}}\big((-i)(2k_2)^n\big)\Big)\check{Y}_\mu && (\because\ -i:=(-1_{\mathbb{C}})\,i_\circ\ \text{定義 1.14})\\
&= \big((-i)(2k_2)^n\big)\check{Y}_\mu && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

(h2.y)、n が奇数のとき。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\Big[i\big(k_2H_2\big),\dots,\Big[i\big(k_2H_2\big),\check{Y}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n} &= \mathrm{ad}^n_{i(k_2H_2)}(\check{Y}_\mu) && (\because\ n \text{ 重交換子の記法})\\
&= i^n \mathrm{ad}^n_{k_2H_2}(\check{Y}_\mu) && (\because\ \text{準備の}(\star)\ \text{を}\alpha=i,\ X=k_2H_2,\ W=\check{Y}_\mu,\ m=n\ \text{で})\\
&= i^n\Big(\big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_2)^n\big)\check{Z}_\mu\Big) && (\because\ \text{主張 14.23 (h2.y) の奇数の場合と}(n-1)/2=l)\\
&= \Big(i^n\big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_2)^n\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{主張 2.41})\\
&= \Big(i^{2l+1}\big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_2)^n\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ n=2l+1)\\
&= \Big(\big(i^{2l}\,i\big)\big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_2)^n\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{冪の約束}x^{m+1}:=x^m x_\circ\ \text{主張 3.12})\\
&= \Big(\big(i^{2l}(-1_{\mathbb{C}})^l\big)\big(i\,(2k_2)^n\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の可換律・結合律。主張 1.56})\\
&= \Big(1_{\mathbb{C}}\big(i\,(2k_2)^n\big)\Big)\check{Z}_\mu && (\because\ \text{準備の}(\ddagger))\\
&= \big(i\,(2k_2)^n\big)\check{Z}_\mu && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

(h2.z)・(h2.y)、n が偶数のとき。$W_\mu \in \{\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu\}$ とする（$W_\mu = \check{Z}_\mu$ が (h2.z)、$W_\mu = \check{Y}_\mu$ が (h2.y) である）。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\big[i\big(k_2H_2\big),\dots,\big[i\big(k_2H_2\big),W_\mu\big]\dots\big]}_{n} &= \mathrm{ad}^n_{i(k_2H_2)}(W_\mu) && (\because\ n \text{ 重交換子の記法})\\
&= i^n\,\mathrm{ad}^n_{k_2H_2}(W_\mu) && (\because\ \text{準備の}(\star)\ \text{を}\alpha=i,\ X=k_2H_2,\ W=W_\mu,\ m=n\ \text{で})\\
&= i^n\Big(\big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_2)^n\big)W_\mu\Big) && (\because\ \text{主張 14.23 (h2.z)・(h2.y) の偶数の場合と}n/2=l)\\
&= \Big(i^n\big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_2)^n\big)\Big)W_\mu && (\because\ \text{主張 2.41})\\
&= \Big(i^{2l}\big((-1_{\mathbb{C}})^l(2k_2)^n\big)\Big)W_\mu && (\because\ n=2l)\\
&= \Big(\big(i^{2l}(-1_{\mathbb{C}})^l\big)(2k_2)^n\Big)W_\mu && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の結合律。主張 1.56})\\
&= \big(1_{\mathbb{C}}(2k_2)^n\big)W_\mu && (\because\ \text{準備の}(\ddagger))\\
&= (2k_2)^n\,W_\mu && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

□

主張 14.25 (偶数番目と奇数番目が数の冪のスカラー倍である行列の列の指数級数)**.** $d\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A,B\in\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$、$x\in\mathbb{R}$ とその像 $x_{\mathbb{C}}\in\mathbb{C}$（定義 1.13）、$c\in\mathbb{C}$ とする。数の冪は 主張 3.12 の約束 $y^0:=1$、$y^{m+1}:=y^m y$（$\mathbb{R}$ でも $\mathbb{C}$ でも同じ）、係数と行列の積はスカラー倍（定義 2.3）、$\cosh,\sinh$ は 定義 3.19、行列の列の収束と級数の和は 定義 2.91 による。$\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ の列 $(T_n)_{n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ が

$$
T_n=\begin{cases}(x_{\mathbb{C}})^n\,A & (n\text{ 偶数})\\ \big(c\,(x_{\mathbb{C}})^n\big)B & (n\text{ 奇数})\end{cases}
$$

を満たすとする。このとき級数 $\sum_{n=0}^{\infty}\big(\frac{1}{n!}\big)_{\mathbb{C}}\,T_n$ は $\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ において収束し、

$$
\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\,T_n=(\cosh x)_{\mathbb{C}}\,A+\big(c\,(\sinh x)_{\mathbb{C}}\big)B
$$

である（$\mathbb{R}$ への脱出: 実数の exp（定義 3.11）の値と、部分和の極限）。

証明. $N\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $S_N:=\sum_{n=0}^{N}\big(\frac{1}{n!}\big)_{\mathbb{C}}\,T_n\in\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$（定義 2.5）、$y\in\mathbb{R}$ について $E_N(y):=\sum_{n=0}^{N}\frac{y^n}{n!}\in\mathbb{R}$（主張 3.12 の部分和）、$\alpha_N:=\frac{E_N(x)+E_N(-x)}{2}\in\mathbb{R}$、$\beta_N:=\frac{E_N(x)-E_N(-x)}{2}\in\mathbb{R}$、$L:=(\cosh x)_{\mathbb{C}}\,A+\big(c\,(\sinh x)_{\mathbb{C}}\big)B\in\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ とおく。$n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $a_n:=\frac{x^n+(-x)^n}{2\cdot n!}\in\mathbb{R}$、$b_n:=\frac{x^n-(-x)^n}{2\cdot n!}\in\mathbb{R}$ とおく。

準備（冪の像）: $n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $(x_{\mathbb{C}})^n=(x^n)_{\mathbb{C}}$ を n の帰納法で示す。$n=0$ では

$$
\begin{aligned}
(x_{\mathbb{C}})^0 &= 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 3.12 の }\mathbb{C}\text{ の冪の約束})\\
&= (1)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定義 1.13 の略記 }1_{\mathbb{C}}=\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1))\\
&= (x^0)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 3.12 の }\mathbb{R}\text{ の冪の約束})
\end{aligned}
$$

であり、$(x_{\mathbb{C}})^n=(x^n)_{\mathbb{C}}$ を仮定すると

$$
\begin{aligned}
(x_{\mathbb{C}})^{n+1} &= (x_{\mathbb{C}})^n\,x_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 3.12 の }\mathbb{C}\text{ の冪の約束})\\
&= (x^n)_{\mathbb{C}}\,x_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{帰納法の仮定})\\
&= (x^n x)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29})\\
&= (x^{n+1})_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 3.12 の }\mathbb{R}\text{ の冪の約束})
\end{aligned}
$$

である。準備（a_n,b_n の値）: n が偶数のとき

$$
\begin{aligned}
a_n &= \frac{x^n + (-1)^n x^n}{2 \cdot n!} && (\because \text{実数の冪 } (-x)^n = (-1)^n x^n) \\
&= \frac{x^n + x^n}{2 \cdot n!} && (\because n \text{ 偶数より } (-1)^n = 1) \\
&= \frac{x^n}{n!} && (\because \text{実数の四則}), \\
b_n &= \frac{x^n - (-1)^n x^n}{2 \cdot n!} && (\because \text{実数の冪 } (-x)^n = (-1)^n x^n) \\
&= \frac{x^n - x^n}{2 \cdot n!} && (\because n \text{ 偶数より } (-1)^n = 1) \\
&= 0 && (\because \text{実数の四則})
\end{aligned}
$$

であり、n が奇数のとき

$$
\begin{aligned}
a_n &= \frac{x^n + (-1)^n x^n}{2 \cdot n!} && (\because \text{実数の冪 } (-x)^n = (-1)^n x^n) \\
&= \frac{x^n + (-1) x^n}{2 \cdot n!} && (\because n \text{ 奇数より } (-1)^n = -1) \\
&= 0 && (\because \text{実数の四則}), \\
b_n &= \frac{x^n - (-1)^n x^n}{2 \cdot n!} && (\because \text{実数の冪 } (-x)^n = (-1)^n x^n) \\
&= \frac{x^n - (-1) x^n}{2 \cdot n!} && (\because n \text{ 奇数より } (-1)^n = -1) \\
&= \frac{x^n}{n!} && (\because \text{実数の四則})
\end{aligned}
$$

である。準備（実数の差の像）：$y, z \in \mathbb{R}$ について

$$
\begin{aligned}
y_{\mathbb{C}} - z_{\mathbb{C}} &= y_{\mathbb{C}} + \left(-z_{\mathbb{C}}\right) && (\because \text{定義 1.15}) \\
&= y_{\mathbb{C}} + \left(-1_{\mathbb{C}}\right) z_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.14}) \\
&= y_{\mathbb{C}} + (-1)_{\mathbb{C}}\, z_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.13 の } -1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1) = (-1)_{\mathbb{C}}) \\
&= y_{\mathbb{C}} + \big((-1)\, z\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29}) \\
&= \big(y + (-1)\, z\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.20 を 2 項へ当てた}) \\
&= (y - z)_{\mathbb{C}} && (\because \text{実数の四則})
\end{aligned}
$$

である。

中間目標: 各項。$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\left(\frac{1}{n!}\right)_{\mathbb{C}} T_n = (a_n)_{\mathbb{C}}\, A + \big(c\,(b_n)_{\mathbb{C}}\big) B$ である。n が偶数のとき

$$
\begin{aligned}
\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} T_n &= \Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} \big((x_{\mathbb{C}})^n\, A\big) && (\because T_n \text{ の仮定の偶数の場合})\\
&= \Big(\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} (x_{\mathbb{C}})^n\Big) A && (\because \text{主張 2.41})\\
&= \Big(\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} (x^n)_{\mathbb{C}}\Big) A && (\because \text{準備の冪の像})\\
&= \Big(\frac{1}{n!}\, x^n\Big)_{\mathbb{C}} A && (\because \text{主張 1.29})\\
&= (a_n)_{\mathbb{C}}\, A && (\because \text{準備の } n \text{ 偶数の } a_n = x^n/n!)\\
&= (a_n)_{\mathbb{C}}\, A + O && (\because \text{主張 2.8})\\
&= (a_n)_{\mathbb{C}}\, A + 0_{\mathbb{C}}\, B && (\because \text{主張 2.13})\\
&= (a_n)_{\mathbb{C}}\, A + \big(c\, 0_{\mathbb{C}}\big) B && (\because \text{主張 1.59})\\
&= (a_n)_{\mathbb{C}}\, A + \big(c\, (0)_{\mathbb{C}}\big) B && (\because \text{定義 1.13 の略記 } 0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0))\\
&= (a_n)_{\mathbb{C}}\, A + \big(c\, (b_n)_{\mathbb{C}}\big) B && (\because \text{準備の } n \text{ 偶数の } b_n = 0)
\end{aligned}
$$

であり、n が奇数のとき

$$
\begin{aligned}
\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} T_n &= \Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} \Big(\big(c\, (x_{\mathbb{C}})^n\big) B\Big) && (\because T_n \text{ の仮定の奇数の場合})\\
&= \Big(\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} \big(c\, (x_{\mathbb{C}})^n\big)\Big) B && (\because \text{主張 2.41})\\
&= \Big(\Big(\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} c\Big) (x_{\mathbb{C}})^n\Big) B && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律})\\
&= \Big(\Big(c \Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\Big) (x_{\mathbb{C}})^n\Big) B && (\because \text{主張 1.56 の積の可換律})\\
&= \Big(c \Big(\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} (x_{\mathbb{C}})^n\Big)\Big) B && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律})\\
&= \Big(c \Big(\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} (x^n)_{\mathbb{C}}\Big)\Big) B && (\because \text{準備の冪の像})\\
&= \Big(c \Big(\frac{1}{n!}\, x^n\Big)_{\mathbb{C}}\Big) B && (\because \text{主張 1.29})\\
&= \big(c\, (b_n)_{\mathbb{C}}\big) B && (\because \text{準備の } n \text{ 奇数の } b_n = x^n/n!)\\
&= O + \big(c\, (b_n)_{\mathbb{C}}\big) B && (\because \text{主張 2.9})\\
&= 0_{\mathbb{C}}\, A + \big(c\, (b_n)_{\mathbb{C}}\big) B && (\because \text{主張 2.13})\\
&= (0)_{\mathbb{C}}\, A + \big(c\, (b_n)_{\mathbb{C}}\big) B && (\because \text{定義 1.13 の略記 } 0_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0))\\
&= (a_n)_{\mathbb{C}}\, A + \big(c\, (b_n)_{\mathbb{C}}\big) B && (\because \text{準備の } n \text{ 奇数の } a_n = 0)
\end{aligned}
$$

である。中間目標: 部分和。$S_N = (\alpha_N)_{\mathbb{C}}\, A + \big(c\, (\beta_N)_{\mathbb{C}}\big) B$ である。$p, q \in \{1, \ldots, d\}$ について

$$
\begin{aligned}
(S_N)_{pq} &= \sum_{n=0}^{N} \Big(\Big(\frac{1}{n!} \Big)_{\mathbb{C}} T_n \Big)_{pq} && (\because \text{主張 2.7}) \\
&= \sum_{n=0}^{N} \Big((a_n)_{\mathbb{C}} A + \big(c\,(b_n)_{\mathbb{C}} \big) B \Big)_{pq} && (\because \text{各項の中間目標}) \\
&= \sum_{n=0}^{N} \Big(\big((a_n)_{\mathbb{C}} A \big)_{pq} + \Big(\big(c\,(b_n)_{\mathbb{C}} \big) B \Big)_{pq} \Big) && (\because \text{定義 2.4}) \\
&= \sum_{n=0}^{N} \Big((a_n)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \big(c\,(b_n)_{\mathbb{C}} \big) B_{pq} \Big) && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \sum_{n=0}^{N} (a_n)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \sum_{n=0}^{N} \big(c\,(b_n)_{\mathbb{C}} \big) B_{pq} && (\because \text{主張 2.22}) \\
&= \Big(\sum_{n=0}^{N} (a_n)_{\mathbb{C}} \Big) A_{pq} + \Big(c \sum_{n=0}^{N} (b_n)_{\mathbb{C}} \Big) B_{pq} && (\because \mathbb{C} \text{ の有限和の分配則}) \\
&= \Big(\sum_{n=0}^{N} a_n \Big)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \Big(c \Big(\sum_{n=0}^{N} b_n \Big)_{\mathbb{C}} \Big) B_{pq} && (\because \text{主張 1.20 を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= \Big(\frac{1}{2} \Big(\sum_{n=0}^{N} \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{N} \frac{(-x)^n}{n!} \Big) \Big)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \Big(c \Big(\frac{1}{2} \Big(\sum_{n=0}^{N} \frac{x^n}{n!} - \sum_{n=0}^{N} \frac{(-x)^n}{n!} \Big) \Big)_{\mathbb{C}} \Big) B_{pq} && (\because \text{実数の有限和の分配則}) \\
&= (\alpha_N)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \big(c\,(\beta_N)_{\mathbb{C}} \big) B_{pq} && (\because E_N, \alpha_N, \beta_N \text{ の定義}) \\
&= \big((\alpha_N)_{\mathbb{C}} A \big)_{pq} + \Big(\big(c\,(\beta_N)_{\mathbb{C}} \big) B \Big)_{pq} && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \Big((\alpha_N)_{\mathbb{C}} A + \big(c\,(\beta_N)_{\mathbb{C}} \big) B \Big)_{pq} && (\because \text{定義 2.4})
\end{aligned}
$$

であり、行列は成分で定まるので中間目標が成り立つ。中間目標: 差。$S_N - L = (\alpha_N - \cosh x)_{\mathbb{C}} A + \big(c\,(\beta_N - \sinh x)_{\mathbb{C}} \big) B$ である。$p, q \in \{1, \ldots, d\}$ について

$$
\begin{aligned}
(S_N - L)_{pq} &= (S_N)_{pq} - L_{pq} && (\because \text{定義 1.92}) \\
&= \Big((\alpha_N)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \big(c\,(\beta_N)_{\mathbb{C}} \big) B_{pq} \Big) - L_{pq} && (\because \text{部分和の中間目標の成分の鎖}) \\
&= \Big((\alpha_N)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \big(c\,(\beta_N)_{\mathbb{C}} \big) B_{pq} \Big) - \Big((\cosh x)_{\mathbb{C}} A + \big(c\,(\sinh x)_{\mathbb{C}} \big) B \Big)_{pq} && (\because L \text{ の定義}) \\
&= \Big((\alpha_N)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \big(c\,(\beta_N)_{\mathbb{C}} \big) B_{pq} \Big) - \Big(\big((\cosh x)_{\mathbb{C}} A \big)_{pq} + \Big(\big(c\,(\sinh x)_{\mathbb{C}} \big) B \Big)_{pq} \Big) && (\because \text{定義 2.4}) \\
&= \Big((\alpha_N)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \big(c\,(\beta_N)_{\mathbb{C}} \big) B_{pq} \Big) - \Big((\cosh x)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \big(c\,(\sinh x)_{\mathbb{C}} \big) B_{pq} \Big) && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \big((\alpha_N)_{\mathbb{C}} - (\cosh x)_{\mathbb{C}} \big) A_{pq} + \Big(c\,\big((\beta_N)_{\mathbb{C}} - (\sinh x)_{\mathbb{C}} \big) \Big) B_{pq} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= (\alpha_N - \cosh x)_{\mathbb{C}} A_{pq} + \big(c\,(\beta_N - \sinh x)_{\mathbb{C}} \big) B_{pq} && (\because \text{準備の実数の差の像を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= \big((\alpha_N - \cosh x)_{\mathbb{C}} A \big)_{pq} + \Big(\big(c\,(\beta_N - \sinh x)_{\mathbb{C}} \big) B \Big)_{pq} && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \Big((\alpha_N - \cosh x)_{\mathbb{C}} A + \big(c\,(\beta_N - \sinh x)_{\mathbb{C}} \big) B \Big)_{pq} && (\because \text{定義 2.4})
\end{aligned}
$$

であり、行列は成分で定まるので中間目標が成り立つ。中間目標: 実数の評価。$u_N := \big| E_N(x) - \exp(x) \big| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$v_N := \big| E_N(-x) - \exp(-x) \big| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とおく（$\mathbb{R}$ の絶対値。exp は実数の exp（定義 3.11））。

$$
\begin{aligned}
\left|\alpha_N - \cosh x\right| &= \left|\frac{E_N(x) + E_N(-x)}{2} - \cosh x\right| && (\because \alpha_N \text{ の定義}) \\
&= \left|\frac{E_N(x) + E_N(-x)}{2} - \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2}\right| && (\because \text{定義 3.19}) \\
&= \left|\frac{\big(E_N(x) - \exp(x)\big) + \big(E_N(-x) - \exp(-x)\big)}{2}\right| && (\because \text{実数の四則}) \\
&= \frac{\left|\big(E_N(x) - \exp(x)\big) + \big(E_N(-x) - \exp(-x)\big)\right|}{2} && (\because \text{実数の絶対値は正の数で割ることと交換する}) \\
&\leq \frac{u_N + v_N}{2} && (\because \text{実数の絶対値の三角不等式と } |-y| = |y|), \\
\left|\beta_N - \sinh x\right| &= \left|\frac{E_N(x) - E_N(-x)}{2} - \sinh x\right| && (\because \beta_N \text{ の定義}) \\
&= \left|\frac{E_N(x) - E_N(-x)}{2} - \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2}\right| && (\because \text{定義 3.19}) \\
&= \left|\frac{\big(E_N(x) - \exp(x)\big) - \big(E_N(-x) - \exp(-x)\big)}{2}\right| && (\because \text{実数の四則}) \\
&= \frac{\left|\big(E_N(x) - \exp(x)\big) - \big(E_N(-x) - \exp(-x)\big)\right|}{2} && (\because \text{実数の絶対値は正の数で割ることと交換する}) \\
&\leq \frac{u_N + v_N}{2} && (\because \text{実数の絶対値の三角不等式と } |-y| = |y|)
\end{aligned}
$$

である。中間目標: ノルムの評価。$\kappa := \|A\| + |c|\,\|B\| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とおく（定義 2.91、定義 1.74）。

$$
\begin{aligned}
\|S_N - L\| &= \Big\|(\alpha_N - \cosh x)_{\mathbb{C}}\, A + \big(c\,(\beta_N - \sinh x)_{\mathbb{C}}\big) B\Big\| && (\because \text{差の中間目標}) \\
&\leq \big\|(\alpha_N - \cosh x)_{\mathbb{C}}\, A\big\| + \Big\|\big(c\,(\beta_N - \sinh x)_{\mathbb{C}}\big) B\Big\| && (\because \text{主張 2.92 (3)}) \\
&= \left|(\alpha_N - \cosh x)_{\mathbb{C}}\right| \|A\| + \left|c\,(\beta_N - \sinh x)_{\mathbb{C}}\right| \|B\| && (\because \text{主張 2.92 (2) を 2 項へ同時適用}) \\
&= \left|(\alpha_N - \cosh x)_{\mathbb{C}}\right| \|A\| + \Big(|c|\,\big|(\beta_N - \sinh x)_{\mathbb{C}}\big|\Big) \|B\| && (\because \text{主張 1.75 (4)}) \\
&= \left|\alpha_N - \cosh x\right| \|A\| + \Big(|c|\,\left|\beta_N - \sinh x\right|\Big) \|B\| && (\because \text{主張 1.75 (6) を 2 箇所へ同時適用}) \\
&\leq \frac{u_N + v_N}{2} \|A\| + \Big(|c|\,\frac{u_N + v_N}{2}\Big) \|B\| && (\because \text{実数の評価の中間目標と } \|A\| \geq 0,\ |c| \geq 0,\ \|B\| \geq 0) \\
&= \frac{u_N + v_N}{2} \big(\|A\| + |c|\,\|B\|\big) && (\because \text{実数の四則}) \\
&= \frac{u_N + v_N}{2}\, \kappa && (\because \kappa \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

である。主張 3.12 を $K = \mathbb{R}$ で x と $-x$ へ当てると、定義 2.91 の K の列の収束の意味で $u_N \to 0$、$v_N \to 0$ である（$\mathbb{R}$ への脱出: 極限）。$\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ に対し、$N \geq N_1$ で $u_N < \varepsilon/(\kappa+1)$、$N \geq N_2$ で $v_N < \varepsilon/(\kappa+1)$ となる $N_1, N_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を取ると、$N \geq \max(N_1, N_2)$ で

$$
\begin{aligned}
\|S_N - L\| &\leq \frac{u_N + v_N}{2}\, \kappa && (\because \text{ノルムの評価の中間目標}) \\
&\leq \frac{\varepsilon}{\kappa + 1}\, \kappa && (\because \tfrac{u_N + v_N}{2} < \tfrac{\varepsilon}{\kappa+1} \text{ と } \kappa \geq 0) \\
&< \varepsilon && (\because \kappa < \kappa + 1 \text{ と } \varepsilon > 0)
\end{aligned}
$$

である。よって $\|S_N - L\| \to 0$、すなわち 定義 2.91 の意味で $S_N \to L$ であり、級数は収束して

$$
\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} \Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}} T_n &= \lim_{N \to \infty} S_N && (\because \text{定義 2.91 の級数の和。極限は 主張 2.92 (4) により一意}) \\
&= L && (\because S_N \to L) \\
&= (\cosh x)_{\mathbb{C}}\, A + \big(c\,(\sinh x)_{\mathbb{C}}\big) B && (\because L \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 14.26 ($\check{Z},\check{Y}$ についてのテイラー係数の抽出)**.** $\mu\in\check{\mathcal{M}}$(定義 14.15)とし、$R$、$H_1^{(+)},H_2,\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu\in R$、$K_1,K_2^*\in\mathbb{R}$ とその像 $(K_1)_{\mathbb{C}},(K_2^*)_{\mathbb{C}}$、$\tilde{\theta}:=\tilde{\theta}_\mu$ とその像 $(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}$、$i,-i,\frac{i}{2}\in\mathbb{C}$、冪の約束、$n$ 重交換子の記法は 主張 14.24 のものとする。$2K_2^*\in\mathbb{R}$ は実数の積、$(1/n!)_{\mathbb{C}}$ は $1/n!\in\mathbb{R}$ の 定義 1.13 による像、$\cosh,\sinh$ は 定義 3.19、係数と行列の積はスカラー倍(定義 2.3)、級数の和は 定義 2.91 による。このとき次の 4 つの級数は R において収束し、それぞれ次に等しい(ℝ への脱出: 実数の exp の値と、部分和の極限)。

(h1.z)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\underbrace{\Big[\tfrac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)}\big),\dots,\Big[\tfrac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)}\big),\check{Z}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n}=(\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\check{Z}_\mu+\Big(\big(i\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\Big)\check{Y}_\mu$$

(h1.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\underbrace{\Big[\tfrac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)}\big),\dots,\Big[\tfrac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)}\big),\check{Y}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n}=\Big(\big((-i)\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\Big)\check{Z}_\mu+(\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\check{Y}_\mu$$

(h2.z)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\underbrace{\Big[i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2\big),\dots,\Big[i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2\big),\check{Z}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n}=(\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\,\check{Z}_\mu+\big((-i)(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\check{Y}_\mu$$

(h2.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\underbrace{\Big[i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2\big),\dots,\Big[i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2\big),\check{Y}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n}=\big(i\,(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\check{Z}_\mu+(\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\,\check{Y}_\mu$$

証明. $G_1:=\frac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)}\big)$、$G_2:=i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2\big)$、$e_\mp:=\exp\big(\mp i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\in\mathbb{C}$(定義 3.11 の複素数の exp)、$d:=2^{M_{\mathrm{col}}}$ とおき、n 重交換子を $\mathrm{ad}_G^n(W)$ と書く(定義 5.11)。準備: $2K_2^*$ の像は

$$\begin{aligned}2\,(K_2^*)_{\mathbb{C}}&=(2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}\,(K_2^*)_{\mathbb{C}}&&(\because\text{主張 14.24 の }2=2_{\mathbb{C}}:=(2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}})\\&=(2K_2^*)_{\mathbb{C}}&&(\because\text{主張 1.29})\end{aligned}$$

である。(h1.z): $n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ が偶数のとき

$$\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Z}_\mu)=(K_1)_{\mathbb{C}}^{\,n}\,\check{Z}_\mu\quad(\because\text{主張 14.24 (h1.z) の偶数の場合})$$

であり、奇数のとき

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Z}_\mu)&=\big(i\,(K_1)_{\mathbb{C}}^{\,n}\,e_-\big)\check{Y}_\mu&&(\because\text{主張 14.24 (h1.z) の奇数の場合})\\&=\big(i\,\big((K_1)_{\mathbb{C}}^{\,n}\,e_-\big)\big)\check{Y}_\mu&&(\because\text{主張 1.56 の積の結合律})\\&=\big(i\,\big(e_-\,(K_1)_{\mathbb{C}}^{\,n}\big)\big)\check{Y}_\mu&&(\because\text{主張 1.56 の積の可換律})\\&=\big((i\,e_-)\,(K_1)_{\mathbb{C}}^{\,n}\big)\check{Y}_\mu&&(\because\text{主張 1.56 の積の結合律})\end{aligned}$$

である。ゆえに $T_n:=\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Z}_\mu)$ は 主張 14.25 の仮定を d、$x=K_1$、$A=\check{Z}_\mu$、$B=\check{Y}_\mu$、$c=i\,e_-$ で満たし、

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Z}_\mu)=(\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\check{Z}_\mu+\big((i\,e_-)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\big)\check{Y}_\mu\quad(\because\text{主張 14.25})$$

である。(h1.y): 偶数のとき

$$\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Y}_\mu) = (K_1)_{\mathbb{C}}^{\,n}\,\check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 14.24 (h1.y) の偶数の場合})$$

であり、奇数のとき

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Y}_\mu) &= \big((-i)\,(K_1)_{\mathbb{C}}^{\,n}\,e_+\big)\check{Z}_\mu \quad (\because \text{主張 14.24 (h1.y) の奇数の場合}) \\
&= \big((-i)\,\big((K_1)_{\mathbb{C}}^{\,n}\,e_+\big)\big)\check{Z}_\mu \quad (\because \text{主張 1.56 の積の結合律}) \\
&= \big((-i)\,\big(e_+\,(K_1)_{\mathbb{C}}^{\,n}\big)\big)\check{Z}_\mu \quad (\because \text{主張 1.56 の積の可換律}) \\
&= \big(((-i)\,e_+)\,(K_1)_{\mathbb{C}}^{\,n}\big)\check{Z}_\mu \quad (\because \text{主張 1.56 の積の結合律})
\end{aligned}$$

であるから、主張 14.25 を d、$x = K_1$、$A = \check{Y}_\mu$、$B = \check{Z}_\mu$、$c = (-i)\,e_+$ で当てて

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Y}_\mu) &= (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\check{Y}_\mu + \big(((-i)\,e_+)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\big)\check{Z}_\mu \quad (\because \text{主張 14.25}) \\
&= \big(((-i)\,e_+)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\big)\check{Z}_\mu + (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 2.14})
\end{aligned}$$

である。(h2.z): 偶数のとき

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_{G_2}^n(\check{Z}_\mu) &= \big(2\,(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\,\check{Z}_\mu \quad (\because \text{主張 14.24 (h2.z) の偶数の場合}) \\
&= \big((2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\,\check{Z}_\mu \quad (\because \text{準備の } 2\,(K_2^*)_{\mathbb{C}} = (2K_2^*)_{\mathbb{C}})
\end{aligned}$$

であり、奇数のとき

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_{G_2}^n(\check{Z}_\mu) &= \Big((-i)\big(2\,(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\Big)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 14.24 (h2.z) の奇数の場合}) \\
&= \Big((-i)\big((2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\Big)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{準備の } 2\,(K_2^*)_{\mathbb{C}} = (2K_2^*)_{\mathbb{C}})
\end{aligned}$$

であるから、主張 14.25 を d、$x = 2K_2^*$、$A = \check{Z}_\mu$、$B = \check{Y}_\mu$、$c = -i$ で当てて

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\mathrm{ad}_{G_2}^n(\check{Z}_\mu) = (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\,\check{Z}_\mu + \big((-i)(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 14.25})$$

である。(h2.y): 偶数のとき

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_{G_2}^n(\check{Y}_\mu) &= \big(2\,(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\,\check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 14.24 (h2.y) の偶数の場合}) \\
&= \big((2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\,\check{Y}_\mu \quad (\because \text{準備の } 2\,(K_2^*)_{\mathbb{C}} = (2K_2^*)_{\mathbb{C}})
\end{aligned}$$

であり、奇数のとき

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_{G_2}^n(\check{Y}_\mu) &= \Big(i\big(2\,(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\Big)\check{Z}_\mu \quad (\because \text{主張 14.24 (h2.y) の奇数の場合}) \\
&= \Big(i\big((2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)^n\Big)\check{Z}_\mu \quad (\because \text{準備の } 2\,(K_2^*)_{\mathbb{C}} = (2K_2^*)_{\mathbb{C}})
\end{aligned}$$

であるから、主張 14.25 を d、$x = 2K_2^*$、$A = \check{Y}_\mu$、$B = \check{Z}_\mu$、$c = i$ で当てて

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\mathrm{ad}_{G_2}^n(\check{Y}_\mu) &= (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\,\check{Y}_\mu + \big(i\,(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\check{Z}_\mu \quad (\because \text{主張 14.25}) \\
&= \big(i\,(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\check{Z}_\mu + (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\,\check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 2.14})
\end{aligned}$$

である。 □

定義 14.27 (行列の組と数の列の積)**.** $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(d, \mathbb{C})$、$a, b \in \mathbb{C}$ について、行列の組 $\begin{pmatrix} A, & B \end{pmatrix}$ と数の列 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ の積を

$$\begin{pmatrix} A, & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} := aA + bB \ \in \ \mathrm{Mat}(d, \mathbb{C})$$

と定める（aA・bB は 定義 2.3 のスカラー倍、和は 定義 2.4)。

主張 14.28 ($T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}, T_{V_2}$ の$\check{Z}, \check{Y}$ への作用)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用いる。$\mu \in \check{\mathcal{M}}$(定義 14.15)、$\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$、$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu \in R$(定義 14.9・定義 14.10)、$K_1, K_2^* \cdot 2K_2^*$ とそれらの像、$(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}$、$\cosh, \sinh$ は 主張 14.26 のものとする。$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in R^\times$（定義 13.28・主張 14.18）と $V_2 \in R^\times$（主張 14.19）による共役 $T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}, T_{V_2} : R \to R$ は 定義 7.3、行列の組と数の列の積は 定義 14.27 による。このとき

$$T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu) = (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\, \check{Z}_\mu + \Big(\big(i \exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\Big)\check{Y}_\mu = \begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\cosh K_1)_{\mathbb{C}} \\ \big(i \exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}} \end{pmatrix}$$

$$T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu) = \Big(\big((-i) \exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\Big)\check{Z}_\mu + (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\, \check{Y}_\mu = \begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \big((-i) \exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}} \\ (\cosh K_1)_{\mathbb{C}} \end{pmatrix}$$

$$T_{V_2}(\check{Z}_\mu) = (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\, \check{Z}_\mu + \big((-i)(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\check{Y}_\mu = \begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} \\ (-i)(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} \end{pmatrix}$$

$$T_{V_2}(\check{Y}_\mu) = \big(i\,(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\check{Z}_\mu + (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\, \check{Y}_\mu = \begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i\,(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} \\ (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} \end{pmatrix}$$

である。

証明. $S := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$、主張 14.26 の証明と同じく $G_1 := \frac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}\big)$、$G_2 := i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2\big)$、$n$ 重交換子を $\mathrm{ad}_G^n(W)$（定義 5.11）と書き、主張 14.18 の証明と同じく $X := \big(\frac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}}\big) H_1^{(+)} \in R$ と置く（定義 13.28 が $\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$ と書いて掛けている K_1 は 定義 1.13 の像 $(K_1)_{\mathbb{C}}$ である)。a・a^{-1}・Y は 主張 14.19 の主張のものとする（主張 13.25 が $\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$ と書いて掛けている K_2^* と係数 $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ は、それぞれ $(K_2^*)_{\mathbb{C}}$ と $a_{\mathbb{C}}$ である)。級数の係数 $1/n! \in \mathbb{R}$ は 定義 2.3 のスカラー倍として掛けるので、定義 1.13 による像を $(1/n!)_{\mathbb{C}}$ と書く。準備: 指数の肩は

$$\begin{aligned} X &= \big(\tfrac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}}\big) H_1^{(+)} && (\because\ X \text{ の置き方}) \\ &= \tfrac{i}{2}\big((K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}\big) && \big(\because\ \text{主張 2.41 } (a \to \tfrac{i}{2},\ b \to (K_1)_{\mathbb{C}},\ A \to H_1^{(+)})\big) \\ &= G_1 && (\because\ G_1 \text{ の置き方}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y &= \big(i(K_2^*)_{\mathbb{C}}\big) H_2 && \big(\because\ \text{主張 14.19 の } Y\big) \\ &= i\big((K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2\big) && \big(\because\ \text{主張 2.41 } (a \to i,\ b \to (K_2^*)_{\mathbb{C}},\ A \to H_2)\big) \\ &= G_2 && (\because\ G_2 \text{ の置き方}) \end{aligned}$$

である。$T_S(\check{Z}_\mu)$・$T_S(\check{Y}_\mu)$ は

$$
\begin{aligned}
T_S(\check{Z}_\mu) &= (S\check{Z}_\mu)S^{-1} && (\because \text{定義 7.3 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ g \to S,\ h \to \check{Z}_\mu)) \\
&= \Big(\exp\Big(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\Big)\,\check{Z}_\mu\Big)\Big(\exp\Big(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\Big)\Big)^{-1} && (\because \text{定義 13.28 を 2 か所へ同時適用}) \\
&= \big(\exp(X)\check{Z}_\mu\big)\big(\exp(X)\big)^{-1} && (\because X \text{ の置き方 } (K_1 \text{ は 定義 1.13 の } (K_1)_{\mathbb{C}})) \\
&= \big(\exp(X)\check{Z}_\mu\big)\exp(-X) && (\because \text{定理 5.13 (3) } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X \to X)) \\
&= \big(\exp(G_1)\check{Z}_\mu\big)\exp(-G_1) && (\because \text{準備の } X = G_1) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\,\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Z}_\mu) && (\because \text{主張 14.4 (同主張の } d,\ X,\ Y \text{ を } 2^{M_{\mathrm{col}}},\ G_1,\ \check{Z}_\mu \text{ に})) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\,\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Z}_\mu) && (\because \text{主張 14.4 が引く 定理 5.13 の実数係数の包含は 定義 1.13}) \\
&= (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\check{Z}_\mu + \Big(\big(i\,\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\Big)\check{Y}_\mu && (\because \text{主張 14.26 (h1.z)}) \\
&= \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(\cosh K_1)_{\mathbb{C}} \\ \big(i\,\exp\big(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 14.27})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
T_S(\check{Y}_\mu) &= (S\check{Y}_\mu)S^{-1} && (\because \text{定義 7.3 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ g \to S,\ h \to \check{Y}_\mu)) \\
&= \Big(\exp\Big(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\Big)\,\check{Y}_\mu\Big)\Big(\exp\Big(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\Big)\Big)^{-1} && (\because \text{定義 13.28 を 2 か所へ同時適用}) \\
&= \big(\exp(X)\check{Y}_\mu\big)\big(\exp(X)\big)^{-1} && (\because X \text{ の置き方 } (K_1 \text{ は 定義 1.13 の } (K_1)_{\mathbb{C}})) \\
&= \big(\exp(X)\check{Y}_\mu\big)\exp(-X) && (\because \text{定理 5.13 (3) } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X \to X)) \\
&= \big(\exp(G_1)\check{Y}_\mu\big)\exp(-G_1) && (\because \text{準備の } X = G_1) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\,\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Y}_\mu) && (\because \text{主張 14.4 (同主張の } d,\ X,\ Y \text{ を } 2^{M_{\mathrm{col}}},\ G_1,\ \check{Y}_\mu \text{ に})) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\,\mathrm{ad}_{G_1}^n(\check{Y}_\mu) && (\because \text{主張 14.4 が引く 定理 5.13 の実数係数の包含は 定義 1.13}) \\
&= \Big(\big((-i)\,\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\Big)\check{Z}_\mu + (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\check{Y}_\mu && (\because \text{主張 14.26 (h1.y)}) \\
&= \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\big((-i)\,\exp\big(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}\big)\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}} \\ (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 14.27})
\end{aligned}
$$

であり、$T_{V_2}(\check{Z}_\mu)$・$T_{V_2}(\check{Y}_\mu)$ は

$$
\begin{aligned}
T_{V_2}(\check{Z}_\mu) &= (V_2\check{Z}_\mu)V_2^{-1} && (\because \text{定義 7.3 } (M\to M_{\mathrm{col}},\ g\to V_2,\ h\to \check{Z}_\mu))\\
&= (V_2\check{Z}_\mu)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because \text{主張 14.19})\\
&= \Big(\Big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(iK_2^*H_2)\Big)\check{Z}_\mu\Big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because \text{主張 13.25})\\
&= \Big(\Big(a_{\mathbb{C}}\exp(iK_2^*H_2)\Big)\check{Z}_\mu\Big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because \text{主張 14.19 の } a \text{ (係数は 定義 1.13 の } a_{\mathbb{C}})\big)\\
&= \Big(\big(a_{\mathbb{C}}\exp(Y)\big)\check{Z}_\mu\Big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because \text{主張 14.19 の } Y \text{ } (K_2^* \text{ は 定義 1.13 の } (K_2^*)_{\mathbb{C}})\big)\\
&= \Big(a_{\mathbb{C}}\big(\exp(Y)\check{Z}_\mu\big)\Big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because \text{主張 2.18 } (a\to a_{\mathbb{C}},\ A\to\exp(Y),\ B\to\check{Z}_\mu))\\
&= a_{\mathbb{C}}\Big(\big(\exp(Y)\check{Z}_\mu\big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big)\Big) && (\because \text{主張 2.18 } (a\to a_{\mathbb{C}},\ A\to\exp(Y)\check{Z}_\mu,\ B\to(a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)))\\
&= a_{\mathbb{C}}\Big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\Big(\big(\exp(Y)\check{Z}_\mu\big)\exp(-Y)\Big)\Big) && (\because \text{主張 2.19 } (a\to(a^{-1})_{\mathbb{C}},\ B\to\exp(-Y)))\\
&= (a_{\mathbb{C}}(a^{-1})_{\mathbb{C}})\Big(\big(\exp(Y)\check{Z}_\mu\big)\exp(-Y)\Big) && (\because \text{主張 2.41 } (a\to a_{\mathbb{C}},\ b\to(a^{-1})_{\mathbb{C}}))\\
&= (aa^{-1})_{\mathbb{C}}\Big(\big(\exp(Y)\check{Z}_\mu\big)\exp(-Y)\Big) && (\because \text{主張 1.29 } (a\to a,\ b\to a^{-1}))\\
&= (1)_{\mathbb{C}}\Big(\big(\exp(Y)\check{Z}_\mu\big)\exp(-Y)\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } aa^{-1}=1)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\Big(\big(\exp(Y)\check{Z}_\mu\big)\exp(-Y)\Big) && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は 定義 1.13 の略記 } r_{\mathbb{C}} \text{ の } r=1)\\
&= \big(\exp(Y)\check{Z}_\mu\big)\exp(-Y) && (\because \text{主張 2.42})\\
&= \big(\exp(G_2)\check{Z}_\mu\big)\exp(-G_2) && (\because \text{準備の } Y=G_2)\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\,\mathrm{ad}_{G_2}^n(\check{Z}_\mu) && (\because \text{主張 14.4 (同主張の } d,\ X,\ Y \text{ を } 2^{M_{\mathrm{col}}},\ G_2,\ \check{Z}_\mu \text{ に})\big)\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\mathrm{ad}_{G_2}^n(\check{Z}_\mu) && (\because \text{主張 14.4 が引く 定理 5.13 の実数係数の包含は 定義 1.13})\\
&= (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\,\check{Z}_\mu + \big((-i)(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\check{Y}_\mu && (\because \text{主張 14.26 (h2.z)})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\begin{pmatrix}(\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\\ (-i)(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 14.27})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
T_{V_2}(\check{Y}_\mu) &= (V_2\check{Y}_\mu)V_2^{-1} && (\because \text{定義 7.3 } (M\to M_{\mathrm{col}},\ g\to V_2,\ h\to \check{Y}_\mu))\\
&= (V_2\check{Y}_\mu)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because \text{主張 14.19})\\
&= \Big(\Big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(iK_2^*H_2)\Big)\check{Y}_\mu\Big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because \text{主張 13.25})\\
&= \Big(\Big(a_{\mathbb{C}}\exp(iK_2^*H_2)\Big)\check{Y}_\mu\Big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because \text{主張 14.19 の } a \text{ (係数は 定義 1.13 の } a_{\mathbb{C}})\big)\\
&= \Big(\big(a_{\mathbb{C}}\exp(Y)\big)\check{Y}_\mu\Big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because \text{主張 14.19 の } Y \text{ } (K_2^* \text{ は 定義 1.13 の } (K_2^*)_{\mathbb{C}})\big)\\
&= \Big(a_{\mathbb{C}}\big(\exp(Y)\check{Y}_\mu\big)\Big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big) && (\because \text{主張 2.18 } (a\to a_{\mathbb{C}},\ A\to\exp(Y),\ B\to\check{Y}_\mu))\\
&= a_{\mathbb{C}}\Big(\big(\exp(Y)\check{Y}_\mu\big)\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)\big)\Big) && (\because \text{主張 2.18 } (a\to a_{\mathbb{C}},\ A\to\exp(Y)\check{Y}_\mu,\ B\to(a^{-1})_{\mathbb{C}}\exp(-Y)))\\
&= a_{\mathbb{C}}\Big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\Big(\big(\exp(Y)\check{Y}_\mu\big)\exp(-Y)\Big)\Big) && (\because \text{主張 2.19 } (a\to(a^{-1})_{\mathbb{C}},\ B\to\exp(-Y)))\\
&= (a_{\mathbb{C}}(a^{-1})_{\mathbb{C}})\Big(\big(\exp(Y)\check{Y}_\mu\big)\exp(-Y)\Big) && (\because \text{主張 2.41 } (a\to a_{\mathbb{C}},\ b\to(a^{-1})_{\mathbb{C}}))\\
&= (aa^{-1})_{\mathbb{C}}\Big(\big(\exp(Y)\check{Y}_\mu\big)\exp(-Y)\Big) && (\because \text{主張 1.29 } (a\to a,\ b\to a^{-1}))\\
&= (1)_{\mathbb{C}}\Big(\big(\exp(Y)\check{Y}_\mu\big)\exp(-Y)\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } aa^{-1}=1)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\Big(\big(\exp(Y)\check{Y}_\mu\big)\exp(-Y)\Big) && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は 定義 1.13 の略記 } r_{\mathbb{C}} \text{ の } r=1)\\
&= \big(\exp(Y)\check{Y}_\mu\big)\exp(-Y) && (\because \text{主張 2.42})\\
&= \big(\exp(G_2)\check{Y}_\mu\big)\exp(-G_2) && (\because \text{準備の } Y=G_2)\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\,\mathrm{ad}_{G_2}^n(\check{Y}_\mu) && (\because \text{主張 14.4 (同主張の } d,\ X,\ Y \text{ を } 2^{M_{\mathrm{col}}},\ G_2,\ \check{Y}_\mu \text{ に})\big)\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\mathrm{ad}_{G_2}^n(\check{Y}_\mu) && (\because \text{主張 14.4 が引く 定理 5.13 の実数係数の包含は 定義 1.13})\\
&= \big(i\,(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\check{Z}_\mu + (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\,\check{Y}_\mu && (\because \text{主張 14.26 (h2.y)})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\begin{pmatrix}i\,(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\\ (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix} && (\because \text{定義 14.27})
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 14.29 ($\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ による共役写像の$\mathbb{C}$ 線型性)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と $R^{\times}$ を用いる。$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）と $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu \in R$（定義 14.9・定義 14.10)、$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in R^{\times}$（定義 13.28・主張 14.18）による共役 $T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} : R \to R$（定義 7.3）をとる。任意の $a, b \in \mathbb{C}$ について、

$$T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu\right) = a\, T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu) + b\, T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)$$

証明. 主張 7.4 を、$M := M_{\mathrm{col}}$、$g := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in R^{\times}$（主張 14.18)、$X := \check{Z}_\mu \in R$、$W := \check{Y}_\mu \in R$ と、主張の $a, b \in \mathbb{C}$ に当てる。

$$T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu\right) = a\, T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu) + b\, T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu) \quad \left(\because \text{ 主張 7.4}\right).$$

□

主張 14.30 (V_2 による共役写像の$\mathbb{C}$ 線型性)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と $R^{\times}$ を用いる。$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）と $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu \in R$（定義 14.9・定義 14.10)、$V_2 \in R^{\times}$（定義 13.15・主張 14.19）による共役 $T_{V_2} : R \to R$（定義 7.3）をとる。任意の $a, b \in \mathbb{C}$ について、

$$T_{V_2}\left(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu\right) = a\, T_{V_2}(\check{Z}_\mu) + b\, T_{V_2}(\check{Y}_\mu)$$

証明. 主張 7.4 を、$M := M_{\mathrm{col}}$、$g := V_2 \in R^{\times}$（主張 14.19)、$X := \check{Z}_\mu \in R$、$W := \check{Y}_\mu \in R$ と、主張の $a, b \in \mathbb{C}$ に当てる。

$$T_{V_2}\left(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu\right) = a\, T_{V_2}(\check{Z}_\mu) + b\, T_{V_2}(\check{Y}_\mu) \quad \left(\because \text{ 主張 7.4}\right).$$

□

定義 14.31 ($B_1(\theta), B_2$ の定義)**.** $\theta \in \mathbb{R}$ とその 定義 1.13 による像 $(\theta)_{\mathbb{C}}$、$K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$(定義 13.15)、実数の積 $2K_2^* \in \mathbb{R}$、$\cosh, \sinh$(定義 3.19)の値の像 $(\cosh K_1)_{\mathbb{C}}, (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}, (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}, (\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}$、数の $\exp$（定義 3.11）を用いて

$$B_1(\theta) := \begin{pmatrix} (\cosh K_1)_{\mathbb{C}} & \left((-i)\, \exp\left(i(\theta)_{\mathbb{C}}\right)\right)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}} \\ \left(i\, \exp\left(-i(\theta)_{\mathbb{C}}\right)\right)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}} & (\cosh K_1)_{\mathbb{C}} \end{pmatrix}, \qquad B_2 := \begin{pmatrix} (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} & i\,(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} \\ (-i)(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} & (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} \end{pmatrix}$$

と定める（いずれも $\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の元)。

定義 14.32 (行列の組と2×2 行列の積)**.** $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(d, \mathbb{C})$、$p, q, r, s \in \mathbb{C}$ について、行列の組 $\begin{pmatrix} A, & B \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の積を、定義 14.27 の積を列ごとに並べた組

$$\begin{pmatrix} A, & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} := \left(\begin{pmatrix} A, & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ r \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A, & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ s \end{pmatrix} \right) \in \mathrm{Mat}(d, \mathbb{C}) \times \mathrm{Mat}(d, \mathbb{C})$$

と定める。

主張 14.33 ($T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}, T_{V_2}$ の$(\check{Z}, \check{Y})$ への直積作用)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（定義 7.2 の M を M_{col} に取ったもの)、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15)、$\tilde{\theta} = \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ とその像 $(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}$、$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu \in R$、共役 $T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}, T_{V_2} : R \to R$、その主張の係数に現れる K_1, K_2^* の値の像は 主張 14.28 のもの

とする。$B_1(\tilde{\theta}), B_2 \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ は 定義 14.31 の θ を $\tilde{\theta}$ に取ったもの、行列の組と 2×2 行列の積は 定義 14.32 の d を $2^{M_{\mathrm{col}}}$ に取ったものとする。このとき

$$\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\quad \check{Y}_\mu\right) B_1(\tilde{\theta})$$

$$\left(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\quad \check{Y}_\mu\right) B_2$$

である（いずれも $R\times R$ の元の等式）。

証明.

$$\begin{aligned}
&\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right)\\
&= \left((\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu)\begin{pmatrix}(\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\\ (i\exp(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}))(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix},\ (\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu)\begin{pmatrix}((-i)\exp(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}))(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\\ (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{主張 14.28 の} T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu)\cdot T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu) \text{ の式を 2 成分へ同時適用})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu)\begin{pmatrix}(\cosh K_1)_{\mathbb{C}} & ((-i)\exp(i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}))(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\\ (i\exp(-i(\tilde{\theta})_{\mathbb{C}}))(\sinh K_1)_{\mathbb{C}} & (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 14.32})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu)\, B_1(\tilde{\theta}) \quad (\because \text{定義 14.31})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\left(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\right)\\
&= \left((\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu)\begin{pmatrix}(\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\\ (-i)(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix},\ (\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu)\begin{pmatrix}i\,(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\\ (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{主張 14.28 の} T_{V_2}(\check{Z}_\mu)\cdot T_{V_2}(\check{Y}_\mu) \text{ の式を 2 成分へ同時適用})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu)\begin{pmatrix}(\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} & i\,(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\\ (-i)(\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} & (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}}\end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 14.32})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu)\, B_2 \quad (\because \text{定義 14.31})
\end{aligned}$$

□

主張 14.34 （$A(\theta) = B_1(\theta)B_2B_1(\theta)(\theta\in\mathbb{R}$ 一般）**.** $\theta\in\mathbb{R}$ について、定義 14.31 の $B_1(\theta), B_2$ と 定義 14.6 の $A(\theta)$ の間に

$$B_1(\theta)\, B_2\, B_1(\theta) = A(\theta)$$

が成り立つ。とくに $\theta = \tilde{\theta}_\mu$（$\mu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 14.15））とすれば $B_1(\tilde{\theta}_\mu)B_2B_1(\tilde{\theta}_\mu) = A(\tilde{\theta}_\mu)$ である。

証明. 記号を次のように置く。$c_1, s_1, c_2, c_2^*, s_2^*\in\mathbb{R}$ は 定義 12.26、$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記、exp は 定義 3.11 の数の exp（$K=\mathbb{C}$）である。

$$a := (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\in\mathbb{C},\quad b := (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\in\mathbb{C},\quad C := (\cosh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} = (c_2^*)_{\mathbb{C}}\in\mathbb{C},\quad S := (\sinh 2K_2^*)_{\mathbb{C}} = (s_2^*)_{\mathbb{C}}\in\mathbb{C},$$
$$e_+ := \exp\bigl(i(\theta)_{\mathbb{C}}\bigr)\in\mathbb{C},\quad e_- := \exp\bigl((-i)(\theta)_{\mathbb{C}}\bigr)\in\mathbb{C}$$

この記号で 定義 14.31 は $B_1(\theta) = \begin{pmatrix}a & \bigl((-i)e_+\bigr)b\\ (ie_-)b & a\end{pmatrix}$、$B_2 = \begin{pmatrix}C & iS\\ (-i)S & C\end{pmatrix}$ である（定義 14.31 の $\exp\bigl(-i(\theta)_{\mathbb{C}}\bigr)$ の指数 $-i(\theta)_{\mathbb{C}}$ は、定義 1.14 の $-i = (-1_{\mathbb{C}})\,i$ を係数とする積 $(-i)(\theta)_{\mathbb{C}}$ である）。$A(\theta)$（定義 14.6）の成分に現れる実数 $c_1, s_1, c_2, c_2^*, s_2^*, \cos\theta, \sin\theta$ は、定義 1.13 による像として $\mathbb{C}$ の演算にかける。$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh, sinh の値が実数の exp の値（部分和の極限）であり、θ が実数の運動量だからである。

準備として、次の七本の等式を置く。

$$\begin{aligned}
a^2+b^2 &= (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}(\cosh K_1)_{\mathbb{C}} + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}(\sinh K_1)_{\mathbb{C}} && (\because\ a,b \text{ の定義と二乗の記法})\\
&= \bigl(\cosh K_1\cosh K_1\bigr)_{\mathbb{C}} + \bigl(\sinh K_1\sinh K_1\bigr)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29 を 2 箇所へ})\\
&= \bigl(\cosh K_1\cosh K_1 + \sinh K_1\sinh K_1\bigr)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.20 } (m=2))\\
&= \bigl(\cosh(K_1+K_1)\bigr)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 11.4 の複号 } + \text{ を} x=y=K_1 \text{ で})\\
&= \bigl(\cosh 2K_1\bigr)_{\mathbb{C}} && (\because\ K_1+K_1 = 2K_1)\\
&= (c_1)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定義 12.26})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
2ab &= \big((2)_{\mathbb{C}}(\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\big)(\sinh K_1)_{\mathbb{C}} && (\because\ a,b \text{ の定義と } 2=(2)_{\mathbb{C}} \text{ (定義 1.13)})\\
&= \big(2\cosh K_1\big)_{\mathbb{C}}(\sinh K_1)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29})\\
&= \big(2\cosh K_1 \sinh K_1\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29})\\
&= \big(2\sinh K_1 \cosh K_1\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の積の交換律})\\
&= \Big(2\sinh\big(\tfrac{2K_1}{2}\big)\cosh\big(\tfrac{2K_1}{2}\big)\Big)_{\mathbb{C}} && (\because\ K_1=\tfrac{2K_1}{2})\\
&= \big(\sinh 2K_1\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 11.7 を} x=2K_1 \text{ で})\\
&= (s_1)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定義 12.26})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
a^2-b^2 &= (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}(\cosh K_1)_{\mathbb{C}} - (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}(\sinh K_1)_{\mathbb{C}} && (\because\ a,b \text{ の定義と二乗の記法})\\
&= \big(\cosh K_1\cosh K_1\big)_{\mathbb{C}} - \big(\sinh K_1\sinh K_1\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29 を 2 箇所へ})\\
&= \big(\cosh K_1\cosh K_1\big)_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{C}})\big(\sinh K_1\sinh K_1\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定義 1.15, 定義 1.14})\\
&= \big(\cosh K_1\cosh K_1\big)_{\mathbb{C}} + (-1)_{\mathbb{C}}\big(\sinh K_1\sinh K_1\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ -1_{\mathbb{C}}=(-1)_{\mathbb{C}} \text{ (定義 1.13 の略記)})\\
&= \big(\cosh K_1\cosh K_1\big)_{\mathbb{C}} + \big((-1)\sinh K_1\sinh K_1\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29})\\
&= \big(\cosh K_1\cosh K_1 + (-1)\sinh K_1\sinh K_1\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.20 } (m=2))\\
&= \big((\cosh K_1)^2-(\sinh K_1)^2\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の差と二乗の記法})\\
&= (1)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 3.21 (2)})\\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定義 1.13 の略記})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
e_+e_- &= \exp\big(i(\theta)_{\mathbb{C}} + (-i)(\theta)_{\mathbb{C}}\big) && (\because\ e_\pm \text{ の定義と 主張 3.13 } (K=\mathbb{C}))\\
&= \exp(0_{\mathbb{C}}) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と } i+(-i)=0_{\mathbb{C}})\\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 3.14 } (K=\mathbb{C}))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
e_+ + e_- &= (2)_{\mathbb{C}}\,\frac{e_+ + e_-}{(2)_{\mathbb{C}}} && (\because\ (2)_{\mathbb{C}}\neq 0_{\mathbb{C}} \text{ と } \mathbb{C} \text{ の四則})\\
&= (2)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定理 1.88 の第 1 式})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
e_+ &= \frac{e_+ + e_-}{(2)_{\mathbb{C}}} + i\,\frac{e_+ - e_-}{(2)_{\mathbb{C}}\,i} && (\because\ (2)_{\mathbb{C}}\neq 0_{\mathbb{C}},\ (2)_{\mathbb{C}}\,i\neq 0_{\mathbb{C}} \text{ と } \mathbb{C} \text{ の四則})\\
&= (\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i(\sin\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定理 1.88 の第 1 式と第 2 式})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
e_- &= \frac{e_+ + e_-}{(2)_{\mathbb{C}}} - i\,\frac{e_+ - e_-}{(2)_{\mathbb{C}}\,i} && (\because\ (2)_{\mathbb{C}}\neq 0_{\mathbb{C}},\ (2)_{\mathbb{C}}\,i\neq 0_{\mathbb{C}} \text{ と } \mathbb{C} \text{ の四則})\\
&= (\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定理 1.88 の第 1 式と第 2 式})
\end{aligned}
$$

さらに、これらから次の二本の補助的な等式を置く。

$$
\begin{aligned}
a^2+b^2e_+e_+ &= a^2(e_+e_-)+b^2e_+e_+ && (\because\ e_+e_-=1_{\mathbb{C}})\\
&= e_+\left(a^2e_- + b^2e_+\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律})\\
&= e_+\Big(a^2\big((\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big) + b^2e_+\Big) && (\because\ e_- \text{ の上の表示})\\
&= e_+\Big(a^2\big((\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big) + b^2\big((\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big)\Big) && (\because\ e_+ \text{ の上の表示})\\
&= e_+\Big(\left(a^2+b^2\right)(\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i\left(a^2-b^2\right)(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則})\\
&= e_+\Big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i\left(a^2-b^2\right)(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because\ a^2+b^2=(c_1)_{\mathbb{C}})\\
&= e_+\Big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because\ a^2-b^2=1_{\mathbb{C}})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
a^2 + b^2 e_- e_- &= a^2(e_+e_-) + b^2 e_- e_- && (\because\ e_+e_- = 1_{\mathbb{C}}) \\
&= e_- \left(a^2 e_+ + b^2 e_-\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律}) \\
&= e_- \Big(a^2 \big((\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big) + b^2 e_-\Big) && (\because\ e_+ \text{ の上の表示}) \\
&= e_- \Big(a^2 \big((\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big) + b^2 \big((\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big)\Big) && (\because\ e_- \text{ の上の表示}) \\
&= e_- \Big(\left(a^2 + b^2\right)(\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i\left(a^2 - b^2\right)(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則}) \\
&= e_- \Big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i\left(a^2 - b^2\right)(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because\ a^2 + b^2 = (c_1)_{\mathbb{C}}) \\
&= e_- \Big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because\ a^2 - b^2 = 1_{\mathbb{C}})
\end{aligned}
$$

また 主張 14.5 の $c_2^* = s_2^* c_2$ から

$$
\begin{aligned}
C &= (c_2^*)_{\mathbb{C}} && (\because\ C \text{ の定義}) \\
&= (s_2^* c_2)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 14.5}) \\
&= S\,(c_2)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29},\ S \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

Step 1: $N := B_2\, B_1(\theta) \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の成分（行列の積は 定義 1.6)。

$$
\begin{aligned}
N_{11} &= Ca + (iS)\big((ie_-)b\big) && (\because\ \text{定義 1.6}) \\
&= Ca - Sbe_- && (\because\ ii = -1_{\mathbb{C}} \text{ と } \mathbb{C} \text{ の積の交換律・結合律})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
N_{12} &= C\big(((-i)e_+)b\big) + (iS)a && (\because\ \text{定義 1.6}) \\
&= i\,(Sa - Cbe_+) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
N_{21} &= \big((-i)S\big)a + C\big((ie_-)b\big) && (\because\ \text{定義 1.6}) \\
&= i\,(Cbe_- - Sa) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
N_{22} &= \big((-i)S\big)\big(((-i)e_+)b\big) + Ca && (\because\ \text{定義 1.6}) \\
&= Ca - Sbe_+ && (\because\ (-i)(-i) = -1_{\mathbb{C}} \text{ と } \mathbb{C} \text{ の積の交換律・結合律})
\end{aligned}
$$

Step 2: $P := B_1(\theta)\, N \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の (1,1) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{11} &= aN_{11} + \big(((-i)e_+)b\big)N_{21} && (\because\ \text{定義 1.6}) \\
&= a\,(Ca - Sbe_-) + \big(((-i)e_+)b\big)\,i\,(Cbe_- - Sa) && (\because\ \text{Step 1 の} N_{11}, N_{21}) \\
&= a\,(Ca - Sbe_-) + e_+ b\,(Cbe_- - Sa) && (\because\ (-i)i = 1_{\mathbb{C}} \text{ と } \mathbb{C} \text{ の積の交換律・結合律}) \\
&= Ca^2 - Sabe_- + Cb^2 e_+ e_- - Sabe_+ && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律}) \\
&= Ca^2 - Sabe_- + Cb^2 - Sabe_+ && (\because\ e_+e_- = 1_{\mathbb{C}}) \\
&= C\left(a^2 + b^2\right) - Sab\,(e_+ + e_-) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則}) \\
&= C(c_1)_{\mathbb{C}} - Sab\,(e_+ + e_-) && (\because\ a^2 + b^2 = (c_1)_{\mathbb{C}}) \\
&= C(c_1)_{\mathbb{C}} - Sab\,(2)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ e_+ + e_- = (2)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}}) \\
&= C(c_1)_{\mathbb{C}} - S\,(2ab)\,(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の交換律・結合律}) \\
&= C(c_1)_{\mathbb{C}} - S\,(s_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ 2ab = (s_1)_{\mathbb{C}}) \\
&= (c_2^*)_{\mathbb{C}}(c_1)_{\mathbb{C}} - (s_2^*)_{\mathbb{C}}(s_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ C, S \text{ の定義を 2 箇所へ}) \\
&= (c_1)_{\mathbb{C}}(c_2^*)_{\mathbb{C}} - (s_1)_{\mathbb{C}}(s_2^*)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の交換律})
\end{aligned}
$$

これは 定義 14.6 の $A(\theta)$ の (1,1) 成分である。

Step 3: P の (2,2) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{22} &= \big((ie_-)b\big)N_{12} + aN_{22} && (\because \text{ 定義 1.6})\\
&= \big((ie_-)b\big)\, i\,(Sa - Cbe_+) + a\,(Ca - Sbe_+) && (\because \text{ Step 1 の} N_{12}, N_{22})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\, e_- b\,(Sa - Cbe_+) + a\,(Ca - Sbe_+) && (\because\ ii = -1_{\mathbb{C}} \text{ と } \mathbb{C} \text{ の積の交換律・結合律})\\
&= -Sabe_- + Cb^2 e_+ e_- + Ca^2 - Sabe_+ && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律})\\
&= -Sabe_- + Cb^2 + Ca^2 - Sabe_+ && (\because\ e_+ e_- = 1_{\mathbb{C}})\\
&= C\left(a^2 + b^2\right) - Sab\,(e_+ + e_-) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と和の交換律})\\
&= C(c_1)_{\mathbb{C}} - Sab\,(e_+ + e_-) && (\because\ a^2 + b^2 = (c_1)_{\mathbb{C}})\\
&= C(c_1)_{\mathbb{C}} - Sab\,(2)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ e_+ + e_- = (2)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}})\\
&= C(c_1)_{\mathbb{C}} - S\,(2ab)\,(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の交換律・結合律})\\
&= C(c_1)_{\mathbb{C}} - S\,(s_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ 2ab = (s_1)_{\mathbb{C}})\\
&= (c_2^*)_{\mathbb{C}}(c_1)_{\mathbb{C}} - (s_2^*)_{\mathbb{C}}(s_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ C, S \text{ の定義を 2 箇所へ})\\
&= (c_1)_{\mathbb{C}}(c_2^*)_{\mathbb{C}} - (s_1)_{\mathbb{C}}(s_2^*)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の交換律})
\end{aligned}
$$

これは $A(\theta)$ の (2,2) 成分である。

Step 4: P の (1,2) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{12} &= aN_{12} + \big(((-i)e_+)b\big)N_{22} && (\because \text{ 定義 1.6})\\
&= a\,i\,(Sa - Cbe_+) + \big(((-i)e_+)b\big)\,(Ca - Sbe_+) && (\because \text{ Step 1 の} N_{12}, N_{22})\\
&= i\left(Sa^2 - Cabe_+\right) + i\left(-Cabe_+ + Sb^2 e_+ e_+\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律})\\
&= i\left(S\left(a^2 + b^2 e_+ e_+\right) - (2ab)\,Ce_+\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律})\\
&= i\Big(Se_+\big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big) - (2ab)\,Ce_+\Big) && (\because \text{ 準備の補助的な等式の 1 本目})\\
&= i\Big(Se_+\big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big) - (s_1)_{\mathbb{C}}\,Ce_+\Big) && (\because\ 2ab = (s_1)_{\mathbb{C}})\\
&= i\Big(Se_+\big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big) - (s_1)_{\mathbb{C}}\,S(c_2)_{\mathbb{C}}e_+\Big) && (\because\ C = S(c_2)_{\mathbb{C}})\\
&= ie_+S\big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}} - (s_1)_{\mathbb{C}}(c_2)_{\mathbb{C}}\big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律})\\
&= ie_+(s_2^*)_{\mathbb{C}}\big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i(\sin\theta)_{\mathbb{C}} - (s_1)_{\mathbb{C}}(c_2)_{\mathbb{C}}\big) && (\because\ S \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

これは 定義 14.6 の $A(\theta)$ の (1,2) 成分である。

Step 5: P の (2,1) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{21} &= \big((ie_-)b\big)N_{11} + aN_{21} && (\because \text{ 定義 1.6})\\
&= \big((ie_-)b\big)\,(Ca - Sbe_-) + a\,i\,(Cbe_- - Sa) && (\because \text{ Step 1 の} N_{11}, N_{21})\\
&= i\left(Cabe_- - Sb^2 e_- e_-\right) + i\left(Cabe_- - Sa^2\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律})\\
&= (-i)\left(S\left(a^2 + b^2 e_- e_-\right) - (2ab)\,Ce_-\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律})\\
&= (-i)\Big(Se_-\big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big) - (2ab)\,Ce_-\Big) && (\because \text{ 準備の補助的な等式の 2 本目})\\
&= (-i)\Big(Se_-\big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big) - (s_1)_{\mathbb{C}}\,Ce_-\Big) && (\because\ 2ab = (s_1)_{\mathbb{C}})\\
&= (-i)\Big(Se_-\big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i(\sin\theta)_{\mathbb{C}}\big) - (s_1)_{\mathbb{C}}\,S(c_2)_{\mathbb{C}}e_-\Big) && (\because\ C = S(c_2)_{\mathbb{C}})\\
&= (-i)e_-S\big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i(\sin\theta)_{\mathbb{C}} - (s_1)_{\mathbb{C}}(c_2)_{\mathbb{C}}\big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と積の交換律・結合律})\\
&= (-i)e_-(s_2^*)_{\mathbb{C}}\big((c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} + i(\sin\theta)_{\mathbb{C}} - (s_1)_{\mathbb{C}}(c_2)_{\mathbb{C}}\big) && (\because\ S \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

これは 定義 14.6 の $A(\theta)$ の (2,1) 成分である。

Step 6: 主張の左辺は 主張 2.15 により括弧の付け方によらず $B_1(\theta)\big(B_2B_1(\theta)\big) = P$ に等しい。Step 2〜5 で P の 4 成分が $A(\theta)$ の対応する成分に等しいので、$B_1(\theta)B_2B_1(\theta) = A(\theta)$ である。主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ を θ に取れば後半を得る。 □

主張 14.35 ($T_{(V^{(+)})}$ の$\check{Z},\check{Y}$ への作用)**.** $\mu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について、

$$\Big(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\Big)=\big(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\big)\,A\Big(\tilde{\theta}_\mu\Big),\qquad \tilde{\theta}_\mu=\frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}$$

が成り立つ（$T_{(V^{(+)})}$ は 定義 14.20、$A(\theta)$ は 定義 14.6）。

証明. 以下 $\tilde{\theta}:=\tilde{\theta}_\mu$ と略記し、定義 14.31 の $B_1(\tilde{\theta}),B_2$ を用いる。

(z) $T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu)$ について、定義 14.20 の定義、主張 14.28、主張 14.30、主張 14.29、主張 14.33 を順に用いる。

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu)&=T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu)\right)\right)\quad(\because\text{定義 14.20})\\
&=T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\Big(T_{V_2}\Big(\cosh(K_1)\check{Z}_\mu+i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Y}_\mu\Big)\Big)\quad(\because\text{主張 14.28})\\
&=T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\big(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\big)\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\end{pmatrix}\right)\quad(\because\text{主張 14.30})\\
&=T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,B_2\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\end{pmatrix}\right)\quad(\because\text{主張 14.33})\\
&=\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right)B_2\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\end{pmatrix}\quad(\because\text{主張 14.29})\\
&=\big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,B_1(\tilde{\theta})\,B_2\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\end{pmatrix}\quad(\because\text{主張 14.33})
\end{aligned}$$

(3 行目・5 行目の線型性は、B_2 や列ベクトルの成分がスカラーであり、$\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu$ の $\mathbb{C}$ 線型結合に T を掛ける形になっていることによる。)

(y) $T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)$ についても同様に、

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)&=T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right)\right)\quad(\because\text{定義 14.20})\\
&=T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\Big(T_{V_2}\Big(-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Z}_\mu+\cosh(K_1)\check{Y}_\mu\Big)\Big)\quad(\because\text{主張 14.28})\\
&=T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\big(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\big)\begin{pmatrix}-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}\right)\quad(\because\text{主張 14.30})\\
&=T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,B_2\begin{pmatrix}-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}\right)\quad(\because\text{主張 14.33})\\
&=\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right)B_2\begin{pmatrix}-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}\quad(\because\text{主張 14.29})\\
&=\big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,B_1(\tilde{\theta})\,B_2\begin{pmatrix}-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}\quad(\because\text{主張 14.33})
\end{aligned}$$

(z) と (y) で得た 2 つの列ベクトルは、定義 14.31 より $B_1(\tilde{\theta})$ の第 1 列・第 2 列そのものである。2 列を並べ、主張 14.34 を $\theta=\tilde{\theta}_\mu\in\mathbb{R}$ として適用すると、主張の左辺から一続きに

$$\begin{aligned}
\Big(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\Big)&=\big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,B_1(\tilde{\theta})\,B_2\,B_1(\tilde{\theta})\quad(\because\text{(z), (y) の鎖と定義 14.31})\\
&=\big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,A(\tilde{\theta}_\mu)\quad(\because\text{主張 14.34})
\end{aligned}$$

□

主張 14.36 ($V^{(+)}$ による$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の共役の、2×2 行列$A(\tilde{\theta}_\mu)$ による表示)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）とする。定義 13.29 の $V^{(+)}$（主張 14.21 により 定義 7.2 の $R^\times$ の元。$R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$)、定義 14.20 の $T_{(V^{(+)})}$、主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}$、定義 14.9 の $\check{Z}_\mu$、定義 14.10 の $\check{Y}_\mu$（いずれも R の元)、定義 14.6 の $A(\theta)$、定義 14.31 の $B_1(\theta), B_2$（いずれも $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の元）について、

$$\begin{aligned}\left(V^{(+)}\check{Z}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1},\ V^{(+)}\check{Y}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1}\right) &= \left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right)\\ &= \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) A\left(\tilde{\theta}_\mu\right)\\ &= \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right) B_2\, B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right)\end{aligned}$$

が成り立つ。行ベクトルと 2×2 行列の積は 定義 14.32・定義 14.27 を続けて展開した $\begin{pmatrix}A, & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p & q\\ r & s\end{pmatrix} = (pA + rB,\ qA + sB)$ である。最後の等号の根拠である行列の等式 $A(\theta) = B_1(\theta)B_2B_1(\theta)$ $(\theta \in \mathbb{R})$ は 主張 14.34 である。

証明.

$$\begin{aligned}\left(V^{(+)}\check{Z}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1},\ V^{(+)}\check{Y}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1}\right) &= \left(T_{V^{(+)}}(\check{Z}_\mu),\ T_{V^{(+)}}(\check{Y}_\mu)\right) && (\because \text{ 定義 7.3 を } g = V^{(+)} \text{ として。 } V^{(+)} \in R^\times \text{ は 主張 14.21})\\ &= \left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) && (\because \text{ 主張 14.22})\\ &= \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) A\left(\tilde{\theta}_\mu\right) && (\because \text{ 主張 14.35})\\ &= \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right) B_2\, B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right) && (\because \text{ 主張 14.34 を } \theta = \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R} \text{ として})\end{aligned}$$

□

15 $A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化と$V^{(+)}$ の指数表示

定義 15.1 (逆双曲線余弦)**.** $y \in \mathbb{R}$ が $y \geq 1$ を満たすとき、

$$\mathrm{arccosh}(y) := \log\left(y + \sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) \in \mathbb{R}$$

と定める。$\sqrt{\cdot}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ は 定義 1.4、log は 定義 12.21 である。右辺が定まることは次による。

$$\begin{aligned} y \geq 1 &\Longrightarrow y^2 - 1 \geq 0 && (\because\ y \geq 1 > 0 \text{ より} y^2 \geq 1)\\ y \geq 1 \ \wedge\ \sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \geq 0 &\Longrightarrow y + \sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \geq 1 > 0 && (\because \text{ 実数の順序と加法})\end{aligned}$$

すなわち平方根の中身は非負であり、log の引数は正である。

主張 15.2 (逆双曲線余弦は非負側の双曲線余弦の逆)**.** $y \in \mathbb{R}$、$y \geq 1$ とする。定義 15.1 の arccosh と 定義 3.19 の cosh について次が成り立つ。

- (1) $\mathrm{arccosh}(y) \geq 0$。
- (2) $\cosh(\mathrm{arccosh}(y)) = y$。
- (3) $t \in \mathbb{R}$ が $t \geq 0$ かつ $\cosh t = y$ を満たすなら $t = \mathrm{arccosh}(y)$。
- (4) $\mathrm{arccosh}(1) = 0$。

証明. 準備。証明の中だけの記号として $r := \sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}$、$u := \operatorname{arccosh}(y) \in \mathbb{R}$ とおく（$y^2-1 \geq 0$ は 定義 15.1 で示した）。（実対数と平方根による $\mathbb{R}$ 脱出）r は 主張 1.3 の存在（$\mathbb{R}$ の完備性）で定まる実数、u と以下の exp・log・cosh・sinh の値は実数の指数関数と実対数（定義 12.21）の値であり、$\mathbb{Q}$ には一般に収まらない（y によっては収まる）。

$$\begin{aligned} & r \geq 0 \ \wedge \ r^2 = y^2 - 1 && (\because \text{ 定義 1.4}) \\ & u = \log(y + r) && (\because \text{ 定義 15.1}) \\ & y + r \geq 1 && (\because \text{ 定義 15.1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log 1 &= \log(\exp(0)) && (\because \text{ 主張 3.14}) \\ &= 0 && (\because \text{ 定義 12.21 の } \log(\exp x) = x) \end{aligned}$$

(1) の証明。$y + r \geq 1$ なので $y + r > 1$ か $y + r = 1$ である。$y + r > 1$ の場合。

$$\begin{aligned} \operatorname{arccosh}(y) &= \log(y + r) && (\because \text{ 定義 15.1}) \\ &> \log 1 && (\because \ y + r > 1 \text{ と主張 12.22}) \\ &= 0 && (\because \text{ 準備の } \log 1 = 0) \end{aligned}$$

$y + r = 1$ の場合。

$$\begin{aligned} \operatorname{arccosh}(y) &= \log(y + r) && (\because \text{ 定義 15.1}) \\ &= \log 1 && (\because \ y + r = 1) \\ &= 0 && (\because \text{ 準備の } \log 1 = 0) \end{aligned}$$

いずれの場合も $\operatorname{arccosh}(y) \geq 0$ である。

(2) の証明。

$$\begin{aligned} \exp(u) &= \exp(\log(y + r)) && (\because \ u = \log(y + r)) \\ &= y + r && (\because \text{ 定義 12.21 の } \exp(\log z) = z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y^2 - r^2 &= y^2 - (y^2 - 1) && (\because \ r^2 = y^2 - 1) \\ &= 1 && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \exp(-u) &= \exp(-u)\,(y^2 - r^2) && (\because \ y^2 - r^2 = 1) \\ &= \exp(-u)\,\big((y + r)(y - r)\big) && (\because \text{ 和と差の積}) \\ &= \exp(-u)\,\big(\exp(u)\,(y - r)\big) && (\because \ \exp(u) = y + r) \\ &= \big(\exp(-u)\exp(u)\big)\,(y - r) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の積の結合律}) \\ &= \exp(-u + u)\,(y - r) && (\because \text{ 主張 3.13}) \\ &= \exp(0)\,(y - r) && (\because \ -u + u = 0) \\ &= 1 \cdot (y - r) && (\because \text{ 主張 3.14}) \\ &= y - r && (\because \ 1 \text{ は}\mathbb{R} \text{ の積の単位元}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cosh(\operatorname{arccosh}(y)) &= \cosh(u) && (\because \ u \text{ の定め方}) \\ &= \frac{\exp(u) + \exp(-u)}{2} && (\because \text{ 定義 3.19}) \\ &= \frac{(y + r) + \exp(-u)}{2} && (\because \ \exp(u) = y + r) \\ &= \frac{(y + r) + (y - r)}{2} && (\because \ \exp(-u) = y - r) \\ &= \frac{2y}{2} && (\because \ \mathbb{R} \text{ の加法}) \\ &= y && (\because \text{ 約分}) \end{aligned}$$

(3) の証明。$t \in \mathbb{R}$、$t \geq 0$、$\cosh t = y$ とする。まず $\sinh t \geq 0$ を示す。$t > 0$ の場合。

$$\sinh t > 0 \quad (\because\ t > 0 \text{ と主張 3.21 (3)})$$

$t = 0$ の場合。

$$\begin{aligned}
\sinh 0 &= \frac{\exp(0) - \exp(-0)}{2} && (\because\ \text{定義 3.19}) \\
&= \frac{\exp(0) - \exp(0)}{2} && (\because\ -0 = 0) \\
&= \frac{1 - 1}{2} && (\because\ \text{主張 3.14}) \\
&= 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

いずれの場合も $\sinh t \geq 0$ である。次に

$$\begin{aligned}
(\sinh t)^2 &= (\cosh t)^2 - 1 && (\because\ \text{主張 3.21 (2) と移項}) \\
&= y^2 - 1 && (\because\ \cosh t = y)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sinh t &= \sqrt{y^2 - 1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \sinh t \geq 0、(\sinh t)^2 = y^2 - 1 \text{ と定義 1.4(主張 1.3 の一意性)}) \\
&= r && (\because\ r \text{ の定め方})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
t &= \log(\exp(t)) && (\because\ \text{定義 12.21 の } \log(\exp x) = x) \\
&= \log(\cosh t + \sinh t) && (\because\ \text{主張 3.21 (1)}) \\
&= \log(y + \sinh t) && (\because\ \cosh t = y) \\
&= \log(y + r) && (\because\ \sinh t = r) \\
&= \operatorname{arccosh}(y) && (\because\ \text{定義 15.1})
\end{aligned}$$

(4) の証明。

$$\begin{aligned}
\operatorname{arccosh}(1) &= \log\left(1 + \sqrt{1^2 - 1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) && (\because\ \text{定義 15.1}) \\
&= \log\left(1 + \sqrt{0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) && (\because\ 1^2 - 1 = 0) \\
&= \log(1 + 0) && (\because\ 0 \geq 0、0^2 = 0 \text{ と定義 1.4(主張 1.3 の一意性)}) \\
&= \log 1 && (\because\ 1 + 0 = 1) \\
&= 0 && (\because\ \text{準備の } \log 1 = 0)
\end{aligned}$$

□

主張 15.3 (Z, Y から和・スカラー倍・積だけで 2^M 次の複素行列がすべて得られる)**.** 定義 13.15（004 章冒頭の記号の定義）で定義された $Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について、集合 $S := \{Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}}\}$ を考える（定義 2.72 の同一視により $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ であり、S の元はいずれも $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の複素行列である)。

$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の部分集合 T が「閉じている」とは、次の 4 条件を満たすことをいう。

- (i) $S \subseteq T$、すなわち $Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}} \in T$。
- (ii) $I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})} \in T$（単位行列を含む)。
- (iii) $A, B \in T$ ならば $A + B \in T$、および $c \in \mathbb{C}$ について $cA \in T$（和とスカラー倍で閉じる)。

- (iv) $A, B \in T$ ならば $AB \in T$（行列の積で閉じる）。

$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ 自身は閉じているからそのような T は少なくとも 1 つ存在し、閉じている部分集合すべての共通部分もまた (i)〜(iv) を満たす（共通部分の元は各 T に属するので、和・スカラー倍・積も各 T に属し、したがって共通部分に属する）。よって、閉じている部分集合のうち最小のものが存在する。それを $\mathcal{A}$ とおく。

このとき $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ である。すなわち、$Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}}$ と単位行列から出発して、和・スカラー倍・行列の積を有限回繰り返すだけで $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の複素行列がすべて得られる。

証明. 以下、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ を標準的な Pauli 行列 $\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$、$\sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$、$\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ とする。$\sigma^x_k, \sigma^y_k, \sigma^z_k$ は 定義 13.15 のとおり、第 k 番目の因子（サイト）のみが対応する Pauli 行列で、他の因子はすべて $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ であるものとする。

Step 1: 単一サイトの Pauli 行列の積公式。

$$
\begin{aligned}
\sigma^x \sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^x \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の成分計算}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \quad (\because \text{単位行列の定義}) \\
\sigma^y \sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^y,\ \sigma^z \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の成分計算}) \\
&= i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{スカラー倍の成分計算}) \\
&= i\, \sigma^x \quad (\because \sigma^x \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

第 2 式から σ^x を書き直す。

$$
\begin{aligned}
\sigma^x &= 1 \cdot \sigma^x \quad (\because 1 \text{ は積の単位元}) \\
&= ((-i)\, i)\, \sigma^x \quad (\because (-i)\, i = 1) \\
&= -i\, (i\, \sigma^x) \quad (\because \text{スカラー倍の結合則}) \\
&= -i\, \sigma^y \sigma^z \quad (\because \text{第 2 式} \sigma^y \sigma^z = i\, \sigma^x)
\end{aligned}
$$

これらをクロネッカー積へ持ち上げる。$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の積は各因子ごとの積であり $(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_{M_{\mathrm{col}}}) = (A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_{M_{\mathrm{col}}} B_{M_{\mathrm{col}}})$（主張 2.73 (1)）。第 k 因子のみが非自明な σ^a_k どうしの積は（$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$）

$$
\begin{aligned}
\sigma^a_k \sigma^b_k &= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I)(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^b}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I) \quad (\because \sigma^a_k,\ \sigma^b_k \text{ の定義の代入}) \\
&= (II) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^a \sigma^b)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^a \sigma^b)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because II = I)
\end{aligned}
$$

これより $\sigma^x_k \sigma^x_k = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}$、$\sigma^x_k = -i\, \sigma^y_k \sigma^z_k$ を得る。また異なるサイト $k \neq l$ の σ^a_k, σ^b_l は可換である（$k < l$ として）。

$$\begin{aligned}
\sigma_k^a\sigma_l^b &= (I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I)(I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^b}^{l\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I) \quad (\because \sigma_k^a,\ \sigma_l^b \text{ の定義の代入})\\
&= I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^b}^{l\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})\\
&= (I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^b}^{l\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I)(I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})\\
&= \sigma_l^b\sigma_k^a \quad (\because \sigma_l^b, \sigma_k^a \text{ の定義（第}l\text{ 因子・第}k\text{ 因子のみが非自明）})
\end{aligned}$$

Step 2: $\mathcal{A}$ が各 $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z$ を含むこと。各 m について「$\sigma_1^x, \ldots, \sigma_{m-1}^x \in \mathcal{A}$」を仮定とする m に関する帰納法で示す。$m=1$ のとき $\sigma_1^z = Z_1 \in \mathcal{A}$、$\sigma_1^y = Y_1 \in \mathcal{A}$ である。

$$\begin{aligned}
\sigma_1^x &= -i\,\sigma_1^y\sigma_1^z \quad (\because \text{Step 1 の}\sigma_k^x = -i\,\sigma_k^y\sigma_k^z \text{ を}k=1 \text{ に取る})\\
&= -i\,Y_1Z_1 \quad (\because \sigma_1^y = Y_1,\ \sigma_1^z = Z_1)
\end{aligned}$$

$Y_1, Z_1 \in \mathcal{A}$ かつ $\mathcal{A}$ は積とスカラー倍について閉じるから $\sigma_1^x \in \mathcal{A}$。

$m \geq 2$ とし $\sigma_1^x, \ldots, \sigma_{m-1}^x \in \mathcal{A}$ を仮定する。$P_{m-1} := \sigma_1^x\sigma_2^x\cdots\sigma_{m-1}^x$ とおくと $P_{m-1} \in \mathcal{A}$（$m=1$ では空積 $P_0 := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$）。異サイトの可換性と $\sigma_k^x\sigma_k^x = I$ より

$$\begin{aligned}
P_{m-1}P_{m-1} &= (\sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x)(\sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x) \quad (\because P_{m-1} \text{ の定義})\\
&= (\sigma_1^x\sigma_1^x)(\sigma_2^x\sigma_2^x)\cdots(\sigma_{m-1}^x\sigma_{m-1}^x) \quad (\because \text{異サイトの可換性})\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \quad (\because \sigma_k^x\sigma_k^x = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})})
\end{aligned}$$

ゆえに P_{m-1} は可逆で $P_{m-1}^{-1} = P_{m-1} \in \mathcal{A}$。定義より $Z_m = \sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^z = P_{m-1}\sigma_m^z$ であるから、

$$\begin{aligned}
P_{m-1}Z_m &= P_{m-1}P_{m-1}\sigma_m^z \quad (\because Z_m = P_{m-1}\sigma_m^z)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\sigma_m^z \quad (\because P_{m-1}P_{m-1} = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})})\\
&= \sigma_m^z \quad (\because I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \text{ は積の単位元})
\end{aligned}$$

$P_{m-1}, Z_m \in \mathcal{A}$ かつ $\mathcal{A}$ は積について閉じるから $\sigma_m^z = P_{m-1}Z_m \in \mathcal{A}$。$\sigma_m^y$ についても同じ形の鎖が書ける。定義より $Y_m = \sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^y = P_{m-1}\sigma_m^y$ であるから、

$$\begin{aligned}
P_{m-1}Y_m &= P_{m-1}P_{m-1}\sigma_m^y \quad (\because Y_m = P_{m-1}\sigma_m^y)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\sigma_m^y \quad (\because P_{m-1}P_{m-1} = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})})\\
&= \sigma_m^y \quad (\because I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \text{ は積の単位元})
\end{aligned}$$

$P_{m-1}, Y_m \in \mathcal{A}$ かつ $\mathcal{A}$ は積について閉じるから $\sigma_m^y = P_{m-1}Y_m \in \mathcal{A}$。さらに Step 1 より $\sigma_m^x = -i\,\sigma_m^y\sigma_m^z$ であり、$\mathcal{A}$ は積とスカラー倍について閉じるから $\sigma_m^x \in \mathcal{A}$。よって $\sigma_m^x, \sigma_m^y, \sigma_m^z \in \mathcal{A}$ が示され、帰納法によりすべての $k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z \in \mathcal{A}$。

Step 3: $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$。まず $\mathcal{B} := \{I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$ 上の基底である。実際、任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ に対し

$$A = \frac{a_{11}+a_{22}}{2}I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} + \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\sigma^x + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\sigma^y + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\sigma^z \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つので $\mathcal{B}$ は張り、$\dim_{\mathbb{C}}\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{B}$ より基底である。次に $\mathcal{B}^{\boxtimes M_{\mathrm{col}}} := \{e_1\boxtimes\cdots\boxtimes e_{M_{\mathrm{col}}} : e_1, \ldots, e_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathcal{B}\}$ は $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の基底である（定理 2.88 (2) を基底 $\mathcal{B}$ に適用した）。一方、各 $e_1\boxtimes\cdots\boxtimes e_{M_{\mathrm{col}}}$ について、各 k で $\sigma_k^{a_k} := I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{e_k}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I$ とおくと、Step 1 の異サイト積公式を繰り返して

$$\sigma_1^{a_1}\sigma_2^{a_2}\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^{a_{M_{\mathrm{col}}}} = e_1 \boxtimes e_2 \boxtimes \cdots \boxtimes e_{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

Step 2 より各 $\sigma_k^{a_k} \in \mathcal{A}$（$I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \in \mathcal{A}$ も含む）であり、$\mathcal{A}$ は積について閉じるから $e_1 \boxtimes \cdots \boxtimes e_{M_{\mathrm{col}}} = \sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^{a_{M_{\mathrm{col}}}} \in \mathcal{A}$。よって $\mathcal{B}^{\boxtimes M_{\mathrm{col}}} \subseteq \mathcal{A}$。$\mathcal{A}$ は $\mathbb{C}$-線型結合について閉じ、$\mathcal{B}^{\boxtimes M_{\mathrm{col}}}$ は基底であるから

$$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C}) = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}(\mathcal{B}^{\boxtimes M_{\mathrm{col}}}) \subseteq \mathcal{A} \quad (\because \mathcal{A} \text{ は}\mathbb{C}\text{-線型結合について閉じる})$$

一方 $\mathcal{A} \subseteq \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ は定義より明らかであるから $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$。 □

主張 15.4 ($\tilde{\theta}_\mu$ の共役添字恒等式$\tilde{\theta}_{1-\mu} = -\tilde{\theta}_\mu$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \mathbb{Z}$ とする。主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu$ について、旧複合主張の番号を保った次の恒等式が成り立つ。

$$\text{(3) 共役添字：} \quad \tilde{\theta}_{1-\mu} = -\tilde{\theta}_\mu$$

証明. (3) 共役添字について示す。主張 14.8 より $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ である。主張の左辺から

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{1-\mu} &= \frac{2\pi\left((1-\mu)_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \tilde{\theta} \text{ の定義を} 1-\mu \in \mathbb{Z} \text{ で。主張 14.8}) \\
&= \frac{2\pi\left((\iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}(1) - \mu_{\mathbb{R}}) - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は和と零を保つので差を保つ。主張 14.8}) \\
&= \frac{2\pi\left((1_{\mathbb{R}} - \mu_{\mathbb{R}}) - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は単位元を保つ。主張 14.8}) \\
&= \frac{2\pi\left((1_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}) - \mu_{\mathbb{R}}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律と交換律}) \\
&= \frac{2\pi\left(\frac{1}{2} - \mu_{\mathbb{R}}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ 1_{\mathbb{R}} - \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}) \\
&= \frac{2\pi\left(-\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ で} \tfrac{1}{2} - \mu_{\mathbb{R}} = -\left(\mu_{\mathbb{R}} - \tfrac{1}{2}\right)) \\
&= -\frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の積と} (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}} \text{ を分母とする分数から} -1 \text{ をくくり出す}) \\
&= -\tilde{\theta}_\mu && (\because\ \tilde{\theta}_\mu \text{ の定義。主張 14.8})
\end{aligned}$$

となる。 □

主張 15.5 ($\check{\mathcal{M}}$ の内側で共役添字を取る)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について

- (1) $\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = 2\pi - \tilde{\theta}_\mu$
- (2) $\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})_{\mathbb{C}}) = \exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) \qquad (j \in \mathbb{Z})$
- (3) $\check{Z}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = \check{Z}_{1-\mu}, \qquad \check{Y}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = \check{Y}_{1-\mu}$

が成り立つ。とくに (3) により、主張 15.4 (3) の共役添字 $1-\mu$（これは $\mu \geq 2$ では $\check{\mathcal{M}}$ の外に出る）を、つねに $\check{\mathcal{M}}$ の元である $M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ で置き換えてよい。** 以降つねにそうする。**

ここで $j_{\mathbb{R}}$ は 主張 14.8 の整数の実数への像、$r_{\mathbb{C}}$（$r \in \mathbb{R}$）は 定義 1.13 の像である。(2) の証明は全実数上の $\cos, \sin$ の値 $\cos(2\pi n_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}}$、$\sin(2\pi n_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$（$n \in \mathbb{Z}$）を使う。全実数への拡張は 定理 1.88 の前置きのとおり未整備なので、(2) はその拡張を前提とする。

(2) は 主張 15.4 (3) の $\tilde{\theta}_{1-\mu} = -\tilde{\theta}_\mu$ が果たしていた役割を、$\check{\mathcal{M}}$ の内側で果たす（位相としては $\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ は $-\tilde{\theta}_\mu$ と 2π しか違わない）。

証明. (1) 主張 14.8 より $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ である。主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= \frac{2\pi\left((M_{\mathrm{col}}+1-\mu)_{\mathbb{R}}-\frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \tilde{\theta}\ \text{の定義を}M_{\mathrm{col}}+1-\mu\in\mathbb{Z}\ \text{で。主張 14.8})\\
&= \frac{2\pi\left(((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}+\iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}(1)-\mu_{\mathbb{R}})-\frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}\ \text{は和と零を保つので和と差を保つ。主張 14.8})\\
&= \frac{2\pi\left(((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}+1_{\mathbb{R}}-\mu_{\mathbb{R}})-\frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}\ \text{は単位元を保つ。主張 14.8})\\
&= \frac{2\pi\left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}+\left(1_{\mathbb{R}}-\frac{1}{2}\right)-\mu_{\mathbb{R}}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の加法の結合律と交換律})\\
&= \frac{2\pi\left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}+\frac{1}{2}-\mu_{\mathbb{R}}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ 1_{\mathbb{R}}-\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2})\\
&= \frac{2\pi\left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}+\left(\frac{1}{2}-\mu_{\mathbb{R}}\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の加法の結合律（差は加法の逆元の和）})\\
&= \frac{2\pi\left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}-\left(\mu_{\mathbb{R}}-\frac{1}{2}\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}\tfrac{1}{2}-\mu_{\mathbb{R}}=-\left(\mu_{\mathbb{R}}-\tfrac{1}{2}\right)(-(a-b)=-a+b)\ \text{と、差は加法の逆元の和})\\
&= \frac{2\pi(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}-2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}}-\frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配法則})\\
&= \frac{2\pi(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}-\frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}}-\frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\neq 0_{\mathbb{R}}\ \text{を分母とする分数の差})\\
&= 2\pi-\frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}}-\frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\neq 0_{\mathbb{R}}\ \text{による約分})\\
&= 2\pi-\tilde{\theta}_{\mu} && (\because\ \tilde{\theta}_{\mu}\ \text{の定義。主張 14.8})
\end{aligned}
$$

(2) $j\in\mathbb{Z}$ とする。準備として、指数の中の実数を (1) で書き直す。

$$
\begin{aligned}
j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= j_{\mathbb{R}}\left(2\pi-\tilde{\theta}_{\mu}\right) && (\because\ \text{直前の (1)})\\
&= j_{\mathbb{R}}\cdot 2\pi-j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配法則})\\
&= 2\pi j_{\mathbb{R}}-j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の積の交換律})\\
&= 2\pi j_{\mathbb{R}}+\left(-(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})\right) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の差は加法の逆元の和})
\end{aligned}
$$

また、$-i := (-1_{\mathbb{C}})\,i$（定義 1.14）を $(-(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu}))_{\mathbb{C}}$ に掛けたものを書き直す。主張と 主張 1.89 の $-i\theta_{\mathbb{C}}$ も、この $-i$ を掛けた $(-i)\,\theta_{\mathbb{C}}$ の意味である。

$$
\begin{aligned}
(-i)\left(-(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})\right)_{\mathbb{C}} &= (-i)\left((-1_{\mathbb{R}})(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})\right)_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}-x=(-1_{\mathbb{R}})x)\\
&= (-i)\left((-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}}\right) && (\because\ \text{主張 1.29})\\
&= (-i)\left((-1_{\mathbb{C}})\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}}\right) && (\because\ (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}=(-1_{\mathbb{R}},0_{\mathbb{R}})\ \text{は}1_{\mathbb{C}}\ \text{の加法の逆元}-1_{\mathbb{C}}\ \text{(定義 1.13, 定義 1.12 の和, 主張 1.56)})\\
&= ((-1_{\mathbb{C}})\,i)\left((-1_{\mathbb{C}})\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}}\right) && (\because\ \text{定義 1.14})\\
&= ((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}}))\left(i\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}}\right) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の結合律と交換律。主張 1.56})\\
&= 1_{\mathbb{C}}\left(i\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}}\right) && (\because\ (-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})=1_{\mathbb{C}}\ \text{(主張 1.56)})\\
&= i\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}}\ \text{は積の単位元 (主張 1.56)})
\end{aligned}
$$

これらを使って、主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})_{\mathbb{C}}) &= \exp\Big(-i\Big(2\pi j_{\mathbb{R}} + \Big(-(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)\Big)_{\mathbb{C}}\Big)\Big) && (\because \text{準備の第一の鎖})\\
&= \exp\Big(-i\Big((2\pi j_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} + \Big(-(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)\Big)_{\mathbb{C}}\Big)\Big) && (\because \text{主張 1.20 を} m=2,\ r_1 = 2\pi j_{\mathbb{R}},\ r_2 = -(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu) \text{ で。二項の有限和は定義 1.16 と} \mathbb{R} \text{ の有限和の定義で} r_1 + r_2 \text{ の形に開く})\\
&= \exp\Big((-i)(2\pi j_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} + (-i)\Big(-(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)\Big)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because \mathbb{C} \text{ の分配法則。主張 1.56})\\
&= \exp\Big((-i)(2\pi j_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} + i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because \text{準備の第二の鎖})\\
&= \exp((-i)(2\pi j_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}})\ \exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because \text{主張 3.13 を} K = \mathbb{C} \text{ で})\\
&= ((\cos(2\pi j_{\mathbb{R}}))_{\mathbb{C}} - i(\sin(2\pi j_{\mathbb{R}}))_{\mathbb{C}})\exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because \text{主張 1.89 を} \theta = 2\pi j_{\mathbb{R}} \text{ で})\\
&= ((1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} - i(\sin(2\pi j_{\mathbb{R}}))_{\mathbb{C}})\exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because j \in \mathbb{Z} \text{ と全実数上の} \cos(2\pi n_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}})\\
&= ((1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} - i(0_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}})\exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because j \in \mathbb{Z} \text{ と全実数上の} \sin(2\pi n_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}})\\
&= (1_{\mathbb{C}} - i\cdot 0_{\mathbb{C}})\exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because (1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} = (1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{C}},\ (0_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} = (0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{C}} \text{ (定義 1.13, 主張 1.56 の単位元と零元)})\\
&= (1_{\mathbb{C}} - 0_{\mathbb{C}})\exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because \text{主張 1.59})\\
&= (1_{\mathbb{C}} + (-0_{\mathbb{C}}))\exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because \text{定義 1.15})\\
&= (1_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{C}})\,0_{\mathbb{C}})\exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because \text{定義 1.14})\\
&= (1_{\mathbb{C}} + 0_{\mathbb{C}})\exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because \text{主張 1.59})\\
&= 1_{\mathbb{C}}\exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は和の単位元 (主張 1.56)})\\
&= \exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元 (主張 1.56)})
\end{aligned}
$$

となる。

(3) 主張 14.13 と 主張 14.14（添字の周期性）を添字 $1-\mu \in \mathbb{Z}$ に適用すると

$$
\begin{aligned}
\check{Z}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= \check{Z}_{(1-\mu)+M_{\mathrm{col}}} && \big(\because (1-\mu)+M_{\mathrm{col}} = M_{\mathrm{col}}+1-\mu\big)\\
&= \check{Z}_{1-\mu} && \big(\because \text{主張 14.13}\big),\\
\check{Y}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= \check{Y}_{(1-\mu)+M_{\mathrm{col}}} && \big(\because (1-\mu)+M_{\mathrm{col}} = M_{\mathrm{col}}+1-\mu\big)\\
&= \check{Y}_{1-\mu} && \big(\because \text{主張 14.14}\big).
\end{aligned}
$$

この適用では、添字の周期性を $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字 $1-\mu$ に用いている。添字の周期性を $\mu \in \mathbb{Z}$ で述べたことが、この橋渡しを可能にする。 □

主張 15.6 ($\check{Z}, \check{Y}$ の反交換関係)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、主張 14.8 の $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ と像の記号 $a_{\mathbb{R}}, a_{\mathbb{C}}$、定義 14.9 の $\check{Z}_\mu$、定義 14.10 の $\check{Y}_\mu$ を用いる。$\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について

$$
\big[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu\big]_+ = 2M_{\mathrm{col}}\,\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I, \qquad \big[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu\big]_+ = 0, \qquad \big[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu\big]_+ = 2M_{\mathrm{col}}\,\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I
$$

が成り立つ。反交換子は 定義 2.44 のもの、$I := I_{\mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}},\mathbb{C})}$ は単位行列である。定義 14.15 (2) により $\nu,\ M_{\mathrm{col}}+1-\mu \in \check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ なので、$\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \in \mathbb{C}$ は 定義 2.1 のクロネッカーのデルタ（$\nu = M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ のとき $1_{\mathbb{C}}$、そうでないとき $0_{\mathbb{C}}$）である。$2M_{\mathrm{col}}\,\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I$ は、$2_{\mathbb{C}} := (2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$ と $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}$ による複素数 $(2_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}})\,\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ による I のスカラー倍（定義 2.3）を表し、0 は零行列 $O \in \mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}, \mathbb{C})$（定義 1.93）を表す。

** 対になる添字に合同式が現れない ** のは、添字の範囲を $\check{\mathcal{M}}$ に絞ったからである：定義 14.15 (5) により $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ では $\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ と $\nu = M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ が同値である。

証明. 準備。$N := (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ と置き、$j \in \{1, \ldots, N\}$、$\lambda \in \mathbb{Z}$ について $e_{j,\lambda} := \exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\lambda)_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C}$ と置く（定義 14.9 の仮定により $\mathbb{C}$ の元）。$-i := (-1_{\mathbb{C}})\,i$（定義 1.14）であり、$-i(x)_{\mathbb{C}}$ は積 $(-i)(x)_{\mathbb{C}}$ を表す。周期デルタ $\delta^{(M_{\mathrm{col}})}$（定義 14.1）の法は N である（主張 14.8）。

準備 1（添字の対角）。$j, k \in \{1, \ldots, N\}$ なら $j_{\mathbb{Z}}, k_{\mathbb{Z}} \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ である。$j = k$ なら $j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}} = 0 = 0 \cdot M_{\mathrm{col}}$ なので $\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}},k_{\mathbb{Z}})} = 1_{\mathbb{C}}$。$j \neq k$ なら、標準包含 $\iota_{\mathbb{N}\to\mathbb{Z}}$ は単射なので $j_{\mathbb{Z}} \neq k_{\mathbb{Z}}$、さらに $0 < |j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}}| \leq M_{\mathrm{col}} - 1 < M_{\mathrm{col}}$ なので M_{col} は $j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}}$ を割り切らず、$\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}},k_{\mathbb{Z}})} = 0_{\mathbb{C}}$（定義 14.1）。したがって $\lambda, \lambda' \in \mathbb{Z}$、$j \neq k$ について

$$
\begin{aligned}
(e_{j,\lambda}e_{k,\lambda'})\,\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}},k_{\mathbb{Z}})} &= (e_{j,\lambda}e_{k,\lambda'})\,0_{\mathbb{C}} && (\because \text{準備 1})\\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.59})
\end{aligned}
$$

準備 2（指数）。$\kappa := -(\mu+\nu-1) \in \mathbb{Z}$ と置く。主張 14.8 より $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ である。$j \in \{1, \ldots, N\}$ について、実数の側で

$$
\begin{aligned}
j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu + j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\nu &= j_{\mathbb{R}}\left(\tilde{\theta}_\mu + \tilde{\theta}_\nu\right) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配法則}) \\
&= j_{\mathbb{R}}\left(\frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} + \frac{2\pi\left(\nu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right) && (\because\ \tilde{\theta}\ \text{の定義を 2 箇所へ同時適用。主張 14.8}) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right) + 2\pi\left(\nu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}\ \text{を分母とする分数の和}) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right) + \left(\nu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配法則}) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\left(\mu_{\mathbb{R}} + \left(-\frac{1}{2}\right)\right) + \left(\nu_{\mathbb{R}} + \left(-\frac{1}{2}\right)\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の差は加法の逆元の和を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} + \left(\left(-\frac{1}{2}\right) + \left(\nu_{\mathbb{R}} + \left(-\frac{1}{2}\right)\right)\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の加法の結合律}) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} + \left(\left(\nu_{\mathbb{R}} + \left(-\frac{1}{2}\right)\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の加法の交換律}) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} + \left(\nu_{\mathbb{R}} + \left(\left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)\right)\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の加法の結合律}) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\left(\mu_{\mathbb{R}} + \nu_{\mathbb{R}}\right) + \left(\left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の加法の結合律}) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\left(\mu_{\mathbb{R}} + \nu_{\mathbb{R}}\right) + \left(-\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}(-a) + (-b) = -(a+b)) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\left(\mu_{\mathbb{R}} + \nu_{\mathbb{R}}\right) + \left(-1_{\mathbb{R}}\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1_{\mathbb{R}}) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} + \nu_{\mathbb{R}} - 1_{\mathbb{R}}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の差は加法の逆元の和}) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(-\left(\mu_{\mathbb{R}} + \nu_{\mathbb{R}} - 1_{\mathbb{R}}\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}-(-x) = x) \\
&= j_{\mathbb{R}} \cdot \frac{2\pi\left(-\kappa_{\mathbb{R}}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}\ \text{は和・零・単位元を保つので差と加法の逆元を保ち、}\kappa_{\mathbb{R}} = -\left(\mu_{\mathbb{R}} + \nu_{\mathbb{R}} - 1_{\mathbb{R}}\right)\text{。主張 14.8}) \\
&= \frac{j_{\mathbb{R}}\left(2\pi\left(-\kappa_{\mathbb{R}}\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}a \cdot \tfrac{b}{c} = \tfrac{ab}{c}) \\
&= \frac{j_{\mathbb{R}}\left(-\left(2\pi\kappa_{\mathbb{R}}\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}a(-b) = -(ab)) \\
&= \frac{-\left(j_{\mathbb{R}}\left(2\pi\kappa_{\mathbb{R}}\right)\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}a(-b) = -(ab)) \\
&= \frac{-\left(\left(j_{\mathbb{R}}\, 2\pi\right)\kappa_{\mathbb{R}}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の積の結合律}) \\
&= \frac{-\left(\left(2\pi j_{\mathbb{R}}\right)\kappa_{\mathbb{R}}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の積の交換律}) \\
&= -\frac{2\pi j_{\mathbb{R}}\kappa_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}\tfrac{-a}{c} = -\tfrac{a}{c}\text{。}\ 2\pi j_{\mathbb{R}}\kappa_{\mathbb{R}} := \left(2\pi j_{\mathbb{R}}\right)\kappa_{\mathbb{R}})
\end{aligned}
$$

であり、$y_j := \frac{2\pi j_{\mathbb{R}}\kappa_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} \in \mathbb{R}$ と置くと、複素数の側で

$$
\begin{aligned}
(-i)(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}} + (-i)(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\nu)_{\mathbb{C}} &= (-i)\left((j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}} + (j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\nu)_{\mathbb{C}}\right) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の分配法則。主張 1.56}) \\
&= (-i)\left(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu + j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\nu\right)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.20 を}m = 2\ \text{で。二項の有限和は定義 1.16 と}\mathbb{R}\ \text{の有限和の定義で二項の和の形に開く}) \\
&= (-i)\,(-y_j)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{直前の実数の鎖}) \\
&= (-i)\,((-1_{\mathbb{R}})y_j)_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{で}-x = (-1_{\mathbb{R}})x) \\
&= (-i)\,((-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}\,(y_j)_{\mathbb{C}}) && (\because\ \text{主張 1.29}) \\
&= (-i)\,((-1_{\mathbb{C}})\,(y_j)_{\mathbb{C}}) && (\because\ (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} = (-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}})\ \text{は}1_{\mathbb{C}}\ \text{の加法の逆元}-1_{\mathbb{C}}\ \text{(定義 1.13, 定義 1.12 の和, 主張 1.56)}) \\
&= ((-1_{\mathbb{C}})\,i)\,((-1_{\mathbb{C}})\,(y_j)_{\mathbb{C}}) && (\because\ \text{定義 1.14}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,(i\,((-1_{\mathbb{C}})(y_j)_{\mathbb{C}})) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の結合律。主張 1.56}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,((i(-1_{\mathbb{C}}))\,(y_j)_{\mathbb{C}}) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の結合律。主張 1.56}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,(((-1_{\mathbb{C}})i)\,(y_j)_{\mathbb{C}}) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の交換律。主張 1.56}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,((-1_{\mathbb{C}})\,(i\,(y_j)_{\mathbb{C}})) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の結合律。主張 1.56}) \\
&= ((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}}))\,(i\,(y_j)_{\mathbb{C}}) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の結合律。主張 1.56}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\,(i\,(y_j)_{\mathbb{C}}) && (\because\ (-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}}) = 1_{\mathbb{C}}\ \text{(主張 1.56)}) \\
&= i\,(y_j)_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}}\ \text{は積の単位元 (主張 1.56)})
\end{aligned}
$$

である。主張 14.2 は包含の像を書いていないが、その $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ を N、$k \in \mathbb{Z}$ を κ に取ったとき、左辺の指数 $\frac{2\pi i j \kappa}{N}$ は $i\,(y_j)_{\mathbb{C}}$、右辺の係数 N は $N_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}$（$(N)_{\mathbb{Z}} = M_{\mathrm{col}}$。主張 14.8）であり、右辺の積は $\mathbb{C}$ の積である。

第 1 式。主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
\left[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ &= \left[\sum_{j=1}^{N} e_{j,\mu} Z_{j_{\mathbb{Z}}},\ \sum_{k=1}^{N} e_{k,\nu} Z_{k_{\mathbb{Z}}}\right]_+ && \left(\because \text{定義 14.9 を 2 箇所へ同時適用}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{k,\nu}) \left[Z_{j_{\mathbb{Z}}}, Z_{k_{\mathbb{Z}}}\right]_+ && \left(\because \text{主張 2.45 } (n = 2^N,\ r = s = N)\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{k,\nu}) \left(\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}}, k_{\mathbb{Z}})} (2_{\mathbb{C}} I)\right) && \left(\because \text{主張 14.3 を} N^2 \text{ 個の項へ同時適用。右辺の} 2I\delta \text{ を、} 2_{\mathbb{C}} I \text{ の} \delta \text{ 倍と書いた}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} \left((e_{j,\mu} e_{k,\nu}) \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}}, k_{\mathbb{Z}})}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && \left(\because \text{主張 2.41 を} N^2 \text{ 個の項へ同時適用}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N} \left(\left(\sum_{k=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{k,\nu}) \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}}, k_{\mathbb{Z}})}\right) (2_{\mathbb{C}} I)\right) && \left(\because \text{主張 2.35 を各} j \text{ へ同時適用}\right)\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{k,\nu}) \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}}, k_{\mathbb{Z}})}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && \left(\because \text{主張 2.35}\right)\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{j,\nu}) \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}})}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && \left(\because \text{主張 1.68 を各} j \text{ へ} n = j \text{ で同時適用。} k \neq j \text{ の項は準備 1 の鎖で} 0_{\mathbb{C}}\right)\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{j,\nu})\, 1_{\mathbb{C}}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && \left(\because \text{準備 1 を各} j \text{ へ同時適用}\right)\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N} e_{j,\mu} e_{j,\nu}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && \left(\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元 (主張 1.56)}\right)\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N} \exp\Big((-i)(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}} + (-i)(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\nu)_{\mathbb{C}}\Big)\right) (2_{\mathbb{C}} I) && \left(\because \text{主張 3.13 を} K = \mathbb{C} \text{ で各} j \text{ へ同時適用}\right)\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N} \exp(i\,(y_j)_{\mathbb{C}})\right) (2_{\mathbb{C}} I) && \left(\because \text{準備 2 の複素数の鎖を各} j \text{ へ同時適用}\right)\\
&= \left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\, \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\kappa, 0)}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && \left(\because \text{主張 14.2 を} N \text{ と} \kappa \text{ で。準備 2 の読み}\right)\\
&= \left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\, \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu+\nu, 1)}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && \left(\because \kappa - 0 = -\left((\mu+\nu) - 1\right) \text{ なので} \kappa \equiv 0 \iff \mu + \nu \equiv 1 \pmod{M_{\mathrm{col}}} \text{。定義 14.1}\right)\\
&= \left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\, \delta_{\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && \left(\because \text{定義 14.15 (5) } (\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}})\right)\\
&= \left(\left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\, \delta_{\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) 2_{\mathbb{C}}\right) I && \left(\because \text{主張 2.41}\right)\\
&= \left((2_{\mathbb{C}} (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}})\, \delta_{\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) I && \left(\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 1.56}\right)
\end{aligned}
$$

となり、最後の行は主張の右辺 $2M_{\mathrm{col}}\, \delta_{\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, I$ である。

第 2 式。主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
\left[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ &= \left[\sum_{j=1}^{N} e_{j,\mu} Z_{j_{\mathbb{Z}}},\ \sum_{k=1}^{N} e_{k,\nu} Y_{k_{\mathbb{Z}}}\right]_+ && \left(\because \text{定義 14.9, 定義 14.10}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{k,\nu}) \left[Z_{j_{\mathbb{Z}}}, Y_{k_{\mathbb{Z}}}\right]_+ && \left(\because \text{主張 2.45 } (n = 2^N,\ r = s = N)\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{k,\nu})\, O && \left(\because \text{主張 14.3 を} N^2 \text{ 個の項へ同時適用。右辺の} 0 \text{ は零行列} O\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} O && \left(\because \text{主張 2.12 を} N^2 \text{ 個の項へ同時適用}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N} O && \left(\because \text{主張 2.11 を各} j \text{ へ同時適用}\right)\\
&= O && \left(\because \text{主張 2.11}\right)
\end{aligned}
$$

第 3 式。主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
\big[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu\big]_+ &= \left[\sum_{j=1}^{N} e_{j,\mu} Y_{j_{\mathbb{Z}}},\ \sum_{k=1}^{N} e_{k,\nu} Y_{k_{\mathbb{Z}}}\right]_+ && (\because \text{定義 14.10 を 2 箇所へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{k,\nu})\, [Y_{j_{\mathbb{Z}}}, Y_{k_{\mathbb{Z}}}]_+ && (\because \text{主張 2.45 } (n = 2^N,\ r = s = N))\\
&= \sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{k,\nu}) \left(\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}}, k_{\mathbb{Z}})}\, (2_{\mathbb{C}} I)\right) && (\because \text{主張 14.3 を} N^2 \text{ 個の項へ同時適用。右辺の} 2I\delta \text{ を、} 2_{\mathbb{C}} I \text{ の} \delta \text{ 倍と書いた})\\
&= \sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} \left((e_{j,\mu} e_{k,\nu})\, \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}}, k_{\mathbb{Z}})}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && (\because \text{主張 2.41 を} N^2 \text{ 個の項へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{N} \left(\left(\sum_{k=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{k,\nu})\, \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}}, k_{\mathbb{Z}})}\right) (2_{\mathbb{C}} I)\right) && (\because \text{主張 2.35 を各} j \text{ へ同時適用})\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{k,\nu})\, \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}}, k_{\mathbb{Z}})}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && (\because \text{主張 2.35})\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{j,\nu})\, \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}})}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && (\because \text{主張 1.68 を各} j \text{ へ} n = j \text{ で同時適用。} k \neq j \text{ の項は準備 1 の鎖で} 0_{\mathbb{C}})\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N} (e_{j,\mu} e_{j,\nu})\, 1_{\mathbb{C}}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && (\because \text{準備 1 を各} j \text{ へ同時適用})\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N} e_{j,\mu} e_{j,\nu}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元 (主張 1.56)})\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N} \exp\Big((-i)(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}} + (-i)(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\nu)_{\mathbb{C}}\Big)\right) (2_{\mathbb{C}} I) && (\because \text{主張 3.13 を} K = \mathbb{C} \text{ で各} j \text{ へ同時適用})\\
&= \left(\sum_{j=1}^{N} \exp(i\,(y_j)_{\mathbb{C}})\right) (2_{\mathbb{C}} I) && (\because \text{準備 2 の複素数の鎖を各} j \text{ へ同時適用})\\
&= \left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\, \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\kappa,\,0)}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && (\because \text{主張 14.2 を} N \text{ と} \kappa \text{ で。準備 2 の読み})\\
&= \left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\, \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu+\nu,\,1)}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && (\because \kappa - 0 = -\left((\mu+\nu) - 1\right) \text{ なので} \kappa \equiv 0 \iff \mu + \nu \equiv 1 \pmod{M_{\mathrm{col}}}\text{。定義 14.1})\\
&= \left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\, \delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) (2_{\mathbb{C}} I) && (\because \text{定義 14.15 (5) } (\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}))\\
&= \left(\left((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\, \delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) 2_{\mathbb{C}}\right) I && (\because \text{主張 2.41})\\
&= \left((2_{\mathbb{C}} (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}})\, \delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) I && (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

となり、最後の行は主張の右辺 $2M_{\mathrm{col}}\, \delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, I$ である。 □

主張 15.7 ($\check{Z}, \check{Y}$ からZ_j, Y_j を復元する)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、主張 14.8 の $N := (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \in \mathbb{N}_{\geq 2}$、像の記号 $n_{\mathbb{Z}}, n_{\mathbb{R}}, a_{\mathbb{R}}, a_{\mathbb{C}}$ と $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$、定義 14.9 の $\check{Z}_\mu$、定義 14.10 の $\check{Y}_\mu$ を用いる。主張 14.8 より $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ なので $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} = ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) \neq (0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{C}}$（定義 1.13）であり、その逆元 $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}^{-1} \in \mathbb{C}$ がある（主張 1.56）。$j \in \{1, \ldots, N\}$ について

$$
(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}^{-1} \sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}})_{\mathbb{C}}\Big)\, \check{Z}_{\mu_{\mathbb{Z}}} = Z_{j_{\mathbb{Z}}}, \qquad (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}^{-1} \sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}})_{\mathbb{C}}\Big)\, \check{Y}_{\mu_{\mathbb{Z}}} = Y_{j_{\mathbb{Z}}}
$$

が成り立つ。exp は 定義 3.11 の $K = \mathbb{C}$ のもの、$i\,(x)_{\mathbb{C}}$ は $\mathbb{C}$ の積、スカラー倍は 定義 2.3、行列の有限和は 定義 2.5 のものであり、両辺は $\mathrm{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ の元である。

とくに、$\mathrm{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ の部分集合 T が、すべての $\mu \in \{1, \ldots, N\}$ について $\check{Z}_{\mu_{\mathbb{Z}}}, \check{Y}_{\mu_{\mathbb{Z}}} \in T$ を満たし、主張 15.3 の (ii)〜(iv)（単位行列を含み、和・スカラー倍・行列の積で閉じる）を満たすならば、$T = \mathrm{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ である。すなわち $\check{Z}_{1_{\mathbb{Z}}}, \ldots, \check{Z}_{N_{\mathbb{Z}}}, \check{Y}_{1_{\mathbb{Z}}}, \ldots, \check{Y}_{N_{\mathbb{Z}}}$ は $\mathrm{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ を単位的 $\mathbb{C}$ 代数として生成する（主張 15.3 の $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ はこの $\mathrm{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ である）。

証明. 準備。$j, k, \mu \in \{1, \ldots, N\}$ について $f_{j,\mu} := \exp(i\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}})_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C}$、$e_{k,\mu} := \exp(-i(k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}})_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C}$（定義 3.11）と置き、$c := (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}^{-1} \in \mathbb{C}$ と置く。$-i := (-1_{\mathbb{C}})\, i$（定義 1.14）であり、$-i(x)_{\mathbb{C}}$ は積 $(-i)(x)_{\mathbb{C}}$ を表す。定義 14.9・定義 14.10 を $\mu_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$ で読むと、$\check{Z}_{\mu_{\mathbb{Z}}} = \sum_{k=1}^{N} e_{k,\mu} Z_{k_{\mathbb{Z}}}$、$\check{Y}_{\mu_{\mathbb{Z}}} = \sum_{k=1}^{N} e_{k,\mu} Y_{k_{\mathbb{Z}}}$ である。

準備 1（$k \neq j$ の項）。$j,k \in \{1,\dots,N\}$ なら $j_{\mathbb{Z}}, k_{\mathbb{Z}} \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ である。$k \neq j$ なら、標準包含 $\iota_{\mathbb{N}\to\mathbb{Z}}$ は単射なので $j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}} \neq 0$、さらに $|j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}}| \leq M_{\mathrm{col}} - 1 < M_{\mathrm{col}}$ である。したがって $A \in \mathrm{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}\left(\sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\left((j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big)\right) A &= 0_{\mathbb{C}}\, A \quad (\because \text{主張 14.8 の「とくに」を} 0 < |j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}}| < M_{\mathrm{col}} \text{ の整数} j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}} \text{ で}) \\ &= O \qquad (\because \text{主張 2.13})\end{aligned}$$

である（O は 定義 1.93 の零行列）。

準備 2（指数）。$j,k,\mu \in \{1,\dots,N\}$ について $x := \tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}} \in \mathbb{R}$ と置く。実数の側で

$$\begin{aligned}j_{\mathbb{R}}x + (-1_{\mathbb{R}})(k_{\mathbb{R}}x) &= j_{\mathbb{R}}x + ((-1_{\mathbb{R}})k_{\mathbb{R}})\, x \quad (\because \mathbb{R} \text{ の積の結合律}) \\ &= j_{\mathbb{R}}x + (-k_{\mathbb{R}})\, x \quad (\because \mathbb{R} \text{ で} (-1_{\mathbb{R}})y = -y) \\ &= (j_{\mathbb{R}} + (-k_{\mathbb{R}}))\, x \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配法則}) \\ &= (j_{\mathbb{R}} - k_{\mathbb{R}})\, x \quad (\because \mathbb{R} \text{ の差は加法の逆元の和}) \\ &= (j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}\, x \quad (\because \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は和と零を保つので差を保つ。} j_{\mathbb{R}} = (j_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}},\ k_{\mathbb{R}} = (k_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}} \text{ (主張 14.8)})\end{aligned}$$

であり、複素数の側で

$$\begin{aligned}i\,(j_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}} + (-i)(k_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}} &= i\,(j_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}} + ((-1_{\mathbb{C}})\, i)\,(k_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 1.14}) \\ &= i\,(j_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}} + (i\,(-1_{\mathbb{C}}))\,(k_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の交換律。主張 1.56}) \\ &= i\,(j_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}} + i\,((-1_{\mathbb{C}})(k_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}}) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律。主張 1.56}) \\ &= i\,((j_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{C}})(k_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}}) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の分配法則。主張 1.56}) \\ &= i\,((j_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}(k_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}}) \quad (\because (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} = (-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) \text{ は} 1_{\mathbb{C}} \text{ の加法の逆元} - 1_{\mathbb{C}} \text{ (定義 1.13, 定義 1.12 の和, 主張 1.56)}) \\ &= i\,((j_{\mathbb{R}}x)_{\mathbb{C}} + ((-1_{\mathbb{R}})(k_{\mathbb{R}}x))_{\mathbb{C}}) \quad (\because \text{主張 1.29}) \\ &= i\,(j_{\mathbb{R}}x + (-1_{\mathbb{R}})(k_{\mathbb{R}}x))_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 1.20 を} m = 2 \text{ で。二項の有限和は定義 1.16 と} \mathbb{R} \text{ の有限和の定義で二項の和の形に開く}) \\ &= i\,((j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}\, x)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{直前の実数の鎖})\end{aligned}$$

である。

第 1 式。主張の左辺から

$$\begin{aligned}c\sum_{\mu=1}^{N} f_{j,\mu}\tilde{Z}_{\mu_{\mathbb{Z}}} &= c\sum_{\mu=1}^{N} f_{j,\mu}\left(\sum_{k=1}^{N} e_{k,\mu}Z_{k_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{定義 14.9 を} N \text{ 個の項へ同時適用}) \\ &= c\sum_{\mu=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} f_{j,\mu}\,(e_{k,\mu}Z_{k_{\mathbb{Z}}}) && (\because \text{主張 2.34 を右辺から左辺へ、各} \mu \text{ へ同時適用}) \\ &= c\sum_{\mu=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} (f_{j,\mu}e_{k,\mu})\, Z_{k_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 2.41 を} N^2 \text{ 個の項へ同時適用}) \\ &= c\sum_{k=1}^{N}\sum_{\mu=1}^{N} (f_{j,\mu}e_{k,\mu})\, Z_{k_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 2.39 } (r = s = N)) \\ &= c\sum_{k=1}^{N}\left(\sum_{\mu=1}^{N} f_{j,\mu}e_{k,\mu}\right) Z_{k_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 2.35 を各} k \text{ へ同時適用}) \\ &= c\sum_{k=1}^{N}\left(\sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}})_{\mathbb{C}} + (-i)(k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}})_{\mathbb{C}}\Big)\right) Z_{k_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 3.13 を} K = \mathbb{C} \text{ で} N^2 \text{ 個の項へ同時適用}) \\ &= c\sum_{k=1}^{N}\left(\sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\left((j_{\mathbb{Z}} - k_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big)\right) Z_{k_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{準備 2 の複素数の鎖を全ての} (k,\mu) \text{ へ同時適用}) \\ &= c\left(\left(\sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\left((j_{\mathbb{Z}} - j_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big)\right) Z_{j_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{主張 2.40 } (q = j)。\ k \neq j \text{ の項は準備 1 の鎖（} A = Z_{k_{\mathbb{Z}}} \text{）で} O) \\ &= c\left(\left(\sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\left((0)_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big)\right) Z_{j_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \mathbb{Z} \text{ で} j_{\mathbb{Z}} - j_{\mathbb{Z}} = 0) \\ &= c\,((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\, Z_{j_{\mathbb{Z}}}) && (\because \text{主張 14.8 の「とくに」を整数0 で}) \\ &= (c\,(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}})\, Z_{j_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 2.41}) \\ &= 1_{\mathbb{C}}\, Z_{j_{\mathbb{Z}}} && (\because c \text{ は} (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \text{ の逆元。主張 1.56}) \\ &= Z_{j_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 2.42})\end{aligned}$$

第 2 式。主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
c\sum_{\mu=1}^{N} f_{j,\mu}\check{Y}_{\mu_{\mathbb{Z}}} &= c\sum_{\mu=1}^{N} f_{j,\mu}\left(\sum_{k=1}^{N} e_{k,\mu}Y_{k_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{定義 14.10 を}N\text{ 個の項へ同時適用})\\
&= c\sum_{\mu=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} f_{j,\mu}\left(e_{k,\mu}Y_{k_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{主張 2.34 を右辺から左辺へ、各}\mu\text{ へ同時適用})\\
&= c\sum_{\mu=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} \left(f_{j,\mu}e_{k,\mu}\right)Y_{k_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 2.41 を}N^2\text{ 個の項へ同時適用})\\
&= c\sum_{k=1}^{N}\sum_{\mu=1}^{N} \left(f_{j,\mu}e_{k,\mu}\right)Y_{k_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 2.39 } (r=s=N))\\
&= c\sum_{k=1}^{N}\left(\sum_{\mu=1}^{N} f_{j,\mu}e_{k,\mu}\right)Y_{k_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 2.35 を各}k\text{ へ同時適用})\\
&= c\sum_{k=1}^{N}\left(\sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\left(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right)_{\mathbb{C}} + (-i)\left(k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big)\right)Y_{k_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 3.13 を}K=\mathbb{C}\text{ で}N^2\text{ 個の項へ同時適用})\\
&= c\sum_{k=1}^{N}\left(\sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\left(\left(j_{\mathbb{Z}}-k_{\mathbb{Z}}\right)_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big)\right)Y_{k_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{準備 2 の複素数の鎖を全ての}(k,\mu)\text{ へ同時適用})\\
&= c\left(\left(\sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\left(\left(j_{\mathbb{Z}}-j_{\mathbb{Z}}\right)_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big)\right)Y_{j_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{主張 2.40 } (q=j)\text{。}k\neq j\text{ の項は準備 1 の鎖（}A=Y_{k_{\mathbb{Z}}}\text{）で}O)\\
&= c\left(\left(\sum_{\mu=1}^{N} \exp\Big(i\left((0)_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big)\right)Y_{j_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \mathbb{Z}\text{ で}j_{\mathbb{Z}}-j_{\mathbb{Z}}=0)\\
&= c\left(\left(M_{\mathrm{col}}\right)_{\mathbb{C}}Y_{j_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{主張 14.8 の「とくに」を整数0 で})\\
&= \left(c\left(M_{\mathrm{col}}\right)_{\mathbb{C}}\right)Y_{j_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 2.41})\\
&= 1_{\mathbb{C}}\,Y_{j_{\mathbb{Z}}} && (\because c\text{ は}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\text{ の逆元。主張 1.56})\\
&= Y_{j_{\mathbb{Z}}} && (\because \text{主張 2.42})
\end{aligned}
$$

生成について。T を主張の部分集合とし、$j\in\{1,\dots,N\}$ を取る。主張 15.3 の (iii) のスカラー倍により $f_{j,\mu}\check{Z}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\in T$、(iii) の和を 定義 2.5 の帰納法の各段へ適用して $\sum_{\mu=1}^{N} f_{j,\mu}\check{Z}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\in T$、もう一度 (iii) のスカラー倍により $c\sum_{\mu=1}^{N} f_{j,\mu}\check{Z}_{\mu_{\mathbb{Z}}}\in T$ であり、第 1 式によりこれは $Z_{j_{\mathbb{Z}}}$ である。同じく第 2 式により $Y_{j_{\mathbb{Z}}}\in T$ である。$1\leq l\leq M_{\mathrm{col}}$ の整数 l は $l=j_{\mathbb{Z}}$ となる $j\in\{1,\dots,N\}$ を持つ（$N_{\mathbb{Z}}=M_{\mathrm{col}}$）ので、主張 15.3 の S について $S\subseteq T$、すなわち T は (i) も満たして閉じている。主張 15.3 の $\mathcal{A}$ は閉じている部分集合のうち最小なので $\mathcal{A}\subseteq T$ であり、主張 15.3 より $\mathcal{A}=\mathrm{Mat}(2^N,\mathbb{C})$ であるから $\mathrm{Mat}(2^N,\mathbb{C})=\mathcal{A}\subseteq T\subseteq\mathrm{Mat}(2^N,\mathbb{C})$、すなわち $T=\mathrm{Mat}(2^N,\mathbb{C})$ である。 □

注意 15.8 ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ を対角化する道筋)**.** 主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu=\dfrac{2\pi(\mu-\frac{1}{2})}{M_{\mathrm{col}}}$ における 定義 14.6 の $A(\tilde{\theta}_\mu)$ を対角化する。

議論を支えるのは、すべての $\mu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）とすべての $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$（臨界点 $\sinh 2K_1\sinh 2K_2=1$ を含む）について $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\neq 0$ が成り立つこと（主張 15.12）である。したがって以下の主張はすべて ** 場合分けなし ** で述べられる。

さらに、固有値に現れる根号 $\sqrt{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}$ は正の実数 $\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$ に確定する（主張 15.13）。このため複素平方根の分枝を論じる必要がなく、固有値・固有ベクトルは代入して確かめるだけで得られる。また $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\neq 0$ の帰結として $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)>0$ が常に成り立ち、2 つの固有値は必ず分離する（主張 15.19）。

定義 15.9 ($\gamma_1(\theta),\gamma_2(\theta)$ $(\theta\in\mathbb{R})$)**.** 定義 13.15 の記号のもと $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$ とし、$\theta\in\mathbb{R}$ について

$$
\gamma_1(\theta):=c_1c_2^*-s_1s_2^*\cos\theta\in\mathbb{R},\qquad \gamma_2(\theta):=i\,\exp(i\theta)s_2^*\big(c_1\cos\theta-i\sin\theta-s_1c_2\big)\in\mathbb{C}
$$

と定める。このとき 定義 14.6 の $A(\theta)$ は

$$A(\theta) = \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta) & \gamma_2(\theta) \\ -\gamma_2(-\theta) & \gamma_1(\theta) \end{pmatrix}$$

と書ける。

証明. 定義 14.6 の $(1,1)$ 成分と $(2,2)$ 成分は $c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta = \gamma_1(\theta)$、$(1,2)$ 成分は $i\exp(i\theta)s_2^*(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2) = \gamma_2(\theta)$ であり、定義そのものである。

$(2,1)$ 成分については、$\cos(-\theta) = \cos\theta$、$\sin(-\theta) = -\sin\theta$ より

$$\begin{aligned}
\gamma_2(-\theta) &= i\,\exp(i(-\theta))s_2^*\big(c_1\cos(-\theta) - i\sin(-\theta) - s_1c_2\big) \quad (\because \text{本ブロックの}\gamma_2\text{ の定義式}) \\
&= i\,\exp(-i\theta)s_2^*\big(c_1\cos(-\theta) - i\sin(-\theta) - s_1c_2\big) \quad (\because i(-\theta) = -i\theta) \\
&= i\,\exp(-i\theta)s_2^*\big(c_1\cos\theta - i\sin(-\theta) - s_1c_2\big) \quad (\because \cos(-\theta) = \cos\theta) \\
&= i\,\exp(-i\theta)s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big) \quad (\because \sin(-\theta) = -\sin\theta)
\end{aligned}$$

したがって 定義 14.6 の $(2,1)$ 成分は

$$\begin{aligned}
A(\theta)_{2,1} &= -i\,\exp(-i\theta)s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big) \quad (\because \text{定義 14.6}) \\
&= -\gamma_2(-\theta) \quad (\because \text{直前の}\gamma_2(-\theta)\text{ の式})
\end{aligned}$$

となる。 □

主張 15.10 $(\gamma_1(\theta) \geq \cosh(2K_1 - 2K_2^*) \geq 1 \quad (\forall\theta \in \mathbb{R}))$**.** 定義 15.9 の $\gamma_1(\theta) = c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta$ を ** すべての実数 ** θ について考える。このとき

$$\gamma_1(\theta) \geq \cosh(2K_1 - 2K_2^*) \geq 1 \qquad (\forall\theta \in \mathbb{R})$$

が成り立つ。証明は全実数上の cos の性質 $\cos\theta \leq 1$ $(\theta \in \mathbb{R})$ を前提とする（本文の 主張 11.26 は $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ に限る）。

証明. 準備。定義 15.9 より $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ である。定義 12.24・定義 12.25 より $K_1^*, K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ である。したがって 主張 13.14 より $c_1, s_1, c_2^*, s_2^* \in \mathbb{R}$、$s_1 > 0$、$s_2^* > 0$ であり、

$$\begin{aligned}
s_1s_2^* &> 0 \cdot s_2^* \quad (\because\ s_1 > 0 \text{ の両辺に } s_2^* > 0 \text{ を掛ける}) \\
&= 0 \qquad (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ との積は } 0)
\end{aligned}$$

である。さらに

$$\begin{aligned}
\cos\theta \leq 1 &\Longrightarrow s_1s_2^*\cos\theta \leq s_1s_2^* \cdot 1 \qquad (\because \text{両辺に } s_1s_2^* > 0 \text{ を掛ける}) \\
&\Longrightarrow -s_1s_2^* \cdot 1 \leq -s_1s_2^*\cos\theta \quad (\because \text{両辺に } -1 < 0 \text{ を掛ける。向きが変わる})
\end{aligned}$$

であり、左端の $\cos\theta \leq 1$ は主張の前提である。以下で $\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからであり、$\cos\theta$ が全実数上の実数値関数の値だからである。

$$\begin{aligned}
\gamma_1(\theta) &= c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta && (\because \text{定義 15.9}) \\
&\geq c_1c_2^* - s_1s_2^* \cdot 1 && (\because \text{準備の } -s_1s_2^* \cdot 1 \leq -s_1s_2^*\cos\theta \text{ の両辺に } c_1c_2^* \text{ を加える}) \\
&= c_1c_2^* - s_1s_2^* && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 1 \text{ は積の単位元}) \\
&= \cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* && (\because \text{定義 12.26}) \\
&= \cosh(2K_1 - 2K_2^*) && (\because \text{主張 11.4 の複号 } - \text{ を } x = 2K_1,\ y = 2K_2^* \text{ に適用}) \\
&\geq 1 && (\because \text{主張 11.20 を } x = 2K_1 - 2K_2^* \text{ に適用})
\end{aligned}$$

□

定義 15.11 ($\gamma(\theta)$ ($\theta \in \mathbb{R}$) の定義)**.** 定義 13.15 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、$\theta \in \mathbb{R}$ について 定義 15.9 の $\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta \in \mathbb{R}$ を考える。主張 15.10 より $\gamma_1(\theta) \geq 1$ であり、

$$\gamma(\theta) := \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta)) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める。ここで $\operatorname{arccosh}(y)$ ($y \geq 1$) は $\cosh t = y$ を満たす唯一の $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である（定義 15.1、主張 15.2 (1)–(3)）。とくに $\cosh\gamma(\theta) = \gamma_1(\theta)$ である（主張 15.2 (2)）。

$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$（主張 14.8）であり、$\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ はこの γ の $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ での値を表す。

主張 15.12 ($\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$(例外なし)**.** 定義 13.15 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M_{\mathrm{col}}}$ について、** すべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）と、すべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（臨界点 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ を含む）について **

$$\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。$\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ の非零性は、後で共役関係から導く。

証明. Step 0（正値性）。$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ から、定義 12.24・定義 12.25・主張 13.14 により次が従う。

$$\begin{aligned}
&K_1^* \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \text{ 定義 12.24 と} K_1 \in \mathbb{R}_{>0}) \\
&K_2^* \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \text{ 定義 12.25 と} K_2 \in \mathbb{R}_{>0}) \\
&c_1 > 0 \quad (\because \text{ 主張 13.14 を} i = 1 \text{ に適用。} K_1 \in \mathbb{R}_{>0}) \\
&s_1 > 0 \quad (\because \text{ 主張 13.14 を} i = 1 \text{ に適用。} K_1 \in \mathbb{R}_{>0}) \\
&c_2 > 0 \quad (\because \text{ 主張 13.14 を} i = 2 \text{ に適用。} K_2 \in \mathbb{R}_{>0}) \\
&s_2^* > 0 \quad (\because \text{ 主張 13.14 を} i = 2 \text{ に適用。} K_2^* \in \mathbb{R}_{>0})
\end{aligned}$$

Step 1（零点の必要条件）。$\theta \in \mathbb{R}$ について、定義 15.9 の定義式の実数 $c_1, s_1, c_2, s_2^*, \cos\theta, \sin\theta$ を 定義 1.13 の像として読み、次の三つの複素数を置く。

$$\begin{aligned}
a(\theta) &:= i\,\exp(i\theta)\,(s_2^*)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}, \\
b(\theta) &:= (-i)\,\exp(-i\theta)\,\big((s_2^*)^{-1}\big)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}, \\
w(\theta) &:= (c_1)_{\mathbb{C}}(\cos\theta)_{\mathbb{C}} - i\,(\sin\theta)_{\mathbb{C}} - (s_1)_{\mathbb{C}}(c_2)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}
\end{aligned}$$

($(s_2^*)^{-1} \in \mathbb{R}$ は Step 0 の $s_2^* > 0$ から定まる。) まず $w(\theta)$ の成分を求めておく。

$$\begin{aligned}
w(\theta) &= (c_1, 0)(\cos\theta, 0) + (-1, 0)\big((0,1)(\sin\theta, 0)\big) + (-1, 0)\big((s_1, 0)(c_2, 0)\big) \quad (\because w(\theta) \text{ の定義、定義 1.13、} i = (0,1) \text{、定義 1.15、定義 1.14}) \\
&= (c_1\cos\theta, 0) + (-1, 0)(0, \sin\theta) + (-1, 0)(s_1 c_2, 0) \quad (\because \text{ 定義 1.12 の積を三か所に}) \\
&= (c_1\cos\theta, 0) + (0, -\sin\theta) + (-s_1 c_2, 0) \quad (\because \text{ 定義 1.12 の積を二か所に}) \\
&= (c_1\cos\theta - s_1 c_2,\ -\sin\theta) \quad (\because \text{ 定義 1.12 の和})
\end{aligned}$$

$b(\theta)$ は $a(\theta)$ の逆元である。

$$
\begin{aligned}
a(\theta)\,b(\theta) &= \big(i\,\exp(i\theta)\,(s_2^*)_{\mathbb{C}}\big)\big((-i)\,\exp(-i\theta)\,((s_2^*)^{-1})_{\mathbb{C}}\big) \quad (\because a(\theta), b(\theta)\ \text{の定義})\\
&= \big(i(-i)\big)\big(\exp(i\theta)\exp(-i\theta)\big)\big((s_2^*)_{\mathbb{C}}((s_2^*)^{-1})_{\mathbb{C}}\big) \quad (\because \mathbb{C}\ \text{の積の結合律と可換律。主張 1.56})\\
&= \big(i\,((-1_{\mathbb{C}})\,i)\big)\big(\exp(i\theta)\exp(-i\theta)\big)\big((s_2^*)_{\mathbb{C}}((s_2^*)^{-1})_{\mathbb{C}}\big) \quad (\because \text{定義 1.14 の} -i := (-1_{\mathbb{C}})\,i)\\
&= \big((-1_{\mathbb{C}})(i\,i)\big)\big(\exp(i\theta)\exp(-i\theta)\big)\big((s_2^*)_{\mathbb{C}}((s_2^*)^{-1})_{\mathbb{C}}\big) \quad (\because \mathbb{C}\ \text{の積の結合律と可換律。主張 1.56})\\
&= \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)\big(\exp(i\theta)\exp(-i\theta)\big)\big((s_2^*)_{\mathbb{C}}((s_2^*)^{-1})_{\mathbb{C}}\big) \quad (\because \text{定義 1.12 の積で}(0,1)(0,1)=(-1,0))\\
&= 1_{\mathbb{C}}\big(\exp(i\theta)\exp(-i\theta)\big)\big((s_2^*)_{\mathbb{C}}((s_2^*)^{-1})_{\mathbb{C}}\big) \quad (\because \text{定義 1.12 の積で}(-1,0)(-1,0)=(1,0))\\
&= 1_{\mathbb{C}}\exp\big(i\theta+(-i\theta)\big)\big((s_2^*)_{\mathbb{C}}((s_2^*)^{-1})_{\mathbb{C}}\big) \quad (\because \text{主張 3.13 を} K=\mathbb{C}\ \text{で})\\
&= 1_{\mathbb{C}}\exp(0_{\mathbb{C}})\big((s_2^*)_{\mathbb{C}}((s_2^*)^{-1})_{\mathbb{C}}\big) \quad (\because i\theta+(-i\theta)=0_{\mathbb{C}})\\
&= 1_{\mathbb{C}}1_{\mathbb{C}}\big((s_2^*)_{\mathbb{C}}((s_2^*)^{-1})_{\mathbb{C}}\big) \quad (\because \text{主張 3.14 を} K=\mathbb{C}\ \text{で})\\
&= 1_{\mathbb{C}}1_{\mathbb{C}}\big(s_2^*(s_2^*)^{-1}\big)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 1.29})\\
&= 1_{\mathbb{C}}1_{\mathbb{C}}(1)_{\mathbb{C}} \quad (\because s_2^*(s_2^*)^{-1}=1)\\
&= 1_{\mathbb{C}}1_{\mathbb{C}}1_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 1.13 の略記} 1_{\mathbb{C}}=(1)_{\mathbb{C}})\\
&= 1_{\mathbb{C}} \quad (\because 1_{\mathbb{C}}\ \text{は積の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

したがって $a(\theta)\neq 0_{\mathbb{C}}$ である。実際 $a(\theta)=0_{\mathbb{C}}$ と仮定すると

$$
\begin{aligned}
1_{\mathbb{C}} &= a(\theta)\,b(\theta) \quad (\because \text{直前の鎖})\\
&= 0_{\mathbb{C}}\,b(\theta) \quad (\because \text{仮定} a(\theta)=0_{\mathbb{C}})\\
&= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 1.58})
\end{aligned}
$$

となり、$1_{\mathbb{C}}\neq 0_{\mathbb{C}}$（主張 1.56）に反する。$a(\theta)\,w(\theta)=0_{\mathbb{C}}$ と $w(\theta)=0_{\mathbb{C}}$ は同値である。前者を仮定すると

$$
\begin{aligned}
w(\theta) &= 1_{\mathbb{C}}\,w(\theta) \quad (\because 1_{\mathbb{C}}\ \text{は積の単位元。主張 1.56})\\
&= \big(b(\theta)\,a(\theta)\big)\,w(\theta) \quad (\because \text{逆元の鎖と積の可換律。主張 1.56})\\
&= b(\theta)\,\big(a(\theta)\,w(\theta)\big) \quad (\because \text{積の結合律。主張 1.56})\\
&= b(\theta)\,0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{仮定} a(\theta)\,w(\theta)=0_{\mathbb{C}})\\
&= 0_{\mathbb{C}}\,b(\theta) \quad (\because \text{積の可換律。主張 1.56})\\
&= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 1.58})
\end{aligned}
$$

であり、後者を仮定すると

$$
\begin{aligned}
a(\theta)\,w(\theta) &= a(\theta)\,0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{仮定} w(\theta)=0_{\mathbb{C}})\\
&= 0_{\mathbb{C}}\,a(\theta) \quad (\because \text{積の可換律。主張 1.56})\\
&= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{主張 1.58})
\end{aligned}
$$

である。したがって

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(\theta)=0_{\mathbb{C}} &\iff a(\theta)\,w(\theta)=0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 15.9 の定義式を積の結合律で括り直す})\\
&\iff w(\theta)=0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{直前の二つの鎖})\\
&\iff \big(c_1\cos\theta - s_1c_2,\ -\sin\theta\big)=(0,0) \quad (\because \text{準備の} w(\theta)\ \text{の成分の鎖と、定義 1.13 の} 0_{\mathbb{C}}=(0,0))\\
&\iff \begin{cases} c_1\cos\theta - s_1c_2 = 0 \\ -\sin\theta = 0 \end{cases} \quad (\because \mathbf{R}^2\ \text{の元の相等は成分ごと})\\
&\iff \begin{cases} c_1\cos\theta = s_1c_2 \\ -\sin\theta = 0 \end{cases} \quad (\because \text{第 1 式の両辺に} s_1c_2\ \text{を加える})\\
&\iff \begin{cases} c_1\cos\theta = s_1c_2 \\ \sin\theta = 0 \end{cases} \quad (\because \text{第 2 式の両辺を} -1\ \text{倍する})
\end{aligned}
$$

Step 2（$\sin\tilde{\theta}_\mu = 0$ が要求すること）。$\theta = \tilde{\theta}_\mu$ とする。実数 t に対する $\sin t = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z}:$ $t = k\pi$ と 主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M_{\mathrm{col}}}$ より

$$\begin{aligned}
\sin\tilde{\theta}_\mu = 0 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}:\ \tilde{\theta}_\mu = k\pi \quad (\because \sin t = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z}:\ t = k\pi) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z}:\ \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} = k\pi \quad (\because \text{主張 14.8 の定義}) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z}:\ \frac{2\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} = k \quad (\because \text{両辺を}\pi > 0 \text{ で割る}) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z}:\ 2\left(\mu - \tfrac{1}{2}\right) = kM_{\mathrm{col}} \quad (\because \text{両辺を}M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ 倍する}) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z}:\ 2\mu - 1 = kM_{\mathrm{col}} \quad (\because \text{分配則} 2\left(\mu - \tfrac{1}{2}\right) = 2\mu - 1)
\end{aligned}$$

このとき k は奇数である。

$2\mu - 1 = kM_{\mathrm{col}}$
$\Longrightarrow kM_{\mathrm{col}} = 2(\mu - 1) + 1 \quad (\because 2\mu - 1 = 2(\mu - 1) + 1,\ \mu - 1 \in \mathbb{Z})$
$\Longrightarrow kM_{\mathrm{col}}$ は奇数 $\quad (\because$ 奇数の定義$)$
$\Longrightarrow k$ は奇数 $\quad (\because$ 整数は偶数か奇数のどちらか一方で、$k = 2l\ (l \in \mathbb{Z})$ なら$kM_{\mathrm{col}} = 2(lM_{\mathrm{col}})$ は偶数$)$

Step 3（そのとき $\cos\tilde{\theta}_\mu = -1$）。Step 2 の $\tilde{\theta}_\mu = k\pi$ と k が奇数であることから、

$$\begin{aligned}
\cos\tilde{\theta}_\mu &= \cos(k\pi) \quad (\because \text{Step 2 の} \tilde{\theta}_\mu = k\pi) \\
&= (-1)^k \quad (\because k \in \mathbb{Z} \text{ に対し} \cos(k\pi) = (-1)^k) \\
&= -1 \quad (\because \text{Step 2 より} k \text{ は奇数})
\end{aligned}$$

Step 4（矛盾）。Step 1 の連立条件の第 1 式に Step 3 を代入すると

$$\begin{aligned}
s_1 c_2 &= c_1 \cos\tilde{\theta}_\mu \quad (\because \text{Step 1 の連立条件の第 1 式}) \\
&= c_1 \cdot (-1) \quad (\because \text{Step 3 の} \cos\tilde{\theta}_\mu = -1) \\
&= -c_1 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の積の符号規則} a \cdot (-1) = -a)
\end{aligned}$$

が要求される。これは Step 0 に反する。

$$\begin{aligned}
0 < s_1 c_2 &\quad (\because \text{Step 0 の} s_1 > 0,\ c_2 > 0 \text{ と正数の積}) \\
= -c_1 &\quad (\because \text{直前の鎖}) \\
< 0 &\quad (\because \text{Step 0 の} c_1 > 0)
\end{aligned}$$

は $0 < 0$ を導き、矛盾である。よって Step 1 の連立条件は $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ で成り立たず、$\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0_{\mathbb{C}}$。 □

主張 15.13 ($\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}$ とその帰結)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について、

$$(1)\quad \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}, \qquad (2)\quad \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|^2 < 0$$

が成り立つ。とくに $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ は ** 負の実数 ** であり（主張 15.12 より狭義に負）、

$$(3)\quad \arg^{[0,2\pi)}\Big(\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\Big) = \pi, \qquad (4)\quad \sqrt{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| > 0$$

$$(5)\quad \sqrt{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = i\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$$

も成り立つ（$\sqrt{\ }$ は 定義 1.81 の、偏角を $[0, 2\pi)$ で取る一価の写像）。また $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$。

証明. 準備。$\theta := \tilde{\theta}_\mu$ と略記する。主張 14.8 より $\theta \in \mathbb{R}$ であり、以下の共役の計算はこの実数性を使う。$c_1, c_2, s_1, s_2^* \in \mathbb{R}$ は 定義 13.15、$\cos\theta, \sin\theta, \cos(-\theta), \sin(-\theta) \in \mathbb{R}$ は 定理 1.88 の前置きのとおり全実数上の $\cos, \sin$ の値である（全実数上への拡張は未整備）。これらの実数が $\mathbb{C}$ の式に現れるときは、定義 15.9 の書き方に従い 定義 1.13 の像 $r_{\mathbb{C}}$ として読み、像の記号を省く。$r, r' \in \mathbb{R}$ について $r_{\mathbb{C}} r'_{\mathbb{C}} = (rr')_{\mathbb{C}}$（主張 1.29）なので、$c_1 \cos\theta \cdot s_1 c_2$ も実数の像である。複素共役は 定義 5.1、$-z$ は 定義 1.14、差は 定義 1.15 のものとする。

第一に、$\cos(-\theta) \cdot \sin(-\theta) \cdot \exp(i\theta)$ を $\exp(\pm i\theta)$ で書く（$-\theta \in \mathbb{R}$ なので 定理 1.88 を $-\theta$ にも適用できる）。

$$\begin{aligned}
\cos(-\theta) &= \frac{\exp(i(-\theta)) + \exp(-i(-\theta))}{2} && (\because \text{ 定理 1.88 を } -\theta \text{ に適用}) \\
&= \frac{\exp(-i\theta) + \exp(i\theta)}{2} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } i(-\theta) = -i\theta,\ -i(-\theta) = i\theta) \\
&= \frac{\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)}{2} && (\because \mathbb{C} \text{ の和の可換律}) \\
&= \cos\theta && (\because \text{ 定理 1.88})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sin(-\theta) &= \frac{\exp(i(-\theta)) - \exp(-i(-\theta))}{2i} && (\because \text{ 定理 1.88 を } -\theta \text{ に適用}) \\
&= \frac{\exp(-i\theta) - \exp(i\theta)}{2i} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } i(-\theta) = -i\theta,\ -i(-\theta) = i\theta) \\
&= -\frac{\exp(i\theta) - \exp(-i\theta)}{2i} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= -\sin\theta && (\because \text{ 定理 1.88})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cos\theta + i\sin\theta &= \frac{\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)}{2} + i\,\frac{\exp(i\theta) - \exp(-i\theta)}{2i} && (\because \text{ 定理 1.88}) \\
&= \frac{\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)}{2} + \frac{\exp(i\theta) - \exp(-i\theta)}{2} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } i/(2i) = 1/2) \\
&= \exp(i\theta) && (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

第二に、$i = (0,1)$（主張 14.8 の前置きの i）の複素共役と、$\exp(i\theta)$ の複素共役を求める。

$$\begin{aligned}
\overline{i} &= \overline{(0,1)} && (\because \text{ 主張 14.8 の前置きの } i := (0,1)) \\
&= (0,-1) && (\because \text{ 定義 5.1}) \\
&= (-1,0)(0,1) && (\because \text{ 定義 1.12 の積 } ((-1)\cdot 0 - 0\cdot 1,\ (-1)\cdot 1 + 0\cdot 0)) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})(0,1) && (\because \text{ 定義 1.13 の } (-1)_{\mathbb{C}} = (-1,0)) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\, i && (\because \text{ 主張 14.8 の前置きの } i := (0,1)) \\
&= -i && (\because \text{ 定義 1.14})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{\exp(i\theta)} &= \overline{\cos\theta + i\sin\theta} && (\because \text{ 上の } \exp(i\theta) \text{ の表示}) \\
&= \overline{\cos\theta} + \overline{i\sin\theta} && (\because \text{ 主張 5.2 を } m = 2 \text{ で}) \\
&= \overline{\cos\theta} + \overline{i}\,\overline{\sin\theta} && (\because \text{ 主張 5.3}) \\
&= \cos\theta + \overline{i}\sin\theta && (\because \text{ 主張 5.6 を 2 箇所へ}) \\
&= \cos\theta + (-i)\sin\theta && (\because \text{ 上の } \overline{i} = -i) \\
&= \cos\theta - i\sin\theta && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= \exp(-i\theta) && (\because \text{ 主張 1.89})
\end{aligned}$$

第三に、$\gamma_2(-\theta)$ を θ の量で書く。

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(-\theta) &= i\,\exp(i(-\theta))\,s_2^*\big(c_1\cos(-\theta) - i\sin(-\theta) - s_1c_2\big) && (\because \text{ 定義 15.9 を } -\theta\in\mathbb{R} \text{ に適用})\\
&= i\,\exp(-i\theta)\,s_2^*\big(c_1\cos(-\theta) - i\sin(-\theta) - s_1c_2\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } i(-\theta) = -i\theta)\\
&= i\,\exp(-i\theta)\,s_2^*\big(c_1\cos\theta - i\sin(-\theta) - s_1c_2\big) && (\because \text{ 上の } \cos(-\theta) = \cos\theta)\\
&= i\,\exp(-i\theta)\,s_2^*\big(c_1\cos\theta - i(-\sin\theta) - s_1c_2\big) && (\because \text{ 上の } \sin(-\theta) = -\sin\theta)\\
&= i\,\exp(-i\theta)\,s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

第四に、$\overline{\gamma_2(\theta)}$ を 1 段ずつ計算する。

$$
\begin{aligned}
\overline{\gamma_2(\theta)} &= \overline{i\,\exp(i\theta)\,s_2^*\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} && (\because \text{ 定義 15.9})\\
&= \overline{i\,\exp(i\theta)\,s_2^*}\;\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} && (\because \text{ 主張 5.3})\\
&= \overline{i\,\exp(i\theta)}\;\overline{s_2^*}\;\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} && (\because \text{ 主張 5.3})\\
&= \bar{i}\;\overline{\exp(i\theta)}\;\overline{s_2^*}\;\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} && (\because \text{ 主張 5.3})\\
&= (-i)\;\overline{\exp(i\theta)}\;\overline{s_2^*}\;\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} && (\because \text{ 上の } \bar{i} = -i)\\
&= (-i)\;\exp(-i\theta)\;\overline{s_2^*}\;\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} && (\because \text{ 上の } \overline{\exp(i\theta)} = \exp(-i\theta))\\
&= (-i)\;\exp(-i\theta)\;s_2^*\;\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} && (\because \text{ 主張 5.6})\\
&= (-i)\;\exp(-i\theta)\;s_2^*\big(\overline{c_1\cos\theta} - \overline{i\sin\theta} - \overline{s_1c_2}\big) && (\because \text{ 主張 5.4})\\
&= (-i)\;\exp(-i\theta)\;s_2^*\big(\overline{c_1\cos\theta} - \overline{i}\;\overline{\sin\theta} - \overline{s_1c_2}\big) && (\because \text{ 主張 5.4})\\
&= (-i)\;\exp(-i\theta)\;s_2^*\big(\overline{c_1\cos\theta} - \bar{i}\;\overline{\sin\theta} - \overline{s_1c_2}\big) && (\because \text{ 主張 5.3})\\
&= (-i)\;\exp(-i\theta)\;s_2^*\big(c_1\cos\theta - \bar{i}\sin\theta - s_1c_2\big) && (\because \text{ 主張 5.6 を 3 箇所へ})\\
&= (-i)\;\exp(-i\theta)\;s_2^*\big(c_1\cos\theta - (-i)\sin\theta - s_1c_2\big) && (\because \text{ 上の } \bar{i} = -i)\\
&= (-i)\;\exp(-i\theta)\;s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\\
&= -\Big(i\,\exp(-i\theta)\,s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big)\Big) && (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\\
&= -\gamma_2(-\theta) && (\because \text{ 上の } \gamma_2(-\theta) \text{ の表示})
\end{aligned}
$$

第五に、$\arctan 0 = 0 \cdot \sin(\pi/2) = 1 \cdot \cos(\pi/2) = 0 \cdot 0 < \pi$ を確かめる。π は $\arcsin(1) = \pi/2$ となる実数である（注意 11.1 の円周率の項。$\pi\in\mathbb{R}$ を使うのは、弧の長さが実数だからである）。

$$
\begin{aligned}
\arctan 0 &= \arcsin\left(\frac{0}{\sqrt{1+0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}}\right) && (\because \text{ 定義 1.40})\\
&= \arcsin(0) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則 } 0/\sqrt{1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = 0)\\
&= \arcsin(\sin 0) && (\because \text{ 主張 11.24})\\
&= 0 && (\because \text{ 定義 1.38 を } 0\in[-\pi/2,\pi/2] \text{ で})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sin(\pi/2) &= \sin(\arcsin(1)) && (\because \text{ 注意 11.1 の } \arcsin(1) = \pi/2)\\
&= 1 && (\because \pi/2 = \arcsin(1)\in[-\pi/2,\pi/2] \text{ (主張 1.37 の値域) で 定義 1.38 の } y \text{ はただ一つ。} \arcsin(1) = \pi/2 \text{ なので } y = 1)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\cos(\pi/2) &= \sqrt{1-(\sin(\pi/2))^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 定義 1.41})\\
&= \sqrt{1-1^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 上の } \sin(\pi/2) = 1)\\
&= \sqrt{0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= 0 && (\because\ 0\geq 0 \text{ かつ } 0^2 = 0 \text{ なので、定義 1.4 のただ一つの元は } 0)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\pi &= 2\arcsin(1) && (\because \text{注意 11.1 の } \arcsin(1) = \pi/2)\\
&> 2\arcsin(0) && (\because 0 < 1 \text{ と 主張 1.37 の狭義単調増加})\\
&= 2 \cdot 0 && (\because \text{上の鎖の } \arcsin(0) = 0)\\
&= 0 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

とくに $0 \leq 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi < 2\pi$ と $0 \leq \pi - 2 \cdot 0 \cdot \pi < 2\pi$ が成り立つので、主張 1.44 の整数は角度 0 と π のどちらについても 0 である。

(1) 主張 (1) の左辺から始める。

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(-\theta) &= -\big(-\gamma_2(-\theta)\big) && (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } (-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}}) = 1_{\mathbb{C}})\\
&= -\overline{\gamma_2(\theta)} && (\because \text{上の } \overline{\gamma_2(\theta)} = -\gamma_2(-\theta))
\end{aligned}
$$

(2) 主張 (2) の左辺から始める。

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= \gamma_2(\theta)\left(-\overline{\gamma_2(\theta)}\right) && (\because (1))\\
&= \gamma_2(\theta)\left((-1_{\mathbb{C}})\,\overline{\gamma_2(\theta)}\right) && (\because \text{定義 1.14})\\
&= (\gamma_2(\theta)(-1_{\mathbb{C}}))\,\overline{\gamma_2(\theta)} && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律})\\
&= ((-1_{\mathbb{C}})\,\gamma_2(\theta))\,\overline{\gamma_2(\theta)} && (\because \text{主張 1.56 の積の可換律})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\left(\gamma_2(\theta)\,\overline{\gamma_2(\theta)}\right) && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\left(\overline{\gamma_2(\theta)}\,\gamma_2(\theta)\right) && (\because \text{主張 1.56 の積の可換律})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\left(|\gamma_2(\theta)|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 5.7})\\
&= \left((-1)\,|\gamma_2(\theta)|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29})\\
&= \left(-\,|\gamma_2(\theta)|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

主張 (2) の右辺 $-|\gamma_2(\theta)|^2$ はこの実数の像として読む。この実数が負であることを示す。定義 1.74 より $|\gamma_2(\theta)| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、主張 15.12 の $\gamma_2(\theta) \neq 0_{\mathbb{C}}$ と 主張 1.75 (3) より $|\gamma_2(\theta)| \neq 0$ なので、$|\gamma_2(\theta)| > 0$ である。

$$
\begin{aligned}
0 &= 0 \cdot |\gamma_2(\theta)| && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&< |\gamma_2(\theta)|\,|\gamma_2(\theta)| && (\because 0 < |\gamma_2(\theta)| \text{ の両辺に正の実数 } |\gamma_2(\theta)| \text{ を掛ける})\\
&= |\gamma_2(\theta)|^2 && (\because \text{実数の 2 乗の定義})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
-\,|\gamma_2(\theta)|^2 &< -0 && (\because \text{直前の鎖の } 0 < |\gamma_2(\theta)|^2 \text{ の両辺を } -1 \text{ 倍すると向きが変わる})\\
&= 0 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

$\gamma_2(-\theta) \neq 0_{\mathbb{C}}$ を背理法で示す。$\gamma_2(-\theta) = 0_{\mathbb{C}}$ と仮定すると、$\gamma_2(\theta) = (x, y)$ と成分で書いて

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(\theta) &= (x, y) && (\because \text{ 成分の置き方})\\
&= \big(x, -(-y)\big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } -(-y) = y)\\
&= \overline{(x, -y)} && (\because \text{ 定義 } 5.1)\\
&= \overline{\overline{(x, y)}} && (\because \text{ 定義 } 5.1)\\
&= \overline{\overline{\gamma_2(\theta)}} && (\because \text{ 成分の置き方})\\
&= \overline{-\gamma_2(-\theta)} && (\because \text{ 上の } \overline{\gamma_2(\theta)} = -\gamma_2(-\theta))\\
&= \overline{-0_{\mathbb{C}}} && (\because \text{ 仮定 } \gamma_2(-\theta) = 0_{\mathbb{C}})\\
&= \overline{(-1_{\mathbb{C}})\, 0_{\mathbb{C}}} && (\because \text{ 定義 } 1.14)\\
&= \overline{0_{\mathbb{C}}} && (\because \text{ 主張 } 1.59)\\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 } 5.6 \text{ を } r = 0 \text{ で})
\end{aligned}
$$

となり、主張 15.12 に反する。よって $\gamma_2(-\theta) \neq 0_{\mathbb{C}}$ である。

(3) 以下 $r := |\gamma_2(\theta)|^2 \in \mathbb{R}_{>0}$ と置く（$r > 0$ は (2) で示した)。まず $\phi_{\mathrm{polar}}((-r)_{\mathbb{C}})$ を求める。

$$
\begin{aligned}
\phi_{\mathrm{polar}}\big((-r)_{\mathbb{C}}\big) &= \phi_{\mathrm{polar}}\big((-r, 0)\big) && (\because \text{ 定義 } 1.13)\\
&= \Big[\Big(\sqrt{(-r)^2 + 0^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan\big(0/(-r)\big) + \pi\Big)\Big]_{\sim} && (\because \text{ 定義 } 1.69 \text{ の } x = -r < 0,\ y = 0 \geq 0 \text{ の場合})\\
&= \Big[\Big(\sqrt{r^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan 0 + \pi\Big)\Big]_{\sim} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= [(r,\ \arctan 0 + \pi)]_{\sim} && (\because r \geq 0 \text{ かつ } r^2 = r^2 \text{ なので、定義 } 1.4 \text{ のただ一つの元は } r)\\
&= [(r,\ \pi)]_{\sim} && (\because \text{ 準備の } \arctan 0 = 0)
\end{aligned}
$$

主張 (3) の左辺から始める。

$$
\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)) &= \arg^{[0,2\pi)}((-r)_{\mathbb{C}}) && (\because \text{ (2)})\\
&= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2\big(\phi_{\mathrm{polar}}((-r)_{\mathbb{C}})\big)\big) && (\because \text{ 定義 } 1.74)\\
&= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2\big([(r, \pi)]_{\sim}\big)\big) && (\because \text{ 上の } \phi_{\mathrm{polar}}((-r)_{\mathbb{C}}) \text{ の値})\\
&= s_{[0,2\pi)}\big([\pi]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because \text{ 定義 } 1.73 \text{ の } r \neq 0 \text{ の場合})\\
&= \pi - 2 \cdot 0 \cdot \pi && (\because \text{ 定義 } 1.45 \text{ と準備の、角度 } \pi \text{ の整数は } 0)\\
&= \pi && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

(4) まず $-\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)$ と $\phi_{\mathrm{polar}}(r_{\mathbb{C}})$ を求める。

$$
\begin{aligned}
-\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= (-1_{\mathbb{C}})\big(\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)\big) && (\because \text{ 定義 } 1.14)\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,(-r)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ (2)})\\
&= \big((-1)(-r)\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 } 1.29)\\
&= r_{\mathbb{C}} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\phi_{\mathrm{polar}}\big(r_{\mathbb{C}}\big) &= \phi_{\mathrm{polar}}\big((r, 0)\big) && (\because \text{ 定義 } 1.13)\\
&= \left[\left(\sqrt{r^2 + 0^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(0/r)\right)\right]_{\sim} && (\because \text{ 定義 } 1.69 \text{ の } x = r > 0 \text{ の場合})\\
&= \Big[\Big(\sqrt{r^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan 0\Big)\Big]_{\sim} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= [(r,\ \arctan 0)]_{\sim} && (\because \text{ 定義 } 1.4 \text{ のただ一つの元は } r)\\
&= [(r,\ 0)]_{\sim} && (\because \text{ 準備の } \arctan 0 = 0)
\end{aligned}
$$

代表元 $(r, 0)$ の角度 0 の整数は準備により 0 である。主張 (4) の左辺から始める。

$$
\begin{aligned}
\sqrt{-\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)} &= \sqrt{r_{\mathbb{C}}} && (\because \text{上の } -\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = r_{\mathbb{C}}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{0}{2} - 0\cdot\pi\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because \text{主張 1.82 を代表元 } (r,0) \text{ と整数 0 で}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\big(\big[\big(|\gamma_2(\theta)|,\ \tfrac{0}{2} - 0\cdot\pi\big)\big]_{\sim}\big) && (\because |\gamma_2(\theta)| \geq 0 \text{ かつ } |\gamma_2(\theta)|^2 = r \text{ なので、定義 1.4}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}([(|\gamma_2(\theta)|,\ 0)]_{\sim}) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \big(|\gamma_2(\theta)|\cos 0,\ |\gamma_2(\theta)|\sin 0\big) && (\because \text{定義 1.70}) \\
&= \big(|\gamma_2(\theta)|\cdot 1,\ |\gamma_2(\theta)|\sin 0\big) && (\because \text{主張 11.25}) \\
&= \big(|\gamma_2(\theta)|\cdot 1,\ |\gamma_2(\theta)|\cdot 0\big) && (\because \text{主張 11.24}) \\
&= \big(|\gamma_2(\theta)|,\ 0\big) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則を 2 箇所へ}) \\
&= |\gamma_2(\theta)|_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.13})
\end{aligned}
$$

主張 (4) の右辺 $|\gamma_2(\theta)|$ はこの実数の像として読み、$|\gamma_2(\theta)| > 0$ は (2) で示した。

(5) 上の $\phi_{\mathrm{polar}}((-r)_{\mathbb{C}}) = [(r,\pi)]_{\sim}$ の代表元 (r,π) の角度 π の整数は準備により 0 である。主張 (5) の左辺から始める。

$$
\begin{aligned}
\sqrt{\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)} &= \sqrt{(-r)_{\mathbb{C}}} && (\because (2)) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\pi}{2} - 0\cdot\pi\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because \text{主張 1.82 を代表元 } (r,\pi) \text{ と整数 0 で}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\big(\big[\big(|\gamma_2(\theta)|,\ \tfrac{\pi}{2} - 0\cdot\pi\big)\big]_{\sim}\big) && (\because |\gamma_2(\theta)| \geq 0 \text{ かつ } |\gamma_2(\theta)|^2 = r \text{ なので、定義 1.4}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\big(\big[\big(|\gamma_2(\theta)|,\ \tfrac{\pi}{2}\big)\big]_{\sim}\big) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \big(|\gamma_2(\theta)|\cos\tfrac{\pi}{2},\ |\gamma_2(\theta)|\sin\tfrac{\pi}{2}\big) && (\because \text{定義 1.70}) \\
&= \big(|\gamma_2(\theta)|\cdot 0,\ |\gamma_2(\theta)|\sin\tfrac{\pi}{2}\big) && (\because \text{準備の } \cos(\pi/2) = 0) \\
&= \big(|\gamma_2(\theta)|\cdot 0,\ |\gamma_2(\theta)|\cdot 1\big) && (\because \text{準備の } \sin(\pi/2) = 1) \\
&= \big(0,\ |\gamma_2(\theta)|\big) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則を 2 箇所へ}) \\
&= (0,1)\big(|\gamma_2(\theta)|,\ 0\big) && (\because \text{定義 1.12 の積 } (0\cdot|\gamma_2(\theta)| - 1\cdot 0,\ 0\cdot 0 + 1\cdot|\gamma_2(\theta)|)) \\
&= i\big(|\gamma_2(\theta)|,\ 0\big) && (\because \text{主張 14.8 の前置きの } i := (0,1)) \\
&= i\,|\gamma_2(\theta)|_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.13})
\end{aligned}
$$

□

主張 15.14 ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ の固有値と固有ベクトル)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.15) について、$A(\tilde{\theta}_\mu)$ の固有値（定義 1.99）は

$$
\lambda_{\pm,\mu} := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \pm \Big|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\Big| \in \mathbb{R}
$$

の 2 つであり（主張 15.13 (4) により根号は正の実数、したがって $\lambda_{+,\mu} \neq \lambda_{-,\mu}$）、$c \in \mathbb{C}^\times$ について

$$
v_{\pm,\mu} := c\begin{pmatrix} \pm i\sqrt{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \\ \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \end{pmatrix} = c\begin{pmatrix} \mp\Big|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\Big| \\ \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \end{pmatrix}
$$

は $A(\tilde{\theta}_\mu)$ の $\lambda_{\pm,\mu}$ に属する固有ベクトル（定義 1.98）である。主張 15.12 により $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ なので、場合分けは要らない。

証明. 以下 $\theta := \tilde{\theta}_\mu$、$g_1 := \gamma_1(\theta) \in \mathbb{R}$、$a := \gamma_2(\theta) \in \mathbb{C}$、$b := \gamma_2(-\theta) \in \mathbb{C}$、$r := |a| \in \mathbb{R}_{>0}$ と略記する（主張 15.12 より $a \neq 0$ なので $r > 0$）。主張 15.13 より $b = -\bar{a}$、$ab = -r^2$、$\sqrt{-ab} = r$、$\sqrt{ab} = ir$ である。

Step 1（固有値がこの 2 つに限ること）。定義 15.9 より $A(\theta) = \begin{pmatrix} g_1 & a \\ -b & g_1 \end{pmatrix}$ である。$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$（定義 2.2）とおき、$\lambda \in \mathbb{C}$ について

λ は$A(\theta)$ の固有値

$\iff \exists v \in \mathbb{C}^2,\ v \neq 0$ かつ $A(\theta)v = \lambda v$ $(\because$ 定義 1.99$)$

$\iff \exists v \in \mathbb{C}^2,\ v \neq 0$ かつ $A(\theta)v - \lambda v = 0$ $(\because$ 主張 1.95 を2 行1 列の行列$A(\theta)v,\ \lambda v$ に適用$)$

$\iff \exists v \in \mathbb{C}^2,\ v \neq 0$ かつ $A(\theta)v - \lambda(Iv) = 0$ $(\because$ 主張 2.16 を2 行1 列の行列v に適用$)$

$\iff \exists v \in \mathbb{C}^2,\ v \neq 0$ かつ $A(\theta)v - (\lambda I)v = 0$ $(\because$ 主張 2.18 を$a := \lambda,\ A := I,\ B := v$ に適用し、右辺から左辺へ$)$

$\iff \exists v \in \mathbb{C}^2,\ v \neq 0$ かつ $(A(\theta) - \lambda I)\, v = 0$ $(\because$ 主張 1.96$)$

$\iff \det(A(\theta) - \lambda I) = 0$ $(\because$ 主張 1.101 を$B := A(\theta) - \lambda I$ に適用$)$

準備として、因数分解の恒等式を確かめる。

$$
\begin{aligned}
(\lambda - (g_1 + r))(\lambda - (g_1 - r)) &= \lambda^2 - (g_1 - r)\lambda - (g_1 + r)\lambda + (g_1 + r)(g_1 - r) \quad (\because \text{分配則}) \\
&= \lambda^2 - 2g_1\lambda + (g_1 + r)(g_1 - r) \quad (\because \text{同類項の統合}) \\
&= \lambda^2 - 2g_1\lambda + \left(g_1^2 - g_1 r + r g_1 - r^2\right) \quad (\because \text{分配則}) \\
&= \lambda^2 - 2g_1\lambda + \left(g_1^2 - r^2\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則と加法逆元})
\end{aligned}
$$

そこで

$$
\begin{aligned}
\det(A(\theta) - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} A(\theta)_{11} - (\lambda I)_{11} & A(\theta)_{12} - (\lambda I)_{12} \\ A(\theta)_{21} - (\lambda I)_{21} & A(\theta)_{22} - (\lambda I)_{22} \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 1.92}) \\
&= \det \begin{pmatrix} A(\theta)_{11} - \lambda I_{11} & A(\theta)_{12} - \lambda I_{12} \\ A(\theta)_{21} - \lambda I_{21} & A(\theta)_{22} - \lambda I_{22} \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \det \begin{pmatrix} A(\theta)_{11} - \lambda \delta_{11} & A(\theta)_{12} - \lambda \delta_{12} \\ A(\theta)_{21} - \lambda \delta_{21} & A(\theta)_{22} - \lambda \delta_{22} \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 2.2}) \\
&= \det \begin{pmatrix} A(\theta)_{11} - \lambda \cdot 1 & A(\theta)_{12} - \lambda \cdot 0 \\ A(\theta)_{21} - \lambda \cdot 0 & A(\theta)_{22} - \lambda \cdot 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 2.1}) \\
&= \det \begin{pmatrix} A(\theta)_{11} - \lambda & A(\theta)_{12} - \lambda \cdot 0 \\ A(\theta)_{21} - \lambda \cdot 0 & A(\theta)_{22} - \lambda \end{pmatrix} \quad (\because x \cdot 1 = x \text{ を 2 成分へ同時適用}) \\
&= \det \begin{pmatrix} A(\theta)_{11} - \lambda & A(\theta)_{12} - 0 \\ A(\theta)_{21} - 0 & A(\theta)_{22} - \lambda \end{pmatrix} \quad (\because x \cdot 0 = 0 \text{ を 2 成分へ同時適用}) \\
&= \det \begin{pmatrix} A(\theta)_{11} - \lambda & A(\theta)_{12} \\ A(\theta)_{21} & A(\theta)_{22} - \lambda \end{pmatrix} \quad (\because y - 0 = y \text{ を 2 成分へ同時適用}) \\
&= \det \begin{pmatrix} g_1 - \lambda & a \\ -b & g_1 - \lambda \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 15.9}) \\
&= (g_1 - \lambda)(g_1 - \lambda) - a \cdot (-b) \quad (\because \text{定義 1.100}) \\
&= (g_1 - \lambda)(g_1 - \lambda) + ab \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } (-a \cdot (-b) = ab)) \\
&= g_1^2 - g_1\lambda - \lambda g_1 + \lambda^2 + ab \quad (\because \text{分配則}) \\
&= g_1^2 - g_1\lambda - g_1\lambda + \lambda^2 + ab \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則}) \\
&= g_1^2 - 2g_1\lambda + \lambda^2 + ab \quad (\because \text{同類項の統合}) \\
&= \lambda^2 - 2g_1\lambda + \left(g_1^2 + ab\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の交換則と結合則}) \\
&= \lambda^2 - 2g_1\lambda + \left(g_1^2 - r^2\right) \quad (\because \text{主張 15.13 } (ab = -r^2)) \\
&= (\lambda - (g_1 + r))(\lambda - (g_1 - r)) \quad (\because \text{準備の因数分解の恒等式})
\end{aligned}
$$

である。$\mathbb{C}$ は体（主張 1.56）ゆえ零因子を持たないから、この積が 0 になるのは $\lambda = g_1 \pm r$ のときに限る。主張 15.13 (4) の $\sqrt{-ab} = r$ より、これは statement の $\lambda_{\pm,\mu}$ に一致する。$r > 0$ なので $\lambda_{+,\mu} - \lambda_{-,\mu} = 2r \neq 0$。

Step 2（$v_{\pm,\mu}$ が固有ベクトルであること）。主張 15.13 (5) より $\pm i\sqrt{ab} = \pm i \cdot ir = \mp r$ なので、statement の 2 つの表示は一致する。$c = 1$ として $v_\pm := (\mp r,\ b)^{\mathsf{T}}$ を代入すると、$b = -\bar{a}$ と $a\bar{a} = r^2$ より第 1 成分は

$$\begin{aligned}
(A(\theta)v_\pm)_1 &= g_1(\mp r) + a\,b \quad (\because \text{定義 15.9 と行列とベクトルの積の定義}) \\
&= \mp g_1 r + a\,(-\bar{a}) \quad (\because \text{主張 15.13 } (b = -\bar{a})) \\
&= \mp g_1 r - r^2 \quad (\because \text{主張 1.75 } (a\bar{a} = |a|^2 = r^2)) \\
&= (g_1 \pm r)\,(\mp r) \quad (\because \text{分配則 } ((g_1 \pm r)\,(\mp r) = \mp g_1 r - r^2)) \\
&= \lambda_{\pm,\mu}\,(v_\pm)_1 \quad (\because \lambda_{\pm,\mu} = g_1 \pm r,\ (v_\pm)_1 = \mp r)
\end{aligned}$$

定義 15.9、主張 15.13、主張 1.75 が各行の根拠である。

第 2 成分は

$$\begin{aligned}
(A(\theta)v_\pm)_2 &= (-b)(\mp r) + g_1 b \quad (\because \text{定義 15.9 と行列とベクトルの積の定義}) \\
&= b(\pm r) + g_1 b \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } ((-b)(\mp r) = b(\pm r))) \\
&= (\pm r)\,b + g_1 b \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則}) \\
&= (\pm r + g_1)\,b \quad (\because \text{分配則で} b \text{ を括り出す}) \\
&= (g_1 \pm r)\,b \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の交換則（下の符号では} g_1 + (-r) = g_1 - r \text{ と書く）}) \\
&= \lambda_{\pm,\mu}\,(v_\pm)_2 \quad (\because \lambda_{\pm,\mu} = g_1 \pm r,\ (v_\pm)_2 = b)
\end{aligned}$$

第 1 行の根拠は 定義 15.9 である。

よって $A(\theta)v_\pm = \lambda_{\pm,\mu}v_{\pm}$。$b \neq 0$（主張 15.13）より $v_\pm \neq 0$ であり、これは固有ベクトルである。$c \in \mathbb{C}^\times$ 倍しても固有ベクトルであることは次による。

$$\begin{aligned}
A(\theta)(cv) &= c\,A(\theta)v \quad (\because \text{行列とベクトルの積の各成分の分配則（スカラー倍は積の外へ出る）}) \\
&= c(\lambda v) \quad (\because \text{上で示した} A(\theta)v = \lambda v \text{ の代入}) \\
&= \lambda(cv) \quad (\because \text{複素数の積の可換性と、ベクトルのスカラー倍の結合})
\end{aligned}$$

また $v \neq 0$ なので $v_k \neq 0$ となる成分 $k \in \{1, 2\}$ があり、

$$\begin{aligned}
(cv)_k &= c\,v_k \quad (\because \text{ベクトルのスカラー倍は成分ごとの積}) \\
&\neq 0 \quad (\because c \neq 0,\ v_k \neq 0 \text{ と、} \mathbb{C} \text{ は体ゆえ零因子を持たないこと（主張 1.56）})
\end{aligned}$$

であるから $cv \neq 0$。よって cv も λ に属する固有ベクトル（定義 1.98）である。 □

主張 15.15 ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化$(\check{P}_\mu,\ \check{D}_\mu)$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について、主張 15.14 の任意定数を $c = \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}$ と選んで

$$\check{P}_\mu := \begin{pmatrix} \dfrac{-\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} & \dfrac{+\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \\ \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} & \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \end{pmatrix}, \qquad \check{D}_\mu := \begin{pmatrix} \lambda_{+,\mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,\mu} \end{pmatrix}$$

とおく。このとき

$$\det \check{P}_\mu = \frac{-\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2M_{\mathrm{col}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \neq 0_{\mathbb{C}}, \qquad A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu\,\check{D}_\mu\,\check{P}_\mu^{-1}$$

が成り立つ。

証明. 主張 15.14 の記号 $a := \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$、$b := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$r := |a|$ を使う。

Step 1（各成分が定まること）。主張 15.12 と 主張 15.13 より $a \neq 0$ かつ $b \neq 0$。また $M_{\mathrm{col}} \geq 2$ より $\sqrt{M_{\mathrm{col}}} > 0$（主張 1.3）。よって分母 $2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\, b \neq 0$ であり、$c := \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\, b} \in \mathbb{C}^\times$ が定まって $\check{P}_\mu$ の 4 成分はすべて定まる。

Step 2（2 つの列が固有ベクトルであること）。主張 15.14 の $v_{\pm,\mu} = c(\mp r,\ b)^{\mathsf{T}}$ に上の c を代入すると、第 2 成分は次の鎖で定まる。

$$\begin{aligned} cb &= \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\, b}\, b \quad (\because c \text{ の定義}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \quad (\because b \neq 0 \text{ と} \mathbb{C} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

したがって $v_{+,\mu}, v_{-,\mu}$ はそれぞれ $\check{P}_\mu$ の第 1 列・第 2 列に一致する。行列の積を列ごとに見れば

$$\begin{aligned} A(\tilde{\theta}_\mu)\,\check{P}_\mu &= \Big(A(\tilde{\theta}_\mu)v_{+,\mu} \quad A(\tilde{\theta}_\mu)v_{-,\mu}\Big) \quad (\because \text{行列の積を列ごとに見た}) \\ &= (\lambda_{+,\mu}v_{+,\mu} \quad \lambda_{-,\mu}v_{-,\mu}) \quad (\because \text{主張 15.14 を 2 列へ同時適用}) \\ &= \check{P}_\mu \check{D}_\mu \quad (\because \check{D}_\mu = \mathrm{diag}(\lambda_{+,\mu}, \lambda_{-,\mu}) \text{ の右乗が列ごとのスカラー倍}) \end{aligned}$$

Step 3（$\det \check{P}_\mu$）。定義 1.100 より

$$\begin{aligned} \det \check{P}_\mu &= \frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\, b} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} - \frac{+r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\, b} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \quad (\because \text{定義 1.100}) \\ &= \frac{-r}{4M_{\mathrm{col}}\, b} - \frac{+r}{4M_{\mathrm{col}}\, b} \quad \left(\because \left(2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\right)^2 = 4M_{\mathrm{col}}\right) \\ &= \frac{-r}{4M_{\mathrm{col}}\, b} + \frac{-r}{4M_{\mathrm{col}}\, b} \quad (\because -\tfrac{+r}{4M_{\mathrm{col}}\, b} = \tfrac{-r}{4M_{\mathrm{col}}\, b}。\ \mathbb{C} \text{ の四則}) \\ &= 2 \cdot \frac{-r}{4M_{\mathrm{col}}\, b} \quad (\because \text{同類項の統合}) \\ &= \frac{-r}{2M_{\mathrm{col}}\, b} \quad (\because 2M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ と} \mathbb{C} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

$r > 0$、$2M_{\mathrm{col}} \neq 0$、$b \neq 0$ と $\mathbb{C}$ が零因子を持たないこと（主張 1.56）から $\det \check{P}_\mu \neq 0_{\mathbb{C}}$。

Step 4（対角化）。$\det \check{P}_\mu \neq 0$ より $\check{P}_\mu^{-1}$ が存在するので、Step 2 の両辺に右から掛けて次の鎖を得る。

$$\begin{aligned} A(\tilde{\theta}_\mu) &= A(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{P}_\mu \check{P}_\mu^{-1}\right) \quad (\because \check{P}_\mu \check{P}_\mu^{-1} = I \text{ と積の単位元}) \\ &= \left(A(\tilde{\theta}_\mu)\check{P}_\mu\right)\check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \\ &= \left(\check{P}_\mu \check{D}_\mu\right)\check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{Step 2}) \\ &= \check{P}_\mu \check{D}_\mu \check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \end{aligned}$$

□

主張 15.16 ($\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1$)**.** 定義 13.15 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について、

$$\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1, \qquad \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 + \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = 1, \qquad \lambda_{+,\mu}\,\lambda_{-,\mu} = 1$$

が成り立つ（第 1・第 2 の等式は $\mathbb{C}$ の等式で、実数 $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$ と 1 は 定義 1.13 の像として読む。$\lambda_{\pm,\mu} \in \mathbb{R}$（主張 15.14）なので第 3 の等式は $\mathbb{R}$ の等式である）。とくに 主張 15.13 (2) と合わせて

$$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 = 1 + \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|^2$$

が成り立つ（$\mathbb{R}$ の等式）。

証明. 準備。$\theta := \tilde{\theta}_\mu$ と略記する。主張 14.8 より $\theta \in \mathbb{R}$ である。$c_1, s_1, c_2, c_2^*, s_2^* \in \mathbb{R}$ は 定義 12.26 の略記、$u := \cos\theta \in \mathbb{R}$・$v := \sin\theta \in \mathbb{R}$ は 定理 1.88 の前置きのとおり全実数上の $\cos, \sin$ の値（全実数上への拡張は未整備）、$a_0 := c_1 u - s_1 c_2 \in \mathbb{R}$、$r := |\gamma_2(\theta)| \in \mathbb{R}$（定義 1.74）とおく。$i := (0_\mathbb{R}, 1_\mathbb{R})$ は 主張 14.8 の前置きの虚数単位、$e_+ := \exp(i\theta) \in \mathbb{C}$・$e_- := \exp(-i\theta) \in \mathbb{C}$ とする。実数が $\mathbb{C}$ の式に現れるときは、定義 15.9 の書き方に従い 定義 1.13 の像 $x_\mathbb{C}$ として読み、像の記号を省く。$x, y \in \mathbb{R}$ について $x_\mathbb{C} y_\mathbb{C} = (xy)_\mathbb{C}$（主張 1.29）、$x_\mathbb{C} + y_\mathbb{C} = (x+y)_\mathbb{C}$（主張 1.20 を $m = 2$ で）であり、差は 定義 1.15 により $-1_\mathbb{C}$ 倍（定義 1.14。$-1_\mathbb{C}$ は 定義 1.13 の略記 $(-1)_\mathbb{C}$）の和なので、実数の和・差・積の像は像の和・差・積である。$\mathbb{C}$ の和と積の結合律・可換律・分配律・単位元・零元・加法逆元・乗法の逆元は 主張 1.56 による。$w \neq 0_\mathbb{C}$ について w^{-1} はその乗法の逆元、商は $z/w := z\,w^{-1}$ とする。$2_\mathbb{C} = (2, 0)$、$i = (0, 1)$、$2_\mathbb{C}\, i = (2\cdot 0 - 0\cdot 1,\ 2\cdot 1 + 0\cdot 0) = (0, 2)$（定義 1.12 の積）は、いずれも成分の一つが 0 でないので $0_\mathbb{C} = (0, 0)$ と異なり、逆元を持つ。

第一に、$-(-z) = z (z \in \mathbb{C})$、$ii = -1_\mathbb{C}$、$e_+ e_- = 1_\mathbb{C}$、$x, y \in \mathbb{C}$ についての $(x-iy)(x+iy) = x^2+y^2$ と $(x-y)^2 = x^2 - 2_\mathbb{C} xy + y^2$、$u + iv = e_+$、$u^2 + v^2 = 1_\mathbb{C}$ を示す。

$$\begin{aligned}
-(-z) &= (-1_\mathbb{C})\big((-1_\mathbb{C})z\big) && (\because \text{定義 1.14 を 2 箇所へ})\\
&= \big((-1_\mathbb{C})(-1_\mathbb{C})\big)z && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律})\\
&= \big((-1)(-1)\big)_\mathbb{C}\, z && (\because \text{主張 1.29})\\
&= 1_\mathbb{C}\, z && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= z && (\because \text{主張 1.56 の積の単位元})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
ii &= (0,1)(0,1) && (\because \text{主張 14.8 の前置きの } i := (0,1))\\
&= (0\cdot 0 - 1\cdot 1,\ 0\cdot 1 + 1\cdot 0) && (\because \text{定義 1.12 の積})\\
&= (-1, 0) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= -1_\mathbb{C} && (\because \text{定義 1.13})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
e_+ e_- &= \exp(i\theta)\exp(-i\theta) && (\because e_\pm \text{ の定義})\\
&= \exp\big(i\theta + (-i\theta)\big) && (\because \text{主張 3.13 を } K = \mathbb{C} \text{ で})\\
&= \exp(0_\mathbb{C}) && (\because \text{主張 1.56 の加法逆元})\\
&= 1_\mathbb{C} && (\because \text{主張 3.14 を } K = \mathbb{C} \text{ で})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(x-iy)(x+iy) &= \big(x + (-(iy))\big)(x+iy) && (\because \text{定義 1.15})\\
&= \big(x + (-1_\mathbb{C})(iy)\big)(x+iy) && (\because \text{定義 1.14})\\
&= xx + x(iy) + \big((-1_\mathbb{C})(iy)\big)x + \big((-1_\mathbb{C})(iy)\big)(iy) && (\because \text{主張 1.56 の分配律})\\
&= xx + (iy)x + (-1_\mathbb{C})\big((iy)x\big) + (-1_\mathbb{C})\big((iy)(iy)\big) && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律・可換律})\\
&= xx + \Big((iy)x + (-1_\mathbb{C})\big((iy)x\big)\Big) + (-1_\mathbb{C})\big((iy)(iy)\big) && (\because \text{主張 1.56 の和の結合律})\\
&= xx + \Big((iy)x + \big(-((iy)x)\big)\Big) + (-1_\mathbb{C})\big((iy)(iy)\big) && (\because \text{定義 1.14})\\
&= xx + 0_\mathbb{C} + (-1_\mathbb{C})\big((iy)(iy)\big) && (\because \text{主張 1.56 の加法逆元})\\
&= xx + (-1_\mathbb{C})\big((iy)(iy)\big) && (\because \text{主張 1.56 の零元})\\
&= xx + (-1_\mathbb{C})\big((ii)(yy)\big) && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律・可換律})\\
&= xx + (-1_\mathbb{C})\big((-1_\mathbb{C})(yy)\big) && (\because \text{上の } ii = -1_\mathbb{C})\\
&= xx + \big(-(-(yy))\big) && (\because \text{定義 1.14 を 2 箇所へ})\\
&= xx + yy && (\because \text{上の } -(-z) = z)\\
&= x^2 + y^2 && (\because \text{定義 1.64 より } z^2 = (1_\mathbb{C} z)z = zz \text{ を 2 箇所へ})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
(x-y)^2 &= (x-y)(x-y) && (\because \text{定義 1.64 より } z^2 = zz)\\
&= \big(x+(-y)\big)\big(x+(-y)\big) && (\because \text{定義 1.15 を 2 箇所へ})\\
&= \big(x+(-1_{\mathbb{C}})y\big)\big(x+(-1_{\mathbb{C}})y\big) && (\because \text{定義 1.14 を 2 箇所へ})\\
&= xx + x\big((-1_{\mathbb{C}})y\big) + \big((-1_{\mathbb{C}})y\big)x + \big((-1_{\mathbb{C}})y\big)\big((-1_{\mathbb{C}})y\big) && (\because \text{主張 1.56 の分配律})\\
&= xx + (-1_{\mathbb{C}})(xy) + (-1_{\mathbb{C}})(xy) + \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)(yy) && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律・可換律})\\
&= xx + \big((-1_{\mathbb{C}}) + (-1_{\mathbb{C}})\big)(xy) + \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)(yy) && (\because \text{主張 1.56 の分配律})\\
&= xx + \big((-1) + (-1)\big)_{\mathbb{C}}(xy) + \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)(yy) && (\because \text{主張 1.20 を } m=2 \text{ で})\\
&= xx + \big((-1) + (-1)\big)_{\mathbb{C}}(xy) + \big((-1)(-1)\big)_{\mathbb{C}}(yy) && (\because \text{主張 1.29})\\
&= xx + \big((-1)\cdot 2\big)_{\mathbb{C}}(xy) + 1_{\mathbb{C}}(yy) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則を 2 箇所へ})\\
&= xx + \big((-1_{\mathbb{C}})\,2_{\mathbb{C}}\big)(xy) + 1_{\mathbb{C}}(yy) && (\because \text{主張 1.29})\\
&= xx + (-1_{\mathbb{C}})\big(2_{\mathbb{C}}(xy)\big) + 1_{\mathbb{C}}(yy) && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律})\\
&= xx + (-1_{\mathbb{C}})\big(2_{\mathbb{C}}(xy)\big) + yy && (\because \text{主張 1.56 の積の単位元})\\
&= xx + \big(-(2_{\mathbb{C}}xy)\big) + yy && (\because \text{定義 1.14})\\
&= xx - 2_{\mathbb{C}}xy + yy && (\because \text{定義 1.15})\\
&= x^2 - 2_{\mathbb{C}}xy + y^2 && (\because \text{定義 1.64 より } z^2 = zz \text{ を 2 箇所へ})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
u+iv &= \frac{e_+ + e_-}{2} + i\,\frac{e_+ - e_-}{2i} && (\because \text{定理 1.88 を 2 箇所へ})\\
&= (e_+ + e_-)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} + i\big((e_+ - e_-)(2_{\mathbb{C}}i)^{-1}\big) && (\because \text{準備の商 } z/w := zw^{-1} \text{ を 2 箇所へ})\\
&= (e_+ + e_-)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} + (e_+ - e_-)\big(i\,(2_{\mathbb{C}}i)^{-1}\big) && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律・可換律})\\
&= (e_+ + e_-)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} + (e_+ - e_-)\big(i\,(2_{\mathbb{C}}^{-1}i^{-1})\big) && (\because \text{主張 1.56 の乗法の逆元の一意性より } (2_{\mathbb{C}}i)^{-1} = 2_{\mathbb{C}}^{-1}i^{-1})\\
&= (e_+ + e_-)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} + (e_+ - e_-)\big(2_{\mathbb{C}}^{-1}(i\,i^{-1})\big) && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律・可換律})\\
&= (e_+ + e_-)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} + (e_+ - e_-)\big(2_{\mathbb{C}}^{-1}1_{\mathbb{C}}\big) && (\because \text{主張 1.56 の乗法の逆元})\\
&= (e_+ + e_-)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} + (e_+ - e_-)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{主張 1.56 の積の単位元})\\
&= \big((e_+ + e_-) + (e_+ - e_-)\big)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{主張 1.56 の分配律})\\
&= \Big((e_+ + e_-) + \big(e_+ + (-e_-)\big)\Big)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{定義 1.15})\\
&= \Big(e_+ + e_+ + \big(e_- + (-e_-)\big)\Big)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{主張 1.56 の和の結合律・可換律})\\
&= \big(e_+ + e_+ + 0_{\mathbb{C}}\big)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{主張 1.56 の加法逆元})\\
&= \big(e_+ + e_+\big)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{主張 1.56 の零元})\\
&= \big(1_{\mathbb{C}}e_+ + 1_{\mathbb{C}}e_+\big)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{主張 1.56 の積の単位元})\\
&= \big((1_{\mathbb{C}} + 1_{\mathbb{C}})e_+\big)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{主張 1.56 の分配律})\\
&= \big((1+1)_{\mathbb{C}}e_+\big)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \text{主張 1.20 を } m=2 \text{ で})\\
&= \big(2_{\mathbb{C}}e_+\big)\,2_{\mathbb{C}}^{-1} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則 } 1+1=2)\\
&= e_+\big(2_{\mathbb{C}}\,2_{\mathbb{C}}^{-1}\big) && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律・可換律})\\
&= e_+\,1_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.56 の乗法の逆元})\\
&= e_+ && (\because \text{主張 1.56 の積の単位元})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
u^2 + v^2 &= (u-iv)(u+iv) && (\because \text{上の } (x-iy)(x+iy) = x^2+y^2 \text{ を } x=u,\ y=v \text{ で})\\
&= e_-\,(u+iv) && (\because \text{主張 1.89})\\
&= e_-\,e_+ && (\because \text{上の } u+iv = e_+)\\
&= e_+e_- && (\because \text{主張 1.56 の積の可換律})\\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because \text{上の } e_+e_- = 1_{\mathbb{C}})
\end{aligned}
$$

第二に、$\gamma_2(\theta)$・$\gamma_2(-\theta)$ とその積を a_0, v で書く。$\gamma_2(-\theta)$ は 定義 15.9 が述べる $A(\theta)$ の $(2,1)$ 成分 $-\gamma_2(-\theta)$ と 定義 14.6 の $(2,1)$ 成分を比べて得る（定義 14.6 の先頭の $-$ は 定義 1.14 の -1 倍と読む）。

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(\theta) &= i\,e_+\,s_2^*\big(c_1u - iv - s_1c_2\big) && (\because \text{ 定義 15.9})\\
&= i\,e_+\,s_2^*\big((c_1u - s_1c_2) - iv\big) && (\because \text{ 主張 1.56 の和の結合律・可換律})\\
&= i\,e_+\,s_2^*\big(a_0 - iv\big) && (\because \ a_0 \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(-\theta) &= -\big(-\gamma_2(-\theta)\big) && (\because \text{ 上の } -(-z) = z)\\
&= -A(\theta)_{2,1} && (\because \text{ 定義 15.9 の } (2,1) \text{ 成分})\\
&= -\Big(-\big(i\,e_-\,s_2^*(c_1u + iv - s_1c_2)\big)\Big) && (\because \text{ 定義 14.6 の } (2,1) \text{ 成分})\\
&= i\,e_-\,s_2^*\big(c_1u + iv - s_1c_2\big) && (\because \text{ 上の } -(-z) = z)\\
&= i\,e_-\,s_2^*\big((c_1u - s_1c_2) + iv\big) && (\because \text{ 主張 1.56 の和の結合律・可換律})\\
&= i\,e_-\,s_2^*\big(a_0 + iv\big) && (\because \ a_0 \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= \big(i\,e_+\,s_2^*(a_0 - iv)\big)\big(i\,e_-\,s_2^*(a_0 + iv)\big) && (\because \text{ 上の } \gamma_2(\theta) \text{ と } \gamma_2(-\theta) \text{ の表示})\\
&= (ii)(e_+e_-)(s_2^*s_2^*)\big((a_0 - iv)(a_0 + iv)\big) && (\because \text{ 主張 1.56 の積の結合律・可換律})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})(e_+e_-)(s_2^*s_2^*)\big((a_0 - iv)(a_0 + iv)\big) && (\because \text{ 上の } ii = -1_{\mathbb{C}})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,1_{\mathbb{C}}\,(s_2^*s_2^*)\big((a_0 - iv)(a_0 + iv)\big) && (\because \text{ 上の } e_+e_- = 1_{\mathbb{C}})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*s_2^*)\big((a_0 - iv)(a_0 + iv)\big) && (\because \text{ 主張 1.56 の積の単位元})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*s_2^*)\big(a_0^2 + v^2\big) && (\because \text{ 上の } (x - iy)(x + iy) = x^2 + y^2 \text{ を } x = a_0,\ y = v \text{ で})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\Big((s_2^*s_2^*)\big(a_0^2 + v^2\big)\Big) && (\because \text{ 主張 1.56 の積の結合律})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\Big((s_2^*)^2\big(a_0^2 + v^2\big)\Big) && (\because \text{ 定義 1.64 より } z^2 = zz)\\
&= -\Big((s_2^*)^2\big(a_0^2 + v^2\big)\Big) && (\because \text{ 定義 1.14})
\end{aligned}
$$

第三に、主張 3.21 (2) と 主張 14.5 から $c_1, s_1, c_2, c_2^*, s_2^*$ の間の $\mathbb{R}$ の関係を三つ作る（$2K_1, 2K_2^* \in \mathbb{R}$ は 定義 13.15 の結合定数と第二の双対結合定数の 2 倍である）。

$$
\begin{aligned}
c_1^2 - s_1^2 &= (\cosh 2K_1)^2 - (\sinh 2K_1)^2 && (\because \text{ 定義 12.26})\\
&= 1 && (\because \text{ 主張 3.21 (2) を } x = 2K_1 \text{ で})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 &= (\cosh 2K_2^*)^2 - (\sinh 2K_2^*)^2 && (\because \text{ 定義 12.26})\\
&= 1 && (\because \text{ 主張 3.21 (2) を } x = 2K_2^* \text{ で})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
c_2s_2^* &= s_2^*c_2 && (\because \ \mathbb{R} \text{ の積の可換律})\\
&= c_2^* && (\because \text{ 主張 14.5})
\end{aligned}
$$

第 2 の等式は、主張の左辺から次のとおりである（$\mathbb{C}$ の等式）。

$\gamma_1(\theta)^2+\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)$

$= \big(c_1c_2^* - s_1s_2^*u\big)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)$ (∵ 定義 15.9)

$= \big(c_1c_2^* - s_1s_2^*u\big)^2 + \Big(-\big((s_2^*)^2(a_0^2+v^2)\big)\Big)$ (∵ 上の $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)$ の鎖)

$= \big(c_1c_2^* - s_1s_2^*u\big)^2 - (s_2^*)^2\big(a_0^2+v^2\big)$ (∵ 定義 1.15)

$= \big(c_1c_2^* - s_1s_2^*u\big)^2 - (s_2^*)^2\big(a_0^2+1-u^2\big)$ (∵ 上の $u^2+v^2=1_{\mathbb{C}}$ を移項した $v^2=1-u^2$)

$= \big(c_1c_2^* - s_1s_2^*u\big)^2 - (s_2^*)^2\big((c_1u-s_1c_2)^2+1-u^2\big)$ (∵ a_0 の定義)

$= (c_1c_2^*)^2 - 2(c_1c_2^*)(s_1s_2^*u) + (s_1s_2^*u)^2$
$\quad - (s_2^*)^2\big((c_1u)^2 - 2(c_1u)(s_1c_2) + (s_1c_2)^2 + 1 - u^2\big)$ (∵ 上の $(x-y)^2 = x^2-2xy+y^2$ を 2 箇所へ)

$= (c_1c_2^*)(c_1c_2^*) - 2(c_1c_2^*)(s_1s_2^*u) + (s_1s_2^*u)(s_1s_2^*u)$
$\quad - (s_2^*s_2^*)\big((c_1u)(c_1u) - 2(c_1u)(s_1c_2) + (s_1c_2)(s_1c_2) + 1 - uu\big)$ (∵ 定義 1.64 より $z^2 = zz$)

$= (c_1c_1)(c_2^*c_2^*) - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + (s_1s_1)(s_2^*s_2^*)(uu)$
$\quad - (s_2^*s_2^*)\big((c_1c_1)(uu) - 2c_1s_1c_2u + (s_1s_1)(c_2c_2) + 1 - uu\big)$ (∵ 主張 1.56 の積の結合律・可換律)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2$
$\quad - (s_2^*)^2\big(c_1^2u^2 - 2c_1s_1c_2u + s_1^2c_2^2 + 1 - u^2\big)$ (∵ 定義 1.64 より $zz = z^2$)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2$
$\quad + \Big(-\big((s_2^*)^2(c_1^2u^2 - 2c_1s_1c_2u + s_1^2c_2^2 + 1 - u^2)\big)\Big)$ (∵ 定義 1.15)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2$
$\quad + \Big(-\big((s_2^*)^2\big(c_1^2u^2 + (-(2c_1s_1c_2u)) + s_1^2c_2^2 + 1 + (-u^2)\big)\big)\Big)$ (∵ 定義 1.15 を 2 箇所へ)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2$
$\quad + (-1_{\mathbb{C}})\Big((s_2^*)^2\big(c_1^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})(2c_1s_1c_2u) + s_1^2c_2^2 + 1 + (-1_{\mathbb{C}})u^2\big)\Big)$ (∵ 定義 1.14 を 3 箇所へ)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big((s_2^*)^2c_1^2u^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})\big((s_2^*)^2(-1_{\mathbb{C}})(2c_1s_1c_2u)\big)$
$\quad + (-1_{\mathbb{C}})\big((s_2^*)^2s_1^2c_2^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})\big((s_2^*)^2\cdot 1\big) + (-1_{\mathbb{C}})\big((s_2^*)^2(-1_{\mathbb{C}})u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の分配律)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big) + \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)\big(2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u\big)$
$\quad + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2c_2^2(s_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})\big((s_2^*)^2\cdot 1\big) + \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の積の結合律・可換律)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big) + \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)\big(2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u\big)$
$\quad + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2c_2^2(s_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の積の単位元)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big) + \big((-1)(-1)\big)_{\mathbb{C}}\big(2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u\big)$
$\quad + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2c_2^2(s_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \big((-1)(-1)\big)_{\mathbb{C}}\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.29 を 2 箇所へ)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big) + 1_{\mathbb{C}}\big(2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u\big)$
$\quad + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2c_2^2(s_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + 1_{\mathbb{C}}\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ $\mathbb{R}$ の四則を 2 箇所へ)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big) + 2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u$
$\quad + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2c_2^2(s_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 主張 1.56 の積の単位元を 2 箇所へ)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + \big(-(c_1^2(s_2^*)^2u^2)\big) + 2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u + \big(-(s_1^2c_2^2(s_2^*)^2)\big) + \big(-(s_2^*)^2\big) + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 定義 1.14 を 3 箇所へ)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2 - c_1^2(s_2^*)^2u^2 + 2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u - s_1^2c_2^2(s_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 定義 1.15 を 3 箇所へ)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2$
$\quad - c_1^2(s_2^*)^2u^2 + 2c_1s_1(c_2s_2^*)s_2^*u - s_1^2(c_2s_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 主張 1.56 の積の結合律・可換律)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2$
$\quad - c_1^2(s_2^*)^2u^2 + 2c_1s_1c_2^*s_2^*u - s_1^2(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 上の $c_2s_2^* = c_2^*$ を 2 箇所へ)

$= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2$
$\quad - c_1^2(s_2^*)^2u^2 + 2c_1c_2^*s_1s_2^*u - s_1^2(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 主張 1.56 の積の可換律)

$= c_1^2(c_2^*)^2 + \big(-(2c_1c_2^*s_1s_2^*u)\big) + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + \big(-(c_1^2(s_2^*)^2u^2)\big) + 2c_1c_2^*s_1s_2^*u$
$\quad + \big(-(s_1^2(c_2^*)^2)\big) + \big(-(s_2^*)^2\big) + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 定義 1.15 を 4 箇所へ)

$= c_1^2(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(2c_1c_2^*s_1s_2^*u) + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big) + 2c_1c_2^*s_1s_2^*u$
$\quad + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2(c_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 定義 1.14 を 4 箇所へ)

$= c_1^2(c_2^*)^2 + \big((-1_{\mathbb{C}})(2c_1c_2^*s_1s_2^*u) + 2c_1c_2^*s_1s_2^*u\big) + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big)$
$\quad + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2(c_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 主張 1.56 の和の結合律・可換律)

$= c_1^2(c_2^*)^2 + \big(-(2c_1c_2^*s_1s_2^*u) + 2c_1c_2^*s_1s_2^*u\big) + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big)$
$\quad + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2(c_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 定義 1.14)

$= c_1^2(c_2^*)^2 + 0_{\mathbb{C}} + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2(c_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 主張 1.56 の加法逆元)

$= c_1^2(c_2^*)^2 + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2(c_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 主張 1.56 の零元)

$= c_1^2(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2(c_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big) + (s_2^*)^2u^2$ (∵ 主張 1.56 の和の結合律・可換律)

$= c_1^2(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(s_1^2(c_2^*)^2\big) + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + s_1^2(s_2^*)^2u^2 + (-1_{\mathbb{C}})\big(c_1^2(s_2^*)^2u^2\big) + 1_{\mathbb{C}}\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の積の単位元)

$= c_1^2(c_2^*)^2 + \big((-1_{\mathbb{C}})s_1^2\big)(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + s_1^2\big((s_2^*)^2u^2\big) + \big((-1_{\mathbb{C}})c_1^2\big)\big((s_2^*)^2u^2\big) + 1_{\mathbb{C}}\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の積の結合律)

$= \big(c_1^2 + (-1_{\mathbb{C}})s_1^2\big)(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \big(s_1^2 + (-1_{\mathbb{C}})c_1^2 + 1_{\mathbb{C}}\big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の分配律を 2 箇所へ)

$= \big(c_1^2 + (-1_{\mathbb{C}})s_1^2\big)(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \big((-1_{\mathbb{C}})c_1^2 + s_1^2 + 1_{\mathbb{C}}\big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の和の可換律)

$= \big(c_1^2 + (-1_{\mathbb{C}})s_1^2\big)(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \big((-1_{\mathbb{C}})c_1^2 + 1_{\mathbb{C}}s_1^2 + 1_{\mathbb{C}}\big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の積の単位元)

$= \big(c_1^2 + (-1_{\mathbb{C}})s_1^2\big)(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \big((-1_{\mathbb{C}})c_1^2 + \big((-1)(-1)\big)_{\mathbb{C}}s_1^2 + 1_{\mathbb{C}}\big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ $\mathbb{R}$ の四則 $1=(-1)(-1)$)

$= \big(c_1^2 + (-1_{\mathbb{C}})s_1^2\big)(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \big((-1_{\mathbb{C}})c_1^2 + \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)s_1^2 + 1_{\mathbb{C}}\big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.29)

$= \big(c_1^2 + (-1_{\mathbb{C}})s_1^2\big)(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \Big(\big(-1_{\mathbb{C}}\big)c_1^2 + \big(-1_{\mathbb{C}}\big)\big((-1_{\mathbb{C}})s_1^2\big) + 1_{\mathbb{C}}\Big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の積の結合律)

$= \big(c_1^2 + (-1_{\mathbb{C}})s_1^2\big)(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \Big(\big(-1_{\mathbb{C}}\big)\big(c_1^2 + (-1_{\mathbb{C}})s_1^2\big) + 1_{\mathbb{C}}\Big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の分配律)

$= \big(c_1^2 + (-s_1^2)\big)(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \Big(\big(-1_{\mathbb{C}}\big)\big(c_1^2 + (-s_1^2)\big) + 1_{\mathbb{C}}\Big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 定義 1.14 を 2 箇所へ)

$= \big(c_1^2 - s_1^2\big)(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \Big(\big(-1_{\mathbb{C}}\big)\big(c_1^2 - s_1^2\big) + 1_{\mathbb{C}}\Big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 定義 1.15 を 2 箇所へ)

$= 1_{\mathbb{C}}(c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \big((-1_{\mathbb{C}})1_{\mathbb{C}} + 1_{\mathbb{C}}\big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 上の $c_1^2 - s_1^2 = 1$ を 2 箇所へ)

$= (c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \big((-1_{\mathbb{C}}) + 1_{\mathbb{C}}\big)\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.56 の積の単位元を 2 箇所へ)

$= (c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + \big((-1) + 1\big)_{\mathbb{C}}\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ 主張 1.20 を $m=2$ で)

$= (c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + 0_{\mathbb{C}}\big((s_2^*)^2u^2\big)$ (∵ $\mathbb{R}$ の四則 $(-1)+1=0$)

$= (c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2 + 0_{\mathbb{C}}$ (∵ 主張 1.58)

$= (c_2^*)^2 + (-1_{\mathbb{C}})(s_2^*)^2$ (∵ 主張 1.56 の零元)

$= (c_2^*)^2 + \big(-(s_2^*)^2\big)$ (∵ 定義 1.14)

$= (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2$ (∵ 定義 1.15)

第 1 の等式は、主張の左辺から次のとおりである。

$$
\begin{aligned}
\det A(\theta) &= \det \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta) & \gamma_2(\theta) \\ -\gamma_2(-\theta) & \gamma_1(\theta) \end{pmatrix} && (\because \text{ 定義 15.9}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) - \gamma_2(\theta)\big(-\gamma_2(-\theta)\big) && (\because \text{ 定義 1.100}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) + \Big(-\big(\gamma_2(\theta)(-\gamma_2(-\theta))\big)\Big) && (\because \text{ 定義 1.15}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) + (-1_{\mathbb{C}})\Big(\gamma_2(\theta)\big((-1_{\mathbb{C}})\gamma_2(-\theta)\big)\Big) && (\because \text{ 定義 1.14 を 2 箇所へ}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) + \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)\big(\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)\big) && (\because \text{ 主張 1.56 の積の結合律・可換律}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) + \big((-1)(-1)\big)_{\mathbb{C}}\big(\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)\big) && (\because \text{ 主張 1.29}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) + 1_{\mathbb{C}}\big(\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)\big) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) && (\because \text{ 主張 1.56 の積の単位元}) \\
&= \gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) && (\because \text{ 定義 1.64 より } z^2 = zz) \\
&= 1 && (\because \text{ 上の第 2 の等式の鎖})
\end{aligned}
$$

第 3 の等式。主張 15.14 より $\lambda_{\pm,\mu} = \gamma_1(\theta) \pm r \in \mathbb{R}$、主張 15.13 (2) より $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = -r^2$ である。まず $\mathbb{C}$ の中で

$$
\begin{aligned}
(\lambda_{+,\mu}\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}} &= (\lambda_{+,\mu})_{\mathbb{C}}\,(\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.29}) \\
&= \big(\gamma_1(\theta) + r\big)_{\mathbb{C}}\,\big(\gamma_1(\theta) - r\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 15.14}) \\
&= \big(\gamma_1(\theta) + r\big)\big(\gamma_1(\theta) - r\big) && (\because \text{ 準備の像の読み方（和・差の像は像の和・差。以下この鎖では像の記号を省く）}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) - \gamma_1(\theta)r + r\gamma_1(\theta) - rr && (\because \text{ 主張 1.56 の分配律}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) - r\gamma_1(\theta) + r\gamma_1(\theta) - rr && (\because \text{ 主張 1.56 の積の可換律}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) - rr && (\because \text{ 主張 1.56 の加法逆元と零元}) \\
&= \gamma_1(\theta)^2 - r^2 && (\because \text{ 定義 1.64 より } z^2 = zz \text{ を 2 箇所へ}) \\
&= \gamma_1(\theta)^2 + \big(-r^2\big) && (\because \text{ 定義 1.15}) \\
&= \gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) && (\because \text{ 主張 15.13 (2)}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 上の第 2 の等式の鎖})
\end{aligned}
$$

であり、これを実数の対として読むと

$$
\begin{aligned}
(\lambda_{+,\mu}\lambda_{-,\mu},\ 0) &= (\lambda_{+,\mu}\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.13}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 直前の鎖}) \\
&= (1,\ 0) && (\because \text{ 定義 1.13})
\end{aligned}
$$

となる。定義 1.12 の台集合 $\mathbb{R}^2$ の元は成分がすべて等しいときに限り等しいので、第 1 成分を比べて $\lambda_{+,\mu}\lambda_{-,\mu} = 1$（$\mathbb{R}$ の等式）を得る。

最後の等式。まず $\mathbb{C}$ の中で

$$
\begin{aligned}
\big(\gamma_1(\theta)^2\big)_{\mathbb{C}} &= \big(\gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta)\big)_{\mathbb{C}} && (\because \mathbb{R} \text{ の冪 } x^2 = xx) \\
&= \gamma_1(\theta)_{\mathbb{C}}\,\gamma_1(\theta)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.29}) \\
&= \big(\gamma_1(\theta)_{\mathbb{C}}\big)^2 && (\because \text{ 定義 1.64 より } zz = z^2) \\
&= \gamma_1(\theta)^2 + 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.56 の零元。以下この鎖では像の記号を省き、最後の 4 行で書き戻す}) \\
&= \gamma_1(\theta)^2 + \big(-r^2 + r^2\big) && (\because \text{ 主張 1.56 の加法逆元}) \\
&= \gamma_1(\theta)^2 + \big(\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) + r^2\big) && (\because \text{ 主張 15.13 (2)}) \\
&= \big(\gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)\big) + r^2 && (\because \text{ 主張 1.56 の和の結合律}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} + \big(r_{\mathbb{C}}\big)^2 && (\because \text{ 上の第 2 の等式の鎖}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} + r_{\mathbb{C}}\,r_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.64 より } z^2 = zz) \\
&= 1_{\mathbb{C}} + (rr)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.29}) \\
&= (1 + rr)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.20 を } m = 2 \text{ で}) \\
&= \big(1 + r^2\big)_{\mathbb{C}} && (\because \mathbb{R} \text{ の冪 } xx = x^2)
\end{aligned}
$$

であり、第 3 の等式と同じく 定義 1.13 の対の第 1 成分を比べて $\gamma_1(\theta)^2 = 1 + r^2 = 1 + |\gamma_2(\theta)|^2$（$\mathbb{R}$ の等式）を得る。 □

主張 15.17 $(\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1)$**.** 定義 13.15 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）とする。定義 15.9 の $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$ について

$$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \geq 1, \qquad \text{さらに} \qquad \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$$

が成り立つ。証明は 主張 15.10 を通じて、全実数上の cos の性質 $\cos\theta \leq 1$ $(\theta \in \mathbb{R})$ を前提とする。狭義の不等号は 主張 15.12 による。

証明. 準備。$\theta := \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$（主張 14.8）、$g := \gamma_1(\theta) \in \mathbb{R}$（定義 15.9）、$r := |\gamma_2(\theta)| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$（定義 1.74）と置く。現れる量はすべて $\mathbb{R}$ の元で、不等号は $\mathbb{R}$ の順序である（$\tilde{\theta}_\mu$ は π を含み、g は実数の exp と全実数上の cos の値から、r は非負の平方根から作るので、いずれも $\mathbb{R}$ の完備性に依る）。

$$\begin{aligned}
& g \geq \cosh(2K_1 - 2K_2^*) \text{ かつ } \cosh(2K_1 - 2K_2^*) \geq 1 && (\because \text{ 主張 15.10 を } \theta \text{ に適用}) \\
\implies\ & g \geq 1 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の順序の推移律}) \\
\implies\ & g > 0 && (\because\ g \geq 1 \text{ と } 1 > 0 \text{ に } \mathbb{R} \text{ の順序の推移律})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \gamma_2(\theta) \neq 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 15.12}) \\
\implies\ & r \neq 0 && (\because \text{ 主張 1.75 (3) の対偶}) \\
\implies\ & r > 0 && (\because \text{ 定義 1.74 の } r \geq 0 \text{ かつ } r \neq 0) \\
\implies\ & r \cdot r > 0 \cdot r && (\because\ r > 0 \text{ の両辺に } 0 < r \text{ を掛ける}) \\
\implies\ & r \cdot r > 0 && (\because\ 0 \cdot r = 0) \\
\implies\ & r^2 > 0 && (\because \text{ 平方の定義 } r^2 = r \cdot r)
\end{aligned}$$

第 1 の不等式 $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \geq 1$ は準備の $g \geq 1$ である。第 2 の不等式のために g^2 を評価する。

$$\begin{aligned}
g^2 &= 1 + r^2 && (\because \text{ 主張 15.16 } (\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 = 1 + |\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)|^2)) \\
&> 1 + 0 && (\because \text{ 準備の } r^2 > 0 \text{ の両辺に 1 を加える}) \\
&= 1 && (\because\ 0 \text{ は加法の単位元})
\end{aligned}$$

$g \leq 1$ と仮定すると

$$\begin{aligned}
g^2 &= g \cdot g && (\because \text{ 平方の定義}) \\
&\leq 1 \cdot g && (\because\ g \leq 1 \text{ の両辺に準備の } 0 < g \text{ を掛ける}) \\
&\leq 1 \cdot 1 && (\because\ g \leq 1 \text{ の両辺に } 0 < 1 \text{ を掛ける}) \\
&= 1 && (\because\ 1 \text{ は乗法の単位元})
\end{aligned}$$

となり、上の $g^2 > 1$ と合わせて $1 < g^2 \leq 1$、すなわち $1 < 1$ となって $\mathbb{R}$ の順序に矛盾する。したがって $g \leq 1$ ではなく、$\mathbb{R}$ の順序は全順序なので $g > 1$、すなわち $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$ である。 □

主張 15.18 $(\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0)$**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）とする。定義 15.11 の γ の $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ での値 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について

$$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$$

が成り立つ。

証明. 準備。$g := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$、$t := \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$ と置く。主張 15.17 より $g > 1$、とくに $g \geq 1$ であり、定義 15.11 より $t = \operatorname{arccosh}(g)$ である。したがって 主張 15.2 (1)・(2) を $y = g$ に適用して $t \geq 0$、$\cosh t = g$ である。以下の exp は 定義 3.19 のとおり実数の exp である。

$t = 0$ と仮定すると

$$\begin{aligned}
g &= \cosh t && (\because \text{準備の } \cosh t = g \text{ (主張 15.2 (2)))} \\
&= \cosh 0 && (\because \text{仮定 } t = 0) \\
&= \frac{\exp 0 + \exp(-0)}{2} && (\because \text{定義 3.19}) \\
&= \frac{\exp 0 + \exp 0}{2} && (\because -0 = 0) \\
&= \frac{1+1}{2} && (\because \text{主張 3.14 } (K = \mathbb{R})) \\
&= 1 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

となり、準備の $g > 1$ と合わせて $1 > 1$ となって $\mathbb{R}$ の順序に矛盾する。よって $t \neq 0$ であり、準備の $t \geq 0$ と合わせて $t > 0$、すなわち $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ である。 □

主張 15.19 ($\lambda_{\pm,\mu} = \exp(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について、

$$\lambda_{+,\mu} = \exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)), \qquad \lambda_{-,\mu} = \exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$$

が成り立つ。ここで $\lambda_{\pm,\mu}$ は 主張 15.14 の固有値、γ は 定義 15.11 の関数で、exp は実数の exp である。とくに $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$（主張 15.18）なので

$$\lambda_{+,\mu} > 1 > \lambda_{-,\mu} > 0$$

であり、2 つの固有値は ** 必ず分離している **。

証明. 準備。$g := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$（定義 15.9。実数の exp で作る結合定数と $\cos\tilde{\theta}_\mu$ の値なので $\mathbb{R}$ に住む）、$r := \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$（定義 1.74。非負の平方根の値）、$t := \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$（定義 15.11。定義 15.1 の実対数の値なので $\mathbb{R}$ に住む）と置く（関数 γ とその値を区別するため、値に別の文字を使う）。以下の exp は 定義 3.19 のとおり実数の exp である。準備で使う事実は次の五つである。

- (a) 主張 15.17 より $g > 1$、とくに $g \geq 1$ であり、定義 15.11 より $t = \operatorname{arccosh}(g)$ である。主張 15.2 (2) を $y = g$ に適用して $\cosh t = g$。
- (b) 主張 15.18 より $t > 0$。
- (c) $r > 0$（下の鎖）。
- (d) 主張 15.16 より $g^2 = 1 + r^2$。
- (e) 主張 15.14 より $\lambda_{+,\mu} = g + r$、$\lambda_{-,\mu} = g - r$。

$$\begin{aligned}
&\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 15.12}) \\
&\implies r \neq 0 && (\because \text{主張 1.75 (3) の対偶}) \\
&\implies r > 0 && (\because \text{定義 1.74 の } r \geq 0 \text{ かつ } r \neq 0)
\end{aligned}$$

Step 1（$\sinh t = r$）。まず両辺の平方が等しいことを示す。

$$
\begin{aligned}
(\sinh t)^2 &= (\cosh t)^2 - 1 && (\because \text{主張 3.21 (2) を } x = t \text{ に適用}) \\
&= g^2 - 1 && (\because \text{準備 (a) の } \cosh t = g) \\
&= \left(1 + r^2\right) - 1 && (\because \text{準備 (d) の } g^2 = 1 + r^2) \\
&= r^2 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

次に両者が正であることを示す。

$$
\begin{aligned}
& t > 0 && (\because \text{準備 (b)}) \\
\Longrightarrow\ & \cosh t > \sinh t \text{ かつ } \sinh t > 0 && (\because \text{主張 3.21 (3) を } x = t \text{ に適用})
\end{aligned}
$$

$r > 0$ は準備 (c) である。$a = \sinh t \in \mathbb{R}_{>0}$、$b = r \in \mathbb{R}_{>0}$ は $a^2 = b^2$ を満たすので、主張 3.21 (4) より $\sinh t = r$ である。

Step 2（$\lambda_{\pm,\mu} = \exp(\pm t)$）。

$$
\begin{aligned}
\lambda_{+,\mu} &= g + r && (\because \text{準備 (e)}) \\
&= \cosh t + r && (\because \text{準備 (a) の } \cosh t = g) \\
&= \cosh t + \sinh t && (\because \text{Step 1 の } \sinh t = r) \\
&= \exp(t) && (\because \text{主張 3.21 (1) を } x = t \text{ に適用}) \\
&= \exp(+t) && (\because +t = t)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\lambda_{-,\mu} &= g - r && (\because \text{準備 (e)}) \\
&= \cosh t - r && (\because \text{準備 (a) の } \cosh t = g) \\
&= \cosh t - \sinh t && (\because \text{Step 1 の } \sinh t = r) \\
&= \exp(-t) && (\because \text{主張 3.21 (1) を } x = t \text{ に適用})
\end{aligned}
$$

$t = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ なので、これが主張の前半である。

Step 3（分離）。まず $-t < 0$ を示す。

$$
\begin{aligned}
& 0 < t && (\because \text{準備 (b)}) \\
\Longrightarrow\ & 0 + (-t) < t + (-t) && (\because \mathbb{R} \text{ の順序は両辺に同じ数を足しても保たれる}) \\
\Longrightarrow\ & -t < 0 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\lambda_{+,\mu} &= \exp(t) && (\because \text{Step 2}) \\
&> \exp(0) && (\because \text{主張 3.17 を } 0 < t \text{ に適用}) \\
&= 1 && (\because \text{主張 3.14 } (K = \mathbb{R}))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
1 &= \exp(0) && (\because \text{主張 3.14 } (K = \mathbb{R})) \\
&> \exp(-t) && (\because \text{主張 3.17 を } -t < 0 \text{ に適用}) \\
&= \lambda_{-,\mu} && (\because \text{Step 2})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\lambda_{-,\mu} &= \exp(-t) && (\because \text{Step 2}) \\
&> 0 && (\because \text{主張 3.16 を } x = -t \text{ に適用})
\end{aligned}
$$

三つを合わせて $\lambda_{+,\mu} > 1 > \lambda_{-,\mu} > 0$ であり、$\mathbb{R}$ の順序の推移律より $\lambda_{+,\mu} > \lambda_{-,\mu}$、すなわち 2 つの固有値は分離している。 □

注意 15.20 ($\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger$ を導入して$V^{(+)} = c\check{V}'$ を示す道筋)**.** 主張 14.35 で $\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) A(\tilde{\theta}_\mu)$ を、主張 15.15 で $A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu \check{D}_\mu \check{P}_\mu^{-1}$ を得た。以下では、$\check{P}_\mu$ の列で $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ を組み替えた $\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger$ を導入し、

$$\check{V}' := \exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{\psi}^\dagger_\mu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \tfrac{1}{2}I\right)\right)$$

とおいたとき、ある $c\in\mathbb{C}^\times$ について $V^{(+)} = c\check{V}'$ が成り立つこと（主張 15.29）まで到達し、最後にこれを $\check{n}_\mu := \check{\psi}^\dagger_\mu\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ で書き直す。c の値の決定は次の章で扱う。

** 場合分けは一つも要らない。** 主張 15.12 により $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\neq 0$ が ** すべての $\mu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）とすべての $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$（臨界点を含む）について ** 成り立つので、$\check{\psi}_\mu,\check{\psi}^\dagger_\mu$ はすべての $\mu\in\check{\mathcal{M}}$ について定義され、$\check{V}'$ の和も $\check{\mathcal{M}}$ 全体にわたる。

** 平方根の分枝の議論も要らない。** 主張 15.13 (4)(5) により根号が $\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|\in\mathbb{R}_{>0}$ と $i\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$ に確定しているので、主張 15.15 の $\check{P}_\mu$ の成分は実の絶対値だけで書かれており、$\check{\psi}$ どうしの反交換関係を計算するときに分枝の問題が生じない。

** 対になる添字は μ と $M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ である。** 主張 15.5 の $\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = 2\pi-\tilde{\theta}_\mu$ と主張 15.6 の $\nu = M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ に対応する。定義 14.15 (2) により $M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ の中にとどまるので、** 以下では $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字が現れない。**

定義 15.21 ($\check{\psi}_\mu,\check{\psi}^\dagger_\mu(\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu$ の一次結合）)**.** $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）とする。主張 15.15 の $\check{P}_\mu$ を用いて $\check{\psi}^\dagger_\mu,\check{\psi}_\mu\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を

$$\left(\check{\psi}^\dagger_\mu,\quad \check{\psi}_\mu\right) := \left(\check{Z}_\mu,\quad \check{Y}_\mu\right)\check{P}_\mu$$

すなわち（$a:=\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$、$b:=\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$r:=|a|\in\mathbb{R}_{>0}$ と略記して）

$$\check{\psi}^\dagger_\mu := \frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b}\check{Z}_\mu + \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}}\check{Y}_\mu,\qquad \check{\psi}_\mu := \frac{+r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b}\check{Z}_\mu + \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}}\check{Y}_\mu$$

と定める（行ベクトルと 2×2 行列の積は 定義 14.32・定義 14.27 を続けて展開した $\begin{pmatrix}A, & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p & q\\ r & s\end{pmatrix} = (pA+rB,\ qA+sB)$）。

** この定義は $\mu\in\check{\mathcal{M}}$ のすべてについて意味をもつ。** 主張 15.12 より $a\neq 0$ すなわち $r>0$、主張 15.13 より $b\neq 0$ であり、$M_{\mathrm{col}}\geq 2$ より $\sqrt{M_{\mathrm{col}}}>0$ なので分母 $2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b$ は 0 でない（主張 15.15 の Step 1）。したがって ** 除外される μ は無い **。

† は転置共役を表す記号ではなく、2 つの元を区別する添え字の一部として使う。

主張 15.22 (γ_1,γ_2 の周期性と共役添字$M_{\mathrm{col}}+1-\mu$)**.** $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu\in\mathbb{R}$（$\mu\in\mathbb{Z}$）と整数の像の記号 $a_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}(a)$（$a\in\mathbb{Z}$）を用いる。次が成り立つ。

- (1) **γ_1,γ_2 の 2π 周期性 **（$\theta\in\mathbb{R}$、$k\in\mathbb{Z}$）：$\gamma_1(\theta+2\pi k_{\mathbb{R}}) = \gamma_1(\theta)$、$\gamma_2(\theta+2\pi k_{\mathbb{R}}) = \gamma_2(\theta)$。
- (2) ** 添字の M_{col} 周期性 **（$\mu,k\in\mathbb{Z}$）：$\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}} = \tilde{\theta}_\mu + 2\pi k_{\mathbb{R}}$、したがって $\gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}}) = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma_2(\pm\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}}) = \gamma_2(\pm\tilde{\theta}_\mu)$（複号同順）。
- (3) ** 共役添字 **（$\mu\in\check{\mathcal{M}}$）：$\gamma_2(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}\mp 1-\mu}) = \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma_2(-\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma_1(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$（定義 15.11）、および 主張 15.15 の $\check{P}$ について

$$\check{P}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = \begin{pmatrix} \dfrac{-\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)} & \dfrac{+\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)} \\ \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} & \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \end{pmatrix}$$

（$\check{P}_\mu$ の式の $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ と $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ を入れ替えたもの）。

** この主張は全実数上の $\cos, \sin$ を前提とする。** 定義 15.9 の γ_1, γ_2 は全実数上の $\cos, \sin$ の値で書かれ、証明は 定理 1.88 の二つの等式と 2π 周期性（$x \in \mathbb{R}$、$n \in \mathbb{Z}$ について $\cos(x + 2\pi n_{\mathbb{R}}) = \cos x$、$\sin(x + 2\pi n_{\mathbb{R}}) = \sin x$）を使う。全実数への拡張は 定理 1.88 の前置きのとおり未整備である。

** この主張の (2) だけは $\mu \in \mathbb{Z}$ で量化する。** $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字を扱う主張には、この (2) のほかに 主張 14.13 と 主張 14.14 がある。(2) は γ_1, γ_2 が $\theta \in \mathbb{R}$ の関数（定義 15.9）であることによって意味をもつ主張であり、$\check{P}_\mu$ や $\check{\psi}_\mu$（これらは $\check{\mathcal{M}}$ 上でしか定義していない）には言及していない。

証明. 準備。$c_1, c_2, c_2^*, s_1, s_2^* \in \mathbb{R}$ は 定義 13.15 の値、$x \in \mathbb{R}$ について $\cos x, \sin x \in \mathbb{R}$ は全実数上の $\cos, \sin$ の値である（全実数上への拡張は未整備）。これらの実数が $\mathbb{C}$ の式に現れるときは、定義 15.9 の書き方に従い 定義 1.13 の像 $r_{\mathbb{C}}$ として読み、像の記号を省く。$\iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}$ は 主張 14.8 のとおり零・単位元・和・積を保つ。$(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ も 主張 14.8 による。

第一に、$x \in \mathbb{R}$ について $\cos(-x)$ と $\exp(ix)$ を書く（$-x \in \mathbb{R}$ なので 定理 1.88 を $-x$ にも適用できる）。

$$\begin{aligned}
\cos(-x) &= \frac{\exp(i(-x)) + \exp(-i(-x))}{2} && (\because \text{ 定理 1.88 を } -x \text{ に適用})\\
&= \frac{\exp(i(-x_{\mathbb{C}})) + \exp(-i(-x_{\mathbb{C}}))}{2} && (\because (-x)_{\mathbb{C}} = (-x, 0) = -(x, 0) = -x_{\mathbb{C}} \text{ を 2 箇所へ。定義 1.13、定義 1.12})\\
&= \frac{\exp(-ix) + \exp(ix)}{2} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } i(-w) = -iw,\ -i(-w) = iw \text{ を } w = x_{\mathbb{C}} \text{ で})\\
&= \frac{\exp(ix) + \exp(-ix)}{2} && (\because \mathbb{C} \text{ の和の可換律})\\
&= \cos x && (\because \text{ 定理 1.88})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cos x + i \sin x &= \frac{\exp(ix) + \exp(-ix)}{2} + i\,\frac{\exp(ix) - \exp(-ix)}{2i} && (\because \text{ 定理 1.88})\\
&= \frac{\exp(ix) + \exp(-ix)}{2} + \frac{\exp(ix) - \exp(-ix)}{2} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } i/(2i) = 1/2)\\
&= \exp(ix) && (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

第二に、$k \in \mathbb{Z}$ について $(-k)_{\mathbb{R}} = -k_{\mathbb{R}}$ である。

$$\begin{aligned}
(-k)_{\mathbb{R}} &= (-k)_{\mathbb{R}} + \big(k_{\mathbb{R}} + (-k_{\mathbb{R}})\big) && (\because k_{\mathbb{R}} + (-k_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}} \text{ と零の性質})\\
&= \big((-k)_{\mathbb{R}} + k_{\mathbb{R}}\big) + (-k_{\mathbb{R}}) && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律})\\
&= \big((-k) + k\big)_{\mathbb{R}} + (-k_{\mathbb{R}}) && (\because \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は和を保つ})\\
&= (0)_{\mathbb{R}} + (-k_{\mathbb{R}}) && (\because \mathbb{Z} \text{ で } (-k) + k = 0)\\
&= 0_{\mathbb{R}} + (-k_{\mathbb{R}}) && (\because \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は零を保つ})\\
&= -k_{\mathbb{R}} && (\because \text{ 零の性質})
\end{aligned}$$

(1) $\theta \in \mathbb{R}$、$k \in \mathbb{Z}$ とする。$\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$ なので 定義 15.9 をこの点に適用できる。

$$\begin{aligned}
\gamma_1(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}}) &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}}) && (\because \text{ 定義 15.9 を } \theta + 2\pi k_{\mathbb{R}} \text{ に適用})\\
&= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta && (\because \cos \text{ の } 2\pi \text{ 周期性を } n = k \text{ で})\\
&= \gamma_1(\theta) && (\because \text{ 定義 15.9})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}}) &= i\,\exp(i(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}}))\, s_2^*\big(c_1 \cos(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}}) - i \sin(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}}) - s_1 c_2\big) && (\because \text{ 定義 15.9 を } \theta + 2\pi k_{\mathbb{R}} \text{ に適用})\\
&= i\,\big(\cos(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}}) + i \sin(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}})\big)\, s_2^*\big(c_1 \cos(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}}) - i \sin(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}}) - s_1 c_2\big) && (\because \text{ 準備の } \exp(ix) \text{ の表示を } x = \theta + 2\pi k_{\mathbb{R}} \text{ で})\\
&= i\,\big(\cos\theta + i \sin(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}})\big)\, s_2^*\big(c_1 \cos\theta - i \sin(\theta + 2\pi k_{\mathbb{R}}) - s_1 c_2\big) && (\because \cos \text{ の } 2\pi \text{ 周期性を } n = k \text{ で 2 箇所へ同時適用})\\
&= i\,\big(\cos\theta + i \sin\theta\big)\, s_2^*\big(c_1 \cos\theta - i \sin\theta - s_1 c_2\big) && (\because \sin \text{ の } 2\pi \text{ 周期性を } n = k \text{ で 2 箇所へ同時適用})\\
&= i\,\exp(i\theta)\, s_2^*\big(c_1 \cos\theta - i \sin\theta - s_1 c_2\big) && (\because \text{ 準備の } \exp(ix) \text{ の表示を } x = \theta \text{ で})\\
&= \gamma_2(\theta) && (\because \text{ 定義 15.9})
\end{aligned}$$

(2) $\mu, k \in \mathbb{Z}$ とする。$\mu + kM_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}$ なので $\tilde{\theta}$ の定義をこの添字に適用できる。

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}} &= \frac{2\pi\left((\mu + kM_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \tilde{\theta} \text{ の定義を } \mu + kM_{\mathrm{col}} \text{ で。主張 14.8}) \\
&= \frac{2\pi\left((\mu_{\mathbb{R}} + (kM_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}) - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は和を保つ}) \\
&= \frac{2\pi\left((\mu_{\mathbb{R}} + k_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}) - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は積を保つ}) \\
&= \frac{2\pi\left((\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}) + k_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律と交換律}) \\
&= \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right) + 2\pi k_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配法則}) \\
&= \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} + \frac{2\pi k_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}} \text{ を分母とする分数の和}) \\
&= \tilde{\theta}_{\mu} + \frac{2\pi k_{\mathbb{R}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && (\because\ \tilde{\theta}_{\mu} \text{ の定義。主張 14.8}) \\
&= \tilde{\theta}_{\mu} + 2\pi k_{\mathbb{R}} && (\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}} \text{ による約分})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}} &= -\left(\tilde{\theta}_{\mu} + 2\pi k_{\mathbb{R}}\right) && (\because\ \text{上の鎖}) \\
&= \left(-\tilde{\theta}_{\mu}\right) + (-2\pi k_{\mathbb{R}}) && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } -(u+v) = (-u) + (-v)) \\
&= \left(-\tilde{\theta}_{\mu}\right) + 2\pi\,(-k_{\mathbb{R}}) && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } -(uv) = u(-v)) \\
&= \left(-\tilde{\theta}_{\mu}\right) + 2\pi(-k)_{\mathbb{R}} && (\because\ \text{準備の第二})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}}) &= \gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu} + 2\pi k_{\mathbb{R}}) && (\because\ \text{上の第一の鎖}) \\
&= \gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu}) && (\because\ \text{本ブロックの (1) を } \theta = \tilde{\theta}_{\mu} \text{ で}), \\
\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}}) &= \gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu} + 2\pi k_{\mathbb{R}}) && (\because\ \text{上の第一の鎖}) \\
&= \gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu}) && (\because\ \text{本ブロックの (1) を } \theta = \tilde{\theta}_{\mu} \text{ で}), \\
\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}}) &= \gamma_2\Big(\left(-\tilde{\theta}_{\mu}\right) + 2\pi(-k)_{\mathbb{R}}\Big) && (\because\ \text{上の第二の鎖}) \\
&= \gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu}) && (\because\ \text{本ブロックの (1) を } \theta = -\tilde{\theta}_{\mu},\ -k \in \mathbb{Z} \text{ で})
\end{aligned}$$

(3) $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ とし、$\nu := M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ とおく。定義 14.15 (2) より $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ である。添字の角度を書く。

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{\nu} &= 2\pi - \tilde{\theta}_{\mu} && (\because\ \text{主張 15.5 (1)}) \\
&= 2\pi + \left(-\tilde{\theta}_{\mu}\right) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の差の定義}) \\
&= \left(-\tilde{\theta}_{\mu}\right) + 2\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の交換律}) \\
&= \left(-\tilde{\theta}_{\mu}\right) + 2\pi \cdot 1_{\mathbb{R}} && (\because\ 1_{\mathbb{R}} \text{ は積の単位元}) \\
&= \left(-\tilde{\theta}_{\mu}\right) + 2\pi\,(1)_{\mathbb{R}} && (\because\ \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は単位元を保つ})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
-\tilde{\theta}_\nu &= -\left(2\pi - \tilde{\theta}_\mu\right) && (\because \text{ 主張 15.5 (1)})\\
&= \tilde{\theta}_\mu + (-2\pi) && (\because \mathbb{R} \text{ で } -(u-v) = v + (-u))\\
&= \tilde{\theta}_\mu + 2\pi\,(-1_{\mathbb{R}}) && (\because \mathbb{R} \text{ で } -u = u(-1_{\mathbb{R}}))\\
&= \tilde{\theta}_\mu + 2\pi\,(-(1)_{\mathbb{R}}) && (\because \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は単位元を保つ})\\
&= \tilde{\theta}_\mu + 2\pi\,(-1)_{\mathbb{R}} && (\because \text{ 準備の第二を } k=1 \text{ で})
\end{aligned}
$$

これを使って、主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu) &= \gamma_2\big(\left(-\tilde{\theta}_\mu\right) + 2\pi\,(1)_{\mathbb{R}}\big) && (\because \text{ 上の } \tilde{\theta}_\nu \text{ の鎖})\\
&= \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{ 本ブロックの (1) を } \theta = -\tilde{\theta}_\mu,\ k=1 \text{ で}),\\
\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu) &= \gamma_2\big(\tilde{\theta}_\mu + 2\pi\,(-1)_{\mathbb{R}}\big) && (\because \text{ 上の } -\tilde{\theta}_\nu \text{ の鎖})\\
&= \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{ 本ブロックの (1) を } \theta = \tilde{\theta}_\mu,\ k=-1 \text{ で}),\\
\gamma_1(\tilde{\theta}_\nu) &= \gamma_1\big(\left(-\tilde{\theta}_\mu\right) + 2\pi\,(1)_{\mathbb{R}}\big) && (\because \text{ 上の } \tilde{\theta}_\nu \text{ の鎖})\\
&= \gamma_1(-\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{ 本ブロックの (1) を } \theta = -\tilde{\theta}_\mu,\ k=1 \text{ で})\\
&= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos(-\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{ 定義 15.9 を } -\tilde{\theta}_\mu \text{ に適用})\\
&= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\tilde{\theta}_\mu && (\because \text{ 準備の } \cos(-x) = \cos x \text{ を } x = \tilde{\theta}_\mu \text{ で})\\
&= \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{ 定義 15.9}),\\
\gamma(\tilde{\theta}_\nu) &= \operatorname{arccosh}\big(\gamma_1(\tilde{\theta}_\nu)\big) && (\because \text{ 定義 15.11})\\
&= \operatorname{arccosh}\big(\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)\big) && (\because \text{ 上の } \gamma_1 \text{ の鎖})\\
&= \gamma(\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{ 定義 15.11})
\end{aligned}
$$

最後に $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ なので 主張 15.15 の $\check{P}_\nu$ が定まり、

$$
\begin{aligned}
\check{P}_\nu &= \begin{pmatrix} \dfrac{-\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu)} & \dfrac{+\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu)} \\ \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} & \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \end{pmatrix} && (\because \text{ 主張 15.15 を } \nu \text{ で})\\
&= \begin{pmatrix} \dfrac{-\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu)} & \dfrac{+\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu)} \\ \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} & \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \end{pmatrix} && (\because \text{ 上の } \gamma_2(\tilde{\theta}_\nu) = \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \text{ を 2 箇所へ同時代入})\\
&= \begin{pmatrix} \dfrac{-\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)} & \dfrac{+\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)} \\ \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} & \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \end{pmatrix} && (\because \text{ 上の } \gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \text{ を 2 箇所へ同時代入})
\end{aligned}
$$

となる。 □

主張 15.23 ($\check{\psi}$ の反交換関係)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について

$$
\left[\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}^\dagger_\nu\right]_+ = 0, \qquad \left[\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}_\nu\right]_+ = \delta_{\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, I, \qquad \left[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu\right]_+ = 0
$$

が成り立つ（$I := I_{\mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}},\mathbb{C})}$、$\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ は 主張 15.6 と同じ通常のクロネッカーのデルタ）。反交換子は 定義 2.44、右辺の 0 は 定義 1.93 の零行列 $O \in \mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}},\mathbb{C})$ である。対になる添字は $\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ である。定義 14.15 (5) により、この対の条件は合同式なしで書ける。

証明. 準備（記号と読み方）。$N := (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$、$(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}$・$(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}$ は 主張 14.8 の像の記号とし、$I := I_{\mathrm{Mat}(2^N,\mathbb{C})}$、$O \in \mathrm{Mat}(2^N,\mathbb{C})$ と置く。$s := \sqrt{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$（定義 1.4。$s\,s = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}$）と置く。$s$ と下の r_λ は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ の平方根の値であり、存在を $\mathbb{R}$ の完備性に頼るので $\mathbb{R}$ へ脱出している（M_{col} が平方数でなければ $s \notin \mathbb{Q}$）。$\sigma := s_{\mathbb{C}}$、$t := 2_{\mathbb{C}}\,\sigma \in \mathbb{C}$（$2_{\mathbb{C}} := (2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$、定義 1.13）と置き、$\lambda \in \check{\mathcal{M}}$ について

$$a_\lambda := \gamma_2(\tilde{\theta}_\lambda) \in \mathbb{C}, \quad b_\lambda := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\lambda) \in \mathbb{C}, \quad r_\lambda := |a_\lambda| \in \mathbb{R}_{>0}, \quad \rho_\lambda := (r_\lambda)_{\mathbb{C}}, \quad d_\lambda := t\,b_\lambda \in \mathbb{C}$$

と置く（$r_\lambda > 0$ は 定義 15.21 の前置き）。定義 15.21 の後段により $t \neq 0_{\mathbb{C}}$、$d_\lambda \neq 0_{\mathbb{C}}$ である。$w \in \mathbb{C}$、$w \neq 0_{\mathbb{C}}$ の逆元 w^{-1} は 主張 1.56 のもので、商を $z/w := z\,w^{-1}$ と書く。$-z := (-1_{\mathbb{C}})z$ は 定義 1.14 である。

$$u_\lambda^- := (-\rho_\lambda)\,d_\lambda^{-1}, \qquad u_\lambda^+ := \rho_\lambda\,d_\lambda^{-1}, \qquad h := 1_{\mathbb{C}}\,t^{-1}$$

と置く。定義 15.21 の係数 $\frac{\mp r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b}$・$\frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}}$ は、実数 $r_\lambda \cdot 2 \cdot \sqrt{M_{\mathrm{col}}} = s$ を包含の像 $\rho_\lambda \cdot 2_{\mathbb{C}} \cdot \sigma$ と読んだ $u_\lambda^{\mp} \cdot h$ である。したがって

$$\begin{aligned}
\check{\psi}_\lambda^\dagger &= u_\lambda^- \check{Z}_\lambda + h\,\check{Y}_\lambda \quad (\because \text{ 定義 15.21}),\\
\check{\psi}_\lambda &= u_\lambda^+ \check{Z}_\lambda + h\,\check{Y}_\lambda \quad (\because \text{ 定義 15.21})
\end{aligned}$$

である。$\delta := \delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \in \mathbb{C}$（定義 2.1 を $n = M_{\mathrm{col}}$ で。定義 14.15 (2) により $\nu,\ M_{\mathrm{col}}+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$）、$\omega := (2_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}})\,\delta \in \mathbb{C}$ と置く。主張 15.6 の右辺の $2M_{\mathrm{col}}\,\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I$ は、その主張の後段のとおりスカラー倍 ωI である。

準備 1（$\check{Y}$ と $\check{Z}$ の順の反交換子）。$\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ について

$$\begin{aligned}
\big[\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu\big]_+ &= \check{Y}_\mu\check{Z}_\nu + \check{Z}_\nu\check{Y}_\mu && (\because \text{ 定義 2.44})\\
&= \check{Z}_\nu\check{Y}_\mu + \check{Y}_\mu\check{Z}_\nu && (\because \text{ 主張 2.14})\\
&= \big[\check{Z}_\nu, \check{Y}_\mu\big]_+ && (\because \text{ 定義 2.44})\\
&= O && (\because \text{ 主張 15.6 の第 2 式を添字の組}(\nu,\mu) \text{ で})
\end{aligned}$$

準備 2（係数を残した展開）。$\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$、$u, u' \in \mathbb{C}$ について

$$\begin{aligned}
\big[u\check{Z}_\mu + h\check{Y}_\mu,\ u'\check{Z}_\nu + h\check{Y}_\nu\big]_+ &= \Big[\sum_{j=1}^{2} x_j X_j,\ \sum_{k=1}^{2} y_k W_k\Big]_+ && (\because \text{ 定義 2.5 を 2 箇所へ同時適用。}(x_1,x_2) := (u,h),\ (X_1,X_2) := (\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu),\ (y_1,y_2) := (u',h),\ (W_1,W_2) := (\check{Z}_\nu,\check{Y}_\nu))\\
&= \sum_{j=1}^{2}\sum_{k=1}^{2}(x_j y_k)\,[X_j, W_k]_+ && (\because \text{ 主張 2.45 } (n = 2^N,\ r = s = 2))\\
&= \big((uu')\,[\check{Z}_\mu,\check{Z}_\nu]_+ + (uh)\,[\check{Z}_\mu,\check{Y}_\nu]_+\big) + \big((hu')\,[\check{Y}_\mu,\check{Z}_\nu]_+ + (hh)\,[\check{Y}_\mu,\check{Y}_\nu]_+\big) && (\because \text{ 定義 2.5 を内側の 2 つと外側の 1 つへ同時適用})\\
&= \big((uu')(\omega I) + (uh)O\big) + \big((hu')\,[\check{Y}_\mu,\check{Z}_\nu]_+ + (hh)(\omega I)\big) && (\because \text{ 主張 15.6 を 3 箇所へ同時適用})\\
&= \big((uu')(\omega I) + (uh)O\big) + \big((hu')O + (hh)(\omega I)\big) && (\because \text{ 準備 1})\\
&= \big((uu')(\omega I) + O\big) + \big(O + (hh)(\omega I)\big) && (\because \text{ 主張 2.12 を 2 箇所へ同時適用})\\
&= (uu')(\omega I) + \big(O + (hh)(\omega I)\big) && (\because \text{ 主張 2.8})\\
&= (uu')(\omega I) + (hh)(\omega I) && (\because \text{ 主張 2.9})\\
&= ((uu')\omega)\,I + ((hh)\omega)\,I && (\because \text{ 主張 2.41 を 2 箇所へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{2}(c_j I) && (\because \text{ 定義 2.5。}(c_1,c_2) := ((uu')\omega, (hh)\omega))\\
&= \Big(\sum_{j=1}^{2} c_j\Big) I && (\because \text{ 主張 2.35 } (r = 2))\\
&= ((uu')\omega + (hh)\omega)\,I && (\because \text{ 定義 1.16})\\
&= ((uu' + hh)\,\omega)\,I && (\because \mathbb{C} \text{ の分配法則。主張 1.56})
\end{aligned}$$

が成り立つ。

準備 3（$\nu \neq M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ の場合）。このとき $\delta = 0_{\mathbb{C}}$（定義 2.1）なので、$w \in \mathbb{C}$ について

$$
\begin{aligned}
\big(w\,\omega\big)I &= \Big(w\big((2_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}})\,0_{\mathbb{C}}\big)\Big)I && \big(\because\ \omega \text{ の定義と} \delta = 0_{\mathbb{C}}\big)\\
&= \big(w\,0_{\mathbb{C}}\big)I && \big(\because\ \text{主張 } 1.59\big)\\
&= 0_{\mathbb{C}}\,I && \big(\because\ \text{主張 } 1.59\big)\\
&= O && \big(\because\ \text{主張 } 2.13\big),\\
\delta\,I &= 0_{\mathbb{C}}\,I && (\because\ \delta = 0_{\mathbb{C}})\\
&= O && \big(\because\ \text{主張 } 2.13\big)
\end{aligned}
$$

準備 4（$\mathbb{C}$ の符号と逆元の規則）。$z, w \in \mathbb{C}$ について

$$
\begin{aligned}
\text{(i)}\quad (-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}}) &= (-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}})(-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) && \big(\because\ -1_{\mathbb{C}} = (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} \text{ (定義 1.13)}\big)\\
&= \big((-1_{\mathbb{R}})(-1_{\mathbb{R}}) - 0_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}},\ (-1_{\mathbb{R}})0_{\mathbb{R}} + 0_{\mathbb{R}}(-1_{\mathbb{R}})\big) && \big(\because\ \text{定義 1.12 の積}\big)\\
&= (1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= 1_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \text{定義 } 1.13\big),\\
\text{(ii)}\quad z(-w) &= z\big((-1_{\mathbb{C}})w\big) && \big(\because\ \text{定義 } 1.14\big)\\
&= (-1_{\mathbb{C}})(zw) && \big(\because\ \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 } 1.56\big)\\
&= -(zw) && \big(\because\ \text{定義 } 1.14\big),\\
\text{(iii)}\quad (-z)w &= \big((-1_{\mathbb{C}})z\big)w && \big(\because\ \text{定義 } 1.14\big)\\
&= (-1_{\mathbb{C}})(zw) && \big(\because\ \mathbb{C} \text{ の積の結合律。主張 } 1.56\big)\\
&= -(zw) && \big(\because\ \text{定義 } 1.14\big),\\
\text{(iv)}\quad -(-z) &= (-1_{\mathbb{C}})\big((-1_{\mathbb{C}})z\big) && \big(\because\ \text{定義 } 1.14 \text{ を 2 箇所へ同時適用}\big)\\
&= \big((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}})\big)z && \big(\because\ \mathbb{C} \text{ の積の結合律。主張 } 1.56\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\,z && (\because\ \text{(i)})\\
&= z && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 } 1.56\big),\\
\text{(v)}\quad (-z)(-w) &= -\big(z(-w)\big) && (\because\ \text{(iii)})\\
&= -\big(-(zw)\big) && (\because\ \text{(ii)})\\
&= zw && (\because\ \text{(iv)})
\end{aligned}
$$

が成り立つ。さらに $z \neq 0_{\mathbb{C}}$、$w \neq 0_{\mathbb{C}}$ なら（逆元は 主張 1.56）

$$
\begin{aligned}
\text{(vi)}\quad (zw)\big(z^{-1}w^{-1}\big) &= \big(zz^{-1}\big)\big(ww^{-1}\big) && \big(\because\ \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 } 1.56\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}}1_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \text{逆元を 2 箇所へ同時適用。主張 } 1.56\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}} && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 } 1.56\big),\\
\text{(vii)}\quad (-z)\big(-(z^{-1})\big) &= zz^{-1} && (\because\ \text{(v)})\\
&= 1_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \text{逆元。主張 } 1.56\big)
\end{aligned}
$$

である。$x \in \mathbb{C}$ が $xy = 1_{\mathbb{C}}$ となる $y \in \mathbb{C}$ をもてば、$x = 0_{\mathbb{C}}$ とすると

$$
\begin{aligned}
1_{\mathbb{C}} &= x\,y && (\because\ xy = 1_{\mathbb{C}} \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= 0_{\mathbb{C}}\,y && (\because\ x = 0_{\mathbb{C}})\\
&= 0_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \text{主張 } 1.58\big)
\end{aligned}
$$

となり $1_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$（主張 1.56）に反するので $x \neq 0_{\mathbb{C}}$ であり、逆元の一意性（主張 1.56）より $x^{-1} = y$ である。これを (vi)・(vii) に当てて、

$$
\text{(viii)}\quad zw \neq 0_{\mathbb{C}},\quad (zw)^{-1} = z^{-1}w^{-1}, \qquad \text{(ix)}\quad -z \neq 0_{\mathbb{C}},\quad (-z)^{-1} = -(z^{-1})
$$

を得る。

準備 5（$\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ の場合の係数)。このとき $\delta = 1_{\mathbb{C}}$（定義 2.1）であり、$\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ に絞ったので合同式を解く必要がない（定義 14.15 (5)）。$a_\mu = (x, y) \in \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ と成分で書く。

$$
\begin{aligned}
a_\nu &= \gamma_2(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) && (\because\ a_\nu := \gamma_2(\tilde{\theta}_\nu),\ \nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu)\\
&= \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) && \big(\because\ \text{主張 15.22 (3)}\big)\\
&= b_\mu && (\because\ b_\mu \text{ の定義}),\\
b_\nu &= \gamma_2(-\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) && (\because\ b_\nu := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu),\ \nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu)\\
&= \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) && \big(\because\ \text{主張 15.22 (3)}\big)\\
&= a_\mu && (\because\ a_\mu \text{ の定義}),\\
r_\nu &= |a_\nu| && (\because\ r_\nu \text{ の定義})\\
&= |b_\mu| && (\because\ \text{上の} a_\nu = b_\mu)\\
&= |-\overline{a_\mu}| && \big(\because\ \text{主張 15.13 (1)}\big)\\
&= |(-1_{\mathbb{C}})\,\overline{a_\mu}| && \big(\because\ \text{定義 1.14}\big)\\
&= |(-1_{\mathbb{C}})\,(x, -y)| && \big(\because\ \text{定義 5.1}\big)\\
&= |(-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}})\,(x, -y)| && \big(\because\ -1_{\mathbb{C}} = (-1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} = (-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) \text{ (定義 1.13)}\big)\\
&= |(-x,\ y)| && \big(\because\ \text{定義 1.12 の積：}\big((-1_{\mathbb{R}})x - 0_{\mathbb{R}}(-y),\ (-1_{\mathbb{R}})(-y) + 0_{\mathbb{R}}x\big) = (-x, y)\big)\\
&= \sqrt{(-x)^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \big(\because\ \text{主張 1.75 (1)}\big)\\
&= \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ で} (-x)^2 = x^2\big)\\
&= |a_\mu| && \big(\because\ \text{主張 1.75 (1)}\big)\\
&= r_\mu && (\because\ r_\mu \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

である。以下 $r := r_\mu = r_\nu \in \mathbb{R}_{>0}$、$\rho := r_{\mathbb{C}} = \rho_\mu = \rho_\nu$ と書く。主張 15.13 (2) の右辺 $-|a_\mu|^2$ は実数なので、$\mathbb{C}$ の等式としては包含の像で読む。

$$
\begin{aligned}
b_\mu b_\nu &= b_\mu a_\mu && (\because\ \text{上の} b_\nu = a_\mu)\\
&= a_\mu b_\mu && \big(\because\ \mathbb{C} \text{ の積の交換律。主張 1.56}\big)\\
&= \big(-|a_\mu|^2\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \text{主張 15.13 (2)}\big)\\
&= \big(-(r\,r)\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ |a_\mu|^2 := |a_\mu|\,|a_\mu| (\mathbb{R} \text{ の 2 乗の記法）と} r = |a_\mu|\big)\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\,(r\,r)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \text{定義 1.13 と定義 1.12 の積：} (-1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}})(rr, 0_{\mathbb{R}}) = (-(rr), 0_{\mathbb{R}})\big)\\
&= -\big((r\,r)_{\mathbb{C}}\big) && \big(\because\ \text{定義 1.14}\big)\\
&= -(\rho\rho) && \big(\because\ \text{主張 1.29}\big),\\
t\,t &= (2_{\mathbb{C}}\sigma)(2_{\mathbb{C}}\sigma) && (\because\ t \text{ の定義})\\
&= (2_{\mathbb{C}}2_{\mathbb{C}})(\sigma\sigma) && \big(\because\ \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 1.56}\big)\\
&= (2_{\mathbb{R}}2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}\,(s\,s)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \text{主張 1.29 を 2 箇所へ同時適用}\big)\\
&= (4_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}\,(s\,s)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ で} 2 \cdot 2 = 4\big)\\
&= (4_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}\,\big((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ s\,s = s^2 = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} (\text{定義 1.4。} s^2 := s\,s)\ \big)\\
&= 4_{\mathbb{C}}\,(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because\ 4_{\mathbb{C}} := (4_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}、\text{主張 14.8 の像の記号}\big),\\
d_\mu d_\nu &= (t\,b_\mu)(t\,b_\nu) && (\because\ d_\lambda \text{ の定義を 2 箇所へ同時適用})\\
&= (t\,t)(b_\mu b_\nu) && \big(\because\ \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 1.56}\big)\\
&= (t\,t)\big(-(\rho\rho)\big) && (\because\ \text{上の} b_\mu b_\nu = -(\rho\rho))\\
&= -\big((t\,t)(\rho\rho)\big) && (\because\ \text{準備 4 (ii)})
\end{aligned}
$$

である。$r \neq 0_{\mathbb{R}}$ より $\rho = (r, 0_{\mathbb{R}}) \neq 0_{\mathbb{C}}$（定義 1.13）、また $t \neq 0_{\mathbb{C}}$ なので、準備 4 (viii) により $t\,t$、$\rho\rho$、$(t\,t)(\rho\rho)$ は $0_{\mathbb{C}}$ でなく、準備 4 (ix) により $-\big((t\,t)(\rho\rho)\big) \neq 0_{\mathbb{C}}$ である。$d_\mu^{-1} d_\nu^{-1}$ を先に求める。

$$
\begin{aligned}
d_\mu^{-1} d_\nu^{-1} &= (d_\mu d_\nu)^{-1} && \big(\because \text{準備 4 (viii) を右辺から左辺へ}\big) \\
&= \Big(-\big((t\,t)(\rho\rho)\big)\Big)^{-1} && \big(\because \text{上の} d_\mu d_\nu = -((tt)(\rho\rho))\big) \\
&= -\Big(\big((t\,t)(\rho\rho)\big)^{-1}\Big) && \big(\because \text{準備 4 (ix)}\big) \\
&= -\big((t\,t)^{-1}(\rho\rho)^{-1}\big) && \big(\because \text{準備 4 (viii)}\big)
\end{aligned}
$$

したがって三つの係数の組は

$$
\begin{aligned}
u_\mu^- u_\nu^- &= \big((-\rho) d_\mu^{-1}\big)\big((-\rho) d_\nu^{-1}\big) && \big(\because u_\lambda^- \text{ の定義と} \rho_\mu = \rho_\nu = \rho\big) \\
&= \big((-\rho)(-\rho)\big)\big(d_\mu^{-1} d_\nu^{-1}\big) && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 1.56}\big) \\
&= (\rho\rho)\big(d_\mu^{-1} d_\nu^{-1}\big) && \big(\because \text{準備 4 (v)}\big) \\
&= (\rho\rho)\Big(-\big((t\,t)^{-1}(\rho\rho)^{-1}\big)\Big) && \big(\because \text{上の} d_\mu^{-1} d_\nu^{-1} \text{ の鎖}\big) \\
&= -\Big((\rho\rho)\big((t\,t)^{-1}(\rho\rho)^{-1}\big)\Big) && \big(\because \text{準備 4 (ii)}\big) \\
&= -\Big((t\,t)^{-1}\big((\rho\rho)(\rho\rho)^{-1}\big)\Big) && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 1.56}\big) \\
&= -\big((t\,t)^{-1} 1_{\mathbb{C}}\big) && \big(\because \text{逆元。主張 1.56}\big) \\
&= -\big((t\,t)^{-1}\big) && \big(\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 1.56}\big), \\
u_\mu^+ u_\nu^+ &= \big(\rho\, d_\mu^{-1}\big)\big(\rho\, d_\nu^{-1}\big) && \big(\because u_\lambda^+ \text{ の定義と} \rho_\mu = \rho_\nu = \rho\big) \\
&= (\rho\rho)\big(d_\mu^{-1} d_\nu^{-1}\big) && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 1.56}\big) \\
&= (\rho\rho)\Big(-\big((t\,t)^{-1}(\rho\rho)^{-1}\big)\Big) && \big(\because \text{上の} d_\mu^{-1} d_\nu^{-1} \text{ の鎖}\big) \\
&= -\Big((\rho\rho)\big((t\,t)^{-1}(\rho\rho)^{-1}\big)\Big) && \big(\because \text{準備 4 (ii)}\big) \\
&= -\Big((t\,t)^{-1}\big((\rho\rho)(\rho\rho)^{-1}\big)\Big) && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 1.56}\big) \\
&= -\big((t\,t)^{-1} 1_{\mathbb{C}}\big) && \big(\because \text{逆元。主張 1.56}\big) \\
&= -\big((t\,t)^{-1}\big) && \big(\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 1.56}\big), \\
u_\mu^- u_\nu^+ &= \big((-\rho) d_\mu^{-1}\big)\big(\rho\, d_\nu^{-1}\big) && \big(\because u_\lambda^\mp \text{ の定義と} \rho_\mu = \rho_\nu = \rho\big) \\
&= \big((-\rho)\rho\big)\big(d_\mu^{-1} d_\nu^{-1}\big) && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 1.56}\big) \\
&= \big(-(\rho\rho)\big)\big(d_\mu^{-1} d_\nu^{-1}\big) && \big(\because \text{準備 4 (iii)}\big) \\
&= -\big((\rho\rho)(d_\mu^{-1} d_\nu^{-1})\big) && \big(\because \text{準備 4 (iii)}\big) \\
&= -\Big(-\big((t\,t)^{-1}\big)\Big) && \big(\because u_\mu^+ u_\nu^+ \text{ の鎖の第 2 行から最後の行までの等号} (\rho\rho)(d_\mu^{-1} d_\nu^{-1}) = -((tt)^{-1})\big) \\
&= (t\,t)^{-1} && \big(\because \text{準備 4 (iv)}\big), \\
h\,h &= \big(1_{\mathbb{C}} t^{-1}\big)\big(1_{\mathbb{C}} t^{-1}\big) && \big(\because h \text{ の定義}\big) \\
&= t^{-1} t^{-1} && \big(\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元を 2 箇所へ同時適用}\big) \\
&= (t\,t)^{-1} && \big(\because \text{準備 4 (viii) を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}
$$

であり、これらから

$$
\begin{aligned}
u_\mu^- u_\nu^- + h\,h &= -\big((t\,t)^{-1}\big) + (t\,t)^{-1} && (\because \text{上の二つの鎖})\\
&= 0_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{加法の逆元。主張 1.56}\big),\\
u_\mu^+ u_\nu^+ + h\,h &= -\big((t\,t)^{-1}\big) + (t\,t)^{-1} && (\because \text{上の二つの鎖})\\
&= 0_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{加法の逆元。主張 1.56}\big),\\
\big(u_\mu^- u_\nu^+ + h\,h\big)\,\omega &= \big((t\,t)^{-1} + (t\,t)^{-1}\big)\,\omega && (\because \text{上の二つの鎖})\\
&= \big(1_{\mathbb{C}}(t\,t)^{-1} + 1_{\mathbb{C}}(t\,t)^{-1}\big)\,\omega && \big(\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元を 2 箇所へ同時適用。主張 1.56}\big)\\
&= \big((1_{\mathbb{C}} + 1_{\mathbb{C}})(t\,t)^{-1}\big)\,\omega && \big(\because \mathbb{C} \text{ の分配法則。主張 1.56}\big)\\
&= \big(2_{\mathbb{C}}(t\,t)^{-1}\big)\,\omega && \big(\because 1_{\mathbb{C}} + 1_{\mathbb{C}} = (1_{\mathbb{R}} + 1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = 2_{\mathbb{C}} \text{ (定義 1.12 の和)}\big)\\
&= \big(2_{\mathbb{C}}(t\,t)^{-1}\big)\Big(\big(2_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\big)1_{\mathbb{C}}\Big) && (\because \omega \text{ の定義と} \delta = 1_{\mathbb{C}})\\
&= \big(2_{\mathbb{C}}(t\,t)^{-1}\big)\big(2_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\big) && \big(\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 1.56}\big)\\
&= \Big((2_{\mathbb{C}}2_{\mathbb{C}})(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\Big)(t\,t)^{-1} && \big(\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律と交換律。主張 1.56}\big)\\
&= \Big((2_{\mathbb{R}}2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\Big)(t\,t)^{-1} && \big(\because \text{主張 1.29}\big)\\
&= \Big(4_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\Big)(t\,t)^{-1} && \big(\because \mathbb{R} \text{ で} 2\cdot 2 = 4\text{。}\ 4_{\mathbb{C}} := (4_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}\big)\\
&= (t\,t)(t\,t)^{-1} && (\because \text{上の} t\,t = 4_{\mathbb{C}}(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}})\\
&= 1_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{逆元。主張 1.56}\big)
\end{aligned}
$$

を得る。

第 1 式。主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
\Big[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger\Big]_+ &= \big[u_\mu^- \check{Z}_\mu + h\check{Y}_\mu,\ u_\nu^- \check{Z}_\nu + h\check{Y}_\nu\big]_+ && \big(\because \text{定義 15.21 を 2 箇所へ同時適用}\big)\\
&= \big((u_\mu^- u_\nu^- + h\,h)\,\omega\big)I && (\because \text{準備 2 を} u = u_\mu^-,\ u' = u_\nu^- \text{ で})
\end{aligned}
$$

である。$\nu \neq M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ のとき

$$
\big((u_\mu^- u_\nu^- + h\,h)\,\omega\big)I = O \quad (\because \text{準備 3 を} w = u_\mu^- u_\nu^- + hh \text{ で})
$$

$\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ のとき

$$
\begin{aligned}
\big((u_\mu^- u_\nu^- + h\,h)\,\omega\big)I &= \big(0_{\mathbb{C}}\,\omega\big)I && (\because \text{準備 5 の} u_\mu^- u_\nu^- + hh = 0_{\mathbb{C}})\\
&= 0_{\mathbb{C}}\,I && \big(\because \text{主張 1.58}\big)\\
&= O && \big(\because \text{主張 2.13}\big)
\end{aligned}
$$

である。どちらの場合も主張の右辺 O に着く。

第 3 式。主張の左辺から

$$
\begin{aligned}
\big[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu\big]_+ &= \big[u_\mu^+ \check{Z}_\mu + h\check{Y}_\mu,\ u_\nu^+ \check{Z}_\nu + h\check{Y}_\nu\big]_+ && \big(\because \text{定義 15.21 を 2 箇所へ同時適用}\big)\\
&= \big((u_\mu^+ u_\nu^+ + h\,h)\,\omega\big)I && (\because \text{準備 2 を} u = u_\mu^+,\ u' = u_\nu^+ \text{ で})
\end{aligned}
$$

である。$\nu \neq M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ のとき

$$
\big((u_\mu^+ u_\nu^+ + h\,h)\,\omega\big)I = O \quad (\because \text{準備 3 を} w = u_\mu^+ u_\nu^+ + hh \text{ で})
$$

$\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ のとき

$$\begin{aligned}\big((u_\mu^+ u_\nu^+ + h\,h)\,\omega\big)I &= \big(0_{\mathbb{C}}\,\omega\big)I \quad (\because \text{準備 5 の} u_\mu^+ u_\nu^+ + hh = 0_{\mathbb{C}})\\ &= 0_{\mathbb{C}}\,I \qquad (\because \text{主張 1.58})\\ &= O \qquad (\because \text{主張 2.13})\end{aligned}$$

である。どちらの場合も主張の右辺 O に着く。

第 2 式。主張の左辺から

$$\begin{aligned}\Big[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu\Big]_+ &= \big[u_\mu^- \check{Z}_\mu + h\check{Y}_\mu,\ u_\nu^+ \check{Z}_\nu + h\check{Y}_\nu\big]_+ \quad (\because \text{定義 15.21 を 2 箇所へ同時適用})\\ &= \big((u_\mu^- u_\nu^+ + h\,h)\,\omega\big)I \qquad (\because \text{準備 2 を} u = u_\mu^-,\ u' = u_\nu^+ \text{ で})\end{aligned}$$

である。$\nu \neq M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ のとき

$$\begin{aligned}\big((u_\mu^- u_\nu^+ + h\,h)\,\omega\big)I &= O \quad (\because \text{準備 3 を} w = u_\mu^- u_\nu^+ + hh \text{ で})\\ &= \delta\, I \quad (\because \text{準備 3 の} \delta I = O \text{ を右辺から左辺へ})\end{aligned}$$

$\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ のとき

$$\begin{aligned}\big((u_\mu^- u_\nu^+ + h\,h)\,\omega\big)I &= 1_{\mathbb{C}}\,I \quad (\because \text{準備 5 の} (u_\mu^- u_\nu^+ + hh)\,\omega = 1_{\mathbb{C}})\\ &= \delta\, I \qquad (\because\ \delta = 1_{\mathbb{C}})\end{aligned}$$

である。どちらの場合も主張の右辺 $\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I = \delta\, I$ に一致する。 □

主張 15.24 ($V^{(+)}$ と $\check{\psi}$ の交換関係)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について

$$T_{(V^{(+)})}\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\Big) = \Big(\exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\Big)_{\mathbb{C}}\,\check{\psi}_\mu^\dagger, \qquad T_{(V^{(+)})}\big(\check{\psi}_\mu\big) = \Big(\exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\Big)_{\mathbb{C}}\,\check{\psi}_\mu$$

が成り立つ ($T_{(V^{(+)})}$ は 定義 14.20、$\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ は 定義 15.11、exp は実数の exp で、$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の像。右辺は 定義 2.3 のスカラー倍)。

証明. 定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R := \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と $R^\times$ を用い、$T := T_{(V^{(+)})} : R \to R$ と書く。組 $(Y_1, Y_2) \in R \times R$ と $l \in \{1, 2\}$ について $\mathrm{pr}_l(Y_1, Y_2) := Y_l$ と書く。$G, H \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の成分を $g_{kl} := G_{kl}$、$h_{kl} := H_{kl}$ ($k, l \in \{1, 2\}$) と書く。組と 2×2 行列の積は 定義 14.32、組と数の列の積は 定義 14.27、$\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の積は 定義 1.6、有限和は 定義 2.5 と 定義 1.16 による。

準備 1（組と 2×2 行列の積の成分)。$X_1, X_2 \in R$、$G \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$、$l \in \{1, 2\}$ について

$$\begin{aligned}\mathrm{pr}_l\big((X_1,\ X_2)\,G\big) &= \mathrm{pr}_l\Big((X_1,\ X_2)\begin{pmatrix}g_{11}\\ g_{21}\end{pmatrix},\ (X_1,\ X_2)\begin{pmatrix}g_{12}\\ g_{22}\end{pmatrix}\Big) \quad (\because \text{定義 14.32 } (d \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to X_1,\ B \to X_2,\ p, q, r, s \to g_{11}, g_{12}, g_{21}, g_{22}))\\ &= (X_1,\ X_2)\begin{pmatrix}g_{1l}\\ g_{2l}\end{pmatrix} \qquad (\because \mathrm{pr}_l \text{ の定め方})\\ &= g_{1l}X_1 + g_{2l}X_2 \qquad (\because \text{定義 14.27})\\ &= \Big(\sum_{i=1}^{1} g_{il}X_i\Big) + g_{2l}X_2 \qquad (\because \text{定義 2.5 の} r = 1 \text{ の式})\\ &= \sum_{i=1}^{2} g_{il}X_i \qquad (\because \text{定義 2.5 の} r+1 \text{ の式 } (r \to 1))\end{aligned}$$

準備 2（結合律)。$X_1, X_2 \in R$、$G, H \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$、$l \in \{1, 2\}$ について

$$
\begin{aligned}
\mathrm{pr}_l\big(\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,G\big)\,H\big) &= \sum_{k=1}^{2} h_{kl}\,\mathrm{pr}_k\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,G\big) && \big(\because \text{準備 1 } \big(X_k \to \mathrm{pr}_k((X_1,X_2)G),\ G \to H\big)\big)\\
&= \sum_{k=1}^{2} h_{kl}\Big(\sum_{i=1}^{2} g_{ik}X_i\Big) && \big(\because \text{準備 1 を}k=1,2 \text{ の 2 か所へ同時適用}\big)\\
&= \sum_{k=1}^{2}\sum_{i=1}^{2} h_{kl}\,(g_{ik}X_i) && \big(\because \text{主張 2.34 を右辺から左辺へ、}k=1,2 \text{ の 2 か所へ同時適用}\big)\\
&= \sum_{k=1}^{2}\sum_{i=1}^{2} (h_{kl}g_{ik})\,X_i && \big(\because \text{主張 2.41 を 4 か所へ同時適用}\big)\\
&= \sum_{i=1}^{2}\sum_{k=1}^{2} (h_{kl}g_{ik})\,X_i && \big(\because \text{主張 2.39}\big)\\
&= \sum_{i=1}^{2}\Big(\sum_{k=1}^{2} h_{kl}g_{ik}\Big)X_i && \big(\because \text{主張 2.35 を}i=1,2 \text{ の 2 か所へ同時適用}\big)\\
&= \sum_{i=1}^{2}\Big(\sum_{k=1}^{2} g_{ik}h_{kl}\Big)X_i && \big(\because \text{主張 1.56 の乗法の可換則を 4 か所へ同時適用}\big)\\
&= \sum_{i=1}^{2}(GH)_{il}\,X_i && \big(\because \text{定義 1.6 を}i=1,2 \text{ の 2 か所へ同時適用}\big)\\
&= \mathrm{pr}_l\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,(GH)\big) && \big(\because \text{準備 1 を右辺から左辺へ } (G \to GH)\big)
\end{aligned}
$$

であり、組は二つの成分で定まるので

$$
\begin{aligned}
\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,G\big)\,H &= \big(\mathrm{pr}_1\big(\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,G\big)\,H\big)\,,\ \mathrm{pr}_2\big(\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,G\big)\,H\big)\big) && \big(\because\ \mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2 \text{ の定め方}\big)\\
&= \big(\mathrm{pr}_1\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,(GH)\big)\,,\ \mathrm{pr}_2\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,(GH)\big)\big) && \big(\because \text{上の鎖を}l=1,2 \text{ の 2 か所へ同時適用}\big)\\
&= \big(X_1,\ \ X_2\big)\,(GH) && \big(\because\ \mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2 \text{ の定め方}\big)
\end{aligned}
$$

準備 3（T を組へ当てる）。主張 14.21 により $V^{(+)} \in R^{\times}$、主張 14.22 により写像として $T = T_{V^{(+)}}$ である。$X_1, X_2 \in R$、$G \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$、$l \in \{1,2\}$ について

$$
\begin{aligned}
T\big(\mathrm{pr}_l\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,G\big)\big) &= T(g_{1l}X_1 + g_{2l}X_2) && \big(\because \text{準備 1 の第 1 式から第 4 式まで}\big)\\
&= T_{V^{(+)}}(g_{1l}X_1 + g_{2l}X_2) && \big(\because \text{主張 14.22}\big)\\
&= g_{1l}\,T_{V^{(+)}}(X_1) + g_{2l}\,T_{V^{(+)}}(X_2) && \big(\because \text{主張 7.4 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ g \to V^{(+)},\ a \to g_{1l},\ b \to g_{2l},\ X \to X_1,\ W \to X_2)\big)\\
&= g_{1l}\,T(X_1) + g_{2l}\,T(X_2) && \big(\because \text{主張 14.22 を 2 か所へ同時適用}\big)\\
&= \mathrm{pr}_l\big(\big(T(X_1),\ \ T(X_2)\big)\,G\big) && \big(\because \text{準備 1 の第 1 式から第 4 式までを右辺から左辺へ } (X_i \to T(X_i))\big)
\end{aligned}
$$

であり、組は二つの成分で定まるので

$$
\begin{aligned}
\big(T\big(\mathrm{pr}_1\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,G\big)\big)\,,\ T\big(\mathrm{pr}_2\big(\big(X_1,\ \ X_2\big)\,G\big)\big)\big) &= \big(\mathrm{pr}_1\big(\big(T(X_1),\ \ T(X_2)\big)\,G\big)\,,\ \mathrm{pr}_2\big(\big(T(X_1),\ \ T(X_2)\big)\,G\big)\big) && \big(\because \text{上の鎖を}l=1,2 \text{ の 2 か所へ同時適用}\big)\\
&= \big(T(X_1),\ \ T(X_2)\big)\,G && \big(\because\ \mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2 \text{ の定め方}\big)
\end{aligned}
$$

準備 4（主張 15.15 の記号の読み方）。$\check{P}_{\mu}^{-1}$ は 定義 7.2 の M を 1 に取ったときの逆元（$\mathrm{Mat}(2^1,\mathbb{C}) = \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$）で、$\check{P}_{\mu}^{-1}\check{P}_{\mu} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ を満たす。三つの積 $\check{P}_{\mu}\check{D}_{\mu}\check{P}_{\mu}^{-1}$ は $(\check{P}_{\mu}\check{D}_{\mu})\check{P}_{\mu}^{-1}$ と読む（主張 15.15 の証明の Step 4 の鎖の第 4 式）。$\check{D}_{\mu}$ の実数の成分 $\lambda_{\pm,\mu} \in \mathbb{R}$ は 定義 1.13 の像 $(\lambda_{\pm,\mu})_{\mathbb{C}}$ と読む。すなわち $(\check{D}_{\mu})_{11} = (\lambda_{+,\mu})_{\mathbb{C}}$、$(\check{D}_{\mu})_{21} = (\check{D}_{\mu})_{12} = 0_{\mathbb{C}}$、$(\check{D}_{\mu})_{22} = (\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}}$ である（主張 15.15 が非対角に書いた 0 は $0_{\mathbb{C}}$ と読む）。以下の O は 定義 1.93 の零行列 $O \in R$ である。

本体。定義 15.21 の $\Big(\check{\psi}_{\mu}^{\dagger}, \check{\psi}_{\mu}\Big) := \big(\check{Z}_{\mu}, \check{Y}_{\mu}\big)\,\check{P}_{\mu}$ から $\check{\psi}_{\mu}^{\dagger} = \mathrm{pr}_1\big((\check{Z}_{\mu}, \check{Y}_{\mu})\check{P}_{\mu}\big)$、$\check{\psi}_{\mu} = \mathrm{pr}_2\big((\check{Z}_{\mu}, \check{Y}_{\mu})\check{P}_{\mu}\big)$ である。

$$
\begin{aligned}
\Big(T(\check{\psi}_\mu^\dagger),\ \ T(\check{\psi}_\mu)\Big) &= \big(T(\mathrm{pr}_1((\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\tilde{P}_\mu))\,,\ T(\mathrm{pr}_2((\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\tilde{P}_\mu))\big) && (\because \text{ 定義 15.21})\\
&= \big(T(\check{Z}_\mu),\ \ T(\check{Y}_\mu)\big)\,\tilde{P}_\mu && (\because \text{ 準備 3 } (X_1 \to \check{Z}_\mu,\ X_2 \to \check{Y}_\mu,\ G \to \tilde{P}_\mu))\\
&= \Big((\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,A(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\,\tilde{P}_\mu && (\because \text{ 主張 14.35})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\Big(A(\tilde{\theta}_\mu)\tilde{P}_\mu\Big) && (\because \text{ 準備 2 } (G \to A(\tilde{\theta}_\mu),\ H \to \tilde{P}_\mu))\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\big(((\tilde{P}_\mu\check{D}_\mu)\,\tilde{P}_\mu^{-1})\,\tilde{P}_\mu\big) && (\because \text{ 主張 15.15 と準備 4})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\big((\tilde{P}_\mu\check{D}_\mu)\,(\tilde{P}_\mu^{-1}\tilde{P}_\mu)\big) && (\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p,q \to 2))\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\big((\tilde{P}_\mu\check{D}_\mu)\,I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\big) && (\because \text{ 定義 7.2 } (M \to 1) \text{ と準備 4})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,(\tilde{P}_\mu\check{D}_\mu) && (\because \text{ 主張 2.17 } (m,n \to 2))\\
&= ((\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\tilde{P}_\mu)\,\check{D}_\mu && (\because \text{ 準備 2 } (G \to \tilde{P}_\mu,\ H \to \check{D}_\mu) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \Big(\check{\psi}_\mu^\dagger,\ \ \check{\psi}_\mu\Big)\,\check{D}_\mu && (\because \text{ 定義 15.21})\\
&= \Big(\mathrm{pr}_1\Big(\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger,\ \ \check{\psi}_\mu\Big)\,\check{D}_\mu\Big),\ \mathrm{pr}_2\Big(\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger,\ \ \check{\psi}_\mu\Big)\,\check{D}_\mu\Big)\Big) && (\because \ \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 \text{ の定め方})\\
&= \Big((\check{D}_\mu)_{11}\check{\psi}_\mu^\dagger + (\check{D}_\mu)_{21}\check{\psi}_\mu,\ (\check{D}_\mu)_{12}\check{\psi}_\mu^\dagger + (\check{D}_\mu)_{22}\check{\psi}_\mu\Big) && (\because \text{ 準備 1 の第 1 式から第 4 式までを} l = 1,2 \text{ の 2 か所へ同時適用 } (X_1 \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ X_2 \to \check{\psi}_\mu,\ G \to \check{D}_\mu))\\
&= \Big((\lambda_{+,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu^\dagger + 0_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu,\ 0_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu^\dagger + (\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu\Big) && (\because \text{ 主張 15.15 の} \check{D}_\mu \text{ と準備 4})\\
&= \Big((\lambda_{+,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu^\dagger + O,\ O + (\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu\Big) && (\because \text{ 主張 2.13 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}}) \text{ を 2 か所へ同時適用})\\
&= \Big((\lambda_{+,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu^\dagger,\ O + (\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu\Big) && (\because \text{ 主張 2.8 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}}))\\
&= \Big((\lambda_{+,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu^\dagger,\ (\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu\Big) && (\because \text{ 主張 2.9 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}}))
\end{aligned}
$$

両辺の第 1 成分と第 2 成分を取り出して

$$
\begin{aligned}
T(\check{\psi}_\mu^\dagger) &= \mathrm{pr}_1\Big(T(\check{\psi}_\mu^\dagger), T(\check{\psi}_\mu)\Big) && \big(\because \ \mathrm{pr}_1 \text{ の定め方}\big)\\
&= \mathrm{pr}_1\Big((\lambda_{+,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu^\dagger,\ (\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu\Big) && \big(\because \text{ 本体の鎖}\big)\\
&= (\lambda_{+,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu^\dagger && \big(\because \ \mathrm{pr}_1 \text{ の定め方}\big)\\
&= \Big(\exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\Big)_{\mathbb{C}}\,\check{\psi}_\mu^\dagger && \big(\because \text{ 主張 15.19}\big),\\
T(\check{\psi}_\mu) &= \mathrm{pr}_2\Big(T(\check{\psi}_\mu^\dagger), T(\check{\psi}_\mu)\Big) && \big(\because \ \mathrm{pr}_2 \text{ の定め方}\big)\\
&= \mathrm{pr}_2\Big((\lambda_{+,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu^\dagger,\ (\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu\Big) && \big(\because \text{ 本体の鎖}\big)\\
&= (\lambda_{-,\mu})_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu && \big(\because \ \mathrm{pr}_2 \text{ の定め方}\big)\\
&= \Big(\exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\Big)_{\mathbb{C}}\,\check{\psi}_\mu && \big(\because \text{ 主張 15.19}\big)
\end{aligned}
$$

$\mathbb{R}$ を使うのは $\lambda_{\pm,\mu}$ と $\exp(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$ が実数であるところだけで（γ は 定義 15.11 の arccosh、exp は実数の指数評価）、どちらも 定義 1.13 の像として $\mathbb{C}$ のスカラー倍に入る。 □

定義 15.25 ($\check{V}'$ の定義)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、$I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$（定義 2.2）と書く。

$$
\check{X} := \sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)_{\mathbb{C}} \Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}}\,I\Big) \ \in \ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C}), \qquad \check{V}' := \exp\big(\check{X}\big)
$$

と定める。$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ は 定義 15.11（実対数による arccosh で定まるので、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出する）、$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の像、$\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu$ は 定義 15.21、スカラー倍は 定義 2.3、差は 定義 1.92、和は 定義 2.5、exp は 定義 3.4 である。定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R := \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を用いる。定義 1.13 の略記に従い、以降の本文はこの $\check{X}$ を $\sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \frac{1}{2}I\Big)$ とも書く（実数 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$・$\frac{1}{2}$ によるスカラー倍は、像 $(\cdot)_{\mathbb{C}}$ によるスカラー倍を表す）。次が成り立つ。

- (1) ** 和の範囲に例外は要らない。** 定義 14.15 (2) より $\mu \in \check{\mathcal{M}} \implies M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、定義 15.21 により $\check{\psi}_\mu^\dagger$ と $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ はともに定義されており、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ のすべての項が R の元である。したがって $\check{X} \in R$。

- (2) $\check{V}' \in R^\times$ であり $\left(\check{V}'\right)^{-1} = \exp(-\check{X})$（$-\check{X}$ は 定義 1.94）。したがって 定義 7.3（$M \to M_{\mathrm{col}}$）の $T_{(\check{V}')}(W) := \check{V}' W \left(\check{V}'\right)^{-1}$ が定義される。

証明. (1) $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ を任意に取り、$\nu := M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \in \mathbb{Z}$ と置く。

$\nu \in \check{\mathcal{M}}$	$(\because$ 定義 14.15 (2)$)$
$\check{\psi}^\dagger_\mu \in R$	$(\because$ 定義 15.21 ($\mu \in \check{\mathcal{M}}$)$)$
$\check{\psi}_\nu \in R$	$(\because$ 定義 15.21 ($\mu \to \nu$. $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ は 1 行目)$)$
$\check{\psi}^\dagger_\mu \check{\psi}_\nu \in R$	$(\because$ 定義 1.6 ($2^{M_{\mathrm{col}}} \times 2^{M_{\mathrm{col}}}$ と $2^{M_{\mathrm{col}}} \times 2^{M_{\mathrm{col}}}$ の積)$)$
$I \in R$	$(\because$ 定義 2.2$)$
$\left(\frac{1}{2}\right)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$	$(\because$ 定義 1.13 ($\frac{1}{2} \in \mathbb{R}$ は $\mathbb{R}$ における 2 の逆元)$)$
$\left(\frac{1}{2}\right)_{\mathbb{C}} I \in R$	$(\because$ 定義 2.3$)$
$\check{\psi}^\dagger_\mu \check{\psi}_\nu - \left(\frac{1}{2}\right)_{\mathbb{C}} I \in R$	$(\because$ 定義 1.92$)$
$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$	$(\because$ 定義 15.11 ($\theta \to \tilde{\theta}_\mu$). 実対数の arccosh で $\mathbb{R}$ へ脱出$)$
$\left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$	$(\because$ 定義 1.13$)$
$\left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)_{\mathbb{C}} \left(\check{\psi}^\dagger_\mu \check{\psi}_\nu - \left(\frac{1}{2}\right)_{\mathbb{C}} I\right) \in R$	$(\because$ 定義 2.3$)$

$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ は任意だったので、

$$\check{X} \in R \qquad (\because \text{ 定義 2.5 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ X_j \to \text{上の最終行の } \mu = j \text{ の項}))$$

(2) $-\check{X} \in R$（定義 1.94）と $\exp(\pm\check{X}) \in R$（定義 3.4）を用いる。exp は級数の極限なので、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出する（主張 8.18）。

$$\begin{aligned}
\check{V}' \exp(-\check{X}) &= \exp(\check{X}) \exp(-\check{X}) && (\because\ \check{V}' \text{ の定義}) \\
&= \exp(-(-\check{X})) \exp(-\check{X}) && (\because \text{ 主張 2.27 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{X})) \\
&= I && (\because \text{ 主張 8.18 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to -\check{X})), \\
\exp(-\check{X}) \check{V}' &= \exp(-\check{X}) \exp(\check{X}) && (\because\ \check{V}' \text{ の定義}) \\
&= I && (\because \text{ 主張 8.18 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{X}))
\end{aligned}$$

$\check{V}' \in R^\times$	$(\because$ 上の二つの積, 定義 7.2 ($M \to M_{\mathrm{col}},\ g \to \check{V}',\ h \to \exp(-\check{X}))$$)$
$\left(\check{V}'\right)^{-1} = \exp(-\check{X})$	$(\because$ 上の二つの積, 定義 7.2 (h はただ 1 つに定まり g^{-1} と書く)$)$
$T_{(\check{V}')} : R \to R,\ W \mapsto \check{V}' W \left(\check{V}'\right)^{-1}$ が定義される	$(\because$ 定義 7.3 ($M \to M_{\mathrm{col}},\ g \to \check{V}'$)$)$

□

主張 15.26 ($T_{(\check{V}')}$ の$\check{\psi}$ への作用)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について

$$T_{(\check{V}')}\left(\check{\psi}^\dagger_\mu\right) = \left(\exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\right)_{\mathbb{C}} \check{\psi}^\dagger_\mu, \qquad T_{(\check{V}')}\left(\check{\psi}_\mu\right) = \left(\exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\right)_{\mathbb{C}} \check{\psi}_\mu$$

が成り立つ（$T_{(\check{V}')}$ は 定義 15.25 (2)、$\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}_\mu$ は 定義 15.21、$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ は 定義 15.11、exp は実数の exp（定義 3.11）で、$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の像。右辺は 定義 2.3 のスカラー倍)。$\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ は実対数による arccosh で、exp の値と $\exp(\pm\check{X})$ は級数の極限で定まるので、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出している。

証明. 定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R := \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用い、$I := I_R$（定義 2.2）、$O \in R$（定義 1.93）、$T := T_{(\check{V}')}$ と書く。行列の積は 定義 1.6、和は 定義 2.4、差は 定義 1.92、符号反転は 定義 1.94、スカラー倍は 定義 2.3、$\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ 上の和は 定義 2.5 の $r = M_{\mathrm{col}}$ の有限和、交換子は 定義 5.11 の $[A, B] := AB - BA$、反交換子は 定義 2.44、$\delta \in \mathbb{C}$ は 定義 2.1、$\mathbb{C}$ の差は 定義 1.15 による。$\nu \in \check{\mathcal{M}}$ について 定義 14.15 (2) より $M_{\mathrm{col}} + 1 - \nu \in \check{\mathcal{M}}$ であり、$M_{\mathrm{col}} + 1 - (M_{\mathrm{col}} + 1 - \nu) = \nu$ である。$\nu \in \check{\mathcal{M}}$ について

$$g_\nu := \Big(\gamma(\tilde{\theta}_\nu)\Big)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}, \qquad P_\nu := \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \in R, \qquad U := \big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}}\, I \in R$$

と置く。定義 15.25 より $\check{X} = \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} g_\nu\, (P_\nu - U)$、$\check{V}' = \exp(\check{X})$、同 (2) より $\big(\check{V}'\big)^{-1} = \exp(-\check{X})$、$T(W) = \big(\check{V}' W\big)\big(\check{V}'\big)^{-1}$（$W \in R$）である。冪は 定義 3.4 (1) の $A^0 := I$、$A^{m+1} := A^m A$ により、$A \in R$、$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について部分和を $S_N(A) := \sum_{m=0}^{N} \big(\frac{1}{m!}\big)_{\mathbb{C}}\, A^m$（定義 2.6）と置く。定義 3.4 (1) より $\exp(A)$ は $S_N(A)$ の $N \to \infty$ での極限である。

準備 1（スカラー行列は任意の元と可換）。$c \in \mathbb{C}$、$W \in R$ について

$$\begin{aligned} (cI)W - W(cI) &= [cI, W] && \big(\because \text{ 定義 } 5.11\big) \\ &= O && \big(\because \text{ 主張 } 2.89\ (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to W)\big) \end{aligned}$$

であるから、主張 1.95 より $(cI)W = W(cI)$ である。

準備 2（差と積）。$A, B, C \in R$ について

$$\begin{aligned} (A - B)C &= (A + (-B))\, C && \big(\because \text{ 主張 } 2.30\big) \\ &= AC + (-B)C && \big(\because \text{ 主張 } 2.24\big) \\ &= AC + (-(BC)) && \big(\because \text{ 主張 } 2.20\big) \\ &= AC - BC && \big(\because \text{ 主張 } 2.30\big) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C(A - B) &= C\,(A + (-B)) && \big(\because \text{ 主張 } 2.30\big) \\ &= CA + C(-B) && \big(\because \text{ 主張 } 2.23\big) \\ &= CA + (-(CB)) && \big(\because \text{ 主張 } 2.21\big) \\ &= CA - CB && \big(\because \text{ 主張 } 2.30\big) \end{aligned}$$

準備 3（差の打ち消し）。$A, B, C \in R$、$k, l \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について

$$\begin{aligned} ((A - B) - (C - B))_{kl} &= (A - B)_{kl} - (C - B)_{kl} && \big(\because \text{ 定義 } 1.92\big) \\ &= (A_{kl} - B_{kl}) - (C_{kl} - B_{kl}) && \big(\because \text{ 定義 } 1.92 \text{ を 2 か所へ同時適用}\big) \\ &= A_{kl} - C_{kl} && \big(\because \text{ 主張 } 1.56 \text{ と 定義 } 1.15\big) \\ &= (A - C)_{kl} && \big(\because \text{ 定義 } 1.92\big) \end{aligned}$$

であり、成分がすべて等しいので $(A - B) - (C - B) = A - C$ である。

準備 4（和の差）。$A_\nu, B_\nu \in R$（$\nu \in \check{\mathcal{M}}$）、$k, l \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について、まず

$$
\begin{aligned}
\Big(\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}(A_\nu+B_\nu)\Big)_{kl} &= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}(A_\nu+B_\nu)_{kl} && (\because \text{主張 2.7})\\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}((A_\nu)_{kl}+(B_\nu)_{kl}) && (\because \text{定義 2.4 を各項へ同時適用})\\
&= \Big(\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}(A_\nu)_{kl}\Big)+\Big(\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}(B_\nu)_{kl}\Big) && (\because \text{主張 2.22})\\
&= \Big(\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}A_\nu\Big)_{kl}+\Big(\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}B_\nu\Big)_{kl} && (\because \text{主張 2.7 を 2 か所へ同時適用})\\
&= \Big(\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}A_\nu+\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}B_\nu\Big)_{kl} && (\because \text{定義 2.4})
\end{aligned}
$$

であり、成分がすべて等しいので $\sum_\nu (A_\nu+B_\nu)=\sum_\nu A_\nu+\sum_\nu B_\nu$ である。よって

$$
\begin{aligned}
\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}(A_\nu-B_\nu) &= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}(A_\nu+(-B_\nu)) && (\because \text{主張 2.30 を各項へ同時適用})\\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}A_\nu+\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}(-B_\nu) && (\because \text{直前の和の等式 } (B_\nu\to -B_\nu))\\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}A_\nu+\Big(-\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}B_\nu\Big) && (\because \text{主張 2.29})\\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}A_\nu-\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}B_\nu && (\because \text{主張 2.30})
\end{aligned}
$$

準備 5（$\check{X}$ との交換子の展開）。$W\in R$、$\nu\in\check{\mathcal{M}}$ について $C_\nu:=g_\nu(P_\nu-U)\in R$ と置くと

$$
\begin{aligned}
[C_\nu,W] &= (g_\nu(P_\nu-U))W-W(g_\nu(P_\nu-U)) && (\because \text{定義 5.11})\\
&= g_\nu((P_\nu-U)W)-W(g_\nu(P_\nu-U)) && (\because \text{主張 2.18})\\
&= g_\nu((P_\nu-U)W)-g_\nu(W(P_\nu-U)) && (\because \text{主張 2.19})\\
&= g_\nu(P_\nu W-UW)-g_\nu(W(P_\nu-U)) && (\because \text{準備 2 の第 1 式})\\
&= g_\nu(P_\nu W-UW)-g_\nu(WP_\nu-WU) && (\because \text{準備 2 の第 2 式})\\
&= g_\nu(P_\nu W-UW)-g_\nu(WP_\nu-UW) && (\because \text{準備 1 } (c\to(\tfrac{1}{2})_{\mathbb{C}}) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= g_\nu((P_\nu W-UW)-(WP_\nu-UW)) && (\because \text{主張 2.32 を右辺から左辺へ})\\
&= g_\nu(P_\nu W-WP_\nu) && (\because \text{準備 3})\\
&= g_\nu[P_\nu,W] && (\because \text{定義 5.11})
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
[\check{X}, W] &= \check{X}W - W\check{X} && (\because \text{定義 } 5.11)\\
&= \Big(\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} C_\nu\Big)W - W\Big(\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} C_\nu\Big) && (\because \text{定義 } 15.25 \text{ の } \check{X} \text{ を } 2 \text{ か所へ同時適用})\\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} (C_\nu W) - W\Big(\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} C_\nu\Big) && (\because \text{主張 } 2.36)\\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} (C_\nu W) - \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} (WC_\nu) && (\because \text{主張 } 2.37)\\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} (C_\nu W - WC_\nu) && (\because \text{準備 } 4 \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} [C_\nu, W] && (\because \text{定義 } 5.11 \text{ を各項へ同時適用})\\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} g_\nu [P_\nu, W] && (\because \text{直前の } [C_\nu, W] \text{ の式を各項へ同時適用})
\end{aligned}
$$

準備 6（cI の成分）。$c \in \mathbb{C}$、$k, l \in \{1, \dots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について

$$
\begin{aligned}
(cI)_{kl} &= c\, I_{kl} && (\because \text{定義 } 2.3)\\
&= c\, \delta_{kl} && (\because \text{定義 } 2.2)
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
c\,\delta_{kk} &= c\,1_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 } 2.1) & \qquad c\,\delta_{kl} &= c\,0_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 } 2.1\ (k \neq l))\\
&= c && (\because \text{主張 } 1.56 \text{ の乗法の単位元}) & &= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 } 1.56)
\end{aligned}
$$

である。よって cI は 定義 4.2 の対角行列で、対角成分は c である。

準備 7（$\exp(cI) = \exp(c)\, I$）。$c \in \mathbb{C}$、$k, l \in \{1, \dots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について（$\exp(c)$ は 定義 3.11 の複素数の exp）

$$
\begin{aligned}
\exp(cI)_{kl} &= \begin{cases} \exp((cI)_{kk}) & (k = l) \\ 0_{\mathbb{C}} & (k \neq l) \end{cases} && (\because \text{主張 } 4.3\ (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ D \to cI))\\
&= \begin{cases} \exp(c) & (k = l) \\ 0_{\mathbb{C}} & (k \neq l) \end{cases} && (\because \text{準備 } 6 \text{ の対角成分})\\
&= \begin{cases} \exp(c)\,1_{\mathbb{C}} & (k = l) \\ \exp(c)\,0_{\mathbb{C}} & (k \neq l) \end{cases} && (\because \text{主張 } 1.56)\\
&= \exp(c)\,\delta_{kl} && (\because \text{定義 } 2.1)\\
&= (\exp(c)\, I)_{kl} && (\because \text{準備 } 6 \text{ の第 } 1 \text{ の鎖 } (c \to \exp(c)) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

であり、成分がすべて等しいので $\exp(cI) = \exp(c)\, I$ である（$\exp(cI)$ と $\exp(c)$ は級数の極限で定まるので、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出している）。

準備 8（$\check{X} + cI$ と $-\check{X}$ の可換性と和）。$c \in \mathbb{C}$ について

$$
\begin{aligned}
\big(\check{X} + cI\big)\big(-\check{X}\big) &= \check{X}\big(-\check{X}\big) + (cI)\big(-\check{X}\big) && (\because \text{主張 } 2.24)\\
&= -\big(\check{X}\check{X}\big) + (cI)\big(-\check{X}\big) && (\because \text{主張 } 2.21)\\
&= -\big(\check{X}\check{X}\big) + \big(-\check{X}\big)(cI) && (\because \text{準備 } 1\ (W \to -\check{X}))\\
&= \big(-\check{X}\big)\check{X} + \big(-\check{X}\big)(cI) && (\because \text{主張 } 2.20 \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \big(-\check{X}\big)\big(\check{X} + cI\big) && (\because \text{主張 } 2.23 \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

であり、

$$\begin{aligned}
\left(\check{X}+cI\right)+\left(-\check{X}\right) &= \left(-\check{X}\right)+\left(\check{X}+cI\right) && \left(\because \text{ 主張 2.14}\right)\\
&= \left(-\check{X}\right)+\left(cI+\check{X}\right) && \left(\because \text{ 主張 2.14}\right)\\
&= \left(-\check{X}\right)+\left(cI+\left(-\left(-\check{X}\right)\right)\right) && \left(\because \text{ 主張 2.27 を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \left(-\check{X}\right)+\left(cI-\left(-\check{X}\right)\right) && \left(\because \text{ 主張 2.30 を右辺から左辺へ}\right)\\
&= cI && \left(\because \text{ 主張 2.67 } (A\to -\check{X},\ B\to cI)\right)
\end{aligned}$$

である。

Step 1（1 項ぶんの交換子、$\check{\psi}_\mu^\dagger$ 側）。$\nu\in\check{\mathcal{M}}$ について、$\delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}=\delta_{\mu,\nu}$ である（定義 2.1 と、$\mathbb{Z}$ で $M_{\mathrm{col}}+1-\nu=M_{\mathrm{col}}+1-\mu \iff \mu=\nu$）。主張 1.91 の交換子・反交換子は 定義 5.11・定義 2.44 のものと同じ式である。

$$\begin{aligned}
[P_\nu,\check{\psi}_\mu^\dagger] &= \left[\check{\psi}_\nu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ \check{\psi}_\mu^\dagger\right] && \left(\because\ P_\nu \text{ の定め方}\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\left[\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\check{\psi}_\mu^\dagger\right]_+ - \left[\check{\psi}_\nu^\dagger,\check{\psi}_\mu^\dagger\right]_+\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 主張 1.91 } (a\to\check{\psi}_\nu^\dagger,\ b\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ c\to\check{\psi}_\mu^\dagger)\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\check{\psi}_\mu^\dagger+\check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right) - \left[\check{\psi}_\nu^\dagger,\check{\psi}_\mu^\dagger\right]_+\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 定義 2.44}\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}+\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\check{\psi}_\mu^\dagger\right) - \left[\check{\psi}_\nu^\dagger,\check{\psi}_\mu^\dagger\right]_+\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 主張 2.14}\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\left[\check{\psi}_\mu^\dagger,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right]_+ - \left[\check{\psi}_\nu^\dagger,\check{\psi}_\mu^\dagger\right]_+\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 定義 2.44}\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\left(\delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I\right) - \left[\check{\psi}_\nu^\dagger,\check{\psi}_\mu^\dagger\right]_+\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 主張 15.23 の第 2 式 } (\nu\to M_{\mathrm{col}}+1-\nu)\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\left(\delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I\right) - O\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 主張 15.23 の第 1 式 } ((\mu,\nu)\to(\nu,\mu))\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\left(\delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I\right) - O && \left(\because \text{ 主張 2.46}\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\left(\delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I\right) && \left(\because \text{ 主張 2.10}\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\left(\delta_{\mu,\nu}\,I\right) && \left(\because\ \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}=\delta_{\mu,\nu}\right)\\
&= \delta_{\mu,\nu}\left(\check{\psi}_\nu^\dagger I\right) && \left(\because \text{ 主張 2.19}\right)\\
&= \delta_{\mu,\nu}\,\check{\psi}_\nu^\dagger && \left(\because \text{ 主張 2.17}\right)
\end{aligned}$$

Step 1’（1 項ぶんの交換子、$\check{\psi}_\mu$ 側）。$\nu\in\check{\mathcal{M}}$ について

$$\begin{aligned}
[P_\nu,\check{\psi}_\mu] &= \left[\check{\psi}_\nu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ \check{\psi}_\mu\right] && \left(\because\ P_\nu \text{ の定め方}\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\left[\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\check{\psi}_\mu\right]_+ - \left[\check{\psi}_\nu^\dagger,\check{\psi}_\mu\right]_+\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 主張 1.91 } (a\to\check{\psi}_\nu^\dagger,\ b\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ c\to\check{\psi}_\mu)\right)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\,O - \left[\check{\psi}_\nu^\dagger,\check{\psi}_\mu\right]_+\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 主張 15.23 の第 3 式 } ((\mu,\nu)\to(M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\mu))\right)\\
&= O - \left[\check{\psi}_\nu^\dagger,\check{\psi}_\mu\right]_+\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 主張 2.47}\right)\\
&= O - \left(\delta_{\mu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\,I\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 主張 15.23 の第 2 式 } ((\mu,\nu)\to(\nu,\mu))\right)\\
&= O - \delta_{\mu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\left(I\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right) && \left(\because \text{ 主張 2.18}\right)\\
&= O - \delta_{\mu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} && \left(\because \text{ 主張 2.16}\right)\\
&= O + \left(-\left(\delta_{\mu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right)\right) && \left(\because \text{ 主張 2.30}\right)\\
&= -\left(\delta_{\mu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right) && \left(\because \text{ 主張 2.9}\right)
\end{aligned}$$

Step 2（$[\check{X},\check{\psi}_\mu^\dagger]=g_\mu\check{\psi}_\mu^\dagger$）。$\nu\in\check{\mathcal{M}}$、$\nu\neq\mu$ の項は

$$\begin{aligned}
g_\nu\left(\delta_{\mu,\nu}\,\check{\psi}_\nu^\dagger\right) &= g_\nu\left(0_{\mathbb{C}}\,\check{\psi}_\nu^\dagger\right) && \left(\because \text{ 定義 2.1 } (\nu\neq\mu)\right)\\
&= g_\nu\,O && \left(\because \text{ 主張 2.13}\right)\\
&= O && \left(\because \text{ 主張 2.12}\right)
\end{aligned}$$

なので、

$$\begin{aligned}
[\check{X}, \check{\psi}_\mu^\dagger] &= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} g_\nu [P_\nu, \check{\psi}_\mu^\dagger] && \left(\because \text{準備 5 } (W \to \check{\psi}_\mu^\dagger)\right) \\
&= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} g_\nu \left(\delta_{\mu,\nu}\, \check{\psi}_\nu^\dagger\right) && \left(\because \text{Step 1 を各項へ同時適用}\right) \\
&= g_\mu \left(\delta_{\mu,\mu}\, \check{\psi}_\mu^\dagger\right) && \left(\because \text{主張 2.40 } (r \to M_{\mathrm{col}},\ q \to \mu)\right) \\
&= g_\mu \left(1_{\mathbb{C}}\, \check{\psi}_\mu^\dagger\right) && \left(\because \text{定義 2.1}\right) \\
&= g_\mu\, \check{\psi}_\mu^\dagger && \left(\because \text{主張 2.42}\right)
\end{aligned}$$

Step 2' ($[\check{X}, \check{\psi}_\mu] = (-g_\mu)\check{\psi}_\mu$)。$\nu \in \check{\mathcal{M}}$ で $\delta_{\mu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \neq 0_{\mathbb{C}}$ となるのは $M_{\mathrm{col}} + 1 - \nu = \mu$、すなわち $\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$ だけである。それ以外の ν の項は

$$\begin{aligned}
g_\nu \left(-\left(\delta_{\mu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right)\right) &= g_\nu \left(-\left(0_{\mathbb{C}}\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right)\right) && \left(\because \text{定義 2.1 } (M_{\mathrm{col}} + 1 - \nu \neq \mu)\right) \\
&= g_\nu\, (-O) && \left(\because \text{主張 2.13}\right) \\
&= g_\nu\, ((-1_{\mathbb{C}})\, O) && \left(\because \text{主張 2.25}\right) \\
&= g_\nu\, O && \left(\because \text{主張 2.12}\right) \\
&= O && \left(\because \text{主張 2.12}\right)
\end{aligned}$$

なので、

$$\begin{aligned}
[\check{X}, \check{\psi}_\mu] &= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} g_\nu [P_\nu, \check{\psi}_\mu] && (\because \text{準備 5 } (W \to \check{\psi}_\mu)) \\
&= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} g_\nu \left(-\left(\delta_{\mu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right)\right) && (\because \text{Step 1' を各項へ同時適用}) \\
&= g_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \left(-\left(\delta_{\mu,\, M_{\mathrm{col}}+1-(M_{\mathrm{col}}+1-\mu)}\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-(M_{\mathrm{col}}+1-\mu)}\right)\right) && (\because \text{主張 2.40 } (r \to M_{\mathrm{col}},\ q \to M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu)) \\
&= g_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \left(-\left(\delta_{\mu,\mu}\, \check{\psi}_\mu\right)\right) && (\because \mathbb{Z} \text{ で } M_{\mathrm{col}} + 1 - (M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu) = \mu) \\
&= g_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \left(-\left(1_{\mathbb{C}}\, \check{\psi}_\mu\right)\right) && (\because \text{定義 2.1}) \\
&= g_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \left(-\check{\psi}_\mu\right) && (\because \text{主張 2.42}) \\
&= -\left(g_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, \check{\psi}_\mu\right) && (\because \text{主張 2.26}) \\
&= -\left(g_\mu\, \check{\psi}_\mu\right) && (\because g_\nu \text{ の定め方と 主張 15.22 (3) の } \gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \text{ から } g_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = g_\mu) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\, (g_\mu\, \check{\psi}_\mu) && (\because \text{主張 2.25}) \\
&= ((-1_{\mathbb{C}})\, g_\mu)\, \check{\psi}_\mu && (\because \text{主張 2.41}) \\
&= (-g_\mu)\, \check{\psi}_\mu && (\because \text{定義 1.14})
\end{aligned}$$

Step 3（移項）。以下 Step 6 まで、$W \in R$ と $c \in \mathbb{C}$ が $[\check{X}, W] = cW$ を満たすとする。

$$\begin{aligned}
\check{X}W &= W\check{X} + \left(\check{X}W - W\check{X}\right) && \left(\because \text{主張 2.67 } (A \to W\check{X},\ B \to \check{X}W) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= W\check{X} + [\check{X}, W] && \left(\because \text{定義 5.11}\right) \\
&= W\check{X} + cW && \left(\because \text{仮定 } [\check{X}, W] = cW\right) \\
&= W\check{X} + c\,(WI) && \left(\because \text{主張 2.17 を右辺から左辺へ}\right) \\
&= W\check{X} + W(cI) && \left(\because \text{主張 2.19 を右辺から左辺へ}\right) \\
&= W\left(\check{X} + cI\right) && \left(\because \text{主張 2.23 を右辺から左辺へ}\right)
\end{aligned}$$

Step 4（帰納法）。$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\check{X}^n W = W\left(\check{X} + cI\right)^n$ を n についての帰納法で示す。$n = 0$ のとき

$$\begin{aligned}
\check{X}^0 W &= IW && \left(\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I\right) \\
&= W && \left(\because \text{主張 2.16}\right) \\
&= WI && \left(\because \text{主張 2.17 を右辺から左辺へ}\right) \\
&= W\left(\check{X} + cI\right)^0 && \left(\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I\right)
\end{aligned}$$

n で成り立つとすると、

$$\begin{aligned}
\check{X}^{n+1}W &= \left(\check{X}^n\check{X}\right)W && \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^mA\right)\\
&= \check{X}^n\left(\check{X}W\right) && \left(\because \text{ 主張 2.15}\right)\\
&= \check{X}^n\left(W\left(\check{X}+cI\right)\right) && \left(\because \text{ Step 3}\right)\\
&= \left(\check{X}^nW\right)\left(\check{X}+cI\right) && \left(\because \text{ 主張 2.15}\right)\\
&= \left(W\left(\check{X}+cI\right)^n\right)\left(\check{X}+cI\right) && \left(\because \text{ 帰納法の仮定}\right)\\
&= W\left(\left(\check{X}+cI\right)^n\left(\check{X}+cI\right)\right) && \left(\because \text{ 主張 2.15}\right)\\
&= W\left(\check{X}+cI\right)^{n+1} && \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^mA\right)
\end{aligned}$$

Step 5（部分和と極限）。$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $a_m := \left(\frac{1}{m!}\right)_{\mathbb{C}}$ と書くと

$$\begin{aligned}
S_N(\check{X})\,W &= \Big(\sum_{m=0}^{N} a_m\check{X}^m\Big)W && \left(\because \ S_N \text{ の定め方}\right)\\
&= \Big(\sum_{j=1}^{N+1} a_{j-1}\check{X}^{j-1}\Big)W && \left(\because \text{ 定義 2.6}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N+1}\left(\left(a_{j-1}\check{X}^{j-1}\right)W\right) && \left(\because \text{ 主張 2.36}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N+1} a_{j-1}\left(\check{X}^{j-1}W\right) && \left(\because \text{ 主張 2.18 を各項へ同時適用}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N+1} a_{j-1}\left(W\left(\check{X}+cI\right)^{j-1}\right) && \left(\because \text{ Step 4 を各項へ同時適用}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{N+1}\left(W\left(a_{j-1}\left(\check{X}+cI\right)^{j-1}\right)\right) && \left(\because \text{ 主張 2.19 を右辺から左辺へ、各項へ同時適用}\right)\\
&= W\Big(\sum_{j=1}^{N+1} a_{j-1}\left(\check{X}+cI\right)^{j-1}\Big) && \left(\because \text{ 主張 2.37 を右辺から左辺へ}\right)\\
&= W\Big(\sum_{m=0}^{N} a_m\left(\check{X}+cI\right)^m\Big) && \left(\because \text{ 定義 2.6 を右辺から左辺へ}\right)\\
&= W\,S_N\big(\check{X}+cI\big) && \left(\because \ S_N \text{ の定め方}\right)
\end{aligned}$$

である。定義 3.4 (1) より $S_N(\check{X}) \to \exp(\check{X})$、$S_N(\check{X}+cI) \to \exp(\check{X}+cI)$ であるから、主張 2.96（A_N を $S_N(\check{X})$ に、A を $\exp(\check{X})$ に、B を W に取る）より $S_N(\check{X})\,W \to \exp(\check{X})\,W$、主張 2.97（$A_N$ を $S_N(\check{X}+cI)$ に、A を $\exp(\check{X}+cI)$ に、B を W に取る）より $W\,S_N(\check{X}+cI) \to W\exp(\check{X}+cI)$ である。直前の等式より二つの列は同じ列なので、主張 2.92 (4)（極限の一意性）より

$$\exp(\check{X})\,W = W\exp\big(\check{X}+cI\big)$$

である（極限をとるので、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出している）。

Step 6（結論の一般形）。定理 3.7 の両辺の exp は級数の極限で定まる量であり、ここでも $\mathbb{R}$ へ脱出している。

$$
\begin{aligned}
T(W) &= \left(\check{V}'W\right)\left(\check{V}'\right)^{-1} && \left(\because \text{定義 15.25 (2) の } T_{(\check{V}')} \text{ (三つの積は左から読む。主張 2.15 より読み方に依らない)}\right)\\
&= \left(\exp(\check{X})\,W\right)\left(\check{V}'\right)^{-1} && \left(\because \text{定義 15.25 の } \check{V}' := \exp(\check{X})\right)\\
&= \left(\exp(\check{X})\,W\right)\exp(-\check{X}) && \left(\because \text{定義 15.25 (2) の } \left(\check{V}'\right)^{-1} = \exp(-\check{X})\right)\\
&= \left(W\exp\left(\check{X}+cI\right)\right)\exp(-\check{X}) && \left(\because \text{Step 5}\right)\\
&= W\left(\exp\left(\check{X}+cI\right)\exp(-\check{X})\right) && \left(\because \text{主張 2.15}\right)\\
&= W\exp\left(\left(\check{X}+cI\right)+\left(-\check{X}\right)\right) && \left(\because \text{定理 3.7 } (A\to\check{X}+cI,\ B\to-\check{X}),\ \text{準備 8 の可換性}\right)\\
&= W\exp(cI) && \left(\because \text{準備 8 の和}\right)\\
&= W\left(\exp(c)\,I\right) && \left(\because \text{準備 7}\right)\\
&= \exp(c)\left(WI\right) && \left(\because \text{主張 2.19}\right)\\
&= \exp(c)\,W && \left(\because \text{主張 2.17}\right)
\end{aligned}
$$

結論。Step 2 より $W\to\check{\psi}_\mu^\dagger$、$c\to g_\mu$ で Step 3〜6 の仮定が成り立つので

$$
\begin{aligned}
T\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right) &= \exp(g_\mu)\,\check{\psi}_\mu^\dagger && \left(\because \text{Step 6 } (W\to\check{\psi}_\mu^\dagger,\ c\to g_\mu)\right)\\
&= \exp\left(\left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)_{\mathbb{C}}\right)\check{\psi}_\mu^\dagger && \left(\because\ g_\mu \text{ の定め方}\right)\\
&= \left(\exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\right)_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu^\dagger && \left(\because \text{主張 3.18 } (x\to\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\right)
\end{aligned}
$$

である。また Step 2' より $W\to\check{\psi}_\mu$、$c\to -g_\mu$ で Step 3〜6 の仮定が成り立ち、

$$
\begin{aligned}
-g_\mu &= -\left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)_{\mathbb{C}} && \left(\because\ g_\mu \text{ の定め方}\right)\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)_{\mathbb{C}} && \left(\because \text{定義 1.14}\right)\\
&= (-1)_{\mathbb{C}}\left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)_{\mathbb{C}} && \left(\because \text{定義 1.13 の } -1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1) = (-1)_{\mathbb{C}}\right)\\
&= \left((-1)\,\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)_{\mathbb{C}} && \left(\because \text{主張 1.29}\right)\\
&= \left(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の } (-1)x = -x\right)
\end{aligned}
$$

であるから

$$
\begin{aligned}
T\left(\check{\psi}_\mu\right) &= \exp(-g_\mu)\,\check{\psi}_\mu && \left(\because \text{Step 6 } (W\to\check{\psi}_\mu,\ c\to -g_\mu)\right)\\
&= \exp\left(\left(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)_{\mathbb{C}}\right)\check{\psi}_\mu && \left(\because \text{直前の等式}\right)\\
&= \left(\exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\right)_{\mathbb{C}}\check{\psi}_\mu && \left(\because \text{主張 3.18 } (x\to-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\right)
\end{aligned}
$$

□

主張 15.27 ($T_{(V^{(+)})}$ と$T_{(\check{V}')}$ は$\check{Z},\check{Y}$ 上で一致する)**.** $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。すべての $\mu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について

$$
T_{(V^{(+)})}\left(\check{Z}_\mu\right) = T_{(\check{V}')}\left(\check{Z}_\mu\right),\qquad T_{(V^{(+)})}\left(\check{Y}_\mu\right) = T_{(\check{V}')}\left(\check{Y}_\mu\right)
$$

が成り立つ（$T_{(V^{(+)})}$ は 定義 14.20、$T_{(\check{V}')}$ は 定義 15.25 (2)、$\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu$ は 定義 14.9・定義 14.10)。

証明. $\mu\in\check{\mathcal{M}}$ を固定する。定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R := \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ と $R^\times$ を用いる。$X_1 := \check{Z}_\mu$、$X_2 := \check{Y}_\mu$、$\Psi_1 := \check{\psi}_\mu^\dagger$、$\Psi_2 := \check{\psi}_\mu$（いずれも R の元）と書き、$k,l\in\{1,2\}$ について $p_{kl} := (\check{P}_\mu)_{kl}\in\mathbb{C}$、$q_{kl} := (\check{P}_\mu^{-1})_{kl}\in\mathbb{C}$ と書く。$\check{P}_\mu^{-1}$ は 定義 7.2 の M を 1 に取ったときの逆元（$\mathrm{Mat}(2^1,\mathbb{C}) = \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$。主張 15.15 の主張に現れるもの）で、$\check{P}_\mu\check{P}_\mu^{-1} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ を満たす。組 $(W_1,W_2)\in R\times R$ について $\mathrm{pr}_k(W_1,W_2) := W_k$ と書く。組と 2×2 行列の積は 定

義 14.32、組と数の列の積は 定義 14.27、$\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の積は 定義 1.6、有限和は 定義 2.5 と 定義 1.16 による。

準備 1（$\check{\psi}^{\dagger}_{\mu},\check{\psi}_{\mu}$ を $\check{Z}_{\mu},\check{Y}_{\mu}$ で書く）。$k\in\{1,2\}$ について

$$
\begin{aligned}
\Psi_k &= \mathrm{pr}_k(\Psi_1,\Psi_2) && (\because\ \mathrm{pr}_k \text{ の定め方})\\
&= \mathrm{pr}_k\big((X_1,\ \ X_2)\,\check{P}_{\mu}\big) && (\because\ \text{定義 15.21})\\
&= \mathrm{pr}_k\left((X_1,\ \ X_2)\begin{pmatrix}p_{11}\\ p_{21}\end{pmatrix},\ (X_1,\ \ X_2)\begin{pmatrix}p_{12}\\ p_{22}\end{pmatrix}\right) && (\because\ \text{定義 14.32 } (d\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to X_1,\ B\to X_2,\ p,q,r,s\to p_{11},p_{12},p_{21},p_{22}))\\
&= (X_1,\ \ X_2)\begin{pmatrix}p_{1k}\\ p_{2k}\end{pmatrix} && (\because\ \mathrm{pr}_k \text{ の定め方})\\
&= p_{1k}X_1+p_{2k}X_2 && (\because\ \text{定義 14.27})\\
&= \Big(\sum_{i=1}^{1}p_{ik}X_i\Big)+p_{2k}X_2 && (\because\ \text{定義 2.5 の}r=1\text{ の式を右辺から左辺へ})\\
&= \sum_{i=1}^{2}p_{ik}X_i && (\because\ \text{定義 2.5 の}r+1\text{ の式 }(r\to 1)\text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

準備 2（$\check{Z}_{\mu},\check{Y}_{\mu}$ を $\check{\psi}^{\dagger}_{\mu},\check{\psi}_{\mu}$ で書く）。$i,l\in\{1,2\}$ で $i\neq l$ なら

$$
\begin{aligned}
\delta_{il}X_i &= 0_{\mathbb{C}}X_i \quad \big(\because\ \text{定義 2.1 } (n\to 2)\big)\\
&= O \qquad \big(\because\ \text{主張 2.13 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}})\big)
\end{aligned}
$$

である（O は 定義 1.93 の零行列 $O\in R$）。これを使って、$l\in\{1,2\}$ について

$$
\begin{aligned}
X_l &= 1_{\mathbb{C}}X_l && (\because\ \text{主張 2.42 を右辺から左辺へ})\\
&= \delta_{ll}X_l && (\because\ \text{定義 2.1 } (n\to 2) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \sum_{i=1}^{2}\delta_{il}X_i && (\because\ \text{主張 2.40(和の添字}a\text{ を}i\text{ に、項}X_a\text{ を}\delta_{al}X_a\text{ に、定理の}r,q\text{ を}2,l\text{ に取る）を右辺から左辺へ。}i\neq l\text{ の項が}O\text{ であることは上の鎖})\\
&= \sum_{i=1}^{2}\left(I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\right)_{il}X_i && (\because\ \text{定義 2.2 } (n\to 2) \text{ を右辺から左辺へ、}i=1,2\text{ の 2 か所へ同時適用})\\
&= \sum_{i=1}^{2}\left(\check{P}_{\mu}\check{P}_{\mu}^{-1}\right)_{il}X_i && (\because\ \text{定義 7.2 } (M\to 1) \text{ の}\check{P}_{\mu}\check{P}_{\mu}^{-1}=I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\text{ を右辺から左辺へ、}i=1,2\text{ の 2 か所へ同時適用})\\
&= \sum_{i=1}^{2}\Big(\sum_{k=1}^{2}p_{ik}q_{kl}\Big)X_i && (\because\ \text{定義 1.6 を}i=1,2\text{ の 2 か所へ同時適用})\\
&= \sum_{i=1}^{2}\Big(\sum_{k=1}^{2}q_{kl}p_{ik}\Big)X_i && (\because\ \text{主張 1.56 の乗法の可換則を 4 か所へ同時適用})\\
&= \sum_{i=1}^{2}\sum_{k=1}^{2}\left(q_{kl}p_{ik}\right)X_i && (\because\ \text{主張 2.35 を右辺から左辺へ、}i=1,2\text{ の 2 か所へ同時適用})\\
&= \sum_{i=1}^{2}\sum_{k=1}^{2}q_{kl}\left(p_{ik}X_i\right) && (\because\ \text{主張 2.41 を右辺から左辺へ、4 か所へ同時適用})\\
&= \sum_{k=1}^{2}\sum_{i=1}^{2}q_{kl}\left(p_{ik}X_i\right) && (\because\ \text{主張 2.39})\\
&= \sum_{k=1}^{2}q_{kl}\Big(\sum_{i=1}^{2}p_{ik}X_i\Big) && (\because\ \text{主張 2.34 を}k=1,2\text{ の 2 か所へ同時適用})\\
&= \sum_{k=1}^{2}q_{kl}\Psi_k && (\because\ \text{準備 1 を右辺から左辺へ、}k=1,2\text{ の 2 か所へ同時適用})\\
&= \Big(\sum_{k=1}^{1}q_{kl}\Psi_k\Big)+q_{2l}\Psi_2 && (\because\ \text{定義 2.5 の}r+1\text{ の式 }(r\to 1))\\
&= q_{1l}\Psi_1+q_{2l}\Psi_2 && (\because\ \text{定義 2.5 の}r=1\text{ の式})
\end{aligned}
$$

準備 3（二つの写像を共役として読む）。主張 14.21 により $V^{(+)}\in R^{\times}$ で、主張 14.22 により写像として $T_{(V^{(+)})}=T_{V^{(+)}}$ である。定義 15.25 (2) により $\check{V}'\in R^{\times}$ で、$T_{(\check{V}')}$ は 定義 7.3（$M\to M_{\mathrm{col}}$）の $\check{V}'$ による共役 $T_{\check{V}'}$ そのもの（$T_{(\check{V}')}=T_{\check{V}'}$）である。

本体。$l\in\{1,2\}$ について

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(X_l) &= T_{(V^{(+)})}(q_{1l}\Psi_1 + q_{2l}\Psi_2) && (\because \text{準備 2})\\
&= T_{V^{(+)}}(q_{1l}\Psi_1 + q_{2l}\Psi_2) && (\because \text{主張 14.22})\\
&= q_{1l}\,T_{V^{(+)}}(\Psi_1) + q_{2l}\,T_{V^{(+)}}(\Psi_2) && (\because \text{主張 7.4 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ g \to V^{(+)},\ a \to q_{1l},\ b \to q_{2l},\ X \to \Psi_1,\ W \to \Psi_2))\\
&= q_{1l}\,T_{(V^{(+)})}(\Psi_1) + q_{2l}\,T_{(V^{(+)})}(\Psi_2) && (\because \text{主張 14.22 を右辺から左辺へ、2 か所へ同時適用})\\
&= q_{1l}\left(\left(\exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\right)_{\mathbb{C}}\Psi_1\right) + q_{2l}\left(\left(\exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\right)_{\mathbb{C}}\Psi_2\right) && (\because \text{主張 15.24 の二つの式})\\
&= q_{1l}\,T_{(\check{V}')}(\Psi_1) + q_{2l}\,T_{(\check{V}')}(\Psi_2) && (\because \text{主張 15.26 の二つの式を右辺から左辺へ})\\
&= q_{1l}\,T_{\check{V}'}(\Psi_1) + q_{2l}\,T_{\check{V}'}(\Psi_2) && (\because \text{定義 15.25 (2) の} T_{(\check{V}')} = T_{\check{V}'} \text{ を 2 か所へ同時適用})\\
&= T_{\check{V}'}(q_{1l}\Psi_1 + q_{2l}\Psi_2) && (\because \text{主張 7.4 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ g \to \check{V}',\ a \to q_{1l},\ b \to q_{2l},\ X \to \Psi_1,\ W \to \Psi_2) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= T_{(\check{V}')}(q_{1l}\Psi_1 + q_{2l}\Psi_2) && (\because \text{定義 15.25 (2) の} T_{(\check{V}')} = T_{\check{V}'} \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= T_{(\check{V}')}(X_l) && (\because \text{準備 2 を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

$l = 1$ が第 1 の式（$X_1 = \check{Z}_\mu$）、$l = 2$ が第 2 の式（$X_2 = \check{Y}_\mu$）である。この証明は新たに $\mathbb{R}$ を持ち込まない。$\mathbb{R}$ を経て作られた値は、引くブロックが宣言した脱出をそのまま引き継ぐ。p_{kl}, q_{kl} は $|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)|$ と $\sqrt{M_{\mathrm{col}}}$ を通して 主張 15.15・定義 15.21 から、本体の第 5 式の $\exp(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$ は実対数による arccosh（定義 15.11）と実数の指数評価を通して 主張 15.24・主張 15.26 から、$\check{V}' = \exp(\check{X})$ は 定義 3.4 の極限を通して 定義 15.25 から引き継ぐ。この証明の中の計算は $\mathbb{C}$ と R の演算だけで閉じる。 □

主張 15.28 ($T_{(V^{(+)})} = T_{(\check{V}')}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。すべての $x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について

$$T_{(V^{(+)})}(x) = T_{(\check{V}')}(x)$$

が成り立つ。

証明. 定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R := \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と $R^\times$、$I := I_R$（定義 2.2）を用いる。主張 14.21 により $V^{(+)} \in R^\times$、定義 15.25 (2) により $\check{V}' \in R^\times$ である。$g \in R^\times$ について、定理 1.8 の n を $2^{M_{\mathrm{col}}}$、その変数 B を g に取った写像を $T'_g : R \to R$、$T'_g(X) := (gX)g^{-1}$ と書く（定義 7.3 の T_g と記号で区別するため）。g^{-1} は 定義 7.2 の逆元で $gg^{-1} = I$ かつ $g^{-1}g = I$ を満たすので、g は 定理 1.8・主張 1.90 の意味で正則であり、g^{-1} はそこでの逆行列でもある。定義 7.3 の $g \cdot h \cdot g^{-1}$ と 定義 15.25 (2) の $\check{V}'\,W\,(\check{V}')^{-1}$ は、主張 7.4 の証明と同じく左から順に $(gh)g^{-1}$・$(\check{V}'W)(\check{V}')^{-1}$ と読む。

準備 1（二つの写像を 定理 1.8 の共役として読む）。任意の $X \in R$ について

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(X) &= T_{V^{(+)}}(X) && \left(\because \text{主張 14.22}\right)\\
&= \left(V^{(+)}X\right)\left(V^{(+)}\right)^{-1} && \left(\because \text{定義 7.3 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ g \to V^{(+)})\right)\\
&= T'_{V^{(+)}}(X) && \left(\because\ T'_g \text{ の定め方 } (g \to V^{(+)})\right)\\
T_{(\check{V}')}(X) &= \left(\check{V}'X\right)\left(\check{V}'\right)^{-1} && \left(\because \text{定義 15.25 (2) } (W \to X)\right)\\
&= T'_{\check{V}'}(X) && \left(\because\ T'_g \text{ の定め方 } (g \to \check{V}')\right)
\end{aligned}
$$

準備 2（復元公式の記号）。主張 15.7 の $N := (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \in \mathbb{N}_{\geq 2}$、像の記号 $j_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{R}}, \mu_{\mathbb{Z}}$、$\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}} \in \mathbb{R}$ と $(M_{\mathrm{col}})^{-1}_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ を用いる。$j, \mu \in \{1, \ldots, N\}$ について $c := (M_{\mathrm{col}})^{-1}_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$、$a_{j\mu} := \exp\left(i\,(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}})_{\mathbb{C}}\right) \in \mathbb{C}$ と置く（$\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}}$ は π を含む実数で、exp は 定義 3.11 の級数の極限なので、ここで $\mathbb{R}$ を使う。値はすでに 主張 15.7 が定めたものをそのまま使う）。$\mu \in \{1, \ldots, N\}$ のとき $\mu_{\mathbb{Z}} \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\} = \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）である。$W \in \{\check{Z}, \check{Y}\}$、$U \in \{Z, Y\}$ を対応させて（$W = \check{Z}$ のとき $U = Z$、$W = \check{Y}$ のとき $U = Y$）、主張 15.7 の二つの式を一つに

$$c\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} W_{\mu_{\mathbb{Z}}} = U_{j_{\mathbb{Z}}}$$

と書く（以下「復元公式」）。

Step 1（$Z_{j_{\mathbb{Z}}}, Y_{j_{\mathbb{Z}}}$ 上で一致）。$j \in \{1, \dots, N\}$ と、準備 2 の対応する組 (W, U) について

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(U_{j_{\mathbb{Z}}}) &= T_{(V^{(+)})}\left(c\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} W_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{復元公式を右辺から左辺へ})\\
&= T'_{V^{(+)}}\left(c\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} W_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{準備 1 の第 1 の鎖})\\
&= cT'_{V^{(+)}}\left(\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} W_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{定理 1.8 のスカラー倍の式 } (\alpha \to c))\\
&= c\sum_{\mu=1}^{N} T'_{V^{(+)}}(a_{j\mu} W_{\mu_{\mathbb{Z}}}) && (\because \text{主張 1.9 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to V^{(+)},\ r \to N,\ (X_1, \dots, X_r) \to (a_{j1}W_{1_{\mathbb{Z}}}, \dots, a_{jN}W_{N_{\mathbb{Z}}})))\\
&= c\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} T'_{V^{(+)}}(W_{\mu_{\mathbb{Z}}}) && (\because \text{定理 1.8 のスカラー倍の式を} N \text{ 個の項へ同時適用})\\
&= c\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} T_{(V^{(+)})}(W_{\mu_{\mathbb{Z}}}) && (\because \text{準備 1 の第 1 の鎖を右辺から左辺へ、} N \text{ 個の項へ同時適用})\\
&= c\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} T_{(\check{V}')}(W_{\mu_{\mathbb{Z}}}) && (\because \text{主張 15.27 } (\mu \to \mu_{\mathbb{Z}} \in \check{\mathcal{M}}) \text{ を} N \text{ 個の項へ同時適用})\\
&= c\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} T'_{\check{V}'}(W_{\mu_{\mathbb{Z}}}) && (\because \text{準備 1 の第 2 の鎖を} N \text{ 個の項へ同時適用})\\
&= c\sum_{\mu=1}^{N} T'_{\check{V}'}(a_{j\mu} W_{\mu_{\mathbb{Z}}}) && (\because \text{定理 1.8 のスカラー倍の式を右辺から左辺へ、} N \text{ 個の項へ同時適用})\\
&= cT'_{\check{V}'}\left(\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} W_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{主張 1.9 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to \check{V}',\ r \to N,\ (X_1, \dots, X_r) \to (a_{j1}W_{1_{\mathbb{Z}}}, \dots, a_{jN}W_{N_{\mathbb{Z}}})) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= T'_{\check{V}'}\left(c\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} W_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{定理 1.8 のスカラー倍の式 } (\alpha \to c) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= T_{(\check{V}')}\left(c\sum_{\mu=1}^{N} a_{j\mu} W_{\mu_{\mathbb{Z}}}\right) && (\because \text{準備 1 の第 2 の鎖を右辺から左辺へ})\\
&= T_{(\check{V}')}(U_{j_{\mathbb{Z}}}) && (\because \text{復元公式})
\end{aligned}
$$

$(W, U) = (\check{Z}, Z)$ が $Z_{j_{\mathbb{Z}}}$ での一致、$(W, U) = (\check{Y}, Y)$ が $Y_{j_{\mathbb{Z}}}$ での一致である。j が $\{1, \dots, N\}$ を動くとき $j_{\mathbb{Z}}$ は $\{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ を動く。

Step 2（一致する元の集合は閉じている）。

$$\mathcal{E} := \left\{ x \in R \ :\ T_{(V^{(+)})}(x) = T_{(\check{V}')}(x) \right\}$$

とおく。$x, y \in \mathcal{E}$、$\alpha \in \mathbb{C}$ について

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(x+y) &= T'_{V^{(+)}}(x+y) && (\because \text{準備 1 の第 1 の鎖})\\
&= T'_{V^{(+)}}(x) + T'_{V^{(+)}}(y) && (\because \text{定理 1.8 の和の式})\\
&= T_{(V^{(+)})}(x) + T_{(V^{(+)})}(y) && (\because \text{準備 1 の第 1 の鎖を右辺から左辺へ、2 か所へ同時適用})\\
&= T_{(\check{V}')}(x) + T_{(\check{V}')}(y) && (\because x, y \in \mathcal{E})\\
&= T'_{\check{V}'}(x) + T'_{\check{V}'}(y) && (\because \text{準備 1 の第 2 の鎖を 2 か所へ同時適用})\\
&= T'_{\check{V}'}(x+y) && (\because \text{定理 1.8 の和の式を右辺から左辺へ})\\
&= T_{(\check{V}')}(x+y) && (\because \text{準備 1 の第 2 の鎖を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\alpha x) &= T'_{V^{(+)}}(\alpha x) && (\because \text{準備 1 の第 1 の鎖})\\
&= \alpha\, T'_{V^{(+)}}(x) && (\because \text{定理 1.8 のスカラー倍の式})\\
&= \alpha\, T_{(V^{(+)})}(x) && (\because \text{準備 1 の第 1 の鎖を右辺から左辺へ})\\
&= \alpha\, T_{(\check{V}')}(x) && (\because\ x \in \mathcal{E})\\
&= \alpha\, T'_{\check{V}'}(x) && (\because \text{準備 1 の第 2 の鎖})\\
&= T'_{\check{V}'}(\alpha x) && (\because \text{定理 1.8 のスカラー倍の式を右辺から左辺へ})\\
&= T_{(\check{V}')}(\alpha x) && (\because \text{準備 1 の第 2 の鎖を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(xy) &= T'_{V^{(+)}}(xy) && (\because \text{準備 1 の第 1 の鎖})\\
&= T'_{V^{(+)}}(x)\, T'_{V^{(+)}}(y) && (\because \text{主張 1.90 の乗法性 } (B \to V^{(+)}))\\
&= T_{(V^{(+)})}(x)\, T_{(V^{(+)})}(y) && (\because \text{準備 1 の第 1 の鎖を右辺から左辺へ、2 か所へ同時適用})\\
&= T_{(\check{V}')}(x)\, T_{(\check{V}')}(y) && (\because\ x, y \in \mathcal{E})\\
&= T'_{\check{V}'}(x)\, T'_{\check{V}'}(y) && (\because \text{準備 1 の第 2 の鎖を 2 か所へ同時適用})\\
&= T'_{\check{V}'}(xy) && (\because \text{主張 1.90 の乗法性 } (B \to \check{V}') \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= T_{(\check{V}')}(xy) && (\because \text{準備 1 の第 2 の鎖を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(I) &= T'_{V^{(+)}}(I) && (\because \text{準備 1 の第 1 の鎖})\\
&= I && (\because \text{主張 1.90 の単位性 } (B \to V^{(+)}))\\
&= T'_{\check{V}'}(I) && (\because \text{主張 1.90 の単位性 } (B \to \check{V}') \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= T_{(\check{V}')}(I) && (\because \text{準備 1 の第 2 の鎖を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

よって $x+y,\ \alpha x,\ xy,\ I \in \mathcal{E}$ である。Step 1 より $Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathcal{E}$ でもあるから、$\mathcal{E}$ は 主張 15.3 の意味で閉じている（(i) は Step 1、(ii) は $I \in \mathcal{E}$、(iii) は $x+y, \alpha x \in \mathcal{E}$、(iv) は $xy \in \mathcal{E}$）。

Step 3（結論）。主張 15.3 の $\mathcal{A}$ は閉じている部分集合のうち最小のものなので、Step 2 より $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$ である。主張 15.3 より $\mathcal{A} = R$ であり、$\mathcal{E}$ の定め方より $\mathcal{E} \subseteq R$ であるから

$$R = \mathcal{A} \subseteq \mathcal{E} \subseteq R$$

すなわち $\mathcal{E} = R$。これが主張である。この証明は新たに $\mathbb{R}$ を持ち込まない。$\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}} \in \mathbb{R}$ と exp の値は 主張 15.7 から、$\check{V}' = \exp(\check{X})$ は 定義 3.4 の極限と実対数による arccosh を通して定義 15.25 から、$\mathbb{R}$ への脱出を引き継ぐ。この証明の中の計算は $\mathbb{C}$ と R の演算だけで閉じる。 □

主張 15.29 ($V^{(+)} = c\check{V}'$(定数倍を除いて一致)). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。ある $c \in \mathbb{C}^{\times}$ が存在して

$$V^{(+)} = c\check{V}'$$

が成り立つ（$V^{(+)}$ は 定義 13.29、$\check{V}'$ は 定義 15.25）。**c の値の決定はここでは行わない。**

証明. Step 1（$W := \left(\check{V}'\right)^{-1} V^{(+)}$ は可逆）。主張 14.21 より $V^{(+)}$ は可逆、定義 15.25 (2) より $\check{V}'$ は可逆であり、可逆行列の逆行列も可逆である（定義 7.2）。可逆行列の積は可逆なので W は可逆であり、

$$\begin{aligned}
\check{V}'\,W &= \check{V}'\left(\left(\check{V}'\right)^{-1}V^{(+)}\right) \quad (\because W := \left(\check{V}'\right)^{-1}V^{(+)})\\
&= \left(\check{V}'\left(\check{V}'\right)^{-1}\right)V^{(+)} \quad (\because \text{行列の積の結合律})\\
&= I\,V^{(+)} \quad (\because \text{可逆元の定義})\\
&= V^{(+)} \quad (\because \text{行列積の単位元})
\end{aligned}$$

Step 2（W はすべての元と可換）。主張 15.28、主張 14.22、定義 15.25 (2)、定義 7.3 より、任意の $x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}
V^{(+)}\,x\left(V^{(+)}\right)^{-1} &= T_{(V^{(+)})}(x) \quad (\because \text{転送行列が定める共役作用})\\
&= T_{(\check{V}')}(x) \quad (\because \text{二つの共役作用の一致})\\
&= \check{V}'\,x\left(\check{V}'\right)^{-1} \quad (\because \text{転送行列が定める共役作用})
\end{aligned}$$

である。主張 1.90 の $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ より Step 1 の $V^{(+)} = \check{V}'W$ から $\left(V^{(+)}\right)^{-1} = W^{-1}\left(\check{V}'\right)^{-1}$ である。したがって、左辺は

$$\begin{aligned}
V^{(+)}x\left(V^{(+)}\right)^{-1} &= \left(\check{V}'W\right)x\left(W^{-1}\left(\check{V}'\right)^{-1}\right) \quad (\because \text{Step 1 と積の逆元の公式})\\
&= \check{V}'\left(WxW^{-1}\right)\left(\check{V}'\right)^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合律})
\end{aligned}$$

と書ける。したがって $\check{V}'\left(WxW^{-1}\right)\left(\check{V}'\right)^{-1} = \check{V}'x\left(\check{V}'\right)^{-1}$ である。可逆な $\check{V}'$ と W を順に消去すると、

$$\begin{aligned}
\check{V}'\left(WxW^{-1}\right)\left(\check{V}'\right)^{-1} &= \check{V}'x\left(\check{V}'\right)^{-1} \quad (\because \text{上の二つの共役作用の一致})\\
WxW^{-1} &= x \quad (\because \check{V}' \text{ の可逆性})\\
Wx &= xW \quad (\because W \text{ の可逆性})
\end{aligned}$$

Step 3（スカラーであること）。Step 2 と 主張 2.90 より、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して $W = c\,I$。

Step 4（$c \neq 0$）。仮に $c = 0$ なら $W = O$（零行列）だが、任意の A について $OA = O \neq I$ なので O は可逆でなく、Step 1 に矛盾する。よって $c \in \mathbb{C}^{\times}$。

Step 5（結論）。Step 1 と Step 3、およびスカラー行列との積の可換性（主張 2.89）より

$$\begin{aligned}
V^{(+)} &= \check{V}'W \quad (\because \text{Step 1})\\
&= \check{V}'\left(c\,I\right) \quad (\because \text{Step 3})\\
&= c\left(\check{V}'I\right) \quad (\because \text{スカラー行列との積の可換性})\\
&= c\,\check{V}' \quad (\because \text{行列積の単位元} \check{V}'I = \check{V}')
\end{aligned}$$

□

定義 15.30 ($\check{n}_\mu := \check{\psi}^\dagger_\mu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ の定義)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）とする。定義 14.15 (2) より $M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、定義 15.21 により $\check{\psi}^\dagger_\mu$ と $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ は ** ともに定義されている **。そこで

$$\check{n}_\mu := \check{\psi}^\dagger_\mu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \ \in\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) \qquad (\mu \in \check{\mathcal{M}})$$

と定める。以下、$2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の単位行列 $I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ を単に I と書く。次が成り立つ。

- (1) 共役添字の対応 $\mu \mapsto M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ から $\check{\mathcal{M}}$ への写像であり（定義 14.15 (2)）、$\check{\mathcal{M}}$ 上の対合である：$M_{\mathrm{col}} + 1 - (M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu) = \mu_\circ$ $\check{n}_\mu$ は $\mu \in \check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ の M_{col} 個であり、その定義に現れる添字 $\mu \cdot M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ はどちらも $\check{\mathcal{M}}$ に入る（$\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は要らない）。

- (2) 定義 15.25 の $\check{X}$ と $\check{V}'$ はこの記号で

$$\check{X} = \sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)_{\mathbb{C}} \left(\check{n}_\mu - \left(\tfrac{1}{2}\right)_{\mathbb{C}} I\right), \qquad \check{V}' = \exp\big(\check{X}\big)$$

と書ける（$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の像。定義 15.25 と同じく、以降の本文はこの式を $\check{X} = \sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I\right)$ とも書く）。$^{**}\mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ を例外なく走る **（主張 15.12）。

証明. (1) 写像 $\sigma : \check{\mathcal{M}} \to \check{\mathcal{M}},\ \mu \mapsto M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ を置く。定義 14.15 (2) より $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ の像 $M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \in \mathbb{Z}$ は $\check{\mathcal{M}}$ に入るので、σ は写像として定まる。$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ を任意に取る。

$$\begin{aligned}
\sigma(\sigma(\mu)) &= M_{\mathrm{col}} + 1 - \sigma(\mu) && (\because\ \sigma \text{ の定義 } (\mu \to \sigma(\mu)))\\
&= M_{\mathrm{col}} + 1 - (M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu) && (\because\ \sigma \text{ の定義})\\
&= (M_{\mathrm{col}} + 1) - (M_{\mathrm{col}} + 1) + \mu && (\because\ \mathbb{Z} \text{ の減法 } a-(b-c) = a-b+c)\\
&= 0 + \mu && (\because\ \mathbb{Z} \text{ の加法の逆元 } a - a = 0)\\
&= \mu && (\because\ \mathbb{Z} \text{ の加法の単位元 } 0 + a = a)
\end{aligned}$$

したがって $\sigma \circ \sigma$ は $\check{\mathcal{M}}$ 上の恒等写像である。これから σ が全単射であることを示す。単射: $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ が $\sigma(\mu) = \sigma(\nu)$ を満たすとき、

$$\begin{aligned}
\mu &= \sigma(\sigma(\mu)) && (\because\ \text{上の鎖})\\
&= \sigma(\sigma(\nu)) && (\because\ \sigma(\mu) = \sigma(\nu))\\
&= \nu && (\because\ \text{上の鎖 } (\mu \to \nu))
\end{aligned}$$

全射: $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ に対し $\sigma(\nu) \in \check{\mathcal{M}}$ であり、上の鎖（$\mu \to \nu$）より $\sigma(\sigma(\nu)) = \nu$ なので、ν は $\sigma(\nu)$ の像である。よって σ は $\check{\mathcal{M}}$ 上の対合（2 回施すと恒等写像になる全単射）である。

主張 (1) の残りの二つ（$\check{n}_\mu$ の個数と、その添字が $\check{\mathcal{M}}$ に入ること）は、対合であることではなく 定義 14.15 から従う。$\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ は M_{col} 個の元を持つ（定義 14.15 の定義）ので、$\check{n}_\mu$（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$）は M_{col} 個である。$\check{n}_\mu = \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{\sigma(\mu)}$ に現れる添字は $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と、冒頭で 定義 14.15 (2) により $\check{\mathcal{M}}$ に入ると確かめた $\sigma(\mu)$ である。

(2) $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ のすべてについて $\check{n}_\mu$ は定義されている（主張の前置き）。

$$\begin{aligned}
\check{X} &= \sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)_{\mathbb{C}} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \left(\tfrac{1}{2}\right)_{\mathbb{C}} I\right) && (\because\ \text{定義 15.25 の } \check{X} \text{ の定義})\\
&= \sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)_{\mathbb{C}} \left(\check{n}_\mu - \left(\tfrac{1}{2}\right)_{\mathbb{C}} I\right) && (\because\ \text{各項へ } \check{n}_\mu := \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

$$\check{V}' = \exp\big(\check{X}\big) \qquad (\because\ \text{定義 15.25 の } \check{V}' \text{ の定義})$$

□

主張 15.31 ($V^{(+)} = c\exp\Big(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I\right)\Big)$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 13.29 の $V^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、定義 15.11 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、定義 15.1 が逆双曲線余弦を実対数で定めるため）、定義 15.30 の $\check{n}_\mu \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$、定義 14.15）と $I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}$ について、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して

$$V^{(+)} = c\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2}I\right)\right)$$

が成り立つ。c の値の決定はここでは行わない。

証明. 主張 15.29 により、$V^{(+)} = c\check{V}'$ を満たす $c \in \mathbb{C}^\times$ を取る（$\check{V}'$ は 定義 15.25）。この c について

$$\begin{aligned}
V^{(+)} &= c\check{V}' && (\because \text{ 主張 15.29}) \\
&= c\exp\bigl(\check{X}\bigr) && (\because \text{ 定義 15.25 の } \check{V}' := \exp(\check{X})) \\
&= c\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \tfrac{1}{2}I\right)\right) && (\because \text{ 定義 15.25 の } \check{X} \text{ の定義}) \\
&= c\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2}I\right)\right) && (\because \text{ 定義 15.30 の } \check{n}_\mu := \check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})
\end{aligned}$$

□

主張 15.32 ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化、$\lambda_{\pm,\mu} = \exp(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$ と$V^{(+)}$ の指数表示)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 14.6 の $A(\theta) \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$（$\theta \in \mathbb{R}$）、主張 15.14 の $\lambda_{\pm,\mu} \in \mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、主張 15.14 が $\lambda_{\pm,\mu}$ を実数の $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$ と絶対値 $\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$ の和・差で与えるため)、主張 15.15 の $\check{P}_\mu \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$、定義 15.11 の $\gamma(\theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、定義 15.1 が逆双曲線余弦を実対数で定めるため)、定義 12.25 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、定義 12.25 が K_2^* を実対数で定めるため)、定義 14.9・定義 14.10 の $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$、定義 15.21 の $\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu$、定義 15.30 の $\check{n}_\mu$、定義 13.29 の $V^{(+)}$（$\check{Z}_\mu$ 以下はいずれも $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の元）と $I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ について、次の五つが成り立つ。(1)(2)(4) は任意の $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について、(3) は任意の $\theta \in \mathbb{R}$ について述べる。(4) は二つの定義の再掲である。

- (1) $A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu \begin{pmatrix} \lambda_{+,\mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,\mu} \end{pmatrix} \check{P}_\mu^{-1}$（$\check{P}_\mu$ は可逆）
- (2) $\lambda_{\pm,\mu} = \exp\left(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)$
- (3) $\gamma(\theta) = \mathrm{arccosh}\left(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta\right)$
- (4) $\left(\check{\psi}_\mu^\dagger,\ \ \check{\psi}_\mu\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right)\check{P}_\mu, \qquad \check{n}_\mu = \check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$
- (5) ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して $V^{(+)} = c\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I\right)\right)$

c の値の決定はここでは行わない。

証明. (1) 主張 15.15 により $\det \check{P}_\mu \neq 0_{\mathbb{C}}$ であり、

$$\begin{aligned}
A(\tilde{\theta}_\mu) &= \check{P}_\mu\,\check{D}_\mu\,\check{P}_\mu^{-1} && (\because \text{ 主張 15.15}) \\
&= \check{P}_\mu \begin{pmatrix} \lambda_{+,\mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,\mu} \end{pmatrix} \check{P}_\mu^{-1} && (\because \text{ 主張 15.15 の } \check{D}_\mu \text{ の定義})
\end{aligned}$$

(2) 主張 15.19 の $\lambda_{+,\mu} = \exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$ と $\lambda_{-,\mu} = \exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$ そのものである。

(3) $\theta \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}
\gamma(\theta) &= \mathrm{arccosh}\left(\gamma_1(\theta)\right) && (\because \text{ 定義 15.11}) \\
&= \mathrm{arccosh}\left(c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta\right) && (\because \text{ 定義 15.9 の } \gamma_1(\theta) \text{ の定義}) \\
&= \mathrm{arccosh}\left(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta\right) && (\because \text{ 定義 12.26 の } c_i, s_i, c_i^*, s_i^* \text{ の定義})
\end{aligned}$$

(4) 一つ目の式は 定義 15.21 の $\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu$ の定義、二つ目の式は 定義 15.30 の $\check{n}_\mu$ の定義そのものである。

(5) 主張 15.31 そのものである。 □

16 $V^{(+)}$ の固有値

注意 16.1 (c の値と$V^{(+)}$ の固有値を求める道筋)**.** 主張 15.29 により、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して $V^{(+)} = c\check{V}'$ が成り立つ。しかし c の値そのものは決まっていない。以下では c を決定し、あわせて $V^{(+)}$ の固有値をすべて求める。結論は

$$c = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}, \qquad V^{(+)} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\,\check{V}'$$

であり、$V^{(+)}$ の固有値は $\epsilon = (\epsilon_\mu)_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}$（各 $\epsilon_\mu \in \{0,1\}$）でパラメトライズされた

$$\check{\Lambda}_\epsilon = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right)$$

であり、その最大値は 定義 16.5 の $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)}$ で $\delta = \frac{1}{2}$ と取ったもの $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ に一致し、しかも ** 単純固有値 ** である。

次のブロックを用いる：トレース（定義 8.1、主張 8.2、主張 8.5)、エルミート性と正定値性（定義 8.7、主張 8.11、主張 8.20)、および符号反転共役（主張 16.2、主張 16.3。いずれも $S_1^{(+)} = i(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}$ について述べてある)。

$\tilde{\theta}_\mu$（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$）について次の 3 点が成り立つのは、主張 15.12（$\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ が例外なく成り立つこと）と 主張 15.18（$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$）による。

- (a) $\check{n}_\mu$ の添字の集合が $\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$（定義 14.15）の全部になる。
- (b) 同時固有空間が ** すべて 1 次元 ** になる。
- (c) $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ が狭義なので、** 最大固有値が単純になる。**

** 対になる添字は μ と $M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ である **（主張 15.5、主張 15.23)。定義 14.15 (2) により $M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ の中にとどまるので、** 以下の主張はすべて $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ について述べられ、$\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は現れない。**

以下で用いる道具は、複素数を成分とする行列の積・和・スカラー倍、行列の指数関数(定義 3.4)、および実数の $\cosh, \sinh, \operatorname{arccosh}$ だけである。行列式は使わない。

主張 16.2 ($i(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}$ と$i(K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2$ は実対称)**.** 定義 13.15 の記号のもとで、$i := (0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}) \in \mathbb{C}$（定義 1.12 の台集合の元、虚数単位）とする。$K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$（定義 13.15 の記号）は、$\mathbb{C}$ の積と行列のスカラー倍の係数としては $(K_1)_{\mathbb{C}}, (K_2^*)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$（定義 1.13 の略記）として使い、式でもそう書く。

$$S_1^{(+)} := i(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}, \qquad S_2 := i(K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2$$

とおくと、

$$S_1^{(+)} = (K_1)_{\mathbb{C}} \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) - (K_1)_{\mathbb{C}}\, G, \qquad G := \sigma_1^y\, \sigma_2^x \sigma_3^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x\, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y$$
$$S_2 = (K_2^*)_{\mathbb{C}} \left(\sigma_1^x + \sigma_2^x + \cdots + \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x\right)$$

であり、G について（$M_{\mathrm{col}} = 2$ のとき $G = \sigma_1^y \sigma_2^y$ と読む)、$S_1^{(+)}$ と S_2 はいずれも成分がすべて実数で、転置について対称である。とくに 定義 8.7 の意味でエルミートである。

証明. Step 0（用いる 2×2 の積)。準備として、主張の i について $\mathbb{C}$ の中で次の 2 つを計算しておく。

$$
\begin{aligned}
(-i)\cdot i &= \big((-1)\cdot i\big)\cdot i \quad (\because \text{定義 1.14})\\
&= (-1)\cdot(i\cdot i) \quad (\because \text{積の結合律。主張 1.56})\\
&= (-1)\cdot(-1) \quad (\because \mathbb{C} \text{ で } i\cdot i=-1\text{。定義 1.12 の積})\\
&= 1 \quad (\because \mathbb{C} \text{ で } (-1)\cdot(-1)=1\text{。定義 1.12 の積})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(-i)\cdot(-i) &= (-i)\cdot\big((-1)\cdot i\big) \quad (\because \text{定義 1.14})\\
&= \big((-i)\cdot(-1)\big)\cdot i \quad (\because \text{積の結合律。主張 1.56})\\
&= \big((-1)\cdot(-i)\big)\cdot i \quad (\because \text{積の可換律。主張 1.56})\\
&= (-1)\cdot\big((-i)\cdot i\big) \quad (\because \text{積の結合律。主張 1.56})\\
&= (-1)\cdot 1 \quad (\because \text{直前の鎖})\\
&= -1 \quad (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

主張 6.1 の $\sigma^x,\sigma^y,\sigma^z$ の積を 定義 1.6 で成分ごとに計算する。

$$
\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^y &= \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 6.1})\\
&= \begin{pmatrix}1\cdot 0+0\cdot i & 1\cdot(-i)+0\cdot 0\\ 0\cdot 0+(-1)\cdot i & 0\cdot(-i)+(-1)\cdot 0\end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 1.6})\\
&= \begin{pmatrix}1\cdot 0+0 & 1\cdot(-i)+0\\ 0+(-1)\cdot i & 0+(-1)\cdot 0\end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 1.58})\\
&= \begin{pmatrix}1\cdot 0 & 1\cdot(-i)\\ (-1)\cdot i & (-1)\cdot 0\end{pmatrix} \quad (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は加法の単位元。主張 1.56})\\
&= \begin{pmatrix}0 & 1\cdot(-i)\\ (-1)\cdot i & 0\end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 1.59})\\
&= \begin{pmatrix}(-i)\cdot 0 & 1\cdot(-i)\\ (-1)\cdot i & (-i)\cdot 0\end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 1.59})\\
&= \begin{pmatrix}(-i)\cdot 0 & (-i)\cdot 1\\ (-1)\cdot i & (-i)\cdot 0\end{pmatrix} \quad (\because \text{積の可換律。主張 1.56})\\
&= \begin{pmatrix}(-i)\cdot 0 & (-i)\cdot 1\\ -i & (-i)\cdot 0\end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 1.14})\\
&= \begin{pmatrix}(-i)\cdot 0 & (-i)\cdot 1\\ (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0\end{pmatrix} \quad (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 1.56})\\
&= (-i)\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 2.3})\\
&= (-i)\sigma^x \quad (\because \text{主張 6.1})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sigma^y\sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 6.1}) \\
&= \begin{pmatrix} 0\cdot 0 + (-i)\cdot 1 & 0\cdot 1 + (-i)\cdot 0 \\ i\cdot 0 + 0\cdot 1 & i\cdot 1 + 0\cdot 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 + (-i)\cdot 1 & 0 + (-i)\cdot 0 \\ i\cdot 0 + 0 & i\cdot 1 + 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 1.58}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \\ i\cdot 0 & i\cdot 1 \end{pmatrix} \quad (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は加法の単位元。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \\ 0 & i\cdot 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \\ (-i)\cdot 0 & i\cdot 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \\ (-i)\cdot 0 & i\cdot\big((-1)\cdot(-1)\big) \end{pmatrix} \quad (\because \mathbb{C} \text{ で } (-1)\cdot(-1) = 1\text{。定義 1.12 の積}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \\ (-i)\cdot 0 & \big(i\cdot(-1)\big)\cdot(-1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{積の結合律。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \\ (-i)\cdot 0 & \big((-1)\cdot i\big)\cdot(-1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{積の可換律。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 1 & (-i)\cdot 0 \\ (-i)\cdot 0 & (-i)\cdot(-1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 1.14}) \\
&= (-i)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 2.3}) \\
&= (-i)\sigma^z \quad (\because \text{主張 6.1})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sigma^x\sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 6.1}) \\
&= \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 0 & 0\cdot 0 + 1\cdot(-1) \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 0 & 1\cdot 0 + 0\cdot(-1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 + 1\cdot 0 & 0 + 1\cdot(-1) \\ 1\cdot 1 + 0 & 1\cdot 0 + 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 1.58}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot 0 & 1\cdot(-1) \\ 1\cdot 1 & 1\cdot 0 \end{pmatrix} \quad (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ は加法の単位元。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1\cdot(-1) \\ 1\cdot 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。主張 1.56}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & -1 \\ 1 & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 1.59}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & -1 \\ (-i)\cdot i & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{準備の } (-i)\cdot i = 1) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot 0 & (-i)\cdot(-i) \\ (-i)\cdot i & (-i)\cdot 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{準備の } (-i)\cdot(-i) = -1) \\
&= (-i)\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 2.3}) \\
&= (-i)\sigma^y \quad (\because \text{主張 6.1})
\end{aligned}
$$

また 主張 6.1 より $\sigma^x\sigma^x = I$ である（Step 1・Step 2 の鎖で引く）。

Step 1（S_2 の形）。$m \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ とし、$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。準備として、定義 13.1 の Z_m と 定義 13.2 の Y_m をクロネッカー積で表す（$m = 1$ のとき第 m 因子より前の因子は無く、$m = M_{\mathrm{col}}$ のとき第 m 因子より後の因子は無い）。

$$
\begin{aligned}
Z_m &= \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z && (\because \text{ 定義 13.1 } (m=1 \text{ では } \sigma_1^z)。\text{積は左から掛けたものと読む}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{ 主張 13.4 } (r \to m,\ a_1 = \cdots = a_{m-1} = x,\ a_m = z))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_m &= \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y && (\because \text{ 定義 13.2 } (m=1 \text{ では } \sigma_1^y)。\text{積は左から掛けたものと読む}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{ 主張 13.4 } (r \to m,\ a_1 = \cdots = a_{m-1} = x,\ a_m = y))
\end{aligned}
$$

このとき

$$
\begin{aligned}
Z_m Y_m &= \Big(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\Big) Y_m && (\because \text{準備の} Z_m \text{ の表示}) \\
&= \Big(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\Big)\Big(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\Big) && (\because \text{準備の} Y_m \text{ の表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x\sigma^x)}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z\sigma^y) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{主張 2.73 (1) } (M \to M_{\mathrm{col}},\ A_k \to \text{準備の} Z_m \text{ の第} k \text{ 因子},\ B_k \to \text{準備の} Y_m \text{ の第} k \text{ 因子})) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z\sigma^y) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{主張 6.1 の } \sigma^x\sigma^x = I \text{ を第 1 から第 } m-1 \text{ 因子へ同時に適用}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z\sigma^y) \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{主張 2.16 (主張の行数・列数} m,n \to 2,\ A \to I) \text{ を第 } m+1 \text{ 以降の因子へ同時に適用}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \big((-i)\sigma^x\big) \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{Step 0 の} \sigma^z\sigma^y = (-i)\sigma^x) \\
&= (-i)\Big(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^x \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\Big) && (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の場合 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ j \to m,\ c \to -i,\ A_m \to \sigma^x,\ A_k \to I\ (k \neq m))) \\
&= (-i)\sigma_m^x && (\because \text{定義 12.8 } (k \to m,\ a \to x))
\end{aligned}
$$

よって

$$
\begin{aligned}
H_2 &= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_m Y_m && (\because \text{ 定義 13.23}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \big((-i)\sigma_m^x\big) && (\because \text{上で得た} Z_m Y_m = (-i)\sigma_m^x) \\
&= (-i) \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x && \Big(\because \text{ 主張 2.34 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ c \to -i,\ (X_1, \dots, X_r) \to (\sigma_1^x, \dots, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x))\Big)
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
S_2 &= (i(K_2^*)_{\mathbb{C}})H_2 \quad (\because S_2 \text{ の定義（係数} i(K_2^*)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C} \text{ のスカラー倍）}) \\
&= (i(K_2^*)_{\mathbb{C}}) \left((-i) \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \right) \quad (\because \text{上で得た} H_2 \text{ の表示}) \\
&= \left((i(K_2^*)_{\mathbb{C}})(-i) \right) \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \quad \left(\because \text{ 主張 2.41 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to i(K_2^*)_{\mathbb{C}},\ b \to -i,\ A \to \textstyle\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_\ell^x) \right) \\
&= \left(i((K_2^*)_{\mathbb{C}}(-i)) \right) \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= \left(i((-i)(K_2^*)_{\mathbb{C}}) \right) \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の交換律主張 1.56}) \\
&= \left((i(-i))(K_2^*)_{\mathbb{C}} \right) \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= (1_{\mathbb{C}}(K_2^*)_{\mathbb{C}}) \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \quad (\because i \cdot (-i) = 1_{\mathbb{C}}) \\
&= (K_2^*)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の単位元主張 1.56})
\end{aligned}
$$

Step 2（$S_1^{(+)}$ の形）。$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}} - 1\}$ とし、Step 1 と同じく $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。準備として、定義 13.2 の Y_m と 定義 13.1 の Z_{m+1} と、$\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ をクロネッカー積で表す（$m = 1$ のとき第 m 因子より前の因子は無く、$m = M_{\mathrm{col}} - 1$ のとき第 $m+1$ 因子より後の因子は無い）。

$$
\begin{aligned}
Y_m &= \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y \quad (\because \text{ 定義 13.2 } (m = 1 \text{ では } \sigma_1^y)\text{。積は左から掛けたものと読む}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} \quad (\because \text{ 主張 13.4 } (r \to m,\ a_1 = \cdots = a_{m-1} = x,\ a_m = y))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Z_{m+1} &= \sigma_1^x \cdots \sigma_m^x \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{ 定義 13.1 } (m \to m+1)\text{。積は左から掛けたものと読む}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{ 主張 13.4 } (r \to m+1,\ a_1 = \cdots = a_m = x,\ a_{m+1} = z))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z &= \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \right) \sigma_{m+1}^z && (\because \text{ 定義 12.8 } (k \to m,\ a \to z)) \\
&= \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \right) \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes I \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \right) && (\because \text{ 定義 12.8 } (k \to m+1,\ a \to z)) \\
&= \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z I) \boxtimes (I \sigma^z) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} && (\because \text{ 主張 2.73 (1) } (M \to M_{\mathrm{col}},\ A_k \to \sigma_m^z \text{ の第} k \text{ 因子},\ B_k \to \sigma_{m+1}^z \text{ の第} k \text{ 因子})) \\
&= \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes (I \sigma^z) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} && (\because \text{ 主張 2.17 } (m, n \to 2,\ A \to \sigma^z) \text{ を第 } m \text{ 因子へ}) \\
&= \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} && (\because \text{ 主張 2.16 } (m, n \to 2,\ A \to \sigma^z) \text{ を第 } m+1 \text{ 因子へ}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} && (\because \text{ 主張 2.16 } (m, n \to 2,\ A \to I) \text{ を第 } m \text{ 因子と第 } m+1 \text{ 因子以外の因子へ同時に適用})
\end{aligned}
$$

このとき

$$
\begin{aligned}
Y_m Z_{m+1} &= \Big(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\Big) Z_{m+1} \quad (\because \text{準備の} Y_m \text{ の表示}) \\
&= \Big(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes I \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1}\Big)\Big(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^x \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1}\Big) \quad (\because \text{準備の} Z_{m+1} \text{ の表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x\sigma^x)}^{m-1} \boxtimes (\sigma^y\sigma^x) \boxtimes (I\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{主張 2.73 (1) } (M \to M_{\mathrm{col}},\ A_k \to \text{準備の} Y_m \text{ の第} k \text{ 因子},\ B_k \to \text{準備の} Z_{m+1} \text{ の第} k \text{ 因子})) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^y\sigma^x) \boxtimes (I\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{主張 6.1 の } \sigma^x\sigma^x = I \text{ を第 1 から第 } m-1 \text{ 因子へ同時に適用}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^y\sigma^x) \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{主張 2.16 } (m,n \to 2,\ A \to \sigma^z) \text{ を第 } m+1 \text{ 因子へ}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^y\sigma^x) \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{主張 2.16 } (m,n \to 2,\ A \to I) \text{ を第 } m+2 \text{ 以降の因子へ同時に適用}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \big((-i)\sigma^z\big) \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{Step 0 の} \sigma^y\sigma^x = (-i)\sigma^z) \\
&= (-i)\Big(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1}\Big) \quad (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の場合 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ j \to m,\ c \to -i,\ A_m \to \sigma^z,\ A_{m+1} \to \sigma^z,\ A_k \to I\ (k \neq m, m+1))) \\
&= (-i)\sigma^z_m\sigma^z_{m+1} \quad (\because \text{準備の} \sigma^z_m\sigma^z_{m+1} \text{ の表示})
\end{aligned}
$$

また境界項について、準備として、定義 13.2 の $Y_{M_{\mathrm{col}}}$ と 定義 13.1 の Z_1 と、主張の G をクロネッカー積で表す（$M_{\mathrm{col}} = 2$ のとき第 2 から第 $M_{\mathrm{col}} - 1$ までの因子は無い）。

$$
\begin{aligned}
Y_{M_{\mathrm{col}}} &= \sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma^y_{M_{\mathrm{col}}} \qquad (\because \text{定義 13.2 } (m \to M_{\mathrm{col}}) \text{。積は左から掛けたものと読む}) \\
&= \sigma^x \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} \quad (\because \text{主張 13.4 } (r \to M_{\mathrm{col}},\ a_1 = \cdots = a_{M_{\mathrm{col}}-1} = x,\ a_{M_{\mathrm{col}}} = y))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Z_1 &= \sigma^z_1 \qquad (\because \text{定義 13.1 } (m \to 1)) \\
&= \overbrace{\sigma^z}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes I \quad (\because \text{主張 13.4 } (r \to 1,\ a_1 = z))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
G &= \sigma^y_1 \sigma^x_2 \cdots \sigma^x_{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma^y_{M_{\mathrm{col}}} \qquad (\because \text{主張の} G \text{ の定義（} M_{\mathrm{col}} = 2 \text{ では } \sigma^y_1\sigma^y_2\text{）。積は左から掛けたものと読む}) \\
&= \overbrace{\sigma^y}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} \quad (\because \text{主張 13.4 } (r \to M_{\mathrm{col}},\ a_1 = y,\ a_2 = \cdots = a_{M_{\mathrm{col}}-1} = x,\ a_{M_{\mathrm{col}}} = y))
\end{aligned}
$$

このとき

$$
\begin{aligned}
Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 &= \Big(\sigma^x \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \sigma^y\Big) Z_1 \quad (\because \text{準備の} Y_{M_{\mathrm{col}}} \text{ の表示}) \\
&= \Big(\sigma^x \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \sigma^y\Big)\Big(\sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes I\Big) \quad (\because \text{準備の} Z_1 \text{ の表示}) \\
&= (\sigma^x\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes (\sigma^y I) \quad (\because \text{主張 2.73 (1) } (M \to M_{\mathrm{col}},\ A_k \to \text{準備の} Y_{M_{\mathrm{col}}} \text{ の第} k \text{ 因子},\ B_k \to \text{準備の} Z_1 \text{ の第} k \text{ 因子})) \\
&= (\sigma^x\sigma^z) \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes (\sigma^y I) \quad (\because \text{主張 2.17 } (m,n \to 2,\ A \to \sigma^x) \text{ を第 2 から第 } M_{\mathrm{col}} - 1 \text{ 因子へ同時に適用}) \\
&= (\sigma^x\sigma^z) \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \sigma^y \quad (\because \text{主張 2.17 } (m,n \to 2,\ A \to \sigma^y) \text{ を第 } M_{\mathrm{col}} \text{ 因子へ}) \\
&= \big((-i)\sigma^y\big) \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \sigma^y \quad (\because \text{Step 0 の} \sigma^x\sigma^z = (-i)\sigma^y) \\
&= (-i)\Big(\sigma^y \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \sigma^y\Big) \quad (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の場合 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ j \to 1,\ c \to -i,\ A_1 \to \sigma^y,\ A_k \to \sigma^x\ (2 \le k \le M_{\mathrm{col}} - 1),\ A_{M_{\mathrm{col}}} \to \sigma^y)) \\
&= (-i)G \quad (\because \text{準備の} G \text{ の表示})
\end{aligned}
$$

これらと 定義 13.22 の $H_1^{(+)}$ の定義を使うと

$$
\begin{aligned}
S_1^{(+)} &= (i(K_1)_{\mathbb{C}})H_1^{(+)} \quad (\because S_1^{(+)} \text{ の定義（係数} i(K_1)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C} \text{ のスカラー倍）}) \\
&= (i(K_1)_{\mathbb{C}})\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1\right) \quad (\because \text{ 定義 13.22}) \\
&= (i(K_1)_{\mathbb{C}})\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left((-i)\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1\right) \quad (\because \text{ 上で得た} Y_m Z_{m+1} = (-i)\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \text{ を各項へ}) \\
&= (i(K_1)_{\mathbb{C}})\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left((-i)\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) - (-i)G\right) \quad (\because \text{ 上で得た} Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 = (-i)G) \\
&= (i(K_1)_{\mathbb{C}})\left((-i)\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - (-i)G\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.34 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}}-1,\ c \to -i,\ (X_1, \ldots, X_r) \to (\sigma_1^z \sigma_2^z, \ldots, \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^z \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z))\right) \\
&= (i(K_1)_{\mathbb{C}})\left((-i)\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - G\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.32 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ c \to -i,\ A \to \textstyle\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_\ell^z \sigma_{\ell+1}^z,\ B \to G) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left((i(K_1)_{\mathbb{C}})(-i)\right)\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - G\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.41 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to i(K_1)_{\mathbb{C}},\ b \to -i,\ A \to \textstyle\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_\ell^z \sigma_{\ell+1}^z - G)\right) \\
&= \left(i((K_1)_{\mathbb{C}}(-i))\right)\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - G\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= \left(i((-i)(K_1)_{\mathbb{C}})\right)\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - G\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の交換律主張 1.56}) \\
&= \left((i(-i))(K_1)_{\mathbb{C}}\right)\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - G\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の結合律主張 1.56}) \\
&= (1_{\mathbb{C}}(K_1)_{\mathbb{C}})\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - G\right) \quad (\because i \cdot (-i) = 1_{\mathbb{C}}) \\
&= (K_1)_{\mathbb{C}}\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - G\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の単位元主張 1.56}) \\
&= (K_1)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - (K_1)_{\mathbb{C}} G \quad \left(\because \text{ 主張 2.32 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ c \to (K_1)_{\mathbb{C}},\ A \to \textstyle\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_\ell^z \sigma_{\ell+1}^z,\ B \to G)\right)
\end{aligned}
$$

Step 3（実対称性）。Step 1 と同じく $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。まず転置（定義 2.75）を計算する。$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について（$m = 1$ のとき第 m 因子より前の因子は無く、$m = M_{\mathrm{col}}$ のとき第 m 因子より後の因子は無い）

$$
\begin{aligned}
(\sigma_m^x)^\top &= \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{m\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I\right)^\top \quad (\because \text{定義 12.8 } (k \to m,\ a \to x)) \\
&= I^\top \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x)^\top}^{m\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I^\top \quad (\because \text{主張 2.76 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ A_m \to \sigma^x,\ A_k \to I\ (k \neq m))) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x)^\top}^{m\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{主張 6.4 を第 } m \text{ 因子以外の因子へ同時に適用}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{m\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{主張 6.5 を第 } m \text{ 因子へ}) \\
&= \sigma_m^x \quad (\because \text{定義 12.8 } (k \to m,\ a \to x))
\end{aligned}
$$

$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}} - 1\}$ について

$$
\begin{aligned}
\left(\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right)^\top &= \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1}\right)^\top \quad (\because \text{Step 2 の準備の} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \text{ の表示}) \\
&= \overbrace{I^\top \boxtimes \cdots \boxtimes I^\top}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z)^\top \boxtimes (\sigma^z)^\top \boxtimes \overbrace{I^\top \boxtimes \cdots \boxtimes I^\top}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{主張 2.76 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ A_m \to \sigma^z,\ A_{m+1} \to \sigma^z,\ A_k \to I\ (k \neq m, m+1))) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z)^\top \boxtimes (\sigma^z)^\top \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{主張 6.4 を第 } m \text{ 因子と第 } m+1 \text{ 因子以外の因子へ同時に適用}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{主張 6.6 を第 } m \text{ 因子と第 } m+1 \text{ 因子へ同時に適用}) \\
&= \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{Step 2 の準備の} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \text{ の表示})
\end{aligned}
$$

であり、G について（$M_{\mathrm{col}} = 2$ のとき第 2 から第 $M_{\mathrm{col}} - 1$ までの因子は無い）

$$
\begin{aligned}
G^\top &= \Big(\sigma^y \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \sigma^y\Big)^\top \quad (\because \text{Step 2 の準備の} G \text{ の表示}) \\
&= (\sigma^y)^\top \boxtimes \overbrace{(\sigma^x)^\top \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x)^\top}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes (\sigma^y)^\top \quad (\because \text{主張 2.76 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ A_1 \to \sigma^y,\ A_k \to \sigma^x\ (2 \le k \le M_{\mathrm{col}}-1),\ A_{M_{\mathrm{col}}} \to \sigma^y)) \\
&= (\sigma^y)^\top \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes (\sigma^y)^\top \quad (\because \text{主張 6.5 を第 2 から第 } M_{\mathrm{col}}-1 \text{ 因子へ同時に適用}) \\
&= (-\sigma^y) \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes (-\sigma^y) \quad (\because \text{主張 6.7 を第 1 因子と第 } M_{\mathrm{col}} \text{ 因子へ同時に適用}) \\
&= \big((-1_{\mathbb{C}})\sigma^y\big) \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \big((-1_{\mathbb{C}})\sigma^y\big) \quad (\because \text{主張 2.25 } (m,n \to 2,\ A \to \sigma^y) \text{ を第 1 因子と第 } M_{\mathrm{col}} \text{ 因子へ同時に適用}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\Big(\sigma^y \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \big((-1_{\mathbb{C}})\sigma^y\big)\Big) \quad (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の場合 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ j \to 1,\ c \to -1_{\mathbb{C}},\ A_1 \to \sigma^y,\ A_k \to \sigma^x\ (2 \le k \le M_{\mathrm{col}}-1),\ A_{M_{\mathrm{col}}} \to (-1_{\mathbb{C}})\sigma^y)) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\Big((-1_{\mathbb{C}})\Big(\sigma^y \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \sigma^y\Big)\Big) \quad (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の場合 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ j \to M_{\mathrm{col}},\ c \to -1_{\mathbb{C}},\ A_1 \to \sigma^y,\ A_k \to \sigma^x\ (2 \le k \le M_{\mathrm{col}}-1),\ A_{M_{\mathrm{col}}} \to \sigma^y)) \\
&= \big((-1_{\mathbb{C}}) \cdot (-1_{\mathbb{C}})\big)\Big(\sigma^y \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \sigma^y\Big) \quad (\because \text{主張 2.41 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to -1_{\mathbb{C}},\ b \to -1_{\mathbb{C}},\ A \to \sigma^y \boxtimes \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x \boxtimes \sigma^y)) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\Big(\sigma^y \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \sigma^y\Big) \quad (\because \mathbb{C} \text{ で } (-1)\cdot(-1) = 1_{\circ} \text{ 定義 1.12 の積}) \\
&= \sigma^y \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \sigma^y \quad (\because \text{主張 2.42 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \sigma^y \boxtimes \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x \boxtimes \sigma^y)) \\
&= G \quad (\because \text{Step 2 の準備の} G \text{ の表示})
\end{aligned}
$$

である。これらを用いて S_2 と $S_1^{(+)}$ の転置を計算する。

$$
\begin{aligned}
(S_2)^\top &= \Big((K_2^*)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\Big)^\top \quad (\because \text{Step 1 の} S_2 \text{ の表示}) \\
&= (K_2^*)_{\mathbb{C}}\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\Big)^\top \quad \Big(\because \text{主張 2.78 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ c \to (K_2^*)_{\mathbb{C}},\ A \to \textstyle\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_\ell^x)\Big) \\
&= (K_2^*)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} (\sigma_m^x)^\top \quad \big(\because \text{主張 2.80 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ (X_1,\dots,X_r) \to (\sigma_1^x,\dots,\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x))\big) \\
&= (K_2^*)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \quad (\because \text{上で得た } (\sigma_m^x)^\top = \sigma_m^x \text{ を各項へ}) \\
&= S_2 \quad (\because \text{Step 1 の} S_2 \text{ の表示})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Big(S_1^{(+)}\Big)^\top &= \Big((K_1)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z - (K_1)_{\mathbb{C}} G\Big)^\top \quad (\because \text{Step 2 の} S_1^{(+)} \text{ の表示}) \\
&= \Big((K_1)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z\Big)^\top - ((K_1)_{\mathbb{C}} G)^\top \quad \Big(\because \text{主張 2.79 } (m,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to (K_1)_{\mathbb{C}} \textstyle\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_\ell^z\sigma_{\ell+1}^z,\ B \to (K_1)_{\mathbb{C}} G)\Big) \\
&= (K_1)_{\mathbb{C}}\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z\Big)^\top - (K_1)_{\mathbb{C}} G^\top \quad \Big(\because \text{主張 2.78 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ c \to (K_1)_{\mathbb{C}},\ A \to \textstyle\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_\ell^z\sigma_{\ell+1}^z \text{ と} A \to G) \text{ を 2 箇所へ同時に適用}\Big) \\
&= (K_1)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \big(\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z\big)^\top - (K_1)_{\mathbb{C}} G^\top \quad \big(\because \text{主張 2.80 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}}-1,\ (X_1,\dots,X_r) \to (\sigma_1^z\sigma_2^z,\dots,\sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^z\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z))\big) \\
&= (K_1)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z - (K_1)_{\mathbb{C}} G^\top \quad (\because \text{上で得た } (\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z)^\top = \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z \text{ を各項へ}) \\
&= (K_1)_{\mathbb{C}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z - (K_1)_{\mathbb{C}} G \quad (\because \text{上で得た} G^\top = G) \\
&= S_1^{(+)} \quad (\because \text{Step 2 の} S_1^{(+)} \text{ の表示})
\end{aligned}
$$

である。次に成分が実数であること（定義 2.81）を見る。$m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、定義 12.8（$k \to m,\ a \to x$）より $\sigma_m^x = I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{m\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I$ である。因子 I の成分はすべて実数（主張 6.8）、因子 σ^x の成分もすべて実数（主張 6.9）なので、主張 2.82 $(M \to M_{\mathrm{col}},\ A_m \to \sigma^x,\ A_k \to I\ (k \ne m))$ より σ_m^x の成分はすべて実数である。

$m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}-1\}$ について、Step 2 の準備の $\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}$ の表示より $\sigma^z_m\sigma^z_{m+1} = \overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{m-1}\boxtimes\sigma^z\boxtimes\sigma^z\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1}$ である。因子 I の成分はすべて実数（主張 6.8）、因子 σ^z の成分もすべて実数（主張 6.10）なので、主張 2.82（$M\to M_{\mathrm{col}},\ A_m\to\sigma^z,\ A_{m+1}\to\sigma^z,\ A_k\to I\ (k\neq m,m+1)$）より $\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}$ の成分はすべて実数である。

G について（$M_{\mathrm{col}}=2$ のとき第 2 から第 $M_{\mathrm{col}}-1$ までの因子は無い）、定義 6.11 の R^y を用いて

$$
\begin{aligned}
G &= \sigma^y\boxtimes\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes\sigma^y \quad (\because \text{Step 2 の準備の} G \text{ の表示})\\
&= (iR^y)\boxtimes\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes(iR^y) \quad (\because \text{主張 6.12 を第 1 因子と第 } M_{\mathrm{col}} \text{ 因子へ同時に適用})\\
&= i\Big(R^y\boxtimes\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes(iR^y)\Big) \quad (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の場合 } (M\to M_{\mathrm{col}},\ j\to 1,\ c\to i,\ A_1\to R^y,\ A_k\to\sigma^x\ (2\le k\le M_{\mathrm{col}}-1),\ A_{M_{\mathrm{col}}}\to iR^y))\\
&= i\Big(i\Big(R^y\boxtimes\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes R^y\Big)\Big) \quad (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の場合 } (M\to M_{\mathrm{col}},\ j\to M_{\mathrm{col}},\ c\to i,\ A_1\to R^y,\ A_k\to\sigma^x\ (2\le k\le M_{\mathrm{col}}-1),\ A_{M_{\mathrm{col}}}\to R^y))\\
&= (i\cdot i)\Big(R^y\boxtimes\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes R^y\Big) \quad (\because \text{主張 2.41 } (m\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a\to i,\ b\to i,\ A\to R^y\boxtimes\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x\boxtimes R^y))\\
&= (-1_{\mathbb{C}})\Big(R^y\boxtimes\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes R^y\Big) \quad (\because \mathbb{C} \text{ で } i\cdot i=-1_{\mathbb{C}} \text{。定義 1.12 の積})\\
&= (-1)_{\mathbb{C}}\Big(R^y\boxtimes\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes R^y\Big) \quad (\because \text{定義 1.13 の略記 } -1_{\mathbb{C}}=\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1))
\end{aligned}
$$

である。因子 R^y の成分はすべて実数（主張 6.13）、因子 σ^x の成分もすべて実数（主張 6.9）なので、主張 2.82（$M\to M_{\mathrm{col}},\ A_1\to R^y,\ A_k\to\sigma^x\ (2\le k\le M_{\mathrm{col}}-1),\ A_{M_{\mathrm{col}}}\to R^y$）より $R^y\boxtimes\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x\boxtimes R^y$ の成分はすべて実数である。主張 2.83（$m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ c\to -1,\ B\to R^y\boxtimes\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x\boxtimes R^y$）と上の鎖より、$G$ の成分はすべて実数である。

最後に $S_2\cdot S_1^{(+)}$ の成分が実数であることを示す。上で見たとおり $m\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について σ^x_m の成分はすべて実数なので、主張 2.86（$m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r\to M_{\mathrm{col}},\ (X_1,\dots,X_r)\to(\sigma^x_1,\dots,\sigma^x_{M_{\mathrm{col}}})$）より $\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}\sigma^x_m$ の成分はすべて実数である。Step 1 の表示 $S_2=(K_2^*)_{\mathbb{C}}\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}\sigma^x_m$ と 主張 2.83（$m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ c\to K_2^*,\ B\to\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}}\sigma^x_\ell$）より、$S_2$ の成分はすべて実数である。

同じく $m\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}-1\}$ について $\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}$ の成分はすべて実数なので、主張 2.86（$m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r\to M_{\mathrm{col}}-1,\ (X_1,\dots,X_r)\to(\sigma^z_1\sigma^z_2,\dots,\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}-1}\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}})$。$M_{\mathrm{col}}\ge 2$ より $r\ge 1$）より $\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}$ の成分はすべて実数である。これと上で見た G の成分の実性に 主張 2.83（$m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ c\to K_1,\ B\to\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\sigma^z_\ell\sigma^z_{\ell+1}$ と $B\to G$）を 2 箇所へ同時に当てはめて、$(K_1)_{\mathbb{C}}\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}$ と $(K_1)_{\mathbb{C}}G$ の成分はすべて実数である。Step 2 の表示 $S_1^{(+)}=(K_1)_{\mathbb{C}}\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}-(K_1)_{\mathbb{C}}G$ と 主張 2.85（$m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to(K_1)_{\mathbb{C}}\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\sigma^z_\ell\sigma^z_{\ell+1},\ B\to(K_1)_{\mathbb{C}}G$）より、$S_1^{(+)}$ の成分はすべて実数である。

上で示した $(S_2)^\top=S_2\cdot\left(S_1^{(+)}\right)^\top=S_1^{(+)}$ と合わせて、$S_1^{(+)}$、S_2 は実対称である（定義 8.8）。主張 8.9（$n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to S_1^{(+)}$ と $A\to S_2$）より、$S_1^{(+)}$、S_2 はエルミートである。 □

主張 16.3 (符号反転共役U)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\ge 2}$ とし、主張 6.1 の二次の Pauli 行列 σ^x,σ^z を用いて、$1\le m\le M_{\mathrm{col}}$ について

$$
E_m:=\begin{cases}\sigma^x & (m\text{ 奇数})\\ I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} & (m\text{ 偶数})\end{cases}\in\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})
$$

とおき、定義 2.72 のクロネッカー積で

$$
E:=E_1\boxtimes\cdots\boxtimes E_{M_{\mathrm{col}}},\qquad F:=\underbrace{\sigma^z\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^z}_{M_{\mathrm{col}}\text{ 個}},\qquad U:=EF\qquad \big(E,F,U\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})\big)
$$

とおく。このとき U は可逆で、

$$U\,S_1^{(+)}\,U^{-1} = -\,S_1^{(+)}, \qquad U\,S_2\,U^{-1} = -\,S_2$$

が成り立つ。すなわち $UH_1^{(+)}U^{-1} = -H_1^{(+)}$、$UH_2U^{-1} = -H_2$。

証明. Step 0（可逆性）。次の鎖の中に限り $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。$1 \le m \le M_{\mathrm{col}}$ と $a \in \{x, z\}$ について、

$$\begin{aligned}
\sigma_m^a \sigma_m^a &= \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{m\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{m\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{定義 } 12.8) \\
&= (II) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^a \sigma^a)}^{m\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{主張 } 2.73\ (1)) \\
&= (II) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{m\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{主張 } 6.1 \text{ の} \sigma^a \sigma^a = I) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{m\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{主張 } 2.16 \text{ を} m \text{ 番目以外の因子へ同時適用}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \quad (\because \text{主張 } 2.73\ (2))
\end{aligned}$$

が成り立つ（Step 1 で使う）。

E, F, U の可逆性を示す。$1 \le m \le M_{\mathrm{col}}$ について、

$$\begin{aligned}
E_m E_m &= \sigma^x \sigma^x \quad (\because E_m \text{ の定義、} m \text{ 奇数}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \quad (\because \text{主張 } 6.1 \text{ の} \sigma^x \sigma^x = I) \qquad (m \text{ 奇数}), \\
E_m E_m &= I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\, I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \quad (\because E_m \text{ の定義、} m \text{ 偶数}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \quad (\because \text{主張 } 2.16) \qquad (m \text{ 偶数})
\end{aligned}$$

である。次の鎖の中に限り $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。

$$\begin{aligned}
FF &= (\sigma^z \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^z)\,(\sigma^z \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^z) \quad (\because F \text{ の定義}) \\
&= (\sigma^z \sigma^z) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^z \sigma^z) \quad (\because \text{主張 } 2.73\ (1)) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{主張 } 6.1 \text{ の} \sigma^z \sigma^z = I \text{ を全ての因子へ同時適用}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \quad (\because \text{主張 } 2.73\ (2)), \\
EE &= (E_1 \boxtimes \cdots \boxtimes E_{M_{\mathrm{col}}})\,(E_1 \boxtimes \cdots \boxtimes E_{M_{\mathrm{col}}}) \quad (\because E \text{ の定義}) \\
&= (E_1 E_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{M_{\mathrm{col}}} E_{M_{\mathrm{col}}}) \quad (\because \text{主張 } 2.73\ (1)) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{上の} E_m E_m = I \text{ を全ての因子へ同時適用}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \quad (\because \text{主張 } 2.73\ (2))
\end{aligned}$$

定義 7.2 を $M = M_{\mathrm{col}}$ で使う。上の 2 本の鎖より、$g = F$ には $h = F$ が、$g = E$ には $h = E$ が可逆の条件 $gh = hg = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ を満たす。よって E, F は可逆であり、逆元の一意性より $F^{-1} = F$、$E^{-1} = E$ である。同じ定義の (ii) を $g_1 = E$、$g_2 = F$ で使うと、$U = EF$ は可逆であり、

$$\begin{aligned}
U^{-1} &= (EF)^{-1} \quad (\because U \text{ の定義}) \\
&= F^{-1} E^{-1} \quad (\because \text{定義 } 7.2\ (\mathrm{ii})) \\
&= FE^{-1} \quad (\because \text{上の} F^{-1} = F) \\
&= FE \quad (\because \text{上の} E^{-1} = E)
\end{aligned}$$

Step 1（1 因子ごとの共役）。以下、WXW^{-1} は $(WX)W^{-1}$ と読む。まず E と F による共役をまとめて計算する。次の鎖の中に限り、$(W, W_1, \ldots, W_{M_{\mathrm{col}}})$ は $(F, \sigma^z, \ldots, \sigma^z)$ または

$(E, E_1, \ldots, E_{M_{\mathrm{col}}})$ のどちらかとし、$1 \leq k \leq M_{\mathrm{col}}$、$a \in \{x, y, z\}$、$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。Step 0 より $W^{-1} = W$ である。また $1 \leq m \leq M_{\mathrm{col}}$ について $W_m W_m = I$ である（$W = F$ なら 主張 6.1 の $\sigma^z \sigma^z = I$、$W = E$ なら Step 0 の $E_m E_m = I$）。

$$
\begin{aligned}
W \sigma_k^a W^{-1} &= (W \sigma_k^a) W \quad (\because \text{ Step 0 の} W^{-1} = W) \\
&= \left((W_1 \boxtimes \cdots \boxtimes W_{M_{\mathrm{col}}}) \, \sigma_k^a \right) (W_1 \boxtimes \cdots \boxtimes W_{M_{\mathrm{col}}}) \quad (\because W \text{ の定義}) \\
&= \left((W_1 \boxtimes \cdots \boxtimes W_{M_{\mathrm{col}}}) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \right) (W_1 \boxtimes \cdots \boxtimes W_{M_{\mathrm{col}}}) \quad (\because \text{ 定義 12.8}) \\
&= \left((W_1 I) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(W_k \sigma^a)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (W_{M_{\mathrm{col}}} I) \right) (W_1 \boxtimes \cdots \boxtimes W_{M_{\mathrm{col}}}) \quad (\because \text{ 主張 2.73 (1)}) \\
&= ((W_1 I) W_1) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((W_k \sigma^a) W_k)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes ((W_{M_{\mathrm{col}}} I) W_{M_{\mathrm{col}}}) \quad (\because \text{ 主張 2.73 (1)}) \\
&= (W_1 W_1) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((W_k \sigma^a) W_k)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (W_{M_{\mathrm{col}}} W_{M_{\mathrm{col}}}) \quad (\because \text{ 主張 2.17 を} k \text{ 番目以外の因子へ同時適用}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((W_k \sigma^a) W_k)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{ 上の} W_m W_m = I \text{ を} k \text{ 番目以外の因子へ同時適用})
\end{aligned}
$$

右辺を、サイト k のパウリ行列の積に戻す。次の鎖の中に限り $p \in \{x, z\}$ とする。

$$
\begin{aligned}
I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((\sigma^p \sigma^a) \sigma^p)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I &= (II) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((\sigma^p \sigma^a) \sigma^p)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{ 主張 2.16 を} k \text{ 番目以外の因子へ同時適用}) \\
&= ((II) I) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((\sigma^p \sigma^a) \sigma^p)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes ((II) I) \quad (\because \text{ 主張 2.17 を} k \text{ 番目以外の因子へ同時適用}) \\
&= \left((II) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^p \sigma^a)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \right) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^p}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{ 主張 2.73 (1)}) \\
&= \left(\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^p}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \right) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^p}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{ 主張 2.73 (1)}) \\
&= \left(\sigma_k^p \sigma_k^a \right) \sigma_k^p \quad (\because \text{ 定義 12.8})
\end{aligned}
$$

k が偶数なら $E_k = I$ なので、上の $W = E$ の鎖の右辺は

$$
\begin{aligned}
I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((E_k \sigma^a) E_k)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I &= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((I \sigma^a) I)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because E_k \text{ の定義、} k \text{ 偶数}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^a I)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{ 主張 2.16}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{ 主張 2.17}) \\
&= \sigma_k^a \quad (\because \text{ 定義 12.8})
\end{aligned}
$$

である。

次に、同じサイト k の二つのパウリ行列の積の順序を入れ替える。次の鎖の中に限り $(p, q) \in \{(z, x),\ (y, z),\ (y, x)\}$ とし、$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書く。

$$
\begin{aligned}
\sigma_k^p \sigma_k^q &= \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^p}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^q}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{ 定義 12.8}) \\
&= (II) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^p \sigma^q)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{ 主張 2.73 (1)}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^p \sigma^q)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{ 主張 2.16 を} k \text{ 番目以外の因子へ同時適用}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(-(\sigma^q \sigma^p))}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{ 主張 6.1 の} \sigma^p \sigma^q = -\sigma^q \sigma^p) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((-1_{\mathbb{C}})(\sigma^q \sigma^p))}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{ 主張 2.25}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}}) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^q \sigma^p)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{ 主張 2.74 の第} k \text{ 因子についての線型性}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}}) \left((II) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^q \sigma^p)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \right) \quad (\because \text{ 主張 2.16 を} k \text{ 番目以外の因子へ同時適用}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}}) \left(\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^q}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \left(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^p}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \right) \quad (\because \text{ 主張 2.73 (1)}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}}) \left(\sigma_k^q \sigma_k^p \right) \quad (\because \text{ 定義 12.8}) \\
&= - \left(\sigma_k^q \sigma_k^p \right) \quad (\because \text{ 主張 2.25})
\end{aligned}
$$

$W \sigma_k^a W^{-1}$ の鎖（$W = F$）、$(\sigma_k^p \sigma_k^a) \sigma_k^p$ の鎖（$p = z$）、$\sigma_k^p \sigma_k^q$ の鎖（$(p, q) = (z, x)$ と (y, z)）および Step 0 の $\sigma_m^z \sigma_m^z = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}$ より

$$
\begin{aligned}
F\sigma_k^x F^{-1} &= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\left((\sigma^z\sigma^x)\sigma^z\right)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{上の} W\sigma_k^a W^{-1} \text{の鎖を} W=F、a=x \text{で}) \\
&= \left(\sigma_k^z\sigma_k^x\right)\sigma_k^z \quad (\because \text{上の} (\sigma_k^p\sigma_k^a)\sigma_k^p \text{の鎖を} p=z、a=x \text{で}) \\
&= \left(-\left(\sigma_k^x\sigma_k^z\right)\right)\sigma_k^z \quad (\because \text{上の} \sigma_k^p\sigma_k^q \text{の鎖を} (p,q)=(z,x) \text{で}) \\
&= -\left(\left(\sigma_k^x\sigma_k^z\right)\sigma_k^z\right) \quad \left(\because \text{主張 2.20}\right) \\
&= -\left(\sigma_k^x\left(\sigma_k^z\sigma_k^z\right)\right) \quad \left(\because \text{主張 2.15}\right) \\
&= -\left(\sigma_k^x I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\right) \quad (\because \text{Step 0 の} \sigma_m^z\sigma_m^z = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \text{を} m=k \text{で}) \\
&= -\sigma_k^x \quad \left(\because \text{主張 2.17}\right), \\
F\sigma_k^y F^{-1} &= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\left((\sigma^z\sigma^y)\sigma^z\right)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{上の} W\sigma_k^a W^{-1} \text{の鎖を} W=F、a=y \text{で}) \\
&= \left(\sigma_k^z\sigma_k^y\right)\sigma_k^z \quad (\because \text{上の} (\sigma_k^p\sigma_k^a)\sigma_k^p \text{の鎖を} p=z、a=y \text{で}) \\
&= \sigma_k^z\left(\sigma_k^y\sigma_k^z\right) \quad \left(\because \text{主張 2.15}\right) \\
&= \sigma_k^z\left(-\left(\sigma_k^z\sigma_k^y\right)\right) \quad (\because \text{上の} \sigma_k^p\sigma_k^q \text{の鎖を} (p,q)=(y,z) \text{で}) \\
&= -\left(\sigma_k^z\left(\sigma_k^z\sigma_k^y\right)\right) \quad \left(\because \text{主張 2.21}\right) \\
&= -\left(\left(\sigma_k^z\sigma_k^z\right)\sigma_k^y\right) \quad \left(\because \text{主張 2.15}\right) \\
&= -\left(I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\sigma_k^y\right) \quad (\because \text{Step 0 の} \sigma_m^z\sigma_m^z = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \text{を} m=k \text{で}) \\
&= -\sigma_k^y \quad \left(\because \text{主張 2.16}\right), \\
F\sigma_k^z F^{-1} &= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\left((\sigma^z\sigma^z)\sigma^z\right)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{上の} W\sigma_k^a W^{-1} \text{の鎖を} W=F、a=z \text{で}) \\
&= \left(\sigma_k^z\sigma_k^z\right)\sigma_k^z \quad (\because \text{上の} (\sigma_k^p\sigma_k^a)\sigma_k^p \text{の鎖を} p=z、a=z \text{で}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\sigma_k^z \quad (\because \text{Step 0 の} \sigma_m^z\sigma_m^z = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \text{を} m=k \text{で}) \\
&= \sigma_k^z \quad \left(\because \text{主張 2.16}\right)
\end{aligned}
$$

$W\sigma_k^a W^{-1}$ の鎖（$W=E$）、k が偶数のときの鎖、$(\sigma_k^p\sigma_k^a)\sigma_k^p$ の鎖（$p=x$）、$\sigma_k^p\sigma_k^q$ の鎖（$(p,q)=(y,x)$ と (z,x)）および Step 0 の $\sigma_m^x\sigma_m^x = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ より、k が偶数なら第 1 式が、k が奇数なら第 2〜4 式が成り立つ。

$$
\begin{aligned}
E\sigma_k^a E^{-1} &= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((E_k\sigma^a)E_k)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{ 上の} W\sigma_k^a W^{-1} \text{ の鎖を} W = E \text{ で}) \\
&= \sigma_k^a \quad (\because \text{ 上の} k \text{ が偶数のときの鎖}) \qquad (k \text{ 偶数}), \\
E\sigma_k^x E^{-1} &= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((E_k\sigma^x)E_k)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{ 上の} W\sigma_k^a W^{-1} \text{ の鎖を} W = E、a = x \text{ で}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((\sigma^x\sigma^x)\sigma^x)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because E_k \text{ の定義、} k \text{ 奇数}) \\
&= (\sigma_k^x\sigma_k^x)\,\sigma_k^x \quad (\because \text{ 上の} (\sigma_k^p\sigma_k^a)\sigma_k^p \text{ の鎖を} p = x、a = x \text{ で}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\,\sigma_k^x \quad (\because \text{ Step 0 の} \sigma_m^x\sigma_m^x = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \text{ を} m = k \text{ で}) \\
&= \sigma_k^x \quad \left(\because \text{ 主張 2.16}\right), \\
E\sigma_k^y E^{-1} &= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((E_k\sigma^y)E_k)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{ 上の} W\sigma_k^a W^{-1} \text{ の鎖を} W = E、a = y \text{ で}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((\sigma^x\sigma^y)\sigma^x)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because E_k \text{ の定義、} k \text{ 奇数}) \\
&= \left(\sigma_k^x\sigma_k^y\right)\sigma_k^x \quad (\because \text{ 上の} (\sigma_k^p\sigma_k^a)\sigma_k^p \text{ の鎖を} p = x、a = y \text{ で}) \\
&= \sigma_k^x\left(\sigma_k^y\sigma_k^x\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15}\right) \\
&= \sigma_k^x\left(-\left(\sigma_k^x\sigma_k^y\right)\right) \quad (\because \text{ 上の} \sigma_k^p\sigma_k^q \text{ の鎖を} (p,q) = (y,x) \text{ で}) \\
&= -\left(\sigma_k^x\left(\sigma_k^x\sigma_k^y\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.21}\right) \\
&= -\left(\left(\sigma_k^x\sigma_k^x\right)\sigma_k^y\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15}\right) \\
&= -\left(I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\,\sigma_k^y\right) \quad (\because \text{ Step 0 の} \sigma_m^x\sigma_m^x = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \text{ を} m = k \text{ で}) \\
&= -\sigma_k^y \quad \left(\because \text{ 主張 2.16}\right), \\
E\sigma_k^z E^{-1} &= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((E_k\sigma^z)E_k)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{ 上の} W\sigma_k^a W^{-1} \text{ の鎖を} W = E、a = z \text{ で}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((\sigma^x\sigma^z)\sigma^x)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because E_k \text{ の定義、} k \text{ 奇数}) \\
&= (\sigma_k^x\sigma_k^z)\,\sigma_k^x \quad (\because \text{ 上の} (\sigma_k^p\sigma_k^a)\sigma_k^p \text{ の鎖を} p = x、a = z \text{ で}) \\
&= \sigma_k^x\left(\sigma_k^z\sigma_k^x\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15}\right) \\
&= \sigma_k^x\left(-\left(\sigma_k^x\sigma_k^z\right)\right) \quad (\because \text{ 上の} \sigma_k^p\sigma_k^q \text{ の鎖を} (p,q) = (z,x) \text{ で}) \\
&= -\left(\sigma_k^x\left(\sigma_k^x\sigma_k^z\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.21}\right) \\
&= -\left(\left(\sigma_k^x\sigma_k^x\right)\sigma_k^z\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15}\right) \\
&= -\left(I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\,\sigma_k^z\right) \quad (\because \text{ Step 0 の} \sigma_m^x\sigma_m^x = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \text{ を} m = k \text{ で}) \\
&= -\sigma_k^z \quad \left(\because \text{ 主張 2.16}\right)
\end{aligned}
$$

この 2 つを合成する。$X \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ について

$$
\begin{aligned}
UXU^{-1} &= ((EF)X)\,U^{-1} \quad (\because\ U \text{ の定義}) \\
&= ((EF)X)\,(FE) \quad (\because\ \text{Step 0 の} U^{-1} = FE) \\
&= (E(FX))\,(FE) \quad \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= ((E(FX))\,F)\,E \quad \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= (E\,((FX)F))\,E \quad \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= \big(E\,\big((FX)F^{-1}\big)\big)\,E \quad (\because\ \text{Step 0 の} F^{-1} = F) \\
&= \big(E\,\big((FX)F^{-1}\big)\big)\,E^{-1} \quad (\because\ \text{Step 0 の} E^{-1} = E) \\
&= E\,\big(FXF^{-1}\big)\,E^{-1} \quad (\because\ \text{Step 1 の冒頭の読み} WXW^{-1} = (WX)W^{-1})
\end{aligned}
$$

である。この合成の鎖に、上の $F\sigma_k^a F^{-1}$ の 3 式と $E\sigma_k^a E^{-1}$ の 4 式を代入する。

$$
\begin{aligned}
U\sigma_k^x U^{-1} &= E\,\big(F\sigma_k^x F^{-1}\big)\,E^{-1} \quad (\because\ \text{上の合成の鎖を} X = \sigma_k^x \text{ で}) \\
&= E\,(-\sigma_k^x)\,E^{-1} \quad (\because\ \text{上の} F\sigma_k^x F^{-1} = -\sigma_k^x) \\
&= (-\,(E\sigma_k^x))\,E^{-1} \quad \big(\because\ \text{主張 2.21}\big) \\
&= -\,\big((E\sigma_k^x)\,E^{-1}\big) \quad \big(\because\ \text{主張 2.20}\big) \\
&= -\sigma_k^x \quad (\because\ \text{上の} E\sigma_k^a E^{-1} \text{ の第 1 式（}k \text{ 偶数、}a = x\text{）と第 2 式（}k \text{ 奇数）}), \\
U\sigma_k^y U^{-1} &= E\,\big(F\sigma_k^y F^{-1}\big)\,E^{-1} \quad (\because\ \text{上の合成の鎖を} X = \sigma_k^y \text{ で}) \\
&= E\,\big(-\sigma_k^y\big)\,E^{-1} \quad (\because\ \text{上の} F\sigma_k^y F^{-1} = -\sigma_k^y) \\
&= \big(-\,\big(E\sigma_k^y\big)\big)\,E^{-1} \quad \big(\because\ \text{主張 2.21}\big) \\
&= -\,\big(\big(E\sigma_k^y\big)\,E^{-1}\big) \quad \big(\because\ \text{主張 2.20}\big) \\
&= \begin{cases} -\big(-\sigma_k^y\big) & (k \text{ 奇数}) \\ -\sigma_k^y & (k \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because\ \text{上の} E\sigma_k^a E^{-1} \text{ の第 3 式（}k \text{ 奇数）と第 1 式（}k \text{ 偶数、}a = y\text{）}) \\
&= \begin{cases} \sigma_k^y & (k \text{ 奇数}) \\ -\sigma_k^y & (k \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \big(\because\ k \text{ 奇数の場合に主張 2.27}\big), \\
U\sigma_k^z U^{-1} &= E\,\big(F\sigma_k^z F^{-1}\big)\,E^{-1} \quad (\because\ \text{上の合成の鎖を} X = \sigma_k^z \text{ で}) \\
&= E\sigma_k^z E^{-1} \quad (\because\ \text{上の} F\sigma_k^z F^{-1} = \sigma_k^z) \\
&= \begin{cases} -\sigma_k^z & (k \text{ 奇数}) \\ \sigma_k^z & (k \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because\ \text{上の} E\sigma_k^a E^{-1} \text{ の第 4 式（}k \text{ 奇数）と第 1 式（}k \text{ 偶数、}a = z\text{）})
\end{aligned}
$$

Step 2（Z_m と Y_m への作用）。U は Step 0 より可逆なので、主張 1.90 を $n = 2^{M_{\mathrm{col}}}$、$B = U$ として使う（UXU^{-1} は $(UX)U^{-1}$ と読む）。$r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$0 \leq r \leq M_{\mathrm{col}}$ について $P_r \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を

$$
P_0 := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}, \qquad P_{r+1} := P_r\,\sigma_{r+1}^x \quad (0 \leq r < M_{\mathrm{col}})
$$

で定める（P_r は積 $\sigma_1^x \cdots \sigma_r^x$ を左から読んだもの）。定義 13.1 と 定義 13.2 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\,\sigma_m^z$、$Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\,\sigma_m^y$ は、積を同じく左から読むので $Z_m = P_{m-1}\sigma_m^z$、$Y_m = P_{m-1}\sigma_m^y$ である（$m = 1$ では左側の空積が P_0 にあたる）。まず $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$0 \leq r \leq M_{\mathrm{col}}$ について

$$
UP_rU^{-1} = \begin{cases} P_r & (r \text{ 偶数}) \\ -P_r & (r \text{ 奇数}) \end{cases}
$$

を r についての帰納法で示す。$r = 0$ では

$$
\begin{aligned}
UP_0U^{-1} &= U\, I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\, U^{-1} \quad (\because\ P_0 \text{ の定義}) \\
&= T_U\left(I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\right) \quad (\because\ \text{主張 1.90 の} T_B \text{ の定義（} B = U \text{）}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \quad (\because\ \text{主張 1.90 の単位性}) \\
&= P_0 \quad (\because\ P_0 \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

である（0 は偶数）。$0 \leq r < M_{\mathrm{col}}$ で r について成り立つとすると、

$$
\begin{aligned}
UP_{r+1}U^{-1} &= U\left(P_r\sigma^x_{r+1}\right)U^{-1} \quad (\because\ P_{r+1} \text{ の定義}) \\
&= T_U\left(P_r\sigma^x_{r+1}\right) \quad (\because\ \text{主張 1.90 の} T_B \text{ の定義（} B = U \text{）}) \\
&= T_U(P_r)\, T_U\left(\sigma^x_{r+1}\right) \quad (\because\ \text{主張 1.90 の乗法性}) \\
&= \left(UP_rU^{-1}\right)\left(U\sigma^x_{r+1}U^{-1}\right) \quad (\because\ \text{主張 1.90 の} T_B \text{ の定義（} B = U \text{）}) \\
&= \left(UP_rU^{-1}\right)\left(-\sigma^x_{r+1}\right) \quad (\because\ \text{Step 1 の} U\sigma^x_kU^{-1} = -\sigma^x_k \text{ を} k = r+1 \text{ で}) \\
&= -\left(\left(UP_rU^{-1}\right)\sigma^x_{r+1}\right) \quad (\because\ \text{主張 2.21}) \\
&= \begin{cases} -\left(P_r\sigma^x_{r+1}\right) & (r \text{ 偶数}) \\ -\left(\left(-P_r\right)\sigma^x_{r+1}\right) & (r \text{ 奇数}) \end{cases} \quad (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= \begin{cases} -\left(P_r\sigma^x_{r+1}\right) & (r \text{ 偶数}) \\ -\left(-\left(P_r\sigma^x_{r+1}\right)\right) & (r \text{ 奇数}) \end{cases} \quad (\because\ r \text{ 奇数の場合に主張 2.20}) \\
&= \begin{cases} -\left(P_r\sigma^x_{r+1}\right) & (r \text{ 偶数}) \\ P_r\sigma^x_{r+1} & (r \text{ 奇数}) \end{cases} \quad (\because\ r \text{ 奇数の場合に主張 2.27}) \\
&= \begin{cases} -P_{r+1} & (r \text{ 偶数}) \\ P_{r+1} & (r \text{ 奇数}) \end{cases} \quad (\because\ P_{r+1} \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

であり、r が偶数なら $r+1$ は奇数、r が奇数なら $r+1$ は偶数なので、$r+1$ についても成り立つ。これを $r = m-1$（$1 \leq m \leq M_{\mathrm{col}}$。$m$ が奇数なら $m-1$ は偶数、m が偶数なら $m-1$ は奇数）で使うと、

$$
\begin{aligned}
UZ_mU^{-1} &= U\left(P_{m-1}\sigma_m^z\right)U^{-1} \quad \left(\because \text{ 定義 13.1 と} P_{m-1} \text{ の定義}\right)\\
&= T_U\left(P_{m-1}\sigma_m^z\right) \quad \left(\because \text{ 主張 1.90 の} T_B \text{ の定義（} B=U\text{）}\right)\\
&= T_U(P_{m-1})\,T_U\left(\sigma_m^z\right) \quad \left(\because \text{ 主張 1.90 の乗法性}\right)\\
&= \left(UP_{m-1}U^{-1}\right)\left(U\sigma_m^zU^{-1}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 1.90 の} T_B \text{ の定義（} B=U\text{）}\right)\\
&= \begin{cases} P_{m-1}\left(U\sigma_m^zU^{-1}\right) & (m \text{ 奇数})\\ (-P_{m-1})\left(U\sigma_m^zU^{-1}\right) & (m \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \text{ 上の} UP_rU^{-1} \text{ を} r=m-1 \text{ で}\right)\\
&= \begin{cases} P_{m-1}\left(-\sigma_m^z\right) & (m \text{ 奇数})\\ (-P_{m-1})\,\sigma_m^z & (m \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \text{ Step 1 の} U\sigma_k^zU^{-1} \text{ を} k=m \text{ で}\right)\\
&= \begin{cases} -\left(P_{m-1}\sigma_m^z\right) & (m \text{ 奇数})\\ (-P_{m-1})\,\sigma_m^z & (m \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because m \text{ 奇数の場合に主張 2.21}\right)\\
&= -\left(P_{m-1}\sigma_m^z\right) \quad \left(\because m \text{ 偶数の場合に主張 2.20}\right)\\
&= -Z_m \quad \left(\because \text{ 定義 13.1 と} P_{m-1} \text{ の定義}\right),\\
UY_mU^{-1} &= U\left(P_{m-1}\sigma_m^y\right)U^{-1} \quad \left(\because \text{ 定義 13.2 と} P_{m-1} \text{ の定義}\right)\\
&= T_U\left(P_{m-1}\sigma_m^y\right) \quad \left(\because \text{ 主張 1.90 の} T_B \text{ の定義（} B=U\text{）}\right)\\
&= T_U(P_{m-1})\,T_U\left(\sigma_m^y\right) \quad \left(\because \text{ 主張 1.90 の乗法性}\right)\\
&= \left(UP_{m-1}U^{-1}\right)\left(U\sigma_m^yU^{-1}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 1.90 の} T_B \text{ の定義（} B=U\text{）}\right)\\
&= \begin{cases} P_{m-1}\left(U\sigma_m^yU^{-1}\right) & (m \text{ 奇数})\\ (-P_{m-1})\left(U\sigma_m^yU^{-1}\right) & (m \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \text{ 上の} UP_rU^{-1} \text{ を} r=m-1 \text{ で}\right)\\
&= \begin{cases} P_{m-1}\sigma_m^y & (m \text{ 奇数})\\ (-P_{m-1})\left(-\sigma_m^y\right) & (m \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \text{ Step 1 の} U\sigma_k^yU^{-1} \text{ を} k=m \text{ で}\right)\\
&= \begin{cases} P_{m-1}\sigma_m^y & (m \text{ 奇数})\\ -\left(P_{m-1}\left(-\sigma_m^y\right)\right) & (m \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because m \text{ 偶数の場合に主張 2.20}\right)\\
&= \begin{cases} P_{m-1}\sigma_m^y & (m \text{ 奇数})\\ -\left(-\left(P_{m-1}\sigma_m^y\right)\right) & (m \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because m \text{ 偶数の場合に主張 2.21}\right)\\
&= P_{m-1}\sigma_m^y \quad \left(\because m \text{ 偶数の場合に主張 2.27}\right)\\
&= Y_m \quad \left(\because \text{ 定義 13.2 と} P_{m-1} \text{ の定義}\right)
\end{aligned}
$$

Step 3 ($H_1^{(+)}$ と H_2 への作用)。定義 13.22 の $H_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1$ と 定義 13.23 の $H_2 = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_mY_m$ は、どちらも Y と Z を 1 個ずつ掛けた項の、係数が 1 または -1 の有限和である。Step 2 と同じく UXU^{-1} は $(UX)U^{-1}$ と読む。$j,k \in \{1,\ldots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、Step 2 より

$$
\begin{aligned}
U\,(Y_jZ_k)\,U^{-1} &= T_U\,(Y_jZ_k) \quad \big(\because \text{ 主張 1.90 の}T_B\text{ の定義 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U)\big)\\
&= T_U(Y_j)\,T_U(Z_k) \quad \big(\because \text{ 主張 1.90 の乗法性 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U)\big)\\
&= \big(UY_jU^{-1}\big)\,\big(UZ_kU^{-1}\big) \quad \big(\because \text{ 主張 1.90 の}T_B\text{ の定義 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U)\big)\\
&= Y_j(-Z_k) \quad (\because \text{ Step 2 の}UY_mU^{-1} = Y_m \text{ を}m = j \text{ で、}UZ_mU^{-1} = -\,Z_m \text{ を}m = k \text{ で})\\
&= -\,(Y_jZ_k) \quad \big(\because \text{ 主張 2.21 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to Y_j,\ B \to Z_k)\big)\,,\\
U\,(Z_jY_j)\,U^{-1} &= T_U\,(Z_jY_j) \quad \big(\because \text{ 主張 1.90 の}T_B\text{ の定義 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U)\big)\\
&= T_U(Z_j)\,T_U(Y_j) \quad \big(\because \text{ 主張 1.90 の乗法性 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U)\big)\\
&= \big(UZ_jU^{-1}\big)\,\big(UY_jU^{-1}\big) \quad \big(\because \text{ 主張 1.90 の}T_B\text{ の定義 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U)\big)\\
&= (-Z_j)Y_j \quad (\because \text{ Step 2 の}UZ_mU^{-1} = -\,Z_m \text{ と}UY_mU^{-1} = Y_m \text{ を}m = j \text{ で})\\
&= -\,(Z_jY_j) \quad \big(\because \text{ 主張 2.20 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to Z_j,\ B \to Y_j)\big)
\end{aligned}
$$

である。H_2 については

$$
\begin{aligned}
UH_2U^{-1} &= U\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_mY_m\Big)U^{-1} \quad \big(\because \text{ 定義 13.23}\big)\\
&= T_U\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_mY_m\Big) \quad \big(\because \text{ 主張 1.90 の}T_B\text{ の定義 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U)\big)\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} T_U\,(Z_mY_m) \quad \big(\because \text{ 主張 1.9 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U,\ r \to M_{\mathrm{col}},\ (X_1,\dots,X_r) \to (Z_1Y_1,\dots,Z_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}))\big)\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} U\,(Z_mY_m)\,U^{-1} \quad \big(\because \text{ 主張 1.90 の}T_B\text{ の定義 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U) \text{ を各項に}\big)\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} (-\,(Z_mY_m)) \quad (\because \text{ 上の}U(Z_jY_j)U^{-1} = -\,(Z_jY_j) \text{ を各項に}j = m \text{ で})\\
&= -\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_mY_m \quad \big(\because \text{ 主張 2.29 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ (X_1,\dots,X_r) \to (Z_1Y_1,\dots,Z_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}))\big)\\
&= -\,H_2 \quad \big(\because \text{ 定義 13.23}\big)
\end{aligned}
$$

が成り立つ。$H_1^{(+)}$ については、主張の仮定 $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ より $M_{\mathrm{col}} - 1 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ であり、

$$
\begin{aligned}
UH_1^{(+)}U^{-1} &= U\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1\Big)U^{-1} \quad \big(\because \text{ 定義 13.22}\big)\\
&= T_U\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1\Big) \quad \big(\because \text{ 主張 1.90 の}T_B\text{ の定義 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U)\big)\\
&= T_U\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1}\Big) - T_U\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1) \quad \Big(\because \text{ 主張 1.11 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U,\ X \to \textstyle\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_\ell Z_{\ell+1},\ W \to Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)\Big)\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} T_U\,(Y_mZ_{m+1}) - T_U\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1) \quad \big(\because \text{ 主張 1.9 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U,\ r \to M_{\mathrm{col}}-1,\ (X_1,\dots,X_r) \to (Y_1Z_2,\dots,Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}}))\big)\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} U\,(Y_mZ_{m+1})\,U^{-1} - U\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)\,U^{-1} \quad \big(\because \text{ 主張 1.90 の}T_B\text{ の定義 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to U) \text{ を各項と引く項に}\big)\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (-\,(Y_mZ_{m+1})) - (-\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)) \quad (\because \text{ 上の}U(Y_jZ_k)U^{-1} = -\,(Y_jZ_k) \text{ を各項に}j = m,\ k = m+1 \text{ で、引く項に}j = M_{\mathrm{col}},\ k = 1 \text{ で})\\
&= \Big(-\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1}\Big) - (-\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)) \quad (\because \text{ 主張 2.29 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}}-1,\ (X_1,\dots,X_r) \to (Y_1Z_2,\dots,Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}})))\\
&= -\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1\Big) \quad \Big(\because \text{ 主張 2.31 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \textstyle\sum_{\ell=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_\ell Z_{\ell+1},\ B \to Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)\Big)\\
&= -\,H_1^{(+)} \quad \big(\because \text{ 定義 13.22}\big)
\end{aligned}
$$

が成り立つ。

Step 4（$S_1^{(+)}, S_2$ への言い換え）。$S_1^{(+)} = i(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}$、$S_2 = i(K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2$（主張 16.2）である。$i(K_1)_{\mathbb{C}}, i(K_2^*)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ はスカラーである。Step 3 から

$$
\begin{aligned}
U S_1^{(+)} U^{-1} &= \big(U\,(i(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)})\big)U^{-1} \quad \Big(\because \text{ 主張 16.2 の} S_1^{(+)} := i(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}\Big) \\
&= \big((i(K_1)_{\mathbb{C}})(U H_1^{(+)})\big)U^{-1} \quad \big(\because \text{ 主張 2.19}\big) \\
&= (i(K_1)_{\mathbb{C}})\big((U H_1^{(+)})U^{-1}\big) \quad \big(\because \text{ 主張 2.18}\big) \\
&= (i(K_1)_{\mathbb{C}})\big(-H_1^{(+)}\big) \quad (\because \text{ Step 3 の} U H_1^{(+)} U^{-1} = -H_1^{(+)}) \\
&= -\big((i(K_1)_{\mathbb{C}}) H_1^{(+)}\big) \quad \big(\because \text{ 主張 2.26}\big) \\
&= -\,S_1^{(+)} \quad \Big(\because \text{ 主張 16.2 の} S_1^{(+)} := i(K_1)_{\mathbb{C}} H_1^{(+)}\Big), \\
U S_2 U^{-1} &= \big(U\,(i(K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2)\big)U^{-1} \quad \big(\because \text{ 主張 16.2 の} S_2 := i(K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2\big) \\
&= \big((i(K_2^*)_{\mathbb{C}})(U H_2)\big)U^{-1} \quad \big(\because \text{ 主張 2.19}\big) \\
&= (i(K_2^*)_{\mathbb{C}})\big((U H_2)U^{-1}\big) \quad \big(\because \text{ 主張 2.18}\big) \\
&= (i(K_2^*)_{\mathbb{C}})\big(-H_2\big) \quad (\because \text{ Step 3 の} U H_2 U^{-1} = -H_2) \\
&= -\big((i(K_2^*)_{\mathbb{C}}) H_2\big) \quad \big(\because \text{ 主張 2.26}\big) \\
&= -\,S_2 \quad \big(\because \text{ 主張 16.2 の} S_2 := i(K_2^*)_{\mathbb{C}} H_2\big)
\end{aligned}
$$

$K_1, K_2^* > 0$ より $i(K_1)_{\mathbb{C}}, i(K_2^*)_{\mathbb{C}} \neq 0$ なので、逆に S についての等式から H についての等式も従い、両者は同値である。 □

定義 16.4 ($\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}$)**.** 主張 14.8 の整数から実数への包含の略記 $a_{\mathbb{R}}$ $(a \in \mathbb{Z})$ を用いる。$\delta \in [0,1)$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\} \subset \mathbb{Z}$ に対し

$$
\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu} := \frac{2\pi\,(\mu_{\mathbb{R}} - \delta)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} \in \mathbb{R}
$$

とおく。$(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \geq 2_{\mathbb{R}} > 0_{\mathbb{R}}$ なので分数が定まる。$\delta \in [0,1) \subset \mathbb{R}$ であり、$\pi \in \mathbb{R}$ を含むので、値は $\mathbb{R}$ に住む。μ で添字づけた M_{col} 個の実数の族であり、集合としては扱わない。

定義 16.5 ($\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}$)**.** 定義 12.6 の $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 15.11 の $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$、定義 16.4 の $\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}$ について、$\delta \in [0,1)$ と $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ に対し

$$
\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} := (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\big(\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\big)\right)
$$

とおく。和は 定義 1.19($m \to M_{\mathrm{col}}$, $r_j \to \gamma\big(\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},j}\big)$)の有限和である。$K_2 > 0$ より $2\sinh 2K_2 > 0$ なので、実数冪 $(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ が定まり、$\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}$ である（$\mathbb{R}$ に住むのは、γ が実関数 arccosh の値であり、exp と実数冪の値を取るからである）。

主張 16.6 ($\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）について、

- (1) $\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger = O, \qquad \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = O$
- (2) $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, \check{\psi}_\mu^\dagger = I - \check{n}_\mu$
- (3) $\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$

$O, I \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ は零行列（定義 1.93）と単位行列（定義 2.2）、$\check{n}_\mu^2$ は 定義 3.4 (1) の冪である。

証明. (1) 主張 15.23 の第 1 式で $\nu \to \mu$ と取ると

$$\begin{aligned}\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger + \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger &= \left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu^\dagger\right]_+ \quad \left(\because \text{ 定義 2.44 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X, W \to \check{\psi}_\mu^\dagger) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\ &= O \quad \left(\because \text{ 主張 15.23 の第 1 式 } (\nu \to \mu)\right)\end{aligned}$$

なので、主張 2.65 を $m, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X \to \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger$ で引いて $\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger = O$ を得る。$M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.15 (2)）なので、第 3 式で両方の添字を $M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ と取ると

$$\begin{aligned}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} + \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= \left[\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right]_+ \quad \left(\because \text{ 定義 2.44 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X, W \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\ &= O \quad \left(\because \text{ 主張 15.23 の第 3 式 } (\mu, \nu \to M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu)\right)\end{aligned}$$

なので、主張 2.65 を $m, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ で引いて $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = O$ を得る。

(2) 主張 15.23 の第 2 式で $\nu \to M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ と取ると

$$\begin{aligned}\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} + \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger &= \left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right]_+ \quad \left(\because \text{ 定義 2.44 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ W \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\ &= \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, I \quad \left(\because \text{ 主張 15.23 の第 2 式 } (\nu \to M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu)\right) \\ &= 1_{\mathbb{C}}\, I \quad \left(\because \text{ 定義 2.1 } (n \to M_{\mathrm{col}},\ i, j \to M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu) \text{ の } i = j \text{ の場合}\right) \\ &= I \quad \left(\because \text{ 主張 2.42 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I)\right)\end{aligned}$$

である（$\check{\mathcal{M}}$ へ絞ったので合同式の計算が要らない）。よって

$$\begin{aligned}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger &= I - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad \left(\because \text{ 主張 2.66 } (m, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu},\ B \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger,\ C \to I) \text{ と直前の鎖}\right) \\ &= I - \check{n}_\mu \quad \left(\because \check{n}_\mu \text{ の定義。定義 15.30}\right)\end{aligned}$$

(3) (1)(2) を使って

$$\begin{aligned}\check{n}_\mu^2 &= \check{n}_\mu^1 \check{n}_\mu \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A\ (m \to 1,\ A \to \check{n}_\mu)\right) \\ &= \left(\check{n}_\mu^0 \check{n}_\mu\right) \check{n}_\mu \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A\ (m \to 0,\ A \to \check{n}_\mu)\right) \\ &= \left(I\, \check{n}_\mu\right) \check{n}_\mu \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^0 := I\ (A \to \check{n}_\mu)\right) \\ &= \check{n}_\mu \check{n}_\mu \quad \left(\because \text{ 主張 2.16 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu)\right) \\ &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because \check{n}_\mu \text{ の定義。定義 15.30}\right) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m, n, p, q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ B \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu},\ C \to \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\right) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m, n, p, q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu},\ B \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ C \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\left(I - \check{n}_\mu\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because (2)\right) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\left(I + (-\check{n}_\mu)\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.30 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I,\ B \to \check{n}_\mu)\right) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(I \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} + \left(-\check{n}_\mu\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.24 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I,\ B \to -\check{n}_\mu,\ C \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\right) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} + \left(-\check{n}_\mu\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.16 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\right) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} + \left(-\left(\check{n}_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.20 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\right) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} + \check{\psi}_\mu^\dagger \left(-\left(\check{n}_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.23 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ B \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu},\ C \to -\left(\check{n}_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right))\right) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} + \left(-\left(\check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{n}_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.21 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ B \to \check{n}_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\right) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{n}_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.30 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu},\ B \to \check{\psi}_\mu^\dagger (\check{n}_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\ &= \check{n}_\mu - \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{n}_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because \check{n}_\mu \text{ の定義。定義 15.30}\right) \\ &= \check{n}_\mu - \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because \check{n}_\mu \text{ の定義。定義 15.30}\right) \\ &= \check{n}_\mu - \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m, n, p, q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ B \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu},\ C \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\right) \\ &= \check{n}_\mu - \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger\right) \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m, n, p, q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ B \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ C \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\ &= \check{n}_\mu - O \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because (1) \text{ の第 1 式}\right) \\ &= \check{n}_\mu - O\, O \quad \left(\because (1) \text{ の第 2 式}\right) \\ &= \check{n}_\mu - O \quad \left(\because \text{ 主張 2.46 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ B \to O)\right) \\ &= \check{n}_\mu \quad \left(\because \text{ 主張 2.10 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X \to \check{n}_\mu)\right)\end{aligned}$$

□

主張 16.7 ($\check{n}_\mu\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\check{n}_\mu$)**.** $\mu,\nu \in \check{\mathcal{M}}$ が $\mu \neq \nu$ を満たすとき、

- (1) $\check{\psi}^\dagger_\mu\,\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\,\check{\psi}^\dagger_\mu, \qquad \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$
- (2) $\check{n}_\mu\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\check{n}_\mu$

証明. Step 1（4 つの反交換関係）。$\mu,\nu \in \check{\mathcal{M}}$ かつ $\mu \neq \nu$ である。定義 14.15 (2) より $M_{\mathrm{col}}+1-\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、主張 15.23 を (μ,ν)、$(\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu)$、$(\nu, M_{\mathrm{col}}+1-\mu)$、$(M_{\mathrm{col}}+1-\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu)$ の 4 通りに適用できる。まず対の条件を見る：

$$\begin{aligned}\delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= \delta_{\mu,\nu} \quad (\because M_{\mathrm{col}}+1-\nu = M_{\mathrm{col}}+1-\mu \iff \mu=\nu)\\ &= 0 \quad \left(\because \text{定義 2.1 } (n\to M_{\mathrm{col}},\ i\to\mu,\ j\to\nu) \text{ の } i\neq j \text{ の場合。} \mu\neq\nu\right)\end{aligned}$$

である（添字を $\check{\mathcal{M}}$ に絞ってあるので、合同式を経由せずこの等号で済む。定義 14.15 (5)）。したがって

$$\begin{aligned}\left[\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}^\dagger_\nu\right]_+ &= O \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 1 式。主張 15.23}),\\
\left[\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right]_+ &= \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, I \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 2 式}(\nu\to M_{\mathrm{col}}+1-\nu)\text{。主張 15.23})\\
&= 0_{\mathbb{C}}\, I \quad (\because \text{直前の}\delta \text{ の計算}\delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}=0)\\
&= O \quad \left(\because \text{主張 2.13 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to I)\right),\\
\left[\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}, \check{\psi}^\dagger_\nu\right]_+ &= \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\check{\psi}^\dagger_\nu + \check{\psi}^\dagger_\nu\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad \left(\because \text{定義 2.44 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu},\ W\to\check{\psi}^\dagger_\nu)\right)\\
&= \check{\psi}^\dagger_\nu\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} + \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\check{\psi}^\dagger_\nu \quad \left(\because \text{主張 2.14 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\check{\psi}^\dagger_\nu,\ B\to\check{\psi}^\dagger_\nu\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\right)\\
&= \left[\check{\psi}^\dagger_\nu, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right]_+ \quad \left(\because \text{定義 2.44 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X\to\check{\psi}^\dagger_\nu,\ W\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\, I \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 2 式}(\mu\to\nu,\ \nu\to M_{\mathrm{col}}+1-\mu)\text{。主張 15.23})\\
&= \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, I \quad (\because \text{定義 2.1 } (n\to M_{\mathrm{col}},\ i\to M_{\mathrm{col}}+1-\mu,\ j\to M_{\mathrm{col}}+1-\nu)\,(i=j \text{ と} j=i \text{ は同値なので}\delta_{i,j}=\delta_{j,i})\ )\\
&= 0_{\mathbb{C}}\, I \quad (\because \text{直前の}\delta \text{ の計算}\delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}=0)\\
&= O \quad \left(\because \text{主張 2.13 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to I)\right),\\
\left[\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right]_+ &= O \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 3 式。主張 15.23})\end{aligned}$$

（右辺の $O \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列。主張 15.23 の右辺の 0 である。）$X \in \{\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\}$ と $W \in \{\check{\psi}^\dagger_\nu, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\}$ を取ると、$[X,W]_+$ は上の 4 式の左辺のどれかなので

$$\begin{aligned}XW + WX = [X,W]_+ &\quad \left(\because \text{定義 2.44 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}}) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\ &= O \quad (\because \text{上の 4 式のうち}[X,W]_+ \text{ を左辺に持つ式})\end{aligned}$$

である。よって 主張 2.43 を $m,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}}$、主張の X をこの Step の XW に、主張の Y を WX に置き換えて引いて、X と W のどの組み合わせでも $XW = -(WX)$ を得る。

Step 2（(1) の証明）。$X \in \{\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\}$ を取ると、$\check{n}_\nu$ の定義（定義 15.30）を開き、Step 1 を 2 回使って

$$\begin{aligned}X\,\check{n}_\nu &= X\left(\check{\psi}^\dagger_\nu\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right) \quad (\because \check{n}_\nu \text{ の定義})\\
&= \left(X\,\check{\psi}^\dagger_\nu\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad \left(\because \text{主張 2.15 } (m,n,p,q\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to X,\ B\to\check{\psi}^\dagger_\nu,\ C\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \left(-\left(\check{\psi}^\dagger_\nu X\right)\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{Step 1 の} X\check{\psi}^\dagger_\nu = -(\check{\psi}^\dagger_\nu X))\\
&= -\left(\left(\check{\psi}^\dagger_\nu X\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right) \quad \left(\because \text{主張 2.20 } (m,n,p\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\check{\psi}^\dagger_\nu X,\ B\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu})\right)\\
&= -\left(\check{\psi}^\dagger_\nu\left(X\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right)\right) \quad \left(\because \text{主張 2.15 } (m,n,p,q\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\check{\psi}^\dagger_\nu,\ B\to X,\ C\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu})\right)\\
&= -\left(\check{\psi}^\dagger_\nu\left(-\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}X\right)\right)\right) \quad (\because \text{Step 1 の} X\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} = -(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}X))\\
&= -\left(-\left(\check{\psi}^\dagger_\nu\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}X\right)\right)\right) \quad \left(\because \text{主張 2.21 } (m,n,p\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\check{\psi}^\dagger_\nu,\ B\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}X)\right)\\
&= \check{\psi}^\dagger_\nu\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}X\right) \quad \left(\because \text{主張 2.27 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\check{\psi}^\dagger_\nu(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}X))\right)\\
&= \left(\check{\psi}^\dagger_\nu\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right)X \quad \left(\because \text{主張 2.15 } (m,n,p,q\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\check{\psi}^\dagger_\nu,\ B\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ C\to X) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \check{n}_\nu\,X \quad (\because \check{n}_\nu \text{ の定義})\end{aligned}$$

$X = \check{\psi}_\mu^\dagger$ と $X = \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ の両方でこれが成り立つ。

Step 3（(2) の証明）。$\check{n}_\mu, \check{n}_\nu$ の定義（定義 15.30）を開き、(1) を 2 回使って

$$
\begin{aligned}
\check{n}_\mu \check{n}_\nu &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \check{n}_\nu \quad (\because \check{n}_\mu \text{ の定義}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{n}_\nu\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p,q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ B \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu},\ C \to \check{n}_\nu)\right) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{n}_\nu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad (\because (1) \text{ を} X = \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \text{ に適用}) \\
&= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\nu\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p,q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ B \to \check{n}_\nu,\ C \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\check{n}_\nu \check{\psi}_\mu^\dagger\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because (1) \text{ を} X = \check{\psi}_\mu^\dagger \text{ に適用}) \\
&= \check{n}_\nu \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p,q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\nu,\ B \to \check{\psi}_\mu^\dagger,\ C \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\right) \\
&= \check{n}_\nu \check{n}_\mu \quad (\because \check{n}_\mu \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

□

主張 16.8 $(\mathrm{tr}\left(R_{\mu_1}^{(e_1)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}\right) = 2^{M_{\mathrm{col}}-k} \quad \left(R_\mu^{(1)} = \check{n}_\mu,\ R_\mu^{(0)} = I - \check{n}_\mu\right)$**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $e \in \{0,1\}$ に対して

$$R_\mu^{(1)} := \check{n}_\mu, \qquad R_\mu^{(0)} := I - \check{n}_\mu \ \in \ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と書く（定義 15.30）。このとき、$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、相異なる $\mu_1, \ldots, \mu_k \in \check{\mathcal{M}}$、および $e_1, \ldots, e_k \in \{0,1\}$ について、

$$\mathrm{tr}\left(R_{\mu_1}^{(e_1)} R_{\mu_2}^{(e_2)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}\right) = 2^{M_{\mathrm{col}}-k}$$

$k \geq 1$ のとき左辺の積は 定義 2.48（$n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to k,\ A_j \to R_{\mu_j}^{(e_j)}$）の左から順に掛ける有限積 $\prod_{j=1}^k R_{\mu_j}^{(e_j)}$、右辺は 定義 1.64 の冪である（$\mu_1, \ldots, \mu_k$ は $\check{\mathcal{M}}$ の相異なる元なので $k \leq M_{\mathrm{col}}$）。

（$k = 0$ のときは空の積を I と読み、$\mathrm{tr}(I) = 2^{M_{\mathrm{col}}}$ である。）とくに $e_1 = \cdots = e_k = 1$ と取れば $\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} \cdots \check{n}_{\mu_k}) = 2^{M_{\mathrm{col}}-k}$ であり、$\mathrm{tr}(\check{n}_\mu) = 2^{M_{\mathrm{col}}-1}$、$k = M_{\mathrm{col}}$ のとき $\mathrm{tr}(\check{n}_1 \cdots \check{n}_{M_{\mathrm{col}}}) = 1$。

** 因子として $\check{n}_\mu$ と $I - \check{n}_\mu$ の混在を許しているのが要点である。** これにより 主張 16.9 の $\mathrm{tr}\left(\check{Q}_\epsilon\right) = 1$ が、$\prod_{\mu \notin T} (I - \check{n}_\mu)$ を部分集合の和へ展開して二項定理で足し上げる、という手順を経ずに直接得られる（$k = M_{\mathrm{col}}$ の場合）。

証明. 以下 $I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}$（定義 2.2）と書き、トレースは 定義 8.1、積は 定義 1.6 $(m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}})$ による。k についての帰納法で、相異なる添字の全ての列 $\mu_1, \ldots, \mu_k$ と全ての $e_1, \ldots, e_k$ について示す。

基底段階（$k = 0$）。空の積は主張の読みにより I である。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(I) &= \sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} 1_{\mathbb{C}} \quad \left(\because \text{ 主張 8.2 (3) } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}})\right) \\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ を } 2^{M_{\mathrm{col}}} \text{ 個足した和。} \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}-0} \quad (\because \mathbb{Z} \text{ の計算 } M_{\mathrm{col}} - 0 = M_{\mathrm{col}})
\end{aligned}
$$

帰納段階。$k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$k-1$ 個の相異なる添字の全ての列と全ての e の選び方について主張が成り立つと仮定する。相異なる $\mu_1, \ldots, \mu_k \in \check{\mathcal{M}}$ と $e_1, \ldots, e_k \in \{0,1\}$ を取る。$\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$（定義 14.15）の相異なる k 個の元なので $k \leq M_{\mathrm{col}}$ であり、$M_{\mathrm{col}} - k,\ M_{\mathrm{col}} - (k-1) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ である。$P \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を、$k = 1$ なら $P := I$、$k \geq 2$ なら $P := \prod_{j=1}^{k-1} R_{\mu_j}^{(e_j)}$（定義 2.48、$r \to k-1$）と置く。$P$ は $k-1$ 個の相異なる添字 $\mu_1, \ldots, \mu_{k-1}$ の積（$k = 1$ なら空の積）なので、帰納法の仮定より

$$\mathrm{tr}(P) = 2^{M_{\mathrm{col}}-(k-1)}$$

である。以下、$\check{n}_{\mu_k} = \check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k}\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}$（定義 15.30）を使う。

準備 1（最後の因子を分ける）。$k=1$ のとき

$$\begin{aligned}\prod_{j=1}^{1} R^{(e_j)}_{\mu_j} &= R^{(e_1)}_{\mu_1} \quad (\because \text{ 定義 2.48})\\ &= I\,R^{(e_1)}_{\mu_1} \quad \Big(\because \text{ 主張 2.16 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to R^{(e_1)}_{\mu_1}) \text{ を右辺から左辺へ}\Big)\\ &= P\,R^{(e_k)}_{\mu_k} \quad (\because P \text{ の置き方 } (k=1))\end{aligned}$$

$k\geq 2$ のとき

$$\begin{aligned}\prod_{j=1}^{k} R^{(e_j)}_{\mu_j} &= \Big(\prod_{j=1}^{k-1} R^{(e_j)}_{\mu_j}\Big) R^{(e_k)}_{\mu_k} \quad (\because \text{ 定義 2.48 } (r\to k-1))\\ &= P\,R^{(e_k)}_{\mu_k} \quad (\because P \text{ の置き方 } (k\geq 2))\end{aligned}$$

準備 2（$\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}$ と P の可換性）。まず単位行列との積の順序を入れ替える：

$$\begin{aligned}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} I &= \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \quad \big(\because \text{ 主張 2.17 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k})\big)\\ &= I\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \quad \big(\because \text{ 主張 2.16 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\end{aligned}$$

$j\in\{1,\dots,k-1\}$ を取る。$\mu_j\neq\mu_k$ なので、$e_j=1$ なら

$$\begin{aligned}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} R^{(1)}_{\mu_j} &= \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}\,\check{n}_{\mu_j} \quad (\because R^{(1)}_{\mu_j} \text{ の定義（主張）})\\ &= \check{n}_{\mu_j}\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \quad \big(\because \text{ 主張 16.7 (1) の第 2 式 } (\mu\to\mu_k,\ \nu\to\mu_j)\big)\\ &= R^{(1)}_{\mu_j}\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \quad (\because R^{(1)}_{\mu_j} \text{ の定義（主張）})\end{aligned}$$

$e_j=0$ なら

$$\begin{aligned}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} R^{(0)}_{\mu_j} &= \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}\,(I-\check{n}_{\mu_j}) \quad (\because R^{(0)}_{\mu_j} \text{ の定義（主張）})\\ &= (I-\check{n}_{\mu_j})\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \quad (\because \text{ 主張 2.71 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ G\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k},\ X\to I,\ W\to\check{n}_{\mu_j}) \text{。前提は上の単位行列との積の鎖と、主張 16.7 (1) の第 2 式 } (\mu\to\mu_k,\ \nu\to\mu_j))\\ &= R^{(0)}_{\mu_j}\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \quad (\because R^{(0)}_{\mu_j} \text{ の定義（主張）})\end{aligned}$$

これで全ての $j\in\{1,\dots,k-1\}$ について $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} R^{(e_j)}_{\mu_j} = R^{(e_j)}_{\mu_j}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}$ である。$k=1$ なら

$$\begin{aligned}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} P &= \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} I \quad (\because P \text{ の置き方 } (k=1))\\ &= I\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \quad (\because \text{上の単位行列との積の鎖})\\ &= P\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \quad (\because P \text{ の置き方 } (k=1))\end{aligned}$$

$k\geq 2$ なら

$$\begin{aligned}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} P &= \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \prod_{j=1}^{k-1} R^{(e_j)}_{\mu_j} \quad (\because P \text{ の置き方 } (k\geq 2))\\ &= \Big(\prod_{j=1}^{k-1} R^{(e_j)}_{\mu_j}\Big)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \quad \Big(\because \text{ 主張 2.61 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r\to k-1,\ X\to\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k},\ A_j\to R^{(e_j)}_{\mu_j}) \text{。前提は直前の段落}\Big)\\ &= P\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k} \quad (\because P \text{ の置き方 } (k\geq 2))\end{aligned}$$

準備 3（$I-\check{n}_{\mu_k}$ を右から掛けたトレース）。

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}(P\,(I-\check{n}_{\mu_k})) &= \operatorname{tr}(P\,(I+(-\check{n}_{\mu_k}))) \quad (\because \text{主張 2.30 } (A\to I,\ B\to \check{n}_{\mu_k})) \\
&= \operatorname{tr}(PI+P\,(-\check{n}_{\mu_k})) \quad (\because \text{主張 2.23 } (A\to P,\ B\to I,\ C\to -\check{n}_{\mu_k})) \\
&= \operatorname{tr}(P+P\,(-\check{n}_{\mu_k})) \quad (\because \text{主張 2.17 } (A\to P)) \\
&= \operatorname{tr}(P+(-(P\check{n}_{\mu_k}))) \quad (\because \text{主張 2.21 } (A\to P,\ B\to \check{n}_{\mu_k})) \\
&= \operatorname{tr}(1_{\mathbb{C}}P+(-(P\check{n}_{\mu_k}))) \quad (\because \text{主張 2.42 } (A\to P) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \operatorname{tr}(1_{\mathbb{C}}P+(-1_{\mathbb{C}})\,(P\check{n}_{\mu_k})) \quad (\because \text{主張 2.25 } (A\to P\check{n}_{\mu_k})) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\operatorname{tr}(P)+(-1_{\mathbb{C}})\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k}) \quad (\because \text{主張 8.2 (1) } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ \alpha\to 1_{\mathbb{C}},\ \beta\to -1_{\mathbb{C}},\ A\to P,\ B\to P\check{n}_{\mu_k})) \\
&= \operatorname{tr}(P)+(-1_{\mathbb{C}})\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k}) \quad (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は } \mathbb{C} \text{ の積の単位元。主張 1.56}) \\
&= \operatorname{tr}(P)+(-\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k})) \quad (\because \text{定義 1.14 } (z\to \operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k})) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \operatorname{tr}(P)-\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k}) \quad (\because \text{定義 1.15 を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

まず $\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k})=\frac{1}{2}\operatorname{tr}(P)$ を示す。

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k}) &= \operatorname{tr}\Big(P\left(\check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}\right)\Big) \quad (\because \text{定義 15.30}) \\
&= \operatorname{tr}\Big(\left(P\check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k}\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}\Big) \quad \Big(\because \text{主張 2.15 } (A\to P,\ B\to \check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k},\ C\to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}) \text{ を右辺から左辺へ}\Big) \\
&= \operatorname{tr}\Big(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}\left(P\check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k}\right)\Big) \quad \Big(\because \text{主張 8.2 (2) } (A\to P\check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k},\ B\to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k})\Big) \\
&= \operatorname{tr}\Big(\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}P\right)\check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k}\Big) \quad \Big(\because \text{主張 2.15 } (A\to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k},\ B\to P,\ C\to \check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k}) \text{ を右辺から左辺へ}\Big) \\
&= \operatorname{tr}\Big(\left(P\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}\right)\check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k}\Big) \quad (\because \text{準備 2}) \\
&= \operatorname{tr}\Big(P\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k}\check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k}\right)\Big) \quad \Big(\because \text{主張 2.15 } (A\to P,\ B\to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_k},\ C\to \check{\psi}^{\dagger}_{\mu_k})\Big) \\
&= \operatorname{tr}(P\,(I-\check{n}_{\mu_k})) \quad (\because \text{主張 16.6 (2) } (\mu\to\mu_k)) \\
&= \operatorname{tr}(P)-\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k}) \quad (\because \text{準備 3})
\end{aligned}
$$

直前の鎖の両辺に $\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k})$ を足し、2 で割ると

$$
\begin{aligned}
2\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k}) &= \operatorname{tr}(P) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k}) &= \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(P) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

となる。これから e_k が 1 でも 0 でも同じ値になる：

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\Big(PR^{(1)}_{\mu_k}\Big) &= \operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k}) \quad (\because R^{(1)}_{\mu_k} \text{ の定義（主張）}) \\
&= \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(P) \quad (\because \text{直前の鎖}), \\
\operatorname{tr}\Big(PR^{(0)}_{\mu_k}\Big) &= \operatorname{tr}(P\,(I-\check{n}_{\mu_k})) \quad (\because R^{(0)}_{\mu_k} \text{ の定義（主張）}) \\
&= \operatorname{tr}(P)-\operatorname{tr}(P\check{n}_{\mu_k}) \quad (\because \text{準備 3}) \\
&= \operatorname{tr}(P)-\tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(P) \quad (\because \text{直前の鎖}) \\
&= \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(P) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

したがって、いずれの場合も

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\left(\prod_{j=1}^{k}R^{(e_j)}_{\mu_j}\right) &= \operatorname{tr}\Big(PR^{(e_k)}_{\mu_k}\Big) \quad (\because \text{準備 1}) \\
&= \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(P) \quad (\because \text{直前の二場合}) \\
&= \tfrac{1}{2}\cdot 2^{M_{\mathrm{col}}-(k-1)} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \tfrac{1}{2}\cdot 2^{(M_{\mathrm{col}}-k)+1} \quad (\because \mathbb{Z} \text{ の計算 } M_{\mathrm{col}}-(k-1)=(M_{\mathrm{col}}-k)+1) \\
&= \tfrac{1}{2}\cdot\Big(2^{M_{\mathrm{col}}-k}\cdot 2\Big) \quad (\because \text{定義 1.64 } (z\to 2,\ m\to M_{\mathrm{col}}-k)) \\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}-k} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

で、k で主張が成り立つ。 □

主張 16.9 ($\check{n}_\mu$ の同時固有空間分解（各空間は 1 次元）). $\epsilon = (\epsilon_\mu)_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対して

$$\check{Q}_\epsilon := \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\epsilon_\mu \check{n}_\mu + (1-\epsilon_\mu)\,(I - \check{n}_\mu) \Big) \ \in \ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める（有限積は 定義 2.48（$n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ A_\mu \to \epsilon_\mu \check{n}_\mu + (1-\epsilon_\mu)\,(I - \check{n}_\mu)$）による）。このとき、

- (1) $\check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'} = 0 \quad (\epsilon \neq \epsilon'), \qquad \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon$
- (2) $\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{Q}_\epsilon = I$
- (3) $\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \check{n}_\nu = \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\nu \in \check{\mathcal{M}})$
- (4) $\mathrm{tr}\big(\check{Q}_\epsilon\big) = 1, \qquad \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{im}\, \check{Q}_\epsilon = 1$
- (5) $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} = \bigoplus_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \mathrm{im}\, \check{Q}_\epsilon$

が成り立つ。(2) の和は 定義 2.50（$m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}}$）による（定義 14.15 により $\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ なので $\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}} = \{0,1\}^{M_{\mathrm{col}}}$）。すなわち $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ は $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の 1 次元部分空間の直和に分解される。

証明. 以下、主張 16.8 と同じ記号を使う：$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $e \in \{0,1\}$ に対して $R_\mu^{(1)} := \check{n}_\mu$、$R_\mu^{(0)} := I - \check{n}_\mu$。本証明の行列の等式の 0 は零行列 $O \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（定義 1.93）である。

まず $\check{Q}_\epsilon$ の因子を $R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ で書く。$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ とする。$\epsilon_\mu = 1$ の場合は

$$\begin{aligned}
\epsilon_\mu \check{n}_\mu + (1-\epsilon_\mu)\,(I - \check{n}_\mu) &= 1_{\mathbb{C}}\, \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} - 1_{\mathbb{C}})\,(I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{場合の仮定} \epsilon_\mu = 1) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\, \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + (-(1_{\mathbb{C}})))\,(I - \check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{ 定義 1.15 } (z \to 1_{\mathbb{C}},\ w \to 1_{\mathbb{C}})\big) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\, \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{C}}) \cdot 1_{\mathbb{C}})\,(I - \check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{ 定義 1.14 } (z \to 1_{\mathbb{C}})\big) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\, \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{C}}))\,(I - \check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{ 主張 1.56 の乗法の単位元}\big) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\, \check{n}_\mu + 0_{\mathbb{C}}\,(I - \check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{ 主張 1.56 の加法の逆元}\big) \\
&= \check{n}_\mu + 0_{\mathbb{C}}\,(I - \check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{ 主張 2.42 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu)\big) \\
&= \check{n}_\mu + O \quad \big(\because \text{ 主張 2.13 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I - \check{n}_\mu)\big) \\
&= \check{n}_\mu \quad \big(\because \text{ 主張 2.8 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X \to \check{n}_\mu)\big) \\
&= R_\mu^{(1)} \quad (\because R_\mu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \text{場合の仮定} \epsilon_\mu = 1)
\end{aligned}$$

$\epsilon_\mu = 0$ の場合は

$$
\begin{aligned}
\epsilon_\mu \check{n}_\mu + (1-\epsilon_\mu)(I-\check{n}_\mu) &= 0_{\mathbb{C}}\,\check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} - 0_{\mathbb{C}})(I-\check{n}_\mu) \quad (\because \text{場合の仮定} \epsilon_\mu = 0) \\
&= 0_{\mathbb{C}}\,\check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + (-(0_{\mathbb{C}})))(I-\check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{定義 1.15 } (z \to 1_{\mathbb{C}},\ w \to 0_{\mathbb{C}})\big) \\
&= 0_{\mathbb{C}}\,\check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{C}}) \cdot 0_{\mathbb{C}})(I-\check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{定義 1.14 } (z \to 0_{\mathbb{C}})\big) \\
&= 0_{\mathbb{C}}\,\check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + 0_{\mathbb{C}})(I-\check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{主張 1.59 } (z \to -1_{\mathbb{C}})\big) \\
&= 0_{\mathbb{C}}\,\check{n}_\mu + 1_{\mathbb{C}}\,(I-\check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{主張 1.56 の加法の単位元}\big) \\
&= O + 1_{\mathbb{C}}\,(I-\check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{主張 2.13 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu)\big) \\
&= O + (I-\check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{主張 2.42 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I-\check{n}_\mu)\big) \\
&= I - \check{n}_\mu \quad \big(\because \text{主張 2.9 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X \to I-\check{n}_\mu)\big) \\
&= R_\mu^{(0)} \quad (\because R_\mu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \text{場合の仮定} \epsilon_\mu = 0)
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon &= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\epsilon_\mu \check{n}_\mu + (1-\epsilon_\mu)(I-\check{n}_\mu)\Big) \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義（主張）}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \text{直前の二つの場合を各因子へ同時に適用})
\end{aligned}
$$

である。以下の鎖の「$\check{Q}_\epsilon$ の定義（冒頭）」はこの等式を指す。

Step 0（1 つの添字についての関係と、異なる添字の因子の可換性）。主張 16.6 (3) の $\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$ を使う。まず (3) を積の形にする：

$$
\begin{aligned}
\check{n}_\mu \check{n}_\mu &= (I\,\check{n}_\mu)\,\check{n}_\mu \quad \big(\because \text{主張 2.16 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu) \text{ を右辺から左辺へ}\big) \\
&= \big(\check{n}_\mu^0\,\check{n}_\mu\big)\,\check{n}_\mu \quad \big(\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I\ (A \to \check{n}_\mu) \text{ を右辺から左辺へ}\big) \\
&= \check{n}_\mu^1\,\check{n}_\mu \quad \big(\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A\ (m \to 0,\ A \to \check{n}_\mu) \text{ を右辺から左辺へ}\big) \\
&= \check{n}_\mu^2 \quad \big(\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A\ (m \to 1,\ A \to \check{n}_\mu) \text{ を右辺から左辺へ}\big) \\
&= \check{n}_\mu \quad \big(\because \text{主張 16.6 (3)}\big)
\end{aligned}
$$

次に異なる上付き添字の積が両順序とも零であること：

$$
\begin{aligned}
R_\mu^{(1)} R_\mu^{(0)} &= \check{n}_\mu\,(I-\check{n}_\mu) \quad (\because R_\mu^{(1)}, R_\mu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \check{n}_\mu\,(I + (-\check{n}_\mu)) \quad \big(\because \text{主張 2.30 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I,\ B \to \check{n}_\mu)\big) \\
&= \check{n}_\mu I + \check{n}_\mu\,(-\check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{主張 2.23 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to I,\ C \to -\check{n}_\mu)\big) \\
&= \check{n}_\mu + \check{n}_\mu\,(-\check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{主張 2.17 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu)\big) \\
&= \check{n}_\mu + (-(\check{n}_\mu \check{n}_\mu)) \quad \big(\because \text{主張 2.21 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to \check{n}_\mu)\big) \\
&= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \check{n}_\mu \quad \big(\because \text{主張 2.30 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to \check{n}_\mu \check{n}_\mu) \text{ を右辺から左辺へ}\big) \\
&= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \quad (\because \text{Step 0 冒頭の} \check{n}_\mu \check{n}_\mu = \check{n}_\mu) \\
&= 0 \quad \big(\because \text{主張 1.95 の } \Leftarrow\ (m,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to \check{n}_\mu)\big)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R_\mu^{(0)} R_\mu^{(1)} &= (I - \check{n}_\mu)\,\check{n}_\mu \quad (\because R_\mu^{(0)}, R_\mu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= (I + (-\check{n}_\mu))\,\check{n}_\mu \quad \big(\because \text{ 主張 2.30 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I,\ B \to \check{n}_\mu)\big) \\
&= I\check{n}_\mu + (-\check{n}_\mu)\,\check{n}_\mu \quad \big(\because \text{ 主張 2.24 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I,\ B \to -\check{n}_\mu,\ C \to \check{n}_\mu)\big) \\
&= \check{n}_\mu + (-\check{n}_\mu)\,\check{n}_\mu \quad \big(\because \text{ 主張 2.16 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu)\big) \\
&= \check{n}_\mu + (-(\check{n}_\mu\check{n}_\mu)) \quad \big(\because \text{ 主張 2.20 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to \check{n}_\mu)\big) \\
&= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu\check{n}_\mu \quad \big(\because \text{ 主張 2.30 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to \check{n}_\mu\check{n}_\mu) \text{ を右辺から左辺へ}\big) \\
&= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \quad (\because \text{Step 0 冒頭の} \check{n}_\mu\check{n}_\mu = \check{n}_\mu) \\
&= 0 \quad \big(\because \text{ 主張 1.95 の } \Leftarrow\ (m, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to \check{n}_\mu)\big)
\end{aligned}
$$

次に 2 つの冪等性（$R_\mu^{(0)} R_\mu^{(0)}$ は上の $R_\mu^{(1)} R_\mu^{(0)} = 0$ を使う）：

$$
\begin{aligned}
R_\mu^{(1)} R_\mu^{(1)} &= \check{n}_\mu\check{n}_\mu \quad (\because R_\mu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \check{n}_\mu \quad (\because \text{Step 0 冒頭の} \check{n}_\mu\check{n}_\mu = \check{n}_\mu) \\
&= R_\mu^{(1)} \quad (\because R_\mu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R_\mu^{(0)} R_\mu^{(0)} &= (I - \check{n}_\mu)\,(I - \check{n}_\mu) \quad (\because R_\mu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= (I + (-\check{n}_\mu))\,(I - \check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{ 主張 2.30 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I,\ B \to \check{n}_\mu) \text{ を左の因子へ}\big) \\
&= I\,(I - \check{n}_\mu) + (-\check{n}_\mu)\,(I - \check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{ 主張 2.24 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I,\ B \to -\check{n}_\mu,\ C \to I - \check{n}_\mu)\big) \\
&= (I - \check{n}_\mu) + (-\check{n}_\mu)\,(I - \check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{ 主張 2.16 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I - \check{n}_\mu)\big) \\
&= (I - \check{n}_\mu) + (-(\check{n}_\mu\,(I - \check{n}_\mu))) \quad \big(\because \text{ 主張 2.20 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to I - \check{n}_\mu)\big) \\
&= (I - \check{n}_\mu) - \check{n}_\mu\,(I - \check{n}_\mu) \quad \big(\because \text{ 主張 2.30 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I - \check{n}_\mu,\ B \to \check{n}_\mu\,(I - \check{n}_\mu)) \text{ を右辺から左辺へ}\big) \\
&= (I - \check{n}_\mu) - 0 \quad (\because \text{上の} R_\mu^{(1)} R_\mu^{(0)} = \check{n}_\mu\,(I - \check{n}_\mu) = 0) \\
&= I - \check{n}_\mu \quad \big(\because \text{ 主張 2.10 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X \to I - \check{n}_\mu)\big) \\
&= R_\mu^{(0)} \quad (\because R_\mu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}
$$

最後に和が単位行列であること：

$$
\begin{aligned}
R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} &= \check{n}_\mu + (I - \check{n}_\mu) \quad (\because R_\mu^{(1)}, R_\mu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= I \quad \big(\because \text{ 主張 2.67 } (m, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to I)\big)
\end{aligned}
$$

さらに異なる添字の因子の可換性を示す。$\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$、$\mu \neq \nu$ とする。まず単位行列との積の順序を入れ替える（$Y \in \{\check{n}_\nu,\ I - \check{n}_\nu\}$）：

$$
\begin{aligned}
Y\,I &= Y \quad \big(\because \text{ 主張 2.17 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to Y)\big) \\
&= I\,Y \quad \big(\because \text{ 主張 2.16 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to Y) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}
$$

次に 4 通りの上付き添字の組について：

$$
\begin{aligned}
R_\nu^{(1)} R_\mu^{(1)} &= \check{n}_\nu\check{n}_\mu \quad (\because R_\nu^{(1)}, R_\mu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \check{n}_\mu\check{n}_\nu \quad \big(\because \text{ 主張 16.7 (2) } (\mu \to \nu,\ \nu \to \mu)\big) \\
&= R_\mu^{(1)} R_\nu^{(1)} \quad (\because R_\mu^{(1)}, R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R_\nu^{(1)} R_\mu^{(0)} &= \check{n}_\nu\,(I - \check{n}_\mu) \quad (\because R_\nu^{(1)}, R_\mu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= (I - \check{n}_\mu)\,\check{n}_\nu \quad \big(\because \text{ 主張 2.71 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ G \to \check{n}_\nu,\ X \to I,\ W \to \check{n}_\mu) \text{。前提は上の } \check{n}_\nu I = I\check{n}_\nu \text{ と 主張 16.7 (2) } (\mu \to \nu,\ \nu \to \mu)\big) \\
&= R_\mu^{(0)} R_\nu^{(1)} \quad (\because R_\mu^{(0)}, R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R^{(0)}_\nu R^{(1)}_\mu &= (I-\check{n}_\nu)\,\check{n}_\mu \quad (\because R^{(0)}_\nu, R^{(1)}_\mu \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \check{n}_\mu\,(I-\check{n}_\nu) \quad (\because \text{直前の鎖の } \check{n}_\nu\,(I-\check{n}_\mu) = (I-\check{n}_\mu)\,\check{n}_\nu \text{ を } (\mu\to\nu,\ \nu\to\mu) \text{ で、右辺から左辺へ}) \\
&= R^{(1)}_\mu R^{(0)}_\nu \quad (\because R^{(1)}_\mu, R^{(0)}_\nu \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R^{(0)}_\nu R^{(0)}_\mu &= (I-\check{n}_\nu)\,(I-\check{n}_\mu) \quad (\because R^{(0)}_\nu, R^{(0)}_\mu \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= (I-\check{n}_\mu)\,(I-\check{n}_\nu) \quad \left(\because \text{主張 2.71 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ G\to I-\check{n}_\nu,\ X\to I,\ W\to\check{n}_\mu) \text{。前提は上の } (I-\check{n}_\nu)\,I = I\,(I-\check{n}_\nu) \text{ と直前の鎖}\right) \\
&= R^{(0)}_\mu R^{(0)}_\nu \quad (\because R^{(0)}_\mu, R^{(0)}_\nu \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}
$$

よって $\mu\neq\nu$ と全ての $e,e'\in\{0,1\}$ について $R^{(e')}_\nu R^{(e)}_\mu = R^{(e)}_\mu R^{(e')}_\nu$ である（以下「Step 0 の可換性」と呼ぶ）。

Step 1（(1) の証明）。$\epsilon\neq\epsilon'$ なら、ある $\nu\in\check{\mathcal{M}}$ で $\epsilon_\nu\neq\epsilon'_\nu$。まず $R^{(\epsilon_\nu)}_\nu$ は $\check{Q}_{\epsilon'}$ のどの因子 $R^{(\epsilon'_\mu)}_\mu$（$\mu\in\check{\mathcal{M}}$）とも可換である。$\mu\neq\nu$ なら Step 0 の可換性（$e'\to\epsilon_\nu,\ e\to\epsilon'_\mu$）による。$\mu=\nu$ なら

$$
\begin{aligned}
R^{(\epsilon_\nu)}_\nu R^{(\epsilon'_\nu)}_\nu &= 0 \quad (\because (\epsilon_\nu,\epsilon'_\nu)=(1,0) \text{ なら Step 0 の } R^{(1)}_\mu R^{(0)}_\mu = 0,\ (0,1) \text{ なら } R^{(0)}_\mu R^{(1)}_\mu = 0\ (\mu\to\nu)) \\
&= R^{(\epsilon'_\nu)}_\nu R^{(\epsilon_\nu)}_\nu \quad (\because (\epsilon_\nu,\epsilon'_\nu)=(1,0) \text{ なら Step 0 の } R^{(0)}_\mu R^{(1)}_\mu = 0,\ (0,1) \text{ なら } R^{(1)}_\mu R^{(0)}_\mu = 0\ (\mu\to\nu) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon\check{Q}_{\epsilon'} &= \left(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right)\check{Q}_{\epsilon'} \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \left(\left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right) R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\right)\check{Q}_{\epsilon'} \quad \left(\because \text{主張 2.64 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r\to M_{\mathrm{col}},\ A_j\to R^{(\epsilon_j)}_j) \text{。前提 } R^{(\epsilon_\nu)}_\nu R^{(\epsilon_j)}_j = R^{(\epsilon_j)}_j R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\ (\nu<j) \text{ は Step 0 の可換性 } (\mu\to j,\ e'\to\epsilon_\nu,\ e\to\epsilon_j)\right) \\
&= \left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right)\left(R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\check{Q}_{\epsilon'}\right) \quad \left(\because \text{主張 2.15 } \left(m,n,p,q\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\textstyle\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu,\ B\to R^{(\epsilon_\nu)}_\nu,\ C\to\check{Q}_{\epsilon'}\right)\right) \\
&= \left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right)\left(R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon'_\mu)}_\mu\right) \quad (\because \check{Q}_{\epsilon'} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right)\left(\left(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon'_\mu)}_\mu\right) R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\right) \quad \left(\because \text{主張 2.61 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r\to M_{\mathrm{col}},\ X\to R^{(\epsilon_\nu)}_\nu,\ A_j\to R^{(\epsilon'_j)}_j) \text{。前提は直前の可換性}\right) \\
&= \left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right)\left(\left(\left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon'_\mu)}_\mu\right) R^{(\epsilon'_\nu)}_\nu\right) R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\right) \quad \left(\because \text{主張 2.64 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r\to M_{\mathrm{col}},\ A_j\to R^{(\epsilon'_j)}_j) \text{。前提は Step 0 の可換性 } (\mu\to j,\ e'\to\epsilon'_\nu,\ e\to\epsilon'_j)\right) \\
&= \left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right)\left(\left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon'_\mu)}_\mu\right)\left(R^{(\epsilon'_\nu)}_\nu R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\right)\right) \quad \left(\because \text{主張 2.15 } \left(m,n,p,q\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\textstyle\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon'_\mu)}_\mu,\ B\to R^{(\epsilon'_\nu)}_\nu,\ C\to R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\right)\right) \\
&= \left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right)\left(\left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon'_\mu)}_\mu\right)\cdot 0\right) \quad (\because (\epsilon'_\nu,\epsilon_\nu)=(0,1) \text{ なら Step 0 の } R^{(0)}_\mu R^{(1)}_\mu = 0,\ (1,0) \text{ なら } R^{(1)}_\mu R^{(0)}_\mu = 0\ (\mu\to\nu)) \\
&= \left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right)\cdot 0 \quad \left(\because \text{主張 2.47 } \left(m,n,p\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\textstyle\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon'_\mu)}_\mu\right)\right) \\
&= 0 \quad \left(\because \text{主張 2.47 } \left(m,n,p\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\textstyle\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right)\right)
\end{aligned}
$$

$\epsilon=\epsilon'$ のときは各因子が Step 0 より冪等なので、

$$
\begin{aligned}
\check{Q}^2_\epsilon &= \check{Q}^1_\epsilon\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A\ (m\to 1,\ A\to\check{Q}_\epsilon)) \\
&= (\check{Q}^0_\epsilon\check{Q}_\epsilon)\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A\ (m\to 0,\ A\to\check{Q}_\epsilon)) \\
&= (I\,\check{Q}_\epsilon)\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I\ (A\to\check{Q}_\epsilon)) \\
&= \check{Q}_\epsilon\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 2.16 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\check{Q}_\epsilon)) \\
&= \left(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right)\left(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right) \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義（冒頭）を 2 か所}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\left(R^{(\epsilon_\mu)}_\mu R^{(\epsilon_\mu)}_\mu\right) \quad \left(\because \text{主張 2.62 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r\to M_{\mathrm{col}},\ A_j\to R^{(\epsilon_j)}_j,\ B_j\to R^{(\epsilon_j)}_j) \text{。前提 } R^{(\epsilon_i)}_i R^{(\epsilon_j)}_j = R^{(\epsilon_j)}_j R^{(\epsilon_i)}_i\ (j<i) \text{ は Step 0 の可換性 } (\nu\to i,\ \mu\to j,\ e'\to\epsilon_i,\ e\to\epsilon_j)\right) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R^{(\epsilon_\mu)}_\mu \quad (\because \text{Step 0 の二つの冪等性を各因子へ同時に適用}) \\
&= \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}
$$

Step 2（(2) の証明）。主張の左辺から始める：

$$\begin{aligned}
\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{Q}_\epsilon &= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.60 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ A_j^{(e)} \to R_j^{(e)}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} I \quad (\because \text{Step 0 の和が単位行列であることを各因子へ同時に適用}) \\
&= I \quad \left(\because \text{ 主張 2.49 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}})\right)
\end{aligned}$$

Step 3（(3) の証明）。$\nu \in \check{\mathcal{M}}$ を固定する。まず $\check{n}_\nu$ は $\check{Q}_\epsilon$ のどの因子 $R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$）とも可換である。$\mu \neq \nu$ なら

$$\begin{aligned}
\check{n}_\nu R_\mu^{(\epsilon_\mu)} &= R_\nu^{(1)} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\nu^{(1)} \quad (\because \text{Step 0 の可換性 } (e' \to 1,\ e \to \epsilon_\mu)) \\
&= R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \check{n}_\nu \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}$$

$\mu = \nu$ で $\epsilon_\nu = 1$ なら

$$\begin{aligned}
\check{n}_\nu R_\nu^{(1)} &= \check{n}_\nu \check{n}_\nu \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= R_\nu^{(1)} \check{n}_\nu \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}$$

$\mu = \nu$ で $\epsilon_\nu = 0$ なら

$$\begin{aligned}
\check{n}_\nu R_\nu^{(0)} &= R_\nu^{(1)} R_\nu^{(0)} \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= 0 \quad (\because \text{Step 0 の } R_\mu^{(1)} R_\mu^{(0)} = 0 \ (\mu \to \nu)) \\
&= R_\nu^{(0)} R_\nu^{(1)} \quad (\because \text{Step 0 の } R_\mu^{(0)} R_\mu^{(1)} = 0 \ (\mu \to \nu) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= R_\nu^{(0)} \check{n}_\nu \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}$$

次に $\check{n}_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)}$ を求める。

$\epsilon_\nu = 1$ の場合は

$$\begin{aligned}
\check{n}_\nu R_\nu^{(1)} &= \check{n}_\nu \check{n}_\nu \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \check{n}_\nu \quad (\because \text{Step 0 冒頭の} \check{n}_\mu \check{n}_\mu = \check{n}_\mu \ (\mu \to \nu)) \\
&= R_\nu^{(1)} \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\, R_\nu^{(1)} \quad \left(\because \text{ 主張 2.42 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to R_\nu^{(1)}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \text{場合の仮定} \epsilon_\nu = 1)
\end{aligned}$$

$\epsilon_\nu = 0$ の場合は

$$
\begin{aligned}
\check{n}_\nu R_\nu^{(0)} &= \check{n}_\nu \left(I - \check{n}_\nu\right) \quad (\because R_\nu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \check{n}_\nu \left(I + (-\check{n}_\nu)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.30 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to I,\ B \to \check{n}_\nu)\right) \\
&= \check{n}_\nu I + \check{n}_\nu \left(-\check{n}_\nu\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.23 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\nu,\ B \to I,\ C \to -\check{n}_\nu)\right) \\
&= \check{n}_\nu + \check{n}_\nu \left(-\check{n}_\nu\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.17 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\nu)\right) \\
&= \check{n}_\nu + \left(-\left(\check{n}_\nu \check{n}_\nu\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.21 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\nu,\ B \to \check{n}_\nu)\right) \\
&= \check{n}_\nu - \check{n}_\nu \check{n}_\nu \quad \left(\because \text{ 主張 2.30 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\nu,\ B \to \check{n}_\nu \check{n}_\nu) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \check{n}_\nu - \check{n}_\nu \quad (\because \text{Step 0 冒頭の} \check{n}_\mu \check{n}_\mu = \check{n}_\mu \ (\mu \to \nu)) \\
&= 0 \quad \left(\because \text{ 主張 1.95 の } \Leftarrow \ (m,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\nu,\ B \to \check{n}_\nu)\right) \\
&= 0_{\mathbb{C}}\, R_\nu^{(0)} \quad \left(\because \text{ 主張 2.13 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to R_\nu^{(0)}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \text{場合の仮定} \epsilon_\nu = 0)
\end{aligned}
$$

したがって、どちらの場合も $\check{n}_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} = \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)}$ である。主張の左辺から始める：

$$
\begin{aligned}
\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon &= \check{n}_\nu \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \left(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}\right) \check{n}_\nu \quad \left(\because \text{ 主張 2.61 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ X \to \check{n}_\nu,\ A_j \to R_j^{(\epsilon_j)}) \text{。前提は最初の三つの場合}\right) \\
&= \left(\left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}\right) R_\nu^{(\epsilon_\nu)}\right) \check{n}_\nu \quad \left(\because \text{ 主張 2.64 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ A_j \to R_j^{(\epsilon_j)}) \text{。前提は Step 0 の可換性 } (\mu \to j,\ e' \to \epsilon_\nu,\ e \to \epsilon_j)\right) \\
&= \left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}\right) \left(R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \check{n}_\nu\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } \left(m,n,p,q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \textstyle\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)},\ B \to R_\nu^{(\epsilon_\nu)},\ C \to \check{n}_\nu\right)\right) \\
&= \left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}\right) \left(\check{n}_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)}\right) \quad (\because \text{最初の三つの場合のうち } \mu = \nu \text{ の二つ（} \epsilon_\nu = 1 \text{ なら一つ目、} \epsilon_\nu = 0 \text{ なら二つ目）を右辺から左辺へ}) \\
&= \left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}\right) \left(\epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)}\right) \quad (\because \text{直前の二つの場合}) \\
&= \epsilon_\nu \left(\left(\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}\right) R_\nu^{(\epsilon_\nu)}\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.19 } \left(m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \epsilon_\nu,\ A \to \textstyle\prod_{\mu=1,\ \mu\neq\nu}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)},\ B \to R_\nu^{(\epsilon_\nu)}\right)\right) \\
&= \epsilon_\nu \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad \left(\because \text{ 主張 2.64 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ A_j \to R_j^{(\epsilon_j)}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義（冒頭）})
\end{aligned}
$$

右から掛けた側は

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon \check{n}_\nu &= \left(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}\right) \check{n}_\nu \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \check{n}_\nu \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad \left(\because \text{ 主張 2.61 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ X \to \check{n}_\nu,\ A_j \to R_j^{(\epsilon_j)}) \text{ を右辺から左辺へ。前提は最初の三つの場合}\right) \\
&= \check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{直前の鎖})
\end{aligned}
$$

Step 4（(4) の証明）。$\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ は、相異なる M_{col} 個の添字 $1, \ldots, M_{\mathrm{col}} \in \check{\mathcal{M}}$ についての $R_\mu^{(e)}$ の積そのものなので、主張 16.8 を $k = M_{\mathrm{col}}$、$(\mu_1, \ldots, \mu_{M_{\mathrm{col}}}) = (1, \ldots, M_{\mathrm{col}})$、$(e_1, \ldots, e_{M_{\mathrm{col}}}) = (\epsilon_1, \ldots, \epsilon_{M_{\mathrm{col}}})$ として適用でき、

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}\left(\check{Q}_\epsilon\right) &= 2^{M_{\mathrm{col}} - M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{主張 16.8（上の適用）}) \\
&= 2^0 \quad (\because M_{\mathrm{col}} - M_{\mathrm{col}} = 0) \\
&= 1 \quad \left(\because \text{ 定義 1.64 の } z^0 := 1_{\mathbb{C}} \ (z \to 2)\right)
\end{aligned}
$$

を得る（$\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ の元をすべて使い切っているので指数が 0 になる）。

$\check{Q}_\epsilon$ は Step 1 より冪等なので、

$$\begin{aligned}\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon &= \operatorname{tr}\left(\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{冪等行列のトレースは像の次元（主張 8.5）。} \check{Q}_\epsilon \text{ は Step 1 より冪等}) \\ &= 1 \quad (\because \text{上で計算した} \operatorname{tr}(\check{Q}_\epsilon))\end{aligned}$$

Step 5（(5) の証明）。本 Step では、数ベクトル $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ を 定義 1.6 のとおり $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 行 1 列の行列として扱う。$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ で添字付けられた数ベクトルの和は 定義 2.50（$m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 1,\ r \to M_{\mathrm{col}}$）により、零ベクトルは零行列 $O_{2^{M_{\mathrm{col}}},1}$（定義 1.93）である。任意の $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について

$$\begin{aligned}x &= Ix \quad \left(\because \text{主張 2.16 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 1,\ A \to x) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\ &= \left(\sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon\right) x \quad (\because \text{Step 2 で示した (2) を右辺から左辺へ}) \\ &= \sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon x \quad \left(\because \text{主張 2.56 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ r \to M_{\mathrm{col}},\ X_\epsilon \to \check{Q}_\epsilon,\ C \to x)\right)\end{aligned}$$

である。各 ϵ について $\check{Q}_\epsilon x \in \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ である（$\operatorname{im} Q := \{Qx \mid x \in \mathbb{C}^n\}$ は 主張 8.5 の定義。$n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ Q \to \check{Q}_\epsilon$）。よって任意の $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ は、各 ϵ について $\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ の元を一つずつ取った和として書ける。

直和であることを見るために、各 ϵ について $y_\epsilon \in \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ を取り、$\sum_\epsilon y_\epsilon = O_{2^{M_{\mathrm{col}}},1}$ とする。主張 8.5 の im の定義により、各 ϵ について $y_\epsilon = \check{Q}_\epsilon x_\epsilon$ を満たす $x_\epsilon \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ を取る。任意の ϵ' を固定する。$\epsilon \neq \epsilon'$ なら

$$\begin{aligned}\check{Q}_{\epsilon'} y_\epsilon &= \check{Q}_{\epsilon'} \left(\check{Q}_\epsilon x_\epsilon\right) \quad (\because x_\epsilon \text{ の取り方}) \\ &= \left(\check{Q}_{\epsilon'} \check{Q}_\epsilon\right) x_\epsilon \quad \left(\because \text{主張 2.15 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ q \to 1,\ A \to \check{Q}_{\epsilon'},\ B \to \check{Q}_\epsilon,\ C \to x_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\ &= O_{2^{M_{\mathrm{col}}}, 2^{M_{\mathrm{col}}}} x_\epsilon \quad (\because \text{Step 1 で示した (1) の } \check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'} = 0 \ (\epsilon \to \epsilon',\ \epsilon' \to \epsilon)) \\ &= O_{2^{M_{\mathrm{col}}},1} \quad \left(\because \text{主張 2.46 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ B \to x_\epsilon)\right)\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}\check{Q}_{\epsilon'} y_{\epsilon'} &= \check{Q}_{\epsilon'} \left(\check{Q}_{\epsilon'} x_{\epsilon'}\right) \quad (\because x_{\epsilon'} \text{ の取り方}) \\ &= \left(\check{Q}_{\epsilon'} \check{Q}_{\epsilon'}\right) x_{\epsilon'} \quad \left(\because \text{主張 2.15 } (m, n, p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ q \to 1,\ A, B \to \check{Q}_{\epsilon'},\ C \to x_{\epsilon'}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\ &= \check{Q}_{\epsilon'} x_{\epsilon'} \quad (\because \text{Step 1 の } \epsilon = \epsilon' \text{ の鎖で示した } \check{Q}_\epsilon \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \ (\epsilon \to \epsilon')) \\ &= y_{\epsilon'} \quad (\because x_{\epsilon'} \text{ の取り方})\end{aligned}$$

である。したがって

$$\begin{aligned}y_{\epsilon'} &= \check{Q}_{\epsilon'} y_{\epsilon'} \quad (\because \check{Q}_{\epsilon'} y_{\epsilon'} \text{ の鎖を右辺から左辺へ}) \\ &= \sum_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'} y_\epsilon \quad \left(\because \text{主張 2.59 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 1,\ r \to M_{\mathrm{col}},\ B_\epsilon \to \check{Q}_{\epsilon'} y_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ。前提 } \check{Q}_{\epsilon'} y_\epsilon = O_{2^{M_{\mathrm{col}}},1} \ (\epsilon \neq \epsilon') \text{ は } \epsilon \neq \epsilon' \text{ の } \check{Q}_{\epsilon'} y_\epsilon \text{ の鎖}\right) \\ &= \check{Q}_{\epsilon'} \left(\sum_\epsilon y_\epsilon\right) \quad \left(\because \text{主張 2.57 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ r \to M_{\mathrm{col}},\ C \to \check{Q}_{\epsilon'},\ X_\epsilon \to y_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\ &= \check{Q}_{\epsilon'} O_{2^{M_{\mathrm{col}}},1} \quad (\because \textstyle\sum_\epsilon y_\epsilon = O_{2^{M_{\mathrm{col}}},1}) \\ &= O_{2^{M_{\mathrm{col}}},1} \quad \left(\because \text{主張 2.47 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ A \to \check{Q}_{\epsilon'})\right)\end{aligned}$$

が各 ϵ' について成り立ち、直和である。

（次元の整合：$\left|\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\right| = 2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の空間がそれぞれ 1 次元で、合計 $2^{M_{\mathrm{col}}}$ となり $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の次元に一致する。） □

主張 16.10 ($\check{V}'$ の固有値)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対して

$$\check{g}(\epsilon) := \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right) \in \mathbb{R}$$

とおく（定義 15.11。和は 定義 1.19 の $\mathbb{R}$ の有限和である)。このとき

$$\check{V}'\,\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon\,\check{V}' = \exp(\check{g}(\epsilon))\,\check{Q}_\epsilon$$

が成り立つ。右辺は、実数 $\exp(\check{g}(\epsilon))$ を 定義 1.13 で $\mathbb{C}$ の元 $(\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}}$ にして掛けた行列である。すなわち $\mathrm{im}\,\check{Q}_\epsilon$ の 0 でない各元は $\check{V}'$ の固有値 $\exp(\check{g}(\epsilon))$ の固有ベクトルであり、主張 16.9 (5) より $\check{V}'$ は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて

$$\left\{ \exp(\check{g}(\epsilon)) \;\middle|\; \epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}} \right\} \qquad (\text{各}\epsilon\text{ が重複度1 を与え、総個数}2^{M_{\mathrm{col}}})$$

で尽くされる。とくに $\check{V}'$ の固有値はすべて正の実数である。

　「固有値がすべて相異なる」ことは主張しない。 主張 15.22 (3) より $\gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ なので、ϵ の成分を $\mu \leftrightarrow M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ で入れ替えても $\check{g}(\epsilon)$ は変わらない。したがって相異なる ϵ が同じ固有値を与えることは実際に起こる。** 単純性を主張するのは最大固有値だけである **（定理 16.19)。

証明. Step 1（$\check{X}\check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$)。$\check{\mathcal{M}} = \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$（定義 14.15）なので、定義 15.30 (2) の $\check{X}$ の和は 定義 2.5 の $\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}$ である。以下の鎖で、和の各項へ同じ主張を同時に適用する行は「各項へ」と書く。

$$\begin{aligned}
\check{X}\check{Q}_\epsilon &= \left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2}I\right)\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{定義 15.30 (2)}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2}I\right)\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad \left(\because \text{主張 2.36 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ (X_1,\dots,X_r) \to (\gamma(\tilde{\theta}_1)(\check{n}_1 - \tfrac{1}{2}I),\dots,\gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}})(\check{n}_{M_{\mathrm{col}}} - \tfrac{1}{2}I)),\ C \to \check{Q}_\epsilon)\right) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2}I\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad \left(\because \text{主張 2.18 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \gamma(\tilde{\theta}_\mu),\ A \to \check{n}_\mu - \tfrac{1}{2}I,\ B \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}\right) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\left(\check{n}_\mu + \left(-\left(\tfrac{1}{2}I\right)\right)\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 2.30 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to \tfrac{1}{2}I) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu\check{Q}_\epsilon + \left(-\left(\tfrac{1}{2}I\right)\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 2.24 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to -\left(\tfrac{1}{2}I\right),\ C \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu\check{Q}_\epsilon + \left(-\left(\left(\tfrac{1}{2}I\right)\check{Q}_\epsilon\right)\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.20 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \tfrac{1}{2}I,\ B \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu\check{Q}_\epsilon - \left(\tfrac{1}{2}I\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 2.30 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu\check{Q}_\epsilon,\ B \to \left(\tfrac{1}{2}I\right)\check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ、各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu\check{Q}_\epsilon - \tfrac{1}{2}\left(I\check{Q}_\epsilon\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.18 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \tfrac{1}{2},\ A \to I,\ B \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu\check{Q}_\epsilon - \tfrac{1}{2}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 2.16 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu\check{Q}_\epsilon - \tfrac{1}{2}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 16.9 (3) の } \check{n}_\nu\check{Q}_\epsilon = \epsilon_\nu\check{Q}_\epsilon\ (\nu \to \mu) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 2.38 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \epsilon_\mu,\ b \to \tfrac{1}{2},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right)\check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{主張 2.41 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \gamma(\tilde{\theta}_\mu),\ b \to \epsilon_\mu - \tfrac{1}{2},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}\right) \\
&= \left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right)\check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{主張 2.35 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ (c_1,\dots,c_r) \to (\gamma(\tilde{\theta}_1)(\epsilon_1 - \tfrac{1}{2}),\dots,\gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}})(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}} - \tfrac{1}{2})),\ A \to \check{Q}_\epsilon)\right) \\
&= \check{g}(\epsilon)\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{g}\text{ の定義})
\end{aligned}$$

右から掛ける形 $\check{Q}_\epsilon\check{X} = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ も、主張 16.9 (3) の $\check{Q}_\epsilon\check{n}_\nu = \epsilon_\nu\check{Q}_\epsilon$ を使って同じ形の鎖で示す。

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon \check{X} &= \check{Q}_\epsilon \left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2} I \right) \right) \quad (\because \text{ 定義 15.30 (2)}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\check{Q}_\epsilon \left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2} I \right) \right) \right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.37 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ C \to \check{Q}_\epsilon,\ (X_1,\ldots,X_r) \to (\gamma(\tilde{\theta}_1)(\check{n}_1 - \tfrac{1}{2}I),\ldots,\gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}})(\check{n}_{M_{\mathrm{col}}} - \tfrac{1}{2}I))) \right) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{Q}_\epsilon \left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2} I \right) \right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.19 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \gamma(\tilde{\theta}_\mu),\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to \check{n}_\mu - \tfrac{1}{2} I) \text{ を各項へ} \right) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{Q}_\epsilon \left(\check{n}_\mu + \left(- \left(\tfrac{1}{2} I \right) \right) \right) \right) \quad (\because \text{ 主張 2.30 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{n}_\mu,\ B \to \tfrac{1}{2} I) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{Q}_\epsilon \check{n}_\mu + \check{Q}_\epsilon \left(- \left(\tfrac{1}{2} I \right) \right) \right) \quad (\because \text{ 主張 2.23 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to \check{n}_\mu,\ C \to - \left(\tfrac{1}{2} I \right)) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{Q}_\epsilon \check{n}_\mu + \left(- \left(\check{Q}_\epsilon \left(\tfrac{1}{2} I \right) \right) \right) \right) \quad (\because \text{ 主張 2.21 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to \tfrac{1}{2} I) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{Q}_\epsilon \check{n}_\mu - \check{Q}_\epsilon \left(\tfrac{1}{2} I \right) \right) \quad (\because \text{ 主張 2.30 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon \check{n}_\mu,\ B \to \check{Q}_\epsilon \left(\tfrac{1}{2} I \right)) \text{ を右辺から左辺へ、各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{Q}_\epsilon \check{n}_\mu - \tfrac{1}{2} \left(\check{Q}_\epsilon I \right) \right) \quad (\because \text{ 主張 2.19 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \tfrac{1}{2},\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to I) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{Q}_\epsilon \check{n}_\mu - \tfrac{1}{2} \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{ 主張 2.17 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon - \tfrac{1}{2} \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{ 主張 16.9 (3) の } \check{Q}_\epsilon \check{n}_\nu = \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \ (\nu \to \mu) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2} \right) \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{ 主張 2.38 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \epsilon_\mu,\ b \to \tfrac{1}{2},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2} \right) \right) \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.41 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \gamma(\tilde{\theta}_\mu),\ b \to \epsilon_\mu - \tfrac{1}{2},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ} \right) \\
&= \left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2} \right) \right) \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.35 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ (c_1,\ldots,c_r) \to (\gamma(\tilde{\theta}_1)(\epsilon_1 - \tfrac{1}{2}),\ldots,\gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}})(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}} - \tfrac{1}{2})),\ A \to \check{Q}_\epsilon) \right) \\
&= \check{g}(\epsilon) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{g} \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

とくに $\check{X}\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \check{X}$（両者が同じ $\check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ に等しい）である。

Step 2（$\check{X}^k \check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon$）。行列の冪は 定義 3.4 (1) の $A^0 := I$、$A^{m+1} := A^m A$ による。数の冪は本証明で $\check{g}(\epsilon)^0 := 1$、$\check{g}(\epsilon)^{k+1} := \check{g}(\epsilon)^k \check{g}(\epsilon)$（$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）と定める。$k$ に関する帰納法。$k = 0$ では

$$
\begin{aligned}
\check{X}^0 \check{Q}_\epsilon &= I \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^0 := I \ (A \to \check{X}) \right) \\
&= \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.16 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \right) \\
&= 1 \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.42 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ} \right) \\
&= \check{g}(\epsilon)^0 \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{g}(\epsilon)^0 := 1)
\end{aligned}
$$

$\check{X}^k \check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon$ を仮定すると

$$
\begin{aligned}
\check{X}^{k+1} \check{Q}_\epsilon &= \left(\check{X}^k \check{X} \right) \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A \ (m \to k,\ A \to \check{X}) \right) \\
&= \check{X}^k \left(\check{X} \check{Q}_\epsilon \right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p,q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{X}^k,\ B \to \check{X},\ C \to \check{Q}_\epsilon) \right) \\
&= \check{X}^k \left(\check{g}(\epsilon) \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \check{g}(\epsilon) \left(\check{X}^k \check{Q}_\epsilon \right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.19 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \check{g}(\epsilon),\ A \to \check{X}^k,\ B \to \check{Q}_\epsilon) \right) \\
&= \check{g}(\epsilon) \left(\check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \left(\check{g}(\epsilon) \check{g}(\epsilon)^k \right) \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.41 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \check{g}(\epsilon),\ b \to \check{g}(\epsilon)^k,\ A \to \check{Q}_\epsilon) \right) \\
&= \left(\check{g}(\epsilon)^k \check{g}(\epsilon) \right) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の交換律主張 1.56}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^{k+1} \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{g}(\epsilon)^{k+1} := \check{g}(\epsilon)^k \check{g}(\epsilon))
\end{aligned}
$$

Step 3（指数関数へ）。定義 3.4 より $\check{V}' = \exp(\check{X}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\check{X}^k$ であり、この級数は 定理 3.3 により 定義 2.91 のノルムについて収束する。部分和を $E_K := \sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!}\check{X}^k$ と書く（$K \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。和は 定義 2.6 による）。以下の鎖で、和の各項へ同じ主張を同時に適用する行は「各項へ」と書く。

$$
\begin{aligned}
E_K\check{Q}_\epsilon &= \left(\sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!}\check{X}^k\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because E_K \text{ の定義}) \\
&= \left(\sum_{j=1}^{K+1} \frac{1}{(j-1)!}\check{X}^{j-1}\right)\check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 定義 2.6 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X_k \to \tfrac{1}{k!}\check{X}^k)\right) \\
&= \sum_{j=1}^{K+1} \left(\left(\frac{1}{(j-1)!}\check{X}^{j-1}\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.36 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to K+1,\ (X_1,\dots,X_r) \to (\tfrac{1}{0!}\check{X}^0,\dots,\tfrac{1}{K!}\check{X}^K),\ C \to \check{Q}_\epsilon)\right) \\
&= \sum_{j=1}^{K+1} \frac{1}{(j-1)!}\left(\check{X}^{j-1}\check{Q}_\epsilon\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.18 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \tfrac{1}{(j-1)!},\ A \to \check{X}^{j-1},\ B \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}\right) \\
&= \sum_{j=1}^{K+1} \frac{1}{(j-1)!}\left(\check{g}(\epsilon)^{j-1}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{Step 2 } (k \to j-1) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{j=1}^{K+1} \left(\frac{1}{(j-1)!}\check{g}(\epsilon)^{j-1}\right)\check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.41 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \tfrac{1}{(j-1)!},\ b \to \check{g}(\epsilon)^{j-1},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ}\right) \\
&= \left(\sum_{j=1}^{K+1} \frac{1}{(j-1)!}\check{g}(\epsilon)^{j-1}\right)\check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.35 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to K+1,\ (c_1,\dots,c_r) \to (\tfrac{1}{0!}\check{g}(\epsilon)^0,\dots,\tfrac{1}{K!}\check{g}(\epsilon)^K),\ A \to \check{Q}_\epsilon)\right) \\
&= \left(\sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!}\check{g}(\epsilon)^k\right)\check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 定義 1.17 } (z_k \to \tfrac{1}{k!}\check{g}(\epsilon)^k) \text{ を右辺から左辺へ}\right)
\end{aligned}
$$

$K \to \infty$ の極限を取る。極限は 定義 2.91 の意味であり、行列の列の lim は 主張 2.92 (4) により一意に定まる極限を表す。

$$
\begin{aligned}
\check{V}'\check{Q}_\epsilon &= \left(\lim_{K\to\infty} E_K\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{V}' = \exp(\check{X}) \text{ は部分和} E_K \text{ の極限。定義 3.4 と主張 3.2 (1) } (N \to K,\ A \to \check{X})) \\
&= \lim_{K\to\infty}\left(E_K\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{ 主張 2.96 (係数の集合} K \to \mathbb{C},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ (A_N)_N \to (E_N)_N,\ A \to \check{V}',\ B \to \check{Q}_\epsilon)) \\
&= \lim_{K\to\infty}\left(\left(\sum_{k=0}^{K}\frac{1}{k!}\check{g}(\epsilon)^k\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{上の部分和の鎖を各} K \text{ へ}) \\
&= \lim_{K\to\infty}\left(\left(\sum_{k=0}^{K}\frac{1}{k!}(\check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}})^k\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{ 鎖の係数} \check{g}(\epsilon) \in \mathbb{R} \text{ は定義 1.13 の} \check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}} \text{ として掛けている}) \\
&= \lim_{K\to\infty}\left(\left(\sum_{k=0}^{K}\frac{(\check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}})^k}{k!}\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \tfrac{1}{k!}z = z\cdot\tfrac{1}{k!} =: \tfrac{z}{k!}\ (z \in \mathbb{C}_\circ \text{ 乗法の可換則と、主張 3.12 の部分和の項の書き方}) \text{ を各項へ}) \\
&= \exp(\check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}})\check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 3.12 (係数の集合} K \to \mathbb{C},\ x \to \check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}}) \text{ の極限} c_N \to c \text{ を仮定に置いた 主張 2.98 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ c_N \to \textstyle\sum_{k=0}^{N}\frac{(\check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}})^k}{k!},\ c \to \exp(\check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}}),\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ と、主張 2.92 (4)}\right) \\
&= (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{ 主張 3.18 } (x \to \check{g}(\epsilon)))
\end{aligned}
$$

Step 3'（右から掛ける形）。Step 1 の $\check{Q}_\epsilon\check{X} = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ から、k に関する帰納法を行う（冪は Step 2 と同じ）。$k = 0$ では

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon\check{X}^0 &= \check{Q}_\epsilon I \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^0 := I\ (A \to \check{X})\right) \\
&= \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.17 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon)\right) \\
&= 1\,\check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.42 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \check{g}(\epsilon)^0\check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{g}(\epsilon)^0 := 1)
\end{aligned}
$$

$\check{Q}_\epsilon\check{X}^k = \check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon$ を仮定すると

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon \check{X}^{k+1} &= \check{Q}_\epsilon \left(\check{X}^k \check{X} \right) \quad (\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A \ (m \to k,\ A \to \check{X})) \\
&= \left(\check{Q}_\epsilon \check{X}^k \right) \check{X} \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p,q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to \check{X}^k,\ C \to \check{X}) \text{ を右辺から左辺へ} \right) \\
&= \left(\check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon \right) \check{X} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^k \left(\check{Q}_\epsilon \check{X} \right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.18 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \check{g}(\epsilon)^k,\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to \check{X}) \right) \\
&= \check{g}(\epsilon)^k \left(\check{g}(\epsilon) \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{Step 1 の右から掛ける形}) \\
&= \left(\check{g}(\epsilon)^k \check{g}(\epsilon) \right) \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.41 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \check{g}(\epsilon)^k,\ b \to \check{g}(\epsilon),\ A \to \check{Q}_\epsilon) \right) \\
&= \check{g}(\epsilon)^{k+1} \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{g}(\epsilon)^{k+1} := \check{g}(\epsilon)^k \check{g}(\epsilon))
\end{aligned}
$$

したがって全ての $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ でこの等式が成り立つ。Step 3 と同じ部分和 E_K について（「各項へ」は Step 3 と同じ意味）

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon E_K &= \check{Q}_\epsilon \left(\sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} \check{X}^k \right) \quad (\because E_K \text{ の定義}) \\
&= \check{Q}_\epsilon \left(\sum_{j=1}^{K+1} \frac{1}{(j-1)!} \check{X}^{j-1} \right) \quad \left(\because \text{ 定義 2.6 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ X_k \to \tfrac{1}{k!} \check{X}^k) \right) \\
&= \sum_{j=1}^{K+1} \left(\check{Q}_\epsilon \left(\frac{1}{(j-1)!} \check{X}^{j-1} \right) \right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.37 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to K+1,\ C \to \check{Q}_\epsilon,\ (X_1,\dots,X_r) \to (\tfrac{1}{0!}\check{X}^0,\dots,\tfrac{1}{K!}\check{X}^K)) \right) \\
&= \sum_{j=1}^{K+1} \frac{1}{(j-1)!} \left(\check{Q}_\epsilon \check{X}^{j-1} \right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.19 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \tfrac{1}{(j-1)!},\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to \check{X}^{j-1}) \text{ を各項へ} \right) \\
&= \sum_{j=1}^{K+1} \frac{1}{(j-1)!} \left(\check{g}(\epsilon)^{j-1} \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{上の帰納法 } (k \to j-1) \text{ を各項へ}) \\
&= \sum_{j=1}^{K+1} \left(\frac{1}{(j-1)!} \check{g}(\epsilon)^{j-1} \right) \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.41 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to \tfrac{1}{(j-1)!},\ b \to \check{g}(\epsilon)^{j-1},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ} \right) \\
&= \left(\sum_{j=1}^{K+1} \frac{1}{(j-1)!} \check{g}(\epsilon)^{j-1} \right) \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 2.35 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to K+1,\ (c_1,\dots,c_r) \to (\tfrac{1}{0!}\check{g}(\epsilon)^0,\dots,\tfrac{1}{K!}\check{g}(\epsilon)^K),\ A \to \check{Q}_\epsilon) \right) \\
&= \left(\sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} \check{g}(\epsilon)^k \right) \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 定義 1.17 } (z_k \to \tfrac{1}{k!}\check{g}(\epsilon)^k) \text{ を右辺から左辺へ} \right)
\end{aligned}
$$

$K \to \infty$ の極限を取る（lim の扱いは Step 3 の極限の鎖と同じ）。

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon \check{V}' &= \check{Q}_\epsilon \left(\lim_{K\to\infty} E_K \right) \quad (\because \check{V}' = \exp(\check{X}) \text{ は部分和} E_K \text{ の極限。Step 3 の級数表示}) \\
&= \lim_{K\to\infty} \left(\check{Q}_\epsilon E_K \right) \quad (\because \text{ 主張 2.97 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ (A_N)_N \to (E_N)_N,\ A \to \check{V}',\ B \to \check{Q}_\epsilon)) \\
&= \lim_{K\to\infty} \left(\left(\sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} \check{g}(\epsilon)^k \right) \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{上の部分和の鎖を各} K \text{ へ}) \\
&= \lim_{K\to\infty} \left(\left(\sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} (\check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}})^k \right) \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{ 鎖の係数} \check{g}(\epsilon) \in \mathbb{R} \text{ は定義 1.13 の} \check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}} \text{ として掛けている}) \\
&= \lim_{K\to\infty} \left(\left(\sum_{k=0}^{K} \frac{(\check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}})^k}{k!} \right) \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \tfrac{1}{k!} z = z \cdot \tfrac{1}{k!} =: \tfrac{z}{k!} \ (z \in \mathbb{C}_\circ \text{ 乗法の可換則と、主張 3.12 の部分和の項の書き方}) \text{ を各項へ}) \\
&= \exp(\check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}}) \check{Q}_\epsilon \quad \left(\because \text{ 主張 3.12 (係数の集合} K \to \mathbb{C},\ x \to \check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}}) \text{ の極限} c_N \to c \text{ を仮定に置いた 主張 2.98 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ c_N \to \textstyle\sum_{k=0}^{N} \frac{(\check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}})^k}{k!},\ c \to \exp(\check{g}(\epsilon)_{\mathbb{C}}),\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ と、主張 2.92 (4)} \right) \\
&= (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{ 主張 3.18 } (x \to \check{g}(\epsilon))) \\
&= \check{V}' \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{Step 3 の極限の鎖})
\end{aligned}
$$

を得る。** この左からの形（$\check{Q}_\epsilon$ を固有方程式の両辺に左から掛ける使い方）が 定理 16.19 (3) で必要になる。**

Step 4（固有値の言い換え）。$y \in \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ なら $y = \check{Q}_\epsilon x$ と書けて

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon y &= \check{Q}_\epsilon \left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad (\because y = \check{Q}_\epsilon x \text{ と書いた}) \\
&= \left(\check{Q}_\epsilon \check{Q}_\epsilon\right) x \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ q \to 1,\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to \check{Q}_\epsilon,\ C \to x) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\left(I\check{Q}_\epsilon\right)\check{Q}_\epsilon\right) x \quad \left(\because \text{ 主張 2.16 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\left(\check{Q}_\epsilon^0 \check{Q}_\epsilon\right)\check{Q}_\epsilon\right) x \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^0 := I\ (A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\check{Q}_\epsilon^1 \check{Q}_\epsilon\right) x \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A\ (m \to 0,\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \check{Q}_\epsilon^2 x \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A\ (m \to 1,\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \check{Q}_\epsilon x \quad \left(\because \text{ 主張 16.9 (1) の } \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon\right) \\
&= y \quad (\because y = \check{Q}_\epsilon x \text{ と書いた})
\end{aligned}
$$

である（冪等性は 主張 16.9 (1)）。だから

$$
\begin{aligned}
\check{V}' y &= \check{V}' \left(\check{Q}_\epsilon y\right) \quad (\because \text{上の等式} \check{Q}_\epsilon y = y \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \left(\check{V}' \check{Q}_\epsilon\right) y \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ q \to 1,\ A \to \check{V}',\ B \to \check{Q}_\epsilon,\ C \to y) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\left(\exp(\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon\right) y \quad (\because \text{Step 3 の極限の鎖}) \\
&= \left(\exp(\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \left(\check{Q}_\epsilon y\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.18 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ a \to (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}},\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to y)\right) \\
&= \left(\exp(\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} y \quad (\because \text{上の等式} \check{Q}_\epsilon y = y)
\end{aligned}
$$

主張 16.9 (5) より $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ は $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ たちの直和だから、各 $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ の基底（主張 16.9 (4) より 1 次元なので 1 本。0 でないので上の等式から固有ベクトルである）を合わせると $\check{V}'$ の固有ベクトルからなる $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の基底が得られる。したがって $\check{V}'$ は対角化可能で、固有値は $\exp(\check{g}(\epsilon))$ が各 ϵ について 1 つずつ現れるもので尽くされる（総個数 $2^{M_{\mathrm{col}}}$）。

$\check{g}(\epsilon) \in \mathbb{R}$（主張の $\check{g}$ の定義）なので、

$$
\exp(\check{g}(\epsilon)) > 0 \quad \left(\because \text{ 主張 3.16 } (x \to \check{g}(\epsilon))\right)
$$

である。 □

主張 16.11 ($\left(\check{V}'\right)^{-1}$ と$\check{Q}_\epsilon$ の積)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ とし、$\check{g}(\epsilon) \in \mathbb{R}$ を 主張 16.10 のもの、$\check{Q}_\epsilon$ を 主張 16.9 のもの、$\left(\check{V}'\right)^{-1}$ を 定義 15.25 (2) の $\check{V}' \in R^\times$ の逆元（定義 7.2、$M \to M_{\mathrm{col}}$）とする。このとき

$$
\left(\check{V}'\right)^{-1} \check{Q}_\epsilon = \left(\exp(-\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon
$$

が成り立つ。exp は 定義 3.11 の $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$（級数の極限なので、ここで $\mathbb{R}$ へ脱出する）、$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記、スカラー倍は 定義 2.3 である。

証明. $I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$（定義 2.2）と書く。$1_{\mathbb{C}} = (1)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記である。

$$
\begin{aligned}
\left(\check{V}'\right)^{-1} \check{Q}_\epsilon &= \left(\check{V}'\right)^{-1} \left(1_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon\right) && \left(\because \text{ 主張 2.42 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\check{V}'\right)^{-1} \left(\left(\exp(0)\right)_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon\right) && \left(\because \text{ 主張 3.14 } (K \to \mathbb{R}) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\check{V}'\right)^{-1} \left(\left(\exp(-\check{g}(\epsilon) + \check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon\right) && \left(\because \mathbb{R} \text{ で } -a+a=0\ (a \to \check{g}(\epsilon)) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\check{V}'\right)^{-1} \left(\left(\exp(-\check{g}(\epsilon)) \exp(\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon\right) && \left(\because \text{ 主張 3.13 } (K \to \mathbb{R},\ x \to -\check{g}(\epsilon),\ y \to \check{g}(\epsilon)) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\check{V}'\right)^{-1} \left(\left(\left(\exp(-\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \left(\exp(\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}}\right) \check{Q}_\epsilon\right) && \left(\because \text{ 主張 1.29 } (a \to \exp(-\check{g}(\epsilon)),\ b \to \exp(\check{g}(\epsilon))) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\check{V}'\right)^{-1} \left(\left(\exp(-\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \left(\left(\exp(\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon\right)\right) && \left(\because \text{ 主張 2.41 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to (\exp(-\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}},\ b \to (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\exp(-\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \left(\left(\check{V}'\right)^{-1} \left(\left(\exp(\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon\right)\right) && \left(\because \text{ 主張 2.19 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a \to (\exp(-\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}},\ A \to (\check{V}')^{-1},\ B \to (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon)\right) \\
&= \left(\exp(-\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \left(\left(\check{V}'\right)^{-1} \left(\check{V}' \check{Q}_\epsilon\right)\right) && \left(\because \text{ 主張 16.10 の } \check{V}'\check{Q}_\epsilon = (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\exp(-\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \left(\left(\left(\check{V}'\right)^{-1} \check{V}'\right) \check{Q}_\epsilon\right) && \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p,q \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to (\check{V}')^{-1},\ B \to \check{V}',\ C \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\exp(-\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \left(I \check{Q}_\epsilon\right) && \left(\because \text{ 定義 7.2 } (M \to M_{\mathrm{col}},\ g \to \check{V}') \text{ の } g^{-1}g = I\right) \\
&= \left(\exp(-\check{g}(\epsilon))\right)_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon && \left(\because \text{ 主張 2.16 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon)\right)
\end{aligned}
$$

□

主張 16.12 $\left(\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big) = \mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big) = \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\Big)_{\mathbb{C}},\quad \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big) > 0\right)$**.** $\check{V}'$ は可逆で $\big(\check{V}'\big)^{-1} = \exp(-\check{X})$ であり（定義 15.25 (2)）、

$$\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big) = \mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big) = \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\Big)_{\mathbb{C}}, \qquad \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big) \in \mathbb{R}_{>0}$$

が成り立つ。積は 定義 1.61（$m \to M_{\mathrm{col}}$）の実数の有限積、$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の包含である。

証明. Step 1（トレースの計算）。$\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ の上の行列の和は 定義 2.50（$m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}}$）、複素数の和は 定義 2.51（$r \to M_{\mathrm{col}}$）による（定義 14.15 により $\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}} = \{0,1\}^{M_{\mathrm{col}}}$）。

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big) &= \mathrm{tr}\big(\check{V}'\, I\big) && \big(\because \text{ 主張 2.17 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{V}') \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \mathrm{tr}\Bigg(\check{V}' \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{Q}_\epsilon\Bigg) && \big(\because \text{ 主張 16.9 (2) を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \mathrm{tr}\Bigg(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{V}'\check{Q}_\epsilon\Bigg) && \big(\because \text{ 主張 2.57 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ C \to \check{V}',\ X_\epsilon \to \check{Q}_\epsilon)\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \mathrm{tr}\big(\check{V}'\check{Q}_\epsilon\big) && \big(\because \text{ 主張 8.3 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ B_\epsilon \to \check{V}'\check{Q}_\epsilon)\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \mathrm{tr}\big(\big(\exp(\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon\big) && \big(\because \text{ 主張 16.10 を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \big(\exp(\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}}\,\mathrm{tr}\big(\check{Q}_\epsilon\big) && \big(\because \text{ 主張 8.4 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ \alpha \to (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \big(\exp(\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}}\,1_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 16.9 (4) の } \mathrm{tr}(\check{Q}_\epsilon) = 1 \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \big(\exp(\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56 を各項へ同時に}\big)
\end{aligned}$$

Step 2（積への分解）。$\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ の上の実数の和は 定義 2.52（$r \to M_{\mathrm{col}}$）による（定義 14.15 により $\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}} = \{0,1\}^{M_{\mathrm{col}}}$）。Step 1 の右辺の複素数の和を、実数の和の包含へ移す。

$$\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \big(\exp(\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}} = \Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \exp(\check{g}(\epsilon))\Big)_{\mathbb{C}} \qquad \big(\because \text{ 主張 2.53 } (r \to M_{\mathrm{col}},\ x_\epsilon \to \exp(\check{g}(\epsilon)))\big)$$

$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ について、$\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ の上の実数の有限積は 定義 1.61（$m \to M_{\mathrm{col}}$）による。

$$\begin{aligned}
\exp(\check{g}(\epsilon)) &= \exp\Bigg(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\big)\Bigg) && \big(\because \text{ 主張 16.10 の } \check{g} \text{ の定義}\big)\\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\big)\Big) && \big(\because \text{ 主張 3.15 } (m \to M_{\mathrm{col}},\ j \to \mu,\ x_j \to \gamma(\tilde{\theta}_\mu)(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}))\big)
\end{aligned}$$

この積表示を和の各項へ入れ、実数の二項の和の有限積の展開を右辺から左辺へ使う。

$$
\begin{aligned}
\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \exp(\check{g}(\epsilon)) &= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2})\Big) && (\because \text{ 直前の鎖を各項へ同時に}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(1-\tfrac{1}{2})\Big) + \exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(0-\tfrac{1}{2})\Big)\Big) && (\because \text{ 主張 2.55 } (r\to M_{\mathrm{col}},\ j\to\mu,\ a_j^{(\epsilon)}\to\exp(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)(e-\tfrac{1}{2}))) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2}\Big) + \exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(0-\tfrac{1}{2})\Big)\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } 1-\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2} \text{ を各因子へ同時に}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2}\Big) + \exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(-\tfrac{1}{2})\Big)\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } 0-a=-a\ (a\to\tfrac{1}{2}) \text{ を各因子へ同時に}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2}\Big) + \exp\Big(-\big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2}\big)\Big)\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ で } a(-b)=-(ab)\ (a\to\gamma(\tilde{\theta}_\mu),\ b\to\tfrac{1}{2}) \text{ を各因子へ同時に}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\exp\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) + \exp\left(-\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right)\right) && (\because \mathbb{R} \text{ で } a\cdot\tfrac{1}{2}=\tfrac{a}{2}\ (a\to\gamma(\tilde{\theta}_\mu)) \text{ を各因子の 2 箇所へ同時に}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cdot\frac{\exp\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big) + \exp\Big(-\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)}{2} && (\because \mathbb{R} \text{ で } 2\neq 0 \text{ なので } b=2\cdot\tfrac{b}{2}\ (b\to\exp(\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2})+\exp(-\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2})) \text{ を各因子へ同時に}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) && (\because \text{ 定義 3.19 の } \cosh\ (x\to\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}) \text{ を各因子へ同時に、右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

Step 3（$\big(\check{V}'\big)^{-1}$ についても同じ値）。和の定義は Step 1・Step 2 と同じである。$\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ について、$\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ の上の実数の有限和は 定義 1.19、有限積は 定義 1.61（どちらも $m\to M_{\mathrm{col}}$）による。

$$
\begin{aligned}
\exp(-\check{g}(\epsilon)) &= \exp\left(-\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2})\right) && (\because \text{ 主張 16.10 の } \check{g} \text{ の定義}) \\
&= \exp\left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(-\big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2})\big)\Big)\right) && (\because \text{ 主張 1.23 } (m\to M_{\mathrm{col}},\ j\to\mu,\ x_j\to\gamma(\tilde{\theta}_\mu)(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2})) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \exp\left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\,(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2})\right) && (\because \mathbb{R} \text{ で } -(ab)=(-a)b\ (a\to\gamma(\tilde{\theta}_\mu),\ b\to\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}) \text{ を各項へ同時に}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\Big(\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\,(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2})\Big) && (\because \text{ 主張 3.15 } (m\to M_{\mathrm{col}},\ j\to\mu,\ x_j\to(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2})))
\end{aligned}
$$

これを使って、$\big(\check{V}'\big)^{-1}$ のトレースを計算する。

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big) &= \operatorname{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1} I\Big) && \big(\because \text{ 主張 2.17 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to (\check{V}')^{-1}) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \operatorname{tr}\left(\big(\check{V}'\big)^{-1} \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \check{Q}_\epsilon\right) && \big(\because \text{ 主張 16.9 (2) を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \operatorname{tr}\left(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \big(\check{V}'\big)^{-1} \check{Q}_\epsilon\right) && \big(\because \text{ 主張 2.57 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ C \to (\check{V}')^{-1},\ X_\epsilon \to \check{Q}_\epsilon)\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \operatorname{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1} \check{Q}_\epsilon\Big) && \big(\because \text{ 主張 8.3 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ B_\epsilon \to (\check{V}')^{-1}\check{Q}_\epsilon)\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \operatorname{tr}\big(\big(\exp(-\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}}\, \check{Q}_\epsilon\big) && \big(\because \text{ 主張 16.11 を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \big(\exp(-\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}} \operatorname{tr}\big(\check{Q}_\epsilon\big) && \big(\because \text{ 主張 8.4 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ \alpha \to (\exp(-\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \big(\exp(-\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}}\, 1_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 16.9 (4) の } \operatorname{tr}(\check{Q}_\epsilon) = 1 \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \big(\exp(-\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56 を各項へ同時に}\big)\\
&= \Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \exp(-\check{g}(\epsilon))\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 2.53 } (r \to M_{\mathrm{col}},\ x_\epsilon \to \exp(-\check{g}(\epsilon)))\big)\\
&= \Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\Big(\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\,(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2})\Big)\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 冒頭の } \exp(-\check{g}(\epsilon)) \text{ の鎖を各項へ同時に}\big)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\,(1-\tfrac{1}{2})\Big) + \exp\Big(\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\,(0-\tfrac{1}{2})\Big)\Big)\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 2.55 } (r \to M_{\mathrm{col}},\ j \to \mu,\ a_j^{(\epsilon)} \to \exp((-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))(\epsilon - \tfrac{1}{2}))) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\cdot\tfrac{1}{2}\Big) + \exp\Big(\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\,(0-\tfrac{1}{2})\Big)\Big)\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ で } 1 - \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2} \text{ を各因子へ同時に}\big)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\cdot\tfrac{1}{2}\Big) + \exp\Big(\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\,(-\tfrac{1}{2})\Big)\Big)\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ で } 0 - a = -a\ (a \to \tfrac{1}{2}) \text{ を各因子へ同時に}\big)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\cdot\tfrac{1}{2}\Big) + \exp\Big(-\Big(\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\cdot\tfrac{1}{2}\Big)\Big)\Big)\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ で } a(-b) = -(ab)\ (a \to -\gamma(\tilde{\theta}_\mu),\ b \to \tfrac{1}{2}) \text{ を各因子へ同時に}\big)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\frac{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big) + \exp\Big(-\frac{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\Big)\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ で } a\cdot\tfrac{1}{2} = \tfrac{a}{2}\ (a \to -\gamma(\tilde{\theta}_\mu)) \text{ を各因子の 2 箇所へ同時に}\big)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cdot\frac{\exp\Big(\frac{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big) + \exp\Big(-\frac{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)}{2}\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ で } 2 \neq 0 \text{ なので } b = 2\cdot\tfrac{b}{2}\ \big(b \to \exp(\tfrac{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}) + \exp(-\tfrac{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2})\big) \text{ を各因子へ同時に}\big)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\Big(\frac{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 定義 3.19 の } \cosh\ (x \to \tfrac{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}) \text{ を各因子へ同時に、右辺から左辺へ}\big)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\Big(-\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ で } \tfrac{-a}{2} = -\tfrac{a}{2}\ (a \to \gamma(\tilde{\theta}_\mu)) \text{ を各因子へ同時に}\big)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 11.2 } (x \to \tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}) \text{ を各因子へ同時に}\big)\\
&= \Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \exp(\check{g}(\epsilon))\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ Step 2 の } \textstyle\sum_\epsilon \exp(\check{g}(\epsilon)) = \prod_\mu 2\cosh(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}) \text{ の鎖を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \big(\exp(\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{ 主張 2.53 } (r \to M_{\mathrm{col}},\ x_\epsilon \to \exp(\check{g}(\epsilon))) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \operatorname{tr}\big(\check{V}'\big) && \big(\because \text{ Step 1 の } \operatorname{tr}(\check{V}') = \textstyle\sum_\epsilon (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}} \text{ の鎖を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}
$$

Step 4（正値性）。主張 15.18 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、各 μ について次の鎖を得る。

$$
\begin{aligned}
2\cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) &\geq 2\cdot 1 \quad \big(\because \text{ 主張 11.20 } (x \to \tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}) \text{ の両辺に } 2 > 0 \text{ を掛ける}\big)\\
&= 2 \quad (\because\ 2\cdot 1 = 2)\\
&> 0 \quad (\because 2 > 0)
\end{aligned}
$$

$$
\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) > 0 \qquad \big(\because \text{ 主張 1.62 } (m \to M_{\mathrm{col}},\ j \to \mu,\ r_\mu \to 2\cosh(\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2})) \text{ に、上の各 } \mu \text{ の鎖 } r_\mu > 0 \text{ を当てる}\big)
$$

Step 5（$\operatorname{tr}(\check{V}')$ を積の包含で表す）。

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\bigl(\check{V}'\bigr) &= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \bigl(\exp(\check{g}(\epsilon))\bigr)_{\mathbb{C}} && \bigl(\because \text{ Step 1 の } \operatorname{tr}(\check{V}') = \textstyle\sum_\epsilon(\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}} \text{ の鎖}\bigr)\\
&= \Bigl(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \exp(\check{g}(\epsilon))\Bigr)_{\mathbb{C}} && \bigl(\because \text{ 主張 2.53 } (r\to M_{\mathrm{col}},\ x_\epsilon\to\exp(\check{g}(\epsilon)))\bigr)\\
&= \Bigl(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\Bigl(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Bigr)\Bigr)_{\mathbb{C}} && \bigl(\because \text{ Step 2 の } \textstyle\sum_\epsilon\exp(\check{g}(\epsilon)) = \prod_\mu 2\cosh(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}) \text{ の鎖}\bigr)
\end{aligned}
$$

主張の等号の鎖は次のとおりで、$\prod_\mu 2\cosh(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}) \in \mathbb{R}_{>0}$ は Step 4 の最後の不等号である。

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\bigl(\check{V}'\bigr) &= \operatorname{tr}\Bigl(\bigl(\check{V}'\bigr)^{-1}\Bigr) && \bigl(\because \text{ Step 3 の } \operatorname{tr}((\check{V}')^{-1}) = \operatorname{tr}(\check{V}') \text{ の鎖を右辺から左辺へ}\bigr)\\
&= \Bigl(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\Bigl(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Bigr)\Bigr)_{\mathbb{C}} && \bigl(\because \text{ Step 3 の鎖と Step 5 の鎖}\bigr)
\end{aligned}
$$

□

主張 16.13 ($V^{(+)}$ は正定値)**.** 主張 16.2 の $S_1^{(+)} := i(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)}$、$S_2 := i(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2$ について、定義 13.29 の $V^{(+)} = \Bigl(V_1^{(+)}\Bigr)^{1/2} V_2 \Bigl(V_1^{(+)}\Bigr)^{1/2}$ は

$$
V^{(+)} = \bigl((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\bigr)_{\mathbb{C}} \exp\Bigl(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Bigr)\exp(S_2)\exp\Bigl(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Bigr)
$$

と書ける（$s_2 = \sinh 2K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ は 定義 13.15、$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記、$\frac{1}{2}S_1^{(+)}$ は $\bigl(\frac{1}{2}\bigr)_{\mathbb{C}}S_1^{(+)}$ の略記)。このとき $V^{(+)}$ は正定値（定義 8.7 の意味）である。

証明. Step 1（表示)。二つの因子を順に書き直す（定義 13.29、定義 13.28、主張 13.25、定義 13.15、主張 16.2)。

$$
\begin{aligned}
\Bigl(V_1^{(+)}\Bigr)^{1/2} &= \exp\Bigl(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\Bigr) && (\because \text{定義 13.28})\\
&= \exp\Bigl(\bigl(\tfrac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}}\bigr)H_1^{(+)}\Bigr) && (\because \text{定義 13.28 の読み（}\mathbb{C}\text{ の元}\tfrac{i}{2}(K_1)_{\mathbb{C}}\text{ によるスカラー倍）})\\
&= \exp\Bigl(\bigl((i\,2_{\mathbb{C}}^{-1})(K_1)_{\mathbb{C}}\bigr)H_1^{(+)}\Bigr) && (\because \text{定義 13.28 の}\tfrac{i}{2} = i\,2_{\mathbb{C}}^{-1})\\
&= \exp\Bigl(\bigl((i(\tfrac{1}{2})_{\mathbb{C}})(K_1)_{\mathbb{C}}\bigr)H_1^{(+)}\Bigr) && (\because \text{主張 1.57(右辺から左辺へ）})\\
&= \exp\Bigl(\bigl(((\tfrac{1}{2})_{\mathbb{C}}i)(K_1)_{\mathbb{C}}\bigr)H_1^{(+)}\Bigr) && (\because \mathbb{C}\text{ の積の交換律主張 1.56})\\
&= \exp\Bigl(\bigl((\tfrac{1}{2})_{\mathbb{C}}(i(K_1)_{\mathbb{C}})\bigr)H_1^{(+)}\Bigr) && (\because \mathbb{C}\text{ の積の結合律主張 1.56})\\
&= \exp\Bigl((\tfrac{1}{2})_{\mathbb{C}}\bigl((i(K_1)_{\mathbb{C}})H_1^{(+)}\bigr)\Bigr) && (\because \text{主張 2.41}(m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ a\to(\tfrac{1}{2})_{\mathbb{C}},\ b\to i(K_1)_{\mathbb{C}},\ A\to H_1^{(+)}\text{。右辺から左辺へ）})\\
&= \exp\Bigl((\tfrac{1}{2})_{\mathbb{C}}S_1^{(+)}\Bigr) && (\because S_1^{(+)} = i(K_1)_{\mathbb{C}}H_1^{(+)})\\
&= \exp\Bigl(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Bigr) && (\because \text{主張の略記}\tfrac{1}{2}S_1^{(+)} = (\tfrac{1}{2})_{\mathbb{C}}S_1^{(+)})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V_2 &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(iK_2^*H_2) && (\because \text{主張 13.25})\\
&= \bigl((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\bigr)_{\mathbb{C}}\exp(iK_2^*H_2) && (\because \text{係数の}(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\in\mathbb{R}_{>0}\subset\mathbb{C}\text{ は定義 1.13 の包含})\\
&= \bigl((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\bigr)_{\mathbb{C}}\exp(i(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2) && (\because \text{主張 13.25 の}K_2^*\in\mathbb{R}_{>0}\subset\mathbb{C}\text{ は定義 1.13 の包含})\\
&= \bigl((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\bigr)_{\mathbb{C}}\exp(S_2) && (\because S_2 = i(K_2^*)_{\mathbb{C}}H_2)
\end{aligned}
$$

$B := \exp\Bigl(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\Bigr)$、$A := \exp(S_2)$、$c := \bigl((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\bigr)_{\mathbb{C}}$ と置くと、

$$
\begin{aligned}
V^{(+)} &= \Big(\Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2} V_2\Big)\Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2} \quad (\because \text{定義 13.29}) \\
&= \big(B(cA)\big)B \quad (\because \text{上の二つの鎖}) \\
&= \big(c(BA)\big)B \quad (\because \text{主張 2.19}) \\
&= c\big((BA)B\big) \quad (\because \text{主張 2.18})
\end{aligned}
$$

であり、主張 2.15 より括弧を省くと statement の表示を得る。

Step 2（各因子の性質）。主張 16.2 より $S_1^{(+)}$ は実対称（定義 8.8）、したがって 主張 8.9 ($n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to S_1^{(+)}$) よりエルミートである。同じく 主張 16.2 より S_2 は実対称なので、主張 8.9（$n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to S_2$）よりエルミートである。$\frac{1}{2}S_1^{(+)}$ もエルミート（実係数倍、主張 8.12 ($n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ \alpha \to \frac{1}{2},\ A \to S_1^{(+)}$)) であり、主張 8.20 ($n \to 2^{M_{\mathrm{col}}}$、$S \to \frac{1}{2}S_1^{(+)}$ と $S \to S_2$) と 主張 8.18（$n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \frac{1}{2}S_1^{(+)}$）より

- B は正定値（定義 8.7 の正定値はエルミートな行列について定めるので、とくにエルミート）で、$B' := \exp\Big(-\frac{1}{2}S_1^{(+)}\Big)$ は $B'B = I$ を満たす
- A は正定値

Step 3（正定値性）。Step 1 の記号のもとで

$$
\begin{aligned}
V^{(+)} &= c\big((BA)B\big) \quad (\because \text{Step 1 の最後の鎖}) \\
&= c\big(B(AB)\big) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= c\big(B^*(AB)\big) \quad (\because B \text{ はエルミート（Step 2）なので} B^* = B\text{。定義 8.7 のエルミートの定義})
\end{aligned}
$$

である。主張 8.14（$n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to A,\ B \to B,\ B' \to B'$。$A$ は正定値、$B'B = I$ は Step 2）より $B^*(AB)$ は正定値である。また

$$
(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \text{等号は定義 12.26(添字} i \to 2\text{) の} s_2 = \sinh 2K_2\text{、所属は定義 12.28})
$$

なので、主張 8.16（$n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ \alpha \to (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2},\ A \to B^*(AB)$）より $V^{(+)} = c\big(B^*(AB)\big)$ は正定値である。 □

主張 16.14 ($V^{(+)}$ は可逆であり、左右逆は明示できる)**.** 定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と、その可逆元の集合 $R^\times$・逆元 g^{-1} を用いる（下の $R^{(+)}$ はこの R とは別の記号である)。主張 16.13 の表示に対して、次の行列を

$$
R^{(+)} := \big((2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}} \exp\Big(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Big) \exp(-S_2) \exp\Big(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Big) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})
$$

と置く（$(2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2} := \big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)^{-1} \in \mathbb{R}$ は 定義 12.28 の正の実数 $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ の $\mathbb{R}$ の逆数、$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記、$-\frac{1}{2}S_1^{(+)} := -\big(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\big)$・$-S_2$ は 定義 1.94 の符号反転)。このとき左右の積はそれぞれ

$$
V^{(+)}R^{(+)} = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}, \qquad R^{(+)}V^{(+)} = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}
$$

である。したがって $V^{(+)} \in R^\times$ であり、

$$
\Big(V^{(+)}\Big)^{-1} = R^{(+)} = \big((2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}} \exp\Big(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Big) \exp(-S_2) \exp\Big(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Big).
$$

証明. Step 1（指数行列どうしの左右逆）。$X_1 := \frac{1}{2}S_1^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（スカラー倍は 定義 2.3）、$E_+ := \exp(X_1)$、$E_- := \exp(-X_1)$、$A_+ := \exp(S_2)$、$A_- := \exp(-S_2)$ と置く（$-X_1$・$-S_2$ は 定義 1.94、exp は 定義 3.4。E_- は主張の $\exp(-\frac{1}{2}S_1^{(+)})$ である）。

$$
\begin{aligned}
E_+E_- &= \exp(X_1)\exp(-X_1) && (\because\ E_\pm \text{ の置き方}) \\
&= \exp(-(-X_1))\exp(-X_1) && \big(\because\ \text{主張 2.27 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to X_1)\big) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because\ \text{主張 8.18 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to -X_1)\big), \\
E_-E_+ &= \exp(-X_1)\exp(X_1) && (\because\ E_\pm \text{ の置き方}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because\ \text{主張 8.18 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to X_1)\big), \\
A_+A_- &= \exp(S_2)\exp(-S_2) && (\because\ A_\pm \text{ の置き方}) \\
&= \exp(-(-S_2))\exp(-S_2) && \big(\because\ \text{主張 2.27 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to S_2)\big) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because\ \text{主張 8.18 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to -S_2)\big), \\
A_-A_+ &= \exp(-S_2)\exp(S_2) && (\because\ A_\pm \text{ の置き方}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because\ \text{主張 8.18 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to S_2)\big).
\end{aligned}
$$

Step 2（右側の候補を掛ける）。$a := (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}$ と置く。$a \in \mathbb{R}_{>0}$（定義 12.28。$s_2 = \sinh 2K_2$ は 定義 12.26）なので $a \neq 0$ であり、$\mathbb{R}$ の逆数 $a^{-1} = (2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}$ がある（等号は主張の $(2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2}$ の置き方）。定義 2.3 のスカラー倍は係数を $\mathbb{C}$ に取るので、実数 $a \cdot a^{-1}$ は定義 1.13 の $a_{\mathbb{C}} \cdot (a^{-1})_{\mathbb{C}}$ として掛ける（主張 16.13 の表示の係数 $\big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}}$ は $a_{\mathbb{C}}$ である）。$V^{(+)}$ と $R^{(+)}$ の 3 つの因子の積は、左の 2 つを先に掛けたもの $V^{(+)} = a_{\mathbb{C}}\big((E_+A_+)E_+\big)$、$R^{(+)} = (a^{-1})_{\mathbb{C}}\big((E_-A_-)E_-\big)$ と読む。Step 1 を使って

$$
\begin{aligned}
V^{(+)}R^{(+)} &= (a_{\mathbb{C}}((E_+A_+)E_+))((a^{-1})_{\mathbb{C}}((E_-A_-)E_-)) && (\because\ V^{(+)} \text{ と} R^{(+)} \text{ の表示}) \\
&= a_{\mathbb{C}}\big(((E_+A_+)E_+)((a^{-1})_{\mathbb{C}}((E_-A_-)E_-))\big) && \big(\because\ \text{主張 2.18}\big) \\
&= a_{\mathbb{C}}\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\big(((E_+A_+)E_+)((E_-A_-)E_-)\big)\big) && \big(\because\ \text{主張 2.19}\big) \\
&= \big(a_{\mathbb{C}}(a^{-1})_{\mathbb{C}}\big)\big(((E_+A_+)E_+)((E_-A_-)E_-)\big) && \big(\because\ \text{主張 2.41}\big) \\
&= (aa^{-1})_{\mathbb{C}}\big(((E_+A_+)E_+)((E_-A_-)E_-)\big) && \big(\because\ \text{主張 1.29 } (a \to a,\ b \to a^{-1})\big) \\
&= (1)_{\mathbb{C}}\big(((E_+A_+)E_+)((E_-A_-)E_-)\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } aa^{-1} = 1) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\big(((E_+A_+)E_+)((E_-A_-)E_-)\big) && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は 定義 1.13 の略記 } r_{\mathbb{C}} \text{ の } r = 1\big) \\
&= ((E_+A_+)E_+)((E_-A_-)E_-) && \big(\because\ \text{主張 2.42}\big) \\
&= \big(((E_+A_+)E_+)(E_-A_-)\big)E_- && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= \big((E_+A_+)(E_+(E_-A_-))\big)E_- && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= \big((E_+A_+)((E_+E_-)A_-)\big)E_- && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= \big((E_+A_+)(I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}A_-)\big)E_- && (\because\ \text{Step 1 の第一の左右逆}) \\
&= \big((E_+A_+)A_-\big)E_- && \big(\because\ \text{主張 2.16 を}A_- \text{ へ適用}\big) \\
&= \big(E_+(A_+A_-)\big)E_- && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big) \\
&= (E_+I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})})E_- && (\because\ \text{Step 1 の第三の左右逆}) \\
&= E_+E_- && \big(\because\ \text{主張 2.17 を}E_+ \text{ へ適用}\big) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because\ \text{Step 1 の第一の左右逆}).
\end{aligned}
$$

Step 3（左側の候補を掛ける）。Step 1 の残る二つの左右逆を使うと

$$
\begin{aligned}
R^{(+)}V^{(+)} &= ((a^{-1})_{\mathbb{C}}((E_-A_-)E_-))(a_{\mathbb{C}}((E_+A_+)E_+)) && (\because\ R^{(+)}\text{と}V^{(+)}\text{ の表示})\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\big(((E_-A_-)E_-)(a_{\mathbb{C}}((E_+A_+)E_+))\big) && \big(\because\ \text{主張 2.18}\big)\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\big(a_{\mathbb{C}}\big(((E_-A_-)E_-)((E_+A_+)E_+)\big)\big) && \big(\because\ \text{主張 2.19}\big)\\
&= \big((a^{-1})_{\mathbb{C}}a_{\mathbb{C}}\big)\big(((E_-A_-)E_-)((E_+A_+)E_+)\big) && \big(\because\ \text{主張 2.41}\big)\\
&= (a^{-1}a)_{\mathbb{C}}\big(((E_-A_-)E_-)((E_+A_+)E_+)\big) && \big(\because\ \text{主張 1.29 } (a\to a^{-1},\ b\to a)\big)\\
&= (1)_{\mathbb{C}}\big(((E_-A_-)E_-)((E_+A_+)E_+)\big) && (\because\ \mathbb{R}\text{ で } a^{-1}a=1)\\
&= 1_{\mathbb{C}}\big(((E_-A_-)E_-)((E_+A_+)E_+)\big) && \big(\because\ 1_{\mathbb{C}}\text{ は 定義 1.13 の略記 } r_{\mathbb{C}}\text{ の } r=1\big)\\
&= ((E_-A_-)E_-)((E_+A_+)E_+) && \big(\because\ \text{主張 2.42}\big)\\
&= \big(((E_-A_-)E_-)(E_+A_+)\big)E_+ && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big)\\
&= \big((E_-A_-)(E_-(E_+A_+))\big)E_+ && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big)\\
&= \big((E_-A_-)((E_-E_+)A_+)\big)E_+ && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big)\\
&= \big((E_-A_-)(I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}A_+)\big)E_+ && (\because\ \text{Step 1 の第二の左右逆})\\
&= \big((E_-A_-)A_+\big)E_+ && \big(\because\ \text{主張 2.16 を}A_+\text{ へ適用}\big)\\
&= \big(E_-(A_-A_+)\big)E_+ && \big(\because\ \text{主張 2.15}\big)\\
&= (E_-I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})})E_+ && (\because\ \text{Step 1 の第四の左右逆})\\
&= E_-E_+ && \big(\because\ \text{主張 2.17 を}E_-\text{ へ適用}\big)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because\ \text{Step 1 の第二の左右逆}).
\end{aligned}
$$

$V^{(+)}\in R^{\times}$ $\quad(\because$ Step 2・Step 3 の二つの積, 定義 7.2 の可逆の定義 $(M\to M_{\mathrm{col}},\ g\to V^{(+)},\ h\to R^{(+)}))$

$\Big(V^{(+)}\Big)^{-1}=R^{(+)}$ $\quad(\because$ Step 2・Step 3 の二つの積, 定義 7.2 の逆元の一意性と記号 $g^{-1})$

□

主張 16.15 ($\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)$ は正)**.** 定義 13.29 の $V^{(+)}\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ について

$$\mathrm{tr}\Big(V^{(+)}\Big)\in\mathbb{R}_{>0}$$

である。トレースは 定義 8.1、$z\in\mathbb{C}$ について「$z\in\mathbb{R}_{>0}$」は 定義 8.7 の略記（$z=r_{\mathbb{C}}$（定義 1.13）を満たす $r\in\mathbb{R}_{>0}$ がある）による。

証明. $n:=2^{M_{\mathrm{col}}}$ と置く。$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$（定義 13.1）なので $n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ であり、$V^{(+)}\in\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$（定義 13.29）である。

$$
\begin{aligned}
&V^{(+)}\text{ は正定値} && (\because\ \text{主張 16.13})\\
\Longrightarrow\ &\mathrm{tr}\Big(V^{(+)}\Big)\in\mathbb{R}_{>0} && \big(\because\ \text{主張 8.17 を } n=2^{M_{\mathrm{col}}},\ A=V^{(+)}\text{ へ}\big)
\end{aligned}
$$

□

主張 16.16 (共役は行列の exp と交換する)**.** $n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$B\in\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ は正則とし、$T_B(A):=(BA)B^{-1}$ は 定理 1.8 の共役写像とする（B^{-1} は 主張 1.90 の正則の意味の逆行列）。冪 A^p（$p\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$）と exp は 定義 3.4 (1) による。$X\in\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ について

$$T_B\big(\exp(X)\big)=\exp\big(T_B(X)\big)$$

が成り立つ。証明の極限の段だけが $\mathbb{R}$ を使う（定義 2.91 の収束が実数列 $\|\cdot\|$ の 0 への収束だからである）。

証明. 準備。$p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $c_p := \left(\frac{1}{p!}\right)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$（定義 1.13 の略記）と書き、$A \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$、$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について部分和を

$$P_N(A) := \sum_{p=0}^{N} c_p A^p \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$$

と置く（和は 定義 2.5 を添字 $p = j-1$ で書いたもの）。定義 2.5 より $P_0(A) = c_0 A^0$、$P_{N+1}(A) = P_N(A) + c_{N+1}A^{N+1}$ である。定義 3.4 (1) と 主張 3.2 (1) より、$A = X$ と $A = T_B(X)$ について $P_N(X) \to \exp(X)$、$P_N\big(T_B(X)\big) \to \exp\big(T_B(X)\big)$ である（定義 2.91 の収束）。

Step 1（冪の共役）。すべての $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $T_B(X^p) = \big(T_B(X)\big)^p$ を p についての帰納法で示す。$p = 0$ のとき、

$$\begin{aligned}
T_B(X^0) &= T_B\big(I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}\big) && (\because \text{ 定義 3.4 (1) の } X^0 := I)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})} && (\because \text{ 主張 1.90 の単位的})\\
&= \big(T_B(X)\big)^0 && (\because \text{ 定義 3.4 (1) の } \big(T_B(X)\big)^0 := I)
\end{aligned}$$

p で成り立つとすると、

$$\begin{aligned}
T_B(X^{p+1}) &= T_B(X^p X) && (\because \text{ 定義 3.4 (1) の } X^{p+1} := X^p X)\\
&= T_B(X^p)\, T_B(X) && (\because \text{ 主張 1.90 の乗法的 } (A \to X^p,\ C \to X))\\
&= \big(T_B(X)\big)^p\, T_B(X) && (\because \text{ 帰納法の仮定 } T_B(X^p) = \big(T_B(X)\big)^p)\\
&= \big(T_B(X)\big)^{p+1} && (\because \text{ 定義 3.4 (1) の } \big(T_B(X)\big)^{p+1} := \big(T_B(X)\big)^p T_B(X))
\end{aligned}$$

Step 2（部分和の共役）。すべての $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $T_B\big(P_N(X)\big) = P_N\big(T_B(X)\big)$ を N についての帰納法で示す。$N = 0$ のとき、

$$\begin{aligned}
T_B\big(P_0(X)\big) &= T_B(c_0 X^0) && (\because \text{ 準備の } P_0(X) = c_0 X^0)\\
&= c_0\, T_B(X^0) && (\because \text{ 定理 1.8 のスカラー倍を保つこと } (\alpha \to c_0,\ A \to X^0))\\
&= c_0 \big(T_B(X)\big)^0 && (\because \text{ Step 1 の } p = 0)\\
&= P_0\big(T_B(X)\big) && (\because \text{ 準備の } P_0\big(T_B(X)\big) = c_0\big(T_B(X)\big)^0)
\end{aligned}$$

N で成り立つとすると、

$$\begin{aligned}
T_B\big(P_{N+1}(X)\big) &= T_B\big(P_N(X) + c_{N+1}X^{N+1}\big) && (\because \text{ 準備の } P_{N+1}(X) = P_N(X) + c_{N+1}X^{N+1})\\
&= T_B\big(P_N(X)\big) + T_B\big(c_{N+1}X^{N+1}\big) && (\because \text{ 定理 1.8 の和を保つこと } (A \to P_N(X),\ C \to c_{N+1}X^{N+1}))\\
&= P_N\big(T_B(X)\big) + T_B\big(c_{N+1}X^{N+1}\big) && (\because \text{ 帰納法の仮定 } T_B\big(P_N(X)\big) = P_N\big(T_B(X)\big))\\
&= P_N\big(T_B(X)\big) + c_{N+1}\, T_B\big(X^{N+1}\big) && (\because \text{ 定理 1.8 のスカラー倍を保つこと } (\alpha \to c_{N+1},\ A \to X^{N+1}))\\
&= P_N\big(T_B(X)\big) + c_{N+1}\big(T_B(X)\big)^{N+1} && (\because \text{ Step 1 の } p = N+1)\\
&= P_{N+1}\big(T_B(X)\big) && (\because \text{ 準備の } P_{N+1}\big(T_B(X)\big) = P_N\big(T_B(X)\big) + c_{N+1}\big(T_B(X)\big)^{N+1})
\end{aligned}$$

Step 3(部分和の共役の極限)。準備の $P_N(X) \to \exp(X)$ に 主張 2.97$((A_N)_N \to (P_N(X))_N,\ A \to \exp(X),\ B \to B)$ を当てて $BP_N(X) \to B\exp(X)$、これに 主張 2.96（$K \to \mathbb{C},\ (A_N)_N \to (BP_N(X))_N,\ A \to B\exp(X),\ B \to B^{-1}$）を当てて $\big(BP_N(X)\big)B^{-1} \to \big(B\exp(X)\big)B^{-1}$ である。定理 1.8 の T_B の定義より、これは $T_B\big(P_N(X)\big) \to T_B\big(\exp(X)\big)$ である。

結論。行列の列 $C_N := T_B\big(P_N(X)\big)$ は、Step 3 より $T_B\big(\exp(X)\big)$ に収束し、Step 2 より $C_N = P_N\big(T_B(X)\big)$ なので準備より $\exp\big(T_B(X)\big)$ にも収束する。よって

$$T_B\big(\exp(X)\big) = \exp\big(T_B(X)\big) \quad (\because\ (C_N) \text{ の二つの極限に 主張 2.92 (4) の極限の一意性})$$

□

主張 16.17 ($c = \big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}}$). 主張 15.29 の $V^{(+)} = c\check{V}'$ を満たす $c \in \mathbb{C}^\times$ は

$$c = \big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}} = \big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}}$$

である（$(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ は 定義 12.28、$s_2 = \sinh 2K_2$ は 定義 12.26（添字 $i \to 2$）、$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記）。すなわち

$$V^{(+)} = \big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}}\, \check{V}'$$

証明. 準備。$n := 2^{M_{\mathrm{col}}}$、$I := I_{\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})}$ と書く。主張 16.2 の $S_1 := S_1^{(+)}$、S_2 を用い、主張 16.13 の表示の $\frac{1}{2}S_1^{(+)}$ を $H := \big(\frac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}} S_1$（定義 2.3）と書く。主張 16.14 の $-\frac{1}{2}S_1^{(+)} := -\big(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\big)$ はこの H の符号反転 $-H$（定義 1.94）である。$a := (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$（定義 12.28）、$a^{-1} \in \mathbb{R}_{>0}$ をその $\mathbb{R}$ の逆数（主張 16.14 の $(2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2}$）、$a^2 := aa \in \mathbb{R}_{>0}$ と書き、

$$\tau := \mathrm{tr}\big(\exp(S_1)\exp(S_2)\big) \in \mathbb{C}, \qquad \tau' := \mathrm{tr}\big(\exp(-S_1)\exp(-S_2)\big) \in \mathbb{C}$$

と置く（tr は 定義 8.1）。$k, l \in \{1, \dots, n\}$ について

$$\begin{aligned}
(H+H)_{kl} &= H_{kl} + H_{kl} && (\because \text{ 定義 2.4})\\
&= \big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}} (S_1)_{kl} + \big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}} (S_1)_{kl} && (\because \text{ 定義 2.3})\\
&= \big(\big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}} + \big(\tfrac{1}{2}\big)_{\mathbb{C}}\big) (S_1)_{kl} && (\because \text{ 分配律。主張 1.56})\\
&= \big(\big(\tfrac{1}{2}, 0\big) + \big(\tfrac{1}{2}, 0\big)\big) (S_1)_{kl} && (\because \text{ 定義 1.13})\\
&= \big(\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2},\ 0 + 0\big) (S_1)_{kl} && (\because \text{ 定義 1.12 の和})\\
&= (1, 0)\, (S_1)_{kl} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= 1_{\mathbb{C}} (S_1)_{kl} && (\because \text{ 定義 1.13})\\
&= (S_1)_{kl} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}$$

なので $H + H = S_1$ であり、

$$\begin{aligned}
\exp(H)\exp(H) &= \exp(H+H) && (\because \text{ 定理 3.7 } (K \to \mathbb{C},\ A \to H,\ B \to H) \text{ と } HH = HH)\\
&= \exp(S_1) && (\because\ H + H = S_1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\exp(-H)\exp(-H) &= \exp\big((-H) + (-H)\big) && (\because \text{ 定理 3.7 } (K \to \mathbb{C},\ A \to -H,\ B \to -H) \text{ と } (-H)(-H) = (-H)(-H))\\
&= \exp\big(-(H+H)\big) && (\because \text{ 主張 2.28 } (A \to H,\ B \to H) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \exp(-S_1) && (\because\ H + H = S_1)
\end{aligned}$$

である。主張 15.29 の $c \in \mathbb{C}^\times$ は $c \neq 0$ なので、主張 1.56 の逆元 $c^{-1} \in \mathbb{C}$ を持つ。$c^2 := cc$ と書く。定義 15.25 (2) より $\check{V}' \in R^\times$（$R := \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、定義 7.2 の $M \to M_{\mathrm{col}}$）であり、主張 16.14 より $V^{(+)} \in R^\times$ である。主張 16.12 の右辺の正の実数を $t := \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)/2\Big) \in \mathbb{R}_{>0}$、主張 16.15 の $\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)$ を $\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big) = r_{\mathbb{C}}$（$r \in \mathbb{R}_{>0}$）と書く。

Step 1（$\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)$ と $\mathrm{tr}\big((V^{(+)})^{-1}\big)$ を $\tau \cdot \tau'$ で表す）。

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big) &= \mathrm{tr}\Big(a_{\mathbb{C}}\big((\exp(H)\exp(S_2))\exp(H)\big)\Big) && (\because \text{ 主張 16.13 の表示})\\
&= a_{\mathbb{C}}\, \mathrm{tr}\big((\exp(H)\exp(S_2))\exp(H)\big) && (\because \text{ 主張 8.4 } (\alpha \to a_{\mathbb{C}}))\\
&= a_{\mathbb{C}}\, \mathrm{tr}\big(\exp(H)(\exp(H)\exp(S_2))\big) && (\because \text{ 主張 8.2 (2) } (A \to \exp(H)\exp(S_2),\ B \to \exp(H)))\\
&= a_{\mathbb{C}}\, \mathrm{tr}\big((\exp(H)\exp(H))\exp(S_2)\big) && (\because \text{ 主張 2.15})\\
&= a_{\mathbb{C}}\, \mathrm{tr}\big(\exp(S_1)\exp(S_2)\big) && (\because \text{ 準備の } \exp(H)\exp(H) = \exp(S_1))\\
&= a_{\mathbb{C}}\, \tau && (\because\ \tau \text{ の定義})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\big((V^{(+)})^{-1}\big) &= \operatorname{tr}\Big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\big((\exp(-H)\exp(-S_2))\exp(-H)\big)\Big) && (\because \text{主張 16.14 の } (V^{(+)})^{-1} = R^{(+)}) \\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\operatorname{tr}\big((\exp(-H)\exp(-S_2))\exp(-H)\big) && (\because \text{主張 8.4 } (\alpha \to (a^{-1})_{\mathbb{C}})) \\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\operatorname{tr}\big(\exp(-H)(\exp(-H)\exp(-S_2))\big) && (\because \text{主張 8.2 (2) } (A \to \exp(-H)\exp(-S_2),\ B \to \exp(-H))) \\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\operatorname{tr}\big((\exp(-H)\exp(-H))\exp(-S_2)\big) && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\operatorname{tr}\big(\exp(-S_1)\exp(-S_2)\big) && (\because \text{準備の } \exp(-H)\exp(-H) = \exp(-S_1)) \\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\,\tau' && (\because \tau' \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

Step 2 ($\tau' = \tau$)。主張 16.3 の可逆な $U \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ と、定理 1.8 の共役写像 $T_U(A) := (UA)U^{-1}$ を用いる。

$$
\begin{aligned}
\tau' &= \operatorname{tr}\big(\exp(-S_1)\exp(-S_2)\big) && (\because \tau' \text{ の定義}) \\
&= \operatorname{tr}\Big(\exp\big(T_U(S_1)\big)\exp\big(T_U(S_2)\big)\Big) && (\because \text{主張 16.3 の } US_1^{(+)}U^{-1} = -S_1^{(+)},\ US_2U^{-1} = -S_2 \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \operatorname{tr}\Big(T_U\big(\exp(S_1)\big)\,T_U\big(\exp(S_2)\big)\Big) && (\because \text{主張 16.16 } (B \to U,\ X \to S_1,\ S_2) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \operatorname{tr}\Big(T_U\big(\exp(S_1)\exp(S_2)\big)\Big) && (\because \text{主張 1.90 の乗法的 } (B \to U,\ A \to \exp(S_1),\ C \to \exp(S_2)) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \operatorname{tr}\Big(\big(U(\exp(S_1)\exp(S_2))\big)U^{-1}\Big) && (\because \text{定理 1.8 の } T_U \text{ の定義}) \\
&= \operatorname{tr}\Big(U\big((\exp(S_1)\exp(S_2))U^{-1}\big)\Big) && (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \operatorname{tr}\big(\exp(S_1)\exp(S_2)\big) && (\because \text{主張 8.2 (4) } (P \to U,\ P' \to U^{-1},\ A \to \exp(S_1)\exp(S_2)) \text{ と } U^{-1}U = I) \\
&= \tau && (\because \tau \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

Step 3 ($\operatorname{tr}\big(V^{(+)}\big)$ と $\operatorname{tr}\big((V^{(+)})^{-1}\big)$ を c と t で表す)。$W := c^{-1}(\check{V}')^{-1} \in R$ と置くと、

$$
\begin{aligned}
V^{(+)}W &= (c\check{V}')\big(c^{-1}(\check{V}')^{-1}\big) && (\because \text{主張 15.29 と } W \text{ の定義}) \\
&= c\Big(\check{V}'\big(c^{-1}(\check{V}')^{-1}\big)\Big) && (\because \text{主張 2.18}) \\
&= c\Big(c^{-1}\big(\check{V}'(\check{V}')^{-1}\big)\Big) && (\because \text{主張 2.19}) \\
&= (cc^{-1})\big(\check{V}'(\check{V}')^{-1}\big) && (\because \text{主張 2.41}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\big(\check{V}'(\check{V}')^{-1}\big) && (\because c^{-1} \text{ は } c \text{ の逆元。主張 1.56}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}I && (\because \text{定義 7.2 の } (\check{V}')^{-1}) \\
&= I && (\because \text{主張 2.42})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
WV^{(+)} &= \big(c^{-1}(\check{V}')^{-1}\big)(c\check{V}') && (\because W \text{ の定義と 主張 15.29}) \\
&= c^{-1}\Big((\check{V}')^{-1}(c\check{V}')\Big) && (\because \text{主張 2.18}) \\
&= c^{-1}\Big(c\big((\check{V}')^{-1}\check{V}'\big)\Big) && (\because \text{主張 2.19}) \\
&= (c^{-1}c)\big((\check{V}')^{-1}\check{V}'\big) && (\because \text{主張 2.41}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\big((\check{V}')^{-1}\check{V}'\big) && (\because c^{-1} \text{ は } c \text{ の逆元。主張 1.56}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}I && (\because \text{定義 7.2 の } (\check{V}')^{-1}) \\
&= I && (\because \text{主張 2.42})
\end{aligned}
$$

なので、定義 7.2 の逆元の一意性より $(V^{(+)})^{-1} = W$ である。よって

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\big(V^{(+)}\big) &= \operatorname{tr}\big(c\check{V}'\big) && (\because \text{主張 15.29}) \\
&= c\operatorname{tr}\big(\check{V}'\big) && (\because \text{主張 8.4 } (\alpha \to c)) \\
&= c\,t_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 16.12 と } t \text{ の置き方})
\end{aligned}
$$

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}\big((V^{(+)})^{-1}\big) &= \operatorname{tr}\big(c^{-1}(\check{V}')^{-1}\big) && (\because\ (V^{(+)})^{-1} = W \text{ と } W \text{ の定義})\\
&= c^{-1}\operatorname{tr}\big((\check{V}')^{-1}\big) && (\because\ \text{主張 8.4 } (\alpha \to c^{-1}))\\
&= c^{-1}\, t_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 16.12 と } t \text{ の置き方})
\end{aligned}$$

Step 4（$c^2 = (a^2)_{\mathbb{C}}$）。$w := \operatorname{tr}\big((V^{(+)})^{-1}\big) \in \mathbb{C}$ と置く。まず w を実数の像で表す。

$$\begin{aligned}
w &= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\,\tau' && (\because\ \text{Step 1 の第二の鎖})\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\,\tau && (\because\ \text{Step 2})\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\big(1_{\mathbb{C}}\tau\big) && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\big((a^{-1}a)_{\mathbb{C}}\tau\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } a^{-1}a = 1)\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\big(((a^{-1})_{\mathbb{C}}a_{\mathbb{C}})\tau\big) && (\because\ \text{主張 1.29 } (a \to a^{-1},\ b \to a) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}(a_{\mathbb{C}}\tau)\big) && (\because\ \text{乗法の結合律。主張 1.56})\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}\operatorname{tr}(V^{(+)})\big) && (\because\ \text{Step 1 の第一の鎖を右辺から左辺へ})\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}\big((a^{-1})_{\mathbb{C}}r_{\mathbb{C}}\big) && (\because\ \text{準備の } \operatorname{tr}(V^{(+)}) = r_{\mathbb{C}})\\
&= (a^{-1})_{\mathbb{C}}(a^{-1}r)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29 } (a \to a^{-1},\ b \to r))\\
&= \big(a^{-1}(a^{-1}r)\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29 } (a \to a^{-1},\ b \to a^{-1}r))
\end{aligned}$$

$q := a^{-1}(a^{-1}r)$ は正の実数 a^{-1}, r の積なので $q \in \mathbb{R}_{>0}$（$\mathbb{R}$ の順序）であり、$w = q_{\mathbb{C}} = (q, 0) \neq (0, 0)$（定義 1.13、定義 1.12 の元の等号は成分ごと）である。よって 主張 1.56 の逆元 $w^{-1} \in \mathbb{C}$ がある。次に

$$\begin{aligned}
c^2 w &= (cc)\big(c^{-1}t_{\mathbb{C}}\big) && (\because\ c^2 \text{ の定義と Step 3 の第二の鎖})\\
&= c\big(c(c^{-1}t_{\mathbb{C}})\big) && (\because\ \text{乗法の結合律。主張 1.56})\\
&= c\big((cc^{-1})t_{\mathbb{C}}\big) && (\because\ \text{乗法の結合律。主張 1.56})\\
&= c\big(1_{\mathbb{C}}t_{\mathbb{C}}\big) && (\because\ c^{-1} \text{ は } c \text{ の逆元。主張 1.56})\\
&= c\,t_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})\\
&= \operatorname{tr}\big(V^{(+)}\big) && (\because\ \text{Step 3 の第一の鎖を右辺から左辺へ})\\
&= a_{\mathbb{C}}\,\tau && (\because\ \text{Step 1 の第一の鎖})\\
&= a_{\mathbb{C}}\big(1_{\mathbb{C}}\tau\big) && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})\\
&= a_{\mathbb{C}}\big((aa^{-1})_{\mathbb{C}}\tau\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } aa^{-1} = 1)\\
&= a_{\mathbb{C}}\big((a_{\mathbb{C}}(a^{-1})_{\mathbb{C}})\tau\big) && (\because\ \text{主張 1.29 } (a \to a,\ b \to a^{-1}) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= a_{\mathbb{C}}\big(a_{\mathbb{C}}((a^{-1})_{\mathbb{C}}\tau)\big) && (\because\ \text{乗法の結合律。主張 1.56})\\
&= a_{\mathbb{C}}\big(a_{\mathbb{C}}((a^{-1})_{\mathbb{C}}\tau')\big) && (\because\ \text{Step 2 を右辺から左辺へ})\\
&= a_{\mathbb{C}}\big(a_{\mathbb{C}}w\big) && (\because\ \text{Step 1 の第二の鎖を右辺から左辺へ})\\
&= (a_{\mathbb{C}}a_{\mathbb{C}})w && (\because\ \text{乗法の結合律。主張 1.56})\\
&= (a^2)_{\mathbb{C}}\,w && (\because\ \text{主張 1.29 } (a \to a,\ b \to a) \text{ と } a^2 \text{ の定義})
\end{aligned}$$

であるから、

$$
\begin{aligned}
c^2 &= c^2\,1_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})\\
&= c^2\big(ww^{-1}\big) && (\because\ w^{-1} \text{ は } w \text{ の逆元。主張 1.56})\\
&= (c^2w)\,w^{-1} && (\because\ \text{乗法の結合律。主張 1.56})\\
&= \big((a^2)_{\mathbb{C}}w\big)w^{-1} && (\because\ \text{上の鎖})\\
&= (a^2)_{\mathbb{C}}\big(ww^{-1}\big) && (\because\ \text{乗法の結合律。主張 1.56})\\
&= (a^2)_{\mathbb{C}}\,1_{\mathbb{C}} && (\because\ w^{-1} \text{ は } w \text{ の逆元。主張 1.56})\\
&= (a^2)_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})
\end{aligned}
$$

Step 5（符号の確定）。$t \in \mathbb{R}_{>0}$ の $\mathbb{R}$ の逆数を $t^{-1} \in \mathbb{R}_{>0}$ と書き、$\rho := rt^{-1} \in \mathbb{R}_{>0}$（正の実数の積。$\mathbb{R}$ の順序）と置く。

$$
\begin{aligned}
c &= c\,1_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})\\
&= c\,(tt^{-1})_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } tt^{-1}=1)\\
&= c\big(t_{\mathbb{C}}(t^{-1})_{\mathbb{C}}\big) && (\because\ \text{主張 1.29 } (a\to t,\ b\to t^{-1}) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \big(c\,t_{\mathbb{C}}\big)(t^{-1})_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{乗法の結合律。主張 1.56})\\
&= \mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)(t^{-1})_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{Step 3 の第一の鎖を右辺から左辺へ})\\
&= r_{\mathbb{C}}(t^{-1})_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{準備の } \mathrm{tr}(V^{(+)}) = r_{\mathbb{C}})\\
&= (rt^{-1})_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29 } (a\to r,\ b\to t^{-1}))\\
&= \rho_{\mathbb{C}} && (\because\ \rho \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
(\rho\rho, 0) &= (\rho\rho)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定義 1.13})\\
&= \rho_{\mathbb{C}}\,\rho_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.29 } (a\to\rho,\ b\to\rho) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= cc && (\because\ \text{上の鎖の } c = \rho_{\mathbb{C}})\\
&= c^2 && (\because\ c^2 \text{ の定義})\\
&= (a^2)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{Step 4})\\
&= (aa, 0) && (\because\ \text{定義 1.13 と } a^2 \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

なので、定義 1.12 の元の等号は成分ごとであることから $\rho\rho = aa$、すなわち $\rho^2 = a^2$ である。$\rho, a \in \mathbb{R}_{>0}$ なので 主張 1.2（$a\to\rho,\ b\to a$）より $\rho = a$ である。よって

$$
\begin{aligned}
c &= \rho_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{上の鎖})\\
&= a_{\mathbb{C}} && (\because\ \rho = a)\\
&= \big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ a \text{ の定義})\\
&= \big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定義 12.26 } (i\to 2) \text{ の } s_2 = \sinh 2K_2)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V^{(+)} &= c\,\check{V}' && (\because\ \text{主張 15.29})\\
&= \big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}}\,\check{V}' && (\because\ \text{上の鎖})
\end{aligned}
$$

□

定理 16.18 ($V^{(+)}$ の固有値)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対して

$$
\check{\Lambda}_\epsilon := (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right) \in \mathbb{R}
$$

とおく。このとき

- (1)　$V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon V^{(+)} = \check{\Lambda}_\epsilon \check{Q}_\epsilon$（左右どちらから掛けても同じ。右辺は、実数 $\check{\Lambda}_\epsilon$ を 定義 1.13 で $\mathbb{C}$ の元 $(\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}}$ にして掛けた行列である）。とくに $V^{(+)}$ は対角化可能である：各 ϵ について $\mathrm{im}\,\check{Q}_\epsilon$ の 0 でない元を 1 本ずつ取った $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 本のベクトルは、$V^{(+)}$ の固有ベクトル（定義 1.98。ϵ の 1 本は $(\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}}$ に属する）からなる $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の基底である。また $V^{(+)}$ の固有値（定義 1.99）はどれも、ある ϵ の $(\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}}$ に等しい。
- (2) 各 ϵ について $\check{\Lambda}_\epsilon > 0$ である。したがって $V^{(+)}$ の固有値はどれも、正の実数 $\check{\Lambda}_\epsilon$ を 定義 1.13 で $\mathbb{C}$ へ移した $(\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}}$ である。$\check{\Lambda}_\epsilon$ のうち最大のものは全ての $\epsilon_\mu = 1$ を取ったとき、最小のものは全ての $\epsilon_\mu = 0$ を取ったときである。$\check{\Lambda}_{\max} := \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} \in \mathbb{R}$、$\check{\Lambda}_{\min} := \check{\Lambda}_{(0,\dots,0)} \in \mathbb{R}$ と書くと、次が成り立つ：

$$\check{\Lambda}_{\max} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right), \qquad \check{\Lambda}_{\min} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)$$

したがって $\check{\Lambda}_{\max}\check{\Lambda}_{\min} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}}$ であり、主張 16.17 の $c \in \mathbb{C}$ について $\big(\check{\Lambda}_{\max}\check{\Lambda}_{\min}\big)_{\mathbb{C}} = c^2$ である（c^2 は 定義 1.64 の冪）。

証明. (1) $a := (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$（等号は 定義 12.26（添字 $i \to 2$）の $s_2 = \sinh 2K_2$ による $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$、所属は 定義 12.28）と書く。主張 16.17 より $V^{(+)} = a_{\mathbb{C}}\check{V}'$ である。

$$\begin{aligned}
V^{(+)}\check{Q}_\epsilon &= (a_{\mathbb{C}}\check{V}')\check{Q}_\epsilon && (\because \text{主張 16.17})\\
&= a_{\mathbb{C}}(\check{V}'\check{Q}_\epsilon) && (\because \text{主張 2.18 } (a \to a_{\mathbb{C}},\ A \to \check{V}',\ B \to \check{Q}_\epsilon))\\
&= a_{\mathbb{C}}\big((\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon\big) && (\because \text{主張 16.10 の } \check{V}'\check{Q}_\epsilon = (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon)\\
&= \big(a_{\mathbb{C}}(\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}}\big)\check{Q}_\epsilon && (\because \text{主張 2.41 } (a \to a_{\mathbb{C}},\ b \to (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}},\ A \to \check{Q}_\epsilon))\\
&= \big(a\exp(\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon && (\because \text{主張 1.29 } (a \to a,\ b \to \exp(\check{g}(\epsilon))))\\
&= \big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon && (\because a \text{ の置き方})\\
&= \Big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2})\Big)\Big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon && (\because \text{主張 16.10 の } \check{g}(\epsilon) \text{ の定義})\\
&= \Big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2})\Big)\Big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon && (\because \text{定義 12.26 } (i \to 2) \text{ の } s_2 = \sinh 2K_2)\\
&= (\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon && (\because \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon V^{(+)} &= \check{Q}_\epsilon(a_{\mathbb{C}}\check{V}') && (\because \text{主張 16.17})\\
&= a_{\mathbb{C}}(\check{Q}_\epsilon\check{V}') && (\because \text{主張 2.19 } (a \to a_{\mathbb{C}},\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to \check{V}'))\\
&= a_{\mathbb{C}}\big((\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon\big) && (\because \text{主張 16.10 の } \check{Q}_\epsilon\check{V}' = (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon)\\
&= \big(a_{\mathbb{C}}(\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}}\big)\check{Q}_\epsilon && (\because \text{主張 2.41 } (a \to a_{\mathbb{C}},\ b \to (\exp(\check{g}(\epsilon)))_{\mathbb{C}},\ A \to \check{Q}_\epsilon))\\
&= \big(a\exp(\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon && (\because \text{主張 1.29 } (a \to a,\ b \to \exp(\check{g}(\epsilon))))\\
&= \big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(\check{g}(\epsilon))\big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon && (\because a \text{ の置き方})\\
&= \Big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2})\Big)\Big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon && (\because \text{主張 16.10 の } \check{g}(\epsilon) \text{ の定義})\\
&= \Big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2})\Big)\Big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon && (\because \text{定義 12.26 } (i \to 2) \text{ の } s_2 = \sinh 2K_2)\\
&= (\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon && (\because \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義})
\end{aligned}$$

対角化可能性と本数。数ベクトル $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ は 定義 1.6 のとおり $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 行 1 列の行列として扱う。$y \in \mathrm{im}\,\check{Q}_\epsilon$（im は 主張 8.5 の定義。$n \to 2^{M_{\mathrm{col}}}$, $Q \to \check{Q}_\epsilon$）なら $y = \check{Q}_\epsilon x$ と書けて

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon y &= \check{Q}_\epsilon\left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad (\because y = \check{Q}_\epsilon x \text{ と書いた}) \\
&= \left(\check{Q}_\epsilon \check{Q}_\epsilon\right) x \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ q \to 1,\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to \check{Q}_\epsilon,\ C \to x) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\left(I\check{Q}_\epsilon\right)\check{Q}_\epsilon\right) x \quad \left(\because \text{ 主張 2.16 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\left(\check{Q}_\epsilon^0\check{Q}_\epsilon\right)\check{Q}_\epsilon\right) x \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^0 := I\ (A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\check{Q}_\epsilon^1\check{Q}_\epsilon\right) x \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A\ (m \to 0,\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \check{Q}_\epsilon^2 x \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A\ (m \to 1,\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \check{Q}_\epsilon x \quad \left(\because \text{ 主張 16.9 (1) の } \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon\right) \\
&= y \quad (\because y = \check{Q}_\epsilon x \text{ と書いた})
\end{aligned}
$$

である。だから

$$
\begin{aligned}
V^{(+)}y &= V^{(+)}\left(\check{Q}_\epsilon y\right) \quad (\because \text{上の等式} \check{Q}_\epsilon y = y \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \left(V^{(+)}\check{Q}_\epsilon\right) y \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ q \to 1,\ A \to V^{(+)},\ B \to \check{Q}_\epsilon,\ C \to y) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon\right) y \quad (\because (1) \text{ の第一の鎖}) \\
&= \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}}\left(\check{Q}_\epsilon y\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.18 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ a \to \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}},\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to y)\right) \\
&= \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} y \quad (\because \text{上の等式} \check{Q}_\epsilon y = y)
\end{aligned}
$$

主張 16.9 (5) より $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ は $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ たちの直和である。各 ϵ について $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ の 0 でない元 q_ϵ を任意に取ると、主張 16.9 (4) より $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ は 1 次元なので q_ϵ 1 本が $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ の基底であり、q_ϵ は上の等式 $(y \to q_\epsilon)$ から $\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}}$ に属する固有ベクトル（定義 1.98）である。直和なので、これらを合わせた $\{q_\epsilon\}_\epsilon$ は $V^{(+)}$ の固有ベクトルからなる $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の基底である。本数は $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ の個数 $2^{M_{\mathrm{col}}}$ である。これが主張の基底である。

固有値がどれもある $\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}}$ に等しいこと。$\lambda \in \mathbb{C}$ を $V^{(+)}$ の固有値（定義 1.99）とし、x を λ に属する固有ベクトル（定義 1.98。$x \neq O$ かつ $V^{(+)}x = \lambda x$）とする。$O \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},1,\mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列（零ベクトル）である。各 ϵ について

$$
\begin{aligned}
\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}}\left(\check{Q}_\epsilon x\right) &= \left(\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon\right) x \quad \left(\because \text{ 主張 2.18 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ a \to \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}},\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to x) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\check{Q}_\epsilon V^{(+)}\right) x \quad (\because (1) \text{ の第二の鎖を右辺から左辺へ}) \\
&= \check{Q}_\epsilon\left(V^{(+)}x\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ q \to 1,\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to V^{(+)},\ C \to x)\right) \\
&= \check{Q}_\epsilon\left(\lambda x\right) \quad (\because V^{(+)}x = \lambda x) \\
&= \lambda\left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.19 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ a \to \lambda,\ A \to \check{Q}_\epsilon,\ B \to x)\right)
\end{aligned}
$$

である。全ての ϵ について $\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} \neq \lambda$ と仮定して矛盾を導く。ϵ を任意に取り、$d_\epsilon := \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} - \lambda \in \mathbb{C}$（定義 1.15）とおく。主張 1.56 の加法の群構造より $d_\epsilon = 0$ なら $\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} = d_\epsilon + \lambda = \lambda$ となるので $d_\epsilon \neq 0$ であり、同じ主張の逆元の存在より $d_\epsilon^{-1}d_\epsilon = 1_{\mathbb{C}}$ を満たす $d_\epsilon^{-1} \in \mathbb{C}$ がある。

$$
\begin{aligned}
d_\epsilon\left(\check{Q}_\epsilon x\right) &= \left(\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} - \lambda\right)\left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad (\because d_\epsilon \text{ の置き方}) \\
&= \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}}\left(\check{Q}_\epsilon x\right) - \lambda\left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.38 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 1,\ a \to \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}},\ b \to \lambda,\ A \to \check{Q}_\epsilon x) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \lambda\left(\check{Q}_\epsilon x\right) - \lambda\left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad (\because \text{上の鎖の両端の等式 } \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}}(\check{Q}_\epsilon x) = \lambda(\check{Q}_\epsilon x)) \\
&= O \quad \left(\because \text{ 主張 1.95 の } \Leftarrow\ (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ A,B \to \lambda(\check{Q}_\epsilon x))\right)
\end{aligned}
$$

である。だから

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon x &= 1_{\mathbb{C}}\left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.42 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 1,\ A \to \check{Q}_\epsilon x) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(d_\epsilon^{-1}d_\epsilon\right)\left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad (\because d_\epsilon^{-1}d_\epsilon = 1_{\mathbb{C}} \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= d_\epsilon^{-1}\left(d_\epsilon\left(\check{Q}_\epsilon x\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.41 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 1,\ a \to d_\epsilon^{-1},\ b \to d_\epsilon,\ A \to \check{Q}_\epsilon x) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= d_\epsilon^{-1}O \quad (\because \text{上の鎖 } d_\epsilon(\check{Q}_\epsilon x) = O) \\
&= O \quad \left(\because \text{ 主張 2.12 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 1,\ a \to d_\epsilon^{-1})\right)
\end{aligned}
$$

である。ϵ は任意だったので、全ての ϵ について $\check{Q}_\epsilon x = O$ である。$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ で添字付けられた和は 定義 2.50（$m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 1,\ r \to M_{\mathrm{col}}$）による。

$$
\begin{aligned}
x &= Ix \quad (\because \text{主張 2.16 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 1,\ A \to x) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \left(\sum_{\epsilon} \check{Q}_\epsilon \right) x \quad (\because \text{主張 16.9 (2) を右辺から左辺へ}) \\
&= \sum_{\epsilon} \check{Q}_\epsilon x \quad \left(\because \text{主張 2.56 } (m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ r \to M_{\mathrm{col}},\ X_\epsilon \to \check{Q}_\epsilon,\ C \to x)\right) \\
&= \check{Q}_{(1,\ldots,1)} x \quad (\because \text{主張 2.59 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 1,\ r \to M_{\mathrm{col}},\ \epsilon' \to (1,\ldots,1),\ B_\epsilon \to \check{Q}_\epsilon x) \text{。前提は上で示した} \check{Q}_\epsilon x = O) \\
&= O \quad (\because \text{上で示した } \check{Q}_\epsilon x = O \ (\epsilon \to (1,\ldots,1)))
\end{aligned}
$$

となり、$x \neq O$ に反する。よって $(\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}} = \lambda$ を満たす ϵ がある。

(2) 正値性。ϵ を任意に取る。(1) の a の置き方より $a > 0$（所属は 定義 12.28）である。$\check{g}(\epsilon) \in \mathbb{R}$（主張 16.10 の $\check{g}$ の定義）なので、主張 3.16（$x \to \check{g}(\epsilon)$）より $\exp(\check{g}(\epsilon)) > 0$ である。

$$
\begin{aligned}
\check{\Lambda}_\epsilon &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right) \Big) && (\because\ \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義}) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right) \Big) && (\because \text{定義 12.26 } (i \to 2) \text{ の } s_2 = \sinh 2K_2 \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(\check{g}(\epsilon)) && (\because \text{主張 16.10 の } \check{g}(\epsilon) \text{ の定義を右辺から左辺へ}) \\
&= a \exp(\check{g}(\epsilon)) && (\because\ a \text{ の置き方を右辺から左辺へ}) \\
&> 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } u > 0,\ v > 0 \text{ なら } uv > 0\ (u \to a,\ v \to \exp(\check{g}(\epsilon))) \text{ に前置きの 2 つの不等号を当てる})
\end{aligned}
$$

である。ϵ は任意だったので、全ての ϵ について $\check{\Lambda}_\epsilon > 0$ である。(1) より $V^{(+)}$ の固有値はどれもある ϵ の $(\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}}$ に等しいので、正の実数 $\check{\Lambda}_\epsilon$ を 定義 1.13 で $\mathbb{C}$ へ移した元である。

大小の比較。ϵ を任意に取る。各 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ について $r_\mu := \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\big(1 - \epsilon_\mu\big) \in \mathbb{R}$、$w_\mu := \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\, \epsilon_\mu \in \mathbb{R}$ とおく。主張 15.18 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$、$\epsilon_\mu \in \{0,1\}$ より $1 - \epsilon_\mu \in \{0,1\}$ なので、正の実数と 0 以上の実数の積として $r_\mu \geq 0$、$w_\mu \geq 0$ である。$M_{\mathrm{col}} \geq 2 \geq 1$ なので $1 \in \check{\mathcal{M}}$ である。主張 16.10 の $\check{g}$ について

$$
\begin{aligned}
\check{g}(1,\ldots,1) - \check{g}(\epsilon) &= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(1 - \tfrac{1}{2}\Big) - \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\Big) \quad (\because \text{主張 16.10 の} \check{g} \text{ の定義を 2 か所へ同時適用}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(1 - \tfrac{1}{2}\Big) - \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\Big) \Big) \quad \Big(\because \text{主張 1.22 } (m \to M_{\mathrm{col}},\ a_j \to \gamma(\tilde{\theta}_j)(1 - \tfrac{1}{2}),\ b_j \to \gamma(\tilde{\theta}_j)(\epsilon_j - \tfrac{1}{2})) \text{ を右辺から左辺へ}\Big) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \Big(\Big(1 - \tfrac{1}{2}\Big) - \Big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\Big) \Big) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配法則を各項へ同時適用}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(1 - \epsilon_\mu\Big) \quad (\because \mathbb{R} \text{ で} \big(1 - \tfrac{1}{2}\big) - \big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\big) = 1 - \epsilon_\mu \text{ を各項へ同時適用}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} r_\mu \quad (\because r_\mu \text{ の置き方}) \\
&\geq r_1 \quad (\because \text{主張 1.25 } (m \to M_{\mathrm{col}},\ k \to 1) \text{。} r_\mu \geq 0 \text{ は上で示した}) \\
&\geq 0 \quad (\because r_1 \geq 0 \text{ は上で示した})
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
\check{g}(\epsilon) - \check{g}(0,\dots,0) &= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\Big) - \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(0 - \tfrac{1}{2}\Big) \quad (\because \text{主張 16.10 の} \check{g} \text{ の定義を 2 か所へ同時適用}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\Big) - \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(0 - \tfrac{1}{2}\Big)\Big) \quad \Big(\because \text{主張 1.22 } (m \to M_{\mathrm{col}},\ a_j \to \gamma(\tilde{\theta}_j)(\epsilon_j - \tfrac{1}{2}),\ b_j \to \gamma(\tilde{\theta}_j)(0 - \tfrac{1}{2})) \text{ を右辺から左辺へ}\Big) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(\Big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\Big) - \Big(0 - \tfrac{1}{2}\Big)\Big) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配法則を各項へ同時適用}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\epsilon_\mu \quad (\because \mathbb{R} \text{ で} \big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\big) - \big(0 - \tfrac{1}{2}\big) = \epsilon_\mu \text{ を各項へ同時適用}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} w_\mu \quad (\because w_\mu \text{ の置き方}) \\
&\geq w_1 \quad (\because \text{主張 1.25 } (m \to M_{\mathrm{col}},\ k \to 1) \text{。} w_\mu \geq 0 \text{ は上で示した}) \\
&\geq 0 \quad (\because w_1 \geq 0 \text{ は上で示した})
\end{aligned}
$$

である。だから

$$
\begin{aligned}
&\check{g}(1,\dots,1) - \check{g}(\epsilon) \geq 0 \quad (\because \text{上の第一の鎖}) && \check{g}(\epsilon) - \check{g}(0,\dots,0) \geq 0 \quad (\because \text{上の第二の鎖}) \\
&\implies \check{g}(\epsilon) \leq \check{g}(1,\dots,1) \quad (\because \text{左辺の} \check{g}(\epsilon) \text{ を右辺へ移項}) && \implies \check{g}(0,\dots,0) \leq \check{g}(\epsilon) \quad (\because \text{左辺の} \check{g}(0,\dots,0) \text{ を右辺へ移項})
\end{aligned}
$$

である。$x, y \in \mathbb{R}$ が $x \leq y$ を満たすとき、$x < y$ なら 主張 3.17 より $\exp(x) < \exp(y)$、$x = y$ なら $\exp(x) = \exp(y)$ なので、どちらでも $\exp(x) \leq \exp(y)$ である。これを $\big(x \to \check{g}(\epsilon),\ y \to \check{g}(1,\dots,1)\big)$ と $\big(x \to \check{g}(0,\dots,0),\ y \to \check{g}(\epsilon)\big)$ に当てて $\exp(\check{g}(\epsilon)) \leq \exp(\check{g}(1,\dots,1))$、$\exp(\check{g}(0,\dots,0)) \leq \exp(\check{g}(\epsilon))$ である。(2) の正値性の前置きより $a > 0$ なので

$$
\begin{aligned}
\check{\Lambda}_\epsilon &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\big)\Big) && (\because\ \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義}) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\big(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\big)\Big) && (\because\ \text{定義 12.26 } (i \to 2) \text{ の } s_2 = \sinh 2K_2 \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(\check{g}(\epsilon)) && (\because\ \text{主張 16.10 の } \check{g}(\epsilon) \text{ の定義を右辺から左辺へ}) \\
&= a \exp(\check{g}(\epsilon)) && (\because\ a \text{ の置き方を右辺から左辺へ}) \\
&\leq a \exp(\check{g}(1,\dots,1)) && (\because\ \exp(\check{g}(\epsilon)) \leq \exp(\check{g}(1,\dots,1)) \text{ の両辺に正の実数 } a \text{ を掛ける}) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(\check{g}(1,\dots,1)) && (\because\ a \text{ の置き方}) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\big(1 - \tfrac{1}{2}\big)\Big) && (\because\ \text{主張 16.10 の } \check{g} \text{ の定義 } (\epsilon \to (1,\dots,1))) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\big(1 - \tfrac{1}{2}\big)\Big) && (\because\ \text{定義 12.26 } (i \to 2) \text{ の } s_2 = \sinh 2K_2) \\
&= \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} && (\because\ \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義 } (\epsilon \to (1,\dots,1)) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
\check{\Lambda}_{(0,\dots,0)} &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(0-\tfrac{1}{2}\right)\Big) && (\because\ \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義 } (\epsilon\to(0,\dots,0)))\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(0-\tfrac{1}{2}\right)\Big) && (\because\ \text{定義 12.26 } (i\to 2) \text{ の } s_2=\sinh 2K_2 \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(\check{g}(0,\dots,0)) && (\because\ \text{主張 16.10 の } \check{g} \text{ の定義 } (\epsilon\to(0,\dots,0)) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= a\exp(\check{g}(0,\dots,0)) && (\because\ a \text{ の置き方を右辺から左辺へ})\\
&\le a\exp(\check{g}(\epsilon)) && (\because\ \exp(\check{g}(0,\dots,0))\le\exp(\check{g}(\epsilon)) \text{ の両辺に正の実数 } a \text{ を掛ける})\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(\check{g}(\epsilon)) && (\because\ a \text{ の置き方})\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\right)\Big) && (\because\ \text{主張 16.10 の } \check{g}(\epsilon) \text{ の定義})\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\right)\Big) && (\because\ \text{定義 12.26 } (i\to 2) \text{ の } s_2=\sinh 2K_2)\\
&= \check{\Lambda}_\epsilon && (\because\ \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

である。ϵ は任意だったので、$\check{\Lambda}_\epsilon$ のうち最大のものは全ての $\epsilon_\mu=1$ を取った $\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$、最小のものは全ての $\epsilon_\mu=0$ を取った $\check{\Lambda}_{(0,\dots,0)}$ である。主張のとおり、これを $\check{\Lambda}_{\max}:=\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}\in\mathbb{R}$、$\check{\Lambda}_{\min}:=\check{\Lambda}_{(0,\dots,0)}\in\mathbb{R}$ と書く。値を求める。$\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\in\mathbb{R}$、$\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\in\mathbb{R}$ である（以下 $-\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ は $-\Big(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)$ と読む）。主張 16.10 の $\check{g}$ について

$$
\begin{aligned}
\check{g}(1,\dots,1) &= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(1-\tfrac{1}{2}\Big) && (\because \text{主張 16.10 の}\check{g} \text{ の定義 } (\epsilon\to(1,\dots,1)))\\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2} && (\because\mathbb{R} \text{ で} 1-\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2} \text{ を各項へ同時適用})\\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\tfrac{1}{2}\gamma(\tilde{\theta}_\mu) && (\because\mathbb{R} \text{ の積の交換法則を各項へ同時適用})\\
&= \frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu) && \Big(\because \text{主張 1.24 } \big(m\to M_{\mathrm{col}},\ c\to\tfrac{1}{2},\ j\to\mu,\ x_\mu\to\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\big)\Big)
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
\check{g}(0,\dots,0) &= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(0-\tfrac{1}{2}\Big) && (\because \text{主張 16.10 の}\check{g} \text{ の定義 } (\epsilon\to(0,\dots,0)))\\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\Big(-\tfrac{1}{2}\Big) && (\because\mathbb{R} \text{ で} 0-\tfrac{1}{2}=-\tfrac{1}{2} \text{ を各項へ同時適用})\\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\Big(-\tfrac{1}{2}\Big)\gamma(\tilde{\theta}_\mu) && (\because\mathbb{R} \text{ の積の交換法則を各項へ同時適用})\\
&= \Big(-\frac{1}{2}\Big)\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu) && \Big(\because \text{主張 1.24 } \big(m\to M_{\mathrm{col}},\ c\to-\tfrac{1}{2},\ j\to\mu,\ x_\mu\to\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\big)\Big)\\
&= -\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu) && \Big(\because\mathbb{R} \text{ で}(-a)b=-(ab)\ \big(a\to\tfrac{1}{2},\ b\to\textstyle\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\big)\Big)
\end{aligned}
$$

である。したがって

$$
\begin{aligned}
\check{\Lambda}_{\max} &= \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} && (\because\ \check{\Lambda}_{\max} \text{ の置き方}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\big(1-\tfrac{1}{2}\big)\Big) && (\because\ \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義 } (\epsilon \to (1,\dots,1))) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(\check{g}(1,\dots,1)) && (\because\ \text{主張 16.10 の } \check{g} \text{ の定義 } (\epsilon \to (1,\dots,1)) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big) && (\because\ \text{上の } \check{g}(1,\dots,1) \text{ の鎖})
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
\check{\Lambda}_{\min} &= \check{\Lambda}_{(0,\dots,0)} && (\because\ \check{\Lambda}_{\min} \text{ の置き方}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\big(0-\tfrac{1}{2}\big)\Big) && (\because\ \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義 } (\epsilon \to (0,\dots,0))) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(\check{g}(0,\dots,0)) && (\because\ \text{主張 16.10 の } \check{g} \text{ の定義 } (\epsilon \to (0,\dots,0)) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(-\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big) && (\because\ \text{上の } \check{g}(0,\dots,0) \text{ の鎖})
\end{aligned}
$$

であり、statement の $\check{\Lambda}_{\max}, \check{\Lambda}_{\min}$ の式を得る。積を求める。$b := \frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$ と書く（a は (1) の置き方、$2\sinh 2K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ は 定義 12.28）。

$$
\begin{aligned}
\check{\Lambda}_{\max}\check{\Lambda}_{\min} &= \Big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\Big)\check{\Lambda}_{\min} && (\because\ \text{上の } \check{\Lambda}_{\max} \text{ の鎖}) \\
&= \Big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\Big)\Big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(-\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\Big) && (\because\ \text{上の } \check{\Lambda}_{\min} \text{ の鎖}) \\
&= \Big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(b)\Big)\Big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(-b)\Big) && (\because\ b \text{ の置き方を右辺から左辺へ、2 か所へ同時に}) \\
&= \Big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(b)\Big)\Big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(-b)\Big) && (\because\ \text{定義 12.26 } (i \to 2) \text{ の } s_2 = \sinh 2K_2 \text{ を右辺から左辺へ、2 か所へ同時に}) \\
&= \big(a \exp(b)\big)\big(a \exp(-b)\big) && (\because\ a \text{ の置き方を右辺から左辺へ、2 か所へ同時に}) \\
&= a\Big(\exp(b)\big(a \exp(-b)\big)\Big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の結合律}) \\
&= a\Big(\big(\exp(b)\,a\big) \exp(-b)\Big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の結合律}) \\
&= a\Big(\big(a \exp(b)\big) \exp(-b)\Big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換律}) \\
&= a\Big(a\big(\exp(b) \exp(-b)\big)\Big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の結合律}) \\
&= (aa)\big(\exp(b) \exp(-b)\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の結合律}) \\
&= (aa) \exp\big(b + (-b)\big) && (\because\ \text{主張 3.13 } (K \to \mathbb{R},\ x \to b,\ y \to -b)) \\
&= (aa) \exp(0) && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } b + (-b) = 0) \\
&= (aa) \cdot 1 && (\because\ \text{主張 3.14 } (K \to \mathbb{R})) \\
&= aa && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } u \cdot 1 = u \ (u \to aa)) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because\ a \text{ の置き方、2 か所へ同時に}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because\ \text{定義 12.26 } (i \to 2) \text{ の } s_2 = \sinh 2K_2\text{、2 か所へ同時に}) \\
&= \Big(\sqrt{2\sinh 2K_2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\Big)^{M_{\mathrm{col}}}\Big(\sqrt{2\sinh 2K_2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\Big)^{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \text{定義 12.28、2 か所へ同時に}) \\
&= \Big(\sqrt{2\sinh 2K_2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\ \sqrt{2\sinh 2K_2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\Big)^{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の冪で } (uv)^m = u^m v^m \ \big(u, v \to \sqrt{2\sinh 2K_2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})},\ m \to M_{\mathrm{col}}\big) \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \Big(\big(\sqrt{2\sinh 2K_2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\big)^2\Big)^{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の冪で } y^2 = yy \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \text{定義 1.4 } (x \to 2\sinh 2K_2) \text{ の } y^2 = x)
\end{aligned}
$$

であり、statement の積の式を得る。主張 16.17 の $c = \big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ について、上の鎖の $\check{\Lambda}_{\max}\check{\Lambda}_{\min} = aa$ から

$$
\begin{aligned}
\big(\check{\Lambda}_{\max}\check{\Lambda}_{\min}\big)_{\mathbb{C}} &= (aa)_{\mathbb{C}} && (\because \text{上の鎖の } \check{\Lambda}_{\max}\check{\Lambda}_{\min} = aa)\\
&= a_{\mathbb{C}}\, a_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29 } (a \to a,\ b \to a) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}}\, \big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\big)_{\mathbb{C}} && (\because a \text{ の置き方、2 か所へ同時に})\\
&= cc && (\because \text{主張 16.17 を右辺から左辺へ、2 か所へ同時に})\\
&= (1_{\mathbb{C}}\, c)\, c && (\because \text{主張 1.56 の乗法の単位元 } 1_{\mathbb{C}} z = z\ (z \to c) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= (c^0 c)\, c && (\because \text{定義 1.64 の } z^0 := 1_{\mathbb{C}}\ (z \to c) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= c^1 c && (\because \text{定義 1.64 の } z^{m+1} := z^m z\ (z \to c,\ m \to 0) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= c^2 && (\because \text{定義 1.64 の } z^{m+1} := z^m z\ (z \to c,\ m \to 1) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

である。 □

定理 16.19 ($\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ であり単純固有値)**.** 定義 16.5 の $\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}$ について、次が成り立つ。

- (1) $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$。すなわち $V^{(+)}$ の最大固有値は $\delta = \frac{1}{2}$ に対応する。
- (2) $\epsilon \neq (1, \dots, 1) \implies \check{\Lambda}_{\epsilon} < \check{\Lambda}_{\max}$（狭義の不等号)。
- (3) したがって $\check{\Lambda}_{\max}$ は $V^{(+)}$ の ** 単純固有値 ** である：$\Big\{x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \mid V^{(+)}x = \check{\Lambda}_{\max}x\Big\} = \mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ であり、この空間の次元は 1 である。

単純性は、主張 15.18 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ が ** すべての μ、すべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（臨界点を含む）で ** 成り立つことから従う。

証明. (1) $\delta = \frac{1}{2} \in [0, 1)$ なので 定義 16.4・定義 16.5 を $\delta \to \frac{1}{2}$ で使える。定理 16.18 (2) の $\check{\Lambda}_{\max}$ の表式から始めて、一続きに

$$
\begin{aligned}
\check{\Lambda}_{\max} &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right) && (\because \text{定理 16.18 (2)})\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left(\frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)\right) && (\because \text{主張 14.8 の} \tilde{\theta}_\mu \text{ の定義を各項へ同時適用})\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\big(\theta^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\big)\right) && (\because \text{定義 16.4 } (\delta \to \tfrac{1}{2}) \text{ を右辺から左辺へ、各項へ同時適用})\\
&= \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{定義 16.5 } (\delta \to \tfrac{1}{2}) \text{ を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

である。1 行目の γ と 4 行目の $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ の中の γ は、どちらも 定義 15.11 の同じ関数 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ である。

(2) $\epsilon \neq (1, \dots, 1)$ とすると、ある $\mu_0 \in \check{\mathcal{M}}$ で $\epsilon_{\mu_0} = 0$ である。各 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ について $a_\mu := \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\big(1 - \epsilon_\mu\big) \in \mathbb{R}$ とおく。主張 15.18 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$、$\epsilon_\mu \in \{0, 1\}$ より $1 - \epsilon_\mu \in \{0, 1\}$ なので、正の実数と 0 以上の実数の積として $a_\mu \geq 0$ である。主張 16.10 の $\check{g}$ について

$$
\begin{aligned}
\check{g}(1,\dots,1)-\check{g}(\epsilon) &= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(1-\tfrac{1}{2}\Big)-\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\Big) \quad (\because \text{主張 16.10 の}\check{g}\text{ の定義を 2 か所へ同時適用})\\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(1-\tfrac{1}{2}\Big)-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\Big)\Big) \quad \Big(\because \text{主張 1.22 } (m\to M_{\mathrm{col}},\ a_j\to\gamma(\tilde{\theta}_j)(1-\tfrac{1}{2}),\ b_j\to\gamma(\tilde{\theta}_j)(\epsilon_j-\tfrac{1}{2})) \text{ を右辺から左辺へ}\Big)\\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(\Big(1-\tfrac{1}{2}\Big)-\Big(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\Big)\Big) \quad (\because \mathbb{R}\text{ の分配法則を各項へ同時適用})\\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(1-\epsilon_\mu\Big) \quad (\because \mathbb{R}\text{ で}\big(1-\tfrac{1}{2}\big)-\big(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\big)=1-\epsilon_\mu \text{ を各項へ同時適用})\\
&= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}a_\mu \quad (\because a_\mu\text{ の置き方})\\
&\geq a_{\mu_0} \quad (\because \text{主張 1.25 } (m\to M_{\mathrm{col}},\ k\to\mu_0)\text{。}\ a_\mu\geq 0 \text{ は上で示した})\\
&= \gamma(\tilde{\theta}_{\mu_0})\Big(1-\epsilon_{\mu_0}\Big) \quad (\because a_\mu\text{ の置き方})\\
&= \gamma(\tilde{\theta}_{\mu_0})\cdot 1 \quad (\because \epsilon_{\mu_0}=0\text{ なので}1-\epsilon_{\mu_0}=1)\\
&= \gamma(\tilde{\theta}_{\mu_0}) \quad (\because 1\text{ は}\mathbb{R}\text{ の積の単位元})\\
&> 0 \quad (\because \text{主張 15.18})
\end{aligned}
$$

である。だから

$$
\begin{aligned}
&\check{g}(1,\dots,1)-\check{g}(\epsilon)>0 \quad (\because \text{上の鎖})\\
&\implies \check{g}(\epsilon)<\check{g}(1,\dots,1) \quad (\because \text{左辺の}\check{g}(\epsilon)\text{ を右辺へ移項})\\
&\implies \exp(\check{g}(\epsilon))<\exp(\check{g}(1,\dots,1)) \quad \Big(\because \text{主張 3.17 } \big(x\to\check{g}(\epsilon),\ y\to\check{g}(1,\dots,1)\big)\Big)
\end{aligned}
$$

である。また

$$
\begin{aligned}
(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \quad (\because \text{定義 12.26 の} s_2=\sinh 2K_2)\\
&\in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \text{定義 12.28})
\end{aligned}
$$

である。よって

$$
\begin{aligned}
\check{\Lambda}_\epsilon &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\big(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\big)\Big) \quad (\because \text{定理 16.18 の}\check{\Lambda}_\epsilon\text{ の定義})\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\big(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\big)\Big) \quad (\because \text{定義 12.26 の} s_2=\sinh 2K_2)\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(\check{g}(\epsilon)) \quad (\because \text{主張 16.10 の}\check{g}\text{ の定義})\\
&< (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(\check{g}(1,\dots,1)) \quad (\because \exp(\check{g}(\epsilon))<\exp(\check{g}(1,\dots,1))\text{ の両辺に正の実数}(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\text{ を掛ける})\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\big(1-\tfrac{1}{2}\big)\Big) \quad (\because \text{主張 16.10 の}\check{g}\text{ の定義（}\epsilon\to(1,\dots,1)\text{）})\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\big(1-\tfrac{1}{2}\big)\Big) \quad (\because \text{定義 12.26 の} s_2=\sinh 2K_2)\\
&= \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} \quad (\because \text{定理 16.18 の}\check{\Lambda}_\epsilon\text{ の定義（}\epsilon\to(1,\dots,1)\text{）})\\
&= \check{\Lambda}_{\max} \quad (\because \text{定理 16.18 (2)})
\end{aligned}
$$

である。

(3) $x\in\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ が $V^{(+)}x=\check{\Lambda}_{\max}x$ を満たすとする。$\epsilon'\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ を任意に取り、この固有方程式の両辺に ** 左から $\check{Q}_{\epsilon'}$ を掛ける **。定理 16.18 (1) の左から掛ける形 $\check{Q}_{\epsilon'}V^{(+)}=\check{\Lambda}_{\epsilon'}\check{Q}_{\epsilon'}$ を使うと

$$
\begin{aligned}
\check{\Lambda}_{\epsilon'}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right) &= \left(\check{\Lambda}_{\epsilon'}\check{Q}_{\epsilon'}\right)x \quad \left(\because \text{ 主張 2.18 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p\to 1,\ a\to\check{\Lambda}_{\epsilon'},\ A\to\check{Q}_{\epsilon'},\ B\to x) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \left(\check{Q}_{\epsilon'}V^{(+)}\right)x \quad \left(\because \text{ 定理 16.18 (1) の } \check{Q}_{\epsilon}V^{(+)}=\check{\Lambda}_{\epsilon}\check{Q}_{\epsilon}\ (\epsilon\to\epsilon') \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \check{Q}_{\epsilon'}\left(V^{(+)}x\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ q\to 1,\ A\to\check{Q}_{\epsilon'},\ B\to V^{(+)},\ C\to x)\right)\\
&= \check{Q}_{\epsilon'}\left(\check{\Lambda}_{\max}x\right) \quad (\because V^{(+)}x=\check{\Lambda}_{\max}x)\\
&= \check{\Lambda}_{\max}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.19 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p\to 1,\ a\to\check{\Lambda}_{\max},\ A\to\check{Q}_{\epsilon'},\ B\to x)\right)
\end{aligned}
$$

である。上の鎖の係数 $\check{\Lambda}_{\epsilon'},\check{\Lambda}_{\max}\in\mathbb{R}$ は、定義 1.13 の像 $(\check{\Lambda}_{\epsilon'})_{\mathbb{C}}=(\check{\Lambda}_{\epsilon'},0)$、$(\check{\Lambda}_{\max})_{\mathbb{C}}=(\check{\Lambda}_{\max},0)$ として掛けている（以下も同じ）。いま $\epsilon'\neq(1,\dots,1)$ とする。(2) より $\check{\Lambda}_{\epsilon'}<\check{\Lambda}_{\max}$ なので $\check{\Lambda}_{\epsilon'}\neq\check{\Lambda}_{\max}$ であり、$(\check{\Lambda}_{\epsilon'},0)$ と $(\check{\Lambda}_{\max},0)$ は第 1 成分が違うので相異なる。$d:=(\check{\Lambda}_{\epsilon'})_{\mathbb{C}}-(\check{\Lambda}_{\max})_{\mathbb{C}}\in\mathbb{C}$（定義 1.15）とおく。主張 1.56 の加法の群構造より $d=0$ なら $(\check{\Lambda}_{\epsilon'})_{\mathbb{C}}=d+(\check{\Lambda}_{\max})_{\mathbb{C}}=(\check{\Lambda}_{\max})_{\mathbb{C}}$ となるので $d\neq 0$ であり、同じ主張の逆元の存在より $d^{-1}d=1_{\mathbb{C}}$ を満たす $d^{-1}\in\mathbb{C}$ がある。$O\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},1,\mathbb{C})$ は 定義 1.93 の零行列（零ベクトル）である。

$$
\begin{aligned}
d\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right) &= \left(\check{\Lambda}_{\epsilon'}-\check{\Lambda}_{\max}\right)\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right) \quad (\because d \text{ の置き方})\\
&= \check{\Lambda}_{\epsilon'}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right)-\check{\Lambda}_{\max}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.38 } (m\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n\to 1,\ a\to\check{\Lambda}_{\epsilon'},\ b\to\check{\Lambda}_{\max},\ A\to\check{Q}_{\epsilon'}x) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \check{\Lambda}_{\max}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right)-\check{\Lambda}_{\max}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right) \quad (\because \text{上の鎖の両端の等式 } \check{\Lambda}_{\epsilon'}(\check{Q}_{\epsilon'}x)=\check{\Lambda}_{\max}(\check{Q}_{\epsilon'}x))\\
&= O \quad \left(\because \text{ 主張 1.95 の } \Leftarrow\ (m\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p\to 1,\ A,B\to\check{\Lambda}_{\max}(\check{Q}_{\epsilon'}x))\right)
\end{aligned}
$$

である。だから

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_{\epsilon'}x &= 1_{\mathbb{C}}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.42 } (m\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n\to 1,\ A\to\check{Q}_{\epsilon'}x) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \left(d^{-1}d\right)\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right) \quad (\because d^{-1}d=1_{\mathbb{C}} \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= d^{-1}\left(d\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right)\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.41 } (m\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n\to 1,\ a\to d^{-1},\ b\to d,\ A\to\check{Q}_{\epsilon'}x) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= d^{-1}O \quad (\because \text{上の鎖 } d(\check{Q}_{\epsilon'}x)=O)\\
&= O \quad \left(\because \text{ 主張 2.12 } (m\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n\to 1,\ a\to d^{-1})\right)
\end{aligned}
$$

である。ϵ' は $\epsilon'\neq(1,\dots,1)$ を満たす任意の元だったので、$\epsilon\neq(1,\dots,1)$ を満たす全ての ϵ について $\check{Q}_{\epsilon}x=O$ である。数ベクトル x は 定義 1.6 のとおり $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 行 1 列の行列として扱い、$\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ で添字付けられた和は 定義 2.50（$m\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n\to 1,\ r\to M_{\mathrm{col}}$）による。

$$
\begin{aligned}
x &= Ix \quad \left(\because \text{ 主張 2.16 } (m\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n\to 1,\ A\to x) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \left(\sum_{\epsilon}\check{Q}_{\epsilon}\right)x \quad (\because \text{主張 16.9 (2) を右辺から左辺へ})\\
&= \sum_{\epsilon}\check{Q}_{\epsilon}x \quad \left(\because \text{ 主張 2.56 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p\to 1,\ r\to M_{\mathrm{col}},\ X_{\epsilon}\to\check{Q}_{\epsilon},\ C\to x)\right)\\
&= \check{Q}_{(1,\dots,1)}x \quad \left(\because \text{ 主張 2.59 } (m\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n\to 1,\ r\to M_{\mathrm{col}},\ \epsilon'\to(1,\dots,1),\ B_{\epsilon}\to\check{Q}_{\epsilon}x)\text{。前提は上で示した}\check{Q}_{\epsilon}x=O\right)
\end{aligned}
$$

とくに $x\in\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ である（$\mathrm{im}\,Q:=\{Qz\mid z\in\mathbb{C}^n\}$ は 主張 8.5 の定義。$n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ Q\to\check{Q}_{(1,\dots,1)}$）。逆に $y\in\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ とすると、$y=\check{Q}_{(1,\dots,1)}z$ を満たす $z\in\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ があり

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_{(1,\dots,1)}y &= \check{Q}_{(1,\dots,1)}\left(\check{Q}_{(1,\dots,1)}z\right) \quad (\because y=\check{Q}_{(1,\dots,1)}z)\\
&= \left(\check{Q}_{(1,\dots,1)}\check{Q}_{(1,\dots,1)}\right)z \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ q\to 1,\ A,B\to\check{Q}_{(1,\dots,1)},\ C\to z) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \left(\left(I\check{Q}_{(1,\dots,1)}\right)\check{Q}_{(1,\dots,1)}\right)z \quad \left(\because \text{ 主張 2.16 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A\to\check{Q}_{(1,\dots,1)}) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \left(\left(\check{Q}^{0}_{(1,\dots,1)}\check{Q}_{(1,\dots,1)}\right)\check{Q}_{(1,\dots,1)}\right)z \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^0:=I\ (A\to\check{Q}_{(1,\dots,1)}) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \left(\check{Q}^{1}_{(1,\dots,1)}\check{Q}_{(1,\dots,1)}\right)z \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1}:=A^mA\ (m\to 0,\ A\to\check{Q}_{(1,\dots,1)}) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \check{Q}^{2}_{(1,\dots,1)}z \quad \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1}:=A^mA\ (m\to 1,\ A\to\check{Q}_{(1,\dots,1)}) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \check{Q}_{(1,\dots,1)}z \quad \left(\because \text{ 主張 16.9 (1) の } \check{Q}^{2}_{\epsilon}=\check{Q}_{\epsilon}\ (\epsilon\to(1,\dots,1))\right)\\
&= y \quad (\because y=\check{Q}_{(1,\dots,1)}z)
\end{aligned}
$$

である。だから

$$
\begin{aligned}
V^{(+)}y &= V^{(+)}\left(\check{Q}_{(1,\dots,1)}y\right) \quad (\because \text{上の等式 } \check{Q}_{(1,\dots,1)}y = y \text{ を右辺から左辺へ}) \\
&= \left(V^{(+)}\check{Q}_{(1,\dots,1)}\right)y \quad \left(\because \text{ 主張 2.15 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ q \to 1,\ A \to V^{(+)},\ B \to \check{Q}_{(1,\dots,1)},\ C \to y) \text{ を右辺から左辺へ}\right) \\
&= \left(\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}\check{Q}_{(1,\dots,1)}\right)y \quad \left(\because \text{ 定理 16.18 (1) の } V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon\ (\epsilon \to (1,\dots,1))\right) \\
&= \left(\check{\Lambda}_{\max}\check{Q}_{(1,\dots,1)}\right)y \quad (\because \text{定理 16.18 (2)}) \\
&= \check{\Lambda}_{\max}\left(\check{Q}_{(1,\dots,1)}y\right) \quad \left(\because \text{ 主張 2.18 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ p \to 1,\ a \to \check{\Lambda}_{\max},\ A \to \check{Q}_{(1,\dots,1)},\ B \to y)\right) \\
&= \check{\Lambda}_{\max}y \quad (\because \text{上の等式 } \check{Q}_{(1,\dots,1)}y = y)
\end{aligned}
$$

である。よって固有値 $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有空間は $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ に一致し、主張 16.9 (4) よりその次元は 1 である。 □

主張 16.20 ($V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon$ と $\max_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon = \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} = \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 13.29 の $V^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、定義 15.30 の $\check{n}_\mu \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ ($\mu \in \check{\mathcal{M}}$、定義 14.15)、定義 15.11 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$ ($\mathbb{R}$ に住むのは、定義 15.1 が逆双曲線余弦を実対数で定めるため)、$I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対する 主張 16.9 の $\check{Q}_\epsilon \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と 定理 16.18 の $\check{\Lambda}_\epsilon \in \mathbb{R}$、定義 16.5 の $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}$ (この二つが $\mathbb{R}$ に住むのは、実数 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ の和を実数の指数関数に入れ、$2\sinh 2K_2 > 0$ の実数冪を掛けた値だから) について、次が成り立つ。

- (1) $V^{(+)} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I\right)\right)$。すなわち 主張 15.31 の式は $c = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ で成り立つ。
- (2) $V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon \quad \left(\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\right)$
- (3) $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} = \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)$
- (4) $\epsilon \neq (1,\dots,1) \implies \check{\Lambda}_\epsilon < \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$。とくに $\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ は族 $(\check{\Lambda}_\epsilon)_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}}$ の 定義 1.26 の意味の最大値であり、定義 1.28 の記号で $\max_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}}\check{\Lambda}_\epsilon = \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ である。

証明. (1)

$$
\begin{aligned}
V^{(+)} &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\,\check{V}' && (\because \text{ 主張 16.17}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\left(\check{X}\right) && (\because \text{ 定義 15.25 の } \check{V}' := \exp(\check{X})) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{\psi}^\dagger_\mu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \frac{1}{2}I\right)\right) && (\because \text{ 定義 15.25 の } \check{X} \text{ の定義}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I\right)\right) && (\because \text{ 定義 15.30 の } \check{n}_\mu := \check{\psi}^\dagger_\mu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})
\end{aligned}
$$

(2)

$$V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon \qquad (\because \text{ 定理 16.18 (1)})$$

(3)

$$
\begin{aligned}
\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} &= \check{\Lambda}_{\max} && (\because \text{ 定理 16.19 (1) を右辺から左辺へ}) \\
&= \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} && (\because \text{ 定理 16.18 (2) の } \check{\Lambda}_{\max} := \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)})
\end{aligned}
$$

であり、

$$\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} = \check{\Lambda}_{\max} \qquad (\because \text{ 定理 16.18 (2) の } \check{\Lambda}_{\max} := \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} \text{ を右辺から左辺へ})$$
$$= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right) \quad (\because \text{ 定理 16.18 (2) の } \check{\Lambda}_{\max} \text{ の値})$$

である。

(4) $\epsilon \neq (1,\dots,1)$ とする。

$$\check{\Lambda}_\epsilon < \check{\Lambda}_{\max} \qquad (\because \text{ 定理 16.19 (2)})$$
$$= \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} \quad (\because \text{ 定理 16.18 (2) の } \check{\Lambda}_{\max} := \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)})$$

$\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ が族 $(\check{\Lambda}_\epsilon)_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}}$ の最大値であることを、定義 1.26 の (1)(2) で示す。(1) $(1,\dots,1) \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ について $\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} = \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ である。(2) $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ を取る。$\epsilon = (1,\dots,1)$ のとき

$$\check{\Lambda}_\epsilon = \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} \qquad (\because\ \epsilon = (1,\dots,1))$$

なので $\check{\Lambda}_\epsilon \leq \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ である。$\epsilon \neq (1,\dots,1)$ のとき

$$\check{\Lambda}_\epsilon < \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} \qquad (\because \text{ (4) の前半の鎖})$$

なので $\check{\Lambda}_\epsilon \leq \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ である。よって $\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ は族 $(\check{\Lambda}_\epsilon)_\epsilon$ の最大値であり、

$$\max_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{\Lambda}_\epsilon = \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} \qquad (\because \text{ 定義 1.28 と 主張 1.27})$$

である。 □

17 $V^{(+)}$ の最大固有値に属する固有ベクトル

注意 17.1 ($\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$ を示す道筋)**.** 定理 16.19 により $V^{(+)}$ の最大固有値 $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ は ** 単純 ** であり、その固有空間は $\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ である。以下では、$\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ が 定義 13.18 の $\mathcal{F}^{(+)}$ に含まれること（ε の固有値が $+1$ であること）を示す。$V^{(+)}$ は $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ 全体の上の行列であり、その $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の固有値に対応する固有ベクトルのうち、$\mathcal{F}^{(+)}$ に属するのは半分だけである。最大固有値の固有ベクトルが $\mathcal{F}^{(+)}$ に属するかどうかは、固有値の値 $\check{\Lambda}_\epsilon$ からは読み取れない。

筋は次のとおりである（ε は 定義 13.15 の $\sigma_1^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x$、$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ は 主張 16.9 の添字である。** 字体が違うだけの別物なので注意する **)。

- (i) ε は Z_j, Y_j と反可換なので $\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu$ とも反可換であり、したがって $\check{n}_\mu$ とは ** 可換 ** である（主張 17.2)。
- (ii) $\mathrm{im}\,\check{Q}_\epsilon$ は 1 次元なので $\varepsilon\check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon$ ($\eta_\epsilon \in \{+1,-1\}$)。しかも $\check{\psi}_\mu^\dagger$ が ϵ_μ を 0 から 1 へ移し、かつ ε と反可換なので、成分を 1 つ変えるたびに η の符号が反転する（主張 17.3)。
- (iii) したがって $\mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big) = \eta_{(1,\dots,1)}\,\varkappa_{\mathbb{C}}$（$\varkappa := (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\sinh\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)$）であり、$\varkappa$ は ** 正の実数 ** である（主張 17.4)。
- (iv) 一方 $\mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big)$ は転送行列の側で ** 直接計算できる **：$\mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big) = (2\exp(-K_2)\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} > 0$（定理 17.16)。使うのは 1 次元開鎖のスピン和だけである。
- (v) 両者を比べて $\eta_{(1,\dots,1)} = +1$、すなわち最大固有ベクトルは $\mathcal{F}^{(+)}$ に属する（定理 17.17)。

主張 17.2 (ε は$\check{Z},\check{Y},\check{\psi}$ と反可換)**.** $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 14.15）とする。定義 13.15 の $\varepsilon=\sigma^x_1\cdots\sigma^x_{M_{\mathrm{col}}}$ について次が成り立つ。

- (1) $\varepsilon\, Z_j=-Z_j\,\varepsilon,\qquad \varepsilon\, Y_j=-Y_j\,\varepsilon\qquad (j\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\})$
- (2) $\varepsilon\,\check{Z}_\mu=-\check{Z}_\mu\,\varepsilon,\qquad \varepsilon\,\check{Y}_\mu=-\check{Y}_\mu\,\varepsilon$
- (3) $\varepsilon\,\check{\psi}^\dagger_\mu=-\check{\psi}^\dagger_\mu\,\varepsilon,\qquad \varepsilon\,\check{\psi}_\mu=-\check{\psi}_\mu\,\varepsilon$
- (4) $\varepsilon\,\check{n}_\mu=\check{n}_\mu\,\varepsilon,\qquad \varepsilon\,\check{Q}_\epsilon=\check{Q}_\epsilon\,\varepsilon\qquad \Big(\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\Big)$

（$\check{n}_\mu$ は 定義 15.30、$\check{Q}_\epsilon$ は 主張 16.9。）

証明. (1) 主張 13.9 と 主張 13.10 を $m\to j$ で引いたものである（$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}\subset\mathbb{Z}_{\geq 1}$。主張 (1)(2)(3) の右辺の $-Z_j\,\varepsilon$ などは $-\big(Z_j\,\varepsilon\big)$ の意味である）。

(2) $(\check{W}_\mu,W)$ を $(\check{Z}_\mu,Z)$ と $(\check{Y}_\mu,Y)$ のどちらかとし、$\check{Z}_\mu$ の場合は 定義 14.9、$\check{Y}_\mu$ の場合は 定義 14.10 を「$\check{W}_\mu$ の定義」と呼ぶ。$j\in\{1,\dots,(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}\}$ について $c_j:=\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}})\in\mathbb{C}$ と書く（$(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$、$j_{\mathbb{Z}}$、$j_{\mathbb{R}}$ は $\check{W}_\mu$ の定義の記号）。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,\check{W}_\mu &= \varepsilon\sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\big(c_jW_{j_{\mathbb{Z}}}\big) && (\because\ \check{W}_\mu\text{ の定義})\\
&= \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\Big(\varepsilon\big(c_jW_{j_{\mathbb{Z}}}\big)\Big) && (\because\ \text{主張 2.37 } (C\to\varepsilon))\\
&= \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\Big(c_j\big(\varepsilon\,W_{j_{\mathbb{Z}}}\big)\Big) && (\because\ \text{主張 2.19 を各項へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\Big(c_j\Big(-\big(W_{j_{\mathbb{Z}}}\,\varepsilon\big)\Big)\Big) && (\because\ (1)\text{ を}j\to j_{\mathbb{Z}}\text{ で各項へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\Big(-\Big(c_j\big(W_{j_{\mathbb{Z}}}\,\varepsilon\big)\Big)\Big) && (\because\ \text{主張 2.26 を各項へ同時適用})\\
&= \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\Big(-\Big(\big(c_jW_{j_{\mathbb{Z}}}\big)\varepsilon\Big)\Big) && (\because\ \text{主張 2.18 を各項へ同時適用})\\
&= -\sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\Big(\big(c_jW_{j_{\mathbb{Z}}}\big)\varepsilon\Big) && (\because\ \text{主張 2.29})\\
&= -\left(\left(\sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\big(c_jW_{j_{\mathbb{Z}}}\big)\right)\varepsilon\right) && (\because\ \text{主張 2.36 } (C\to\varepsilon))\\
&= -\big(\check{W}_\mu\,\varepsilon\big) && (\because\ \check{W}_\mu\text{ の定義})
\end{aligned}
$$

(3) (Ψ,p,q) を 定義 15.21 の第二の式の二つの組 $\big(\check{\psi}^\dagger_\mu,\ \frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b},\ \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}}\big)$ と $\big(\check{\psi}_\mu,\ \frac{+r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b},\ \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}}\big)$ のどちらかとする（$p,q\in\mathbb{C}$ はその式の係数で、$\Psi=p\check{Z}_\mu+q\check{Y}_\mu$）。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,\Psi &= \varepsilon\big(p\check{Z}_\mu + q\check{Y}_\mu\big) && (\because \text{定義 15.21})\\
&= \varepsilon\big(p\check{Z}_\mu\big) + \varepsilon\big(q\check{Y}_\mu\big) && (\because \text{主張 2.23})\\
&= p\big(\varepsilon\,\check{Z}_\mu\big) + q\big(\varepsilon\,\check{Y}_\mu\big) && (\because \text{主張 2.19 を 2 項へ同時適用})\\
&= p\Big(-\big(\check{Z}_\mu\,\varepsilon\big)\Big) + q\Big(-\big(\check{Y}_\mu\,\varepsilon\big)\Big) && (\because \text{(2) を 2 項へ同時適用})\\
&= \Big(-\Big(p\big(\check{Z}_\mu\,\varepsilon\big)\Big)\Big) + \Big(-\Big(q\big(\check{Y}_\mu\,\varepsilon\big)\Big)\Big) && (\because \text{主張 2.26 を 2 項へ同時適用})\\
&= \Big(-\Big(\big(p\check{Z}_\mu\big)\varepsilon\Big)\Big) + \Big(-\Big(\big(q\check{Y}_\mu\big)\varepsilon\Big)\Big) && (\because \text{主張 2.18 を 2 項へ同時適用})\\
&= -\Big(\big(p\check{Z}_\mu\big)\varepsilon + \big(q\check{Y}_\mu\big)\varepsilon\Big) && (\because \text{主張 2.28 を右辺から左辺へ})\\
&= -\Big(\big(p\check{Z}_\mu + q\check{Y}_\mu\big)\varepsilon\Big) && (\because \text{主張 2.24})\\
&= -\big(\Psi\,\varepsilon\big) && (\because \text{定義 15.21})
\end{aligned}
$$

(4) 定義 14.15 (2) より $M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、(3) は $\varepsilon\,\check{\psi}^\dagger_\mu = -\big(\check{\psi}^\dagger_\mu\,\varepsilon\big)$ と $\varepsilon\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = -\big(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,\varepsilon\big)$ を与える。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,\check{n}_\mu &= \varepsilon\big(\check{\psi}^\dagger_\mu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\big) && (\because \text{定義 15.30})\\
&= \big(\check{\psi}^\dagger_\mu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\big)\varepsilon && (\because \text{主張 2.68 } (G \to \varepsilon,\ X \to \check{\psi}^\dagger_\mu,\ Y \to \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\text{。仮定は上の (3) の 2 式})\\
&= \check{n}_\mu\,\varepsilon && (\because \text{定義 15.30})
\end{aligned}
$$

$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ とし、$\nu \in \check{\mathcal{M}}$ について 主張 16.9 の $\check{Q}_\epsilon$ の定義の因子を $A_\nu := \epsilon_\nu\,\check{n}_\nu + (1-\epsilon_\nu)\,(I - \check{n}_\nu)$ と書く（ϵ_ν・$1-\epsilon_\nu$ はその定義のスカラー）。まず ε は I と可換である。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,I &= \varepsilon && (\because \text{主張 2.17})\\
&= I\,\varepsilon && (\because \text{主張 2.16})
\end{aligned}
$$

これと上の $\varepsilon\,\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\,\varepsilon$（$\mu \to \nu$）から、次の 3 式が成り立つ。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,(I - \check{n}_\nu) &= (I - \check{n}_\nu)\,\varepsilon && (\because \text{主張 2.71 } (G \to \varepsilon,\ X \to I,\ W \to \check{n}_\nu)\text{。仮定は}\varepsilon I = I\varepsilon \text{ と} \varepsilon\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\varepsilon)\\
\varepsilon\big(\epsilon_\nu\,\check{n}_\nu\big) &= \big(\epsilon_\nu\,\check{n}_\nu\big)\varepsilon && (\because \text{主張 2.69 } (G \to \varepsilon,\ c \to \epsilon_\nu,\ X \to \check{n}_\nu)\text{。仮定は}\varepsilon\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\varepsilon)\\
\varepsilon\Big(\big(1-\epsilon_\nu\big)\,\big(I - \check{n}_\nu\big)\Big) &= \Big(\big(1-\epsilon_\nu\big)\,\big(I - \check{n}_\nu\big)\Big)\varepsilon && (\because \text{主張 2.69 } (G \to \varepsilon,\ c \to 1-\epsilon_\nu,\ X \to I - \check{n}_\nu)\text{。仮定は 1 行目})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,A_\nu &= \varepsilon\Big(\epsilon_\nu\,\check{n}_\nu + \big(1-\epsilon_\nu\big)\,\big(I - \check{n}_\nu\big)\Big) && (\because A_\nu \text{ の置き方})\\
&= \varepsilon\big(\epsilon_\nu\,\check{n}_\nu\big) + \varepsilon\Big(\big(1-\epsilon_\nu\big)\,\big(I - \check{n}_\nu\big)\Big) && (\because \text{主張 2.23})\\
&= \big(\epsilon_\nu\,\check{n}_\nu\big)\varepsilon + \Big(\big(1-\epsilon_\nu\big)\,\big(I - \check{n}_\nu\big)\Big)\varepsilon && (\because \text{上の 3 式の 2 行目と 3 行目を 2 項へ同時適用})\\
&= \Big(\epsilon_\nu\,\check{n}_\nu + \big(1-\epsilon_\nu\big)\,\big(I - \check{n}_\nu\big)\Big)\varepsilon && (\because \text{主張 2.24})\\
&= A_\nu\,\varepsilon && (\because A_\nu \text{ の置き方})
\end{aligned}
$$

がすべての $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ で成り立ち、

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,\check{Q}_\epsilon &= \varepsilon \prod_{\nu=1}^{M_{\mathrm{col}}} A_\nu \qquad (\because \text{主張 16.9 の}\check{Q}_\epsilon \text{ の定義と}A_\nu \text{ の置き方}) \\
&= \Big(\prod_{\nu=1}^{M_{\mathrm{col}}} A_\nu\Big)\varepsilon \quad (\because \text{主張 2.61 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ X \to \varepsilon,\ A_j \to A_\nu)) \\
&= \check{Q}_\epsilon\,\varepsilon \qquad (\because \text{主張 16.9 の}\check{Q}_\epsilon \text{ の定義と}A_\nu \text{ の置き方})
\end{aligned}
$$

□

主張 17.3 ($\varepsilon\check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon\check{Q}_\epsilon$ と符号の反転則)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対し $|\epsilon| := \#\{\mu \in \check{\mathcal{M}} \mid \epsilon_\mu = 1\}$ とおく。次が成り立つ。

- (1) $\exists!\,\eta_\epsilon \in \{+1,-1\}:\quad \varepsilon\,\check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon\,\check{Q}_\epsilon$
- (2) $\epsilon_\mu = 0 \implies \eta_{\epsilon[\mu\to 1]} = -\eta_\epsilon$。ここで $\epsilon[\mu \to 1]$ は ϵ の第 μ 成分だけを 1 に取り替えたもの。
- (3) $\eta_\epsilon = \eta_{(1,\dots,1)}\,(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}$
- (4) $\varepsilon = \eta_{(1,\dots,1)}\,(-1)^{M_{\mathrm{col}}}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}(I - 2\check{n}_\mu)$

** この段階では $\eta_{(1,\dots,1)}$ の値は決まっていない。** それを決めるのが 定理 17.16 と 定理 17.17 である。

証明. (1) 主張 16.9 (4) より $\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im}\check{Q}_\epsilon = 1$ なので、$\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon = \mathbb{C}q$ なる $q \neq 0$ が取れる。$q \in \operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ なので $q = \check{Q}_\epsilon x$ なる $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ が取れる。まず $\check{Q}_\epsilon q = q$ を確かめる。

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon q &= \check{Q}_\epsilon\left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad (\because q = \check{Q}_\epsilon x \text{ の置き方}) \\
&= \left(\check{Q}_\epsilon\check{Q}_\epsilon\right)x \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \check{Q}_\epsilon x \quad (\because \text{主張 16.9 (1) の}\check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon) \\
&= q \quad (\because q = \check{Q}_\epsilon x \text{ の置き方})
\end{aligned}
$$

次に 主張 17.2 (4) より $\varepsilon\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon\varepsilon$ だから

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon\,(\varepsilon q) &= \left(\check{Q}_\epsilon\varepsilon\right)q \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \left(\varepsilon\check{Q}_\epsilon\right)q \quad (\because \text{主張 17.2 (4)}) \\
&= \varepsilon\left(\check{Q}_\epsilon q\right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \varepsilon q \quad (\because \text{上で示した}\check{Q}_\epsilon q = q)
\end{aligned}
$$

よって $\varepsilon q \in \operatorname{im}\check{Q}_\epsilon = \mathbb{C}q$ であり、$\varepsilon q = \eta q$ なる $\eta \in \mathbb{C}$ が一意に定まる（$q \neq 0$）。次の式変形で $\eta^2 = 1$ を示す。

$$
\begin{aligned}
q &= Iq \quad (\because \text{主張 2.16}) \\
&= (\varepsilon\varepsilon)\,q \quad (\because \text{主張 13.19 の}\varepsilon^2 = I) \\
&= \varepsilon\,(\varepsilon q) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \varepsilon\,(\eta q) \quad (\because \varepsilon q = \eta q \text{ の置き方}) \\
&= \eta\,(\varepsilon q) \quad (\because \text{主張 2.19}) \\
&= \eta\,(\eta q) \quad (\because \varepsilon q = \eta q \text{ の置き方}) \\
&= (\eta\eta)\,q \quad (\because \text{主張 2.41})
\end{aligned}
$$

上の式変形の両端から $q = (\eta\eta)q$ である。これを使うと

$$
\begin{aligned}
(\eta\eta - 1)\, q &= (\eta\eta)q - 1q \quad (\because \text{主張 2.38}) \\
&= q - 1q \quad (\because \text{上の式変形の} q = (\eta\eta)q) \\
&= q - q \quad (\because \text{主張 2.42}) \\
&= O \quad (\because \text{主張 1.95})
\end{aligned}
$$

$q \neq 0$ なので $q_k \neq 0$ となる $k \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ が取れ、上の式の第 k 成分は 定義 2.3 より $(\eta\eta - 1)\, q_k = 0$ である。主張 1.56 より $\mathbb{C}$ は体なので $\eta\eta - 1 = 0$ であり、

$$
\begin{aligned}
(\eta - 1)(\eta + 1) &= (\eta - 1)\eta + (\eta - 1) \cdot 1 \quad (\because \text{主張 1.56 の分配則}) \\
&= (\eta\eta - \eta) + (\eta - 1) \quad (\because \text{主張 1.56 の分配則と乗法の単位元}) \\
&= \eta\eta - 1 \quad (\because \text{主張 1.56 の加法の結合則と逆元}) \\
&= 0 \quad (\because \text{上で示した} \eta\eta - 1 = 0)
\end{aligned}
$$

より、体 $\mathbb{C}$ では $\eta - 1 = 0$ または $\eta + 1 = 0$、すなわち $\eta \in \{+1, -1\}$ である。

次に行列の等式を示す。$x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ とする。$\check{Q}_\epsilon x \in \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon = \mathbb{C}q$ なので $\check{Q}_\epsilon x = cq$ なる $c \in \mathbb{C}$ が取れ、

$$
\begin{aligned}
\left(\varepsilon \check{Q}_\epsilon\right) x &= \varepsilon \left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \varepsilon\,(cq) \quad (\because \check{Q}_\epsilon x = cq \text{ の置き方}) \\
&= c\,(\varepsilon q) \quad (\because \text{主張 2.19}) \\
&= c\,(\eta q) \quad (\because \varepsilon q = \eta q \text{ の置き方}) \\
&= (c\eta) q \quad (\because \text{主張 2.41}) \\
&= (\eta c) q \quad (\because \text{主張 1.56 の乗法の交換則}) \\
&= \eta\,(cq) \quad (\because \text{主張 2.41}) \\
&= \eta \left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad (\because \check{Q}_\epsilon x = cq \text{ の置き方}) \\
&= \left(\eta \check{Q}_\epsilon\right) x \quad (\because \text{主張 2.18})
\end{aligned}
$$

である。$N := 2^{M_{\mathrm{col}}}$、$e_k$ を I の第 k 列（定義 2.2）とすると $I = [\, e_1 \ \cdots \ e_N \,]$ であり、上の等式を $x \to e_1, \ldots, e_N$ に使うと

$$
\begin{aligned}
\varepsilon \check{Q}_\epsilon &= \left(\varepsilon \check{Q}_\epsilon\right) I \quad (\because \text{主張 2.17}) \\
&= \left(\varepsilon \check{Q}_\epsilon\right) [\, e_1 \ \cdots \ e_N \,] \quad (\because I = [\, e_1 \ \cdots \ e_N \,]) \\
&= \left[\, \left(\varepsilon \check{Q}_\epsilon\right) e_1 \ \cdots \ \left(\varepsilon \check{Q}_\epsilon\right) e_N \,\right] \quad (\because \text{定理 1.7}) \\
&= \left[\, \left(\eta \check{Q}_\epsilon\right) e_1 \ \cdots \ \left(\eta \check{Q}_\epsilon\right) e_N \,\right] \quad (\because \text{上の等式を} N \text{ 箇所へ同時適用}) \\
&= \left(\eta \check{Q}_\epsilon\right) [\, e_1 \ \cdots \ e_N \,] \quad (\because \text{定理 1.7}) \\
&= \left(\eta \check{Q}_\epsilon\right) I \quad (\because I = [\, e_1 \ \cdots \ e_N \,]) \\
&= \eta \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 2.17})
\end{aligned}
$$

一意性を示す。$\eta' \in \{+1, -1\}$ が $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \eta' \check{Q}_\epsilon$ を満たすとすると

$$
\begin{aligned}
\eta' q &= \eta' \left(\check{Q}_\epsilon q\right) \quad (\because \text{上で示した} \check{Q}_\epsilon q = q) \\
&= \left(\eta' \check{Q}_\epsilon\right) q \quad (\because \text{主張 2.18}) \\
&= \left(\varepsilon \check{Q}_\epsilon\right) q \quad (\because \eta' \text{ の仮定}) \\
&= \varepsilon \left(\check{Q}_\epsilon q\right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \varepsilon q \quad (\because \text{上で示した} \check{Q}_\epsilon q = q) \\
&= \eta q \quad (\because \varepsilon q = \eta q \text{ の置き方})
\end{aligned}
$$

であり、$q \neq 0$ だから $\varepsilon q = \eta q$ なる η の一意性より $\eta' = \eta$。この η を η_ϵ と書く。

(2) $\epsilon_\mu = 0$ とし、$\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ の 0 でない元を 1 つ取って q とする。主張 16.9 (1) の冪等性より $\check{Q}_\epsilon q = q$ である。(1) より

$$\begin{aligned}
\varepsilon q &= \varepsilon \left(\check{Q}_\epsilon q \right) \quad (\because \check{Q}_\epsilon q = q) \\
&= \left(\varepsilon \check{Q}_\epsilon \right) q \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \left(\eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon \right) q \quad (\because (1)) \\
&= \eta_\epsilon \left(\check{Q}_\epsilon q \right) \quad (\because \text{主張 2.18}) \\
&= \eta_\epsilon q \quad (\because \check{Q}_\epsilon q = q)
\end{aligned}$$

である。** 以下で使うのは $q \neq 0$ と $\check{Q}_\epsilon q = q$ だけであり、$\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ や $\operatorname{im} \check{Q}_{\epsilon[\mu \to 1]}$ が 1 次元であることは使わない **（1 次元性が要るのは (1) の η_ϵ の存在を出すところだけである）。

Step 1（$\check{\psi}_\mu^\dagger q \neq 0$）。$\epsilon_\mu = 0$ なので

$$\begin{aligned}
\check{n}_\mu q &= \check{n}_\mu \left(\check{Q}_\epsilon q \right) \quad (\because \check{Q}_\epsilon q = q) \\
&= \left(\check{n}_\mu \check{Q}_\epsilon \right) q \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \left(\epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon \right) q \quad (\because \text{主張 16.9 (3)}) \\
&= \left(0_{\mathbb{C}} \check{Q}_\epsilon \right) q \quad (\because \epsilon_\mu = 0) \\
&= O q \quad (\because \text{主張 2.13}) \\
&= 0 \quad (\because \text{主張 2.46})
\end{aligned}$$

である。これと 主張 16.6 (2) の $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger = I - \check{n}_\mu$ を使うと

$$\begin{aligned}
\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q \right) &= \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger \right) q \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \left(I - \check{n}_\mu \right) q \quad (\because \text{主張 16.6 (2)}) \\
&= I q - \check{n}_\mu q \quad (\because \text{主張 1.96}) \\
&= q - \check{n}_\mu q \quad (\because \text{主張 2.16}) \\
&= q - 0 \quad (\because \text{上の} \check{n}_\mu q = 0) \\
&= q \quad (\because \text{主張 2.10})
\end{aligned}$$

である。仮に $\check{\psi}_\mu^\dagger q = 0$ とすると

$$\begin{aligned}
q &= \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q \right) \quad (\because \text{上の式変形}) \\
&= \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} 0 \quad (\because \text{仮定} \check{\psi}_\mu^\dagger q = 0) \\
&= 0 \quad (\because \text{主張 2.47})
\end{aligned}$$

となって $q \neq 0$ に反する。よって $\check{\psi}_\mu^\dagger q \neq 0$。

Step 2（$\check{Q}_{\epsilon'} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q \right) = \check{\psi}_\mu^\dagger q$、$\epsilon' := \epsilon[\mu \to 1]$）。まず $\check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger$ を示す。

$$
\begin{aligned}
\check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{定義 15.30}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger\right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(I - \check{n}_\mu\right) \quad (\because \text{主張 16.6 (2)}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(I + (-\check{n}_\mu)\right) \quad (\because \text{主張 2.30}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger I + \check{\psi}_\mu^\dagger (-\check{n}_\mu) \quad (\because \text{主張 2.23}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger I + \left(-\left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\mu\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.21}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger I - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\mu \quad (\because \text{主張 2.30}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\mu \quad (\because \text{主張 2.17}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger - \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad (\because \text{定義 15.30}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger - \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger - O\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \text{主張 16.6 (1) の } \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2 = O) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger - O \quad (\because \text{主張 2.46}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{主張 2.10})
\end{aligned}
$$

$\delta \in \{\epsilon, \epsilon'\}$ と $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ について $A_\nu^\delta := \delta_\nu \check{n}_\nu + (1 - \delta_\nu)(I - \check{n}_\nu)$ とおく。主張 16.9 の $\check{Q}_\delta$ の定義により $\check{Q}_\delta = \prod_{\nu=1}^{M_{\mathrm{col}}} A_\nu^\delta$ である。$\nu \neq \mu$ では $\epsilon'_\nu = \epsilon_\nu$ なので $A_\nu^{\epsilon'} = A_\nu^\epsilon$ であり、以下これを A_ν と書く。μ 番目の因子は、$\epsilon_\mu = 0$ から

$$
\begin{aligned}
A_\mu^\epsilon &= 0_{\mathbb{C}} \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} - 0_{\mathbb{C}})(I - \check{n}_\mu) \quad (\because \epsilon_\mu = 0) \\
&= 0_{\mathbb{C}} \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + (-(0_{\mathbb{C}})))(I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{定義 1.15}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{C}}) \cdot 0_{\mathbb{C}})(I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{定義 1.14}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + 0_{\mathbb{C}})(I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{主張 1.59}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} \check{n}_\mu + 1_{\mathbb{C}} (I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{主張 1.56 の加法の単位元}) \\
&= O + 1_{\mathbb{C}} (I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{主張 2.13}) \\
&= O + (I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{主張 2.42}) \\
&= I - \check{n}_\mu \quad (\because \text{主張 2.9})
\end{aligned}
$$

であり、$\epsilon'_\mu = 1$ から

$$
\begin{aligned}
A_\mu^{\epsilon'} &= 1_{\mathbb{C}} \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} - 1_{\mathbb{C}})(I - \check{n}_\mu) \quad (\because \epsilon'_\mu = 1) \\
&= 1_{\mathbb{C}} \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + (-(1_{\mathbb{C}})))(I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{定義 1.15}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{C}}) \cdot 1_{\mathbb{C}})(I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{定義 1.14}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} \check{n}_\mu + (1_{\mathbb{C}} + (-1_{\mathbb{C}}))(I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{主張 1.56 の乗法の単位元}) \\
&= 1_{\mathbb{C}} \check{n}_\mu + 0_{\mathbb{C}} (I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{主張 1.56 の加法の逆元}) \\
&= \check{n}_\mu + 0_{\mathbb{C}} (I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{主張 2.42}) \\
&= \check{n}_\mu + O \quad (\because \text{主張 2.13}) \\
&= \check{n}_\mu \quad (\because \text{主張 2.8})
\end{aligned}
$$

である。次に可換性を示す。$X \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と $\nu \in \check{\mathcal{M}}$、$\delta \in \{\epsilon, \epsilon'\}$ が $X\check{n}_\nu = \check{n}_\nu X$ を満たすとする。$XI = X = IX$（主張 2.17・主張 2.16）と 主張 2.71 より $X(I - \check{n}_\nu) = (I - \check{n}_\nu)X$、主張 2.69 より $X(\delta_\nu \check{n}_\nu) = (\delta_\nu \check{n}_\nu)X$ と $X((1 - \delta_\nu)(I - \check{n}_\nu)) = ((1 - \delta_\nu)(I - \check{n}_\nu))X$ であり、

$$
\begin{aligned}
X A_\nu^\delta &= X\left(\delta_\nu \check{n}_\nu + (1-\delta_\nu)(I-\check{n}_\nu)\right) \quad (\because A_\nu^\delta \text{ の置き方}) \\
&= X\left(\delta_\nu \check{n}_\nu\right) + X\left((1-\delta_\nu)(I-\check{n}_\nu)\right) \quad (\because \text{主張 2.23}) \\
&= \left(\delta_\nu \check{n}_\nu\right) X + \left((1-\delta_\nu)(I-\check{n}_\nu)\right) X \quad (\because \text{上の 2 式}) \\
&= \left(\delta_\nu \check{n}_\nu + (1-\delta_\nu)(I-\check{n}_\nu)\right) X \quad (\because \text{主張 2.24}) \\
&= A_\nu^\delta X \quad (\because A_\nu^\delta \text{ の置き方})
\end{aligned}
$$

である。これを $X \to \check{n}_\kappa$（$\kappa \in \check{\mathcal{M}}$。主張 16.7 (2)。$\kappa = \nu$ では両辺が同じ積 $\check{n}_\nu \check{n}_\nu$ である）に使うと $\check{n}_\kappa A_\nu^\delta = A_\nu^\delta \check{n}_\kappa$、さらに $X \to A_\kappa^\delta$ に使うと $A_\kappa^\delta A_\nu^\delta = A_\nu^\delta A_\kappa^\delta$ である（因子の可換性）。また $\nu \neq \mu$ では 主張 16.7 (1) より $\check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{\psi}_\mu^\dagger$ なので $X \to \check{\psi}_\mu^\dagger$ に使うと $\check{\psi}_\mu^\dagger A_\nu = A_\nu \check{\psi}_\mu^\dagger$ である。$\Pi' := \prod_{\nu=1,\ \nu\neq\mu}^{M_{\mathrm{col}}} A_\nu$（定義 2.63（$r \to M_{\mathrm{col}},\ \nu \to \mu$）。$\Pi' = \prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} A_{s(j)}$ で $s(j) \neq \mu$）とおくと、主張 2.61 より $\check{\psi}_\mu^\dagger \Pi' = \Pi' \check{\psi}_\mu^\dagger$ である。以上を使って次の 3 式を示す。

$$
\begin{aligned}
A_\mu^\epsilon q &= (I - \check{n}_\mu)\, q \quad (\because \text{上の} A_\mu^\epsilon = I - \check{n}_\mu) \\
&= Iq - \check{n}_\mu q \quad (\because \text{主張 1.96}) \\
&= q - \check{n}_\mu q \quad (\because \text{主張 2.16}) \\
&= q - 0 \quad (\because \text{Step 1 の} \check{n}_\mu q = 0) \\
&= q \quad (\because \text{主張 2.10})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Pi' q &= \Pi'\left(A_\mu^\epsilon q\right) \quad (\because \text{上の} A_\mu^\epsilon q = q) \\
&= \left(\Pi' A_\mu^\epsilon\right) q \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \left(\prod_{\nu=1}^{M_{\mathrm{col}}} A_\nu^\epsilon\right) q \quad (\because \text{主張 2.64 と因子の可換性}) \\
&= \check{Q}_\epsilon q \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義}) \\
&= q \quad (\because \check{Q}_\epsilon q = q)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_{\epsilon'}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) &= \left(\prod_{\nu=1}^{M_{\mathrm{col}}} A_\nu^{\epsilon'}\right)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) \quad (\because \check{Q}_{\epsilon'} \text{ の定義}) \\
&= \left(\Pi' A_\mu^{\epsilon'}\right)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) \quad (\because \text{主張 2.64 と因子の可換性、} \nu \neq \mu \text{ で} A_\nu^{\epsilon'} = A_\nu) \\
&= \left(\Pi' \check{n}_\mu\right)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) \quad (\because \text{上の} A_\mu^{\epsilon'} = \check{n}_\mu) \\
&= \Pi'\left(\check{n}_\mu\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \Pi'\left(\left(\check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger\right) q\right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \Pi'\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) \quad (\because \text{Step 2 冒頭の} \check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger) \\
&= \left(\Pi' \check{\psi}_\mu^\dagger\right) q \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \Pi'\right) q \quad (\because \text{上の} \check{\psi}_\mu^\dagger \Pi' = \Pi' \check{\psi}_\mu^\dagger) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger\left(\Pi' q\right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger q \quad (\because \text{上の} \Pi' q = q)
\end{aligned}
$$

Step 3（符号）。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) &= \left(\varepsilon\check{\psi}_\mu^\dagger\right) q \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \left(-\left(\check{\psi}_\mu^\dagger \varepsilon\right)\right) q \quad (\because \text{主張 17.2 (3)}) \\
&= -\left(\left(\check{\psi}_\mu^\dagger \varepsilon\right) q\right) \quad (\because \text{主張 2.20}) \\
&= -\left(\check{\psi}_\mu^\dagger (\varepsilon q)\right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= -\left(\check{\psi}_\mu^\dagger (\eta_\epsilon q)\right) \quad (\because (2) \text{ の冒頭の} \varepsilon q = \eta_\epsilon q) \\
&= -\left(\eta_\epsilon \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.19}) \\
&= (-1_{\mathbb{C}})\left(\eta_\epsilon \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.25}) \\
&= ((-1_{\mathbb{C}})\,\eta_\epsilon)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) \quad (\because \text{主張 2.41}) \\
&= (-\eta_\epsilon)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) \quad (\because \text{定義 1.14})
\end{aligned}
$$

一方 (1) を ϵ' に使うと

$$
\begin{aligned}
\eta_{\epsilon'}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) &= \eta_{\epsilon'}\left(\check{Q}_{\epsilon'}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right)\right) \quad (\because \text{Step 2 の} \check{Q}_{\epsilon'}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) = \check{\psi}_\mu^\dagger q) \\
&= \left(\eta_{\epsilon'}\check{Q}_{\epsilon'}\right)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) \quad (\because \text{主張 2.18}) \\
&= \left(\varepsilon\check{Q}_{\epsilon'}\right)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) \quad (\because (1) \text{ の} \varepsilon\check{Q}_{\epsilon'} = \eta_{\epsilon'}\check{Q}_{\epsilon'}) \\
&= \varepsilon\left(\check{Q}_{\epsilon'}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\
&= \varepsilon\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) \quad (\because \text{Step 2 の} \check{Q}_{\epsilon'}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) = \check{\psi}_\mu^\dagger q) \\
&= (-\eta_\epsilon)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) \quad (\because \text{上の式変形})
\end{aligned}
$$

である。Step 1 より $\check{\psi}_\mu^\dagger q \neq 0$ なので、(1) の $\eta\eta - 1 = 0$ の段と同じく 0 でない成分を比べて $\eta_{\epsilon'} = -\eta_\epsilon$。

(3) $k := M_{\mathrm{col}} - |\epsilon| \in \{0, 1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ についての帰納法で示す。$k = 0$ なら全ての μ で $\epsilon_\mu = 1$、すなわち $\epsilon = (1, \ldots, 1)$ であり、$\eta_\epsilon = \eta_{(1,\ldots,1)} = \eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^0$ である。$k \geq 1$ とし、$M_{\mathrm{col}} - |\epsilon| = k - 1$ の全ての ϵ で (3) が成り立つとする。$k \geq 1$ より $\epsilon_\mu = 0$ なる μ が取れ、$\epsilon' := \epsilon[\mu \to 1]$ は $|\epsilon'| = |\epsilon| + 1$、すなわち $M_{\mathrm{col}} - |\epsilon'| = k - 1$ を満たす。(2) の $\eta_{\epsilon'} = -\eta_\epsilon$ の両辺に -1 を掛けると $\eta_\epsilon = -\eta_{\epsilon'}$ であり、

$$
\begin{aligned}
\eta_\epsilon &= -\eta_{\epsilon'} \quad (\because (2)) \\
&= -\left(\eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon'|}\right) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= -\left(\eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|-1}\right) \quad (\because |\epsilon'| = |\epsilon| + 1) \\
&= (-1)\left(\eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|-1}\right) \quad (\because \text{定義 1.14}) \\
&= \left(\eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|-1}\right)(-1) \quad (\because \text{主張 1.56 の乗法の交換則}) \\
&= \eta_{(1,\ldots,1)}\left((-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|-1}(-1)\right) \quad (\because \text{主張 1.56 の乗法の結合則}) \\
&= \eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|} \quad (\because \text{定義 1.64 の} z^{m+1} = z^m z)
\end{aligned}
$$

で、k で (3) が成り立つ。

(4) まず各 $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ について

$$
\begin{aligned}
(I-2\check{n}_\mu)\,\check{Q}_\epsilon &= (I+(-(2\check{n}_\mu)))\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 2.30})\\
&= I\check{Q}_\epsilon + (-(2\check{n}_\mu))\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 2.24})\\
&= I\check{Q}_\epsilon + \left(-\left((2\check{n}_\mu)\,\check{Q}_\epsilon\right)\right) \quad (\because \text{主張 2.20})\\
&= I\check{Q}_\epsilon - (2\check{n}_\mu)\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 2.30})\\
&= \check{Q}_\epsilon - (2\check{n}_\mu)\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 2.16})\\
&= \check{Q}_\epsilon - 2\left(\check{n}_\mu\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 2.18})\\
&= \check{Q}_\epsilon - 2\left(\epsilon_\mu\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 16.9 (3)})\\
&= 1\check{Q}_\epsilon - 2\left(\epsilon_\mu\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 2.42})\\
&= 1\check{Q}_\epsilon - (2\epsilon_\mu)\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 2.41})\\
&= (1-2\epsilon_\mu)\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 2.38})
\end{aligned}
$$

である。$P_k := \prod_{\mu=1}^{k}(I-2\check{n}_\mu)$、$p_k := \prod_{\mu=1}^{k}(1-2\epsilon_\mu) \in \mathbb{C}$(定義 2.48・定義 1.60、$k \in \{1,\ldots,M_{\mathrm{col}}\}$)とおき、$P_k\check{Q}_\epsilon = p_k\check{Q}_\epsilon$ を k についての帰納法で示す。$k=1$ は上の式 ($\mu \to 1$) である。$k < M_{\mathrm{col}}$ で成り立つとすると

$$
\begin{aligned}
P_{k+1}\check{Q}_\epsilon &= (P_k\,(I-2\check{n}_{k+1}))\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{定義 2.48})\\
&= P_k\left((I-2\check{n}_{k+1})\,\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 2.15})\\
&= P_k\left((1-2\epsilon_{k+1})\,\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{上の式}(\mu \to k+1))\\
&= (1-2\epsilon_{k+1})\left(P_k\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{主張 2.19})\\
&= (1-2\epsilon_{k+1})\left(p_k\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= ((1-2\epsilon_{k+1})\,p_k)\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 2.41})\\
&= (p_k\,(1-2\epsilon_{k+1}))\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 1.56 の乗法の交換則})\\
&= p_{k+1}\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{定義 1.60})
\end{aligned}
$$

で、$k+1$ でも成り立つ。$1-2\epsilon_\mu$ は $\epsilon_\mu = 1$ なら -1、$\epsilon_\mu = 0$ なら $+1$ なので、$p_{M_{\mathrm{col}}}$ は -1 を $|\epsilon|$ 個、$+1$ を残りの個数だけ掛けたものであり $p_{M_{\mathrm{col}}} = (-1)^{|\epsilon|}$ である。以下 $P := P_{M_{\mathrm{col}}}$、$c := \eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}} \in \{+1,-1\}$ とおく。(1)(3) より

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\check{Q}_\epsilon &= \eta_\epsilon\check{Q}_\epsilon \quad (\because (1))\\
&= \left(\eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because (3))\\
&= \left(\eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}\left((-1)^{|\epsilon|}(-1)^{|\epsilon|}\right)\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because (-1)^{|\epsilon|}(-1)^{|\epsilon|} = ((-1)(-1))^{|\epsilon|} = 1^{|\epsilon|} = 1)\\
&= \left(\eta_{(1,\ldots,1)}\left((-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}(-1)^{|\epsilon|}\right)(-1)^{|\epsilon|}\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{主張 1.56 の乗法の結合則})\\
&= \left(\eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}}(-1)^{|\epsilon|}\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{非負の指数の指数法則} z^a z^b = z^{a+b}\text{(定義 1.64 から}b\text{ の帰納法)})\\
&= c\left((-1)^{|\epsilon|}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because c\text{ の置き方と主張 2.41})\\
&= c\left(P\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{上の} P\check{Q}_\epsilon = p_{M_{\mathrm{col}}}\check{Q}_\epsilon = (-1)^{|\epsilon|}\check{Q}_\epsilon)
\end{aligned}
$$

である。和 $\sum_\epsilon$ は 定義 2.50 による。主張 16.9 (2) の $\sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon = I$ を使うと

$$
\begin{aligned}
\varepsilon &= \varepsilon I \quad (\because \text{主張 2.17}) \\
&= \varepsilon \sum_{\epsilon} \check{Q}_{\epsilon} \quad (\because \text{主張 16.9 (2)}) \\
&= \sum_{\epsilon} \varepsilon \check{Q}_{\epsilon} \quad (\because \text{主張 2.57}) \\
&= \sum_{\epsilon} c\left(P\check{Q}_{\epsilon}\right) \quad (\because \text{上の式を} 2^{M_{\mathrm{col}}} \text{ 箇所へ同時適用}) \\
&= \sum_{\epsilon} (cP)\, \check{Q}_{\epsilon} \quad (\because \text{主張 2.18}) \\
&= (cP) \sum_{\epsilon} \check{Q}_{\epsilon} \quad (\because \text{主張 2.57}) \\
&= (cP)\, I \quad (\because \text{主張 16.9 (2)}) \\
&= cP \quad (\because \text{主張 2.17}) \\
&= \eta_{(1,\dots,1)} (-1)^{M_{\mathrm{col}}} \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} (I - 2\check{n}_{\mu}) \quad (\because c,\ P \text{ の置き方})
\end{aligned}
$$

で (4) を得る。 □

主張 17.4 ($\mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big)$ を$\eta_{(1,\dots,1)}$ で表す)**.** 主張 17.3 (1) の $\eta_{(1,\dots,1)} \in \{+1, -1\}$（$\mathbb{C}$ の元 $1_{\mathbb{C}}$ と $-1_{\mathbb{C}}$)、定義 12.28 の $(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 15.11 の $\gamma(\tilde{\theta}_{\mu}) \in \mathbb{R}$（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$）について

$$
\varkappa := (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\sinh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\right) \in \mathbb{R}
$$

とおく。積は 定義 1.61（$m \to M_{\mathrm{col}}$）の実数の有限積、$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の包含である。$z \in \mathbb{C}$ について $z > 0$ は「$z = r_{\mathbb{C}}$ を満たす $r \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在する」ことを表す。このとき次が成り立つ。

- (1) $\mathrm{tr}\big(\varepsilon\, V^{(+)}\big) = \eta_{(1,\dots,1)}\, \varkappa_{\mathbb{C}}$
- (2) $\varkappa > 0$
- (3) $\eta_{(1,\dots,1)} = +1 \iff \mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big) > 0$

証明. 準備。$\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ の上の行列の和は 定義 2.50（$m, n \to 2^{M_{\mathrm{col}}}$, $r \to M_{\mathrm{col}}$）、複素数の和は 定義 2.51、実数の和は 定義 2.52（どちらも $r \to M_{\mathrm{col}}$）による（定義 14.15 により $\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}} = \{0,1\}^{M_{\mathrm{col}}}$）。定理 16.18 の $\check{\Lambda}_{\epsilon} \in \mathbb{R}$ による行列のスカラー倍 $\check{\Lambda}_{\epsilon}\check{Q}_{\epsilon}$ は、定義 1.13 の像による $\big(\check{\Lambda}_{\epsilon}\big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_{\epsilon}$（定義 2.3）と読む。$\pm 1_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記 $r_{\mathbb{C}}$ の $r \to \pm 1$ である。$\eta_{(1,\dots,1)} \in \{1_{\mathbb{C}}, -1_{\mathbb{C}}\}$ なので、$\check{h} \in \{1, -1\} \subset \mathbb{R}$ を $\check{h}_{\mathbb{C}} = \eta_{(1,\dots,1)}$ となるように取る。$e \in \{0,1\}$ について $\check{u}^{(1)} := 1$, $\check{u}^{(0)} := -1 \in \mathbb{R}$、$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ と $k \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ について $|\epsilon|_k := \#\{\mu \in \{1, \dots, k\} \mid \epsilon_{\mu} = 1\}$ とおく。$|\epsilon|_{M_{\mathrm{col}}} = |\epsilon|$、$|\epsilon|_1 = \epsilon_1$、$|\epsilon|_{k+1} = |\epsilon|_k + \epsilon_{k+1}$、$0 \le |\epsilon|_k \le k$ である（数え上げの定義)。

Step 1（トレースの分解)。

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) &= \operatorname{tr}\Big(\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) I\Big) && \big(\because \text{主張 2.17 } (m,n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \varepsilon V^{(+)}) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \operatorname{tr}\left(\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{Q}_\epsilon\right) && \big(\because \text{主張 16.9 (2) を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \operatorname{tr}\left(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) \check{Q}_\epsilon\right) && \big(\because \text{主張 2.57 } (m,n,p \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ C \to \varepsilon V^{(+)},\ X_\epsilon \to \check{Q}_\epsilon)\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \operatorname{tr}\Big(\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) \check{Q}_\epsilon\Big) && \big(\because \text{主張 8.3 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r \to M_{\mathrm{col}},\ B_\epsilon \to (\varepsilon V^{(+)})\check{Q}_\epsilon)\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \operatorname{tr}\Big(\varepsilon\Big(V^{(+)}\check{Q}_\epsilon\Big)\Big) && \big(\because \text{主張 2.15 を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \operatorname{tr}\big(\varepsilon\big(\big(\check{\Lambda}_\epsilon\big)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon\big)\big) && \big(\because \text{定理 16.18 (1) の } V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \operatorname{tr}\big(\big(\check{\Lambda}_\epsilon\big)_{\mathbb{C}}\big(\varepsilon\check{Q}_\epsilon\big)\big) && \big(\because \text{主張 2.19 } (a \to (\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}},\ A \to \varepsilon,\ B \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \operatorname{tr}\big(\big(\check{\Lambda}_\epsilon\big)_{\mathbb{C}}\big(\eta_\epsilon\check{Q}_\epsilon\big)\big) && \big(\because \text{主張 17.3 (1) の } \varepsilon\check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon\check{Q}_\epsilon \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \operatorname{tr}\big(\big(\big(\check{\Lambda}_\epsilon\big)_{\mathbb{C}}\eta_\epsilon\big)\check{Q}_\epsilon\big) && \big(\because \text{主張 2.41 } (a \to (\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}},\ b \to \eta_\epsilon,\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \big(\big(\check{\Lambda}_\epsilon\big)_{\mathbb{C}}\eta_\epsilon\big)\operatorname{tr}\big(\check{Q}_\epsilon\big) && \big(\because \text{主張 8.4 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ \alpha \to (\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}}\eta_\epsilon,\ A \to \check{Q}_\epsilon) \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \big(\big(\check{\Lambda}_\epsilon\big)_{\mathbb{C}}\eta_\epsilon\big)1_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{主張 16.9 (4) の } \operatorname{tr}(\check{Q}_\epsilon) = 1 \text{ を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \big(\check{\Lambda}_\epsilon\big)_{\mathbb{C}}\eta_\epsilon && \big(\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56 を各項へ同時に}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \eta_\epsilon\big(\check{\Lambda}_\epsilon\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{主張 1.56 の乗法の交換則を各項へ同時に}\big)
\end{aligned}
$$

Step 2（符号の冪を実数の積の包含で表す）。$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ を固定し、$k \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について $\Big(\prod_{\mu=1}^{k}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}} = (-1_{\mathbb{C}})^{k-|\epsilon|_k}$（冪は 定義 1.64）を k についての帰納法で示す。$k=1$ で $\epsilon_1 = 1$ なら $|\epsilon|_1 = 1$ であり

$$
\begin{aligned}
\Big(\prod_{\mu=1}^{1}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}} &= \Big(\check{u}^{(\epsilon_1)}\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{定義 1.61}\big)\\
&= \Big(\check{u}^{(1)}\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \epsilon_1 = 1\big)\\
&= 1_{\mathbb{C}} && \big(\because \check{u}^{(1)} := 1 \text{ と 定義 1.13 の略記}\big)\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{0} && \big(\because \text{定義 1.64 の } z^0 := 1_{\mathbb{C}} \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{1-|\epsilon|_1} && \big(\because |\epsilon|_1 = 1\big)
\end{aligned}
$$

$\epsilon_1 = 0$ なら $|\epsilon|_1 = 0$ であり

$$
\begin{aligned}
\Big(\prod_{\mu=1}^{1}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}} &= \Big(\check{u}^{(\epsilon_1)}\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.61})\\
&= \Big(\check{u}^{(0)}\Big)_{\mathbb{C}} && (\because\ \epsilon_1 = 0)\\
&= -1_{\mathbb{C}} && (\because\ \check{u}^{(0)} := -1 \text{ と 定義 1.13 の略記})\\
&= 1_{\mathbb{C}}\,(-1_{\mathbb{C}}) && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^0\,(-1_{\mathbb{C}}) && (\because \text{ 定義 1.64 の } z^0 := 1_{\mathbb{C}} \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^1 && (\because \text{ 定義 1.64 の } z^{m+1} := z^m z\ (m \to 0) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{1-|\epsilon|_1} && (\because\ |\epsilon|_1 = 0)
\end{aligned}
$$

$k < M_{\mathrm{col}}$ で成り立つとする。$\epsilon_{k+1} = 1$ なら $(k+1) - |\epsilon|_{k+1} = k - |\epsilon|_k$ であり

$$
\begin{aligned}
\Big(\prod_{\mu=1}^{k+1}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}} &= \Big(\Big(\prod_{\mu=1}^{k}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)\check{u}^{(\epsilon_{k+1})}\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.61})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{k}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}}\Big(\check{u}^{(\epsilon_{k+1})}\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.29 を右辺から左辺へ})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{k-|\epsilon|_k}\Big(\check{u}^{(\epsilon_{k+1})}\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 帰納法の仮定})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{k-|\epsilon|_k}\,1_{\mathbb{C}} && (\because\ \epsilon_{k+1} = 1,\ \check{u}^{(1)} := 1 \text{ と 定義 1.13 の略記})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{k-|\epsilon|_k} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{(k+1)-|\epsilon|_{k+1}} && (\because\ (k+1) - |\epsilon|_{k+1} = k - |\epsilon|_k)
\end{aligned}
$$

$\epsilon_{k+1} = 0$ なら $(k+1) - |\epsilon|_{k+1} = (k - |\epsilon|_k) + 1$ であり

$$
\begin{aligned}
\Big(\prod_{\mu=1}^{k+1}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}} &= \Big(\Big(\prod_{\mu=1}^{k}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)\check{u}^{(\epsilon_{k+1})}\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 1.61})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{k}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}}\Big(\check{u}^{(\epsilon_{k+1})}\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.29 を右辺から左辺へ})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{k-|\epsilon|_k}\Big(\check{u}^{(\epsilon_{k+1})}\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 帰納法の仮定})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{k-|\epsilon|_k}\,(-1_{\mathbb{C}}) && (\because\ \epsilon_{k+1} = 0,\ \check{u}^{(0)} := -1 \text{ と 定義 1.13 の略記})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{(k-|\epsilon|_k)+1} && (\because \text{ 定義 1.64 の } z^{m+1} := z^m z\ (m \to k - |\epsilon|_k) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= (-1_{\mathbb{C}})^{(k+1)-|\epsilon|_{k+1}} && (\because\ (k+1) - |\epsilon|_{k+1} = (k - |\epsilon|_k) + 1)
\end{aligned}
$$

で、$k+1$ でも成り立つ。$k = M_{\mathrm{col}}$ と $|\epsilon|_{M_{\mathrm{col}}} = |\epsilon|$ より $\Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}} = (-1_{\mathbb{C}})^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}$ である。

Step 3（各項を実数の包含で表す）。$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ について $\check{t}_\epsilon := \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)\check{\Lambda}_\epsilon \in \mathbb{R}$ とおく。

$$
\begin{aligned}
\eta_\epsilon\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} &= \Big(\eta_{(1,\dots,1)}\left(-1_{\mathbb{C}}\right)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}\Big)\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \text{主張 17.3 (3)}\right)\\
&= \Big(\eta_{(1,\dots,1)}\Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}}\Big)\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \text{Step 2 の } k=M_{\mathrm{col}} \text{ の式を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \Big(\check{h}_{\mathbb{C}}\Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}}\Big)\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \check{h} \text{ の取り方 } \check{h}_{\mathbb{C}}=\eta_{(1,\dots,1)} \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \Big(\check{h}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)_{\mathbb{C}}\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \text{主張 1.29 } \left(a\to\check{h},\ b\to\textstyle\prod_\mu\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\right)\right)\\
&= \Big(\Big(\check{h}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)\check{\Lambda}_\epsilon\Big)_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \text{主張 1.29 } \left(a\to\check{h}\textstyle\prod_\mu\check{u}^{(\epsilon_\mu)},\ b\to\check{\Lambda}_\epsilon\right)\right)\\
&= \Big(\Big(\Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)\check{\Lambda}_\epsilon\Big)\check{h}\Big)_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } (ab)c=(bc)a \text{（乗法の交換則と結合則）}\right)\\
&= \left(\check{t}_\epsilon\check{h}\right)_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \check{t}_\epsilon \text{ の置き方}\right)
\end{aligned}
$$

Step 4(実数の和を積へ分解する)。$\mu\in\check{\mathcal{M}}$ と $e\in\{0,1\}$ について $\check{w}_\mu^{(e)}:=\check{u}^{(e)}\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(e-\frac{1}{2}\right)\Big)\in\mathbb{R}$ とおく。exp は 定義 3.11 の実数の exp で、$\mathbb{R}$ を使うのはその値が部分和の極限だからである（指数評価による脱出)。$\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ について

$$
\begin{aligned}
\check{t}_\epsilon &= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)\check{\Lambda}_\epsilon && \left(\because\ \check{t}_\epsilon \text{ の置き方}\right)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)\Big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\right)\Big)\Big) && \left(\because\ \text{定理 16.18 の } \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義}\right)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)\Big((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\right)\Big)\Big) && \left(\because\ \text{主張 3.15 } \left(m\to M_{\mathrm{col}},\ j\to\mu,\ x_j\to\gamma(\tilde{\theta}_\mu)(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2})\right)\right)\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\Big(\Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\Big)\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\right)\Big)\Big) && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } a(bc)=b(ac) \text{（乗法の交換則と結合則）}\right)\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\Big(\check{u}^{(\epsilon_\mu)}\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}\right)\Big)\Big) && \left(\because\ \text{主張 1.63 } \left(m\to M_{\mathrm{col}},\ j\to\mu,\ x_j\to\check{u}^{(\epsilon_\mu)},\ y_j\to\exp(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2}))\right) \text{ を右辺から左辺へ}\right)\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{w}_\mu^{(\epsilon_\mu)} && \left(\because\ \check{w}_\mu^{(e)} \text{ の置き方 } (e\to\epsilon_\mu) \text{ を各因子へ同時に}\right)\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\check{w}_\mu^{(\epsilon_\mu)}\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則}\right)
\end{aligned}
$$

これを和の各項へ入れる。

$$
\begin{aligned}
\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \check{t}_\epsilon &= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{w}_\mu^{(\epsilon_\mu)}\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \text{直前の鎖を各項へ同時に})\\
&= \Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{M}}} \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{w}_\mu^{(\epsilon_\mu)}\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \text{主張 2.54 } (r\to M_{\mathrm{col}},\ x_\epsilon\to\textstyle\prod_\mu \check{w}_\mu^{(\epsilon_\mu)},\ c\to(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\check{w}_\mu^{(1)} + \check{w}_\mu^{(0)}\Big)\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \text{主張 2.55 } (r\to M_{\mathrm{col}},\ j\to\mu,\ a_j^{(e)}\to\check{w}_\mu^{(e)}) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\check{u}^{(1)}\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(1-\tfrac{1}{2})\Big) + \check{u}^{(0)}\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(0-\tfrac{1}{2})\Big)\Big)\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \check{w}_\mu^{(e)} \text{ の置き方 } (e\to 1,\ e\to 0) \text{ を各因子へ同時に})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(1\cdot\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(1-\tfrac{1}{2})\Big) + (-1)\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(0-\tfrac{1}{2})\Big)\Big)\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \check{u}^{(1)}:=1,\ \check{u}^{(0)}:=-1 \text{ を各因子へ同時に})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(1-\tfrac{1}{2})\Big) + (-1)\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(0-\tfrac{1}{2})\Big)\Big)\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \mathbb{R} \text{ で } 1\cdot b=b \text{ を各因子へ同時に})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(1-\tfrac{1}{2})\Big) - \exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(0-\tfrac{1}{2})\Big)\Big)\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \mathbb{R} \text{ で } a+(-1)b=a-b \text{ を各因子へ同時に})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2}\Big) - \exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(0-\tfrac{1}{2})\Big)\Big)\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \mathbb{R} \text{ で } 1-\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2} \text{ を各因子へ同時に})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2}\Big) - \exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(-\tfrac{1}{2})\Big)\Big)\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \mathbb{R} \text{ で } 0-a=-a\ (a\to\tfrac{1}{2}) \text{ を各因子へ同時に})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2}\Big) - \exp\Big(-\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2}\Big)\Big)\Big)\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \mathbb{R} \text{ で } a(-b)=-(ab)\ (a\to\gamma(\tilde{\theta}_\mu),\ b\to\tfrac{1}{2}) \text{ を各因子へ同時に})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big(\exp\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big) - \exp\Big(-\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\Big)\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \mathbb{R} \text{ で } a\cdot\tfrac{1}{2}=\tfrac{a}{2}\ (a\to\gamma(\tilde{\theta}_\mu)) \text{ を各因子の 2 箇所へ同時に})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cdot\frac{\exp\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big) - \exp\Big(-\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)}{2}\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \mathbb{R} \text{ で } 2\neq 0 \text{ なので } b=2\cdot\tfrac{b}{2} \text{ を各因子へ同時に})\\
&= \Big(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\sinh\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\Big)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} && (\because \text{定義 3.19 の } \sinh\ (x\to\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}) \text{ を各因子へ同時に、右辺から左辺へ})\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\sinh\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則})\\
&= \varkappa && (\because \varkappa \text{ の置き方})
\end{aligned}
$$

Step 5（(1) の等式）。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) &= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \eta_\epsilon\,\big(\check{\Lambda}_\epsilon\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{Step 1 の鎖}\big)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \big(\check{t}_\epsilon\check{h}\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{Step 3 の鎖を各項へ同時に}\big)\\
&= \Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{t}_\epsilon\check{h}\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{主張 2.53 } (r\to M_{\mathrm{col}},\ x_\epsilon\to\check{t}_\epsilon\check{h})\big)\\
&= \Big(\Big(\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{t}_\epsilon\Big)\check{h}\Big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{主張 2.54 } (r\to M_{\mathrm{col}},\ x_\epsilon\to\check{t}_\epsilon,\ c\to\check{h}) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \big(\varkappa\check{h}\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{Step 4 の鎖}\big)\\
&= \big(\check{h}\varkappa\big)_{\mathbb{C}} && \big(\because \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則}\big)\\
&= \check{h}_{\mathbb{C}}\varkappa_{\mathbb{C}} && \big(\because \text{主張 1.29 } (a\to\check{h},\ b\to\varkappa) \text{ を右辺から左辺へ}\big)\\
&= \eta_{(1,\dots,1)}\varkappa_{\mathbb{C}} && \big(\because \check{h} \text{ の取り方 } \check{h}_{\mathbb{C}}=\eta_{(1,\dots,1)}\big)
\end{aligned}
$$

Step 6（(2) の不等号）。$\mu\in\check{\mathcal{M}}$ について 主張 15.18 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)>0$ であり、次の 2 つの鎖を得る。

$$
\begin{aligned}
\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2} &= \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2} && \big(\because \mathbb{R} \text{ で } \tfrac{a}{2}=a\cdot\tfrac{1}{2}\big)\\
&> 0\cdot\tfrac{1}{2} && \big(\because \gamma(\tilde{\theta}_\mu)>0 \text{ の両辺に } \tfrac{1}{2}>0 \text{ を掛ける}\big)\\
&= 0 && \big(\because\ 0\cdot\tfrac{1}{2}=0\big)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
2\sinh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) &> 2\cdot 0 \quad \left(\because \text{ 主張 3.21 (3) の } \sinh x>0 \ (x\to\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}) \text{ に上の鎖を当て、両辺に } 2>0 \text{ を掛ける}\right)\\
&= 0 \qquad (\because\ 2\cdot 0 = 0)
\end{aligned}
$$

$$
\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\sinh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) > 0 \quad \left(\because \text{ 主張 1.62 } \left(m\to M_{\mathrm{col}},\ j\to\mu,\ r_\mu\to 2\sinh(\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2})\right) \text{ に、上の各 } \mu \text{ の鎖 } r_\mu>0 \text{ を当てる}\right)
$$

$$
\begin{aligned}
\varkappa &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\sinh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \quad (\because\ \varkappa \text{ の置き方})\\
&> 0 \qquad \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } a>0,\ b>0 \text{ なら } ab>0 \ (a\to(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2},\ b\to\textstyle\prod_\mu 2\sinh(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2})) \text{ に、定義 12.28 の } (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\in\mathbb{R}_{>0} \text{ と直前の不等号を当てる}\right)
\end{aligned}
$$

Step 7（(3) の同値)。$\eta_{(1,\dots,1)}=+1$ なら

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) &= 1_{\mathbb{C}}\varkappa_{\mathbb{C}} \quad \left(\because\ (1) \text{ と } \eta_{(1,\dots,1)}=1_{\mathbb{C}}\right)\\
&= \varkappa_{\mathbb{C}} \qquad \left(\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56}\right)
\end{aligned}
$$

であり、(2) の $\varkappa\in\mathbb{R}_{>0}$ を r に取れば $\mathrm{tr}(\varepsilon V^{(+)})>0$ である。逆に $\mathrm{tr}(\varepsilon V^{(+)})>0$ とし、$\mathrm{tr}(\varepsilon V^{(+)})=r_{\mathbb{C}}$ を満たす $r\in\mathbb{R}_{>0}$ を取る。

$$
\begin{aligned}
(r,0) &= r_{\mathbb{C}} \qquad \left(\because \text{ 定義 1.13 の定義を右辺から左辺へ}\right)\\
&= \mathrm{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) \quad \left(\because\ r \text{ の取り方}\right)\\
&= \left(\check{h}\varkappa\right)_{\mathbb{C}} \qquad \left(\because \text{ Step 5 の鎖の 1 行目から 6 行目}\right)\\
&= \left(\check{h}\varkappa,0\right) \qquad \left(\because \text{ 定義 1.13 の定義}\right)
\end{aligned}
$$

定義 1.12 の $\mathbb{C}=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ の元の等号は成分ごとなので $r=\check{h}\varkappa$ である。$\check{h}=-1$ と仮定すると

$$
\begin{aligned}
r &= \check{h}\varkappa \qquad \left(\because \text{ 直前の成分の比較}\right)\\
&= (-1)\varkappa \quad \left(\because \text{ 仮定 } \check{h}=-1\right)\\
&= -\varkappa \qquad \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } (-1)a=-a\ (a\to\varkappa)\right)\\
&< 0 \qquad \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } a>0 \text{ なら } -a<0\ (a\to\varkappa) \text{ に (2) の } \varkappa>0 \text{ を当てる}\right)
\end{aligned}
$$

となり $r>0$ に反する。$\check{h}\in\{1,-1\}$ なので $\check{h}=1$ であり、

$$
\begin{aligned}
\eta_{(1,\dots,1)} &= \check{h}_{\mathbb{C}} \quad \left(\because\ \check{h} \text{ の取り方}\right)\\
&= 1_{\mathbb{C}} \quad \left(\because\ \check{h}=1 \text{ と 定義 1.13 の略記}\right)
\end{aligned}
$$

である。 □

定義 17.5 (開鎖項D_0)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 13.15 のサイト作用素を用いて、開鎖項を

$$
D_0 := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z
$$

と定める。

定義 17.6 (周期境界項G)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 13.15 のサイト作用素を用いて、周期境界項を

$$
G := \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z
$$

と定める。

主張 17.7 ($iH_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z + \varepsilon\, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z \sigma_1^z$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.22 の $H_1^{(+)} = Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1$、定義 17.5 の開鎖項 D_0、定義 17.6 の周期境界項 G について

$$i\,H_1^{(+)} = D_0 + \varepsilon G$$

証明. 以下 $M := M_{\mathrm{col}}$、$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と書き、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z$ は 主張 6.1 の Pauli 行列、$\boxtimes$ は 定義 2.72 のクロネッカー積とする。$\overbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}^{k}$ は A を k 個並べたもので、$k = 0$ のときは何も並べない。積 $\sigma_1^{a_1} \cdots \sigma_r^{a_r}$ は左から順に掛けたものとする（主張 13.4 の約束）。

準備 1（内部の辺の因子のクロネッカー積表示）。$m \in \{1, \ldots, M-1\}$ とする。

$$\begin{aligned}
Y_m &= \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y && (\because \text{定義 13.2}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} && (\because \text{主張 13.4 } (r \to m,\ a_1 = \cdots = a_{m-1} = x,\ a_m = y)) \\
Z_{m+1} &= \sigma_1^x \cdots \sigma_m^x \sigma_{m+1}^z && (\because \text{定義 13.1}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1} && (\because \text{主張 13.4 } (r \to m+1,\ a_1 = \cdots = a_m = x,\ a_{m+1} = z)) \\
\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z &= \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} \right) \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1} \right) && (\because \text{定義 12.8 を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z I) \boxtimes (I\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M-m-1} && (\because \text{主張 2.73 (1)}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes (I\sigma^z) \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1} && (\because \text{主張 2.17 を } AI \text{ の形の因子へ同時適用}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1} && (\because \text{主張 2.16})
\end{aligned}$$

準備 2（境界の因子のクロネッカー積表示）。

$$\begin{aligned}
Y_M &= \sigma_1^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y && (\because \text{定義 13.2}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-1} \boxtimes \sigma^y && (\because \text{主張 13.4 } (r \to M,\ a_1 = \cdots = a_{M-1} = x,\ a_M = y)) \\
Z_1 &= \sigma_1^z && (\because \text{定義 13.1 } (m = 1)) \\
&= \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-1} && (\because \text{定義 12.8}) \\
\varepsilon &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M} && (\because \text{主張 13.5}) \\
\sigma_M^z \sigma_1^z &= \left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-1} \boxtimes \sigma^z \right) \left(\sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-1} \right) && (\because \text{定義 12.8 を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= (I\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M-2} \boxtimes (\sigma^z I) && (\because \text{主張 2.73 (1)。} M \geq 2 \text{ より第 1 因子と第 } M \text{ 因子は異なる}) \\
&= (I\sigma^z) \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-2} \boxtimes \sigma^z && (\because \text{主張 2.17 を } AI \text{ の形の因子へ同時適用}) \\
&= \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-2} \boxtimes \sigma^z && (\because \text{主張 2.16})
\end{aligned}$$

準備 3（内部の辺）。$m \in \{1, \ldots, M-1\}$ とする。

$$
\begin{aligned}
i\,(Y_m Z_{m+1}) &= i\left(\left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m}\right) Z_{m+1}\right) && (\because \text{準備 1 の} Y_m \text{ の鎖}) \\
&= i\left(\left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m}\right)\left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1}\right)\right) && (\because \text{準備 1 の} Z_{m+1} \text{ の鎖}) \\
&= i\left(\overbrace{(\sigma^x\sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x\sigma^x)}^{m-1} \boxtimes (\sigma^y\sigma^x) \boxtimes (I\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M-m-1}\right) && (\because \text{主張 2.73 (1)}) \\
&= i\left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^y\sigma^x) \boxtimes (I\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M-m-1}\right) && (\because \text{主張 6.1 の } \sigma^x\sigma^x = I \text{ を } m-1 \text{ 箇所へ同時適用}) \\
&= i\left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^y\sigma^x) \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1}\right) && (\because \text{主張 2.16 を } IA \text{ の形の因子へ同時適用}) \\
&= i\left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \big((-i)\,\sigma^z\big) \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1}\right) && (\because \text{主張 6.2}) \\
&= i\left((-i)\left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1}\right)\right) && (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の式 } (j \to m)) \\
&= \big(i \cdot (-i)\big)\left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1}\right) && (\because \text{主張 2.41}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}\left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1}\right) && (\because \mathbb{C} \text{ で } i \cdot (-i) = 1_{\mathbb{C}\circ} \text{ 定義 1.12 の積}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1} && (\because \text{主張 2.42}) \\
&= \sigma^z_m \sigma^z_{m+1} && (\because \text{準備 1 の } \sigma^z_m\sigma^z_{m+1} \text{ の鎖を右辺から左辺へ})
\end{aligned}
$$

準備 4（境界の辺）。

$$
\begin{aligned}
-\big(i\,(Y_M Z_1)\big) &= (-1_{\mathbb{C}})\big(i\,(Y_M Z_1)\big) && (\because \text{主張 2.25})\\
&= \big((-1_{\mathbb{C}})\cdot i\big)(Y_M Z_1) && (\because \text{主張 2.41})\\
&= (-i)\,(Y_M Z_1) && (\because \text{定義 1.14})\\
&= (-i)\left(\left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-1} \boxtimes \sigma^y\right) Z_1\right) && (\because \text{準備 2 の} Y_M \text{ の鎖})\\
&= (-i)\left(\left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-1} \boxtimes \sigma^y\right)\left(\sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-1}\right)\right) && (\because \text{準備 2 の} Z_1 \text{ の鎖})\\
&= (-i)\left((\sigma^x\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{M-2} \boxtimes (\sigma^y I)\right) && (\because \text{主張 2.73 (1)})\\
&= (-i)\left((\sigma^x\sigma^z) \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-2} \boxtimes \sigma^y\right) && (\because \text{主張 2.17 を } AI \text{ の形の因子へ同時適用})\\
&= (-i)\left(\big((-i)\,\sigma^y\big) \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-2} \boxtimes \sigma^y\right) && (\because \text{主張 6.3})\\
&= (-i)\left((-i)\left(\sigma^y \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-2} \boxtimes \sigma^y\right)\right) && (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の式 } (j \to 1))\\
&= (-i)\left(\sigma^y \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-2} \boxtimes \big((-i)\,\sigma^y\big)\right) && (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の式 } (j \to M) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= \big((-i)\,\sigma^y\big) \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-2} \boxtimes \big((-i)\,\sigma^y\big) && (\because \text{主張 2.74 の } r=1 \text{ の式 } (j \to 1) \text{ を右辺から左辺へ})\\
&= (\sigma^x\sigma^z) \boxtimes \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-2} \boxtimes (\sigma^x\sigma^z) && (\because \text{主張 6.3 を 2 箇所へ右辺から左辺へ同時適用})\\
&= (\sigma^x\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{M-2} \boxtimes (\sigma^x\sigma^z) && (\because \text{主張 2.17 を右辺から左辺へ同時適用})\\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M}\right)\left(\sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-2} \boxtimes \sigma^z\right) && (\because \text{主張 2.73 (1) を右辺から左辺へ})\\
&= \varepsilon\left(\sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-2} \boxtimes \sigma^z\right) && (\because \text{準備 2 の } \varepsilon \text{ の式を右辺から左辺へ})\\
&= \varepsilon\,(\sigma^z_M \sigma^z_1) && (\because \text{準備 2 の } \sigma^z_M\sigma^z_1 \text{ の鎖を右辺から左辺へ})\\
&= \varepsilon G && (\because \text{定義 17.6})
\end{aligned}
$$

主張の左辺から計算する。

$$
\begin{aligned}
i\,H_1^{(+)} &= i\left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} - Y_M Z_1\right) && (\because \text{定義 13.22})\\
&= i\left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1}\right) - \big(i\,(Y_M Z_1)\big) && (\because \text{主張 2.32})\\
&= \sum_{m=1}^{M-1} \big(i\,(Y_m Z_{m+1})\big) - \big(i\,(Y_M Z_1)\big) && (\because \text{主張 2.34 を右辺から左辺へ})\\
&= \sum_{m=1}^{M-1} \sigma^z_m \sigma^z_{m+1} - \big(i\,(Y_M Z_1)\big) && (\because \text{準備 3 を各項へ同時適用})\\
&= D_0 - \big(i\,(Y_M Z_1)\big) && (\because \text{定義 17.5})\\
&= D_0 + \Big(-\big(i\,(Y_M Z_1)\big)\Big) && (\because \text{主張 2.30})\\
&= D_0 + \varepsilon G && (\because \text{準備 4})
\end{aligned}
$$

□

主張 17.8 (D_0, G の配置基底上の対角作用)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 12.11 の基底 $f_{\iota(s)} \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$（$s \in \mathfrak{M}$）に対し、定義 17.5 の D_0 と 定義 17.6 の G は次のように作用する。

$$D_0 f_{\iota(s)} = \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)s(m+1) \right)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)}, \qquad G f_{\iota(s)} = \big(s(M_{\mathrm{col}})s(1)\big)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)}$$

ここで $s(m) \in \{-1, 1\} \subset \mathbb{R}$、括弧の中の積は $\mathbb{R}$ の積、和は 定義 1.19 の有限和、$r_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記、右辺は 定義 2.3 のスカラー倍、左辺の積は 定義 1.6 の数ベクトルへの作用である。スピン配置を s と書くのは、μ を $\check{\mathcal{M}}$ の元に使うためである。

証明. 準備。各 $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}} - 1\}$ について

$$\begin{aligned}
(\sigma^z_m \sigma^z_{m+1}) f_{\iota(s)} &= \sigma^z_m \big(\sigma^z_{m+1} f_{\iota(s)}\big) && \big(\because \text{ 主張 2.15}\big) \\
&= \sigma^z_m \big(s(m+1)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)}\big) && \big(\because \text{ 主張 12.13 } (\mu \to s,\ m \to m+1)\big) \\
&= s(m+1)_{\mathbb{C}} \big(\sigma^z_m f_{\iota(s)}\big) && \big(\because \text{ 主張 2.19}\big) \\
&= s(m+1)_{\mathbb{C}} \big(s(m)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)}\big) && \big(\because \text{ 主張 12.13 } (\mu \to s,\ m \to m)\big) \\
&= \big(s(m+1)_{\mathbb{C}}\, s(m)_{\mathbb{C}}\big) f_{\iota(s)} && \big(\because \text{ 主張 2.41}\big) \\
&= \big(s(m+1)s(m)\big)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)} && \big(\because \text{ 主張 1.29}\big) \\
&= \big(s(m)s(m+1)\big)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)} && \big(\because \mathbb{R} \text{ の積の交換律}\big).
\end{aligned}$$

開鎖項について。

$$\begin{aligned}
D_0 f_{\iota(s)} &= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma^z_m \sigma^z_{m+1} \right) f_{\iota(s)} && \big(\because \text{ 定義 17.5}\big) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \Big((\sigma^z_m \sigma^z_{m+1}) f_{\iota(s)} \Big) && \big(\because \text{ 主張 2.36 } (r \to M_{\mathrm{col}} - 1)\big) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \Big(\big(s(m)s(m+1)\big)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)} \Big) && \big(\because \text{ 準備の等式を各}m \text{ へ同時に適用}\big) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \big(s(m)s(m+1)\big)_{\mathbb{C}} \right) f_{\iota(s)} && \big(\because \text{ 主張 2.35 } (r \to M_{\mathrm{col}} - 1,\ c_j \to (s(j)s(j+1))_{\mathbb{C}})\big) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)s(m+1) \right)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)} && \big(\because \text{ 主張 1.20 } (m \to M_{\mathrm{col}} - 1,\ r_j \to s(j)s(j+1))\big).
\end{aligned}$$

周期境界項について。

$$\begin{aligned}
G f_{\iota(s)} &= (\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_1) f_{\iota(s)} && \big(\because \text{ 定義 17.6}\big) \\
&= \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} \big(\sigma^z_1 f_{\iota(s)}\big) && \big(\because \text{ 主張 2.15}\big) \\
&= \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} \big(s(1)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)}\big) && \big(\because \text{ 主張 12.13 } (\mu \to s,\ m \to 1)\big) \\
&= s(1)_{\mathbb{C}} \big(\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} f_{\iota(s)}\big) && \big(\because \text{ 主張 2.19}\big) \\
&= s(1)_{\mathbb{C}} \big(s(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)}\big) && \big(\because \text{ 主張 12.13 } (\mu \to s,\ m \to M_{\mathrm{col}})\big) \\
&= \big(s(1)_{\mathbb{C}}\, s(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\big) f_{\iota(s)} && \big(\because \text{ 主張 2.41}\big) \\
&= \big(s(1)s(M_{\mathrm{col}})\big)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)} && \big(\because \text{ 主張 1.29}\big) \\
&= \big(s(M_{\mathrm{col}})s(1)\big)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)} && \big(\because \mathbb{R} \text{ の積の交換律}\big).
\end{aligned}$$

□

主張 17.9 (ε, D_0, G の二つずつの可換性)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 17.5 の D_0 と 定義 17.6 の G と 定義 13.3 の ε は、$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の中で二つずつ可換である。すなわち

$$\varepsilon D_0 = D_0 \varepsilon, \qquad \varepsilon G = G\varepsilon, \qquad D_0 G = G D_0$$

証明. 準備 (ε と σ^z の対の可換)。各 $k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について $\varepsilon\sigma_k^z = -(\sigma_k^z\varepsilon)$ (主張 13.7) である。各 $j, k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について

$$\begin{aligned}
\varepsilon(\sigma_j^z\sigma_k^z) &= (\varepsilon\sigma_j^z)\sigma_k^z && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= \big(-(\sigma_j^z\varepsilon)\big)\sigma_k^z && (\because \text{ 主張 13.7 } (k \to j)) \\
&= -\big((\sigma_j^z\varepsilon)\sigma_k^z\big) && (\because \text{ 主張 2.20}) \\
&= -\big(\sigma_j^z(\varepsilon\sigma_k^z)\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= -\Big(\sigma_j^z\big(-(\sigma_k^z\varepsilon)\big)\Big) && (\because \text{ 主張 13.7 } (k \to k)) \\
&= -\Big(-\big(\sigma_j^z(\sigma_k^z\varepsilon)\big)\Big) && (\because \text{ 主張 2.21}) \\
&= \sigma_j^z(\sigma_k^z\varepsilon) && (\because \text{ 主張 2.27}) \\
&= (\sigma_j^z\sigma_k^z)\varepsilon && (\because \text{ 主張 2.15}).
\end{aligned}$$

準備 (σ^z どうしの可換)。各 $j, k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について $\sigma_j^z\sigma_k^z = \sigma_k^z\sigma_j^z$ である。$j \neq k$ なら 主張 12.10 ($a = b = z$) により、$j = k$ なら両辺は同じ行列である。

準備 (σ^z の対と G の可換)。各 $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}} - 1\}$ について

$$\begin{aligned}
(\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z)G &= (\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z)(\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z) && (\because \text{ 定義 17.6}) \\
&= \sigma_m^z\big(\sigma_{m+1}^z(\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z)\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= \sigma_m^z\big((\sigma_{m+1}^z\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z)\sigma_1^z\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= \sigma_m^z\big((\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_{m+1}^z)\sigma_1^z\big) && (\because \text{ 準備 (σ^z どうしの可換) } (j \to m+1,\ k \to M_{\mathrm{col}})) \\
&= \sigma_m^z\big(\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z(\sigma_{m+1}^z\sigma_1^z)\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= \sigma_m^z\big(\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z(\sigma_1^z\sigma_{m+1}^z)\big) && (\because \text{ 準備 (σ^z どうしの可換) } (j \to m+1,\ k \to 1)) \\
&= (\sigma_m^z\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z)(\sigma_1^z\sigma_{m+1}^z) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= (\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_m^z)(\sigma_1^z\sigma_{m+1}^z) && (\because \text{ 準備 (σ^z どうしの可換) } (j \to m,\ k \to M_{\mathrm{col}})) \\
&= \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\big(\sigma_m^z(\sigma_1^z\sigma_{m+1}^z)\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\big((\sigma_m^z\sigma_1^z)\sigma_{m+1}^z\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\big((\sigma_1^z\sigma_m^z)\sigma_{m+1}^z\big) && (\because \text{ 準備 (σ^z どうしの可換) } (j \to m,\ k \to 1)) \\
&= \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\big(\sigma_1^z(\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z)\big) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= (\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z)(\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z) && (\because \text{ 主張 2.15}) \\
&= G(\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z) && (\because \text{ 定義 17.6}).
\end{aligned}$$

$\varepsilon D_0 = D_0\varepsilon$ について。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon D_0 &= \varepsilon \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) && \left(\because \text{ 定義 } 17.5\right) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \varepsilon(\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) && \left(\because \text{ 主張 } 2.37\ (r \to M_{\mathrm{col}}-1)\right) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z)\varepsilon && \left(\because \text{ 準備（}\varepsilon \text{ と}\sigma^z \text{ の対の可換）}\ (j \to m,\ k \to m+1)\right) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) \varepsilon && \left(\because \text{ 主張 } 2.36\ (r \to M_{\mathrm{col}}-1)\right) \\
&= D_0 \varepsilon && \left(\because \text{ 定義 } 17.5\right).
\end{aligned}
$$

$\varepsilon G = G\varepsilon$ について。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon G &= \varepsilon(\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z \sigma_1^z) && \left(\because \text{ 定義 } 17.6\right) \\
&= (\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z \sigma_1^z)\varepsilon && \left(\because \text{ 準備（}\varepsilon \text{ と}\sigma^z \text{ の対の可換）}\ (j \to M_{\mathrm{col}},\ k \to 1)\right) \\
&= G\varepsilon && \left(\because \text{ 定義 } 17.6\right).
\end{aligned}
$$

$D_0 G = G D_0$ について。

$$
\begin{aligned}
D_0 G &= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) G && \left(\because \text{ 定義 } 17.5\right) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) G && \left(\because \text{ 主張 } 2.36\ (r \to M_{\mathrm{col}}-1)\right) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} G(\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z) && \left(\because \text{ 準備（}\sigma^z \text{ の対と}G \text{ の可換）}\right) \\
&= G \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) && \left(\because \text{ 主張 } 2.37\ (r \to M_{\mathrm{col}}-1)\right) \\
&= G D_0 && \left(\because \text{ 定義 } 17.5\right).
\end{aligned}
$$

□

主張 17.10 (εG の二乗)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 13.3 の ε と 定義 17.6 の G について

$$
(\varepsilon G)^2 = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}
$$

ここで $X \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ に対して $X^2 := XX$ である。

証明. 準備。$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ とおく。各 $k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について

$$
\begin{aligned}
\sigma^z_k\sigma^z_k &= \big(I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I\big)\big(I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I\big) && \big(\because \text{定義 12.8}\big)\\
&= (II)\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{(\sigma^z\sigma^z)}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes(II) && \big(\because \text{主張 2.73 (1)}\big)\\
&= I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{(\sigma^z\sigma^z)}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I && \big(\because \text{主張 2.16 を}k\text{ 以外の各サイトで}\big)\\
&= I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{I}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I && \big(\because \text{主張 6.1 の}\sigma^z\sigma^z=I\big)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because \text{主張 2.73 (2)}\big).
\end{aligned}
$$

主張について。$M_{\mathrm{col}}\geq 2$ より $M_{\mathrm{col}}\neq 1$ である。

$$
\begin{aligned}
(\varepsilon G)^2 &= (\varepsilon G)(\varepsilon G) && \big(\because\ X^2:=XX\big)\\
&= \big((\varepsilon G)\varepsilon\big)G && \big(\because \text{主張 2.15}\big)\\
&= \big(\varepsilon(G\varepsilon)\big)G && \big(\because \text{主張 2.15}\big)\\
&= \big(\varepsilon(\varepsilon G)\big)G && \big(\because \text{主張 17.9 の}\varepsilon G=G\varepsilon\big)\\
&= \big((\varepsilon\varepsilon)G\big)G && \big(\because \text{主張 2.15}\big)\\
&= \big(I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}G\big)G && \big(\because \text{主張 13.19 の}\varepsilon^2=\varepsilon\varepsilon=I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\big)\\
&= GG && \big(\because \text{主張 2.16}\big)\\
&= (\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1)(\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1) && \big(\because \text{定義 17.6}\big)\\
&= \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\big(\sigma^z_1(\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1)\big) && \big(\because \text{主張 2.15}\big)\\
&= \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\big((\sigma^z_1\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}})\sigma^z_1\big) && \big(\because \text{主張 2.15}\big)\\
&= \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\big((\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1)\sigma^z_1\big) && \big(\because \text{主張 12.10 }(j\to 1,\ k\to M_{\mathrm{col}},\ a=b=z)\big)\\
&= \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\big(\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}(\sigma^z_1\sigma^z_1)\big) && \big(\because \text{主張 2.15}\big)\\
&= (\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}})(\sigma^z_1\sigma^z_1) && \big(\because \text{主張 2.15}\big)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\,I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because \text{準備を}k=M_{\mathrm{col}}\text{ と}k=1\text{ で}\big)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because \text{主張 2.16}\big).
\end{aligned}
$$

□

定義 17.11 (1 次元開鎖のスピン配置とエネルギー)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 12.3 の $\mathfrak{M}=\mathrm{Map}(\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\},\{-1,1\})$ を用いる。各 $s\in\mathfrak{M}$ に対して、1 次元開鎖のエネルギーを

$$
E(s):=\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}s(m)\,s(m+1)\in\mathbb{Z}\qquad(s\in\mathfrak{M})
$$

と定める。

主張 17.12 (端点因子のない 1 次元開鎖のスピン和)**.** 定義 17.11 の記号（$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mathfrak{M}$、$E$）を用い、$K\in\mathbb{R}$ とする。exp は 定義 3.11 の実数の exp、cosh は 定義 3.19、x^n（$x\in\mathbb{R}$、$n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$）は 定義 1.61 の $\prod_{j=1}^n x$ である。このとき

$$
\sum_{s\in\mathfrak{M}}\exp(KE(s))=2\,(2\cosh K)^{M_{\mathrm{col}}-1}
$$

が成り立つ。（指数評価による $\mathbb{R}$ 脱出）ここでは実数値の指数関数を用いる。

証明. Step 1（変数変換）。写像

$$\Phi : \mathfrak{M} \longrightarrow \{-1,1\} \times \{-1,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1}, \qquad \Phi(s) := \big(s(1);\ t_1(s), \dots, t_{M_{\mathrm{col}}-1}(s)\big), \quad t_m(s) := s(m)s(m+1) \in \{-1,1\}$$

は全単射である。実際、$(u;\tau_1,\dots,\tau_{M_{\mathrm{col}}-1}) \in \{-1,1\}\times\{-1,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1}$ が与えられれば $s(1) := u$、$s(m+1) := s(m)\tau_m$ により $s(2),\dots,s(M_{\mathrm{col}})$ が順に一意に定まり（$s(m)s(m) = 1$ なので $s(m+1) = s(m)\tau_m$ は $\tau_m = s(m)s(m+1)$ と同値）、逆にこの手続きで作った s は $\Phi(s)$ として元の組を与えるからである。両側の集合はともに $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の元をもつ。

さらに写像 $\varsigma : \{0,1\} \to \{-1,1\}$ を $\varsigma(e) := 2e-1$（$\varsigma(1) = 1$、$\varsigma(0) = -1$）で定める。ς は全単射なので、定義 2.50 の $\{0,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1}$ から $\{-1,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1}$ への写像 $\epsilon \mapsto (\varsigma(\epsilon_1),\dots,\varsigma(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}-1}))$ も全単射である（成分ごとに ς の逆写像 $\tau \mapsto (\tau+1)/2$ を当てたものが逆写像）。

Step 2（スピン和の計算）。準備として、各 $s \in \mathfrak{M}$ について

$$\begin{aligned}
\exp(KE(s)) &= \exp\Big(K \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} t_m(s)\Big) \quad (\because \text{定義 17.11 と Step 1 の} t_m(s) := s(m)s(m+1)) \\
&= \exp\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Kt_m(s)\Big) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則を有限和の各項へ}) \\
&= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(Kt_m(s)) \quad (\because \text{主張 3.15 } (m \to M_{\mathrm{col}}-1,\ j \to m,\ x_j \to Kt_m(s)))
\end{aligned}$$

である。これを使うと

$$\begin{aligned}
\sum_{s\in\mathfrak{M}} \exp(KE(s)) &= \sum_{s\in\mathfrak{M}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(Kt_m(s)) \quad (\because \text{準備の等式を各項へ}) \\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \sum_{\tau_1,\dots,\tau_{M_{\mathrm{col}}-1}\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(K\tau_m) \quad (\because \text{Step 1 の全単射}\Phi \text{ で和の添字を} s \text{ から} (u;\tau_1,\dots,\tau_{M_{\mathrm{col}}-1}) = \Phi(s) \text{ へ付け替える}) \\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(K\varsigma(\epsilon_m)) \quad (\because \text{Step 1 の全単射} \epsilon \mapsto (\varsigma(\epsilon_1),\dots,\varsigma(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}-1})) \text{ で内側の和の添字を付け替える}) \\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (\exp(K\varsigma(1)) + \exp(K\varsigma(0))) \quad (\because \text{主張 2.55 } (r \to M_{\mathrm{col}}-1,\ j \to m,\ a_j^{(e)} \to \exp(K\varsigma(e))) \text{ を右辺から左辺へ、各} u \text{ の項へ}) \\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (\exp(K\cdot 1) + \exp(K\cdot(-1))) \quad (\because \varsigma(1) = 1,\ \varsigma(0) = -1 \text{ を各因子へ}) \\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (\exp(K) + \exp(K\cdot(-1))) \quad (\because \mathbb{R} \text{ で} a\cdot 1 = a \text{ を各因子へ}) \\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (\exp(K) + \exp(-K)) \quad (\because \mathbb{R} \text{ で} a\cdot(-1) = -a \text{ を各因子へ}) \\
&= 2 \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (\exp(K) + \exp(-K)) \quad (\because u \text{ に依らない実数} c \text{ の二元集合} \{-1,1\} \text{ 上の和は} c + c = 2c) \\
&= 2 \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (2\cosh K) \quad (\because \text{定義 3.19 } (x \to K) \text{ を各因子へ}) \\
&= 2\,(2\cosh K)^{M_{\mathrm{col}}-1} \quad (\because \text{主張の} x^n := \textstyle\prod_{j=1}^{n} x \ (x \to 2\cosh K,\ n \to M_{\mathrm{col}}-1))
\end{aligned}$$

□

主張 17.13 (両端のスピンの積を掛けた 1 次元開鎖のスピン和)**.** 定義 17.11 の記号（$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mathfrak{M}$、$E$）を用い、$K \in \mathbb{R}$ とする。exp は 定義 3.11 の実数の exp、sinh は 定義 3.19、x^n（$x \in \mathbb{R}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$）は 定義 1.61 の $\prod_{j=1}^{n} x$、$s(M_{\mathrm{col}})s(1) \in \{-1,1\} \subset \mathbb{R}$ である。このとき

$$\sum_{s\in\mathfrak{M}} s(M_{\mathrm{col}})s(1) \exp(KE(s)) = 2\,(2\sinh K)^{M_{\mathrm{col}}-1}$$

が成り立つ。（指数評価による $\mathbb{R}$ 脱出）ここでは実数値の指数関数を用いる。

証明. Step 1（変数変換）。主張 17.12 の証明の Step 1 の全単射

$$\Phi : \mathfrak{M} \longrightarrow \{-1,1\} \times \{-1,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1}, \qquad \Phi(s) := \big(s(1);\ t_1(s), \dots, t_{M_{\mathrm{col}}-1}(s)\big), \quad t_m(s) := s(m)s(m+1) \in \{-1,1\}$$

を使う。$(u; \tau_1, \dots, \tau_{M_{\mathrm{col}}-1})$ から $s(1) := u$、漸化式 $s(m+1) := s(m)\tau_m$ によって $s(2), \dots, s(M_{\mathrm{col}})$ が一意に復元され、この復元は Φ の逆写像になる。同じ証明の Step 1 の $\varsigma(e) := 2e - 1$ と全単射 $\epsilon \mapsto (\varsigma(\epsilon_1), \dots, \varsigma(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}-1}))$ $(\{0,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1} \to \{-1,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1})$ も使う。

Step 2（端点因子の書き替え）。各 $s \in \mathfrak{M}$ について、$M_{\mathrm{col}} = 2$ のとき

$$\begin{aligned}
\prod_{m=1}^{1} t_m(s) &= t_1(s) && \big(\because \text{ 定義 1.61 } (m \to 1)\big) \\
&= s(1)s(2) && \big(\because\ t_1(s) := s(1)s(2)\big) \\
&= s(1)s(M_{\mathrm{col}}) && \big(\because\ M_{\mathrm{col}} = 2\big)
\end{aligned}$$

であり、$M_{\mathrm{col}} \geq 3$ のとき

$$\begin{aligned}
\prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} t_m(s) &= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)s(m+1) && \big(\because\ t_m(s) := s(m)s(m+1)\big) \\
&= s(1)\left(\prod_{m=2}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)s(m)\right) s(M_{\mathrm{col}}) && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の可換性と結合性}\big) \\
&= s(1)\left(\prod_{m=2}^{M_{\mathrm{col}}-1} 1\right) s(M_{\mathrm{col}}) && \big(\because\ s(m)s(m) = 1 \text{ を各} m \text{ へ同時適用}\big) \\
&= s(1)s(M_{\mathrm{col}}) && \big(\because\ 1 \text{ の有限積は} 1\big)
\end{aligned}$$

である（隣接する因子が対になって 1 になる。$\prod_{m=2}^{M_{\mathrm{col}}-1}$ は $M_{\mathrm{col}} - 2 \geq 1$ 個の因子の 定義 1.61 の積）。また

$$\begin{aligned}
\exp(KE(s)) &= \exp\Big(K \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} t_m(s)\Big) && (\because \text{定義 17.11 と Step 1 の} t_m(s) := s(m)s(m+1)) \\
&= \exp\Big(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Kt_m(s)\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則を有限和の各項へ}) \\
&= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(Kt_m(s)) && (\because \text{主張 3.15 } (m \to M_{\mathrm{col}} - 1,\ j \to m,\ x_j \to Kt_m(s)))
\end{aligned}$$

である。これらから

$$\begin{aligned}
s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(KE(s)) &= s(1)s(M_{\mathrm{col}})\exp(KE(s)) && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の可換性}\big) \\
&= \left(\prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} t_m(s)\right)\exp(KE(s)) && \big(\because \text{ 上の等式を右辺から左辺へ}\big) \\
&= \left(\prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} t_m(s)\right)\prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\exp(Kt_m(s)) && \big(\because \text{ 上の } \exp(KE(s)) \text{ の鎖}\big) \\
&= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\big(t_m(s)\exp(Kt_m(s))\big) && \big(\because \text{ 主張 1.63 } (m \to M_{\mathrm{col}} - 1,\ j \to m,\ x_j \to t_m(s),\ y_j \to \exp(Kt_m(s))) \text{ を右辺から左辺へ}\big)
\end{aligned}$$

である。したがって

$$
\begin{aligned}
\sum_{s\in\mathfrak{M}} s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(KE(s)) &= \sum_{s\in\mathfrak{M}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(t_m(s)\exp(Kt_m(s))\right) \quad (\because \text{直前の等式を各項へ})\\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \sum_{\tau_1,\ldots,\tau_{M_{\mathrm{col}}-1}\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\tau_m\exp(K\tau_m)\right) \quad (\because \text{Step 1 の全単射}\Phi \text{ で和の添字を}s \text{ から}(u;\tau_1,\ldots,\tau_{M_{\mathrm{col}}-1})=\Phi(s) \text{ へ付け替える})\\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\varsigma(\epsilon_m)\exp(K\varsigma(\epsilon_m))\right) \quad (\because \text{Step 1 の全単射}\epsilon\mapsto(\varsigma(\epsilon_1),\ldots,\varsigma(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}-1})) \text{ で内側の和の添字を付け替える})\\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\varsigma(1)\exp(K\varsigma(1))+\varsigma(0)\exp(K\varsigma(0))\right) \quad (\because \text{主張 2.55 } (r\to M_{\mathrm{col}}-1,\ j\to m,\ a_j^{(e)}\to\varsigma(e)\exp(K\varsigma(e))) \text{ を右辺から左辺へ、各}u \text{ の項へ})\\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(1\cdot\exp(K\cdot 1)+(-1)\exp(K\cdot(-1))\right) \quad (\because \varsigma(1)=1,\ \varsigma(0)=-1 \text{ を各因子へ})\\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\exp(K\cdot 1)+(-1)\exp(K\cdot(-1))\right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ で} 1\cdot b=b \text{ を各因子へ})\\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\exp(K)+(-1)\exp(K\cdot(-1))\right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ で} a\cdot 1=a \text{ を各因子へ})\\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\exp(K)+(-1)\exp(-K)\right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ で} a\cdot(-1)=-a \text{ を各因子へ})\\
&= \sum_{u\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\exp(K)-\exp(-K)\right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ で} a+(-1)b=a-b \text{ を各因子へ})\\
&= 2\prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\exp(K)-\exp(-K)\right) \quad (\because u \text{ に依らない実数}c \text{ の二元集合}\{-1,1\} \text{ 上の和は}c+c=2c)\\
&= 2\prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(2\sinh K\right) \quad (\because \text{定義 3.19 } (x\to K) \text{ を各因子へ})\\
&= 2\left(2\sinh K\right)^{M_{\mathrm{col}}-1} \quad (\because \text{主張の} x^n:=\textstyle\prod_{j=1}^{n} x \ (x\to 2\sinh K,\ n\to M_{\mathrm{col}}-1))
\end{aligned}
$$

□

主張 17.14 (1 次元開鎖の二つのスピン和の正値性)**.** 定義 17.11 の $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ を用い、$K\in\mathbb{R}_{>0}$ とする。このとき 主張 17.12 と 主張 17.13 の二つのスピン和は、ともに正の実数である。

証明. 準備として

$$
\begin{aligned}
\cosh K &> 0 \quad (\because \text{主張 3.21 (1) } (x\to K))\\
2\cosh K &> 0 \quad (\because 2>0 \text{ と直前の行、正の実数どうしの積は正})\\
\sinh K &> 0 \quad (\because \text{主張 3.21 (3) } (x\to K>0))\\
2\sinh K &> 0 \quad (\because 2>0 \text{ と直前の行、正の実数どうしの積は正})\\
\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (2\cosh K) &> 0 \quad (\because \text{主張 1.62 } (m\to M_{\mathrm{col}}-1\in\mathbb{Z}_{\geq 1},\ r_j\to 2\cosh K))\\
\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (2\sinh K) &> 0 \quad (\because \text{主張 1.62 } (m\to M_{\mathrm{col}}-1\in\mathbb{Z}_{\geq 1},\ r_j\to 2\sinh K))
\end{aligned}
$$

である。これらから

$$
\begin{aligned}
\sum_{s\in\mathfrak{M}} \exp(KE(s)) &= 2\left(2\cosh K\right)^{M_{\mathrm{col}}-1} \quad (\because \text{主張 17.12})\\
&= 2\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (2\cosh K) \quad (\because \text{主張 17.12 の主張の冪の定義})\\
&> 0 \quad (\because \text{上の準備の} \textstyle\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}(2\cosh K)>0 \text{ と} 2>0\text{、正の実数どうしの積は正})
\end{aligned}
$$

$$\sum_{s\in\mathfrak{M}} s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(KE(s)) = 2\,(2\sinh K)^{M_{\mathrm{col}}-1} \quad (\because \text{主張 } 17.13)$$
$$= 2\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}(2\sinh K) \quad (\because \text{主張 } 17.13 \text{ の主張の冪の定義})$$
$$> 0 \quad (\because \text{上の準備の} \textstyle\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}(2\sinh K) > 0 \text{ と} 2 > 0\text{、正の実数どうしの積は正})$$

□

主張 17.15 ($\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ の平方根性)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 13.28 の $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と 定義 13.21 の $V_1^{(+)}$ について、

$$\left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)^2 = V_1^{(+)}$$

が成り立つ。ここで $A \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ に対して $A^2 := AA$ である。

証明. 準備。$\kappa := (K_1)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$（定義 1.13 の略記）、$c := \frac{i}{2}\kappa = \left(i\,2_{\mathbb{C}}^{-1}\right)\kappa \in \mathbb{C}$、$X := cH_1^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ とおく（定義 13.28 の $\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}$ の読み方)。X は自分自身と可換である。

$$XX = XX \qquad (\because \text{等号の反射律})$$

$1_{\mathbb{C}}$ を二つ足すと、定義 13.28 の $2_{\mathbb{C}} = (2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$ になる。

$$\begin{aligned}
1_{\mathbb{C}} + 1_{\mathbb{C}} &= (1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} + (1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} = (1,0)\text{（主張 1.56）と } (1,0) = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1_{\mathbb{R}})\text{（定義 1.13）を 2 箇所へ})\\
&= (1_{\mathbb{R}} + 1_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{主張 1.21 } (a,b \to 1_{\mathbb{R}}))\\
&= (2_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } 1+1=2)\\
&= 2_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{定義 13.28 の } 2_{\mathbb{C}} \text{ の定め方}).
\end{aligned}$$

c を二つ足すと $i\kappa$ になる（以下の結合律・可換律・分配律・単位元・逆元は 主張 1.56 の $\mathbb{C}$ の体の公理である)。

$$\begin{aligned}
c + c &= \left(i\,2_{\mathbb{C}}^{-1}\right)\kappa + \left(i\,2_{\mathbb{C}}^{-1}\right)\kappa && (\because\ c \text{ の定義を 2 箇所へ})\\
&= \left(i\,2_{\mathbb{C}}^{-1}\right)(\kappa + \kappa) && (\because\ \text{分配律})\\
&= \left(i\,2_{\mathbb{C}}^{-1}\right)\left(\kappa 1_{\mathbb{C}} + \kappa 1_{\mathbb{C}}\right) && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元。2 箇所へ})\\
&= \left(i\,2_{\mathbb{C}}^{-1}\right)\left(\kappa(1_{\mathbb{C}} + 1_{\mathbb{C}})\right) && (\because\ \text{分配律})\\
&= \left(i\,2_{\mathbb{C}}^{-1}\right)\left(\kappa 2_{\mathbb{C}}\right) && (\because\ \text{上の } 1_{\mathbb{C}} + 1_{\mathbb{C}} = 2_{\mathbb{C}})\\
&= \left(i\,2_{\mathbb{C}}^{-1}\right)\left(2_{\mathbb{C}}\kappa\right) && (\because\ \text{積の可換律})\\
&= i\left(2_{\mathbb{C}}^{-1}\left(2_{\mathbb{C}}\kappa\right)\right) && (\because\ \text{積の結合律})\\
&= i\left(\left(2_{\mathbb{C}}^{-1}2_{\mathbb{C}}\right)\kappa\right) && (\because\ \text{積の結合律})\\
&= i\left(1_{\mathbb{C}}\kappa\right) && (\because\ 2_{\mathbb{C}}^{-1} \text{ は } 2_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}} \text{ の逆元})\\
&= i\kappa && (\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元}).
\end{aligned}$$

主張について。$c_1 := c$、$c_2 := c$ とおく。主張 13.24 の右辺の $iK_1H_1^{(+)}$ は $(i\kappa)H_1^{(+)}$ と読む。

$$
\begin{aligned}
\Big(\Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2}\Big)^2 &= \Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2}\Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2} && (\because\ A^2 := AA)\\
&= \exp(X)\exp(X) && (\because\ \text{定義 13.28 と } X \text{ の定義を 2 箇所へ})\\
&= \exp(X+X) && (\because\ \text{定理 3.7 } (n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ K\to\mathbb{C},\ A,B\to X) \text{ と準備の } XX=XX)\\
&= \exp\Big(cH_1^{(+)}+cH_1^{(+)}\Big) && (\because\ X \text{ の定義を 2 箇所へ})\\
&= \exp\left(\sum_{j=1}^{2}\Big(c_jH_1^{(+)}\Big)\right) && \Big(\because\ c_1=c_2=c \text{ と 定義 2.5 } (r\to 1,\ X_j\to c_jH_1^{(+)}) \text{ の } r=1 \text{ と } r+1=2 \text{ の段}\Big)\\
&= \exp\left(\left(\sum_{j=1}^{2}c_j\right)H_1^{(+)}\right) && \Big(\because\ \text{主張 2.35 } (m,n\to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ r\to 2,\ A\to H_1^{(+)})\Big)\\
&= \exp\Big((c+c)H_1^{(+)}\Big) && (\because\ \text{定義 1.16 } (m\to 1,\ z_j\to c_j) \text{ の } m=1 \text{ と } m+1=2 \text{ の段と } c_1=c_2=c)\\
&= \exp\Big((i\kappa)H_1^{(+)}\Big) && (\because\ \text{準備の } c+c=i\kappa)\\
&= V_1^{(+)} && (\because\ \text{主張 13.24})\,.
\end{aligned}
$$

□

定理 17.16 $\big(\mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big) = (2\exp(-K_2)\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} > 0\big)$**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 13.29 の $V^{(+)} = \Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2} V_2 \Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2}$ について

$$
\mathrm{tr}\Big(\varepsilon\, V^{(+)}\Big) = (2\exp(-K_2)\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} \ \in\ \mathbb{R}_{>0}
$$

が成り立つ。ここで左辺は $\mathbb{C}$ の元、右辺は $\mathbb{R}$ の元であり、等号は左辺が右辺の像 $(\cdot)_{\mathbb{C}}$（定義 1.13）に等しいことを、$\in \mathbb{R}_{>0}$ は右辺の実数が正であることを表す。右辺の exp は 定義 3.11 の実数の exp、cosh, sinh は 定義 3.19、x^n は 定義 1.61 の $\prod_{j=1}^{n} x$ である。

** この計算には $\check{Z}, \check{Y}, \check{\psi}$ も $\tilde{\theta}_\mu$ も現れない。** 転送行列を配置の基底（定義 12.11）で見て、1 次元開鎖のスピン和（主張 17.12、主張 17.13）を実行するだけである。

証明. 準備。記号を置く。$\kappa := (K_1)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$（定義 1.13）、$B := \Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2}$（定義 13.28）、$I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ とし、定義 17.5 の D_0 と 定義 17.6 の G を用いる。$s \in \mathfrak{M}$ に対し $-s \in \mathfrak{M}$ を $(-s)(m) := -s(m)$ で定める。主張 12.5 より $\mathrm{ord} : \mathfrak{M} \to \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ は全単射なので、$a : \mathfrak{M} \to \mathbb{C}$ について $\sum_{s\in\mathfrak{M}} a(s) := \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} a\big(\mathrm{ord}^{-1}(k)\big)$（定義 1.16）と定め、$a : \mathfrak{M} \to \mathbb{R}$ についても同じ式で 定義 1.19 の和を定める（主張 17.12・主張 17.13 の左辺の和もこの和である）。主張 13.24 の右辺の $iK_1H_1^{(+)}$ は $(i\kappa)H_1^{(+)}$ と読む。

(P1) exp の中身の分解。

$$
\begin{aligned}
(i\kappa)H_1^{(+)} &= (\kappa i)H_1^{(+)} && (\because \text{主張 1.56 の積の可換律})\\
&= \kappa\big(iH_1^{(+)}\big) && (\because \text{主張 2.41})\\
&= \kappa\big(D_0+\varepsilon G\big) && (\because \text{主張 17.7})\\
&= \kappa D_0 + \kappa(\varepsilon G) && (\because \text{主張 2.33})
\end{aligned}
$$

(P2) 二つの可換性。

$$
\begin{aligned}
D_0(\varepsilon G) &= (D_0\varepsilon)G && (\because \text{主張 2.15})\\
&= (\varepsilon D_0)G && (\because \text{主張 17.9 の } \varepsilon D_0 = D_0\varepsilon)\\
&= \varepsilon(D_0G) && (\because \text{主張 2.15})\\
&= \varepsilon(GD_0) && (\because \text{主張 17.9 の } D_0G = GD_0)\\
&= (\varepsilon G)D_0 && (\because \text{主張 2.15})
\end{aligned}
$$

これに 主張 2.69 を $(G,X,c)=(D_0,\varepsilon G,\kappa)$ で当てて $D_0\big(\kappa(\varepsilon G)\big)=\big(\kappa(\varepsilon G)\big)D_0$、さらに $(G,X,c)=(\kappa(\varepsilon G),D_0,\kappa)$ で当てて $\big(\kappa(\varepsilon G)\big)(\kappa D_0)=(\kappa D_0)\big(\kappa(\varepsilon G)\big)$ を得る。また 主張 17.9 の $\varepsilon D_0=D_0\varepsilon$ に 主張 2.69 を $(G,X,c)=(\varepsilon,D_0,\kappa)$ で当てて $\varepsilon(\kappa D_0)=(\kappa D_0)\varepsilon$ を得る。

(P3) εG の冪。定義 3.4 の冪 $A^0:=I$、$A^{n+1}:=A^nA$ について、$j\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ に関する帰納法で $(\varepsilon G)^{2j}=I$ かつ $(\varepsilon G)^{2j+1}=\varepsilon G$ を示す。$j=0$ では $(\varepsilon G)^0=I$（冪の定義）であり、

$$\begin{aligned}(\varepsilon G)^{2j+1}&=(\varepsilon G)^{2j}(\varepsilon G) && (\because \text{冪の定義})\\ &=I(\varepsilon G) && (\because \text{帰納法の仮定 } (\varepsilon G)^{2j}=I)\\ &=\varepsilon G && (\because \text{主張 2.16})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\varepsilon G)^{2j+2}&=(\varepsilon G)^{2j+1}(\varepsilon G) && (\because \text{冪の定義})\\ &=(\varepsilon G)(\varepsilon G) && (\because \text{直前の } (\varepsilon G)^{2j+1}=\varepsilon G)\\ &=(\varepsilon G)^2 && (\because \text{主張 17.10 の } X^2:=XX)\\ &=I && (\because \text{主張 17.10})\end{aligned}$$

(P4) スカラー倍の冪。$n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ に関する帰納法で $\big(\kappa(\varepsilon G)\big)^n=\kappa^n(\varepsilon G)^n$（$\kappa^n$ は 定義 1.64）を示す。$n=0$ では両辺とも I である（$\kappa^0=1_{\mathbb{C}}$、主張 2.42）。$X:=\varepsilon G$ と書くと

$$\begin{aligned}(\kappa X)^{n+1}&=(\kappa X)^n(\kappa X) && (\because \text{冪の定義})\\ &=\big(\kappa^nX^n\big)(\kappa X) && (\because \text{帰納法の仮定})\\ &=\kappa^n\big(X^n(\kappa X)\big) && (\because \text{主張 2.18})\\ &=\kappa^n\big(\kappa(X^nX)\big) && (\because \text{主張 2.19})\\ &=(\kappa^n\kappa)(X^nX) && (\because \text{主張 2.41})\\ &=\kappa^{n+1}X^{n+1} && (\because \text{定義 1.64 と冪の定義})\end{aligned}$$

(P5) 基底ベクトルの成分。$s,s'\in\mathfrak{M}$ について、$\delta_{s=s'}\in\{0_{\mathbb{C}},1_{\mathbb{C}}\}$ を $s=s'$ のとき $1_{\mathbb{C}}$、そうでないとき $0_{\mathbb{C}}$ とすると

$$\begin{aligned}\big(f_{\iota(s)}\big)_{\mathrm{ord}(s')}&=\big(f_{\iota(s)}\big)_{\nu(\iota(s'))} && (\because \text{主張 12.12})\\ &=\prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}\big(e_{\iota(s)_m}\big)_{\iota(s')_m} && (\because \text{定義 4.1 の } f_I \text{ と定義 2.72 (1) の成分の式})\\ &=\delta_{s=s'} && (\because \text{下の場合分け})\end{aligned}$$

最後の行の場合分け: $s=s'$ なら全ての因子が $(e_i)_i=1_{\mathbb{C}}$（$e_1=(1,0),\ e_2=(0,1)$）なので、積は 主張 1.66 より $1_{\mathbb{C}}$。$s\neq s'$ なら 定義 12.11 の ι は単射（i_m から $s(m)$ が読み戻せる）なので、ある m で $\iota(s)_m\neq\iota(s')_m$ となり、その因子は $0_{\mathbb{C}}$。積は 主張 1.65 より $0_{\mathbb{C}}$。

列の読み取り: $X\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ について、主張 12.5 より $l\neq\mathrm{ord}(s)$ の番号は $t\neq s$ なる $l=\mathrm{ord}(t)$ と書けるので、上の式から $(f_{\iota(s)})_l=0_{\mathbb{C}}$、主張 1.59 より $X_{\mathrm{ord}(s'),l}(f_{\iota(s)})_l=0_{\mathbb{C}}$ である。ゆえに

$$\begin{aligned}\big(Xf_{\iota(s)}\big)_{\mathrm{ord}(s')}&=\sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}X_{\mathrm{ord}(s'),l}\big(f_{\iota(s)}\big)_l && (\because \text{定義 1.6})\\ &=X_{\mathrm{ord}(s'),\mathrm{ord}(s)}\big(f_{\iota(s)}\big)_{\mathrm{ord}(s)} && (\because \text{主張 1.68})\\ &=X_{\mathrm{ord}(s'),\mathrm{ord}(s)}\,1_{\mathbb{C}} && (\because \text{(P5) の } s'=s)\\ &=X_{\mathrm{ord}(s'),\mathrm{ord}(s)} && (\because \text{主張 1.56 の積の単位元})\end{aligned}$$

Step 1（ε を $V_1^{(+)}V_2$ の前へ移す）。

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) &= \operatorname{tr}(\varepsilon\, B\, V_2\, B) && (\because \text{定義 13.29})\\
&= \operatorname{tr}(B\,\varepsilon\, V_2\, B) && (\because \text{主張 13.35 の } \varepsilon B = B\varepsilon)\\
&= \operatorname{tr}(\varepsilon\, V_2\, B\, B) && (\because \text{主張 8.2 (2) を } A = B,\ B' = \varepsilon V_2 B \text{ に})\\
&= \operatorname{tr}\Big(\varepsilon\, V_2\, V_1^{(+)}\Big) && \Big(\because \text{主張 17.15 の } BB = V_1^{(+)}\Big)\\
&= \operatorname{tr}\Big(V_1^{(+)}\,\varepsilon\, V_2\Big) && (\because \text{主張 8.2 (2) を } A = \varepsilon V_2,\ B' = V_1^{(+)} \text{ に})\\
&= \operatorname{tr}\Big(\varepsilon\, V_1^{(+)}\, V_2\Big) && (\because \text{主張 13.34 の } V_1^{(+)}\varepsilon = \varepsilon V_1^{(+)})
\end{aligned}
$$

（積の括弧は 主張 2.15 により省いている。）

Step 2（$\varepsilon V_1^{(+)}$ を対角行列と ε・G で書く）。

$$
\begin{aligned}
V_1^{(+)} &= \exp\Big((i\kappa)H_1^{(+)}\Big) && (\because \text{主張 13.24})\\
&= \exp(\kappa D_0 + \kappa(\varepsilon G)) && (\because \text{(P1)})\\
&= \exp(\kappa D_0)\exp(\kappa(\varepsilon G)) && (\because \text{定理 3.7 を } A = \kappa D_0,\ B = \kappa(\varepsilon G) \text{ に。可換性は (P2)})
\end{aligned}
$$

$T_n := \big(\kappa(\varepsilon G)\big)^n$（$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）は、(P4)・(P3) より n が偶数のとき $\kappa^n I$、奇数のとき $\kappa^n(\varepsilon G) = (1_{\mathbb{C}}\kappa^n)(\varepsilon G)$（主張 1.56 の積の単位元）である。ゆえに 主張 14.25 の仮定を $d = 2^{M_{\mathrm{col}}}$、$x = K_1$、$A = I$、$B = \varepsilon G$、$c = 1_{\mathbb{C}}$ で満たし、

$$
\begin{aligned}
\exp(\kappa(\varepsilon G)) &= \sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{1}{n!}\Big)_{\mathbb{C}}\big(\kappa(\varepsilon G)\big)^n && (\because \text{定義 3.4 (1)})\\
&= (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\, I + \big(1_{\mathbb{C}}(\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\big)(\varepsilon G) && (\because \text{主張 14.25})\\
&= (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\, I + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}(\varepsilon G) && (\because \text{主張 1.56 の積の単位元})
\end{aligned}
$$

である。したがって

$$
\begin{aligned}
\varepsilon V_1^{(+)} &= \varepsilon\Big(\exp(\kappa D_0)\exp\big(\kappa(\varepsilon G)\big)\Big) && (\because \text{この Step の最初の鎖})\\
&= \big(\varepsilon\exp(\kappa D_0)\big)\exp\big(\kappa(\varepsilon G)\big) && (\because \text{主張 2.15})\\
&= \big(\exp(\kappa D_0)\varepsilon\big)\exp\big(\kappa(\varepsilon G)\big) && (\because \text{主張 3.6 を } A = \varepsilon,\ B = \kappa D_0 \text{ に。可換性は (P2)})\\
&= \exp(\kappa D_0)\Big(\varepsilon\exp\big(\kappa(\varepsilon G)\big)\Big) && (\because \text{主張 2.15})\\
&= \exp(\kappa D_0)\Big(\varepsilon\big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}} I + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}(\varepsilon G)\big)\Big) && (\because \text{直前の } \exp(\kappa(\varepsilon G)) \text{ の鎖})\\
&= \exp(\kappa D_0)\Big(\varepsilon\big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}} I\big) + \varepsilon\big((\sinh K_1)_{\mathbb{C}}(\varepsilon G)\big)\Big) && (\because \text{主張 2.23})\\
&= \exp(\kappa D_0)\Big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}(\varepsilon I) + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\big(\varepsilon(\varepsilon G)\big)\Big) && (\because \text{主張 2.19})\\
&= \exp(\kappa D_0)\Big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\varepsilon + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\big(\varepsilon(\varepsilon G)\big)\Big) && (\because \text{主張 2.17})\\
&= \exp(\kappa D_0)\Big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\varepsilon + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\big((\varepsilon\varepsilon)G\big)\Big) && (\because \text{主張 2.15})\\
&= \exp(\kappa D_0)\Big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\varepsilon + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}(IG)\Big) && (\because \text{主張 13.19 の } \varepsilon^2 = I)\\
&= \exp(\kappa D_0)\Big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\varepsilon + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\,G\Big) && (\because \text{主張 2.16})
\end{aligned}
$$

Step 3（成分の読み取り）。$s, s' \in \mathfrak{M}$ とする。

(a) D_0 と G の成分は

$$
\begin{aligned}
(D_0)_{\mathrm{ord}(s'),\mathrm{ord}(s)} &= \big(D_0 f_{\iota(s)}\big)_{\mathrm{ord}(s')} && (\because \text{(P5) の列の読み取り}) \\
&= \Big(\big(E(s)\big)_{\mathbb{C}} f_{\iota(s)}\Big)_{\mathrm{ord}(s')} && (\because \text{主張 17.8 と 定義 17.11}) \\
&= \big(E(s)\big)_{\mathbb{C}} \big(f_{\iota(s)}\big)_{\mathrm{ord}(s')} && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \big(E(s)\big)_{\mathbb{C}}\, \delta_{s=s'} && (\because \text{(P5)})
\end{aligned}
$$

であり、同じ 4 行で $G_{\mathrm{ord}(s'),\mathrm{ord}(s)} = \big(s(M_{\mathrm{col}})s(1)\big)_{\mathbb{C}}\, \delta_{s=s'}$（主張 17.8 の G の式）である。主張 12.5 より全ての番号は $\mathrm{ord}(s)$ の形なので、D_0 も G も対角行列（定義 4.2）であり、κD_0 も対角行列で（定義 2.3・主張 1.59）、その対角成分は

$$
\begin{aligned}
(\kappa D_0)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} &= \kappa \big(E(s)\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 2.3 と (a)}) \\
&= \big(K_1 E(s)\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29})
\end{aligned}
$$

である。ゆえに 主張 4.3 より $\exp(\kappa D_0)$ は対角行列で、

$$
\begin{aligned}
\big(\exp(\kappa D_0)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} &= \exp\Big(\big(K_1 E(s)\big)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because \text{主張 4.3}) \\
&= \Big(\exp\big(K_1 E(s)\big)\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 3.18})
\end{aligned}
$$

(b) $\varepsilon f_{\iota(s)} = f_{\iota(-s)}$。理由：定義 4.1 の基底は $f_I = e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}}$ で、主張 2.73 より σ^x_m は第 m 因子にだけ σ^x を作用させる。$\sigma^x e_1 = e_2$、$\sigma^x e_2 = e_1$ なので $\sigma^x_m f_I$ は第 m 成分だけを入れ替える。$\varepsilon = \sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{M_{\mathrm{col}}}$（定義 13.3）はすべての成分を入れ替えるので、定義 12.11 の ι（$+1 \mapsto 1$、$-1 \mapsto 2$）のもとで $\varepsilon f_{\iota(s)} = f_{\iota(-s)}$ である。これと (P5) より

$$
\begin{aligned}
\varepsilon_{\mathrm{ord}(s'),\mathrm{ord}(s)} &= \big(\varepsilon f_{\iota(s)}\big)_{\mathrm{ord}(s')} && (\because \text{(P5) の列の読み取り}) \\
&= \big(f_{\iota(-s)}\big)_{\mathrm{ord}(s')} && (\because \text{(b)}) \\
&= \delta_{-s=s'} && (\because \text{(P5)})
\end{aligned}
$$

(c) 定義 12.6 より $(V_2)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s')} = \Big(\exp\Big(K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} s(m)s'(m)\Big)\Big)_{\mathbb{C}}$（右辺の内側は 定義 3.11 の実数の exp）。$s(m)s(m) = 1$、$(-s(m))s(m) = -1$ を $m = 1, \ldots, M_{\mathrm{col}}$ について足すと $(V_2)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} = \big(\exp(K_2 M_{\mathrm{col}})\big)_{\mathbb{C}}$、$(V_2)_{\mathrm{ord}(-s),\mathrm{ord}(s)} = \big(\exp(-K_2 M_{\mathrm{col}})\big)_{\mathbb{C}}$ である。

Step 4（対角成分）。$s \in \mathfrak{M}$ とする。定義 1.6 の和 $\sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ で、(a) の対角性・(b) の $\varepsilon_{\mathrm{ord}(s),k}$ が $k \neq \mathrm{ord}(-s)$ で $0_{\mathbb{C}}$ であることから、$0_{\mathbb{C}}$ を掛けた項は 主張 1.58 で $0_{\mathbb{C}}$ になり、主張 1.68 により一つの項だけが残る。

$$
\begin{aligned}
\big(\exp(\kappa D_0)(\varepsilon V_2)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} &= \big(\exp(\kappa D_0)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} (\varepsilon V_2)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} && (\because \text{定義 1.6 と (a) の } \exp(\kappa D_0) \text{ の対角性、主張 1.68}) \\
&= \big(\exp(\kappa D_0)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} \big(\varepsilon_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(-s)} (V_2)_{\mathrm{ord}(-s),\mathrm{ord}(s)}\big) && (\because \text{定義 1.6 と (b)、主張 1.68}) \\
&= \big(\exp(\kappa D_0)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} \big(1_{\mathbb{C}} (V_2)_{\mathrm{ord}(-s),\mathrm{ord}(s)}\big) && (\because \text{(b) の } \delta_{-(-s)=s} = 1_{\mathbb{C}}) \\
&= \big(\exp(\kappa D_0)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} (V_2)_{\mathrm{ord}(-s),\mathrm{ord}(s)} && (\because \text{主張 1.56 の積の単位元}) \\
&= \Big(\exp\big(K_1 E(s)\big)\Big)_{\mathbb{C}} (V_2)_{\mathrm{ord}(-s),\mathrm{ord}(s)} && (\because \text{(a)}) \\
&= \Big(\exp\big(K_1 E(s)\big)\Big)_{\mathbb{C}} \big(\exp(-K_2 M_{\mathrm{col}})\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{(c)}) \\
&= \Big(\exp(-K_2 M_{\mathrm{col}}) \exp\big(K_1 E(s)\big)\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29 と } \mathbb{R} \text{ の積の可換律})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\big(\exp(\kappa D_0)(GV_2)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} &= \big(\exp(\kappa D_0)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)}\,(GV_2)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} && (\because \text{定義 1.6 と (a) の } \exp(\kappa D_0) \text{ の対角性、主張 1.68})\\
&= \big(\exp(\kappa D_0)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)}\,\big(G_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)}(V_2)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)}\big) && (\because \text{定義 1.6 と (a) の } G \text{ の対角性、主張 1.68})\\
&= \Big(\exp\big(K_1E(s)\big)\Big)_{\mathbb{C}}\Big(\big(s(M_{\mathrm{col}})s(1)\big)_{\mathbb{C}}(V_2)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)}\Big) && (\because \text{(a)})\\
&= \Big(\exp\big(K_1E(s)\big)\Big)_{\mathbb{C}}\Big(\big(s(M_{\mathrm{col}})s(1)\big)_{\mathbb{C}}\big(\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\big)_{\mathbb{C}}\Big) && (\because \text{(c)})\\
&= \Big(\exp\big(K_1E(s)\big)\Big)_{\mathbb{C}}\Big(s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29})\\
&= \Big(\exp\big(K_1E(s)\big)\,s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29})\\
&= \Big(\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\big(s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(K_1E(s))\big)\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律・結合律})
\end{aligned}
$$

Step 5(トレースの計算)。$S_{\cosh} := \sum_{s\in\mathfrak{M}} \exp\big(K_1E(s)\big) \in \mathbb{R}$、$S_{\sinh} := \sum_{s\in\mathfrak{M}} s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp\big(K_1E(s)\big) \in \mathbb{R}$ とおく。定義 8.1 と準備の和の定め方より $\mathrm{tr}(X) = \sum_{s\in\mathfrak{M}} X_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)}$ である。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(\exp(\kappa D_0)(\varepsilon V_2)) &= \sum_{s\in\mathfrak{M}} \big(\exp(\kappa D_0)(\varepsilon V_2)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} && (\because \text{定義 8.1 と準備の和の定め方})\\
&= \sum_{s\in\mathfrak{M}} \Big(\exp(-K_2M_{\mathrm{col}})\exp\big(K_1E(s)\big)\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{Step 4})\\
&= \Big(\sum_{s\in\mathfrak{M}} \exp(-K_2M_{\mathrm{col}})\exp\big(K_1E(s)\big)\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.20})\\
&= \big(\exp(-K_2M_{\mathrm{col}})\,S_{\cosh}\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.24})\\
\mathrm{tr}(\exp(\kappa D_0)(GV_2)) &= \sum_{s\in\mathfrak{M}} \big(\exp(\kappa D_0)(GV_2)\big)_{\mathrm{ord}(s),\mathrm{ord}(s)} && (\because \text{定義 8.1 と準備の和の定め方})\\
&= \sum_{s\in\mathfrak{M}} \Big(\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\big(s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(K_1E(s))\big)\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{Step 4})\\
&= \Big(\sum_{s\in\mathfrak{M}} \exp(K_2M_{\mathrm{col}})\big(s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(K_1E(s))\big)\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.20})\\
&= \big(\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\,S_{\sinh}\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.24})
\end{aligned}
$$

これらを使って

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) &= \mathrm{tr}\Big(\varepsilon V_1^{(+)}V_2\Big) && (\because \text{Step 1})\\
&= \mathrm{tr}\Big(\Big(\exp(\kappa D_0)\big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\varepsilon + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\,G\big)\Big)V_2\Big) && (\because \text{Step 2})\\
&= \mathrm{tr}\Big(\exp(\kappa D_0)\Big(\big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\varepsilon + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\,G\big)V_2\Big)\Big) && (\because \text{主張 2.15})\\
&= \mathrm{tr}\Big(\exp(\kappa D_0)\Big(\big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\varepsilon\big)V_2 + \big((\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\,G\big)V_2\Big)\Big) && (\because \text{主張 2.24})\\
&= \mathrm{tr}\Big(\exp(\kappa D_0)\Big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}(\varepsilon V_2) + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}(GV_2)\Big)\Big) && (\because \text{主張 2.18})\\
&= \mathrm{tr}\Big(\exp(\kappa D_0)\big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}(\varepsilon V_2)\big) + \exp(\kappa D_0)\big((\sinh K_1)_{\mathbb{C}}(GV_2)\big)\Big) && (\because \text{主張 2.23})\\
&= \mathrm{tr}\Big((\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\big(\exp(\kappa D_0)(\varepsilon V_2)\big) + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\big(\exp(\kappa D_0)(GV_2)\big)\Big) && (\because \text{主張 2.19})\\
&= (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\,\mathrm{tr}\big(\exp(\kappa D_0)(\varepsilon V_2)\big) + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\,\mathrm{tr}\big(\exp(\kappa D_0)(GV_2)\big) && (\because \text{主張 8.2 (1)})\\
&= (\cosh K_1)_{\mathbb{C}}\big(\exp(-K_2M_{\mathrm{col}})\,S_{\cosh}\big)_{\mathbb{C}} + (\sinh K_1)_{\mathbb{C}}\big(\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\,S_{\sinh}\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{直前の二つの鎖})\\
&= \big(\cosh K_1\,(\exp(-K_2M_{\mathrm{col}})\,S_{\cosh})\big)_{\mathbb{C}} + \big(\sinh K_1\,(\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\,S_{\sinh})\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29})\\
&= \big(\cosh K_1\,(\exp(-K_2M_{\mathrm{col}})\,S_{\cosh}) + \sinh K_1\,(\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\,S_{\sinh})\big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.21})
\end{aligned}
$$

であり、括弧の中の実数は、$x^n := \prod_{j=1}^{n} x$ (定義 1.61。$M_{\mathrm{col}}-1 \geq 1$) と $\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}(\mp K_2) = \mp K_2M_{\mathrm{col}}$ を使って

$$
\begin{aligned}
&\cosh K_1\,(\exp(-K_2M_{\mathrm{col}})\,S_{\cosh}) + \sinh K_1\,(\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\,S_{\sinh}) \\
&= \cosh K_1\left(\exp(-K_2M_{\mathrm{col}})\cdot 2\,(2\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}-1}\right) + \sinh K_1\left(\exp(K_2M_{\mathrm{col}})\cdot 2\,(2\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}-1}\right) && (\because \text{主張 17.12 と 主張 17.13 を } K=K_1 \text{ に}) \\
&= \exp(-K_2M_{\mathrm{col}})\Big((2\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}-1}(2\cosh K_1)\Big) + \exp(K_2M_{\mathrm{col}})\Big((2\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}-1}(2\sinh K_1)\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律・結合律}) \\
&= \exp(-K_2M_{\mathrm{col}})\,(2\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + \exp(K_2M_{\mathrm{col}})\,(2\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{定義 1.61 の帰納的定義}) \\
&= \exp\Big(\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}(-K_2)\Big)\,(2\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + \exp\Big(\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}K_2\Big)\,(2\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} && (\because \mathbb{R} \text{ の有限和: 同じ実数 } \mp K_2 \text{ を } M_{\mathrm{col}} \text{ 個足すと } \mp K_2M_{\mathrm{col}}) \\
&= \Big(\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp(-K_2)\Big)\,(2\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + \Big(\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp(K_2)\Big)\,(2\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 3.15}) \\
&= \Big(\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp(-K_2)\Big)\Big(\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}2\cosh K_1\Big) + \Big(\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp(K_2)\Big)\Big(\prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}2\sinh K_1\Big) && (\because \text{冪の定義 } x^n := \textstyle\prod_{j=1}^{n}x) \\
&= \prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\big(\exp(-K_2)\cdot 2\cosh K_1\big) + \prod_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\big(\exp(K_2)\cdot 2\sinh K_1\big) && (\because \text{主張 1.63}) \\
&= (2\exp(-K_2)\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} && (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律・結合律と冪の定義})
\end{aligned}
$$

に等しい。ゆえに主張の等号が成り立つ。

Step 6（正値性）。主張 17.14 を $K = K_1$ として $S_{\cosh} > 0$、$S_{\sinh} > 0$。主張 3.21 (3) と $K_1 > 0$ から $\cosh K_1 > 0$、$\sinh K_1 > 0$。主張 3.16 から $\exp(\mp K_2M_{\mathrm{col}}) > 0$。正の実数の積は正なので、Step 5 の最後の鎖の左辺の二項はともに正であり、正の実数の和は正なので、左辺は正である。それが右辺に等しいので $(2\exp(-K_2)\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}_{>0}$ である。 □

定理 17.17 (ε の固有値は $+1$, $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 17.3 の η_ϵ について次が成り立つ。

- (1) $\eta_{(1,\dots,1)} = +1$
- (2) $\eta_\epsilon = (-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|} = (-1)^{M_{\mathrm{col}}+|\epsilon|}$、すなわち $\varepsilon\check{Q}_\epsilon = (-1)^{M_{\mathrm{col}}+|\epsilon|}\check{Q}_\epsilon$。
- (3) $\varepsilon = (-1)^{M_{\mathrm{col}}}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}(I - 2\check{n}_\mu)$
- (4) $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$（定義 13.18 の $\mathcal{F}^{(+)}$）。すなわち $^{**}V^{(+)}$ の最大固有値 $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルは $\mathcal{F}^{(+)}$ に属する **。

証明. 準備。$\eta_\epsilon \in \{+1, -1\}$ の $+1, -1$ は $\mathbb{C}$ の元 $1_{\mathbb{C}}$ と $-1_{\mathbb{C}}$（主張 17.3 (1) の η_ϵ は行列のスカラー倍の係数なので $\mathbb{C}$ の元である。主張 17.4 も $\eta_{(1,\dots,1)}$ をこう読む）であり、$-1_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の像 $(-1)_{\mathbb{C}}$ の略記（定義 1.14 の $-z$ とは別の記号）、$(-1)^k$（$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）は 定義 1.64 の $(-1_{\mathbb{C}})^k$ である。(P1) $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
(-1)^k(-1)^k &= ((-1_{\mathbb{C}})(-1_{\mathbb{C}}))^k && (\because \text{可換な二数の冪の積} z^kw^k = (zw)^k \text{(定義 1.64 から} k \text{ の帰納法と、主張 1.56 の乗法の結合則・交換則）}) \\
&= (((-1)(-1))_{\mathbb{C}})^k && (\because \text{主張 1.29}) \\
&= 1_{\mathbb{C}}^k && (\because \mathbb{R} \text{ の四則 } (-1)(-1) = 1) \\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because 1_{\mathbb{C}}^{k+1} = 1_{\mathbb{C}}^k 1_{\mathbb{C}} \text{(定義 1.64）と} 1_{\mathbb{C}} \text{ が乗法の単位元であること（主張 1.56）から} k \text{ の帰納法})
\end{aligned}
$$

(P2) $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ について $\{\mu \in \check{\mathcal{M}} \mid \epsilon_\mu = 1\} \subseteq \check{\mathcal{M}}$ なので

$$
\begin{aligned}
|\epsilon| &= \#\{\mu \in \check{\mathcal{M}} \mid \epsilon_\mu = 1\} && (\because \text{主張 17.3 の} |\epsilon| \text{ の置き方}) \\
&\leq \#\check{\mathcal{M}} && (\because \text{有限集合の部分集合の元の個数は全体の元の個数以下}) \\
&= M_{\mathrm{col}} && (\because \text{定義 14.15 の} \check{\mathcal{M}} = \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\})
\end{aligned}
$$

であり、$M_{\mathrm{col}} - |\epsilon| \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ である。

(1) $r := (2\exp(-K_2)\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}$ とおく。

$\mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) = r_{\mathbb{C}}$ かつ $r \in \mathbb{R}_{>0}$ $(\because$ 定理 17.16 とその等号と $\in \mathbb{R}_{>0}$ の読み方$)$

$\Longrightarrow \mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) > 0$ $(\because$ 主張 17.4 の$\mathbb{C}$ の元の$z > 0$ の定め方 $(z \to \mathrm{tr}(\varepsilon V^{(+)})$、存在する実数として$r$ を取る$))$

$\Longrightarrow \eta_{(1,\ldots,1)} = +1$ $(\because$ 主張 17.4 (3) の同値の $\Longleftarrow)$

(2) $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ を取る。指数はすべて (P2) により $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ の元である。

$\eta_\epsilon = \eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}$ $(\because$ 主張 17.3 (3)$)$

$= 1_{\mathbb{C}}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}$ $(\because$ (1)$)$

$= (-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}$ $(\because$ $1_{\mathbb{C}}$ は乗法の単位元。主張 1.56$)$

$= (-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}\, 1_{\mathbb{C}}$ $(\because$ $1_{\mathbb{C}}$ は乗法の単位元。主張 1.56$)$

$= (-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}\Big((-1)^{|\epsilon|}(-1)^{|\epsilon|}\Big)$ $(\because$ (P1) $(k \to |\epsilon|)$ を右辺から左辺へ$)$

$= \Big((-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}(-1)^{|\epsilon|}\Big)(-1)^{|\epsilon|}$ $(\because$ 主張 1.56 の乗法の結合則$)$

$= (-1)^{M_{\mathrm{col}}}(-1)^{|\epsilon|}$ $(\because$ 非負の指数の指数法則$z^a z^b = z^{a+b}$(定義 1.64 からb の帰納法$)$ $(a \to M_{\mathrm{col}} - |\epsilon|,\ b \to |\epsilon|))$

$= (-1)^{M_{\mathrm{col}}+|\epsilon|}$ $(\because$ 同じ指数法則 $(a \to M_{\mathrm{col}},\ b \to |\epsilon|))$

これで $\eta_\epsilon = (-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|} = (-1)^{M_{\mathrm{col}}+|\epsilon|}$ を得た（三行目と最後の行)。行列の式は

$$\begin{aligned}\varepsilon\check{Q}_\epsilon &= \eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon && (\because \text{主張 17.3 (1)})\\ &= (-1)^{M_{\mathrm{col}}+|\epsilon|}\check{Q}_\epsilon && (\because \text{上の鎖の}\eta_\epsilon = (-1)^{M_{\mathrm{col}}+|\epsilon|})\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \big(\eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}}\big)\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}(I-2\check{n}_\mu) && (\because \text{主張 17.3 (4)})\\ &= \big(1_{\mathbb{C}}(-1)^{M_{\mathrm{col}}}\big)\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}(I-2\check{n}_\mu) && (\because (1))\\ &= (-1)^{M_{\mathrm{col}}}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}(I-2\check{n}_\mu) && (\because 1_{\mathbb{C}} \text{ は乗法の単位元。主張 1.56})\end{aligned}$$

(4) まず $\varepsilon\check{Q}_{(1,\ldots,1)} = \check{Q}_{(1,\ldots,1)}$ を示す。

$$\begin{aligned}\varepsilon\check{Q}_{(1,\ldots,1)} &= \eta_{(1,\ldots,1)}\check{Q}_{(1,\ldots,1)} && (\because \text{主張 17.3 (1) } (\epsilon \to (1,\ldots,1)))\\ &= 1_{\mathbb{C}}\check{Q}_{(1,\ldots,1)} && (\because (1))\\ &= \check{Q}_{(1,\ldots,1)} && (\because \text{主張 2.42})\end{aligned}$$

$y \in \mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\ldots,1)}$ を取ると、$y = \check{Q}_{(1,\ldots,1)}x$ なる $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ が取れる（数ベクトルは 定義 1.6 の $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 行 1 列の行列)。

$$\begin{aligned}\check{Q}_{(1,\ldots,1)}y &= \check{Q}_{(1,\ldots,1)}\big(\check{Q}_{(1,\ldots,1)}x\big) && (\because y = \check{Q}_{(1,\ldots,1)}x \text{ の取り方})\\ &= \big(\check{Q}_{(1,\ldots,1)}\check{Q}_{(1,\ldots,1)}\big)x && (\because \text{主張 2.15})\\ &= \check{Q}_{(1,\ldots,1)}x && (\because \text{主張 16.9 (1) の } \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon\ (\epsilon \to (1,\ldots,1)))\\ &= y && (\because y = \check{Q}_{(1,\ldots,1)}x \text{ の取り方})\end{aligned}$$

であり、

$$
\begin{aligned}
\varepsilon y &= \varepsilon\left(\check{Q}_{(1,\dots,1)}y\right) && (\because\ \text{直前の鎖の}\check{Q}_{(1,\dots,1)}y = y)\\
&= \left(\varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)}\right)y && (\because\ \text{主張 2.15})\\
&= \check{Q}_{(1,\dots,1)}y && (\because\ \text{上の鎖の}\varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)} = \check{Q}_{(1,\dots,1)})\\
&= y && (\because\ \text{直前の鎖の}\check{Q}_{(1,\dots,1)}y = y)
\end{aligned}
$$

なので、定義 13.18 より $y \in \mathcal{F}^{(+)}$。y は $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ の任意の元なので $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$ である。言い換えの部分は

$$
\begin{aligned}
\left\{x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \;\middle|\; V^{(+)}x = \check{\Lambda}_{\max}x\right\} &= \operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)} && (\because\ \text{定理 16.19 (3)})\\
&\subseteq \mathcal{F}^{(+)} && (\because\ \text{上で示した包含})
\end{aligned}
$$

である。 □

主張 17.18 ($\operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) > 0$ から$\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 13.29 の $V^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、定義 13.15 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、主張 16.9 の $\check{Q}_{(1,\dots,1)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、定義 13.18 の $\mathcal{F}^{(+)} \subseteq \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について、次が成り立つ。

- (1) $\operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) = \left(2\exp(-K_2)\cosh K_1\right)^{M_{\mathrm{col}}} + \left(2\exp(K_2)\sinh K_1\right)^{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}_{>0}$（右辺が $\mathbb{R}$ に住むのは、定義 3.4 の exp と 定義 3.19 の $\cosh, \sinh$ の値が 主張 3.1 の級数の極限で定まるため。指数評価による脱出）
- (2) $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$

証明. (1) 定理 17.16 そのものである。

(2) $\eta_{(1,\dots,1)} \in \{+1, -1\}$ は 主張 17.3 (1) の符号とする。

$$
\begin{aligned}
&\operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) > 0 && (\because\ (1))\\
\Longrightarrow\ &\eta_{(1,\dots,1)} = +1 && (\because\ \text{主張 17.4 (3) の同値}\ \eta_{(1,\dots,1)} = +1 \iff \operatorname{tr}(\varepsilon V^{(+)}) > 0)\\
\Longrightarrow\ &\varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)} = \check{Q}_{(1,\dots,1)} && (\because\ \text{主張 17.3 (1) の}\ \varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)} = \eta_{(1,\dots,1)}\check{Q}_{(1,\dots,1)})
\end{aligned}
$$

$y \in \operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ を取ると、主張 16.9 (1) の冪等性より $y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y$ であり

$$
\begin{aligned}
\varepsilon y &= \varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)}y && (\because\ y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y)\\
&= \check{Q}_{(1,\dots,1)}y && (\because\ \text{直前の}\ \varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)} = \check{Q}_{(1,\dots,1)})\\
&= y && (\because\ y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y)
\end{aligned}
$$

したがって 定義 13.18 より $y \in \mathcal{F}^{(+)}$。これは 定理 17.17 (4) と同じ結論である。 □

部 IV
熱力学極限

18 $N \to \infty$ の極限と最大固有値$c(M)$

注意 18.1 (Z を$c(M_{\mathrm{col}})$ で挟み、$N_{\mathrm{row}} \to \infty$ の極限を取る道筋)**.** 主張 12.7 により $Z(K_1, K_2) = \operatorname{tr}\left((V_1V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\right)$ である。熱力学極限を取るには、この N_{row} 乗のトレースを ** 最大固有値ひとつ ** で挟み撃ちしたい。以下でそれを行う。

得られる評価は、$W := V_1^{1/2}V_2V_1^{1/2}$、$c(M_{\mathrm{col}}) := \sup\{\, x^\top Wx \mid x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \,\}$ として

$$c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} \;\le\; Z(K_1,K_2) \;\le\; 2^{M_{\mathrm{col}}}\, c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}}$$

である。** 以下では固有値の存在（対角化可能性・スペクトル定理）を一切使わない。**$c(M_{\mathrm{col}})$ は上限として定義され、必要な不等式はすべて半正定値双線型形式に対する Cauchy–Schwarz の不等式から出る。有限次元の実対称行列が対角化できること自体は正しいが、その証明は本文にまだ無く、また挟み撃ちには不要だからである。

この挟み撃ちの両辺の対数を $M_{\mathrm{col}}N_{\mathrm{row}}$ で割ると、M_{col} を固定したまま $N_{\mathrm{row}} \to \infty$ の極限が $\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$ に等しいことが従う（主張 18.10）。

主張 18.2 ($Z = \mathrm{tr}(W^{N_{\mathrm{row}}})$)**.** 主張 12.7 と同じ設定のもと、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について

$$\mathrm{tr}((V_1V_2)^n) = \mathrm{tr}(W^n)$$

が成り立つ。とくに $Z(K_1,K_2) = \mathrm{tr}\big(W^{N_{\mathrm{row}}}\big)$。

証明. $n_0 := 2^{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$B := V_1^{1/2} \in \mathrm{Mat}(n_0,\mathbb{C})$ と書く。$V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(n_0,\mathbb{C})$ は 定義 12.6 のものである。行列の積は 定義 1.6、行列の冪は 定義 3.4 (1) の $X^0 := I$、$X^{m+1} := X^m X$（$X \in \mathrm{Mat}(n_0,\mathbb{C})$、$m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$、$I := I_{\mathrm{Mat}(n_0,\mathbb{C})}$）による。三つ以上の行列の積は括弧を省かずに書く。

準備 1（B と W の関係）。

$$\begin{aligned} BB &= V_1 && \big(\because \text{ 定義 13.41}\big) \\ W &= (BV_2)\,B && \big(\because \text{ 定義 13.42}\big) \end{aligned}$$

準備 2（開いた積の冪）。$X, Y \in \mathrm{Mat}(n_0,\mathbb{C})$、$k \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について $\big(X(YX)^k\big)\,Y = (XY)^{k+1}$ を k の帰納法で示す。$k = 0$ のとき

$$\begin{aligned} \big(X(YX)^0\big)\,Y &= (XI)Y && \big(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } (YX)^0 := I\big) \\ &= XY && \big(\because \text{ 主張 2.17}\big) \\ &= I(XY) && \big(\because \text{ 主張 2.16}\big) \\ &= (XY)^0(XY) && \big(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } (XY)^0 := I\big) \\ &= (XY)^1 && \big(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } (XY)^{0+1} := (XY)^0(XY)\big) \end{aligned}$$

k で成り立つとすると、

$$\begin{aligned} \Big(X(YX)^{k+1}\Big)\,Y &= \Big(X\Big((YX)^k(YX)\Big)\Big)\,Y && \big(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } (YX)^{k+1} := (YX)^k(YX)\big) \\ &= \Big(\Big(X(YX)^k\Big)(YX)\Big)\,Y && \big(\because \text{ 主張 2.15}\big) \\ &= \Big(\Big(\Big(X(YX)^k\Big)Y\Big)X\Big)\,Y && \big(\because \text{ 主張 2.15}\big) \\ &= \Big((XY)^{k+1}X\Big)\,Y && \big(\because \text{ 帰納法の仮定}\big) \\ &= (XY)^{k+1}(XY) && \big(\because \text{ 主張 2.15}\big) \\ &= (XY)^{k+2} && \big(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } (XY)^{(k+1)+1} := (XY)^{k+1}(XY)\big) \end{aligned}$$

となり $k+1$ でも成り立つ。ゆえにすべての $k \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ で成り立つ。

準備 3（W の冪）。$k \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について $W^{k+1} = \big(\big(B(V_2V_1)^k\big)V_2\big)\,B$ を k の帰納法で示す。$k = 0$ のとき

$$
\begin{aligned}
W^1 &= W^0 W && (\because \text{定義 3.4 (1) の } W^{0+1} := W^0 W)\\
&= IW && (\because \text{定義 3.4 (1) の } W^0 := I)\\
&= W && (\because \text{主張 2.16})\\
&= (BV_2)\,B && (\because \text{準備 1})\\
&= ((BI)\,V_2)\,B && (\because \text{主張 2.17})\\
&= \big(\big(B(V_2V_1)^0\big)\,V_2\big)\,B && (\because \text{定義 3.4 (1) の } (V_2V_1)^0 := I)
\end{aligned}
$$

k で成り立つとし、$C := B(V_2V_1)^k \in \mathrm{Mat}(n_0, \mathbb{C})$ と書くと、

$$
\begin{aligned}
W^{k+2} &= W^{k+1}W && (\because \text{定義 3.4 (1) の } W^{(k+1)+1} := W^{k+1}W)\\
&= \Big(\Big(\Big(B(V_2V_1)^k\Big)\,V_2\Big)\,B\Big)\,W && (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= ((CV_2)\,B)\,W && (\because C \text{ の置き方})\\
&= ((CV_2)\,B)\,((BV_2)\,B) && (\because \text{準備 1})\\
&= (((CV_2)\,B)\,(BV_2))\,B && (\because \text{主張 2.15})\\
&= ((((CV_2)\,B)\,B)\,V_2)\,B && (\because \text{主張 2.15})\\
&= (((CV_2)\,(BB))\,V_2)\,B && (\because \text{主張 2.15})\\
&= (((CV_2)\,V_1)\,V_2)\,B && (\because \text{準備 1})\\
&= ((C\,(V_2V_1))\,V_2)\,B && (\because \text{主張 2.15})\\
&= \Big(\Big(\Big(B(V_2V_1)^k\Big)\,(V_2V_1)\Big)\,V_2\Big)\,B && (\because C \text{ の置き方})\\
&= \Big(\Big(B\,\Big((V_2V_1)^k\,(V_2V_1)\Big)\Big)\,V_2\Big)\,B && (\because \text{主張 2.15})\\
&= \Big(\Big(B(V_2V_1)^{k+1}\Big)\,V_2\Big)\,B && (\because \text{定義 3.4 (1) の } (V_2V_1)^{k+1} := (V_2V_1)^k(V_2V_1))
\end{aligned}
$$

となり $k+1$ でも成り立つ。ゆえにすべての $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ で成り立つ。

本体。$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について $k := n-1 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と置くと $k+1 = n$ であり、

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}((V_1V_2)^n) &= \mathrm{tr}\Big(\Big(V_1(V_2V_1)^k\Big)\,V_2\Big) && (\because \text{準備 2 を } X := V_1,\ Y := V_2 \text{ に適用})\\
&= \mathrm{tr}\Big(\Big((BB)\,(V_2V_1)^k\Big)\,V_2\Big) && (\because \text{準備 1})\\
&= \mathrm{tr}\Big(\Big(B\,\Big(B(V_2V_1)^k\Big)\Big)\,V_2\Big) && (\because \text{主張 2.15})\\
&= \mathrm{tr}\Big(B\,\Big(\Big(B(V_2V_1)^k\Big)\,V_2\Big)\Big) && (\because \text{主張 2.15})\\
&= \mathrm{tr}\Big(\Big(\Big(B(V_2V_1)^k\Big)\,V_2\Big)\,B\Big) && (\because \text{主張 8.2 (2) の巡回性の左の因子に } B \text{ を、右の因子に } \Big(B(V_2V_1)^k\Big)\,V_2 \text{ を当てる})\\
&= \mathrm{tr}(W^n) && (\because \text{準備 3})
\end{aligned}
$$

とくに $N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$
\begin{aligned}
Z(K_1, K_2) &= \mathrm{tr}\big((V_1V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big) && (\because \text{主張 12.7})\\
&= \mathrm{tr}\big(W^{N_{\mathrm{row}}}\big) && (\because \text{本体を } n := N_{\mathrm{row}} \text{ に適用})
\end{aligned}
$$

□

主張 18.3 (W は実対称正定値)**.** W は成分がすべて実数で転置について対称であり、定義 8.7 の意味で正定値である。また W は 定義 7.2（$M \to M_{\mathrm{col}}$）の意味で可逆である。

証明. Step 1（K_1D と S_2 は実対称)。$\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}$ は 主張 16.2 の Step 3 で見たとおり、成分が実で転置について対称である（σ^z が 2 個、他は単位行列のクロネッカー積)。実係数 K_1 の有限和なので K_1D も実対称。主張 16.2 の Step 1 より S_2 も実対称である。その表示は

$$
\begin{aligned}
S_2 &= iK_2^* H_2 && \big(\because\ S_2 \text{ の定義}\big) \\
&= K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x && \big(\because\ \text{実対称性の主張の Step 1}\big)
\end{aligned}
$$

Step 2（指数関数）。$K_1 D$ と S_2 は実対称（定義 8.8）なので、主張 8.9（$n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to K_1 D$ と $A \to S_2$）よりエルミートであり、主張 8.12（$\alpha \to \frac{1}{2},\ A \to K_1 D$）より $\frac{1}{2} K_1 D$ もエルミートである。主張 8.20 より $B := \exp(\frac{1}{2} K_1 D)$ と $A := \exp(S_2)$ はいずれも正定値（とくにエルミート）であり、主張 8.18 より $B' := \exp(-\frac{1}{2} K_1 D)$ は $B'B = I$ を満たす。この B は 定義 13.41 で定めた $V_1^{1/2}$ そのものである。さらに実対称行列の冪は実対称で、定義 3.4 の級数の部分和は実対称、主張 8.11 (3) と同じ議論（転置もノルムを保つ）から極限も実対称。よって B, A は ** 実 ** 対称正定値である。

Step 3（合同変換）。主張 13.25 より $V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} A$（主張 16.2 Step 1）であり、$B$ がエルミートなので $B^* = B$。よって

$$
\begin{aligned}
W &= B\, V_2\, B && \big(\because\ W = BV_2B \text{ の定義定義 13.42}\big) \\
&= B\big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} A\big) B && \big(\because\ V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} A\big) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} BAB && \big(\because\ \text{スカラー倍と行列積の結合則}\big) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} B^* AB && \big(\because\ B^* = B\big)
\end{aligned}
$$

主張 8.14 より $B^*AB = B^*(AB)$（主張 2.15）は正定値、$K_2 > 0$ より $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} > 0$ なので主張 8.16 より W は正定値である。実対称性は次の転置の計算から従う。

$$
\begin{aligned}
W^\top &= (BV_2B)^\top && \big(\because\ W = BV_2B \text{ の定義定義 13.42}\big) \\
&= B^\top V_2^\top B^\top && \big(\because\ \text{転置の積の法則 } (ABC)^\top = C^\top B^\top A^\top\big) \\
&= BV_2B && \big(\because\ B^\top = B,\ V_2^\top = V_2\big) \\
&= W && \big(\because\ W = BV_2B \text{ の定義定義 13.42}\big)
\end{aligned}
$$

可逆性。定義 7.2 の M を M_{col} に取った $R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と、その単位行列 I・可逆元の集合 $R^\times$ を用いる（$-\frac{1}{2} K_1 D := -\big(\frac{1}{2} K_1 D\big)$ は 定義 1.94 の符号反転）。Step 2 の $B'B = I$ と次の鎖から $B \in R^\times$ である（定義 7.2 の $g \to B,\ h \to B'$）。

$$
\begin{aligned}
BB' &= \exp\big(\tfrac{1}{2} K_1 D\big) \exp\big(-\tfrac{1}{2} K_1 D\big) && \big(\because\ B,\ B' \text{ の置き方}\big) \\
&= \exp\big(-\big(-\tfrac{1}{2} K_1 D\big)\big) \exp\big(-\tfrac{1}{2} K_1 D\big) && \big(\because\ \text{主張 2.27 } (m \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to \tfrac{1}{2} K_1 D)\big) \\
&= I && \big(\because\ \text{主張 8.18 } (n \to 2^{M_{\mathrm{col}}},\ A \to -\tfrac{1}{2} K_1 D)\big)
\end{aligned}
$$

$$
BV_2 \in R^\times \qquad \big(\because\ B \in R^\times,\ \text{主張 14.19},\ \text{定義 7.2 (ii) } (g_1 \to B,\ g_2 \to V_2)\big)
$$

$$
\begin{aligned}
W &= (BV_2)\, B && \big(\because\ \text{定義 13.42},\ B = V_1^{1/2} \text{ 定義 13.41}\big) \\
&\in R^\times && \big(\because\ \text{前の式の } BV_2 \in R^\times,\ B \in R^\times,\ \text{定義 7.2 (ii) } (g_1 \to BV_2,\ g_2 \to B)\big)
\end{aligned}
$$

□

定義 18.4 ($c(M_{\mathrm{col}}) := \sup_{\|x\|=1} x^\top W x$)**.** W は 主張 18.3 より実行列とみなせるので、

$$
\mathcal{R} := \left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \right\} \subseteq \mathbb{R}_{>0}
$$

とおく。$\mathcal{R}$ は空でない（$\|e_1\| = 1$ なので e_1 を取れる）。上に有界であることは、成分の有限和として次のように評価できる。$\|x\| = 1$ とすると、各 i について

$$
\begin{aligned}
|x_i|^2 &\le \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} |x_k|^2 && \left(\because \text{非負の項の有限和は各項以上}\right)\\
&= \|x\|^2 && \left(\because \text{ノルムの定義定義 2.91}\right)\\
&= 1 && \left(\because \|x\| = 1\right)
\end{aligned}
$$

であるから $|x_i| \le 1$ である。これを成分表示へ入れると

$$
\begin{aligned}
\left|x^\top W x\right| &= \left|\sum_{i=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \sum_{j=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} x_i\, W_{ij}\, x_j\right| && \left(\because \text{行列積の成分表示}\right)\\
&\le \sum_{i=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \sum_{j=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} |x_i|\,|W_{ij}|\,|x_j| && \left(\because \text{有限和の三角不等式と積の絶対値}\right)\\
&\le \sum_{i=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \sum_{j=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} |W_{ij}| && \left(\because\ |x_i| \le 1,\ |x_j| \le 1\right)
\end{aligned}
$$

となり、右辺は x によらない有限個の実数の和である。よって $\mathcal{R}$ は上に有界である。ここで実数の上限

$$
c(M_{\mathrm{col}}) := \sup \mathcal{R} \in \mathbb{R}_{>0}
$$

が定まる。** ここが実数へ脱出する箇所である。** $\mathcal{R}$ は一般に有限集合でも可算集合でもなく、上限の存在は「空でなく上に有界な実数の集合は上限をもつ」という $\mathbb{R}$ の性質による。有理数の範囲では同じ主張は成り立たない。定義から

$$
x^\top W x \le c(M_{\mathrm{col}})\, \|x\|^2 \qquad (\forall x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}})
$$

が成り立つ（$x \neq 0$ なら $x/\|x\|$ に適用し、$x = 0$ なら両辺 0）。

** 上限が達成されること（最大固有値の存在）はここでは主張しない。** 以下の評価は上限としての $c(M_{\mathrm{col}})$ だけで足りる。

主張 18.5 ($\|Wx\| \le c(M_{\mathrm{col}})\,\|x\|$)**.** $\forall x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について $\|Wx\| \le c(M_{\mathrm{col}})\,\|x\|$。したがって $k \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について $\|W^k x\| \le c(M_{\mathrm{col}})^k \|x\|$。

証明. $c := c(M_{\mathrm{col}})$ と略記する。$x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ を取り、$y := Wx$（成分は $y_k = \sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} W_{kl}\, x_l$（定義 1.6）。$W$ の成分と x の成分は実数なので $y \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$）とおく。まず

$$
\begin{aligned}
\|Wx\|^2 &= \|y\|^2 && \left(\because\ y := Wx\right)\\
&= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} |y_k|^2 && \left(\because \text{ノルムの定義定義 2.91 と 定義 1.4 の } \left(\sqrt{a}\right)^2 = a\right)\\
&= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} y_k\, y_k && \left(\because\ y_k \in \mathbb{R} \text{ なので } |y_k|^2 = y_k y_k\right)\\
&= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} y_k \sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} W_{kl}\, x_l && \left(\because\ y = Wx \text{ の成分定義 1.6（右因子）}\right)\\
&= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} y_k\, W_{kl}\, x_l && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の分配則と乗法の結合則 } y_k(W_{kl}x_l) = (y_k W_{kl})x_l\right)\\
&= y^\top W x && \left(\because \text{定義 9.1}\right)
\end{aligned}
$$

である。W は実対称かつ正定値、とくに半正定値である（主張 18.3）から、

$$\begin{aligned}
\|Wx\|^4 &= \left(\|Wx\|^2\right)^2 && (\because \text{ 冪の指数法則}) \\
&= \left(y^\top Wx\right)^2 && (\because \text{ 上の式変形}) \\
&\le \left(x^\top Wx\right)\left(y^\top Wy\right) && (\because \text{ 半正定値の Cauchy–Schwarz 主張 9.3 を } P = W,\ y = Wx \text{ に適用}) \\
&\le \left(c\|x\|^2\right)\left(y^\top Wy\right) && (\because \text{ 上限の評価 定義 18.4 の } x^\top Wx \le c\|x\|^2 \text{ と } 0 \le y^\top Wy \text{（半正定値性）}) \\
&\le \left(c\|x\|^2\right)\left(c\|y\|^2\right) && (\because \text{ 上限の評価 定義 18.4 の } y^\top Wy \le c\|y\|^2 \text{ と } 0 \le c\|x\|^2) \\
&= c^2\|x\|^2\|Wx\|^2 && (\because \ y = Wx \text{ と } \mathbb{R} \text{ の乗法の可換則・結合則})
\end{aligned}$$

$\|Wx\| = 0$ のときは左辺が 0、右辺が $c\|x\| \ge 0$ なので主張が成り立つ。以下 $\|Wx\| > 0$ とする。

$$\begin{aligned}
\|Wx\|^4 \le c^2\|x\|^2\|Wx\|^2 &\Longrightarrow \|Wx\|^2 \le c^2\|x\|^2 && \left(\because \text{ 両辺を } \|Wx\|^2 > 0 \text{ で割る}\right) \\
&\Longrightarrow \|Wx\| \le c\|x\| && \left(\because \ \|Wx\| \ge 0,\ c\|x\| \ge 0 \text{ と平方の単調性}\right)
\end{aligned}$$

x は任意に取ったので、すべての $x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について $\|Wx\| \le c\|x\|$ である。

冪についての主張は k に関する帰納法で示す。$k = 0$ のときは、$x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について

$$\begin{aligned}
\|W^0x\| &= \|Ix\| && \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^0 := I\right) \\
&= \|x\| && \left(\because \text{ 主張 2.16}\right) \\
&= c^0\|x\| && \left(\because \ c^0 = 1\right)
\end{aligned}$$

である。k で成り立つ（すべての $x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について $\|W^kx\| \le c^k\|x\|$）とし、$x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ を取ると

$$\begin{aligned}
\|W^{k+1}x\| &= \|(W^kW)x\| && \left(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^mA\right) \\
&= \|W^k(Wx)\| && \left(\because \text{ 主張 2.15}\right) \\
&\le c^k\|Wx\| && \left(\because \text{ 帰納法の仮定を } Wx \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \text{ に適用}\right) \\
&\le c^k\big(c\|x\|\big) && \left(\because \text{ いま示した評価 } \|Wx\| \le c\|x\| \text{ と } c^k \ge 0\,(c > 0)\ \right) \\
&= c^{k+1}\|x\| && \left(\because \text{ 冪の指数法則と } \mathbb{R} \text{ の乗法の結合則}\right)
\end{aligned}$$

x は任意に取ったので、$k+1$ のときもすべての $x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について成り立つ。 □

主張 18.6 $(\mathrm{tr}(W^n) \le 2^{M_{\mathrm{col}}}c(M_{\mathrm{col}})^n)$**.** $n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について

$$\mathrm{tr}(W^n) \ \le \ 2^{M_{\mathrm{col}}}\,c(M_{\mathrm{col}})^n$$

証明. $c := c(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}_{>0}$（定義 18.4）、$d := 2^{M_{\mathrm{col}}}$ と略記する。$k \in \{1, \dots, d\}$ について $e_k \in \mathbb{R}^d$ を、$i \in \{1, \dots, d\}$ について $i = k$ なら $(e_k)_i := 1$、$i \ne k$ なら $(e_k)_i := 0$ で定める。

【e_k のノルム】

$$\begin{aligned}
\|e_k\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^{d} |(e_k)_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} && \left(\because \text{ 定義 2.91 } (K = \mathbb{R})\right) \\
&= \sqrt{|(e_k)_k|^2}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} && \left(\because \ i \ne k \text{ の項は } |(e_k)_i|^2 = |0|^2 = 0\right) \\
&= \sqrt{|1|^2}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} && \left(\because \ (e_k)_k = 1\right) \\
&= \sqrt{1}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} && \left(\because \ |1|^2 = 1\right) \\
&= 1 && \left(\because \text{ 定義 1.4 の } 1 \ge 0,\ 1^2 = 1\right)
\end{aligned}$$

【冪の実対称性】W は実対称なので（主張 18.3）、すべての $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について W^p は実対称である（主張 8.10、$n \to d,\ A \to W$）。すなわち W^p の成分はすべて実数で、すべての $k, l \in \{1, \ldots, d\}$ について

$$\begin{aligned}(W^p)_{kl} &= \left((W^p)^\top\right)_{kl} && \left(\because\ W^p \text{ は実対称なので } (W^p)^\top = W^p \text{（定義 8.8）}\right)\\ &= (W^p)_{lk} && \left(\because\ \text{定義 2.75}\right)\end{aligned}$$

である。以下、定義 18.4 が W を読むのと同じく、W^p の成分を実数として $W^p e_k \in \mathbb{R}^d$（定義 1.6）と $x^\top W^p y$（定義 9.1）を読む。

【対角成分の表示】$p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$k \in \{1, \ldots, d\}$ について

$$\begin{aligned}e_k^\top W^p e_k &= \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d}(e_k)_i\,(W^p)_{ij}\,(e_k)_j && \left(\because\ \text{定義 9.1}\right)\\ &= \sum_{j=1}^{d}(e_k)_k\,(W^p)_{kj}\,(e_k)_j && \left(\because\ i \neq k \text{ の項は } (e_k)_i = 0 \text{ なので } 0\right)\\ &= \sum_{j=1}^{d}(W^p)_{kj}\,(e_k)_j && \left(\because\ (e_k)_k = 1\right)\\ &= (W^p)_{kk}\,(e_k)_k && \left(\because\ j \neq k \text{ の項は } (e_k)_j = 0 \text{ なので } 0\right)\\ &= (W^p)_{kk} && \left(\because\ (e_k)_k = 1\right)\end{aligned}$$

【$W^a e_k$ の成分とノルム】$a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$k \in \{1, \ldots, d\}$ について $u := W^a e_k \in \mathbb{R}^d$ とおく。$l \in \{1, \ldots, d\}$ について

$$\begin{aligned}u_l &= \sum_{m=1}^{d}(W^a)_{lm}\,(e_k)_m && \left(\because\ \text{定義 1.6}\right)\\ &= (W^a)_{lk}\,(e_k)_k && \left(\because\ m \neq k \text{ の項は } (e_k)_m = 0 \text{ なので } 0\right)\\ &= (W^a)_{lk} && \left(\because\ (e_k)_k = 1\right)\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}\|u\| &= \|W^a e_k\| && \left(\because\ u := W^a e_k\right)\\ &\leq c^a\,\|e_k\| && \left(\because\ \text{主張 18.5 の冪の主張を指数 } a \text{ と } x \to e_k \text{ で適用}\right)\\ &= c^a && \left(\because\text{【}e_k \text{ のノルム】}\right)\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}\|u\|^2 &\leq \left(c^a\right)^2 && \left(\because\ 0 \leq \|u\| \leq c^a \text{（上の式変形と 定義 2.91 の値が } \mathbb{R}_{\geq 0}\text{）と } \mathbb{R}_{\geq 0} \text{ の平方の単調性}\right)\\ &= c^{2a} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の冪の指数法則}\right)\end{aligned}$$

である。

$n = 2a$（$a \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$）が偶数の場合。$k \in \{1, \ldots, d\}$ と【$W^a e_k$ の成分とノルム】の $u = W^a e_k$ について

$$
\begin{aligned}
e_k^\top W^{2a} e_k &= (W^{2a})_{kk} && \big(\because \text{【対角成分の表示】 } (p \to 2a)\big) \\
&= (W^{a+a})_{kk} && \big(\because \mathbb{Z} \text{ で } 2a = a + a\big) \\
&= (W^a W^a)_{kk} && \big(\because \text{ 主張 3.5 } (p, q \to a)\big) \\
&= \sum_{l=1}^{d} (W^a)_{kl} \, (W^a)_{lk} && \big(\because \text{ 定義 1.6}\big) \\
&= \sum_{l=1}^{d} (W^a)_{lk} \, (W^a)_{lk} && \big(\because \text{【冪の実対称性】の } (W^a)_{kl} = (W^a)_{lk}\big) \\
&= \sum_{l=1}^{d} u_l \, u_l && \big(\because \text{【} W^a e_k \text{ の成分とノルム】の } u_l = (W^a)_{lk}\big) \\
&= \sum_{l=1}^{d} |u_l|^2 && \big(\because \ u_l \in \mathbb{R} \text{ なので } u_l u_l = |u_l|^2\big) \\
&= \|u\|^2 && \big(\because \text{ 定義 2.91 と 定義 1.4 の } \left(\sqrt{b}\right)^2 = b\big) \\
&\leq c^{2a} && \big(\because \text{【} W^a e_k \text{ の成分とノルム】の } \|u\|^2 \leq c^{2a}\big) \\
&= c^n && \big(\because \ n = 2a\big)
\end{aligned}
$$

である。$n = 2a + 1$（$a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）が奇数の場合。まず

$$
\begin{aligned}
W^{2a+1} &= W^{a+(1+a)} && \big(\because \mathbb{Z} \text{ で } 2a + 1 = a + (1 + a)\big) \\
&= W^a W^{1+a} && \big(\because \text{ 主張 3.5 } (p \to a, \ q \to 1 + a)\big) \\
&= W^a \big(W^1 W^a\big) && \big(\because \text{ 主張 3.5 } (p \to 1, \ q \to a)\big) \\
&= W^a \big(W^{0+1} W^a\big) && \big(\because \mathbb{Z} \text{ で } 1 = 0 + 1\big) \\
&= W^a \big((W^0 W) W^a\big) && \big(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A \text{ を } m = 0 \text{ に適用}\big) \\
&= W^a \big((I_{\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})} W) W^a\big) && \big(\because \text{ 定義 3.4 (1) の } A^0 := I\big) \\
&= W^a \big(W W^a\big) && \big(\because \text{ 主張 2.16}\big)
\end{aligned}
$$

である。$k \in \{1, \ldots, d\}$ と【$W^a e_k$ の成分とノルム】の $u = W^a e_k$ について

$$
\begin{aligned}
e_k^\top W^{2a+1} e_k &= (W^{2a+1})_{kk} && (\because \text{【対角成分の表示】 } (p \to 2a+1)) \\
&= \big(W^a (W W^a)\big)_{kk} && (\because \text{ 上の式変形}) \\
&= \sum_{l=1}^{d} (W^a)_{kl}\, (W W^a)_{lk} && (\because \text{ 定義 1.6}) \\
&= \sum_{l=1}^{d} (W^a)_{kl} \sum_{m=1}^{d} W_{lm}\, (W^a)_{mk} && (\because \text{ 定義 1.6}) \\
&= \sum_{l=1}^{d} \sum_{m=1}^{d} (W^a)_{kl}\, W_{lm}\, (W^a)_{mk} && (\because \text{ 分配則と乗法の結合則}) \\
&= \sum_{l=1}^{d} \sum_{m=1}^{d} (W^a)_{lk}\, W_{lm}\, (W^a)_{mk} && (\because \text{【冪の実対称性】の } (W^a)_{kl} = (W^a)_{lk}) \\
&= \sum_{l=1}^{d} \sum_{m=1}^{d} u_l\, W_{lm}\, u_m && (\because \text{【} W^a e_k \text{ の成分とノルム】の } u_l = (W^a)_{lk},\ u_m = (W^a)_{mk}) \\
&= u^\top W u && (\because \text{ 定義 9.1}) \\
&\le c\, \|u\|^2 && (\because \text{ 定義 18.4 の } x^\top W x \le c\|x\|^2\ (x \to u)) \\
&\le c\, c^{2a} && (\because \text{【} W^a e_k \text{ の成分とノルム】の } \|u\|^2 \le c^{2a} \text{ と } c > 0) \\
&= c^{2a+1} && (\because \mathbb{R} \text{ の冪の指数法則}) \\
&= c^n && (\because\ n = 2a+1)
\end{aligned}
$$

である。いずれの場合も、すべての k について $e_k^\top W^n e_k \le c^n$ である。よって

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(W^n) &= \sum_{k=1}^{d} (W^n)_{kk} && (\because \text{ 定義 8.1}) \\
&= \sum_{k=1}^{d} e_k^\top W^n e_k && (\because \text{【対角成分の表示】 } (p \to n) \text{ を } d \text{ 個の項へ同時に適用}) \\
&\le \sum_{k=1}^{d} c^n && (\because \text{ 各 } k \text{ の } e_k^\top W^n e_k \le c^n \text{ と、項ごとの不等式の有限和は順序を保つ}) \\
&= d\, c^n && (\because \text{ 同じ項 } c^n \text{ を } d \text{ 個足した和}) \\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}} c^n && (\because\ d := 2^{M_{\mathrm{col}}})
\end{aligned}
$$

となり、上からの評価を得る。 □

主張 18.7 (モーメント列の正値性と対数凸性)**.** 定義 13.42 の W は 主張 18.3 より実対称正定値である。単位ベクトル $x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ ($\|x\| = 1$) を固定し、$k \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について $m_k := x^\top W^k x \in \mathbb{R}$ (W^k は 定義 3.4 (1) の冪で、定義 18.4 が W を読むのと同じく、その成分を実数として 定義 9.1 で読む) とおく。このとき全ての k について $m_k > 0$ であり、

$$
m_k^2 \le m_{k-1}\, m_{k+1} \qquad (k \in \mathbb{Z}_{\ge 1})
$$

が成り立つ。

証明. $d := 2^{M_{\mathrm{col}}}$ と略記する。冪は 定義 3.4 (1) のもの、積は 定義 1.6 のものである。

【冪の実対称性】W は実対称なので (主張 18.3)、すべての $p \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について W^p は実対称である (主張 8.10、$n \to d,\ A \to W$)。すなわち W^p の成分はすべて実数で、すべての $k, l \in \{1, \dots, d\}$ について

$$
\begin{aligned}
(W^p)_{kl} &= \big((W^p)^\top\big)_{kl} && \big(\because\ W^p \text{ は実対称なので } (W^p)^\top = W^p \text{（定義 8.8）}\big) \\
&= (W^p)_{lk} && \big(\because\ \text{定義 2.75}\big)
\end{aligned}
$$

である。単位行列 $I := I_{\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})}$ の成分 $I_{kl} = \delta_{kl}$（定義 2.2、定義 2.1）も実数である。$a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$B = I$ または $B = W$ について、BW^a と $W^b(BW^a)$ の成分も実数である（主張 2.87 の行列 $A \cdot B$ を、ここの $B \cdot W^a$ とした場合と、$W^b \cdot BW^a$ とした場合の二回適用）。以下、定義 18.4 が W を読むのと同じく、$W^p \cdot I \cdot W^b(BW^a)$ の成分を実数として、$W^p x \in \mathbb{R}^d$（定義 1.6）と $y^\top Pz$（定義 9.1）を読む。

【$W^a x$ の成分】$a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $u^{(a)} := W^a x \in \mathbb{R}^d$ とおく。定義 1.6 より、$l \in \{1, \ldots, d\}$ について $u_l^{(a)} = \sum_{m=1}^d (W^a)_{lm}\, x_m$ である。

【冪の分け方】$a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
W^{a+b} &= W^{b+a} && \big(\because\ \mathbb{Z} \text{ の加法の交換則}\big) \\
&= W^b W^a && \big(\because\ \text{主張 3.5 } (p \to b,\ q \to a)\big) \\
&= W^b\big(IW^a\big) && \big(\because\ \text{主張 2.16}\big)
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
W^{a+b+1} &= W^{b+(1+a)} && \big(\because\ \mathbb{Z} \text{ で } a+b+1 = b+(1+a)\big) \\
&= W^b W^{1+a} && \big(\because\ \text{主張 3.5 } (p \to b,\ q \to 1+a)\big) \\
&= W^b\big(W^1 W^a\big) && \big(\because\ \text{主張 3.5 } (p \to 1,\ q \to a)\big) \\
&= W^b\big(W^{0+1} W^a\big) && \big(\because\ \mathbb{Z} \text{ で } 1 = 0+1\big) \\
&= W^b\big((W^0 W) W^a\big) && \big(\because\ \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A \text{ を } m = 0 \text{ に適用}\big) \\
&= W^b\big((IW) W^a\big) && \big(\because\ \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I\big) \\
&= W^b\big(W W^a\big) && \big(\because\ \text{主張 2.16}\big)
\end{aligned}
$$

である。

【二つの冪で挟んだ値】$a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と、$B = I$ または $B = W$ について

$$
\begin{aligned}
x^\top \big(W^b(BW^a)\big)x &= \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} x_i \left(W^b(BW^a)\right)_{ij} x_j && (\because \text{ 定義 9.1})\\
&= \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} x_i \Big(\sum_{l=1}^{d} (W^b)_{il}\,(BW^a)_{lj}\Big) x_j && (\because \text{ 定義 1.6})\\
&= \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} x_i \Big(\sum_{l=1}^{d} (W^b)_{il} \sum_{m=1}^{d} B_{lm}\,(W^a)_{mj}\Big) x_j && (\because \text{ 定義 1.6})\\
&= \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d}\sum_{l=1}^{d}\sum_{m=1}^{d} x_i\,(W^b)_{il}\,B_{lm}\,(W^a)_{mj}\,x_j && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則と乗法の結合則})\\
&= \sum_{l=1}^{d}\sum_{m=1}^{d}\sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} x_i\,(W^b)_{il}\,B_{lm}\,(W^a)_{mj}\,x_j && (\because \mathbb{R} \text{ の有限和の順序の交換})\\
&= \sum_{l=1}^{d}\sum_{m=1}^{d} \Big(\sum_{i=1}^{d} x_i\,(W^b)_{il}\Big) B_{lm} \Big(\sum_{j=1}^{d} (W^a)_{mj}\,x_j\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則と乗法の交換則・結合則})\\
&= \sum_{l=1}^{d}\sum_{m=1}^{d} \Big(\sum_{i=1}^{d} x_i\,(W^b)_{li}\Big) B_{lm} \Big(\sum_{j=1}^{d} (W^a)_{mj}\,x_j\Big) && (\because \text{【冪の実対称性】の } (W^b)_{il} = (W^b)_{li})\\
&= \sum_{l=1}^{d}\sum_{m=1}^{d} \Big(\sum_{i=1}^{d} (W^b)_{li}\,x_i\Big) B_{lm} \Big(\sum_{j=1}^{d} (W^a)_{mj}\,x_j\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則})\\
&= \sum_{l=1}^{d}\sum_{m=1}^{d} u_l^{(b)}\,B_{lm}\,u_m^{(a)} && (\because \text{【} W^a x \text{ の成分】を } a \text{ と } b \text{ へ同時に適用})\\
&= \big(u^{(b)}\big)^\top B\,u^{(a)} && (\because \text{ 定義 9.1})
\end{aligned}
$$

である。

【I と W の正値性】$y \in \mathbb{R}^d$ について

$$
\begin{aligned}
y^\top I y &= \sum_{k=1}^{d}\sum_{l=1}^{d} y_k\,\delta_{kl}\,y_l && (\because \text{ 定義 9.1 と 定義 2.2})\\
&= \sum_{k=1}^{d} y_k\,\delta_{kk}\,y_k && (\because \ l \neq k \text{ の項は } \delta_{kl} = 0 \text{（定義 2.1）なので } 0)\\
&= \sum_{k=1}^{d} y_k\,y_k && (\because \ \delta_{kk} = 1 \text{（定義 2.1）})
\end{aligned}
$$

であり、各項 $y_k y_k$ は 0 以上なので $y^\top I y \geq 0$、$y \neq 0$ なら $y_{k_0} \neq 0$ となる k_0 の項が正なので $y^\top I y > 0$ である。また W は正定値なので（主張 18.3 の正定値性を、定義 18.4 が W を読むのと同じく実の y で読む）、$y \neq 0$ なら $y^\top W y > 0$、すべての y について $y^\top W y \geq 0$ である。さらに、すべての $k, l \in \{1, \ldots, d\}$ について

$$
\begin{aligned}
I_{kl} &= \delta_{kl} && (\because \text{ 定義 2.2})\\
&= \delta_{lk} && (\because \text{ 定義 2.1 の場合分けは } k = l \text{ と } l = k \text{ で同じ})\\
&= I_{lk} && (\because \text{ 定義 2.2})\\
W_{kl} &= \big(W^\top\big)_{kl} && (\because \ W \text{ は実対称なので } W^\top = W \text{（主張 18.3、定義 8.8）})\\
&= W_{lk} && (\because \text{ 定義 2.75})
\end{aligned}
$$

なので、I と W は 定義 9.2 の意味で対称であり、上の評価から半正定値である。すなわち 主張 9.3 の前提を満たす。

【$W^a x$ は零でない】$\|x\| = 1$ なので $x \neq 0$ である（$x = 0$ なら 定義 2.91 より $\|x\| = \sqrt{0} = 0$。$\sqrt{0} = 0$ は 定義 1.4 の $0 \geq 0,\ 0^2 = 0$）。a についての帰納法で $u^{(a)} \neq 0$ を示す。$a = 0$ では

$$\begin{aligned} u^{(0)} &= W^0 x && \left(\because\ u^{(0)} := W^0 x\right) \\ &= Ix && \left(\because\ \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I\right) \\ &= x && \left(\because\ \text{主張 2.16}\right) \end{aligned}$$

なので $u^{(0)} \neq 0$ である。$u^{(a)} \neq 0$ とすると、

$$\begin{aligned} u^{(a+1)} &= W^{a+1} x && \left(\because\ u^{(a+1)} := W^{a+1} x\right) \\ &= W^{1+a} x && \left(\because\ \mathbb{Z} \text{ の加法の交換則}\right) \\ &= \left(W^1 W^a\right) x && \left(\because\ \text{主張 3.5 } (p \to 1,\ q \to a)\right) \\ &= \left(W^{0+1} W^a\right) x && \left(\because\ \mathbb{Z} \text{ で } 1 = 0 + 1\right) \\ &= \left((W^0 W) W^a\right) x && \left(\because\ \text{定義 3.4 (1) の } A^{m+1} := A^m A \text{ を } m = 0 \text{ に適用}\right) \\ &= \left((IW) W^a\right) x && \left(\because\ \text{定義 3.4 (1) の } A^0 := I\right) \\ &= \left(W W^a\right) x && \left(\because\ \text{主張 2.16}\right) \\ &= W\left(W^a x\right) && \left(\because\ \text{主張 2.15}\right) \\ &= W u^{(a)} && \left(\because\ u^{(a)} := W^a x\right) \end{aligned}$$

である。仮に $Wu^{(a)} = 0$ なら

$$\begin{aligned} \left(u^{(a)}\right)^\top W u^{(a)} &= \sum_{k=1}^{d} \sum_{l=1}^{d} u_k^{(a)}\, W_{kl}\, u_l^{(a)} && \left(\because\ \text{定義 9.1}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{d} u_k^{(a)} \sum_{l=1}^{d} W_{kl}\, u_l^{(a)} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の分配則と乗法の結合則}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{d} u_k^{(a)} \left(W u^{(a)}\right)_k && \left(\because\ \text{定義 1.6}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{d} u_k^{(a)} \cdot 0 && \left(\because\ W u^{(a)} = 0 \text{ という仮定}\right) \\ &= 0 && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } r \cdot 0 = 0 \text{ と } 0 \text{ の有限和}\right) \end{aligned}$$

となり、帰納法の仮定 $u^{(a)} \neq 0$ と【I と W の正値性】の $\left(u^{(a)}\right)^\top W u^{(a)} > 0$ に反する。よって $u^{(a+1)} = W u^{(a)} \neq 0$ である。

【正値性】$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ は、ある $a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $k = 2a$ か $k = 2a + 1$ である。$k = 2a$ なら

$$\begin{aligned} m_{2a} &= x^\top W^{2a} x && \left(\because\ m_k := x^\top W^k x\right) \\ &= x^\top W^{a+a} x && \left(\because\ \mathbb{Z} \text{ で } 2a = a + a\right) \\ &= x^\top \left(W^a (I W^a)\right) x && \left(\because \text{【冪の分け方】の一つ目 } (b \to a)\right) \\ &= \left(u^{(a)}\right)^\top I\, u^{(a)} && \left(\because \text{【二つの冪で挟んだ値】 } (b \to a,\ B = I)\right) \\ &> 0 && \left(\because \text{【}W^a x \text{ は零でない】と【}I \text{ と}W \text{ の正値性】}\right) \end{aligned}$$

であり、$k = 2a + 1$ なら

$$
\begin{aligned}
m_{2a+1} &= x^\top W^{2a+1} x && \big(\because\ m_k := x^\top W^k x\big) \\
&= x^\top W^{a+a+1} x && \big(\because\ \mathbb{Z}\text{ で }2a+1 = a+a+1\big) \\
&= x^\top \big(W^a (W W^a)\big) x && \big(\because \text{【冪の分け方】の二つ目 } (b \to a)\big) \\
&= \big(u^{(a)}\big)^\top W\, u^{(a)} && \big(\because \text{【二つの冪で挟んだ値】 } (b \to a,\ B = W)\big) \\
&> 0 && \big(\because \text{【}W^a x \text{ は零でない】と【}I \text{ と}W \text{ の正値性】}\big)
\end{aligned}
$$

である。

【$P = W$ の不等式】$a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
(m_{a+b+1})^2 &= \Big(x^\top W^{a+b+1} x\Big)^2 && \big(\because\ m_k := x^\top W^k x\big) \\
&= \Big(x^\top \big(W^b (W W^a)\big) x\Big)^2 && \big(\because \text{【冪の分け方】の二つ目}\big) \\
&= \Big(\big(u^{(b)}\big)^\top W\, u^{(a)}\Big)^2 && \big(\because \text{【二つの冪で挟んだ値】 } (B = W)\big) \\
&\leq \Big(\big(u^{(a)}\big)^\top W\, u^{(a)}\Big)\Big(\big(u^{(b)}\big)^\top W\, u^{(b)}\Big) && \big(\because \text{ 主張 9.3 } (n \to d,\ P \to W,\ x \to u^{(a)},\ y \to u^{(b)})\big) \\
&= \Big(x^\top \big(W^a (W W^a)\big) x\Big)\Big(x^\top \big(W^b (W W^b)\big) x\Big) && \big(\because \text{【二つの冪で挟んだ値】を } (a,b) \to (a,a),\ (b,b),\ B = W \text{ で両因子へ同時に適用}\big) \\
&= \Big(x^\top W^{a+a+1} x\Big)\Big(x^\top W^{b+b+1} x\Big) && \big(\because \text{【冪の分け方】の二つ目を両因子へ同時に適用}\big) \\
&= \Big(x^\top W^{2a+1} x\Big)\Big(x^\top W^{2b+1} x\Big) && \big(\because\ \mathbb{Z}\text{ で }a+a+1 = 2a+1,\ b+b+1 = 2b+1\big) \\
&= m_{2a+1}\, m_{2b+1} && \big(\because\ m_k := x^\top W^k x \text{ を両因子へ同時に適用}\big)
\end{aligned}
$$

である。

【$P = I$ の不等式】$a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
(m_{a+b})^2 &= \Big(x^\top W^{a+b} x\Big)^2 && \big(\because\ m_k := x^\top W^k x\big) \\
&= \Big(x^\top \big(W^b (I W^a)\big) x\Big)^2 && \big(\because \text{【冪の分け方】の一つ目}\big) \\
&= \Big(\big(u^{(b)}\big)^\top I\, u^{(a)}\Big)^2 && \big(\because \text{【二つの冪で挟んだ値】 } (B = I)\big) \\
&\leq \Big(\big(u^{(a)}\big)^\top I\, u^{(a)}\Big)\Big(\big(u^{(b)}\big)^\top I\, u^{(b)}\Big) && \big(\because \text{ 主張 9.3 } (n \to d,\ P \to I,\ x \to u^{(a)},\ y \to u^{(b)})\big) \\
&= \Big(x^\top \big(W^a (I W^a)\big) x\Big)\Big(x^\top \big(W^b (I W^b)\big) x\Big) && \big(\because \text{【二つの冪で挟んだ値】を } (a,b) \to (a,a),\ (b,b),\ B = I \text{ で両因子へ同時に適用}\big) \\
&= \Big(x^\top W^{a+a} x\Big)\Big(x^\top W^{b+b} x\Big) && \big(\because \text{【冪の分け方】の一つ目を両因子へ同時に適用}\big) \\
&= \Big(x^\top W^{2a} x\Big)\Big(x^\top W^{2b} x\Big) && \big(\because\ \mathbb{Z}\text{ で }a+a = 2a,\ b+b = 2b\big) \\
&= m_{2a}\, m_{2b} && \big(\because\ m_k := x^\top W^k x \text{ を両因子へ同時に適用}\big)
\end{aligned}
$$

である。

【$P = I$ の不等式】と【$P = W$ の不等式】から、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$
m_k^2 \leq m_{k-1}\, m_{k+1} \qquad (k \in \mathbb{Z}_{\geq 1})
$$

が従う。k の偶奇でどちらの式を使うかを分け、いずれの場合も $a := \lfloor (k-1)/2 \rfloor$、$b := a+1$ と取る。

$k = 2p+1$（奇数、$p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）の場合は $(a, b) = (p, p+1)$ と取る。このとき

$$
\begin{aligned}
m_k^2 &= (m_{a+b})^2 && \big(\because\ k = 2p+1 = a+b\big) \\
&\leq m_{2a}\, m_{2b} && \big(\because \text{【}P = I \text{ の不等式】}\big) \\
&= m_{2p}\, m_{2p+2} && \big(\because\ a = p,\ b = p+1\big) \\
&= m_{k-1}\, m_{k+1} && \big(\because\ k = 2p+1\big)
\end{aligned}
$$

$k = 2p+2$（偶数、$p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）の場合も $(a, b) = (p, p+1)$ と取る。このとき

$$\begin{aligned} m_k^2 &= (m_{a+b+1})^2 && (\because\ k = 2p+2 = a+b+1) \\ &\le m_{2a+1}\, m_{2b+1} && (\because \text{【}P = W \text{ の不等式】}) \\ &= m_{2p+1}\, m_{2p+3} && (\because\ a = p,\ b = p+1) \\ &= m_{k-1}\, m_{k+1} && (\because\ k = 2p+2) \end{aligned}$$

(添字の確認。奇数の場合は

$$\begin{aligned} a+b &= p+(p+1) && (\because\ a = p,\ b = p+1) \\ &= 2p+1 && (\because\ \mathbb{Z} \text{ の加法}) \\ &= k && (\because\ k = 2p+1) \\ 2a &= 2p && (\because\ a = p) \\ &= k-1 && (\because\ k = 2p+1 \text{ の両辺から1 を引く}) \\ 2b &= 2(p+1) && (\because\ b = p+1) \\ &= 2p+2 && (\because\ \mathbb{Z} \text{ の分配則}) \\ &= k+1 && (\because\ k = 2p+1 \text{ の両辺へ1 を足す}) \end{aligned}$$

であり、偶数の場合は

$$\begin{aligned} a+b+1 &= p+(p+1)+1 && (\because\ a = p,\ b = p+1) \\ &= 2p+2 && (\because\ \mathbb{Z} \text{ の加法}) \\ &= k && (\because\ k = 2p+2) \\ 2a+1 &= 2p+1 && (\because\ a = p) \\ &= k-1 && (\because\ k = 2p+2 \text{ の両辺から1 を引く}) \\ 2b+1 &= 2(p+1)+1 && (\because\ b = p+1) \\ &= 2p+3 && (\because\ \mathbb{Z} \text{ の分配則と加法}) \\ &= k+1 && (\because\ k = 2p+2 \text{ の両辺へ1 を足す}) \end{aligned}$$

である。また $k \ge 1$ より奇数の場合 $p = (k-1)/2 \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$、偶数の場合は $k \ge 2$ なので $p = (k-2)/2 \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ であり、どちらも $p = \lfloor (k-1)/2 \rfloor = a$。現れる指数はすべて $\mathbb{Z}_{\ge 0}$ に収まるので、m_j はいずれも定義済みである。) □

主張 18.8 ($c(M_{\mathrm{col}})^n \le \mathrm{tr}(W^n) \le 2^{M_{\mathrm{col}}} c(M_{\mathrm{col}})^n$)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について

$$c(M_{\mathrm{col}})^n \ \le\ \mathrm{tr}(W^n)\ \le\ 2^{M_{\mathrm{col}}}\, c(M_{\mathrm{col}})^n$$

証明. $c := c(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}_{>0}$（定義 18.4）、$d := 2^{M_{\mathrm{col}}}$、$\mathcal{R} := \{x^\top W x \mid x \in \mathbb{R}^d,\ \|x\| = 1\} \subseteq \mathbb{R}_{>0}$（定義 18.4）と略記する。冪は 定義 3.4 (1) のもの、積は 定義 1.6 のもの、$\mathbb{R}$ の元 t の冪は $t^0 := 1,\ t^{p+1} := t^p t$ である。上からの評価 $\mathrm{tr}(W^n) \le 2^{M_{\mathrm{col}}} c^n$ は 主張 18.6 なので、以下で下からの評価 $c^n \le \mathrm{tr}(W^n)$ を示す。

【W^n の成分の対称性】W は実対称なので（主張 18.3）、W^n は実対称である（主張 8.10、$n \to d,\ A \to W$、指数 n）。すなわち W^n の成分はすべて実数で、すべての $k, l \in \{1, \dots, d\}$ について

$$\begin{aligned} (W^n)_{lk} &= \left((W^n)^\top\right)_{kl} && (\because \text{ 定義 2.75}) \\ &= (W^n)_{kl} && (\because\ W^n \text{ は実対称なので } (W^n)^\top = W^n \text{（定義 8.8）}) \end{aligned}$$

である。以下、定義 18.4 が W を読むのと同じく、W^n の成分を実数として $y^\top W^n z$（定義 9.1）と $\mathrm{tr}(W^n) = \sum_{k=1}^{d} (W^n)_{kk}$（定義 8.1）を読む。

【W^n の半正定値性】$z \in \mathbb{R}^d$ について $z^\top W^n z \ge 0$ を示す。$z = 0$ なら 定義 9.1 の和の各項が $0 \cdot (W^n)_{ij} \cdot 0 = 0$ なので $z^\top W^n z = 0$ である。$z \ne 0$ なら $z_{j_0} \ne 0$ となる j_0 があり、

$$
\begin{aligned}
\|z\|^2 &= \sum_{j=1}^{d} |z_j|^2 && \left(\because \text{ 定義 2.91 と 定義 1.4 の } \left(\sqrt{b}\right)^2 = b\right) \\
&\geq |z_{j_0}|^2 && \left(\because \text{ 主張 1.25 } (a_j \to |z_j|^2,\ k \to j_0)\right) \\
&> 0 && \left(\because\ z_{j_0} \neq 0\right)
\end{aligned}
$$

なので、$\|z\| \geq 0$（定義 2.91）と $\|z\| \neq 0$（$\|z\| = 0$ なら $\|z\|^2 = 0^2 = 0$ となり $\|z\|^2 > 0$ に反する）から $\|z\| > 0$ である。$w \in \mathbb{R}^d$ を $w_i := \|z\|^{-1} z_i$ で定めると、$i \in \{1, \ldots, d\}$ について $z_i = \|z\|\left(\|z\|^{-1} z_i\right) = \|z\|\, w_i$ であり、

$$
\begin{aligned}
\|w\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^{d} |w_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \left(\because \text{ 定義 2.91}\right) \\
&= \sqrt{\sum_{i=1}^{d} \left(\|z\|^{-1} z_i\right)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \left(\because\ w_i := \|z\|^{-1} z_i \text{ と、} \mathbb{R} \text{ の元 } t \text{ で } |t|^2 = t^2 \text{ を各項へ同時に適用}\right) \\
&= \sqrt{\sum_{i=1}^{d} \left(\|z\|^{-1}\right)^2 z_i^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ で } (st)^2 = s^2 t^2 \text{ を各項へ同時に適用}\right) \\
&= \sqrt{\left(\|z\|^{-1}\right)^2 \sum_{i=1}^{d} z_i^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \left(\because \text{ 主張 1.24 } (c \to (\|z\|^{-1})^2)\right) \\
&= \sqrt{\left(\|z\|^{-1}\right)^2 \sum_{i=1}^{d} |z_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の元 } t \text{ で } t^2 = |t|^2 \text{ を各項へ同時に適用}\right) \\
&= \sqrt{\left(\|z\|^{-1}\right)^2 \|z\|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \left(\because \text{ 上の } \|z\|^2 = \sum_j |z_j|^2\right) \\
&= \sqrt{\left(\|z\|^{-1}\|z\|\right)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則・結合則}\right) \\
&= \sqrt{1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \left(\because\ \|z\| \neq 0 \text{ なので } \|z\|^{-1}\|z\| = 1,\ 1^2 = 1\right) \\
&= 1 && \left(\because \text{ 定義 1.4 の } 1 \geq 0,\ 1^2 = 1\right)
\end{aligned}
$$

である。よって

$$
\begin{aligned}
z^\top W^n z &= \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} z_i \left(W^n\right)_{ij} z_j && \left(\because \text{ 定義 9.1}\right) \\
&= \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} (\|z\|\, w_i)\left(W^n\right)_{ij} (\|z\|\, w_j) && \left(\because\ z_i = \|z\|\, w_i \text{ を各項へ同時に適用}\right) \\
&= \|z\|^2 \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} w_i \left(W^n\right)_{ij} w_j && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則・結合則と、主張 1.24 } (c \to \|z\|^2) \text{ を内側と外側の和へ適用}\right) \\
&= \|z\|^2 \left(w^\top W^n w\right) && \left(\because \text{ 定義 9.1}\right) \\
&> 0 && \left(\because\ \|z\|^2 > 0 \text{ と、主張 18.7 の正値性を単位ベクトル } x \to w \text{ と } k \to n \text{ で適用した } w^\top W^n w > 0\right)
\end{aligned}
$$

である。いずれの場合も $z^\top W^n z \geq 0$ である。

【W^n の成分の評価】$x \in \mathbb{R}^d$、$k, l \in \{1, \ldots, d\}$ について、$v \in \mathbb{R}^d$ を $v_i := x_l \left(e_k\right)_i - x_k \left(e_l\right)_i$ で定める。ここで $q \in \{1, \ldots, d\}$ について $e_q \in \mathbb{R}^d$ は、$i = q$ なら $\left(e_q\right)_i := 1$、$i \neq q$ なら $\left(e_q\right)_i := 0$ で定めた実数の組である。

$$
\begin{aligned}
0 &\leq v^\top W^n v && (\because \text{【}W^n \text{ の半正定値性】 } (z \to v)) \\
&= \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} v_i\,(W^n)_{ij}\,v_j && (\because \text{ 定義 } 9.1) \\
&= \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} \big(x_l(e_k)_i - x_k(e_l)_i\big)(W^n)_{ij}\big(x_l(e_k)_j - x_k(e_l)_j\big) && (\because \ v \text{ の定義}) \\
&= x_l^2 \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} (e_k)_i (W^n)_{ij} (e_k)_j - x_l x_k \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} (e_k)_i (W^n)_{ij} (e_l)_j \\
&\quad - x_k x_l \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} (e_l)_i (W^n)_{ij} (e_k)_j + x_k^2 \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} (e_l)_i (W^n)_{ij} (e_l)_j && (\because \ \mathbb{R} \text{ の分配則と乗法の交換則・結合則、主張 } 1.24 \text{ を内側と外側の和へ適用}) \\
&= x_l^2\,(W^n)_{kk} - x_l x_k\,(W^n)_{kl} - x_k x_l\,(W^n)_{lk} + x_k^2\,(W^n)_{ll} && (\because \ (e_q)_i \text{ は } i = q \text{ でだけ } 1 \text{ でほかは } 0 \text{ なので、各二重和で } 0 \text{ でない項は一つだけ}) \\
&= x_l^2\,(W^n)_{kk} - x_l x_k\,(W^n)_{kl} - x_k x_l\,(W^n)_{kl} + x_k^2\,(W^n)_{ll} && (\because \text{【}W^n \text{ の成分の対称性】の } (W^n)_{lk} = (W^n)_{kl}) \\
&= x_l^2\,(W^n)_{kk} - 2\,x_k\,(W^n)_{kl}\,x_l + x_k^2\,(W^n)_{ll} && (\because \ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則と同類項の加法})
\end{aligned}
$$

であり、移項して

$$
2\,x_k\,(W^n)_{kl}\,x_l \ \leq \ x_l^2\,(W^n)_{kk} + x_k^2\,(W^n)_{ll}
$$

である。

【単位ベクトルでの評価】$x \in \mathbb{R}^d$、$\|x\| = 1$ とし、$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $m_k := x^\top W^k x$ を 主張 18.7 のとおりに置く。主張 18.7 より、すべての $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ で $m_k > 0$、すべての $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $m_k^2 \leq m_{k-1} m_{k+1}$ である。まず

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{d} x_k^2 &= \sum_{k=1}^{d} |x_k|^2 && \big(\because \ x_k \in \mathbb{R} \text{ なので } x_k^2 = |x_k|^2\big) \\
&= \|x\|^2 && \big(\because \text{ 定義 } 2.91 \text{ と 定義 } 1.4 \text{ の } \big(\sqrt{b}\big)^2 = b\big) \\
&= 1 && \big(\because \ \|x\| = 1 \text{ と } 1^2 = 1\big)
\end{aligned}
$$

であり、単位行列 $I := I_{\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})}$ について

$$
\begin{aligned}
m_0 &= x^\top W^0 x && \big(\because \ m_0 := x^\top W^0 x\big) \\
&= x^\top I x && \big(\because \text{ 定義 } 3.4 \text{ (1) の } A^0 := I\big) \\
&= \sum_{k=1}^{d}\sum_{l=1}^{d} x_k\,\delta_{kl}\,x_l && \big(\because \text{ 定義 } 9.1 \text{ と 定義 } 2.2\big) \\
&= \sum_{k=1}^{d} x_k\,\delta_{kk}\,x_k && \big(\because \ l \neq k \text{ の項は } \delta_{kl} = 0 \text{ (定義 } 2.1\text{) なので } 0\big) \\
&= \sum_{k=1}^{d} x_k x_k && \big(\because \ \delta_{kk} = 1 \text{ (定義 } 2.1\text{) }\big) \\
&= \sum_{k=1}^{d} x_k^2 && \big(\because \text{ 冪の定義 } t^2 = (t^0 t)t = tt\big) \\
&= 1 && \big(\because \text{ 上の式変形}\big)
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
m_1 &= x^\top W^1 x && \big(\because \ m_1 := x^\top W^1 x\big) \\
&= x^\top W^{0+1} x && \big(\because \ \mathbb{Z} \text{ で } 1 = 0 + 1\big) \\
&= x^\top \big(W^0 W\big) x && \big(\because \text{ 定義 } 3.4 \text{ (1) の } A^{m+1} := A^m A \text{ を } m = 0 \text{ に適用}\big) \\
&= x^\top \big(IW\big) x && \big(\because \text{ 定義 } 3.4 \text{ (1) の } A^0 := I\big) \\
&= x^\top W x && \big(\because \text{ 主張 } 2.16\big)
\end{aligned}
$$

である。次に、$k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について $m_k \geq m_1 m_{k-1}$ を k についての帰納法で示す。$k = 1$ では $m_1 = m_1 \cdot 1 = m_1 m_0$（$m_0 = 1$）である。$k \geq 1$ で $m_k \geq m_1 m_{k-1}$ とすると、

$$\begin{aligned} \frac{m_k}{m_{k-1}} &\geq \frac{m_1 m_{k-1}}{m_{k-1}} && (\because \text{ 帰納法の仮定と、正の } m_{k-1} \text{ での商は順序を保つ}) \\ &= m_1 && (\because \ m_{k-1} > 0 \text{ の約分}) \end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned} m_{k+1} &= \frac{m_{k-1} m_{k+1}}{m_{k-1}} && (\because \ m_{k-1} > 0 \text{ の約分}) \\ &\geq \frac{m_k^2}{m_{k-1}} && (\because \text{ 主張 18.7 の } m_k^2 \leq m_{k-1} m_{k+1} \text{ と、正の } m_{k-1} \text{ での商は順序を保つ}) \\ &= m_k \frac{m_k}{m_{k-1}} && (\because \ m_k^2 = m_k m_k \text{ と乗法の結合則}) \\ &\geq m_k \, m_1 && (\because \text{ 上の } \tfrac{m_k}{m_{k-1}} \geq m_1 \text{ と、正の } m_k \text{ を掛けても順序を保つ}) \\ &= m_1 m_{(k+1)-1} && (\because \ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則と } \mathbb{Z} \text{ で } k = (k+1) - 1) \end{aligned}$$

である。さらに、$p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $m_p \geq m_1^p$ を p についての帰納法で示す。$p = 0$ では $m_0 = 1 = m_1^0$ である。$m_p \geq m_1^p$ とすると、

$$\begin{aligned} m_{p+1} &\geq m_1 m_{(p+1)-1} && (\because \text{ 上の } m_k \geq m_1 m_{k-1} \ (k \to p+1)) \\ &= m_1 m_p && (\because \ \mathbb{Z} \text{ で } (p+1) - 1 = p) \\ &\geq m_1 m_1^p && (\because \text{ 帰納法の仮定と、正の } m_1 \text{ を掛けても順序を保つ}) \\ &= m_1^{p+1} && (\because \ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則と冪の定義 } t^{p+1} := t^p t) \end{aligned}$$

である。最後に、【W^n の成分の評価】をすべての k, l に当てて

$$\begin{aligned} m_n &= \sum_{k=1}^{d} \sum_{l=1}^{d} x_k \, (W^n)_{kl} \, x_l && (\because \ m_n := x^\top W^n x \text{ と 定義 9.1}) \\ &= 2^{-1} \sum_{k=1}^{d} \sum_{l=1}^{d} 2 \, x_k \, (W^n)_{kl} \, x_l && (\because \ 2^{-1} \cdot 2 = 1 \text{ と 主張 1.24 } (c \to 2^{-1}) \text{ を内側と外側の和へ適用}) \\ &\leq 2^{-1} \sum_{k=1}^{d} \sum_{l=1}^{d} (x_l^2 \, (W^n)_{kk} + x_k^2 \, (W^n)_{ll}) && (\because \text{【}W^n \text{ の成分の評価】を } d^2 \text{ 個の項へ同時に適用し、項ごとの不等式の有限和と } 2^{-1} > 0 \text{ 倍は順序を保つ}) \\ &= 2^{-1} \Big(\sum_{k=1}^{d} \sum_{l=1}^{d} x_l^2 \, (W^n)_{kk} + \sum_{k=1}^{d} \sum_{l=1}^{d} x_k^2 \, (W^n)_{ll} \Big) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の有限和の加法の交換則・結合則}) \\ &= 2^{-1} \Big(\sum_{k=1}^{d} (W^n)_{kk} \sum_{l=1}^{d} x_l^2 + \sum_{k=1}^{d} x_k^2 \sum_{l=1}^{d} (W^n)_{ll} \Big) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則と、主張 1.24 を内側の和へ適用}) \\ &= 2^{-1} \Big(\Big(\sum_{k=1}^{d} (W^n)_{kk} \Big) \Big(\sum_{l=1}^{d} x_l^2 \Big) + \Big(\sum_{k=1}^{d} x_k^2 \Big) \Big(\sum_{l=1}^{d} (W^n)_{ll} \Big) \Big) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則と、主張 1.24 を外側の和へ適用}) \\ &= 2^{-1} \big(\mathrm{tr}(W^n) \cdot 1 + 1 \cdot \mathrm{tr}(W^n) \big) && (\because \text{ 定義 8.1 と、上の } \textstyle\sum_k x_k^2 = 1) \\ &= \mathrm{tr}(W^n) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

である。以上を合わせると、単位ベクトル x について

$$\begin{aligned} \big(x^\top W x \big)^n &= m_1^n && (\because \text{ 上の } m_1 = x^\top W x) \\ &\leq m_n && (\because \text{ 上の } m_p \geq m_1^p \ (p \to n)) \\ &\leq \mathrm{tr}(W^n) && (\because \text{ 上の式変形}) \end{aligned}$$

である。

【正の実数の冪の比較】$r, s \in \mathbb{R}_{>0}$、$r < s$ とする。$p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について (a) $0 < r^p < s^p$、(b) $s^p - r^p \leq p \, s^{p-1} (s - r)$ を p についての帰納法で示す。$p = 1$ では $r^1 = r^0 r = r$、$s^1 = s$ なので (a) は $0 < r < s$、(b) は $s - r = 1 \cdot s^0 (s - r)$ である。p で (a)(b) が成り立つとすると、

$$
\begin{aligned}
r^{p+1} &= r^p r && \big(\because \text{ 冪の定義}\big)\\
&< s^p r && \big(\because \text{ (a) の } r^p < s^p \text{ と } r > 0\big)\\
&< s^p s && \big(\because \text{ } r < s \text{ と、(a) から } s^p > r^p > 0\big)\\
&= s^{p+1} && \big(\because \text{ 冪の定義}\big)
\end{aligned}
$$

かつ $r^{p+1} = r^p r > 0$（$r^p > 0$、$r > 0$）なので (a) が $p+1$ で成り立ち、

$$
\begin{aligned}
s^{p+1} - r^{p+1} &= s\big(s^p - r^p\big) + r^p(s-r) && \big(\because \text{ 冪の定義と } \mathbb{R} \text{ の分配則（} -sr^p + r^p s = 0\text{）}\big)\\
&\le s\big(p\, s^{p-1}(s-r)\big) + r^p(s-r) && \big(\because \text{ (b) と } s > 0\big)\\
&\le s\big(p\, s^{p-1}(s-r)\big) + s^p(s-r) && \big(\because \text{ (a) の } r^p < s^p \text{ と } s - r > 0\big)\\
&= p\, s^p(s-r) + s^p(s-r) && \big(\because \text{ } s\, s^{p-1} = s^{p-1} s = s^p \text{（冪の定義）と乗法の交換則・結合則}\big)\\
&= (p+1)\, s^{(p+1)-1}(s-r) && \big(\because \text{ } \mathbb{R} \text{ の分配則と } \mathbb{Z} \text{ で } p = (p+1) - 1\big)
\end{aligned}
$$

なので (b) が $p+1$ で成り立つ。

【上限への移行】$T := \mathrm{tr}(W^n)$ とおく。$\|e_1\| = 1$ の e_1（定義 18.4）に【単位ベクトルでの評価】を当てると $T \ge m_n > 0$ である（m_n は $x = e_1$ のもの）。$c^n \le T$ を背理法で示す。$c^n > T$ と仮定し、$\delta := (c^n - T)\,(n\, c^{n-1})^{-1}$、$r := c - \delta$ とおく（$c^{n-1} > 0$（$n = 1$ なら $c^0 = 1$、$n \ge 2$ なら【正の実数の冪の比較】(a) を $r \to c,\ s \to c+1,\ p \to n-1$ に当てる）なので $n\, c^{n-1} > 0$、$\delta \in \mathbb{R}_{>0}$、$r \in \mathbb{R}$、$r < c$）。

$$
\begin{aligned}
\delta &= (c^n - T)\,(n\, c^{n-1})^{-1} && \big(\because \text{ } \delta \text{ の定義}\big)\\
&< c^n\,(n\, c^{n-1})^{-1} && \big(\because \text{ } T > 0 \text{ と、正の } (n\, c^{n-1})^{-1} \text{ を掛けても順序を保つ}\big)\\
&= c^{n-1} c\,(n\, c^{n-1})^{-1} && \big(\because \text{ 冪の定義と } \mathbb{Z} \text{ で } n = (n-1) + 1\big)\\
&= c^{n-1} c\,\big(n^{-1}(c^{n-1})^{-1}\big) && \big(\because \text{ } n \ne 0,\ c^{n-1} \ne 0 \text{ なので } (n\, c^{n-1})^{-1} = n^{-1}(c^{n-1})^{-1}\big)\\
&= c\, n^{-1}\big(c^{n-1}(c^{n-1})^{-1}\big) && \big(\because \text{ } \mathbb{R} \text{ の乗法の交換則・結合則}\big)\\
&= c\, n^{-1} && \big(\because \text{ } c^{n-1}(c^{n-1})^{-1} = 1\big)\\
&\le c && \big(\because \text{ } n \ge 1 \text{ なので } 0 < n^{-1} \le 1 \text{ と } c > 0\big)
\end{aligned}
$$

なので $r = c - \delta > 0$ である。$r < c = \sup \mathcal{R}$ で、上限は最小の上界なので、r は $\mathcal{R}$ の上界でない。すなわち $\|x\| = 1$ で $t := x^\top W x > r$ となる $x \in \mathbb{R}^d$ があり、$t \in \mathcal{R} \subseteq \mathbb{R}_{>0}$ である。この x について

$$
\begin{aligned}
T &\ge t^n && \big(\because \text{【単位ベクトルでの評価】の } \big(x^\top W x\big)^n \le \mathrm{tr}(W^n)\big)\\
&> r^n && \big(\because \text{【正の実数の冪の比較】(a) } (r \to r,\ s \to t,\ p \to n)\big)\\
&\ge c^n - n\, c^{n-1}(c - r) && \big(\because \text{【正の実数の冪の比較】(b) } (r \to r,\ s \to c,\ p \to n) \text{ の移項}\big)\\
&= c^n - n\, c^{n-1}\delta && \big(\because \text{ } r := c - \delta \text{ なので } c - r = \delta\big)\\
&= c^n - (c^n - T) && \big(\because \text{ } \delta \text{ の定義と } n\, c^{n-1}\,(n\, c^{n-1})^{-1} = 1\big)\\
&= T && \big(\because \text{ } \mathbb{R} \text{ の加法}\big)
\end{aligned}
$$

となり、$T > T$ で矛盾する。よって $c^n \le \mathrm{tr}(W^n)$ である。上からの評価 主張 18.6 と合わせて主張を得る。 □

主張 18.9 (分配関数の挟み撃ち)**.** 主張 12.7 と同じ設定のもと、$N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について

$$
c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} \;\le\; Z(K_1, K_2) \;\le\; 2^{M_{\mathrm{col}}}\, c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}}
$$

証明.

$$\begin{aligned} Z(K_1,K_2) &= \mathrm{tr}\big(W^{N_{\mathrm{row}}}\big) && \big(\because \text{ 主張 18.2}\big) \\ &\geq c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} && \big(\because \text{ 主張 18.8 の下からの評価を } n = N_{\mathrm{row}} \text{ に適用}\big) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z(K_1,K_2) &= \mathrm{tr}\big(W^{N_{\mathrm{row}}}\big) && \big(\because \text{ 主張 18.2}\big) \\ &\leq 2^{M_{\mathrm{col}}}\, c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} && \big(\because \text{ 主張 18.8 の上からの評価を } n = N_{\mathrm{row}} \text{ に適用}\big) \end{aligned}$$

この二つを合わせて主張を得る。 □

主張 18.10 ($N_{\mathrm{row}} \to \infty$ の極限)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ と $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ を固定する。主張 18.9 の $c(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}_{>0}$ と、行数 $N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ の 定義 12.2 の $Z(K_1,K_2) \in \mathbb{R}_{>0}$ について、N_{row} を動かした実数列の極限

$$\lim_{N_{\mathrm{row}} \to \infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}}\, N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1,K_2) = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$$

が存在する。すなわち、行数 N_{row} についての極限は $c(M_{\mathrm{col}})$ だけで決まる。log は 定義 12.21 の実対数で、値は $\mathbb{R}$ に住む（実対数と極限による $\mathbb{R}$ 脱出)。

証明. $N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について $Z := Z(K_1,K_2)$ (行数 N_{row} のもの)、$c := c(M_{\mathrm{col}})$ と略記する。定義 12.2 より $Z \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 18.4 より $c \in \mathbb{R}_{>0}$ である。冪 $c^{N_{\mathrm{row}}}$、$2^{M_{\mathrm{col}}}$ は 定義 11.36 の冪で、$\mathbb{R}_{>0}$ に住む。したがって $c^{N_{\mathrm{row}}}$、Z、$2^{M_{\mathrm{col}}} c^{N_{\mathrm{row}}}$ の log が定まる。

$$\begin{aligned} & c^{N_{\mathrm{row}}} \leq Z \leq 2^{M_{\mathrm{col}}} c^{N_{\mathrm{row}}} && \big(\because \text{ 主張 18.9}\big) \\ \Longrightarrow\ & \log(c^{N_{\mathrm{row}}}) \leq \log Z \leq \log(2^{M_{\mathrm{col}}} c^{N_{\mathrm{row}}}) && \big(\because\ u \leq v \text{ は} u < v \text{ か} u = v\text{。前者は主張 12.22、後者は写像} \log \text{ の値が一つに定まること}\big) \\ \Longrightarrow\ & N_{\mathrm{row}} \log c \leq \log Z \leq \log(2^{M_{\mathrm{col}}} c^{N_{\mathrm{row}}}) && \big(\because \text{ 主張 11.37 を} a = c,\ n = N_{\mathrm{row}} \text{ で}\big) \\ \Longrightarrow\ & N_{\mathrm{row}} \log c \leq \log Z \leq \log(2^{M_{\mathrm{col}}}) + \log(c^{N_{\mathrm{row}}}) && \big(\because \text{ 主張 11.35 を} a = 2^{M_{\mathrm{col}}},\ b = c^{N_{\mathrm{row}}} \text{ で}\big) \\ \Longrightarrow\ & N_{\mathrm{row}} \log c \leq \log Z \leq M_{\mathrm{col}} \log 2 + \log(c^{N_{\mathrm{row}}}) && \big(\because \text{ 主張 11.37 を} a = 2,\ n = M_{\mathrm{col}} \text{ で}\big) \\ \Longrightarrow\ & N_{\mathrm{row}} \log c \leq \log Z \leq M_{\mathrm{col}} \log 2 + N_{\mathrm{row}} \log c && \big(\because \text{ 主張 11.37 を} a = c,\ n = N_{\mathrm{row}} \text{ で}\big) \\ \Longrightarrow\ & \frac{N_{\mathrm{row}} \log c}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \leq \frac{\log Z}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \leq \frac{M_{\mathrm{col}} \log 2 + N_{\mathrm{row}} \log c}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} && \big(\because \text{ 各辺を} M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{R}_{>0} \text{ で割る。正の数で割っても不等号は保たれる}\big) \\ \Longrightarrow\ & \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c \leq \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z \leq \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c + \frac{\log 2}{N_{\mathrm{row}}} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則。分子と分母の共通の因子} N_{\mathrm{row}}\text{、} M_{\mathrm{col}} \text{ を約す}\big) \\ \Longrightarrow\ & 0 \leq \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z - \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c \leq \frac{\log 2}{N_{\mathrm{row}}} && \Big(\because \text{ 各辺から} \tfrac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c \text{ を引く。引いても不等号は保たれる}\Big) \\ \Longrightarrow\ & \left| \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z - \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c \right| \leq \frac{\log 2}{N_{\mathrm{row}}} && \big(\because \text{ 非負の実数の絶対値はそれ自身}\big)\,. \end{aligned}$$

$a_{N_{\mathrm{row}}} := \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1,K_2) \in \mathbb{R}$、$a := \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c \in \mathbb{R}$ と置く。準備として

$$\begin{aligned} \log 2 &> \log 1 && \big(\because \text{ 主張 12.22 を} 1 < 2 \text{ に}\big) \\ &= \log(\exp 0) && \big(\because \text{ 主張 3.14}\big) \\ &= 0 && \big(\because \text{ 定義 12.21 の} \log(\exp x) = x\big)\,. \end{aligned}$$

$\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ を取る。$\mathbb{R}$ のアルキメデス性より $N_0\, \varepsilon > \log 2$ となる $N_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を取る。$N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\geq N_0}$ について

$$\begin{aligned} |a_{N_{\mathrm{row}}} - a| &\leq \frac{\log 2}{N_{\mathrm{row}}} && \big(\because \text{ 上の含意の鎖の最後の行}\big) \\ &\leq \frac{\log 2}{N_0} && \big(\because \text{ 準備の} \log 2 > 0 \text{ かつ} 0 < N_0 \leq N_{\mathrm{row}}\big) \\ &< \varepsilon && \big(\because\ N_0\, \varepsilon > \log 2 \text{ の両辺を} N_0 > 0 \text{ で割る}\big)\,. \end{aligned}$$

よって 定義 2.91 の $K = \mathbb{R}$ の列の収束の意味で $a_{N_{\mathrm{row}}} \to a$ であり、極限は 主張 3.10 により一つに定まるので、主張の極限は存在して値は $a = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$ である。$\mathbb{R}$ を使うのは、log が実対数で値が $\mathbb{R}$ に住むこと（実対数による脱出）と、実数列の極限とアルキメデス性を使うこと（極限による脱出）のためである。 □

主張 18.11 ($c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} \le Z \le 2^{M_{\mathrm{col}}} c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}}$ と $\lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（定義 12.2 の定義域が $\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$ であるため）、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\ge 2}$ とする。定義 13.42 の $W = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（成分はすべて実数。主張 18.3。成分が $\mathbb{R}$ に住むのは、定義 3.4 の行列の指数関数の値であるため。指数評価による脱出）と、定義 18.4 の

$$c(M_{\mathrm{col}}) = \sup \left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \right\} \in \mathbb{R}_{>0}$$

（$\mathbb{R}$ に住むのは、上限の存在を $\mathbb{R}$ の完備性から得るため。完備性による脱出）について、定義 12.2 の $Z(K_1, K_2) \in \mathbb{R}_{>0}$（行数 N_{row} に依る。$\mathbb{R}$ に住むのは、実数の指数関数の値の有限和であるため。指数評価による脱出）は次を満たす。

- (1) $c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} \le Z(K_1, K_2) \le 2^{M_{\mathrm{col}}} c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} \qquad (N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\ge 1})$
- (2) $\lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1, K_2) = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$（log は正の実数上の実対数で、値は $\mathbb{R}$ に住む。実対数と極限による脱出）

証明. (1) 主張 18.9 そのものである。
(2) 主張 18.10 そのものである（その証明は (1) の挟み撃ちから始まる）。 □

19 $M \to \infty$ の極限と閉形式

注意 19.1 ($c_+(M_{\mathrm{col}})$ を $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ で決め、$M_{\mathrm{col}} \to \infty$ の極限を取る道筋)**.** 定義 19.4 の $c_+(M_{\mathrm{col}})$ は $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトルにわたる上限であり、主張 13.43 の $WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$ により $\mathcal{F}^{(+)}$ の上では W と $V^{(+)}$ が一致する。したがって、定理 16.19 の $V^{(+)}$ の最大固有値 $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ について

$$c_+(M_{\mathrm{col}}) \le \check{\Lambda}_{\max}$$

は容易である。逆向きの不等号には、$\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルが $\mathcal{F}^{(+)}$ に属すること（定理 17.17）を使う。

そのうえで $c_+(M_{\mathrm{col}}) = \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$（定理 19.14）を示し、$c(M_{\mathrm{col}})$ を $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ と $2\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ で挟む（主張 19.16）。これを 定理 19.10 と合わせて 注意 19.11 の「残っている入力」を解消する（定理 19.17）。

以下で用いる道具は、複素数を成分とする行列の積・和・スカラー倍、行列の指数関数（定義 3.4）、有限個の実数の和と積、$\cosh, \sinh, \log$、実数の上限、注意 19.8 の (R0)（初等関数の連続性。主張 19.9 が使う）、および 定理 10.1（等間隔点の平均の積分への収束）である。定理 10.1 を引くのは 定理 19.10 の証明であり、定理 19.17 はそれを通して有限和の極限を積分として計算する。

注意 19.2 ($c_+(M_{\mathrm{col}})$ と、W とε の性質を示す道筋)**.** 定義 13.18 の ε の固有値 $+1$ の固有空間 $\mathcal{F}^{(+)}$ について次を示す。$\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトルにわたる上限 $c_+(M_{\mathrm{col}})$ を定め（定義 19.4）、定義 18.4 の $c(M_{\mathrm{col}})$ について $c_+(M_{\mathrm{col}}) \le c(M_{\mathrm{col}})$ を示す（主張 19.5）。W が ε と可換で $\mathcal{F}^{(+)}$ を保つこと（主張 19.6）、ε が実対称であること（主張 19.7）を示す。$\mathcal{F}^{(+)}$ の上で W が $V^{(+)}$ に一致すること $WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$（主張 13.43）は、定理 19.14 で $c_+(M_{\mathrm{col}})$ の値を求めるために使う。$c_+(M_{\mathrm{col}}) \le c(M_{\mathrm{col}})$ と $W \cdot \varepsilon$ の性質は、主張 19.16 で $c(M_{\mathrm{col}})$ を $c_+(M_{\mathrm{col}})$ と $2c_+(M_{\mathrm{col}})$ で挟むために使う。

主張 19.3 (W の成分はすべて正)**.** 定義 12.11 の ι による番号付け（主張 12.12）のもとで、定義 13.42 で定めた $W \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（結合定数 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$）のすべての成分は正の実数である：

$$W_{\iota(\mu),\iota(\mu')} > 0 \qquad (\mu, \mu' \in \mathfrak{M})$$

ここで $W_{\iota(\mu),\iota(\mu')}$ は 定義 2.72 の取り決めにより $W_{\nu(\iota(\mu)),\nu(\iota(\mu'))}$ を表し、$z \in \mathbb{C}$ について $z > 0$ は「$z = w_{\mathbb{C}}$ を満たす $w \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在する」ことを表す（$w_{\mathbb{C}}$ は 定義 1.13 の略記。正であることの判定に $\mathbb{R}$ の順序を使うので、w は $\mathbb{R}$ の元として取る）。言い換えると、すべての $k, l \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について $W_{kl} > 0$ である。

証明. 準備。$n := 2^{M_{\mathrm{col}}}$、$B := V_1^{1/2}$（定義 13.41）とおく。定義 13.41 の $D = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$（定義 2.5 の有限和）について、$\frac{1}{2}K_1 D$ は実数 $\frac{1}{2}K_1 \in \mathbb{R}$ による 定義 2.3 のスカラー倍 $X := \left(\frac{1}{2}K_1\right)_{\mathbb{C}} D$ と読む。$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について $m^+ := m + 1$（$m \leq M_{\mathrm{col}} - 1$）、$m^+ := 1$（$m = M_{\mathrm{col}}$）とおく。定義 12.9 より $\sigma_{m+1}^z = \sigma_{m^+}^z$、定義 12.6 の周期規約 $\mu(M_{\mathrm{col}} + 1) := \mu(1)$ より $\mu(m+1) = \mu(m^+)$ である。$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ について

$$d(\mu) := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\,\mu(m+1) \in \mathbb{R}, \qquad b(\mu) := \exp\left(\tfrac{1}{2}K_1\, d(\mu)\right) \in \mathbb{R},$$

$$e(\mu, \mu') := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\,\mu'(m) \in \mathbb{R}, \qquad v(\mu, \mu') := \exp\left(K_2\, e(\mu, \mu')\right) \in \mathbb{R}$$

とおく（和は 定義 1.19、exp は 定義 3.11 の実数の exp。実数の指数関数を使うので $\mathbb{R}$ へ脱出している）。主張 3.16 より $b(\mu) > 0$、$v(\mu, \mu') > 0$ である。以下、$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ を固定し、$k := \nu(\iota(\mu))$、$l := \nu(\iota(\mu'))$ とおく。

Step 1（B は対角行列で、$B_{kk} = b(\mu)_{\mathbb{C}}$）。$p, q \in \{1, \ldots, n\}$、$p \neq q$ とする。

$$\begin{aligned}
D_{pq} &= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right)_{pq} && (\because \text{主張 2.7}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\sigma_m^z \sigma_{m^+}^z\right)_{pq} && (\because \sigma_{m+1}^z = \sigma_{m^+}^z \text{ を各項へ同時に適用}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 12.16 を各} (m, m^+) \text{ へ同時に適用}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.18})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_{kk} &= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right)_{kk} && (\because \text{主張 2.7}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\sigma_m^z \sigma_{m^+}^z\right)_{kk} && (\because \sigma_{m+1}^z = \sigma_{m^+}^z \text{ を各項へ同時に適用}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)_{\mathbb{C}}\, \mu(m^+)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 12.18 を各} (m, m^+) \text{ へ同時に適用}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left(\mu(m)\,\mu(m^+)\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29 を各項へ同時に適用}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\,\mu(m^+)\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.20}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\,\mu(m+1)\right)_{\mathbb{C}} && (\because \mu(m+1) = \mu(m^+) \text{ を各項へ同時に適用}) \\
&= d(\mu)_{\mathbb{C}} && (\because d(\mu) \text{ の定義})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
X_{pq} &= \left(\tfrac{1}{2}K_1\right)_{\mathbb{C}} D_{pq} && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \left(\tfrac{1}{2}K_1\right)_{\mathbb{C}} 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{上の} D_{pq} = 0_{\mathbb{C}}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.59})
\end{aligned}
$$

より X は対角行列（定義 4.2）である。ゆえに

$$
\begin{aligned}
B_{pq} &= \left(\exp(X)\right)_{pq} && (\because \text{定義 13.41}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 4.3 を対角行列} X \text{ へ})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
B_{kk} &= \left(\exp(X)\right)_{kk} && (\because \text{定義 13.41}) \\
&= \exp(X_{kk}) && (\because \text{主張 4.3 を対角行列} X \text{ へ}) \\
&= \exp\left(\left(\tfrac{1}{2}K_1\right)_{\mathbb{C}} D_{kk}\right) && (\because \text{定義 2.3}) \\
&= \exp\left(\left(\tfrac{1}{2}K_1\right)_{\mathbb{C}} d(\mu)_{\mathbb{C}}\right) && (\because \text{上の} D_{kk} = d(\mu)_{\mathbb{C}}) \\
&= \exp\left(\left(\tfrac{1}{2}K_1\, d(\mu)\right)_{\mathbb{C}}\right) && (\because \text{主張 1.29}) \\
&= \left(\exp\left(\tfrac{1}{2}K_1\, d(\mu)\right)\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 3.18}) \\
&= b(\mu)_{\mathbb{C}} && (\because b(\mu) \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

同じ鎖を μ' と $l = \nu(\iota(\mu'))$ に当てて $B_{ll} = b(\mu')_{\mathbb{C}}$ である。

Step 2（$(V_2)_{kl} = v(\mu, \mu')_{\mathbb{C}}$）。

$$
\begin{aligned}
(V_2)_{kl} &= (V_2)_{\mathrm{ord}(\mu),\, \mathrm{ord}(\mu')} && (\because \text{主張 12.12 を} \mu \text{ と} \mu' \text{ へ}) \\
&= \left(\exp\left(K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\, \mu'(m)\right)\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 12.6。指数の肩は実数で、値は実数の exp の} \mathbb{C} \text{ への包含}) \\
&= v(\mu, \mu')_{\mathbb{C}} && (\because e(\mu, \mu') \text{ と} v(\mu, \mu') \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

Step 3（成分の計算）。$s, t \in \{1, \ldots, n\}$、$s \neq k$、$t \neq l$ とする。

$$
\begin{aligned}
(BV_2)_{kt}\, B_{tl} &= (BV_2)_{kt}\, 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{Step 1 の} B_{tl} = 0_{\mathbb{C}}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.59})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
B_{ks}\, (V_2)_{sl} &= 0_{\mathbb{C}}\, (V_2)_{sl} && (\because \text{Step 1 の} B_{ks} = 0_{\mathbb{C}}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.58})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
W_{kl} &= \left((BV_2)\, B\right)_{kl} && (\because \text{定義 13.42}) \\
&= \sum_{t=1}^{n} (BV_2)_{kt}\, B_{tl} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= (BV_2)_{kl}\, B_{ll} && (\because \text{主張 1.68 を、上の} t \neq l \text{ の項の値へ}) \\
&= \left(\sum_{s=1}^{n} B_{ks}\, (V_2)_{sl}\right) B_{ll} && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \left(B_{kk}\, (V_2)_{kl}\right) B_{ll} && (\because \text{主張 1.68 を、上の} s \neq k \text{ の項の値へ}) \\
&= \left(b(\mu)_{\mathbb{C}}\, (V_2)_{kl}\right) b(\mu')_{\mathbb{C}} && (\because \text{Step 1 の} B_{kk} \text{ と} B_{ll}) \\
&= \left(b(\mu)_{\mathbb{C}}\, v(\mu, \mu')_{\mathbb{C}}\right) b(\mu')_{\mathbb{C}} && (\because \text{Step 2}) \\
&= \left(b(\mu)\, v(\mu, \mu')\right)_{\mathbb{C}}\, b(\mu')_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29}) \\
&= \left(\left(b(\mu)\, v(\mu, \mu')\right) b(\mu')\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29})
\end{aligned}
$$

$w := \left(b(\mu)\, v(\mu, \mu')\right) b(\mu') \in \mathbb{R}$、$r_1 := b(\mu),\ r_2 := v(\mu, \mu'),\ r_3 := b(\mu') \in \mathbb{R}$ とおくと、準備の $b(\mu) > 0$・$v(\mu, \mu') > 0$・$b(\mu') > 0$ より

$$w = \prod_{j=1}^{3} r_j \quad (\because \text{定義 1.61})$$
$$> 0 \qquad (\because \text{主張 1.62 を} m := 3 \text{ で})$$

であり、$W_{kl} = w_{\mathbb{C}}$ である。$k = \nu(\iota(\mu))$、$l = \nu(\iota(\mu'))$ なので、これが主張である。主張 12.12 と 主張 12.5 より $\mathfrak{M} \ni \mu \mapsto \nu(\iota(\mu)) = \mathrm{ord}(\mu) \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ は全単射なので、どの $k', l' \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ もある $\lambda, \lambda' \in \mathfrak{M}$ で $k' = \nu(\iota(\lambda))$、$l' = \nu(\iota(\lambda'))$ と書け、上の議論を $(\mu, \mu') := (\lambda, \lambda')$ で行えば $W_{k'l'} > 0$ である。これが言い換えの形である。 □

定義 19.4 ($c_+(M_{\mathrm{col}}) := \sup \mathcal{R}_+$($\mathcal{F}^{(+)}$ での上限)). 定義 13.42 の W と 定義 13.18 の $\mathcal{F}^{(+)}$ について、

$$\mathcal{R}_+ := \left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \right\}, \qquad c_+(M_{\mathrm{col}}) := \sup \mathcal{R}_+$$

とおく。この上限が定まること、すなわち $\mathcal{R}_+$ が空でなく上に有界であることを先に確かめる。上に有界なのは $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \subseteq \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ より $\mathcal{R}_+ \subseteq \mathcal{R}$（定義 18.4 の $\mathcal{R}$）であり、$\mathcal{R}$ が成分の絶対値の有限和 $\sum_{i,j} |W_{ij}|$ で上に有界だからである（定義 18.4 の有界性の評価)。空でないことは、$\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトルを具体的に作れることから従う。

主張 6.1 の $\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ について

$$a_+ := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \qquad \sigma^x a_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = a_+$$

とおき（右の等式は 2×2 行列と 2 次元数ベクトルの積の計算そのもの)、定義 2.72 (1) の数ベクトルのクロネッカー積で

$$x^{(+)} := \overbrace{a_+ \boxtimes a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+}^{M_{\mathrm{col}}} \quad \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$$

と定める（定義 2.72 (1) より成分は各因子の成分の積だから、$x^{(+)}$ の各成分は $2^{-M_{\mathrm{col}}/2}$ という実数であり、とくに $x^{(+)} \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$)。主張 13.19 の証明で得た $\varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x$ と 主張 2.73 (3) より

$$\begin{aligned}
\varepsilon\, x^{(+)} &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)\,(a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+) \quad (\because \text{主張 13.19 の証明で得た表示と } x^{(+)} \text{ の定義}) \\
&= (\sigma^x a_+) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x a_+) \quad (\because \text{主張 2.73 (3)}) \\
&= a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+ \quad (\because \sigma^x a_+ = a_+ \text{ を各因子へ同時に適用}) \\
&= x^{(+)} \quad (\because x^{(+)} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

である。よって 定義 13.18 より $x^{(+)} \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ である。さらに $x^{(+)}$ の $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の成分はすべて $2^{-M_{\mathrm{col}}/2}$ なので

$$\begin{aligned}
\left\| x^{(+)} \right\|^2 &= \sum_{I \in \mathcal{I}_{M_{\mathrm{col}}}} \left(2^{-M_{\mathrm{col}}/2} \right)^2 \quad (\because \text{定義 2.91 の数ベクトルのノルムの定義と各成分の値}) \\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}} \cdot 2^{-M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \#\mathcal{I}_{M_{\mathrm{col}}} = 2^{M_{\mathrm{col}}} \text{ と } \left(2^{-M_{\mathrm{col}}/2} \right)^2 = 2^{-M_{\mathrm{col}}}) \\
&= 1 \quad (\because \text{指数法則})
\end{aligned}$$

($\mathcal{I}_{M_{\mathrm{col}}}$ は 定義 2.72 の添字集合)。したがって $\left(x^{(+)}\right)^\top W x^{(+)} \in \mathcal{R}_+$ で $\mathcal{R}_+ \neq \emptyset$ であり、上限 $c_+(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}$ が定まる。上限の存在は 定義 18.4 と同じく、空でなく上に有界な実数の集合が上限をもつという $\mathbb{R}$ の性質による（実数への脱出)。

主張 19.5 ($c_+(M_{\mathrm{col}}) \le c(M_{\mathrm{col}})$)**.** 定義 19.4 の $c_+(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}$ と 定義 18.4 の $c(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}_{>0}$ について、

$$c_+(M_{\mathrm{col}}) \le c(M_{\mathrm{col}})$$

が成り立つ。

証明. $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \subseteq \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ なので、$\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトルは $\mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトルでもあり、定義 19.4 の $\mathcal{R}_+$ と 定義 18.4 の $\mathcal{R}$ について $\mathcal{R}_+ \subseteq \mathcal{R}$ である。$\mathcal{R}_+$ は空でない（定義 19.4)。上限の比較は $\mathbb{R}$ の中で行う（両辺の上限はいずれも $\mathbb{R}$ の上限の存在によって定まった実数である)。

$$\begin{aligned} c_+(M_{\mathrm{col}}) &= \sup \mathcal{R}_+ \quad (\because \text{定義 19.4}) \\ &\le \sup \mathcal{R} \quad (\because \mathcal{R}_+ \subseteq \mathcal{R},\ \mathcal{R}_+ \neq \emptyset \text{ と上限の単調性}) \\ &= c(M_{\mathrm{col}}) \quad (\because \text{定義 18.4}) \end{aligned}$$

□

主張 19.6 ($\varepsilon W = W\varepsilon$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、結合定数 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。定義 13.42 の $W \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ は 定義 13.3 の全スピン反転行列 $\varepsilon \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と可換である（積は 定義 1.6)。

$$\varepsilon W = W\varepsilon$$

したがって W は 定義 13.18 の $\mathcal{F}^{(+)}$ を保つ。すなわち、すべての $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ について $Wf \in \mathcal{F}^{(+)}$ である。

証明. 準備。$S := V_1^{1/2}$（定義 13.41）とおく。定義 13.41 の $D = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ は 主張 13.30 の D と同じ式で定まる同じ行列である。$\frac{1}{2}K_1 D$ は実数 $\frac{1}{2}K_1 \in \mathbb{R}$ の 定義 1.13 による像 $c := \left(\frac{1}{2}K_1\right)_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ による 定義 2.3 のスカラー倍 cD と読む。したがって $S = \exp(cD)$ である。

$$\begin{aligned} \varepsilon D &= D\varepsilon \quad (\because \text{主張 13.30}) \\ \varepsilon(cD) &= (cD)\varepsilon \quad (\because \text{主張 2.69 } (G \to \varepsilon,\ X \to D)\text{、仮定}GX = XG \text{ は}\varepsilon D = D\varepsilon) \\ \varepsilon V_2 &= V_2\varepsilon \quad (\because \text{主張 13.32}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon S &= \varepsilon \exp(cD) \quad (\because \text{定義 13.41}) \\ &= \exp(cD)\,\varepsilon \quad (\because \text{主張 3.6 } (A \to \varepsilon,\ B \to cD)\text{、仮定}AB = BA \text{ は}\varepsilon(cD) = (cD)\varepsilon) \\ &= S\varepsilon \quad (\because \text{定義 13.41}) \end{aligned}$$

本体。

$$\begin{aligned} \varepsilon W &= \varepsilon\,((SV_2)S) \quad (\because \text{定義 13.42}) \\ &= (\varepsilon(SV_2))\,S \quad (\because \text{主張 2.15}) \\ &= ((\varepsilon S)V_2)\,S \quad (\because \text{主張 2.15}) \\ &= ((S\varepsilon)V_2)\,S \quad (\because \varepsilon S = S\varepsilon) \\ &= (S(\varepsilon V_2))\,S \quad (\because \text{主張 2.15}) \\ &= (S(V_2\varepsilon))\,S \quad (\because \varepsilon V_2 = V_2\varepsilon) \\ &= ((SV_2)\varepsilon)\,S \quad (\because \text{主張 2.15}) \\ &= (SV_2)(\varepsilon S) \quad (\because \text{主張 2.15}) \\ &= (SV_2)(S\varepsilon) \quad (\because \varepsilon S = S\varepsilon) \\ &= ((SV_2)S)\,\varepsilon \quad (\because \text{主張 2.15}) \\ &= W\varepsilon \quad (\because \text{定義 13.42}) \end{aligned}$$

$f \in \mathcal{F}^{(+)}$ とする。f は 定義 1.6 の取り決めで $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 行 1 列の行列として積に入る。定義 13.18 より $\varepsilon f = f$ である。

$$\begin{aligned}
\varepsilon(Wf) &= (\varepsilon W)f \quad (\because \text{主張 2.15 } (q=1)) \\
&= (W\varepsilon)f \quad (\because \varepsilon W = W\varepsilon) \\
&= W(\varepsilon f) \quad (\because \text{主張 2.15 } (q=1)) \\
&= Wf \qquad (\because \varepsilon f = f)
\end{aligned}$$

$Wf \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$（定義 1.6）と $\varepsilon(Wf) = Wf$ より、定義 13.18 から $Wf \in \mathcal{F}^{(+)}$ である。 □

主張 19.7 ($\varepsilon^\top = \varepsilon$)**.** 定義 13.3 の全スピン反転行列 $\varepsilon \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ は成分がすべて実数であり、転置について対称である。

$$\varepsilon^\top = \varepsilon$$

証明. 主張 13.19 の証明で得た表示より $\varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x$（$M_{\mathrm{col}}$ 個の因子）である。因子 σ^x の成分はすべて実数（主張 6.9）なので、主張 2.82（$M \to M_{\mathrm{col}},\ A_k \to \sigma^x\ (k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\})$）より ε の成分はすべて実数（定義 2.81）である。転置については

$$\begin{aligned}
\varepsilon^\top &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)^\top \quad (\because \text{主張 13.19 の証明で得た表示}) \\
&= (\sigma^x)^\top \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x)^\top \quad (\because \text{主張 2.76}) \\
&= \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x \quad (\because \text{主張 6.5 を各因子へ同時に適用}) \\
&= \varepsilon \quad (\because \text{主張 13.19 の証明で得た表示}).
\end{aligned}$$

□

注意 19.8 (実数解析（Riemann 積分）へ移行する箇所)**.** 分配関数の部から $N_{\mathrm{row}} \to \infty$ の極限の章までは、複素数を成分とする有限サイズの行列の積・和・スカラー倍と、行列の指数関数（定義 3.4：ノルムについて収束する級数）だけで書かれてきた。実数の極限は使ったが、積分は一度も使っていない。

定理 19.10 の証明が 定理 10.1 を引く箇所が、自由エネルギーの表式（定理 19.17）を得るまでに実数解析（Riemann 積分）へ移行する唯一の箇所である。定理 10.1 の証明が ** 積分について ** 外部から持ち込む事実は次の 2 つだけであり、この表式を得るまでの他の箇所では使わない。

- (R1) **Heine–Cantor**：有界閉区間 $[a,b] \subset \mathbb{R}$ 上の連続関数は一様連続である。すなわち $\forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0$ が存在して $|s-t| \le \delta \Rightarrow |g(s) - g(t)| \le \epsilon$。
- (R2) ** 連続関数の Riemann 可積分性 **：$[a,b]$ 上の連続関数 g は Riemann 積分可能で、積分は区間についての加法性 $\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c$ と評価 $\left|\int_a^b g\right| \le (b-a)\sup_{[a,b]}|g|$、および定数の積分 $\int_a^b \lambda\, dt = \lambda(b-a)$ を満たす。

** 積分とは別に、被積分関数の連続性を示すところでもう 1 種類の外部事実を使う。**主張 19.9 の証明は、$\gamma = \mathrm{arccosh} \circ \gamma_1$ を初等関数の合成として書いて連続性を導くので、次を認める必要がある。

- (R0) ** 初等関数の連続性 **：$\cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ は連続、$\sqrt{\cdot} : \mathbb{R}_{\ge 0} \to \mathbb{R}$ は連続、$\log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ は連続であり、連続関数の四則（分母が 0 にならない範囲）と合成は連続である。

(R0) は Riemann 積分とは独立の事実であり、(R1)(R2) には含まれない。これも有限の代数計算では代用できないので、外部事実として明示的に数える。自由エネルギーの表式を得るまでに持ち込む実数解析の事実は (R0)(R1)(R2) の 3 種類でちょうど尽きている。

移行が必要になる理由も明示しておく。主張 18.9 と 主張 18.10 により、鎖の長さ M_{col} を固定したままの量 $\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log c(M_{\mathrm{col}})$ までは有限の行列計算で到達する。しかし $M_{\mathrm{col}}\to\infty$ で現れるのは $\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma\Big(\frac{2\pi(\mu-\frac{1}{2})}{M_{\mathrm{col}}}\Big)$ という ** 点の個数が増えていく有限和 ** であり、その極限を閉じた式で書くには「等間隔の点での値の平均が積分に収束する」という実数解析の事実が要る。ここだけは有限の代数計算では代用できない。

** 表式を得た後の臨界点の章では、得られた積分を微分するために外部事実を追加で持ち込む。** 追加分のうち (R3)(R4) は 注意 11.1 に、(R5)(R6) は臨界点の章の冒頭に列挙し、自由エネルギーの表式を得るまでに持ち込む (R0)(R1)(R2) とは独立に管理する。

主張 19.9 (γ はℝ 上で連続)**.** 定義 15.11 の $\gamma:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ は連続である。証明は全実数上の cos とその連続性（注意 19.8 の (R0)）を前提とする（本文の 定義 1.41 は $[-\pi/2,\pi/2]$ に限る）。

証明. Step 1（γ_1 の連続性）。$\theta\in\mathbb{R}$ について

$$\gamma_1(\theta)=c_1c_2^*-s_1s_2^*\cos\theta\qquad\big(\because\text{ 定義 15.9}\big)$$

であり、$c_1c_2^*, s_1s_2^*\in\mathbb{R}$ は θ に依らない（定義 12.26）。定数関数は連続である（連続の定義の δ を任意に取れる）。$\cos:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ は連続、連続関数の積と差は連続である（注意 19.8 の (R0)）。よって $\gamma_1:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ は連続である。

Step 2（arccosh の $[1,\infty)$ 上の連続性）。$y\in[1,\infty)$ について

$$\operatorname{arccosh}(y)=\log\left(y+\sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\qquad\big(\because\text{ 定義 15.1}\big)$$

であり、定義 15.1 の右辺が定まることの鎖により $y^2-1\geq 0$、$y+\sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\geq 1>0$ である。恒等写像 $y\mapsto y$ と定数関数は連続であり（連続の定義の δ を ϵ に、または任意に取れる）、連続写像を定義域の部分集合へ制限しても連続である（同じ δ が使える）。これらと 注意 19.8 の (R0) により、次の各写像は連続である。

- $[1,\infty)\to\mathbb{R},\ y\mapsto y^2-1$（恒等写像の積と定数関数の差。値は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に入る）
- $[1,\infty)\to\mathbb{R},\ y\mapsto\sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$（前の写像の値が $\sqrt{\cdot}:\mathbb{R}_{\geq 0}\to\mathbb{R}$ の定義域に入るので、その連続性と合成）
- $[1,\infty)\to\mathbb{R},\ y\mapsto y+\sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$（連続関数の和。値は $\mathbb{R}_{>0}$ に入る）
- $\operatorname{arccosh}:[1,\infty)\to\mathbb{R}$（前の写像の値が $\log:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}$ の定義域に入るので、その連続性と合成）

Step 3（合成）。$\theta\in\mathbb{R}$ について

$$\gamma(\theta)=\operatorname{arccosh}\left(\gamma_1(\theta)\right)\qquad\big(\because\text{ 定義 15.11}\big)$$

であり、主張 15.10 より $\gamma_1(\mathbb{R})\subseteq[1,\infty)$ である。Step 1 より $\gamma_1:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ は連続で、その値はすべて Step 2 で連続性を示した arccosh の定義域 $[1,\infty)$ に入るので、合成 $\theta\mapsto\operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta))$ は $\mathbb{R}$ 上連続である（注意 19.8 の (R0) の合成）。よって γ は $\mathbb{R}$ 上連続である（値が $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に入ることは 定義 15.11 が述べている）。 □

定理 19.10 (Onsager の自由エネルギーの表式)**.** $\delta\in[0,1)$ を固定し、$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ について 定義 16.5 の $\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}$ を考える。このとき

$$\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}=\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta$$

が成り立つ。** 右辺は δ に依らない。** ここで

$$\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}\left(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta\right)$$

であり（定義 15.9、定義 15.11）、これが Onsager の自由エネルギーの表式である。

証明. $\Lambda := \Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}$ の log を取る。$2\sinh 2K_2 > 0$（$K_2 > 0$）と exp の正値性より $\Lambda > 0$ なので $\log\Lambda$ が定まり、一続きに

$$\begin{aligned}
\log\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} &= \log\left((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\big(\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\big)\right)\right) && \left(\because\ \Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} \text{の定義。定義 16.5}\right) \\
&= \log\left((2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\right) + \log\left(\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\big(\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\big)\right)\right) && \left(\because\ \text{積の対数}\ \log(ab) = \log a + \log b\right) \\
&= \frac{M_{\mathrm{col}}}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \log\left(\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\big(\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\big)\right)\right) && \left(\because\ \text{冪の対数}\ \log(x^r) = r\log x\right) \\
&= \frac{M_{\mathrm{col}}}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\big(\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\big) && \left(\because\ \log(\exp(y)) = y\right)
\end{aligned}$$

を得る。

ここで $\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}$ を展開する。一続きに

$$\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\big(\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\big) = \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{R}} - \delta)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right) \quad \left(\because\ \text{定義 16.4 を各項へ同時適用}\right)$$

を得る。また、$M_{\mathrm{col}} > 0$ なので、一続きに

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} &= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\left(\frac{M_{\mathrm{col}}}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\big(\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\big)\right) && \left(\because\ \text{上で得た}\ \log\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}\ \text{の表示を代入}\right) \\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{2M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\big(\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\big) && \left(\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則}\right) \\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{2M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{R}} - \delta)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right) && \left(\because\ \text{上で得た}\theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\ \text{の展開}\right) \\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{R}} - \delta)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right) && \left(\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則}\right)
\end{aligned}$$

第 1 項は M_{col} に依らない定数である。第 2 項について、主張 19.9 より γ は $\mathbb{R}$ 上連続であり、$\delta \in [0,1) \subset [0,1]$ なので、定理 10.1 を $g \to \gamma,\ M \to M_{\mathrm{col}}$ として適用でき（定理 10.1 の $t_\mu^{(M_{\mathrm{col}})}$ が $\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{R}}-\delta)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}$ に当たる）

$$\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{R}} - \delta)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right) \xrightarrow[M_{\mathrm{col}}\to\infty]{} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta$$

を得る。よって、一続きに

$$\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}=\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\left(\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma\Big(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{R}}-\delta)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\Big)\right)\quad\Big(\because\ \text{上で得た}\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}\ \text{の表示を代入}\Big)$$

$$=\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma\Big(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{R}}-\delta)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\Big)\right)\quad(\because\ \text{収束する実数列に定数を加えた列は収束し、極限に定数が加わる})$$

$$=\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{2}\cdot\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma\Big(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{R}}-\delta)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\Big)\quad(\because\ \text{収束する実数列の定数倍は収束し、極限が定数倍になる})$$

$$=\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta\quad(\because\ \text{上の収束（等間隔点の平均は積分に収束する）})$$

$$=\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta\quad\Big(\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則}\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}=\frac{1}{4\pi}\Big)$$

が成り立ち、主張の式を得る（第 2 行・第 3 行の極限法則が適用できるのは、第 4 行で引いた 定理 10.1 の収束が第 2 項の収束を与えるからである）。定理 10.1 の極限が δ に依らないので、右辺も δ に依らない。 □

注意 19.11 (厳密解へ残っている入力：$c_+(M_{\mathrm{col}})$ の値)**.** ここまでで得られたものを並べると、分配関数から自由エネルギーまでの経路は次のようになっている。

- 主張 12.7：$Z=\mathrm{tr}\big((V_1V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big)$
- 主張 18.9：$c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}}\le Z\le 2^{M_{\mathrm{col}}}c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}}$
- 主張 18.10：$\dfrac{1}{M_{\mathrm{col}}N_{\mathrm{row}}}\log Z\to\dfrac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log c(M_{\mathrm{col}})$
- 主張 19.5：$c_+(M_{\mathrm{col}})\le c(M_{\mathrm{col}})$
- 定理 19.10：$\dfrac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}\to\dfrac{1}{2}\log(2\sinh 2K_2)+\dfrac{1}{4\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}\gamma$（$\delta$ に依らない）

** 残っている入力は 1 つだけである **（これは固有値問題の部で求めた $V^{(+)}$ の固有値から 定理 19.14 で示す。最終的な結論は 定理 19.17）：$c_+(M_{\mathrm{col}})$（ε の固有値 $+1$ の固有空間での上限）が $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ に等しいこと、すなわち $V^{(+)}$ の固有値が $\tilde\theta_\mu=2\pi(\mu-\frac{1}{2})/M_{\mathrm{col}}$（$\mu\in\check{\mathcal{M}}$）での $\gamma(\tilde\theta_\mu)$ で与えられることである。上からの評価 $c(M_{\mathrm{col}})\le 2c_+(M_{\mathrm{col}})$ は、主張 19.3 の成分の正値性から 主張 19.16 で示す。

$V^{(+)}$ を作る $H_1^{(+)}$（定義 13.22）は、境界項 $-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1$ を持つ：

$$H_1^{(+)}=\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}Y_mZ_{m+1}-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1$$

この符号のため、$V^{(+)}$ を対角化する行列は、$\tilde\theta_\mu$（主張 14.8）で Z_j,Y_j を離散 Fourier 変換した

$$\check Z_\mu:=\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}Z_j\ \exp(-ij\tilde\theta_\mu),\qquad \check Y_\mu:=\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}Y_j\ \exp(-ij\tilde\theta_\mu),\qquad \tilde\theta_\mu:=\frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}$$

になる（定義 14.9、定義 14.10）。この $\check Z,\check Y$ は $H_1^{(+)},H_2$ との交換関係 (A)〜(D) を満たし（主張 14.16）、反交換関係の対は $\nu=M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ になる（主張 15.6）。** この道筋は固有値問題の部で本文として実行済みであり、以降の証明の根拠として使ってよい。** 到達点は 定理 19.14 の $c_+(M_{\mathrm{col}})=\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ と 定理 19.17 である。

主張 19.12 (Z_m,Y_m は線型独立)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\ge1}$ とし、定義 13.1 の $Z_1,\dots,Z_{M_{\mathrm{col}}}$ と 定義 13.2 の $Y_1,\dots,Y_{M_{\mathrm{col}}}$ を $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の元として考える。$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を $\mathbb{C}$-線型空間とみなすとき、

$$\{Z_1,\dots,Z_{M_{\mathrm{col}}},Y_1,\dots,Y_{M_{\mathrm{col}}}\}\ \text{は線型独立}$$

すなわち $\alpha_1,\dots,\alpha_{M_{\mathrm{col}}},\beta_1,\dots,\beta_{M_{\mathrm{col}}}\in\mathbb{C}$ が $\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}\alpha_mZ_m+\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}\beta_mY_m=0$ を満たすならば、すべての m について $\alpha_m=\beta_m=0$ である。

証明. 以下、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ を標準的な Pauli 行列

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。定義 12.8 のとおり σ^a_k（$a \in \{x, y, z\}$）は第 k 番目の因子（サイト）のみが σ^a で他の因子がすべて I である元である。

Step 1: $\mathcal{B} := \{I, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ に対して

$$A = \frac{a_{11}+a_{22}}{2} I + \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\sigma^x + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\sigma^y + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\sigma^z \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つ。右辺の 4 つの成分を 1 つずつ計算すると、

$$\begin{aligned}
\left(\frac{a_{11}+a_{22}}{2} I + \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\sigma^x + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\sigma^y + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\sigma^z\right)_{11} &= \frac{a_{11}+a_{22}}{2}\cdot 1 + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\cdot 1 && (\because\ I_{11} = \sigma^z_{11} = 1,\ \sigma^x_{11} = \sigma^y_{11} = 0) \\
&= \frac{a_{11}+a_{22}}{2} + \frac{a_{11}-a_{22}}{2} && (\because\ 1 \text{ を掛けても変わらない}) \\
&= \frac{2a_{11}}{2} && (\because\ \text{同分母の和}) \\
&= a_{11} && (\because\ \text{約分})
\end{aligned}$$

であり、同じ計算を残りの 3 つの成分について行うと、

$$\begin{aligned}
(\cdots)_{22} &= \frac{a_{11}+a_{22}}{2}\cdot 1 + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\cdot(-1) && (\because\ I_{22} = 1,\ \sigma^z_{22} = -1,\ \sigma^x_{22} = \sigma^y_{22} = 0) \\
&= \frac{a_{11}+a_{22}}{2} - \frac{a_{11}-a_{22}}{2} && (\because\ (-1) \text{ を掛けることは符号を変えること}) \\
&= \frac{2a_{22}}{2} && (\because\ \text{同分母の差}) \\
&= a_{22} && (\because\ \text{約分}) \\
(\cdots)_{12} &= \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\cdot 1 + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\cdot(-i) && (\because\ \sigma^x_{12} = 1,\ \sigma^y_{12} = -i,\ I_{12} = \sigma^z_{12} = 0) \\
&= \frac{a_{12}+a_{21}}{2} + \frac{a_{12}-a_{21}}{2} && (\because\ i\cdot(-i) = 1) \\
&= \frac{2a_{12}}{2} && (\because\ \text{同分母の和}) \\
&= a_{12} && (\because\ \text{約分}) \\
(\cdots)_{21} &= \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\cdot 1 + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\cdot i && (\because\ \sigma^x_{21} = 1,\ \sigma^y_{21} = i,\ I_{21} = \sigma^z_{21} = 0) \\
&= \frac{a_{12}+a_{21}}{2} - \frac{a_{12}-a_{21}}{2} && (\because\ i\cdot i = -1) \\
&= \frac{2a_{21}}{2} && (\because\ \text{同分母の差}) \\
&= a_{21} && (\because\ \text{約分})
\end{aligned}$$

となる（$(\cdots)$ は上と同じ右辺の行列である）。よって $\mathcal{B}$ は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ を張り、$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{B}$ であるから $\mathcal{B}$ は基底である。以下

$$e_1 := I, \quad e_2 := \sigma^x, \quad e_3 := \sigma^y, \quad e_4 := \sigma^z$$

と番号を付ける。

Step 2: クロネッカー積がつくる基底。定理 2.88 (2) を基底 $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ に適用すると、多重添字 $(i_1, \ldots, i_{M_{\mathrm{col}}}) \in \{1,2,3,4\}^{M_{\mathrm{col}}}$ で添字づけられた族

$$\mathcal{E} := \left\{ e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} \;\middle|\; (i_1, \ldots, i_{M_{\mathrm{col}}}) \in \{1,2,3,4\}^{M_{\mathrm{col}}} \right\}$$

は $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。

Step 3: Z_m, Y_m のクロネッカー積による表示。まず $1 \le r \le M_{\mathrm{col}}$ と $a_1, \ldots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$\sigma_1^{a_1}\sigma_2^{a_2}\cdots\sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r}$$

が成り立つことを r に関する帰納法で示す。$r = 1$ のときは 定義 13.15 の $\sigma_1^{a_1}$ の定義そのものである。r で成り立つとすると、クロネッカー積の積が各サイトごとの積であること（主張 2.73 (1)）

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_{M_{\mathrm{col}}}) = (A_1B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_{M_{\mathrm{col}}}B_{M_{\mathrm{col}}})$$

と $AI = IA = A$ より、

$$\begin{aligned}
\sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_r^{a_r}\sigma_{r+1}^{a_{r+1}} &= (\sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes I \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I)\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{\sigma^{a_{r+1}}}^{(r+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I\right) && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= (\sigma^{a_1}I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^{a_r}I) \boxtimes (I\sigma^{a_{r+1}}) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) && (\because \text{ クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \sigma^{a_{r+1}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-(r+1)} && (\because AI = IA = A)
\end{aligned}$$

定義 13.1 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$ と、定義 13.2 の $Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ にこれを適用すると（$m = 1$ のときは前半の積が空積で $Z_1 = \sigma_1^z$、$Y_1 = \sigma_1^y$ であり、下の式で σ^x の個数を 0 とすればよい）、

$$\begin{aligned}
Z_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{ Step 3 の帰納法と} Z_m \text{ の定義}) \\
Y_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{ Step 3 の帰納法と} Y_m \text{ の定義定義 13.2})
\end{aligned}$$

Step 4: 対応する多重添字。Step 1 の番号付け $e_1 = I,\ e_2 = \sigma^x,\ e_3 = \sigma^y,\ e_4 = \sigma^z$ のもとで、Step 3 の表示は Z_m, Y_m がそれぞれ多重添字

$$\zeta(m)_k := \begin{cases} 2 & (k < m) \\ 4 & (k = m) \\ 1 & (k > m) \end{cases} \qquad \eta(m)_k := \begin{cases} 2 & (k < m) \\ 3 & (k = m) \\ 1 & (k > m) \end{cases}$$

に対応する $\mathcal{E}$ の元であることを意味する。すなわち $Z_m = e_{\zeta(m)_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{\zeta(m)_{M_{\mathrm{col}}}}$、$Y_m = e_{\eta(m)_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{\eta(m)_{M_{\mathrm{col}}}}$。

Step 5: これら $2M_{\mathrm{col}}$ 個の多重添字は相異なる。$m, m' \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について次のように場合分けする。

- $\zeta(m)$ と $\zeta(m')$（$m < m'$）：第 m 成分は $\zeta(m)_m = 4$、$\zeta(m')_m = 2$（$m < m'$ より）であり相異なる。
- $\eta(m)$ と $\eta(m')$（$m < m'$）：第 m 成分は $\eta(m)_m = 3$、$\eta(m')_m = 2$ であり相異なる。
- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m = m'$ のとき: 第 m 成分は 4 と 3 で相異なる。

- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m < m'$ のとき: 第 m 成分は 4 と 2 で相異なる。
- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m > m'$ のとき: 第 m' 成分は $\zeta(m)_{m'} = 2$（$m' < m$ より）と $\eta(m')_{m'} = 3$ で相異なる。

以上より $\zeta(1), \dots, \zeta(M_{\mathrm{col}}), \eta(1), \dots, \eta(M_{\mathrm{col}})$ は相異なる $2M_{\mathrm{col}}$ 個の多重添字であり、対応する $Z_1, \dots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \dots, Y_{M_{\mathrm{col}}}$ は基底 $\mathcal{E}$ の相異なる $2M_{\mathrm{col}}$ 個の元である。

Step 6: 結論。$\alpha_1, \dots, \alpha_{M_{\mathrm{col}}}, \beta_1, \dots, \beta_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{C}$ が

$$\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \alpha_m Z_m + \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \beta_m Y_m = 0$$

を満たすとする。Step 5 より左辺は基底 $\mathcal{E}$ の相異なる元の $\mathbb{C}$-線型結合であり、$\mathcal{E}$ のそれ以外の元の係数は 0 である。基底による表示は一意（特に 0 の表示はすべての係数が 0）であるから、

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_{M_{\mathrm{col}}} = \beta_1 = \cdots = \beta_{M_{\mathrm{col}}} = 0$$

すなわち $\{Z_1, \dots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \dots, Y_{M_{\mathrm{col}}}\}$ は線型独立である。 □

主張 19.13 ($\check{n}_\mu, \check{Q}_\epsilon$ はエルミート)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ とする。X^* を 定義 8.7 の転置共役とすると、

- (1) $Z_j^* = Z_j, \qquad Y_j^* = Y_j \qquad (j \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\})$
- (2) $\check{Z}_\mu^* = \check{Z}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}, \qquad \check{Y}_\mu^* = \check{Y}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$
- (3) $\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^* = \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$
- (4) $\check{n}_\mu^* = \check{n}_\mu, \qquad \check{Q}_\epsilon^* = \check{Q}_\epsilon \qquad \left(\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\right)$

が成り立つ。とくに $\check{Q}_\epsilon$ はエルミートな冪等行列なので、任意の $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について

$$x^* \check{Q}_\epsilon x = x^* \check{Q}_\epsilon^* \check{Q}_\epsilon x = \left\| \check{Q}_\epsilon x \right\|^2 \geq 0$$

である。

証明. (1) 主張 6.1 の Pauli 行列の成分より $(\sigma^x)^* = \sigma^x$、$(\sigma^y)^* = \sigma^y$、$(\sigma^z)^* = \sigma^z$ である（σ^y は転置で $(1,2)$ 成分 $-i$ と $(2,1)$ 成分 i が入れ替わり、複素共役でさらに符号が戻る）。$I^*_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ である（定義 2.2 の成分 δ_{kl} は実数で、$\delta_{lk} = \delta_{kl}$）。$A_1, \dots, A_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ と 定義 2.72 の $I = (i_1, \dots, i_{M_{\mathrm{col}}}),\ J = (j_1, \dots, j_{M_{\mathrm{col}}}) \in \mathcal{I}_{M_{\mathrm{col}}}$ について

$$\begin{aligned}
\left((A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})^*\right)_{\nu(I),\nu(J)} &= \overline{(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})_{\nu(J),\nu(I)}} && (\because \text{定義 8.7}) \\
&= \overline{\prod_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} (A_k)_{j_k i_k}} && (\because \text{定義 2.72 (2)}) \\
&= \prod_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} \overline{(A_k)_{j_k i_k}} && (\because \text{主張 5.3 の反復適用}) \\
&= \prod_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} (A_k^*)_{i_k j_k} && (\because \text{定義 8.7 を各因子へ}) \\
&= \left(A_1^* \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}}^*\right)_{\nu(I),\nu(J)} && (\because \text{定義 2.72 (2)})
\end{aligned}$$

ν は全単射なので $(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})^* = A_1^* \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}}^*$ である。よって $a \in \{x, y, z\}$、$k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について

$$\begin{aligned}
(\sigma_k^a)^* &= \left(I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^a \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\right)^* && (\because \text{定義 12.8}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}^* \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^a)^* \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}^* && (\because \text{直前の式}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^a \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} && \left(\because\ (\sigma^a)^* = \sigma^a \text{ と} I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}^* = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\right) \\
&= \sigma_k^a && (\because \text{定義 12.8})
\end{aligned}$$

主張 8.11 (1) の $(XW)^* = W^* X^*$ と、相異なるサイトの因子が可換であること（主張 12.10）から

$$\begin{aligned}
Z_j^* &= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z\right)^* && (\because \text{定義 13.1}) \\
&= \left(\sigma_j^z\right)^* \left(\sigma_{j-1}^x\right)^* \cdots (\sigma_1^x)^* && (\because \text{主張 8.11 (1) の} (XW)^* = W^* X^* \text{ の反復適用}) \\
&= \sigma_j^z\, \sigma_{j-1}^x \cdots \sigma_1^x && (\because (\sigma_k^a)^* = \sigma_k^a) \\
&= \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z && (\because \text{主張 12.10 の反復適用}) \\
&= Z_j && (\because \text{定義 13.1})
\end{aligned}$$

Y_j も、定義 13.2 の $Y_j = \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^y$ について同じ計算である（σ_j^z を σ_j^y に替える）。

(2) 主張 15.5 (2) より $\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})_{\mathbb{C}}) = \exp(i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}})$ である（以下の $\exp(\pm ij\tilde{\theta}_\mu)$ は $\exp(\pm i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}})$ の略記である）。$\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ なので 定理 1.88 より $\overline{\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)} = \exp(ij\tilde{\theta}_\mu)$ であり、

$$\begin{aligned}
\check{Z}_\mu^* &= \left(\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j\right)^* && (\because \text{定義 14.9}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \overline{\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)}\, Z_j^* && (\because \text{主張 8.11 (1) の} (\alpha A + \beta B)^* = \overline{\alpha} A^* + \overline{\beta} B^* \text{ の反復適用}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(ij\tilde{\theta}_\mu)\, Z_j && (\because (1) \text{ と} \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\, Z_j && (\because \text{主張 15.5 (2)}) \\
&= \check{Z}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} && (\because \text{定義 14.9})
\end{aligned}$$

$\check{Y}_\mu$ も、定義 14.10 について同じ計算である（定義 14.15 (2) より $M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので右辺は定義されている）。

(3) 定義 15.21 より、$\nu := M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$、$\beta := \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \in \mathbb{R}_{>0}$、$\alpha_\mu := \dfrac{-\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}$ とおくと

$$\check{\psi}_\mu^\dagger = \alpha_\mu \check{Z}_\mu + \beta \check{Y}_\mu, \qquad \check{\psi}_\nu = -\alpha_\nu \check{Z}_\nu + \beta \check{Y}_\nu$$

である。まず $\overline{\alpha_\mu} = -\alpha_\nu$ を示す。主張 15.13 (1) の $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}$ より $\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right| = \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$ であり、主張 15.22 (3) より $\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu) = \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ である。よって $r := \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| = \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu)\right| \in \mathbb{R}_{>0}$（主張 15.12）と書けて

$$
\begin{aligned}
\overline{\alpha_\mu} &= \overline{\left(\frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}\right)} \quad (\because \alpha_\mu \text{ の定義}) \\
&= \frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}} \quad \left(\because r, 2\sqrt{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R} \text{ と} \overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1}\right) \\
&= \frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\left(-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right)} \quad \left(\because \text{主張 15.13 (1) を} \overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = -\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \text{ の形で使う}\right) \\
&= \frac{r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)} \\
&= \frac{r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu)} \quad (\because \text{主張 15.22 (3)}) \\
&= -\alpha_\nu \quad (\because \alpha_\nu \text{ の定義と} \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu)\right| = r)
\end{aligned}
$$

（3 段目で使った $\overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = -\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ は、主張 15.13 (1) の両辺の複素共役を取り $\overline{\overline{z}} = z$ を使ったものである。）これを使うと

$$
\begin{aligned}
\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^* &= \left(\alpha_\mu \check{Z}_\mu + \beta \check{Y}_\mu\right)^* \quad (\because \text{定義 15.21}) \\
&= \overline{\alpha_\mu}\,\check{Z}_\mu^* + \overline{\beta}\,\check{Y}_\mu^* \quad (\because \text{主張 8.11 (1) の} (\alpha A + \beta B)^* = \overline{\alpha} A^* + \overline{\beta} B^*) \\
&= \overline{\alpha_\mu}\,\check{Z}_\nu + \beta\,\check{Y}_\nu \quad (\because (2) \text{ と} \beta \in \mathbb{R}) \\
&= -\alpha_\nu \check{Z}_\nu + \beta \check{Y}_\nu \quad (\because \overline{\alpha_\mu} = -\alpha_\nu) \\
&= \check{\psi}_\nu \quad (\because \text{定義 15.21})
\end{aligned}
$$

(4) (3) の両辺の転置共役を取り $(X^*)^* = X$ を使うと $\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^* = \check{\psi}_\mu^\dagger$ である。よって

$$
\begin{aligned}
\check{n}_\mu^* &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^* && (\because \text{ 定義 15.30}) \\
&= \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^* \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^* && (\because \text{ 主張 8.11 (1) の} (XW)^* = W^* X^*) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} && (\because (3) \text{ とその転置共役}) \\
&= \check{n}_\mu && (\because \text{ 定義 15.30})
\end{aligned}
$$

主張 16.9 の $\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$（$R_\mu^{(1)} = \check{n}_\mu$、$R_\mu^{(0)} = I - \check{n}_\mu$）について、各因子はエルミートで（$I^* = I$）、主張 16.7 (2) より互いに可換なので

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon^* &= \left(R_1^{(\epsilon_1)} \cdots R_{M_{\mathrm{col}}}^{(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}})}\right)^* && (\because \text{ 主張 16.9}) \\
&= \left(R_{M_{\mathrm{col}}}^{(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}})}\right)^* \cdots \left(R_1^{(\epsilon_1)}\right)^* && (\because \text{ 主張 8.11 (1) の} (XW)^* = W^* X^* \text{ の反復適用}) \\
&= R_{M_{\mathrm{col}}}^{(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}})} \cdots R_1^{(\epsilon_1)} && (\because \check{n}_\mu^* = \check{n}_\mu, I^* = I \text{ と、主張 8.11 (1) の線型性による} (I - \check{n}_\mu)^* = I^* - \check{n}_\mu^*) \\
&= R_1^{(\epsilon_1)} \cdots R_{M_{\mathrm{col}}}^{(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}})} && (\because \text{ 因子の可換性。主張 16.7 (2) の} \check{n}_\mu \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{n}_\mu \text{ と、分配則による} (I - \check{n}_\mu)\check{n}_\nu = \check{n}_\nu (I - \check{n}_\mu) \text{ など}) \\
&= \check{Q}_\epsilon && (\because \text{ 主張 16.9})
\end{aligned}
$$

主張 16.9 (1) の $\check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon$ と合わせる。$x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ に対し $w := \check{Q}_\epsilon x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ とおき、その第 k 成分を $w_k \in \mathbb{C}$ と書くと

$$
\begin{aligned}
x^* \check{Q}_\epsilon x &= x^* \check{Q}_\epsilon^2 x && (\because \text{主張 16.9 (1) の} \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon^2) \\
&= x^* \left(\check{Q}_\epsilon^* \check{Q}_\epsilon \right) x && (\because \check{Q}_\epsilon^* = \check{Q}_\epsilon) \\
&= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \overline{x_k} \left(\check{Q}_\epsilon^* \check{Q}_\epsilon \right)_{kl} x_l && (\because \text{定義 8.6}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \overline{x_k} \left(\sum_{m=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \overline{\left(\check{Q}_\epsilon \right)_{mk}} \left(\check{Q}_\epsilon \right)_{ml} \right) x_l && (\because \text{定義 1.6 と定義 8.7}) \\
&= \sum_{m=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(\sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \overline{\left(\check{Q}_\epsilon \right)_{mk}} \, \overline{x_k} \right) \left(\sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(\check{Q}_\epsilon \right)_{ml} x_l \right) && (\because \text{分配則と有限和の並べ替え（主張 1.56）}) \\
&= \sum_{m=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(\sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \overline{\left(\check{Q}_\epsilon \right)_{mk} x_k} \right) \left(\sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(\check{Q}_\epsilon \right)_{ml} x_l \right) && (\because \text{主張 5.3 を各項へ}) \\
&= \overline{\sum_{m=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(\sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(\check{Q}_\epsilon \right)_{mk} x_k \right) \left(\sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(\check{Q}_\epsilon \right)_{ml} x_l \right)} && (\because \text{主張 5.2}) \\
&= \sum_{m=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \overline{w_m} \, w_m && (\because \text{定義 1.6 の行列と数ベクトルの積と} w \text{ の定義}) \\
&= \sum_{m=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(|w_m|^2 \right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 5.7 を各項へ}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} |w_m|^2 \right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.20}) \\
&= \left(\left(\sqrt{\sum_{m=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} |w_m|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \right)^2 \right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 1.4}) \\
&= \left(\left\| \check{Q}_\epsilon x \right\|^2 \right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{定義 2.91 と} w = \check{Q}_\epsilon x)
\end{aligned}
$$

$\left\| \check{Q}_\epsilon x \right\|^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である（定義 2.91 のノルムは $\mathbb{R}_{\geq 0}$ の元で、実数の平方は非負）。主張の $x^* \check{Q}_\epsilon x = \left\| \check{Q}_\epsilon x \right\|^2 \geq 0$ の右辺は、この実数を 定義 1.13 で $\mathbb{C}$ に入れた値と、その実数についての不等式である。 □

定理 19.14 ($c_+(M_{\mathrm{col}}) = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 19.4 の

$$
c_+(M_{\mathrm{col}}) = \sup \left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \right\}
$$

と 定義 16.5 の $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ について

$$
c_+(M_{\mathrm{col}}) = \check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} = (2 \sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \right)
$$

が成り立つ。** 上限は達成される **（最大値である）。

証明. 準備 1（記号）。$n := 2^{M_{\mathrm{col}}}$ とおく。定義 1.13 の $r \mapsto r_{\mathbb{C}}$ を成分ごとに当てる写像を

$$
\iota^n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}^n, \qquad \iota^n(x) := \left((x_1)_{\mathbb{C}}, \ldots, (x_n)_{\mathbb{C}} \right)
$$

と定める。$a, b \in \mathbb{R}$ について $a_{\mathbb{C}} = b_{\mathbb{C}}$ なら $(a, 0) = (b, 0)$（定義 1.13）なので $a = b$ である（以下「$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ の単射性」と呼ぶ）。主張 18.3 より W の成分はすべて実数（定義 2.81）なので、各 k, l について $W_{kl} = (w_{kl})_{\mathbb{C}}$ を満たす $w_{kl} \in \mathbb{R}$ がただ一つある（一意性は単射性による）。$W_{\mathbb{R}} := (w_{kl}) \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{R})$ とおく。定義 19.4 の $x^{\top} W x$ を 定義 9.1 の $x^{\top} W_{\mathbb{R}} x \in \mathbb{R}$ と、$x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^n$ を「$x \in \mathbb{R}^n$ かつ $\iota^n(x) \in \mathcal{F}^{(+)}$」と読む。

準備 2（実の二次形式と複素の二次形式の橋）。$x \in \mathbb{R}^n$、$u := \iota^n(x)$ とすると

$$
\begin{aligned}
\left(x^{\top} W_{\mathbb{R}} x\right)_{\mathbb{C}} &= \Big(\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} (x_k\, w_{kl})\, x_l\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 9.1}) \\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} ((x_k\, w_{kl})\, x_l)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.20 を外と内の和へ}) \\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} ((x_k)_{\mathbb{C}}\, (w_{kl})_{\mathbb{C}})\, (x_l)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.29 を二つの積へ}) \\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \left(\overline{(x_k)_{\mathbb{C}}}\, (w_{kl})_{\mathbb{C}}\right) (x_l)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 5.6}) \\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} (\overline{u_k}\, W_{kl})\, u_l && (\because\ u = \iota^n(x),\ W_{kl} = (w_{kl})_{\mathbb{C}}) \\
&= u^* W u && (\because \text{ 定義 8.6})
\end{aligned}
$$

準備 3。$u \in \mathbb{C}^n$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について（Au は 定義 1.6 の積、$(Au)_k$ はその第 k 成分）

$$
\begin{aligned}
u^* A u &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} (\overline{u_k}\, A_{kl})\, u_l && (\because \text{ 定義 8.6}) \\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \overline{u_k}\, (A_{kl}\, u_l) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の結合則（主張 1.56）}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k} \sum_{l=1}^{n} A_{kl}\, u_l && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則（主張 1.56）}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k}\, (Au)_k && (\because \text{ 定義 1.6})
\end{aligned}
$$

準備 4。$u \in \mathbb{C}^n$ について

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} \overline{u_k}\, u_k &= \sum_{k=1}^{n} \left(|u_k|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 5.7}) \\
&= \Big(\sum_{k=1}^{n} |u_k|^2\Big)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.20}) \\
&= \left(\|u\|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 定義 2.91 と 定義 1.4 の } y^2 = x)
\end{aligned}
$$

であり、$u = \iota^n(x)$（$x \in \mathbb{R}^n$）なら

$$
\begin{aligned}
\|u\|^2 &= \sum_{k=1}^{n} |(x_k)_{\mathbb{C}}|^2 && (\because \text{ 定義 2.91 と 定義 1.4 の } y^2 = x) \\
&= \sum_{k=1}^{n} |x_k|^2 && (\because \text{ 主張 1.75 (6)}) \\
&= \|x\|^2 && (\because \text{ 定義 2.91 と 定義 1.4 の } y^2 = x)
\end{aligned}
$$

である。

Step 0（$\mathcal{F}^{(+)}$ の上で W と $V^{(+)}$ が一致すること）。$y \in \mathcal{F}^{(+)}$ とすると

$$\begin{aligned}
P^{(+)}y &= \left(\tfrac{1}{2}\left(I+\varepsilon\right)\right)y && \left(\because \text{ 定義 13.26}\right)\\
&= \tfrac{1}{2}\left(\left(I+\varepsilon\right)y\right) && \left(\because \text{ 主張 2.18}\right)\\
&= \tfrac{1}{2}\left(Iy+\varepsilon y\right) && \left(\because \text{ 主張 2.24}\right)\\
&= \tfrac{1}{2}\left(y+\varepsilon y\right) && \left(\because \text{ 主張 2.16}\right)\\
&= \tfrac{1}{2}\left(y+y\right) && \left(\because\ y \in \mathcal{F}^{(+)} \text{ より } \varepsilon y = y \text{（定義 13.18）}\right)\\
&= y && \left(\because \text{ 定義 2.4 と 定義 2.3 の成分で } \tfrac{1}{2}(y_k+y_k)=y_k\right)
\end{aligned}$$

であり、したがって

$$\begin{aligned}
Wy &= W\left(P^{(+)}y\right) && \left(\because \text{ 直前の } P^{(+)}y = y\right)\\
&= \left(WP^{(+)}\right)y && \left(\because \text{ 主張 2.15}\right)\\
&= \left(V^{(+)}P^{(+)}\right)y && \left(\because \text{ 主張 13.43}\right) \qquad \left(y \in \mathcal{F}^{(+)}\right)\\
&= V^{(+)}\left(P^{(+)}y\right) && \left(\because \text{ 主張 2.15}\right)\\
&= V^{(+)}y && \left(\because \text{ 直前の } P^{(+)}y = y\right)
\end{aligned}$$

Step 1（$c_+(M_{\mathrm{col}}) \leq \check{\Lambda}_{\max}$）。$x \in \mathbb{R}^n$、$\iota^n(x) \in \mathcal{F}^{(+)}$、$\|x\| = 1$ とし、$u := \iota^n(x)$、$w_\epsilon := \check{Q}_\epsilon u$ $(\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}})$ とおく。まず

$$\begin{aligned}
u &= Iu && \left(\because \text{ 主張 2.16}\right)\\
&= \left(\sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon\right)u && \left(\because \text{ 主張 16.9 (2)}\right)\\
&= \sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon u && \left(\because \text{ 主張 2.56}\right)\\
&= \sum_\epsilon w_\epsilon && \left(\because\ w_\epsilon \text{ の置き方}\right)
\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}
V^{(+)}u &= V^{(+)}\left(\sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon u\right) && \left(\because \text{ 直前の鎖の 3 行目}\right)\\
&= \sum_\epsilon V^{(+)}\left(\check{Q}_\epsilon u\right) && \left(\because \text{ 主張 2.57}\right)\\
&= \sum_\epsilon \left(V^{(+)}\check{Q}_\epsilon\right)u && \left(\because \text{ 主張 2.15}\right)\\
&= \sum_\epsilon \left(\left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}}\check{Q}_\epsilon\right)u && \left(\because \text{ 定理 16.18 (1)}\right)\\
&= \sum_\epsilon \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} w_\epsilon && \left(\because \text{ 主張 2.18 と } w_\epsilon \text{ の置き方}\right)
\end{aligned}$$

である（$\sum_\epsilon$ は 定義 2.50 の和）。主張 2.58 より、$u_k = \sum_\epsilon (w_\epsilon)_k$、$(V^{(+)}u)_k = \sum_\epsilon (\check{\Lambda}_\epsilon)_{\mathbb{C}}(w_\epsilon)_k$ である（後者は 定義 2.3 も使う）。これらを使うと

$$
\begin{aligned}
\left(x^\top W_{\mathbb{R}} x\right)_{\mathbb{C}} &= u^* W u && (\because \text{準備 2}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k}\,(Wu)_k && (\because \text{準備 3}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k}\left(V^{(+)}u\right)_k && \left(\because\ u \in \mathcal{F}^{(+)} \text{ と Step 0}\right) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k} \sum_{\epsilon} \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} (w_\epsilon)_k && (\because \text{直前の成分の式}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{\epsilon} \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} \left(\overline{u_k}\,(w_\epsilon)_k\right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則・交換則・結合則（主張 1.56）}) \\
&= \sum_{\epsilon} \sum_{k=1}^{n} \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} \left(\overline{u_k}\,(w_\epsilon)_k\right) && (\because \text{有限個の複素数の和の順序の入れ替え（}\mathbb{C} \text{ の加法の結合則・交換則。主張 1.56）}) \\
&= \sum_{\epsilon} \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k}\,(w_\epsilon)_k && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則（主張 1.56）}) \\
&= \sum_{\epsilon} \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} u^* \check{Q}_\epsilon u && (\because \text{準備 3（}A \to \check{Q}_\epsilon\text{）と } w_\epsilon = \check{Q}_\epsilon u) \\
&= \sum_{\epsilon} \left(\check{\Lambda}_\epsilon\right)_{\mathbb{C}} \left(\|w_\epsilon\|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 19.13 の (4) に続く式}) \\
&= \sum_{\epsilon} \left(\check{\Lambda}_\epsilon \|w_\epsilon\|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 1.29}) \\
&= \left(\sum_{\epsilon} \check{\Lambda}_\epsilon \|w_\epsilon\|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 2.53})
\end{aligned}
$$

であり、同じく

$$
\begin{aligned}
\left(\sum_{\epsilon} \|w_\epsilon\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \sum_{\epsilon} \left(\|w_\epsilon\|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{主張 2.53}) \\
&= \sum_{\epsilon} u^* \check{Q}_\epsilon u && (\because \text{主張 19.13 の (4) に続く式}) \\
&= \sum_{\epsilon} \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k}\,(w_\epsilon)_k && (\because \text{準備 3（}A \to \check{Q}_\epsilon\text{）と } w_\epsilon = \check{Q}_\epsilon u) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{\epsilon} \overline{u_k}\,(w_\epsilon)_k && (\because \text{有限個の複素数の和の順序の入れ替え（}\mathbb{C} \text{ の加法の結合則・交換則。主張 1.56）}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k} \sum_{\epsilon} (w_\epsilon)_k && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則（主張 1.56）}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k}\, u_k && (\because\ u_k = \textstyle\sum_\epsilon (w_\epsilon)_k) \\
&= \left(\|u\|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{準備 4}) \\
&= \left(\|x\|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{準備 4 の } \|\iota^n(x)\|^2 = \|x\|^2)
\end{aligned}
$$

である。$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ の単射性より、二つの鎖の両端は $\mathbb{R}$ の等式 $x^\top W_{\mathbb{R}} x = \sum_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon \|w_\epsilon\|^2$、$\sum_\epsilon \|w_\epsilon\|^2 = \|x\|^2$ を与える。定理 16.18 (2) より $\check{\Lambda}_\epsilon \le \check{\Lambda}_{\max}$ であり、$\|w_\epsilon\|^2 \ge 0$ なので、各 ϵ について $\check{\Lambda}_\epsilon \|w_\epsilon\|^2 \le \check{\Lambda}_{\max} \|w_\epsilon\|^2$ である。よって

$$
\begin{aligned}
x^\top W_{\mathbb{R}} x &= \sum_{\epsilon} \check{\Lambda}_\epsilon \|w_\epsilon\|^2 && \left(\because \text{直前の } \mathbb{R} \text{ の等式}\right) \\
&\le \sum_{\epsilon} \check{\Lambda}_{\max} \|w_\epsilon\|^2 && \left(\because \text{各項の不等式を 定義 2.52 の和で足し合わせる}\right) \\
&= \check{\Lambda}_{\max} \sum_{\epsilon} \|w_\epsilon\|^2 && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の分配則を 定義 2.52 の各段の和へ}\right) \\
&= \check{\Lambda}_{\max} \|x\|^2 && \left(\because \text{直前の } \mathbb{R} \text{ の等式}\right) \\
&= \check{\Lambda}_{\max} && (\because\ \|x\| = 1)
\end{aligned}
$$

である。x は任意だったので $\check{\Lambda}_{\max}$ は 定義 19.4 の $\mathcal{R}_+$ の上界であり、上限は最小の上界なので $c_+(M_{\mathrm{col}}) \le \check{\Lambda}_{\max}$ である。

Step 2（実の最大固有ベクトルの存在）。主張 16.9 (4) より $\operatorname{im} \check{Q}_{(1,\dots,1)}$ は 1 次元なので、生成元 $q \neq 0$ を取ると $\operatorname{im} \check{Q}_{(1,\dots,1)} = \mathbb{C}q$ である。定理 16.19 (3) より $V^{(+)}q = \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} q$、定理 17.17 (4) より $q \in \mathcal{F}^{(+)}$ なので、Step 0 より $Wq = V^{(+)}q = \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} q$、定義 13.18 より $\varepsilon q = q$ である。$\overline{q} := (\overline{q_1}, \dots, \overline{q_n}) \in \mathbb{C}^n$ とおく。W の成分は $W_{kl} = (w_{kl})_{\mathbb{C}}$（準備 1）なので、各 k について

$$
\begin{aligned}
(W\overline{q})_k &= \sum_{l=1}^{n} W_{kl}\,\overline{q_l} && (\because \text{ 定義 1.6}) \\
&= \sum_{l=1}^{n} \overline{W_{kl}}\,\overline{q_l} && (\because \ W_{kl} = (w_{kl})_{\mathbb{C}} \text{ と 主張 5.6}) \\
&= \sum_{l=1}^{n} \overline{W_{kl}\,q_l} && (\because \text{ 主張 5.3}) \\
&= \overline{\sum_{l=1}^{n} W_{kl}\,q_l} && (\because \text{ 主張 5.2 を左から順の各和へ}) \\
&= \overline{(Wq)_k} && (\because \text{ 定義 1.6}) \\
&= \overline{\left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}}\,q_k} && (\because \ Wq = \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} q \text{ と 定義 2.3}) \\
&= \overline{\left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}}}\,\overline{q_k} && (\because \text{ 主張 5.3}) \\
&= \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}}\,\overline{q_k} && (\because \text{ 主張 5.6})
\end{aligned}
$$

であり、主張 19.7 より ε の成分も実数（定義 2.81 の意味で、各 k, l に $\varepsilon_{kl} = (e_{kl})_{\mathbb{C}}$ なる $e_{kl} \in \mathbb{R}$ がある）なので、同じ鎖（$W \to \varepsilon$、$w_{kl} \to e_{kl}$、$\left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} \to 1_{\mathbb{C}}$。$\varepsilon q = q = 1_{\mathbb{C}} q$ は 主張 2.42、$1_{\mathbb{C}}$ が共役で動かないことは 主張 5.6）で $(\varepsilon\overline{q})_k = \overline{q_k}$ である。よって $W\overline{q} = \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} \overline{q}$、$\overline{q} \in \mathcal{F}^{(+)}$ であり、Step 0 より $V^{(+)}\overline{q} = W\overline{q} = \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} \overline{q}$。定理 16.19 (3) より $\overline{q} \in \operatorname{im} \check{Q}_{(1,\dots,1)} = \mathbb{C}q$ なので、ある $z \in \mathbb{C}$ で $\overline{q} = zq$ である。

$i := (0,1) \in \mathbb{C}$ とし、$p := q + \overline{q}$、$p' := i\,(q - \overline{q})$ とおく（和・差・スカラー倍は 定義 2.4・定義 1.92・定義 2.3）。定義 5.1 より $\overline{\overline{c}} = c$（$c \in \mathbb{C}$）、$\overline{i} = (0,-1) = -i$ である。各 k について

$$
\begin{aligned}
\overline{p_k} &= \overline{q_k + \overline{q_k}} && (\because \ p \text{ の置き方}) \\
&= \overline{q_k} + \overline{\overline{q_k}} && (\because \text{ 主張 5.2}) \\
&= \overline{q_k} + q_k && (\because \ \overline{\overline{c}} = c) \\
&= p_k && (\because \ \mathbb{C} \text{ の加法の交換則（主張 1.56）})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\overline{p'_k} &= \overline{i\,(q_k - \overline{q_k})} && (\because \ p' \text{ の置き方}) \\
&= \overline{i}\,\overline{q_k - \overline{q_k}} && (\because \text{ 主張 5.3}) \\
&= (-i)\,\overline{q_k - \overline{q_k}} && (\because \ \overline{i} = -i) \\
&= (-i)\,(\overline{q_k} - \overline{\overline{q_k}}) && (\because \text{ 主張 5.4}) \\
&= (-i)\,(\overline{q_k} - q_k) && (\because \ \overline{\overline{c}} = c) \\
&= i\,(q_k - \overline{q_k}) && (\because \ \mathbb{C} \text{ の分配則と符号（主張 1.56）}) \\
&= p'_k && (\because \ p' \text{ の置き方})
\end{aligned}
$$

である。また $\overline{q} = zq$ より

$$
\begin{aligned}
p &= q + zq && (\because \ \overline{q} = zq) \\
&= (1_{\mathbb{C}} + z)q && (\because \text{ 主張 2.42 と 定義 2.4 ・ 定義 2.3 の成分での分配則}) \\
p' &= i\,(q - zq) && (\because \ \overline{q} = zq) \\
&= i\,((1_{\mathbb{C}} - z)q) && (\because \text{ 主張 2.42 と 定義 1.92 ・ 定義 2.3 の成分での分配則}) \\
&= (i(1_{\mathbb{C}} - z))\,q && (\because \text{ 主張 2.41})
\end{aligned}
$$

である。$1_{\mathbb{C}} + z = 0$ と $i(1_{\mathbb{C}} - z) = 0$ が同時に成り立つと、$i \neq 0$ なので i^{-1} を掛けて $z = -1_{\mathbb{C}}$ かつ $z = 1_{\mathbb{C}}$ となり矛盾する。よって $1_{\mathbb{C}} + z$ と $i(1_{\mathbb{C}} - z)$ のうち 0 でない方を c とし、対応する p

または p' を v とする ($v = cq$)。$q_{k_0} \neq 0$ なる k_0 を取ると、$v_{k_0} = 0$ なら $q_{k_0} = c^{-1}(c\,q_{k_0}) = 0$ (主張 1.56 の逆元) となるので $v_{k_0} \neq 0$、すなわち $v \neq 0$ である。上の二つの鎖より各 k で $\overline{v_k} = v_k$ である。$v_k = (a_k, b_k)$ (定義 1.12) とすると 定義 5.1 より $(a_k, -b_k) = (a_k, b_k)$、よって $b_k = 0$、$v_k = (a_k, 0) = (a_k)_{\mathbb{C}}$ (定義 1.13) である。$r := (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ とおくと $\iota^n(r) = v \neq 0$ なので $r \neq 0$、すなわち $a_{k_1} \neq 0$ なる k_1 がある。定義 2.91 と 定義 1.4 の $y^2 = x$ より $\|r\|^2 = \sum_k |a_k|^2$、主張 1.25 より $\|r\|^2 \geq |a_{k_1}|^2 > 0$、よって $\|r\| > 0$ である。$x_0 := (a_1/\|r\|, \ldots, a_n/\|r\|) \in \mathbb{R}^n$ とおくと、定義 2.91 と 定義 1.4 の $y^2 = x$ より $\|x_0\|^2 = \sum_k |a_k|^2/\|r\|^2 = \|r\|^2/\|r\|^2 = 1$ であり、主張 1.29 より $\iota^n(x_0) = (1/\|r\|)_{\mathbb{C}}\, v = ((1/\|r\|)_{\mathbb{C}}\, c)\, q \in \mathbb{C}q$ (主張 2.41) である。

Step 3 ($c_+(M_{\mathrm{col}}) \geq \check{\Lambda}_{\max}$)。$u_0 := \iota^n(x_0)$ とおく。$u_0 \in \mathbb{C}q = \operatorname{im} \check{Q}_{(1,\ldots,1)}$ なので 定理 17.17 (4) より $u_0 \in \mathcal{F}^{(+)}$、定理 16.19 (3) より $V^{(+)}u_0 = \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} u_0$ である。よって

$$
\begin{aligned}
\left(x_0^{\top} W_{\mathbb{R}} x_0\right)_{\mathbb{C}} &= u_0^* W u_0 && (\because \text{ 準備 2}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{(u_0)_k}\, (W u_0)_k && (\because \text{ 準備 3}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{(u_0)_k}\, \left(V^{(+)} u_0\right)_k && \left(\because\ u_0 \in \mathcal{F}^{(+)} \text{ と Step 0}\right) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{(u_0)_k}\, \left(\left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} (u_0)_k\right) && \left(\because\ V^{(+)}u_0 = \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} u_0 \text{ と 定義 2.3}\right) \\
&= \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} \sum_{k=1}^{n} \overline{(u_0)_k}\, (u_0)_k && (\because\ \mathbb{C} \text{ の交換則・結合則・分配則 (主張 1.56)}) \\
&= \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} \left(\|x_0\|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 準備 4 } (u_0 = \iota^n(x_0))\ ) \\
&= \left(\check{\Lambda}_{\max} \|x_0\|^2\right)_{\mathbb{C}} && (\because \text{ 主張 1.29}) \\
&= \left(\check{\Lambda}_{\max}\right)_{\mathbb{C}} && (\because\ \|x_0\| = 1)
\end{aligned}
$$

であり、$(\cdot)_{\mathbb{C}}$ の単射性より $x_0^{\top} W_{\mathbb{R}} x_0 = \check{\Lambda}_{\max}$ である。$x_0 \in \mathbb{R}^n$、$\iota^n(x_0) \in \mathcal{F}^{(+)}$、$\|x_0\| = 1$ なので $\check{\Lambda}_{\max} \in \mathcal{R}_+$ であり、上限は上界なので $\check{\Lambda}_{\max} \leq c_+(M_{\mathrm{col}})$ である。

結び。定義 16.4 の $\delta = \frac{1}{2}$ と 主張 14.8 の $\tilde{\theta}_\mu$ はどちらも $2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)/(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}$ なので $\theta^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}},\mu} = \tilde{\theta}_\mu$ である。よって

$$
\begin{aligned}
c_+(M_{\mathrm{col}}) &= \check{\Lambda}_{\max} && (\because \text{ Step 1 と Step 3 (} \mathbb{R} \text{ の順序の反対称律)}\ ) \\
&= \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{ 定理 16.19 (1)}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left(\theta^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}},\mu}\right)\right) && (\because \text{ 定義 16.5 の } \delta = \tfrac{1}{2}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right) && \left(\because\ \theta^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}},\mu} = \tilde{\theta}_\mu\right)
\end{aligned}
$$

であり、上限は x_0 で達成される。 □

主張 19.15 ($\mathcal{F}^{(+)}$ の複素部分線型空間性)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 13.18 の $\mathcal{F}^{(+)} \subseteq \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ を考える。この集合は零ベクトルを含み、複素数ベクトルの和と複素スカラー倍について閉じる。すなわち、

$$0 \in \mathcal{F}^{(+)}$$

であり、任意の $f, g \in \mathcal{F}^{(+)}$ と $a \in \mathbb{C}$ に対して、

$$f+g\in\mathcal{F}^{(+)},\qquad af\in\mathcal{F}^{(+)}$$

が成り立つ。したがって $\mathcal{F}^{(+)}$ は $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の複素部分線型空間である。

証明. 定義 1.6 の行列と数ベクトルの積、および 主張 1.56 の複素数の演算法則を用いる。複素数ベクトルの演算は成分ごとに定め、任意の $u,v\in\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$、$a\in\mathbb{C}$、$r\in\{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ に対して $[u+v]_r:=u_r+v_r$ および $[au]_r:=au_r$ とする。まず零ベクトルを考える。任意の $r\in\{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について、

$$\begin{aligned}
[\varepsilon 0]_r &= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs}0 && (\because \text{定義 1.6})\\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} 0 && (\because \text{主張 1.56 の零倍})\\
&= 0 && (\because \text{有限個の零の和}).
\end{aligned}$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon 0=0$ である。よって 定義 13.18 から $0\in\mathcal{F}^{(+)}$ である。

次に $f,g\in\mathcal{F}^{(+)}$ とする。定義 13.18 より $\varepsilon f=f$ かつ $\varepsilon g=g$ である。任意の $r\in\{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について、

$$\begin{aligned}
[\varepsilon(f+g)]_r &= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs}(f_s+g_s) && (\because \text{定義 1.6})\\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (\varepsilon_{rs}f_s+\varepsilon_{rs}g_s) && (\because \text{主張 1.56 の分配律})\\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs}f_s + \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs}g_s && (\because \text{有限和を項ごとに分ける})\\
&= [\varepsilon f]_r+[\varepsilon g]_r && (\because \text{定義 1.6})\\
&= f_r+g_r && (\because \varepsilon f=f \text{ かつ } \varepsilon g=g)\\
&= [f+g]_r && (\because \text{複素数ベクトルの和の定義}).
\end{aligned}$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon(f+g)=f+g$ である。よって 定義 13.18 から $f+g\in\mathcal{F}^{(+)}$ である。

最後に $a\in\mathbb{C}$ と $f\in\mathcal{F}^{(+)}$ を取る。定義 13.18 より $\varepsilon f=f$ である。任意の $r\in\{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について、

$$
\begin{aligned}
[\varepsilon(af)]_r &= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs}(af_s) && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (\varepsilon_{rs}a)f_s && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (a\varepsilon_{rs})f_s && (\because \text{主張 1.56 の積の可換律}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} a(\varepsilon_{rs}f_s) && (\because \text{主張 1.56 の積の結合律}) \\
&= a\sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs}f_s && (\because \text{主張 1.56 の分配律を有限回適用}) \\
&= a[\varepsilon f]_r && (\because \text{定義 1.6}) \\
&= af_r && (\because \varepsilon f = f) \\
&= [af]_r && (\because \text{複素数ベクトルのスカラー倍の定義}) .
\end{aligned}
$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon(af) = af$ である。よって 定義 13.18 から $af \in \mathcal{F}^{(+)}$ である。零ベクトル・和・複素スカラー倍についての三つの結果から、主張を得る。 □

主張 19.16 ($\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} \le c(M_{\mathrm{col}}) \le 2\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\ge 2}$ とする。定義 18.4 の $c(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}_{>0}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、上限の存在を $\mathbb{R}$ の完備性から得るため。完備性による脱出）と、定義 16.5 の $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}_{>0}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、実数の指数関数と arccosh の値から作るため。指数評価による脱出）について

$$
\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} \ \le\ c(M_{\mathrm{col}}) \ \le\ 2\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}
$$

が成り立つ。

証明. Step 1（下からの評価 $c(M_{\mathrm{col}}) \ge \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$）。主張 19.5 と 定理 19.14 より

$$
\begin{aligned}
c(M_{\mathrm{col}}) &\ge c_+(M_{\mathrm{col}}) && (\because \text{主張 19.5}) \\
&= \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{定理 19.14})
\end{aligned}
$$

Step 2（上からの評価 $c(M_{\mathrm{col}}) \le 2\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$）。$x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$、$\|x\| = 1$ を任意に取る。成分ごとの絶対値を取ったベクトルを u（$u_k := |x_k|$）とし、$v := u + \varepsilon u$ とおく。

主張 19.3 より W の成分はすべて正なので、

$$
u^\top W u = \sum_{k,l} |x_k|\,|x_l|\,W_{kl} \ \ge\ \left|\sum_{k,l} x_k x_l W_{kl}\right| \ \ge\ x^\top W x \quad (\because \text{三角不等式と} W_{kl} > 0)
$$

である。また ε は各基底ベクトルを別の基底ベクトルへ写す置換行列（定理 17.16 の証明 Step 3 の (b)）なので、$u \ge 0$ なら $\varepsilon u \ge 0$ であり、

$$
\begin{aligned}
\|\varepsilon u\| &= \|u\| && (\because \varepsilon \text{ は置換行列であり、成分の並べ替えは二乗和を変えない}) \\
&= \|x\| && (\because u_k = |x_k| \text{ であり、ノルムは成分の絶対値だけで決まる}) \\
&= 1 && (\because \|x\| = 1 \text{ (Step 2 の} x \text{ の取り方)})
\end{aligned}
$$

である。さらに $\varepsilon^\top = \varepsilon$（主張 19.7）、$\varepsilon^2 = I$（主張 13.19）である。

- $$\begin{aligned}\varepsilon v &= \varepsilon\,(u+\varepsilon u) && (\because\ v = u+\varepsilon u)\\ &= \varepsilon u + \varepsilon^2 u && (\because\ \text{行列の分配則})\\ &= \varepsilon u + u && (\because\ \text{主張 13.19 の}\varepsilon^2 = I)\\ &= v && (\because\ v = u+\varepsilon u)\end{aligned}$$

  より $v \in \mathcal{F}^{(+)}$（定義 13.18）。また v は実である。

- $v \geq u \geq 0$ かつ $u \neq 0$ より $v \neq 0$。

- $$\begin{aligned}\|v\|^2 &= \|u\|^2 + 2u^\top \varepsilon u + \|\varepsilon u\|^2 && \left(\because\ v = u+\varepsilon u \text{ の展開と}\varepsilon^\top = \varepsilon.\ \text{主張 19.7}\right)\\ &= 2 + 2u^\top \varepsilon u && (\because\ \|u\| = \|\varepsilon u\| = 1)\\ &\leq 4 && \left(\because\ \text{Cauchy–Schwarz より} u^\top \varepsilon u \leq \|u\|\|\varepsilon u\| = 1\right)\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}v^\top W v &= u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u + (\varepsilon u)^\top W (\varepsilon u) && \left(\because\ v = u+\varepsilon u \text{ の展開と} W^\top = W\right)\\ &= u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u + u^\top \varepsilon W \varepsilon u && \left(\because\ \text{主張 19.7 の}\varepsilon^\top = \varepsilon\right)\\ &= u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u + u^\top W \varepsilon^2 u && (\because\ \varepsilon W = W\varepsilon.\ \text{主張 19.6})\\ &= 2u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u && (\because\ \text{主張 13.19 の}\varepsilon^2 = I)\\ &\geq 2u^\top W u && \left(\because\ u, \varepsilon u \geq 0 \text{ と} W_{kl} > 0 \text{ より} u^\top W \varepsilon u \geq 0\right)\end{aligned}$$

$\hat{v} := v/\|v\|$ は $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトル（$1/\|v\| \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ なので、主張 19.15 の複素スカラー倍で閉じることから $\hat{v} \in \mathcal{F}^{(+)}$）なので 定理 19.14 より

$$\begin{aligned}\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} &= c_+(M_{\mathrm{col}}) && (\because\ \text{定理 19.14})\\ &\geq \hat{v}^\top W \hat{v} && \left(\because\ c_+(M_{\mathrm{col}}) \text{ は}\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \text{ の単位ベクトル上の上限.\ 定義 19.4}\right)\\ &= \frac{v^\top W v}{\|v\|^2} && (\because\ \hat{v} = v/\|v\| \text{ の代入と二次形式の斉次性})\\ &\geq \frac{2\,u^\top W u}{\|v\|^2} && \left(\because\ v^\top W v \geq 2u^\top W u\text{(上の式変形）と}\|v\|^2 > 0\right)\\ &\geq \frac{2\,u^\top W u}{4} && \left(\because\ \|v\|^2 \leq 4\text{(上の式変形）と}u^\top W u \geq 0(u \geq 0,\ W_{kl} > 0)\ \right)\\ &= \frac{u^\top W u}{2} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の約分})\\ &\geq \frac{x^\top W x}{2} && \left(\because\ u^\top W u \geq x^\top W x\text{(上の三角不等式）}\ \right)\end{aligned}$$

x は任意だったので、上限を取って $c(M_{\mathrm{col}}) \leq 2\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$。 □

定理 19.17 (2 次元 Ising 模型の厳密解（Onsager の自由エネルギー）)**.** 主張 12.7 と同じ設定（結合定数 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$）のもとで、

$$\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}}\,N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1, K_2) = \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\,d\theta$$

が成り立つ。ここで

$$\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta)$$

であり（定義 15.11）、これが Onsager の自由エネルギーの表式である。

とくに 注意 19.11 が「残っている入力」として挙げていた $c_+(M_{\mathrm{col}}) = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ は 定理 19.14 で証明された。

証明. まず任意の $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ について、主張 18.10 により

$$\lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1, K_2) = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}}) \quad (\because \text{ 主張 18.10}).$$

次に 主張 19.16 の両側評価を読む。

$$\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \leq c(M_{\mathrm{col}}) \leq 2\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \qquad (\because \text{ 主張 19.16})$$

三つの量は正の実数である。実対数の単調性と正の整数 M_{col} で割る操作から

$$\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \leq \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}}) \leq \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} + \frac{\log 2}{M_{\mathrm{col}}} \qquad (\because \text{ 実対数の単調性と積公式、} M_{\mathrm{col}} > 0)$$

ここで $(\log 2)/M_{\mathrm{col}} \to 0$ である。定理 19.10 を $\delta = \frac{1}{2}$ として使い、挟み撃ちすると

$$\begin{aligned}
\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1, K_2) &= \lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}}) && (\because \text{ 主張 18.10}) \\
&= \lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} && (\because \text{ 直前の両側評価と} (\log 2)/M_{\mathrm{col}} \to 0) \\
&= \frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta && (\because \text{ 定理 19.10 に} \delta = \tfrac{1}{2} \text{ を代入}).
\end{aligned}$$

** 実数解析（Riemann 積分）を使ったのは 定理 10.1 を経由する最後の等号だけである **（注意 19.8）。それ以外の段はすべて有限サイズの複素行列の積・和・トレースと、有限個の実数の不等式で書かれている。 □

主張 19.18 ($c_+(M_{\mathrm{col}}) = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$、$\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \leq c(M_{\mathrm{col}}) \leq 2\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ と $\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z$ の閉形式)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（定義 12.2 の定義域が $\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$ であるため）とする。$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ について、定義 13.42 の W、定義 13.18 の $\mathcal{F}^{(+)}$、定義 18.4 の $c(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 19.4 の $c_+(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}$（どちらも $\mathbb{R}$ に住むのは、上限の存在を $\mathbb{R}$ の完備性から得るため。完備性による脱出）、定義 16.5 の $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \in \mathbb{R}_{>0}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、実数の指数関数と arccosh の値から作るため。指数評価による脱出）、定義 12.2 の $Z(K_1, K_2) \in \mathbb{R}_{>0}$（行数 N_{row} と列数 M_{col} に依る）、定義 15.11 の $\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta) \in \mathbb{R}$（$\theta \in \mathbb{R}$）は次を満たす。

- (1) $c_+(M_{\mathrm{col}}) = \sup \left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \right\} = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$
- (2) $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \leq c(M_{\mathrm{col}}) \leq 2\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$
- (3) $\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1, K_2) = \frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta$（log は正の実数上の実対数で、両辺の値は $\mathbb{R}$ に住む。実対数・極限・Riemann 積分による脱出。積分を使うのは 注意 19.8 の箇所だけである）

証明. (1) 定理 19.14 そのものである。

(2) 主張 19.16 そのものである。

(3) 定理 19.17 そのものである（その証明は (2) の挟み込みを 定理 19.10 と合わせて使う）。 □

部 V
臨界点

20　臨界点K_c と$\frac{d^2 f}{dK^2}$ の対数発散

注意 20.1 (この章で新たに持ち込む実数解析の事実（(R5)・(R6)・数値の評価）)**.** 注意 19.8 は、自由エネルギーの表式 定理 19.17 を得るまでに実数解析へ移行する箇所が 定理 10.1 1 つだけであり、外部から持ち込む事実が (R1) Heine–Cantor と (R2) 連続関数の Riemann 可積分性の 2 つだけであることを述べた。

** この章は、その表式を出発点として積分の微分を扱うので、外部事実を追加で持ち込む。** 積分の線型性と単調性 (R3) と微分積分学の基本定理 (R4) は、注意 11.1 で持ち込んだものをそのまま使う。この章で新たに追加するのは次の 2 つと、この注記の末尾に挙げる数値の評価だけであり、他では使わない。

- (R5) ** 積分記号下の微分(Leibniz の規則)**：$g(t,x)$ と $\dfrac{\partial g}{\partial x}(t,x)$ が $[a,b]\times[x_1,x_2]$ 上で(2 変数の関数として) 連続なら、$x \mapsto \int_a^b g(t,x)\,dt$ は $[x_1,x_2]$ 上微分可能で $\dfrac{d}{dx}\int_a^b g(t,x)\,dt = \int_a^b \dfrac{\partial g}{\partial x}(t,x)\,dt$。
- (R6) ** 置換積分 **：$u:[a,b]\to\mathbb{R}$ が微分可能で u' が連続、g が $u([a,b])$ を含む区間上で連続なら $\int_a^b g(u(t))u'(t)\,dt = \int_{u(a)}^{u(b)} g(s)\,ds$。

どの段でどれを使うかは次のとおりである。

- (R3) は 主張 20.12（増分の評価）と 定理 20.14 の各不等式（被積分関数の各点評価を積分へ持ち上げる段）で使う。
- (R4) は 主張 20.12（増分の評価）と 定理 20.14（定数関数の積分と、$F(s) = -s^2\log s$ の増分の評価）で使う。
- (R5) は 定理 20.14 で $\dfrac{d^2}{d\kappa^2}\int_0^{2\pi}\gamma\,d\theta = \int_0^{2\pi}\dfrac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta$ とする段でだけ使う（2 回適用する)。
- (R6) は 定理 20.14 の証明で $\int_0^{2\pi} = 2\int_0^{\pi}$（$\theta\mapsto 2\pi-\theta$ による折り返し）とする段でだけ使う。
- 注意 11.1 の微分の公式は、主張 20.12 でも、$\tanh\cdot K^*\cdot\kappa\cdot\kappa'\cdot\cosh t/\sinh^2 t$ の導関数を求める段と、κ' などの連続性を言う段で使う。定理 20.14 でも、$G'\cdot G''$ の偶奇を合成関数の微分で言う段と、$F(s) = -s^2\log s$ の導関数とその連続性を言う段で使う。

** これ以外の解析的道具（広義積分、一様収束、優収束、実解析性、平均値の定理）は使わない。** とくに本章に現れる積分はすべて有界閉区間上の連続関数の積分であり、広義積分は現れない（被積分関数が発散するのは $\kappa = 0$ のときだけで、本章の評価はすべて $\kappa \neq 0$ のもとで行う)。

また 主張 20.12 は、初等関数の値の次の数値の評価を、本文では証明せずに持ち込む: $1.02006 \le \cosh\frac{1}{5} \le 1.020067$、$0.201336 \le \sinh\frac{1}{5} \le 0.2013361$。示した桁までの不等式としてだけ使う（数値検証は sagemath/check/kappa_of_K_basic/ に置いた)。

定理 20.14 も、次の数値の評価を本文では証明せずに持ち込む: $\sinh\frac{1}{4} \le 0.2527$、$\cosh\frac{1}{4} \le 1.0315$、$\log\cosh\frac{1}{4} \le 0.0310$、$\cosh\frac{1}{2} \le 1.1277$、$0.6931 \le \log 2 \le 0.6932$、$\log(2\pi) \le 1.8380$。示した桁までの不等式としてだけ使う(数値検証は sagemath/check/second_derivative_log_divergence/ に置いた)。

主張 20.2 ($c_1 = s_1c_2$ は臨界条件$s_1s_2 = 1$ と同値)**.** 定義 13.15 の記号 $c_1 = \cosh 2K_1$、$s_1 = \sinh 2K_1$、$c_2 = \cosh 2K_2$、$s_2 = \sinh 2K_2$ について、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。このとき

$$c_1 = s_1c_2 \iff s_1s_2 = 1$$

すなわち $\cosh 2K_1 = \sinh 2K_1 \cosh 2K_2$ であることと、Ising 模型の臨界条件 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ であることは同値である。

証明. Step 0: 所属集合と正値性。$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $2K_1, 2K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、主張 3.21 (3) を $x = 2K_1$、$x = 2K_2$ に適用して

$$\begin{aligned}
c_1 &= \cosh 2K_1 && (\because \text{ 記号の定義}) \\
&> \sinh 2K_1 && (\because\ 2K_1 > 0 \text{ における } \cosh x > \sinh x,\ \text{主張 3.21}) \\
&= s_1 && (\because \text{ 記号の定義}) \\
&> 0 && (\because\ 2K_1 > 0 \text{ における } \sinh x > 0,\ \text{主張 3.21}) \\
c_2 &= \cosh 2K_2 && (\because \text{ 記号の定義}) \\
&> \sinh 2K_2 && (\because\ 2K_2 > 0 \text{ における } \cosh x > \sinh x,\ \text{主張 3.21}) \\
&= s_2 && (\because \text{ 記号の定義}) \\
&> 0 && (\because\ 2K_2 > 0 \text{ における } \sinh x > 0,\ \text{主張 3.21})
\end{aligned}$$

特に $c_1, s_1, c_2, s_2 \in \mathbb{R}_{>0}$。また同 (2) より

$$\begin{aligned}
c_1^2 &= 1 + s_1^2 && (\because\ \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \text{ を } x = 2K_1 \text{ へ適用},\ \text{主張 3.21}) \\
c_2^2 &= 1 + s_2^2 && (\because\ \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \text{ を } x = 2K_2 \text{ へ適用},\ \text{主張 3.21})
\end{aligned}$$

Step 1: ($\Rightarrow$) の証明。$c_1 = s_1c_2$ と仮定する。両辺は正の実数（$s_1c_2 > 0$）である。まず両辺を 2 乗して Step 0 の 2 式を代入すると

$$\begin{aligned}
c_1^2 &= (s_1c_2)^2 && (\because\ c_1 = s_1c_2 \text{（仮定）}) \\
&= s_1^2c_2^2 && (\because \text{ 積の 2 乗は 2 乗の積}) \\
&= s_1^2(1 + s_2^2) && (\because \text{ Step 0 の} c_2^2 = 1 + s_2^2) \\
&= s_1^2 + s_1^2s_2^2 && (\because \text{ 分配則})
\end{aligned}$$

が成り立つ。この両辺から s_1^2 を引くと

$$\begin{aligned}
(s_1s_2)^2 &= s_1^2s_2^2 && (\because \text{ 積の 2 乗は 2 乗の積}) \\
&= c_1^2 - s_1^2 && (\because \text{ 上の等式の両辺から} s_1^2 \text{ を引く}) \\
&= (1 + s_1^2) - s_1^2 && (\because \text{ Step 0 の} c_1^2 = 1 + s_1^2) \\
&= 1 && (\because \text{ 加法逆元の相殺})
\end{aligned}$$

$s_1s_2 > 0 \ \wedge\ 1 > 0 \ \wedge\ (s_1s_2)^2 = 1^2 \Longrightarrow s_1s_2 = 1$ (∵ 正の実数の二乗の一意性、主張 3.21 (4))

Step 2: ($\Leftarrow$) の証明。$s_1s_2 = 1$ と仮定する。Step 0 の 2 式より

$$\begin{aligned}
(s_1c_2)^2 &= s_1^2c_2^2 && (\because \text{ 積の 2 乗は 2 乗の積}) \\
&= s_1^2(1 + s_2^2) && (\because \text{ Step 0 の} c_2^2 = 1 + s_2^2) \\
&= s_1^2 + s_1^2s_2^2 && (\because \text{ 分配則}) \\
&= s_1^2 + (s_1s_2)^2 && (\because \text{ 積の 2 乗は 2 乗の積}) \\
&= s_1^2 + 1 && (\because\ s_1s_2 = 1 \text{（仮定）と} 1^2 = 1) \\
&= c_1^2 && (\because \text{ Step 0 の} c_1^2 = 1 + s_1^2)
\end{aligned}$$

$s_1c_2 > 0 \ \wedge \ c_1 > 0 \ \wedge \ (s_1c_2)^2 = c_1^2 \Longrightarrow s_1c_2 = c_1$ $(\because$ 正の実数の二乗の一意性、主張 3.21 (4))

以上で $c_1 = s_1c_2 \iff s_1s_2 = 1$ が示された。 □

定義 20.3 ($\kappa := 2K_1 - 2K_2^*$)**.** 定義 13.15 の記号のもとで、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して

$$\kappa := 2K_1 - 2K_2^* \in \mathbb{R}$$

と定める。

定義 20.4 ($A := \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^*$)**.** 定義 13.15 の記号のもとで、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して

$$A := s_1 s_2^*$$

と定める。記号の定義を代入すれば一続きである。

$$\begin{aligned} A &= s_1 s_2^* && (\because\ A \text{ の定義}) \\ &= \sinh 2K_1 \ \sinh 2K_2^* && (\because\ \text{def_transfer_matrix_symbols の} s_1 = \sinh 2K_1,\ s_2^* = \sinh 2K_2^*) \end{aligned}$$

さらに $A \in \mathbb{R}_{>0}$ である。定義 13.15 の $K_1, K_2^* > 0$ と 主張 3.21 (3) から $s_1 > 0$ かつ $s_2^* > 0$ であり、正の実数の積は正だからである。

主張 20.5 ($\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) = \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$)**.** 定義 20.3 の κ、定義 20.4 の A、定義 15.9 の γ_1 と 定義 15.11 の γ について、** すべての実数 ** θ で次の 3 つが成り立つ。

$$\gamma_1(\theta) = \cosh\gamma(\theta) = \cosh\kappa + 2A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) = \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\gamma(\theta) = 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)$$

とくに $\gamma(\theta)$ は κ と A だけで決まり、κ については偶関数である（κ を $-\kappa$ に置き換えても値が変わらない)。

証明. 記号の帰属。$K_1, K_2, K_2^*, \kappa, A, \theta \in \mathbb{R}$、$c_1, s_1, c_2^*, s_2^* \in \mathbb{R}$（定義 12.26)、$\gamma_1(\theta), \gamma(\theta) \in \mathbb{R}$ である。$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh・cos・sin・arccosh・arcsinh の値が部分和の極限・平方根・実対数として定まる実数だからである。以下 $\sinh^2(a) := (\sinh a)^2$（主張 11.6)、$\sin^2(a) := (\sin a)^2$ と書く。

Step 1（γ_1 の書き換えと 1 番目の式)。

$$\begin{aligned} \gamma_1(\theta) &= c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta && (\because \text{定義 15.9}) \\ &= (c_1c_2^* - s_1s_2^*) + s_1s_2^*(1 - \cos\theta) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\ &= (\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^*) + s_1s_2^*(1 - \cos\theta) && (\because \text{定義 12.26}) \\ &= \cosh(2K_1 - 2K_2^*) + s_1s_2^*(1 - \cos\theta) && (\because \text{主張 11.4 の複号 } - \text{ を} x = 2K_1,\ y = 2K_2^* \text{ に適用}) \\ &= \cosh\kappa + s_1s_2^*(1 - \cos\theta) && (\because \text{定義 20.3}) \\ &= \cosh\kappa + A(1 - \cos\theta) && (\because \text{定義 20.4}) \\ &= \cosh\kappa + 2A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) && (\because \text{倍角公式} \cos 2t = 1 - 2\sin^2 t \text{ を} t = \tfrac{\theta}{2} \text{ に適用}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_1(\theta) &= \cosh(\mathrm{arccosh}(\gamma_1(\theta))) && (\because \text{主張 15.2 (2) を} y = \gamma_1(\theta) \text{ に適用。} \gamma_1(\theta) \geq 1 \text{ は主張 15.10}) \\ &= \cosh\gamma(\theta) && (\because \text{定義 15.11}) \end{aligned}$$

二つの鎖の左辺はどちらも $\gamma_1(\theta)$ であり、二つを合わせたものが 1 番目の式である。

Step 2（2 番目の式）。

$$\begin{aligned}
\sinh^2\!\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) &= \frac{\left(1+2\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right)\right)-1}{2} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \frac{\cosh\gamma(\theta)-1}{2} && (\because \text{主張 11.6 を} x=\gamma(\theta) \text{ に適用}) \\
&= \frac{\left(\cosh\kappa + 2A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)-1}{2} && (\because \text{Step 1 の 1 番目の式}) \\
&= \frac{\left(1+2\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)+2A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)-1}{2} && (\because \text{主張 11.6 を} x=\kappa \text{ に適用}) \\
&= \sinh^2\!\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A\sin^2\!\left(\frac{\theta}{2}\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

Step 3 (3 番目の式)。準備として $S := \sinh^2(\frac{\kappa}{2}) + A\sin^2(\frac{\theta}{2}) \in \mathbb{R}$ とおき、$S \geq 0$ と $\sinh(\frac{\gamma(\theta)}{2}) \geq 0$ を示す。

$$\begin{aligned}
S &= \sinh^2\!\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) && (\because \text{Step 2}) \\
&= \left(\sinh\frac{\gamma(\theta)}{2}\right)^2 && (\because \sinh^2 \text{ の記法}) \\
&\geq 0 && (\because \text{実数の 2 乗は非負})
\end{aligned}$$

主張 15.2 (1) より $\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta)) \geq 0$（定義 15.11。$\gamma_1(\theta) \geq 1$ は 主張 15.10）、ゆえに $\frac{\gamma(\theta)}{2} \geq 0$ である。$\frac{\gamma(\theta)}{2} > 0$ なら 主張 3.21 (3) より $\sinh(\frac{\gamma(\theta)}{2}) > 0$、$\frac{\gamma(\theta)}{2} = 0$ なら 主張 11.8 より $\sinh(\frac{\gamma(\theta)}{2}) = 0$ であり、どちらでも $\sinh(\frac{\gamma(\theta)}{2}) \geq 0$ である。

$$\begin{aligned}
\gamma(\theta) &= 2\cdot\frac{\gamma(\theta)}{2} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= 2\operatorname{arcsinh}\left(\sinh\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) && (\because \text{主張 11.18 を} u=\tfrac{\gamma(\theta)}{2},\ y=\sinh\tfrac{\gamma(\theta)}{2} \text{ に適用}) \\
&= 2\operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{S}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) && (\because \text{主張 1.3 の一意性。} \sinh\tfrac{\gamma(\theta)}{2} \geq 0 \text{ と上の鎖の} \left(\sinh\tfrac{\gamma(\theta)}{2}\right)^2 = S) \\
&= 2\operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\!\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A\sin^2\!\left(\frac{\theta}{2}\right)}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) && (\because S \text{ の定義})
\end{aligned}$$

偶関数性。3 番目の式の右辺は κ を $\sinh^2(\frac{\kappa}{2})$ を通してだけ含み、κ を $-\kappa$ に置き換えても次の鎖により値が変わらない。

$$\begin{aligned}
\sinh^2\!\left(\frac{-\kappa}{2}\right) &= \left(\sinh\frac{-\kappa}{2}\right)^2 && (\because \sinh^2 \text{ の記法}) \\
&= \left(\sinh\left(-\frac{\kappa}{2}\right)\right)^2 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則} \tfrac{-\kappa}{2} = -\tfrac{\kappa}{2}) \\
&= \left(-\sinh\frac{\kappa}{2}\right)^2 && (\because \text{主張 11.3 を} x=\tfrac{\kappa}{2} \text{ に適用}) \\
&= \left(\sinh\frac{\kappa}{2}\right)^2 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則} (-a)^2 = a^2) \\
&= \sinh^2\!\left(\frac{\kappa}{2}\right) && (\because \sinh^2 \text{ の記法})
\end{aligned}$$

□

主張 20.6 ($\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1 \iff K_1 = K_2^* \iff \kappa = 0$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ について、次の 3 条件は同値である。

- (1) $s_1 s_2 = \sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$（Ising 模型の臨界条件）
- (2) $K_1 = K_2^*$
- (3) 定義 20.3 の $\kappa = 2K_1 - 2K_2^*$ が 0 に等しい

主張 20.2 は同じ条件 (1) が $c_1 = s_1 c_2$ と同値であることを示している。したがって本主張と合わせて、$\kappa = 0$ と $c_1 = s_1 c_2$ も同値である。

証明. 記号の帰属。$K_1, K_2, K_2^*, \kappa \in \mathbb{R}$（$K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ は 定義 12.25）、$c_1, s_1, c_2, s_2, s_2^* \in \mathbb{R}$（定義 12.26）である。$\mathbb{R}$ を使うのは、cosh・sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限であり、K_2^* が実対数の値だからである。

準備。$s_2 \neq 0$ と $s_2^* = \dfrac{1}{s_2}$ を示す。

$$s_2 > 0 \quad (\because \text{主張 13.14 を} i = 2 \text{ に適用。} K_2 > 0 \text{ は仮定、} K_2^* > 0 \text{ は定義 12.25})$$

$$s_2 \neq 0 \quad (\because \ s_2 > 0 \text{ と} \mathbb{R} \text{ の順序})$$

$$\begin{aligned} s_2^* &= \frac{s_2\, s_2^*}{s_2} && (\because \ s_2 \neq 0 \text{ なので} \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &= \frac{\sinh(2K_2)\sinh(2K_2^*)}{s_2} && (\because \text{定義 12.26}) \\ &= \frac{1}{s_2} && (\because \text{主張 13.13}) \end{aligned}$$

(1) $\iff$ (2) の証明。

$$\begin{aligned} s_1 s_2 = 1 &\iff s_1 = \frac{1}{s_2} && (\because \ s_2 \neq 0 \text{ なので、} \Rightarrow \text{ は両辺を} s_2 \text{ で割り、} \Leftarrow \text{ は両辺に} s_2 \text{ を掛ける}) \\ &\iff s_1 = s_2^* && (\because \text{準備の} s_2^* = \tfrac{1}{s_2}) \\ &\iff \sinh 2K_1 = \sinh 2K_2^* && (\because \text{定義 12.26}) \\ &\iff 2K_1 = 2K_2^* && (\because \Rightarrow \text{ は主張 11.10 を} u = 2K_1,\ v = 2K_2^* \text{ に適用。} \Leftarrow \text{ は両辺に sinh を施す}) \\ &\iff K_1 = K_2^* && (\because \ 2 \neq 0 \text{ なので、} \Rightarrow \text{ は両辺を2 で割り、} \Leftarrow \text{ は両辺に2 を掛ける}) \end{aligned}$$

(2) $\iff$ (3) の証明。

$$\begin{aligned} \kappa = 0 &\iff 2K_1 - 2K_2^* = 0 && (\because \text{定義 20.3}) \\ &\iff 2\,(K_1 - K_2^*) = 0 && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\ &\iff K_1 - K_2^* = 0 && (\because \ 2 \neq 0 \text{ なので、} \Rightarrow \text{ は両辺を2 で割り、} \Leftarrow \text{ は両辺に2 を掛ける}) \\ &\iff K_1 = K_2^* && (\because \mathbb{R} \text{ の移項}) \end{aligned}$$

$\kappa = 0$ と $c_1 = s_1 c_2$ の同値の証明。

$$\begin{aligned} c_1 = s_1 c_2 &\iff s_1 s_2 = 1 && (\because \text{主張 20.2}) \\ &\iff K_1 = K_2^* && (\because \text{上の (1)} \iff \text{(2)}) \\ &\iff \kappa = 0 && (\because \text{上の (2)} \iff \text{(3)}) \end{aligned}$$

□

定義 20.7 (等方な場合の双対結合定数K^*)**.** $K \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して（等方な場合 $K_1 = K_2 = K$ に使う)、定義 12.20 の双曲線正接と 定義 12.21 の実対数を用いて

$$K^* := -\frac{1}{2}\log(\tanh K) \in \mathbb{R}_{>0}$$

と定める。右辺は 定義 12.25 の右辺の $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ を $K \in \mathbb{R}_{>0}$ に置いたものなので、同じブロックの確認により定まり、$\mathbb{R}_{>0}$ に属する。

定義 20.8 ($\kappa(K) := 2K - 2K^*$)**.** $K \in \mathbb{R}_{>0}$ と 定義 20.7 の $K^* \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して

$$\kappa(K) := 2K - 2K^* \in \mathbb{R}$$

と定める。

主張 20.9 (等方な場合$K_1 = K_2 = K$ では$A = 1$)**.** ** 等方な場合 ** $K_1 = K_2 = K \in \mathbb{R}_{>0}$ では、定義 20.4 の A について

$$A = 1$$

が成り立つ。

証明. 記号の帰属。$K, K_1, K_2, K_2^*, A \in \mathbb{R}$、$s_1, s_2^* \in \mathbb{R}$（定義 12.26）である。$\mathbb{R}$ を使うのは、K_2^* が実対数の値であり、sinh の値が実数の exp の値、すなわち部分和の極限だからである。

$$\begin{aligned}
A &= s_1 s_2^* && (\because \text{ 定義 } 20.4)\\
&= \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* && (\because \text{ 定義 } 12.26 \text{ の} s_1 = \sinh 2K_1,\ s_2^* = \sinh 2K_2^*)\\
&= \sinh 2K_2 \sinh 2K_2^* && (\because\ K_1 = K = K_2\text{(仮定)})\\
&= 1 && (\because \text{ 主張 } 13.13)
\end{aligned}$$

□

主張 20.10 (等方な場合$\kappa = \kappa(K)$)**.** ** 等方な場合 ** $K_1 = K_2 = K \in \mathbb{R}_{>0}$ では、定義 20.3 の κ と 定義 20.8 の $\kappa(K)$ について

$$\kappa = \kappa(K)$$

が成り立つ。

証明. 記号の帰属。$K, K_1, K_2, K_2^*, K^*, \kappa, \kappa(K) \in \mathbb{R}$ である。$\mathbb{R}$ を使うのは、K_2^* と K^* が実対数の値だからである。

準備。$K_2^* = K^*$ を示す。

$$\begin{aligned}
K_2^* &= -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) && (\because \text{ 定義 } 12.25)\\
&= -\frac{1}{2}\log(\tanh K) && (\because\ K_2 = K\text{(仮定)})\\
&= K^* && (\because \text{ 定義 } 20.7)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\kappa &= 2K_1 - 2K_2^* && (\because \text{ 定義 } 20.3)\\
&= 2K - 2K_2^* && (\because\ K_1 = K\text{(仮定)})\\
&= 2K - 2K^* && (\because \text{ 準備の} K_2^* = K^*)\\
&= \kappa(K) && (\because \text{ 定義 } 20.8)
\end{aligned}$$

□

主張 20.11 (等方な場合$\gamma(\theta)=2\operatorname{arcsinh}\sqrt{\sinh^2(\kappa(K)/2)+\sin^2(\theta/2)}$)**.** ** 等方な場合 ** $K_1=K_2=K\in\mathbb{R}_{>0}$ では、定義 15.11 の γ と 定義 20.8 の $\kappa(K)$ について、すべての実数 θ で

$$\gamma(\theta)=2\operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa(K)}{2}\right)+\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)$$

が成り立つ。すなわち ** 等方な場合、γ は $\kappa(K)$ 1 つだけを通じて K に依存する。**

証明. 記号の帰属。$K,\kappa,\kappa(K),A,\theta,\gamma(\theta)\in\mathbb{R}$ である。$\mathbb{R}$ を使うのは、sinh・sin・arcsinh の値が部分和の極限・平方根・実対数として定まる実数だからである。$\theta\in\mathbb{R}$ を任意にとる。

$$\begin{aligned}
\gamma(\theta)&=2\operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)+A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) && (\because \text{主張 20.5 の第 3 式})\\
&=2\operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)+1\cdot\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) && (\because \text{主張 20.9})\\
&=2\operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)+\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) && (\because \mathbb{R}\text{ の乗法の単位元}1\cdot x=x)\\
&=2\operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa(K)}{2}\right)+\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) && (\because \text{主張 20.10})
\end{aligned}$$

□

主張 20.12 ($\kappa(K)$ の基本性質と臨界点K_c)**.** 定義 20.8 の $\kappa(K)=2K-2K^*$（$K\in\mathbb{R}_{>0}$）について次が成り立つ。ここで ** 臨界点 ** $K_c\in\mathbb{R}$ を $\sinh 2K_c=1$ で定める（主張 11.18 と 定義 11.16 より $2K_c=\operatorname{arcsinh}(1)=\log\left(1+\sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)$ と一意に定まる）。$K_c\in\mathbb{R}_{>0}$ である。

- (1) κ は $\mathbb{R}_{>0}$ 上微分可能で $\kappa'(K)=2+\dfrac{2}{\sinh 2K}>0$、$\kappa'$ は連続であり、κ は狭義単調増加。
- (2) $\kappa(K_c)=0$ であり、$K\in\mathbb{R}_{>0}$ について $\kappa(K)=0\iff K=K_c\iff\sinh^2 2K=1$（等方な場合の臨界条件）。
- (3) κ' は $\mathbb{R}_{>0}$ 上微分可能で $\kappa''(K)=-\dfrac{4\cosh 2K}{\sinh^2 2K}$。
- (4) $K\in\mathbb{R}$ が $|K-K_c|\leq\frac{1}{10}$ を満たすなら $K\in\mathbb{R}_{>0}$ であり、$0.7353\leq\sinh 2K\leq 1.3048$、$3.53\leq\kappa'(K)\leq 4.72$、$|\kappa''(K)|\leq 9.19$、$\left|\left(\kappa'^2\right)'(K)\right|\leq 87$。
- (5) $K\in\mathbb{R}$ が $|K-K_c|\leq\frac{1}{10}$ を満たすなら $3.53\,|K-K_c|\leq|\kappa(K)|\leq 4.72\,|K-K_c|\leq 0.472$、および $\left|\kappa'(K)^2-16\right|\leq 24.7\,|\kappa(K)|$。

証明. 記号の帰属。$K,K^*,\kappa(K),\kappa'(K),\kappa''(K),K_c\in\mathbb{R}$、小数で書いた数は $\mathbb{Q}$ の元である。$\mathbb{R}$ を使うのは、sinh・cosh の値が実数の exp の値（部分和の極限）、K^* と K_c が実対数の値であり、微分と積分が実数の極限で定まるからである。微分は 注意 11.1 の微分の公式、積分は同じ注記の (R3)・(R4) で扱う（注意 20.1）。

準備。$K_c\in\mathbb{R}_{>0}$ であること。$2K_c\leq 0$ と仮定すると

$$
\begin{aligned}
1 &= \sinh 2K_c && (\because\ K_c \text{ の定義}) \\
&\leq \sinh 0 && (\because\ 2K_c \leq 0 \text{ と主張 11.9(等号のときは等しい）}) \\
&= 0 && (\because\ \text{主張 11.8})
\end{aligned}
$$

となり矛盾する。よって $2K_c > 0$、すなわち $K_c \in \mathbb{R}_{>0}$。

準備。$\cosh 2K_c = \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ であること。

$$
\begin{aligned}
(\cosh 2K_c)^2 &= 1 + (\sinh 2K_c)^2 && (\because\ \text{主張 3.21 (2)}) \\
&= 1 + 1^2 && (\because\ K_c \text{ の定義}) \\
&= 2 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の四則}) \\
&= \left(\sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 && (\because\ \text{定義 1.4})
\end{aligned}
$$

$\cosh 2K_c > 0$（主張 3.21 (1)）と $\sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} > 0$（定義 1.4 より $\sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \geq 0$ で、その 2 乗は $2 \neq 0$）に 主張 3.21 (4) を当てて $\cosh 2K_c = \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$。

準備。$1.414213 \leq \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq 1.414214$ であること。$1.414213, 1.414214, \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
1.414213^2 &= 1.999998409369 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の四則}) \\
&\leq 2 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の大小}) \\
&= \left(\sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 && (\because\ \text{定義 1.4}) \\
&\leq 2.000001237796 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の大小}) \\
&= 1.414214^2 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

の二つの不等号に 主張 11.45 を当てる。

準備。数値の評価 $1.02006 \leq \cosh \frac{1}{5} \leq 1.020067$、$0.201336 \leq \sinh \frac{1}{5} \leq 0.2013361$ は、注意 20.1 が持ち込む数値の評価である。

(1) の証明。$K \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。まず 定義 12.20 の $\tanh = \sinh / \cosh$ の導関数を求める（$\cosh K > 0$ は 主張 3.21 (1)）。

$$
\begin{aligned}
(\tanh)'(K) &= \left(\frac{\sinh}{\cosh}\right)'(K) && (\because\ \text{定義 12.20}) \\
&= \frac{\sinh'(K)\cosh K - \sinh K \cosh'(K)}{\cosh^2 K} && (\because\ \text{微分の公式の商。} \cosh K \neq 0) \\
&= \frac{\cosh K \cosh K - \sinh K \sinh K}{\cosh^2 K} && (\because\ \text{主張 11.11 と主張 11.12}) \\
&= \frac{1}{\cosh^2 K} && (\because\ \text{主張 3.21 (2)})
\end{aligned}
$$

定義 20.7 より $K^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K)$ で、$\tanh K \in \mathbb{R}_{>0}$（定義 12.20）なので

$$
\begin{aligned}
\frac{dK^*}{dK} &= \left(-\frac{1}{2}\log\circ\tanh\right)'(K) && (\because \text{定義 20.7})\\
&= -\frac{1}{2}(\log\circ\tanh)'(K) && (\because \text{微分の公式の定数倍})\\
&= -\frac{1}{2}\cdot\log'(\tanh K)\cdot(\tanh)'(K) && (\because \text{微分の公式の合成})\\
&= -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\tanh K}\cdot(\tanh)'(K) && (\because \text{微分の公式の}\log'(w)=\tfrac{1}{w})\\
&= -\frac{1}{2}\cdot\frac{\cosh K}{\sinh K}\cdot\frac{1}{\cosh^2 K} && (\because \text{定義 12.20 と上の}(\tanh)'(K))\\
&= -\frac{1}{2\sinh K\cosh K} && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})\\
&= -\frac{1}{\sinh 2K} && (\because \text{主張 11.7 を}x=2K\text{ で})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\kappa'(K) &= (2\,\mathrm{id}-2K^*)'(K) && (\because \text{定義 20.8。}K^*\text{ を}K\text{ の関数と読む})\\
&= (2\,\mathrm{id})'(K)-(2K^*)'(K) && (\because \text{微分の公式の和（差は}-1\text{ 倍との和）})\\
&= 2\,\mathrm{id}'(K)-2\frac{dK^*}{dK} && (\because \text{微分の公式の定数倍を 2 箇所へ})\\
&= 2-2\frac{dK^*}{dK} && (\because \text{恒等関数の導関数1})\\
&= 2+\frac{2}{\sinh 2K} && (\because \text{上の}dK^*/dK\text{ の表示}).
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\kappa'(K) &= 2+\frac{2}{\sinh 2K} && (\because \text{上の}\kappa'(K)\text{ の表示})\\
&> 2 && (\because \sinh 2K>0\text{。主張 3.21 (3) を}x=2K>0\text{ で})\\
&> 0 && (\because \mathbb{Q}\text{ の大小})
\end{aligned}
$$

$\kappa' = 2+2/(\sinh\circ(2\,\mathrm{id}))$ は $\mathbb{R}_{>0}$ 上で微分可能（主張 11.11 と微分の公式の和・定数倍・商・合成。分母 $\sinh 2K>0$）なので、微分の公式の「微分可能な関数は連続」より連続である。$0<a<b$ なら、(R4) を $F=\kappa$ と $F(t)=2t$ に当てて

$$
\begin{aligned}
\kappa(b)-\kappa(a) &= \int_a^b \kappa'(t)\,dt && (\because \text{(R4)})\\
&\geq \int_a^b 2\,dt && (\because \text{(R3) の単調性と上の}\kappa'(t)>2)\\
&= 2b-2a && (\because \text{(R4) を}F(t)=2t\text{ で})\\
&> 0 && (\because a<b)
\end{aligned}
$$

なので κ は狭義単調増加である。

(2) の証明。$K\in\mathbb{R}_{>0}$ とし、$K_1=K_2=K$ と置く。

$$
\begin{aligned}
\kappa(K)=0 &\iff \kappa=0 && (\because \text{主張 20.10。左の}\kappa\text{ は定義 20.3 のもの})\\
&\iff s_1s_2=1 && (\because \text{主張 20.6 の (1) }\iff\text{ (3)})\\
&\iff \sinh^2 2K=1 && (\because \text{定義 12.26 の}s_i=\sinh 2K_i\text{ と}K_1=K_2=K)\\
&\iff \sinh 2K=1 && (\because \sinh 2K>0\text{(主張 3.21 (3))、}1>0\text{ と主張 3.21 (4)})\\
&\iff \sinh 2K=\sinh 2K_c && (\because K_c\text{ の定義})\\
&\iff 2K=2K_c && (\because \Rightarrow\text{ は主張 11.10、}\Leftarrow\text{ は等しい実数の}\sinh\text{ は等しい})\\
&\iff K=K_c && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})
\end{aligned}
$$

準備の $K_c \in \mathbb{R}_{>0}$ より、この同値の鎖を $K = K_c$ に当てると最後の条件が成り立つので $\kappa(K_c) = 0$。鎖の条件 $\kappa(K) = 0 \cdot \sinh^2 2K = 1 \cdot K = K_c$ が互いに同値なので $\kappa(K) = 0 \iff K = K_c \iff \sinh^2 2K = 1$。

(3) の証明。$K \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。(1) の $\kappa' = 2 + 2/(\sinh \circ (2\,\mathrm{id}))$ は微分可能で（(1) の証明）、

$$
\begin{aligned}
\kappa''(K) &= \left(2 + \frac{2}{\sinh \circ (2\,\mathrm{id})}\right)'(K) && (\because\ (1)\ \text{の}\kappa'\ \text{の表示}) \\
&= 2'(K) + \left(\frac{2}{\sinh \circ (2\,\mathrm{id})}\right)'(K) && (\because\ \text{微分の公式の和}) \\
&= 0 + \left(\frac{2}{\sinh \circ (2\,\mathrm{id})}\right)'(K) && (\because\ \text{定数関数の導関数0}) \\
&= -\frac{2\,(\sinh \circ (2\,\mathrm{id}))'(K)}{\sinh^2 2K} && (\because\ \text{微分の公式の商（分子は定数で導関数0）と}\mathbb{R}\ \text{の四則}) \\
&= -\frac{2 \cdot \sinh'(2K) \cdot (2\,\mathrm{id})'(K)}{\sinh^2 2K} && (\because\ \text{微分の公式の合成}) \\
&= -\frac{2 \cdot \sinh'(2K) \cdot 2\,\mathrm{id}'(K)}{\sinh^2 2K} && (\because\ \text{微分の公式の定数倍}) \\
&= -\frac{2 \cdot \sinh'(2K) \cdot 2}{\sinh^2 2K} && (\because\ \text{恒等関数の導関数1}) \\
&= -\frac{2 \cdot \cosh 2K \cdot 2}{\sinh^2 2K} && (\because\ \text{主張 11.11}) \\
&= -\frac{4 \cosh 2K}{\sinh^2 2K} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則})
\end{aligned}
$$

(4) の証明。$K \in \mathbb{R}$、$|K - K_c| \leq \frac{1}{10}$ とすると、絶対値の定義より $2K_c - \frac{1}{5} \leq 2K \leq 2K_c + \frac{1}{5}$。主張 11.5 を $x = 2K_c$、$y = \frac{1}{5}$ に当てると（複号同順）

$$
\begin{aligned}
\sinh\left(2K_c \pm \tfrac{1}{5}\right) &= \sinh 2K_c \cosh \tfrac{1}{5} \pm \cosh 2K_c \sinh \tfrac{1}{5} && (\because\ \text{主張 11.5}) \\
&= \cosh \tfrac{1}{5} \pm \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \sinh \tfrac{1}{5} && (\because\ K_c\ \text{の定義と準備の}\cosh 2K_c = \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})})
\end{aligned}
$$

準備の数値の評価から $\sinh \frac{1}{5} > 0$、$\cosh \frac{1}{5} > 0$ である。

$$
\begin{aligned}
\sinh 2K &\geq \sinh\left(2K_c - \tfrac{1}{5}\right) && (\because\ 2K_c - \tfrac{1}{5} \leq 2K\ \text{と主張 11.9(等号のときは等しい）}) \\
&= \cosh \tfrac{1}{5} - \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \sinh \tfrac{1}{5} && (\because\ \text{上の端点の式の複号}-) \\
&\geq 1.02006 - \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \sinh \tfrac{1}{5} && (\because\ \cosh \tfrac{1}{5} \geq 1.02006) \\
&\geq 1.02006 - 1.414214 \sinh \tfrac{1}{5} && (\because\ \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq 1.414214\ \text{と}\sinh \tfrac{1}{5} > 0) \\
&\geq 1.02006 - 1.414214 \cdot 0.2013361 && (\because\ \sinh \tfrac{1}{5} \leq 0.2013361) \\
&\geq 0.7353 && (\because\ \mathbb{Q}\ \text{の四則と大小}).
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sinh 2K &\leq \sinh\left(2K_c + \tfrac{1}{5}\right) && (\because\ 2K \leq 2K_c + \tfrac{1}{5}\ \text{と主張 11.9(等号のときは等しい）}) \\
&= \cosh \tfrac{1}{5} + \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \sinh \tfrac{1}{5} && (\because\ \text{上の端点の式の複号}+) \\
&\leq 1.020067 + \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \sinh \tfrac{1}{5} && (\because\ \cosh \tfrac{1}{5} \leq 1.020067) \\
&\leq 1.020067 + 1.414214 \sinh \tfrac{1}{5} && (\because\ \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq 1.414214\ \text{と}\sinh \tfrac{1}{5} > 0) \\
&\leq 1.020067 + 1.414214 \cdot 0.2013361 && (\because\ \sinh \tfrac{1}{5} \leq 0.2013361) \\
&\leq 1.3048 && (\because\ \mathbb{Q}\ \text{の四則と大小}).
\end{aligned}
$$

一つ目の鎖の 2 行目以降は K に依らないので $\sinh(2K_c - \frac{1}{5}) \geq 0.7353$ でもある。$2K \leq 0$ なら 主張 11.9（等号のときは等しい）と 主張 11.8 より $\sinh 2K \leq 0 < 0.7353$ となり一つ目の鎖に反するので $2K > 0$、すなわち $K \in \mathbb{R}_{>0}$。同じ理由で $2K_c - \frac{1}{5} > 0$。したがって (1)・(3) を K で使える。

$$\begin{aligned}
\kappa'(K) &= 2 + \frac{2}{\sinh 2K} && (\because\ (1)) \\
&\geq 2 + \frac{2}{1.3048} && (\because\ 0 < \sinh 2K \leq 1.3048) \\
&\geq 3.53 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の四則と大小}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\kappa'(K) &= 2 + \frac{2}{\sinh 2K} && (\because\ (1)) \\
&\leq 2 + \frac{2}{0.7353} && (\because\ \sinh 2K \geq 0.7353 > 0) \\
&\leq 4.72 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の四則と大小}).
\end{aligned}$$

κ'' を評価するために $h : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R},\ h(t) := \dfrac{\cosh t}{\sinh^2 t}$ と置く（$t > 0$ で $\sinh t > 0$。主張 3.21 (3)）。h は微分可能で、$t \in \mathbb{R}_{>0}$ について

$$\begin{aligned}
h'(t) &= \frac{\cosh'(t)\sinh^2 t - \cosh t\,(\sinh\cdot\sinh)'(t)}{\sinh^4 t} && (\because\ \text{微分の公式の商}) \\
&= \frac{\cosh'(t)\sinh^2 t - \cosh t \cdot 2\sinh t\,\sinh'(t)}{\sinh^4 t} && (\because\ \text{微分の公式の積と}\mathbb{R}\text{ の乗法の交換律}) \\
&= \frac{\sinh t \cdot \sinh^2 t - \cosh t \cdot 2\sinh t \cosh t}{\sinh^4 t} && (\because\ \text{主張 11.12 と主張 11.11}) \\
&= \frac{\sinh^2 t - 2\cosh^2 t}{\sinh^3 t} && (\because\ \mathbb{R}\text{ の四則。}\ \sinh t \neq 0) \\
&= \frac{-1 - \cosh^2 t}{\sinh^3 t} && (\because\ \text{主張 3.21 (2) の}\sinh^2 t = \cosh^2 t - 1) \\
&< 0 && (\because\ -1 - \cosh^2 t \leq -1 < 0,\ \sinh^3 t > 0).
\end{aligned}$$

h' は微分可能な関数の商として微分可能なので連続であり、$0 < a < b$ なら

$$\begin{aligned}
h(b) - h(a) &= \int_a^b h'(t)\,dt && (\because\ \text{(R4) を}F = h\text{ で}) \\
&\leq \int_a^b 0\,dt && (\because\ \text{(R3) の単調性と上の}h'(t) < 0) \\
&= 0 && (\because\ \text{(R4) を定数関数}F = 0\text{ で})
\end{aligned}$$

である。よって $0 < a \leq b$ なら $h(b) \leq h(a)$。

$$\begin{aligned}
\cosh\left(2K_c - \tfrac{1}{5}\right) &= \cosh 2K_c \cosh\tfrac{1}{5} - \sinh 2K_c \sinh\tfrac{1}{5} && (\because\ \text{主張 11.4 の複号}-) \\
&= \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \cosh\tfrac{1}{5} - \sinh\tfrac{1}{5} && (\because\ \text{準備の}\cosh 2K_c = \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\ \text{と}K_c\ \text{の定義}) \\
&\leq 1.414214 \cosh\tfrac{1}{5} - \sinh\tfrac{1}{5} && (\because\ \sqrt{2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq 1.414214\ \text{と}\cosh\tfrac{1}{5} > 0) \\
&\leq 1.414214 \cdot 1.020067 - \sinh\tfrac{1}{5} && (\because\ \cosh\tfrac{1}{5} \leq 1.020067) \\
&\leq 1.414214 \cdot 1.020067 - 0.201336 && (\because\ \sinh\tfrac{1}{5} \geq 0.201336) \\
&\leq 1.2413 && (\because\ \mathbb{Q}\text{ の四則と大小}).
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\left|\kappa''(K)\right| &= \left|-\frac{4\cosh 2K}{\sinh^2 2K}\right| && (\because\ (3)) \\
&= \frac{4\cosh 2K}{\sinh^2 2K} && (\because\ \cosh 2K > 0\text{(主張 3.21 (1))、}\ \sinh^2 2K > 0) \\
&= 4h(2K) && (\because\ h \text{ の定義}) \\
&\le 4h\left(2K_c - \tfrac{1}{5}\right) && (\because\ 0 < 2K_c - \tfrac{1}{5} \le 2K \text{ と上の} h \text{ の単調減少}) \\
&= \frac{4\cosh(2K_c - \frac{1}{5})}{\sinh^2(2K_c - \frac{1}{5})} && (\because\ h \text{ の定義}) \\
&\le \frac{4 \cdot 1.2413}{\sinh^2(2K_c - \frac{1}{5})} && (\because\ \text{上の}\cosh(2K_c - \tfrac{1}{5}) \le 1.2413) \\
&\le \frac{4 \cdot 1.2413}{0.7353^2} && (\because\ \sinh(2K_c - \tfrac{1}{5}) \ge 0.7353 > 0) \\
&\le 9.19 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の四則と大小}).
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\left|\left(\kappa'^2\right)'(K)\right| &= \left|2\kappa'(K)\kappa''(K)\right| && (\because\ \text{微分の公式の積（(1)・(3) より}\kappa' \text{ は微分可能）}) \\
&= 2\,\kappa'(K)\left|\kappa''(K)\right| && (\because\ \text{積の絶対値と}\kappa'(K) > 0) \\
&\le 2 \cdot 4.72 \cdot 9.19 && (\because\ \text{上の}\kappa'(K) \text{ と}|\kappa''(K)| \text{ の上界}) \\
&\le 87 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の四則と大小}).
\end{aligned}
$$

(5) の証明。$K \in \mathbb{R}$、$|K - K_c| \le \frac{1}{10}$ とし、$a := \min\{K, K_c\}$、$b := \max\{K, K_c\}$ と置く。$\{a, b\} = \{K, K_c\}$、$b - a = |K - K_c|$ であり、$t \in [a, b]$ は $|t - K_c| \le |K - K_c| \le \frac{1}{10}$ を満たすので (4) を t で使える（とくに $a > 0$）。(1) より κ は単調増加なので $\kappa(b) - \kappa(a) = |\kappa(K) - \kappa(K_c)|$ である。

$$
\begin{aligned}
3.53\,|K - K_c| &= 3.53\,(b - a) && (\because\ b - a = |K - K_c|) \\
&= \int_a^b 3.53\,dt && (\because\ \text{(R4) を} F(t) = 3.53\,t \text{ で}) \\
&\le \int_a^b \kappa'(t)\,dt && (\because\ \text{(R3) の単調性と (4) の}\kappa'(t) \ge 3.53) \\
&= \kappa(b) - \kappa(a) && (\because\ \text{(R4) を} F = \kappa \text{ で。(1) より}\kappa' \text{ は連続}) \\
&= |\kappa(K) - \kappa(K_c)| && (\because\ \text{上の}\kappa(b) - \kappa(a) \text{ の表示}) \\
&= |\kappa(K)| && (\because\ \text{(2) の}\kappa(K_c) = 0) \\
&= \kappa(b) - \kappa(a) && (\because\ \text{(2) の}\kappa(K_c) = 0 \text{ と上の}\kappa(b) - \kappa(a) \text{ の表示}) \\
&= \int_a^b \kappa'(t)\,dt && (\because\ \text{(R4) を} F = \kappa \text{ で}) \\
&\le \int_a^b 4.72\,dt && (\because\ \text{(R3) の単調性と (4) の}\kappa'(t) \le 4.72) \\
&= 4.72\,(b - a) && (\because\ \text{(R4) を} F(t) = 4.72\,t \text{ で}) \\
&= 4.72\,|K - K_c| && (\because\ b - a = |K - K_c|) \\
&\le 4.72 \cdot \frac{1}{10} && (\because\ |K - K_c| \le \tfrac{1}{10}) \\
&= 0.472 && (\because\ \mathbb{Q} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

次に $G := \kappa'^2 : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ と置く。(1)・(3) と微分の公式の積より G は微分可能で $G' = 2\kappa'\kappa''$、$\kappa'' = -4\cosh(2\cdot)/\sinh^2(2\cdot)$ は微分可能な関数の商なので連続、よって G' は連続である。

$$\begin{aligned}\kappa'(K_c) &= 2 + \frac{2}{\sinh 2K_c} && (\because (1)\ \text{の}\kappa'\ \text{の表示を}K = K_c \in \mathbb{R}_{>0}\ \text{で読む})\\ &= 2 + \frac{2}{1} && (\because K_c\ \text{の定義})\\ &= 4 && (\because \mathbb{R}\ \text{の四則})\end{aligned}$$

(4) より $t \in [a,b]$ で $-87 \le G'(t) \le 87$ なので

$$\begin{aligned}-87\,(b-a) &= \int_a^b (-87)\,dt && (\because\ \text{(R4) を}F(t) = -87\,t\ \text{で})\\ &\le \int_a^b G'(t)\,dt && (\because\ \text{(R3) の単調性と} -87 \le G'(t))\\ &\le \int_a^b 87\,dt && (\because\ \text{(R3) の単調性と}G'(t) \le 87)\\ &= 87\,(b-a) && (\because\ \text{(R4) を}F(t) = 87\,t\ \text{で})\end{aligned}$$

であり、

$$\begin{aligned}\left|\kappa'(K)^2 - 16\right| &= |G(K) - G(K_c)| && (\because\ G\ \text{の定義と}\kappa'(K_c) = 4)\\ &= |G(b) - G(a)| && (\because\ \{a,b\} = \{K, K_c\}\ \text{と}|-x| = |x|)\\ &= \left|\int_a^b G'(t)\,dt\right| && (\because\ \text{(R4) を}F = G\ \text{で})\\ &\le 87\,(b-a) && (\because\ \text{上の}\textstyle\int_a^b G'\ \text{の挟み込みと絶対値の定義})\\ &= 87\,|K - K_c| && (\because\ b - a = |K - K_c|)\\ &\le 87 \cdot \frac{|\kappa(K)|}{3.53} && (\because\ \text{上の}3.53|K - K_c| \le |\kappa(K)|)\\ &\le 24.7\,|\kappa(K)| && (\because\ \mathbb{Q}\ \text{の四則と大小}).\end{aligned}$$

□

主張 20.13 ($\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa} = \frac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}$, $\left|\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\right| \le 1$)**.** 主張 20.11 の等方な場合について、$(\theta,\kappa) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}$ の関数

$$S(\theta,\kappa) := \sinh^2\!\left(\frac{\kappa}{2}\right) + \sin^2\!\left(\frac{\theta}{2}\right), \qquad \gamma(\theta,\kappa) := 2\,\mathrm{arcsinh}\Big(\sqrt{S(\theta,\kappa)}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}\Big)$$

を考える。$S(\theta,\kappa)$ は実数の 2 乗の和なので $\mathbb{R}_{\ge 0}$ に属し、$\sqrt{\cdot}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}$ は 定義 1.4 の平方根である。以下、θ を固定したときは $S := S(\theta,\kappa)$、$\gamma := \gamma(\theta,\kappa)$ と書く。このとき次が成り立つ。

- (1) $\sinh\!\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{S}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}$、$\cosh\!\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{1+S}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}$、$\sinh\gamma = 2\sqrt{S(1+S)}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}$、$\cosh\gamma = 1+2S$。
- (2) $\kappa \ne 0$ のとき $S > 0$、$\sinh\gamma > 0$ であり、γ は κ について 2 回微分可能で $\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa} = \dfrac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}$、$\dfrac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2} = \dfrac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma} - \dfrac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}$。
- (3) $\kappa \ne 0$ のとき $\left|\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\right| \le 1$。
- (4) $0 < \kappa_1 \le \kappa_2$ のとき、γ、$\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}$、$\dfrac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}$ はいずれも $[0,2\pi]\times[\kappa_1,\kappa_2]$ 上の連続関数である。

$\mathbb{R}$ を使うのは、sinh・cosh・arcsinh の値が部分和の極限・平方根・実対数として、sin の値が弧の長さで定めた arcsin の逆関数の値として定まる実数であり、微分が実数の極限で定まるからである（注意 11.1 の微分の公式）。

証明. 記号の帰属。$\theta, \kappa, S, \gamma \in \mathbb{R}$。$\theta$ を固定する。$r := \sqrt{S}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$、$t := \sqrt{1+S}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ と置く ($1 + S \geq 1 > 0$)。定義 1.4 より $r, t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$r^2 = S$、$t^2 = 1 + S$ である。

$$\begin{aligned} t < 1 &\Longrightarrow t^2 < 1 && (\because\ t \geq 0 \text{ より} t \cdot t \leq t \cdot 1 = t < 1) \\ &\Longrightarrow 1 + S < 1 && (\because\ t^2 = 1 + S) \\ &\Longrightarrow S < 0 && (\because\ \text{両辺から} 1 \text{ を引く}) \end{aligned}$$

これは $S \geq 0$ に反するので $t \geq 1$ である。

(1) の証明。

$$\begin{aligned} \sinh\Big(\frac{\gamma}{2}\Big) &= \sinh\left(\frac{2\,\mathrm{arcsinh}(r)}{2}\right) && (\because\ \gamma \text{ と} r \text{ の定義}) \\ &= \sinh\big(\mathrm{arcsinh}(r)\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &= r && (\because\ \text{主張 } 11.17) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cosh\Big(\frac{\gamma}{2}\Big) &= \sqrt{\big(\cosh\tfrac{\gamma}{2}\big)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \cosh\tfrac{\gamma}{2} > 0 \text{ (主張 } 3.21 \text{ (1))}, \text{ 主張 } 1.3 \text{ の一意性}) \\ &= \sqrt{1 + \big(\sinh\tfrac{\gamma}{2}\big)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \text{主張 } 3.21 \text{ (2) を} \tfrac{\gamma}{2} \text{ で移項}) \\ &= \sqrt{1 + r^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \sinh\tfrac{\gamma}{2} = r) \\ &= \sqrt{1 + S}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ r^2 = S) \\ &= t && (\because\ t \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sinh\gamma &= 2\sinh\Big(\frac{\gamma}{2}\Big)\cosh\Big(\frac{\gamma}{2}\Big) && (\because\ \text{主張 } 11.7) \\ &= 2rt && (\because\ \sinh\tfrac{\gamma}{2} = r,\ \cosh\tfrac{\gamma}{2} = t) \\ &= 2\sqrt{(rt)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ rt \geq 0,\ \text{主張 } 1.3 \text{ の一意性}) \\ &= 2\sqrt{r^2 t^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換律と結合律}) \\ &= 2\sqrt{S\,t^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ r^2 = S) \\ &= 2\sqrt{S(1+S)}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ t^2 = 1 + S) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cosh\gamma &= 1 + 2\sinh^2\Big(\frac{\gamma}{2}\Big) && (\because\ \text{主張 } 11.6) \\ &= 1 + 2r^2 && (\because\ \sinh\tfrac{\gamma}{2} = r) \\ &= 1 + 2S && (\because\ r^2 = S) \end{aligned}$$

(2) の証明。$\kappa \neq 0$ とする。まず $S > 0$ と $\sinh\gamma > 0$ を示す。

$$\begin{aligned} \kappa \neq 0 &\Longrightarrow \frac{\kappa}{2} \neq 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &\Longrightarrow \sinh\frac{\kappa}{2} \neq \sinh 0 && (\because\ \text{主張 } 11.10 \text{ の対偶}) \\ &\Longrightarrow \sinh\frac{\kappa}{2} \neq 0 && (\because\ \text{主張 } 11.8) \\ &\Longrightarrow \sinh^2\frac{\kappa}{2} > 0 && (\because\ 0 \text{ でない実数の } 2 \text{ 乗は正}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \sinh^2\Big(\frac{\kappa}{2}\Big) + \sin^2\Big(\frac{\theta}{2}\Big) && (\because\ S \text{ の定義}) \\ &\geq \sinh^2\Big(\frac{\kappa}{2}\Big) && (\because\ \text{実数の } 2 \text{ 乗は非負}) \\ &> 0 && (\because\ \text{直前の含意}) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
S > 0 &\Longrightarrow r \neq 0 && (\because\ r^2 = S)\\
&\Longrightarrow r > 0 && (\because\ r \geq 0)\\
&\Longrightarrow 2rt > 0 && (\because\ t \geq 1 > 0 \text{ (記号の帰属の段)})\\
&\Longrightarrow \sinh\gamma > 0 && (\because\ \text{本主張 (1) の証明の} \sinh\gamma = 2rt)
\end{aligned}
$$

微分可能性。$\kappa \mapsto S$ は、主張 11.11 の sinh、定数倍、恒等関数、積と定数関数の和なので微分可能であり、$\kappa \neq 0$ では値が $\mathbb{R}_{>0}$ に入る。平方根は $\mathbb{R}_{>0}$ 上微分可能、arcsinh は微分可能（主張 11.19）なので、合成の微分の公式（注意 11.1）より γ は $\kappa \neq 0$ で κ について微分可能である。θ を固定して κ で微分する。

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial \kappa} &= \frac{d}{d\kappa}\left(\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) && (\because\ S \text{ の定義})\\
&= \frac{d}{d\kappa}\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + \frac{d}{d\kappa}\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) && (\because\ \text{微分の公式の和})\\
&= \frac{d}{d\kappa}\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + 0 && (\because\ \theta \text{ は固定。定数関数の導関数は0})\\
&= \frac{d}{d\kappa}\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cdot\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right) + \sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cdot\frac{d}{d\kappa}\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right) && (\because\ \text{微分の公式の積})\\
&= 2\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cdot\frac{d}{d\kappa}\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換律と同類項})\\
&= 2\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cdot\sinh'\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cdot\frac{d}{d\kappa}\frac{\kappa}{2} && (\because\ \text{微分の公式の合成})\\
&= 2\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cdot\sinh'\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cdot\frac{1}{2} && (\because\ \text{微分の公式の定数倍と恒等関数の導関数1})\\
&= 2\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cdot\frac{1}{2} && (\because\ \text{主張 11.11})\\
&= \frac{1}{2}\cdot 2\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法の交換律})\\
&= \frac{1}{2}\sinh\kappa && (\because\ \text{主張 11.7})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \gamma}{\partial \kappa} &= \frac{d}{d\kappa}\Big(2\operatorname{arcsinh}\big(r\big)\Big) && (\because\ \gamma \text{ と} r \text{ の定義})\\
&= 2 \cdot \frac{d}{d\kappa}\operatorname{arcsinh}\big(r\big) && (\because\ \text{微分の公式の定数倍})\\
&= 2 \cdot \operatorname{arcsinh}'(r) \cdot \frac{d}{d\kappa}\sqrt{S}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \text{微分の公式の合成})\\
&= 2 \cdot \operatorname{arcsinh}'(r) \cdot \big(\sqrt{}\big)'(S) \cdot \frac{\partial S}{\partial \kappa} && (\because\ \text{微分の公式の合成})\\
&= 2 \cdot \operatorname{arcsinh}'(r) \cdot \frac{1}{2r} \cdot \frac{\partial S}{\partial \kappa} && (\because\ \text{微分の公式の} (\sqrt{})'(w) = \tfrac{1}{2\sqrt{w}},\ S > 0)\\
&= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{r^2+1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} \cdot \frac{1}{2r} \cdot \frac{\partial S}{\partial \kappa} && (\because\ \text{主張 } 11.19)\\
&= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{S+1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} \cdot \frac{1}{2r} \cdot \frac{\partial S}{\partial \kappa} && (\because\ r^2 = S)\\
&= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1+S}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} \cdot \frac{1}{2r} \cdot \frac{\partial S}{\partial \kappa} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の交換律})\\
&= 2 \cdot \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{2r} \cdot \frac{\partial S}{\partial \kappa} && (\because\ t \text{ の定義})\\
&= 2 \cdot \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{2r} \cdot \frac{1}{2}\sinh\kappa && (\because\ \text{上の} \tfrac{\partial S}{\partial \kappa})\\
&= \frac{\sinh\kappa}{2rt} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則})\\
&= \frac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma} && (\because\ \text{本主張 (1) の証明の} \sinh\gamma = 2rt)
\end{aligned}
$$

$\kappa \mapsto \sinh\gamma$ は sinh と微分可能な γ の合成なので微分可能で、$\sinh\gamma > 0$ だから $\dfrac{\partial \gamma}{\partial \kappa} = \dfrac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}$ は商の微分の公式より κ について微分可能である。すなわち γ は 2 回微分可能で、

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2} &= \frac{d}{d\kappa}\left(\frac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}\right) && (\because \text{上の}\tfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}) \\
&= \frac{\dfrac{d}{d\kappa}\sinh\kappa\cdot\sinh\gamma - \sinh\kappa\cdot\dfrac{d}{d\kappa}\sinh\gamma}{\sinh^2\gamma} && (\because \text{微分の公式の商},\ \sinh\gamma>0) \\
&= \frac{\cosh\kappa\cdot\sinh\gamma - \sinh\kappa\cdot\dfrac{d}{d\kappa}\sinh\gamma}{\sinh^2\gamma} && (\because \text{主張 11.11}) \\
&= \frac{\cosh\kappa\cdot\sinh\gamma - \sinh\kappa\cdot\sinh'(\gamma)\cdot\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}}{\sinh^2\gamma} && (\because \text{微分の公式の合成}) \\
&= \frac{\cosh\kappa\cdot\sinh\gamma - \sinh\kappa\cdot\cosh\gamma\cdot\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}}{\sinh^2\gamma} && (\because \text{主張 11.11}) \\
&= \frac{\cosh\kappa\cdot\sinh\gamma - \sinh\kappa\cdot\cosh\gamma\cdot\dfrac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}}{\sinh^2\gamma} && (\because \text{上の}\tfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}) \\
&= \frac{\cosh\kappa\cdot\sinh\gamma}{\sinh^2\gamma} - \frac{\sinh\kappa\cdot\cosh\gamma\cdot\dfrac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}}{\sinh^2\gamma} && (\because \text{分母の等しい分数の差}) \\
&= \frac{\cosh\kappa\cdot\sinh\gamma}{\sinh^2\gamma} - \frac{\sinh\kappa\cdot\cosh\gamma\cdot\sinh\kappa}{\sinh\gamma\cdot\sinh^2\gamma} && (\because \text{分数の積}) \\
&= \frac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma} - \frac{\sinh\kappa\cdot\cosh\gamma\cdot\sinh\kappa}{\sinh\gamma\cdot\sinh^2\gamma} && (\because \text{約分}) \\
&= \frac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma} - \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma} && (\because \mathbb{R}\ \text{の乗法の交換律と冪の記法})
\end{aligned}
$$

(3) の証明。$\kappa\neq 0$ とする。まず $\sinh^2\gamma-\sinh^2\kappa\geq 0$ を示す。

$$
\begin{aligned}
\sinh^2\gamma-\sinh^2\kappa &= \left(2\sinh\tfrac{\gamma}{2}\cosh\tfrac{\gamma}{2}\right)^2-\left(2\sinh\tfrac{\kappa}{2}\cosh\tfrac{\kappa}{2}\right)^2 && (\because \text{主張 11.7 を}\gamma\ \text{と}\kappa\ \text{に}) \\
&= 4\sinh^2\tfrac{\gamma}{2}\cosh^2\tfrac{\gamma}{2}-4\sinh^2\tfrac{\kappa}{2}\cosh^2\tfrac{\kappa}{2} && (\because \text{積の 2 乗}) \\
&= 4\sinh^2\tfrac{\gamma}{2}\left(1+\sinh^2\tfrac{\gamma}{2}\right)-4\sinh^2\tfrac{\kappa}{2}\left(1+\sinh^2\tfrac{\kappa}{2}\right) && (\because \text{主張 3.21 (2) を}\tfrac{\gamma}{2}\ \text{と}\tfrac{\kappa}{2}\ \text{で移項}) \\
&= 4r^2(1+r^2)-4\sinh^2\tfrac{\kappa}{2}\left(1+\sinh^2\tfrac{\kappa}{2}\right) && (\because \sinh\tfrac{\gamma}{2}=r) \\
&= 4S(1+S)-4\sinh^2\tfrac{\kappa}{2}\left(1+\sinh^2\tfrac{\kappa}{2}\right) && (\because r^2=S) \\
&= 4\left(S-\sinh^2\tfrac{\kappa}{2}\right)\left(1+S+\sinh^2\tfrac{\kappa}{2}\right) && (\because \text{因数分解}S(1+S)-a(1+a)=(S-a)(1+S+a)) \\
&= 4\sin^2\tfrac{\theta}{2}\left(1+S+\sinh^2\tfrac{\kappa}{2}\right) && (\because S\ \text{の定義}) \\
&\geq 0 && (\because \text{実数の 2 乗は非負},\ S\geq 0)
\end{aligned}
$$

これで $\sinh^2\kappa\leq\sinh^2\gamma$ が示せた。次に $|\sinh\kappa|\leq\sinh\gamma$ を背理法で示す。$|\sinh\kappa|>\sinh\gamma$ と仮定すると、(2) の $\sinh\gamma>0$ より $|\sinh\kappa|>0$ であり、

$$
\begin{aligned}
\sinh^2\kappa &= |\sinh\kappa|^2 && (\because \text{実数の絶対値の 2 乗は 2 乗に等しい}) \\
&= |\sinh\kappa|\cdot|\sinh\kappa| && (\because \text{冪の記法}) \\
&> |\sinh\kappa|\cdot\sinh\gamma && (\because |\sinh\kappa|>\sinh\gamma\ \text{の両辺に正の}|\sinh\kappa|\ \text{を掛ける}) \\
&> \sinh\gamma\cdot\sinh\gamma && (\because |\sinh\kappa|>\sinh\gamma\ \text{の両辺に正の}\sinh\gamma\ \text{を掛ける}) \\
&= \sinh^2\gamma && (\because \text{冪の記法})
\end{aligned}
$$

となって $\sinh^2\kappa\leq\sinh^2\gamma$ に反する。よって $|\sinh\kappa|\leq\sinh\gamma$ である。

$$\begin{aligned}\left|\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\right| &= \left|\frac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}\right| && (\because \text{ 本主張 (2)})\\ &= \frac{|\sinh\kappa|}{\sinh\gamma} && (\because\ |a/b| = |a|/|b|,\ \sinh\gamma > 0)\\ &\le \frac{\sinh\gamma}{\sinh\gamma} && (\because\ |\sinh\kappa| \le \sinh\gamma,\ \sinh\gamma > 0)\\ &= 1 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則})\end{aligned}$$

(4) の証明。$(\theta,\kappa) \in [0,2\pi] \times [\kappa_1,\kappa_2]$ では、$\frac{\kappa}{2} \ge \frac{\kappa_1}{2} > 0$ と 主張 11.9・主張 3.21 (3) より $\sinh\frac{\kappa}{2} \ge \sinh\frac{\kappa_1}{2} > 0$ なので、

$$\begin{aligned}S &\ge \sinh^2\Big(\frac{\kappa}{2}\Big) && (\because\ S \text{ の定義と実数の 2 乗は非負})\\ &\ge \sinh^2\Big(\frac{\kappa_1}{2}\Big) && (\because\ \sinh\tfrac{\kappa}{2} \ge \sinh\tfrac{\kappa_1}{2} > 0)\\ &> 0 && (\because\ \sinh\tfrac{\kappa_1}{2} > 0)\end{aligned}$$

である。S は $\sinh, \sin$ の連続関数の和・積として連続、$\sqrt{\cdot}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}$ は $[\sinh^2(\frac{\kappa_1}{2}),\infty)$ 上連続、arcsinh は連続なので γ は連続。(2) の 2 つの式は、$\sinh\gamma = 2rt \ge 2r > 0$（$t \ge 1$）を分母にもつ連続関数の四則で書けているので連続である。 □

定理 20.14 ($\left|G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| \le \frac{6}{5} \quad \big(0 < |\kappa| \le \frac{1}{2}\big)$)**.** 主張 20.13 の $\gamma(\theta,\kappa)$ に対して

$$G(\kappa) := \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta,\kappa)\,d\theta$$

とおく（定理 19.17 の自由エネルギーの積分項そのものであり、等方な場合 主張 20.11 により κ だけの関数になる）。このとき $0 < |\kappa| \le \frac{1}{2}$ なる κ について G は 2 回微分可能で

$$\big|G'(\kappa)\big| \le \frac{1}{2}, \qquad \left|G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| \ \le\ \frac{6}{5}$$

が成り立つ。とくに $G''(\kappa) \to +\infty$（$\kappa \to 0$）であり、その発散は $\dfrac{1}{2\pi}\log\dfrac{1}{|\kappa|}$ と有界な差しかもたない ** 対数発散 ** である。

証明. 数値の評価。この証明は、初等関数の値の次の数値の評価を 注意 20.1 から持ち込み、示した桁までの不等式としてだけ使う: $\sinh\frac{1}{4} \le 0.2527$、$\cosh\frac{1}{4} \le 1.0315$、$\log\cosh\frac{1}{4} \le 0.0310$、$\cosh\frac{1}{2} \le 1.1277$、$0.6931 \le \log 2 \le 0.6932$、$\log(2\pi) \le 1.8380$。円周率は 注意 11.1 の $3.141592 \le \pi \le 3.141593$ を使い、有理数の大小比較から $\pi \le 3.1416$、$2\pi \ge 6.283184 \ge 6.2831$ である。$9.8696 \le \pi^2$ は 主張 11.30 のものである。主張 11.35 を $1\cdot 1 = 1$ に当てて $\log 1 = \log 1 + \log 1$、すなわち $\log 1 = 0$ であり、$2\pi > 1$ と 主張 12.22 より $\log(2\pi) > \log 1 = 0$ である。

Step 0（$\kappa > 0$ としてよいこと）。すべての実数 κ について、主張 20.5 から次の式を得る。

$$\begin{aligned}G(-\kappa) &= \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta,-\kappa)\,d\theta && (\because\ G \text{ の定義})\\ &= \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta,\kappa)\,d\theta && (\because \text{ 主張 20.5})\\ &= G(\kappa) && (\because\ G \text{ の定義}).\end{aligned}$$

ここから $\kappa < 0$ の場合を $\kappa > 0$ の場合に帰着できることを、合成関数の微分で明示しておく。$\kappa < 0$ のとき $-\kappa > 0$ なので、後述の Step 1 により G は $-\kappa$ で 2 回微分可能である。$G(\kappa) = G(-\kappa)$ の右辺は $\kappa \mapsto -\kappa$ と G の合成なので、合成関数の微分より G は κ でも微分可能で $G'(\kappa) = -G'(-\kappa)$。この等式の右辺をもう一度 κ で微分すると、同じく合成関数の微

分より $-(-1)G''(-\kappa) = G''(-\kappa)$ なので $G''(\kappa) = G''(-\kappa)$。したがって $G''(-\kappa) = G''(\kappa)$ かつ $|G'(-\kappa)| = |G'(\kappa)|$。$\log\frac{1}{|\kappa|}$ も偶関数なので、以下 $0 < \kappa \le \frac{1}{2}$ とする。$\delta := \sinh\bigl(\frac{\kappa}{2}\bigr) > 0$ とおくと 主張 3.21 (3) と 主張 11.9 より $0 < \delta \le \sinh\frac{1}{4} \le 0.2527$。

Step 1（微分と積分の交換）。主張 20.13 (4) より γ と $\partial_\kappa\gamma$ と $\partial_\kappa^2\gamma$ は $[0, 2\pi] \times [\kappa_1, \kappa_2]$（$0 < \kappa_1 \le \kappa \le \kappa_2$）上連続なので、(R5) を 2 回適用して

$$G'(\kappa) = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\,d\theta, \qquad G''(\kappa) = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta$$

主張 20.13 (3) の $|\partial_\kappa\gamma| \le 1$ と (R3) より、次の式鎖を得る。

$$\begin{aligned}
|G'(\kappa)| &= \left|\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\,d\theta\right| && (\because \text{ 主張 20.13 と微分積分交換 (R5)})\\
&\le \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \left|\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\right| d\theta && (\because \text{ 積分の三角不等式 (R3)})\\
&\le \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} 1\,d\theta && (\because \text{ 主張 20.13})\\
&= \frac{1}{4\pi}\cdot 2\pi && (\because \text{ 定数関数の積分 (R4)})\\
&= \frac{1}{2} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}$$

Step 2（半区間への折り返し）。$\sin\bigl(\frac{2\pi-\theta}{2}\bigr) = \sin\bigl(\pi - \frac{\theta}{2}\bigr) = \sin\frac{\theta}{2}$ なので、$\partial_\kappa^2\gamma$ は $\theta \mapsto 2\pi - \theta$ で不変である。(R6) を $u(s) = 2\pi - s$ に適用すると $\int_\pi^{2\pi} = \int_0^\pi$ となるので

$$\begin{aligned}
G''(\kappa) &= \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta && (\because \text{ 主張 20.13 と微分積分交換 (R5)})\\
&= \frac{1}{4\pi}\left(\int_0^{\pi} + \int_\pi^{2\pi}\right) \frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta && (\because \text{ 積分区間の分割 (R3)})\\
&= \frac{1}{4\pi}\left(\int_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\right) \frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta && (\because \theta \mapsto 2\pi - \theta \text{ の置換積分 (R6)})\\
&= \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta && (\because \mathbb{R} \text{ の四則と積分の線型性 (R3)}).
\end{aligned}$$

Step 3（2 つの項に分ける）。以下この証明の平方根はすべて 定義 1.4 の $\sqrt{\cdot}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}$ である。主張 20.13 (1)(2) より $\sinh\gamma = 2\sqrt{S(1+S)}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}$、$\cosh\gamma = 1 + 2S$、$S > 0$ であり、$S = \delta^2 + \sin^2\bigl(\frac{\theta}{2}\bigr)$ である（S の定義と δ の定義）。$r := \sqrt{S}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}$、$t := \sqrt{1+S}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}$ と置くと、定義 1.4 より $r, t \ge 0$、$r^2 = S$、$t^2 = 1 + S$ である。$r = 0$ なら $S = r^2 = 0$ となり $S > 0$ に反するので $r > 0$。$t < 1$ なら $1 + S = t^2 < 1$ となり $S > 0$ に反するので $t \ge 1$。主張 11.7 と 主張 20.13 (1) の $\sinh(\frac{\gamma}{2}) = r$、$\cosh(\frac{\gamma}{2}) = t$ より $\sinh\gamma = 2\sinh(\frac{\gamma}{2})\cosh(\frac{\gamma}{2}) = 2rt$ である。さらに $J := \int_0^\pi \frac{d\theta}{rt}$、$T := \int_0^\pi \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}\,d\theta$ とおく（r, t は θ の関数である）。このとき

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} \frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta &= \int_0^{\pi} \left(\frac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma} - \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}\right) d\theta && (\because \text{ 主張 20.13})\\
&= \int_0^{\pi} \left(\frac{\cosh\kappa}{2rt} - \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}\right) d\theta && (\because \sinh\gamma = 2rt)\\
&= \frac{\cosh\kappa}{2}\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{rt} - \int_0^{\pi} \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}\,d\theta && (\because \text{ 積分の線型性 (R3)})\\
&= \frac{\cosh\kappa}{2}\,J - T && (\because J, T \text{ の定義}).
\end{aligned}$$

Step 4（J の評価）。準備として、$\theta \in [0,\pi]$ なら $\frac{\theta}{2} \in [0,\frac{\pi}{2}]$ なので 定義 1.38 と 主張 1.37 より $0 \le \sin\frac{\theta}{2} \le 1$、したがって $\sin^2\frac{\theta}{2} \le 1$ である。これと 主張 3.21 を使う。

$$\begin{aligned} r^2 &= \delta^2 + \sin^2\!\left(\tfrac{\theta}{2}\right) && (\because\ r^2 = S \text{ と} S \text{ の表示}) \\ &\le \delta^2 + 1 && (\because\ \sin^2\tfrac{\theta}{2} \le 1) \\ &= \cosh^2\!\left(\tfrac{\kappa}{2}\right) && (\because\ \text{主張 3.21 (2)}). \end{aligned}$$

$r > \cosh(\frac{\kappa}{2})$ なら、主張 3.21 (1) の $\cosh(\frac{\kappa}{2}) > 0$ より両辺が正なので $r^2 > \cosh^2(\frac{\kappa}{2})$ となり直前の評価に反する。よって $r \le \cosh(\frac{\kappa}{2})$ である。また $t+1 \ge 2 > 0$、$t(t+1) \ge 1\cdot 2 = 2$ $(t \ge 1)$ である。各点で

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} - \frac{1}{rt} &= \frac{1}{r}\left(1 - \frac{1}{t}\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\ &= \frac{1}{r}\cdot\frac{t-1}{t} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &= \frac{1}{r}\cdot\frac{(t-1)(t+1)}{t(t+1)} && (\because t+1 \ge 2 > 0) \\ &= \frac{1}{r}\cdot\frac{t^2-1}{t(t+1)} && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\ &= \frac{1}{r}\cdot\frac{S}{t(t+1)} && (\because t^2 = 1+S) \\ &\le \frac{1}{r}\cdot\frac{S}{2} && (\because t(t+1) \ge 2,\ \tfrac{S}{r} > 0) \\ &= \frac{r^2}{2r} && (\because S = r^2) \\ &= \frac{r}{2} && (\because r > 0) \\ &\le \frac{\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{2} && (\because r \le \cosh(\tfrac{\kappa}{2})). \end{aligned}$$

鎖の中の $\frac{1}{r}\cdot\frac{S}{t(t+1)}$ は $r>0$、$S>0$、$t(t+1)>0$ より正なので、$0 \le \frac{1}{r} - \frac{1}{rt}$ でもある。この各点評価は ** 符号のついた片側の評価 ** である。(R3) の単調性を $[0,\pi]$ 上で使うと

$$\begin{aligned} 0 &\le \int_0^\pi \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{rt}\right) d\theta && (\because \text{直前の各点評価と積分の単調性 (R3)}) \\ &= \int_0^\pi \frac{d\theta}{r} - J && (\because J \text{ の定義と積分の線型性 (R3)}) \\ &\le \int_0^\pi \frac{\cosh(\kappa/2)}{2}\, d\theta && (\because \text{直前の各点評価と積分の単調性 (R3)}) \\ &= \frac{\pi}{2}\cosh\!\left(\frac{\kappa}{2}\right) && (\because \text{定数関数の積分 (R4)}). \end{aligned}$$

主張 11.48 を $\delta = \sinh(\frac{\kappa}{2})$ に適用し、$R_0 := \displaystyle\int_0^\pi \frac{d\theta}{r} - 2\log\frac{\pi}{\delta}$ とおく。このとき $0 \le R_0 \le \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$ である（B は 定義 11.46 のもの）。$R := J - 2\log\frac{\pi}{\delta}$ とおく。先に得た差の評価を使う。

$$\begin{aligned} R &= J - 2\log\frac{\pi}{\delta} && (\because\ R \text{ の定義}) \\ &= R_0 - \left(\int_0^\pi \frac{d\theta}{r} - J\right) && (\because\ R_0 \text{ の定義と} \mathbb{R} \text{ の四則}). \end{aligned}$$

直前の差の評価から下界を、主張 11.48 から上界をそれぞれ得る。

$$
\begin{aligned}
R &\geq -\left(\int_0^\pi \frac{d\theta}{r} - J\right) && (\because\ R_0 \geq 0)\\
&\geq -\frac{\pi}{2}\cosh\!\left(\frac{\kappa}{2}\right) && (\because\ \text{直前の差の評価}),\\
R &\leq R_0 && (\because\ \int_0^\pi \frac{d\theta}{r} - J \geq 0)\\
&\leq \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B && (\because\ \text{主張 11.48}).
\end{aligned}
$$

$$
J = 2\log\frac{\pi}{\delta} + R \qquad (\because\ R\ \text{の定義}).
$$

したがって $|R| \leq \max\left\{\frac{2\delta^2}{\pi^2} + B,\ \frac{\pi}{2}\cosh\!\left(\frac{\kappa}{2}\right)\right\}$ である。$\kappa \leq \frac{1}{2}$ のとき $\cosh(\frac{\kappa}{2}) \leq \cosh\frac{1}{4} \leq 1.0315$（主張 11.21）、$\delta \leq 0.2527$、$9.8696 \leq \pi^2$、$\pi \leq 3.1416$ なので

$$
\begin{aligned}
|R| &\leq \max\left\{\frac{2\cdot 0.2527^2}{9.8696} + 0.88,\ \frac{3.1416}{2}\cdot 1.0315\right\} && (\because\ \text{直前の}|R|\ \text{の評価と数値上下界。}B \leq 0.88\ \text{は 主張 11.47})\\
&\leq \max\{0.0130 + 0.88,\ 1.6203\} && (\because\ \text{有理数の四則})\\
&\leq 1.621 && (\because\ \text{有理数の大小比較}).
\end{aligned}
$$

Step 5（T の評価）。3/2 乗は 定義 11.43 のものである。Step 3 の r, t を使う。$S^{3/2} = S\,r = r^3$（定義 11.43 と $r^2 = S$）である。

$$
\begin{aligned}
\frac{\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma} &= \frac{1+2S}{(2rt)^3} && (\because\ \text{主張 20.13 と}\sinh\gamma = 2rt)\\
&= \frac{1+2S}{8\,r^3t^3} && (\because\ \text{積の冪})\\
&\leq \frac{2(1+S)}{8\,r^3t^3} && (\because\ 1+2S \leq 2+2S,\ 8r^3t^3 > 0)\\
&= \frac{2t^2}{8\,r^3t^3} && (\because\ t^2 = 1+S)\\
&= \frac{1}{4\,r^3t} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則})\\
&\leq \frac{1}{4\,r^3} && (\because\ t \geq 1,\ r > 0)\\
&= \frac{1}{4\,S^{3/2}} && (\because\ S^{3/2} = r^3).
\end{aligned}
$$

また 2 行目の値は $1 + 2S > 0$、$8r^3t^3 > 0$ なので正であり、$\sinh^2\kappa \geq 0$ と合わせて、

$$
\begin{aligned}
T &= \int_0^\pi \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}\,d\theta && (\because\ T\ \text{の定義})\\
&\geq \int_0^\pi 0\,d\theta && (\because\ \text{被積分関数} \geq 0\ \text{と積分の単調性 (R3)})\\
&= 0 && (\because\ \text{定数関数の積分 (R4)}).
\end{aligned}
$$

主張 11.34 より $\sin\!\left(\frac{\theta}{2}\right) \geq c_0\frac{\theta}{2} \geq 0$ なので、両辺を 2 乗して $S \geq w := \delta^2 + \frac{c_0^2\theta^2}{4} \geq \delta^2 > 0$。$\sqrt{w}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq r$（逆なら両辺が 0 以上なので $w > r^2 = S$ となり矛盾）から $w^{3/2} = w\sqrt{w}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq S\,r = S^{3/2}$、したがって $\frac{1}{S^{3/2}} \leq \frac{1}{w^{3/2}}$ である。(R3) と 主張 11.44（$a = c_0$）より

$$
\begin{aligned}
T &= \int_0^{\pi} \sinh^2\kappa \cdot \frac{\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}\, d\theta && (\because T \text{ の定義}) \\
&\le \int_0^{\pi} \sinh^2\kappa \cdot \frac{1}{4S^{3/2}}\, d\theta && (\because \text{直前の各点評価に} \sinh^2\kappa \ge 0 \text{ を掛け、(R3) の単調性}) \\
&= \frac{\sinh^2\kappa}{4} \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{S^{3/2}} && (\because \text{(R3) の線型性}) \\
&\le \frac{\sinh^2\kappa}{4} \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{\left(\delta^2 + \frac{c_0^2\theta^2}{4}\right)^{3/2}} && (\because \tfrac{1}{S^{3/2}} \le \tfrac{1}{w^{3/2}} \text{ と (R3) の単調性}) \\
&\le \frac{\sinh^2\kappa}{4} \cdot \frac{2}{c_0\delta^2} && (\because \text{主張 11.44}) \\
&= \frac{4\delta^2\cosh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{4} \cdot \frac{2}{c_0\delta^2} && (\because \text{主張 11.7 : } \sinh\kappa = 2\delta\cosh(\tfrac{\kappa}{2})) \\
&= \frac{2\cosh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{c_0} && (\because \delta > 0 \text{ と} \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\le \frac{2 \cdot 1.0315^2}{0.5887} && (\because \kappa \le \tfrac{1}{2},\ \cosh(\tfrac{\kappa}{2}) \le \cosh\tfrac{1}{4} \le 1.0315 \text{ (主張 11.21)},\ \text{主張 11.32} : c_0 \ge 0.5887) \\
&\le 3.615 && (\because \text{有理数の大小比較})
\end{aligned}
$$

Step 6（$\log\frac{\pi}{\delta}$ を $\log\frac{1}{\kappa}$ に直す）。主張 11.22 と 主張 11.23 を $\frac{\kappa}{2} \in \mathbb{R}_{\ge 0}$ に適用すると $\frac{\kappa}{2} \le \delta \le \frac{\kappa}{2}\cosh\frac{\kappa}{2}$ となる。正の数の逆数の順序と対数の単調性を順に使う。

$$
\begin{aligned}
\frac{2}{\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)} &\le \frac{\kappa}{\delta} && (\because\ \delta \le \frac{\kappa}{2}\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right),\ \kappa, \delta > 0) \\
&\le 2 && (\because\ \frac{\kappa}{2} \le \delta), \\
-\log\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) &= \log\frac{2}{\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)} - \log 2 && (\because\ \text{主張 11.35}) \\
&\le \log\frac{\kappa}{\delta} - \log 2 && (\because\ \text{直前の左辺の評価と主張 12.22}) \\
&\le \log 2 - \log 2 && (\because\ \text{直前の右辺の評価と主張 12.22}) \\
&= 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

$\rho := \log\frac{\kappa}{\delta} - \log 2$ とおく。直前の評価と 主張 11.21 を用いると、

$$
\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \le \cosh\tfrac{1}{4} \quad (\because\ 0 < \kappa \le \tfrac{1}{2} \text{ と主張 11.21}).
$$

$$
\begin{aligned}
\log\frac{\pi}{\delta} &= \log\frac{1}{\kappa} + \log\pi + \log\frac{\kappa}{\delta} && (\because\ \text{主張 11.35}) \\
&= \log\frac{1}{\kappa} + \log(2\pi) + \left(\log\frac{\kappa}{\delta} - \log 2\right) && (\because\ \text{主張 11.35}) \\
&= \log\frac{1}{\kappa} + \log(2\pi) + \rho && (\because\ \rho \text{ の定義}), \\
|\rho| &\le \log\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) && (\because\ -\log\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \le \rho \le 0) \\
&\le \log\cosh\tfrac{1}{4} && (\because\ \text{直前の評価と主張 12.22}) \\
&\le 0.0310 && (\because\ \text{数値の評価} \log\cosh\tfrac{1}{4} \le 0.0310).
\end{aligned}
$$

よって

$$\cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta}-\log\frac{1}{\kappa}=\cosh\kappa\left(\log\frac{1}{\kappa}+\log(2\pi)+\rho\right)-\log\frac{1}{\kappa}\qquad(\because\ \text{直前の}\log\tfrac{\pi}{\delta}\ \text{の表示})$$
$$=(\cosh\kappa-1)\log\frac{1}{\kappa}+\cosh\kappa\,(\log(2\pi)+\rho)\quad(\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配則}).$$

右辺第 1 項は、主張 11.6 と 主張 11.23 より

$$\begin{aligned}\cosh\kappa-1&=2\sinh^2\Big(\frac{\kappa}{2}\Big)&&(\because\ \text{主張 11.6})\\&\le 2\left(\frac{\kappa}{2}\cosh\frac{\kappa}{2}\right)^2&&(\because\ \text{主張 11.23 を}\tfrac{\kappa}{2}\ \text{に。両辺は0 以上なので 2 乗しても向きは保たれる})\\&\le 2\left(\frac{\kappa}{2}\cosh\frac{1}{4}\right)^2&&(\because\ \text{主張 11.21 と}0<\kappa\le\tfrac{1}{2})\\&\le 0.532\,\kappa^2&&(\because\ \cosh\tfrac{1}{4}\ \text{の数値上界}).\end{aligned}$$

次に $F(s):=-s^2\log s\,(s\in[\kappa,\frac{1}{2}])$ と置く。注意 11.1 の微分の公式（積・恒等関数・$\log'(x)=1/x$）より F は微分可能で $F'(s)=-2s\log s-s^2\cdot\frac{1}{s}=s\,(-2\log s-1)$ である。F' も同じ公式から微分可能なので、「微分可能な関数は連続である」より連続である。$0<s\le\frac{1}{2}$ なら 主張 12.22 と 主張 11.35（$\log\frac{1}{2}+\log 2=\log 1=0$）より $\log s\le\log\frac{1}{2}=-\log 2\le-0.6931$、したがって $-2\log s-1\ge 0.3862>0$ で $F'(s)>0$ である。また $\log\frac{1}{\kappa}=-\log\kappa$（主張 11.35 を $\kappa\cdot\frac{1}{\kappa}=1$ に）なので $\kappa^2\log\frac{1}{\kappa}=F(\kappa)$ である。$\frac{1}{\kappa}\ge 2>1$ と 主張 12.22 より $\log\frac{1}{\kappa}>\log 1=0$（$\log 1=0$ は数値の評価の段）、主張 11.20 より $\cosh\kappa-1\ge 0$ である。

$$\begin{aligned}\kappa^2\log\frac{1}{\kappa}&=F(\kappa)&&(\because\ \text{直前の式})\\&=F\big(\tfrac{1}{2}\big)-\int_\kappa^{1/2}F'(s)\,ds&&(\because\ \text{(R4) を}F\ \text{で})\\&\le F\big(\tfrac{1}{2}\big)-\int_\kappa^{1/2}0\,ds&&(\because\ F'\ge 0\ \text{と積分の単調性 (R3)})\\&=F\big(\tfrac{1}{2}\big)&&(\because\ \text{(R4) を定数関数0 で})\\&=\tfrac{1}{4}\log 2&&(\because\ F\ \text{の定義と}-\log\tfrac{1}{2}=\log 2)\\&\le 0.1733&&(\because\ \log 2\le 0.6932).\end{aligned}$$

これを使うと

$$\begin{aligned}0&\le(\cosh\kappa-1)\log\frac{1}{\kappa}&&(\because\ \cosh\kappa-1\ge 0,\ \log\tfrac{1}{\kappa}>0)\\&\le 0.532\,\kappa^2\log\frac{1}{\kappa}&&(\because\ \text{直前の}\cosh\kappa-1\ \text{の上界と}\log\tfrac{1}{\kappa}>0)\\&\le 0.532\cdot 0.1733&&(\because\ \kappa^2\log(1/\kappa)\le 0.1733)\\&\le 0.093&&(\because\ \text{有理数の大小比較}).\end{aligned}$$

第 2 項は $\cosh\kappa\le\cosh\frac{1}{2}\le 1.1277$（主張 11.21）、$\log(2\pi)\le 1.8380$ より

$$\begin{aligned}|\cosh\kappa\,(\log(2\pi)+\rho)|&\le\cosh\kappa\,(|\log(2\pi)|+|\rho|)&&(\because\ \cosh\kappa>0\ \text{と三角不等式})\\&\le 1.1277\,(1.8380+0.0310)&&(\because\ 0<\log(2\pi)\le 1.8380,\ \cosh\kappa\le 1.1277,\ |\rho|\le 0.0310)\\&\le 2.108&&(\because\ \text{有理数の大小比較}).\end{aligned}$$

以上を合わせると

$$\left|\cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta}-\log\frac{1}{\kappa}\right|\le 0.093+2.108 \quad (\because \text{直前の二項の上界と三角不等式})$$
$$= 2.201 \quad (\because \text{有理数の加法}).$$

Step 7（総合）。Step 2〜6 より

$$\begin{aligned}2\pi\,G''(\kappa) &= \frac{\cosh\kappa}{2}J - T && (\because \text{Step 2 と Step 3})\\ &= \frac{\cosh\kappa}{2}\left(2\log\frac{\pi}{\delta}+R\right)-T && (\because \text{Step 4 の} J \text{ の表示})\\ &= \cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta}+\frac{\cosh\kappa}{2}R-T && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則})\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}\left|2\pi\,G''(\kappa)-\log\frac{1}{\kappa}\right| &\le \left|\cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta}-\log\frac{1}{\kappa}\right|+\frac{\cosh\kappa}{2}|R|+|T| && (\because \text{直前の} G'' \text{ の表示と三角不等式})\\ &\le 2.201+\frac{1.1277}{2}\cdot 1.621+3.615 && (\because \text{Step 4、Step 5（}T\ge 0\text{ より }|T|=T\text{）、Step 6 の上界})\\ &\le 2.201+0.915+3.615 && (\because \tfrac{1.1277}{2}\cdot 1.621\le 0.915)\\ &= 6.731 && (\because \text{有理数の加法})\end{aligned}$$

$2\pi\ge 6.2831$ で割ると

$$\begin{aligned}\left|G''(\kappa)-\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{\kappa}\right| &= \frac{1}{2\pi}\left|2\pi G''(\kappa)-\log\frac{1}{\kappa}\right| && (\because 2\pi>0)\\ &\le \frac{6.731}{2\pi} && (\because \text{直前の総合評価})\\ &\le \frac{6.731}{6.2831} && (\because 2\pi\ge 6.2831)\\ &\le 1.08 && (\because \text{有理数の大小比較})\\ &\le \frac{6}{5} && (\because \text{有理数の大小比較}).\end{aligned}$$

上の評価と $\log(1/|\kappa|)\to+\infty$（$\kappa\to 0$）から

$$G''(\kappa)\ge\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}-\frac{6}{5} \quad (\because \text{直前の絶対値評価}),$$
$$\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}-\frac{6}{5}\longrightarrow+\infty \quad (\because \log(1/|\kappa|)\to+\infty,\ 2\pi>0).$$

□

定理 20.15 ($\left|\frac{d^2f}{dK^2}-\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa(K)|}\right|\le 45$)**.** 定理 19.17 の自由エネルギーを、等方な場合 $K_1=K_2=K\in\mathbb{R}_{>0}$ について

$$f(K):=\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right)+G(\kappa(K))$$

と書く（定理 20.14 の G と 主張 20.12 の $\kappa(K)$）。このとき $0<|K-K_c|\le\frac{1}{10}$ なる K について f は 2 回微分可能で

$$\left|\frac{d^2f}{dK^2}(K)-\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa(K)|}\right|\ \le\ 45$$

が成り立つ。さらに 主張 20.12 (5) より $3.53|K-K_c|\le|\kappa(K)|\le 4.72|K-K_c|$ なので

$$\left| \frac{d^2 f}{dK^2}(K) - \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} \right| \ \le \ 49$$

も成り立つ。とくに

$$\frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} - 49 \ \le \ \frac{d^2 f}{dK^2}(K) \ \le \ \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} + 49$$

であり、** 臨界点 $K \to K_c$（$\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$、主張 20.6）で $\dfrac{d^2 f}{dK^2} \to +\infty$ が係数 $\dfrac{8}{\pi}$ の対数発散として起こる **：

$$\lim_{K \to K_c} \frac{\dfrac{d^2 f}{dK^2}(K)}{\log \dfrac{1}{|K - K_c|}} = \frac{8}{\pi}$$

証明. Step 1（f が主張の形に書けること）。定理 19.17 の自由エネルギーは $\frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta$ であり、$K_1 = K_2 = K$ のとき 主張 20.11 より $\gamma(\theta) = \gamma(\theta, \kappa(K))$（主張 20.13 の記法）なので、積分項は $G(\kappa(K))$ に一致する。

Step 2（第 1 項の 2 階微分）。$\sinh 2K > 0$ なので

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dK} \left(\frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K) \right) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cosh 2K}{\sinh 2K} \quad (\because \log \text{ の微分と} (\sinh)' = \cosh) \\
&= \frac{\cosh 2K}{\sinh 2K} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
\frac{d^2}{dK^2} \left(\frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K) \right) &= \frac{2 \sinh 2K \cdot \sinh 2K - \cosh 2K \cdot 2 \cosh 2K}{\sinh^2 2K} \quad (\because \text{商の微分}) \\
&= \frac{2 \left(\sinh^2 2K - \cosh^2 2K \right)}{\sinh^2 2K} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
&= -\frac{2}{\sinh^2 2K} \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties (2)})
\end{aligned}$$

主張 20.12 (4) の $\sinh 2K \ge 0.7353$ より

$$\begin{aligned}
\left| \frac{d^2}{dK^2} \left(\frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K) \right) \right| &= \left| -\frac{2}{\sinh^2 2K} \right| \quad (\because \text{直前の二階微分の等式}) \\
&= \frac{2}{\sinh^2 2K} \quad (\because \sinh 2K > 0) \\
&\le \frac{2}{0.7353^2} \quad (\because \sinh 2K \ge 0.7353 \text{ と正数の逆数の単調性}) \\
&\le 3.70 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の有理数計算})
\end{aligned}$$

Step 3（第 2 項の 2 階微分）。$0 < |K - K_c| \le \frac{1}{10}$ のとき 主張 20.12 (2)(5) より $0 < |\kappa(K)| \le 0.472 \le \frac{1}{2}$ なので、定理 20.14 が適用できる。合成関数の微分より

$$\frac{d^2}{dK^2} G(\kappa(K)) = G''(\kappa(K))\, \kappa'(K)^2 + G'(\kappa(K))\, \kappa''(K) \qquad (\because \text{ 合成関数の微分を二度適用})$$

第 2 項は 定理 20.14 の $|G'| \le \frac{1}{2}$ と 主張 20.12 (4) の $|\kappa''| \le 9.19$ より

$$\begin{aligned}
\left|G'(\kappa(K))\,\kappa''(K)\right| &= \left|G'(\kappa(K))\right|\left|\kappa''(K)\right| \qquad (\because \text{絶対値の積の性質}) \\
&\le \frac{1}{2}\cdot 9.19 \qquad (\because \text{second_derivative_log_divergence と kappa_of_K_basic (4)}) \\
&\le 4.60 \qquad (\because \mathbb{R} \text{ の有理数計算}).
\end{aligned}$$

Step 4（κ'^2 を 16 に置き換える誤差）。主張 20.12 (5) の $\left|\kappa'(K)^2-16\right| \le 24.7|\kappa|$ と 定理 20.14 より

$$\begin{aligned}
\left|\left(\kappa'(K)^2-16\right)G''(\kappa)\right| &\le 24.7\,|\kappa|\left(\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}+\frac{6}{5}\right) \quad (\because \text{主張 20.12 (5) と定理 20.14}) \\
&= 24.7\left(\frac{1}{2\pi}\,|\kappa|\log\frac{1}{|\kappa|}+\frac{6}{5}|\kappa|\right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
&\le 24.7\left(\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{e}+\frac{6}{5}\cdot 0.472\right) \quad (\because |\kappa|\le 0.472 \text{ と下記の} |\kappa|\log\tfrac{1}{|\kappa|}\le\tfrac{1}{e}) \\
&\le 24.7\,(0.0586+0.5664) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の有理数評価}) \\
&\le 15.44 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の有理数計算})
\end{aligned}$$

ここで $x\log\frac{1}{x}$ は $(0,1]$ 上 $x=\frac{1}{e}$ で最大値 $\frac{1}{e}$ をとる（導関数 $\log\frac{1}{x}-1$ の符号）。

Step 5（主要項）。定理 20.14 より

$$\begin{aligned}
\left|16\,G''(\kappa)-\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| &= 16\left|G''(\kappa)-\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| \quad \left(\because \mathbb{R} \text{ の分配律と絶対値の積の性質}\right) \\
&\le 16\cdot\frac{6}{5} \qquad \left(\because \text{定理 20.14}\right) \\
&= 19.2 \qquad \left(\because \mathbb{R} \text{ の有理数計算}\right).
\end{aligned}$$

Step 6（総合）。Step 2〜5 と三角不等式より

$$\begin{aligned}
\left|\tfrac{d^2f}{dK^2}-\tfrac{8}{\pi}\log\tfrac{1}{|\kappa|}\right| &= \left|\tfrac{d^2}{dK^2}\left(\tfrac{1}{2}\log(2\sinh 2K)\right)+G'\kappa''+(\kappa'^2-16)G''+16G''-\tfrac{8}{\pi}\log\tfrac{1}{|\kappa|}\right| && (\because \text{Step 1 の表式、Step 3 の合成関数の微分と分配律}) \\
&\le \left|\tfrac{d^2}{dK^2}\left(\tfrac{1}{2}\log(2\sinh 2K)\right)\right|+\left|G'\kappa''\right|+\left|\left(\kappa'^2-16\right)G''\right|+\left|16G''-\tfrac{8}{\pi}\log\tfrac{1}{|\kappa|}\right| && (\because \mathbb{R} \text{ の三角不等式}) \\
&\le 3.70+4.60+15.44+19.2 && (\because \text{Step 2、Step 3、Step 4、Step 5 の評価}) \\
&= 42.94 && (\because \mathbb{R} \text{ の有理数計算}) \\
&\le 45 && (\because \mathbb{R} \text{ の有理数の順序})
\end{aligned}$$

Step 7（$|K-K_c|$ による表示）。主張 20.12 (5) より $3.53 \le \dfrac{|\kappa|}{|K-K_c|} \le 4.72$ なので、log の単調性より

$$\begin{aligned}
\left|\log\frac{1}{|\kappa|}-\log\frac{1}{|K-K_c|}\right| &= \left|\log\frac{|K-K_c|}{|\kappa|}\right| \quad \left(\because \log A-\log B=\log(A/B)\right) \\
&= \left|\log\frac{|\kappa|}{|K-K_c|}\right| \quad \left(\because \log(1/r)=-\log r\right) \\
&= \log\frac{|\kappa|}{|K-K_c|} \quad \left(\because 3.53\le|\kappa|/|K-K_c|\right) \\
&\le \log 4.72 \qquad \left(\because \text{主張 20.12 (5) と対数の単調性}\right) \\
&\le 1.5519 \qquad \left(\because \log 4.72\le 1.5519\right).
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
\left|\frac{d^2f}{dK^2}-\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|}\right| &\le \left|\frac{d^2f}{dK^2}-\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right|+\frac{8}{\pi}\left|\log\frac{1}{|\kappa|}-\log\frac{1}{|K-K_c|}\right| && (\because\ \mathbb{R}\text{ の三角不等式})\\
&\le 45+\frac{8}{\pi}\cdot 1.5519 && (\because\ \text{Step 6 と直前の評価})\\
&\le 45+3.96 && (\because\ 8\cdot 1.5519/\pi\le 3.96)\\
&\le 49 && (\because\ \mathbb{R}\text{ の有理数の順序}).
\end{aligned}$$

Step 8（極限）。$K\to K_c$ のとき $\log\frac{1}{|K-K_c|}\to+\infty$ なので、Step 7 の評価の各辺を $\log\frac{1}{|K-K_c|}>0$ で割ると

$$\begin{aligned}
0 &\le \left|\frac{\dfrac{d^2f}{dK^2}}{\log\dfrac{1}{|K-K_c|}}-\frac{8}{\pi}\right| && (\because\ \text{絶対値の非負性})\\
&\le \frac{49}{\log\dfrac{1}{|K-K_c|}} && (\because\ \text{Step 7 の評価を正の分母で割る}),\\
\frac{49}{\log\dfrac{1}{|K-K_c|}} &\xrightarrow[K\to K_c]{} 0 && (\because\ \log(1/|K-K_c|)\to+\infty).
\end{aligned}$$

（$|K-K_c|<\exp(-1)$ なら分母は正である。）これが主張の極限であり、同時に $\frac{d^2f}{dK^2}\to+\infty$ を与える。 □

主張 20.16 ($\sinh 2K_c=1$ と $\left|\frac{d^2f}{dK^2}(K)-\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|}\right|\le 49$)**.** $K\in\mathbb{R}_{>0}$（定義 12.2 の定義域が $\mathbb{R}_{>0}\times\mathbb{R}_{>0}$ であるため）について、主張 19.18 (3) の右辺を $K_1=K_2=K$ で取ったものを

$$f(K):=\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right)+\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta$$

と書く（$\gamma(\theta)$ は 定義 15.11 のもの。log は正の実数上の実対数で、$f(K)$ は $\mathbb{R}$ に住む。実対数と Riemann 積分による脱出）。このとき次が成り立つ。

- (1) 主張 20.12 の臨界点 K_c（$\sinh 2K_c=1$ で定めたもの）は $K_c=\frac{1}{2}\log\left(1+\sqrt{2}\right)\in\mathbb{R}_{>0}$（$\mathbb{R}$ に住むのは実対数の値であるため。実対数による脱出）を満たし、$\sinh 2K=1$ を満たす $K\in\mathbb{R}_{>0}$ は K_c だけである。
- (2) $0<|K-K_c|\le\frac{1}{10}$ なる $K\in\mathbb{R}_{>0}$ について、f は K で 2 回微分可能で $\left|\frac{d^2f}{dK^2}(K)-\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|}\right|\le 49$ である。

証明. (1) $u\in\mathbb{R}$ とする。

$$\begin{aligned}
\sinh u=1 &\iff u=\operatorname{arcsinh}(1) && (\because\ \text{主張 11.18})\\
&\iff u=\log\left(1+\sqrt{1^2+1}\right) && (\because\ \text{定義 11.16})\\
&\iff u=\log\left(1+\sqrt{2}\right) && (\because\ \mathbb{R}\text{ の四則})
\end{aligned}$$

主張 20.12 の K_c は $\sinh 2K_c=1$ を満たすので、$u=2K_c$ と $u=2K$ に当てはめると次を得る。

$$
\begin{aligned}
K_c &= \frac{1}{2}\log\left(1+\sqrt{2}\right) && \left(\because\ \sinh 2K_c = 1 \text{ と直前の同値}\right)\\
&> \frac{1}{2}\log 1 && \left(\because\ 1+\sqrt{2}>1 \text{ と実対数の狭義単調性}\right)\\
&= 0 && \left(\because\ \log 1 = 0\right),\\
\sinh 2K = 1 &\iff 2K = \log\left(1+\sqrt{2}\right) && \left(\because\ \text{直前の同値}\right)\\
&\iff K = K_c && \left(\because\ K_c = \tfrac{1}{2}\log(1+\sqrt{2})\right)
\end{aligned}
$$

(2) $\kappa(K)$ を 定義 20.8 のもの、G を 定理 20.14 のものとする。f は 定理 20.15 の f と一致する。

$$
\begin{aligned}
f(K) &= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta && \left(\because\ f \text{ の定義}\right)\\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta,\kappa(K))\,d\theta && \left(\because\ \text{主張 20.11 と主張 20.13 の記法}\right)\\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right) + G(\kappa(K)) && \left(\because\ \text{定理 20.14 の}G \text{ の定義}\right)
\end{aligned}
$$

右辺は 定理 20.15 の $f(K)$ の定義そのものである。したがって 定理 20.15 の二つ目の不等式が主張の不等式である（2 回微分可能であることも同じ定理が述べている）。 □