

## 9 Mayer–Vietoris 完全列 (2)

Mayer–Vietoris 完全列を用いて de Rham コホモロジーを計算する問題を並べる．ここでは「 $H_{\text{dR}}^k(M)$  を求めよ」とは「 $H_{\text{dR}}^k(M)$  のベクトル空間としての同型類を決定せよ」の意味（もっと有り体にいえば「 $H_{\text{dR}}^k(M)$  の次元を決定せよ」の意味）であり，微分形式を用いて具体的に記述せよということではない．

46. 実射影平面  $\mathbb{RP}^2$  を考える．球面  $S^2$  からの自然な射影を  $\pi: S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  で表す．  
 $S^2$  の赤道  $S^2 \cap \{z = 0\}$  の  $\pi$  による像を  $\mathbb{RP}^1$  と書く． $\mathbb{RP}^1$  は  $\mathbb{RP}^2$  の部分多様体で，もちろん  $S^1$  と微分同相である．さらに， $(0, 0, 1) \in S^2$  の  $\pi$  による像を  $p_0$  と書く．  
 (1)  $U = \mathbb{RP}^2 \setminus \mathbb{RP}^1$ ,  $V = \mathbb{RP}^2 \setminus \{p_0\}$  とおく．以下の 3 つのことを確かめよ．  
 (a)  $U$  は  $C^\infty$  可縮である．すなわち一点（のみからなる部分多様体）を  $C^\infty$  変位レトラクトとしてもつ．  
 (b)  $V$  は  $\mathbb{RP}^1$  を  $C^\infty$  変位レトラクトとしてもつ．[ヒント：問題 42.]  
 (c)  $U \cap V$  は  $S^1$  と微分同相な部分多様体を  $C^\infty$  変位レトラクトとしてもつ．  
 (2)  $H_{\text{dR}}^k(\mathbb{RP}^2)$  を  $k = 0, 1, 2$  について求めよ．
47.  $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$  の de Rham コホモロジー  $H_{\text{dR}}^k(M)$  を  $k = 0, 1, 2$  について求めよ．ただし  $p_i = (i, 0)$  とする．

実は，問題 47 で  $n$  点が一直線上に並んでいなくても結論は同じである．なぜだろうか．なおアイソトピー拡張定理によれば一般の  $n$  点に対する  $M$  と一直線上に並んだ  $n$  点に対する  $M$  は微分同相だが\*，その事実に頼らなくてもわかるはずだ．

類似の問題として，絹田村子『数字であそぼ。』5 巻（フラワーコミックスアルファ，小学館）135 ページに「 $\mathbb{R}^3$  からどの 2 本も互いに交わらない  $n$  本の直線を除いた空間の de Rham コホモロジーを求めよ」というものがでてくる．これも考えてみよう．

48.  $\mathbb{R}^3$  の平面  $z = 0$  上にある原点を中心とする単位円周を  $C$  とし， $M = \mathbb{R}^3 \setminus C$  とおく．  
 (1)  $M$  が， $\mathbb{R}^3$  から 1 本の直線とその上にない 1 点を除いて得られる  $\mathbb{R}^3$  の開集合  $N$  に微分同相であることを示せ．[ヒント：立体射影を 2 回用いる.]  
 (2)  $H_{\text{dR}}^k(M)$  を  $k = 0, 1, 2, 3$  について求めよ．
49.  $M = S^1 \times S^2$  とおく． $H_{\text{dR}}^k(M)$  を  $k = 0, 1, 2, 3$  について求めよ．

問題 49 は，K nneth の公式を使えば結論はすぐにえられるが，Mayer–Vietoris 完全列だけでもなんとかなると思う． $M = S^1 \times S^2$  の開被覆  $\{U, V\}$  を何通りも考えてみよ．

---

\*田村一郎『微分位相幾何学』（岩波書店）もしくは M. W. Hirsch, *Differential Topology*, Springer をみよ．

$T^n$  の de Rham コホモロジーの計算を,  $\mathbb{R}^n$  上の周期的な微分形式に関する計算に帰着して行うこともできる. ここでは  $n = 2$  に対する  $H_{\text{dR}}^1$  の場合を考えてみたい.

$\pi: \mathbb{R}^2 \rightarrow T^2 = S^1 \times S^1$  を

$$(s, t) \mapsto ((\cos 2\pi s, \sin 2\pi s), (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t))$$

で定義する. また,  $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$  に対し  $\mathbb{R}^2$  上の平行移動  $(x, y) \mapsto (x + m, y + n)$  を  $\tau_{(m, n)}$  であらわす.

任意の  $f \in C^\infty(T^2)$  に対し,  $\mathbb{R}^2$  への引き戻し  $F = \pi^* f = f \circ \pi$  は  $\tau_{(m, n)}$  に関して不変である. すなわち

$$F(x + m, y + n) = F(x, y). \quad (*)$$

逆に,  $(*)$  のとき  $F$  はある  $f \in C^\infty(T^2)$  に対する  $f \circ \pi$  に一致する (確認は各自にまかせる). 以上で

$$C^\infty(T^2) \rightarrow \{F \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \mid F \text{ は } (*) \text{ をみたす}\}, \quad f \mapsto f \circ \pi$$

という一対一対応がえられる.

また任意の  $\omega \in \Omega^1(T^2)$  に対し,  $\mathbb{R}^2$  への引き戻し  $\tilde{\omega} = \pi^* \omega \in \Omega^1(\mathbb{R}^2)$  を  $\varphi dx + \psi dy$  とあらわすと,  $\tau_{(m, n)}^* \tilde{\omega} = (\tau_{(m, n)}^* \circ \pi^*) \omega = (\pi \circ \tau_{(m, n)})^* \omega = \pi^* \omega = \tilde{\omega}$  より  $\varphi, \psi$  は

$$\varphi(x + m, y + n) = \varphi(x, y), \quad \psi(x + m, y + n) = \psi(x, y) \quad (**)$$

をみたす. 逆に,  $(**)$  のとき  $\varphi dx + \psi dy$  がある  $\omega \in \Omega^1(T^2)$  に対する  $\pi^* \omega$  に一致することもない. そうして

$$\Omega^1(T^2) \rightarrow \{\varphi dx + \psi dy \in \Omega^1(\mathbb{R}^2) \mid \varphi, \psi \text{ は } (**) \text{ をみたす}\}, \quad \omega \mapsto \pi^* \omega$$

という一対一対応がえられる.

50. (1)  $\omega \in \Omega^1(T^2)$  が閉形式なら  $\tilde{\omega} = \pi^* \omega$  も閉形式である. その理由を説明せよ. また, このとき  $\tilde{\omega} = \varphi dx + \psi dy$  とおけば  $\mathbb{R}^2$  全体で  $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial \psi}{\partial x}$  であることを示せ.
- (2)  $\omega \in \Omega^1(T^2)$  を閉形式とし,  $\tilde{\omega} = \varphi dx + \psi dy$  とおく.

$$p_\omega = \int_0^1 \varphi(s, y) ds, \quad q_\omega = \int_0^1 \psi(x, t) dt$$

がそれぞれ  $y, x$  に依存しない定数であることを示せ.

- (3)  $\omega \in \Omega^1(T^2)$  が閉形式ならば  $\tilde{\omega}$  も閉形式だが,  $H_{\text{dR}}^1(\mathbb{R}^2) = 0$  より  $\tilde{\omega}$  は完全形式で,  $dF = \tilde{\omega}$  をみたす  $F \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$  が存在する. そのような  $F$  を任意に一つとると,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= F(0, 0) + \int_0^x \varphi(s, 0) ds + \int_0^y \psi(x, t) dt \\ &= F(0, 0) + \int_0^y \psi(0, t) dt + \int_0^x \varphi(s, y) ds \end{aligned}$$

であることを示せ.

- (4) 上記の  $F$  が  $(*)$  をみたすためには,  $p_\omega = q_\omega = 0$  が必要十分であることを示せ.
- (5) 閉微分 1 形式の空間  $\text{Ker } d^{(1)} \subset \Omega^1(T^2)$  について写像  $\text{Ker } d^{(1)} \rightarrow \mathbb{R}^2, \omega \mapsto (p_\omega, q_\omega)$  を考えることにより,  $H_{\text{dR}}^1(T^2) \cong \mathbb{R}^2$  を示せ.