

2026 年度春夏学期 大阪大学 全学共通教育科目 線形代数学・同演義Ⅰ（理（数））

岩井雅崇 (大阪大学)

July 16, 2026 ver 1.01

Contents

0	ガイダンス	2
0	はじめに	6
1	平面や空間の線形変換 [教科書, 1 章]	6
1.1	幾何ベクトルと数ベクトル [教科書, 1.1 節]	6
1.2	線形写像の定義と例 [教科書, 1.2 節]	9
2	行列 [教科書, 2 章]	15
2.0	数について	15
2.1	行列と数ベクトルの演算 [教科書, 2.1 節]	18
2.2	行列の基本変形 [教科書, 2.2 節]	26
2.3	行列の簡約化や標準化と行列の階数 [教科書, 2.3 節]	28
2.4	行基本変形による連立 1 次方程式の解法 [教科書, 2.4 節]	31
2.5	基本変形による逆行列の計算 [教科書, 2.5 節]	35
3	行列式 [教科書, 3 章]	36
3.1	置換, 行列式の定義 [教科書, 3.1 節]	36
3.2	基本変形と行列式 [教科書, 3.2 節]	42
3.3	行列式に関する幾つかの定理 [教科書, 3.3 節]	44
3.4	余因子展開と余因子行列 [教科書, 3.4 節]	45
3.5	行列式の応用 [教科書, 3.5 節]	47
4	演習問題	50

0 ガイダンス

2026 年度春夏学期
大阪大学 全学共通教育科目 線形代数学・同演義Ⅰ (理 (数))
木曜 2・3 限 (10:30-12:00, 13:30-15:00) 場所 共 C206

岩井雅崇 (いわいまさたか)

基本的事項

- この授業は対面授業です。木曜 2 限 (10:30-12:00) に共 C206にて授業を行います。
- CLE に「授業の資料・授業の板書」などをアップロードしていきます。CLE が使えない場合でも授業ホームページ (https://masataka123.github.io/2026_summer_linear_algebra/) にアップロードしてます。

成績に関して

授業も演義もレポート (後述)・中間+期末試験 (後述) で成績をつける予定です。

- レポート 2 回. 20 点. 提出すれば点数を与えるつもりなので, 必ず提出してください. なおレポートは中間と期末の練習も兼ねています。
- 中間試験+期末試験 80 点 (以上). 割合はまだ考えていません.^a また中間試験ができなかった場合でも期末試験で挽回できるようにするので, 最後まで諦めないでください。

^a成績の平均をある程度に収めないといけない都合上, 試験の点数を今の時点であまり決められないです...

単位が欲しい方はレポートを必ず提出し, 中間試験と期末試験に必ず出席するようにしてください. なお通常時の授業・演義に出席点はございません. 授業・演義への出席は任意となります。

1. レポートに関して

次の日時にレポートを配布します. (予定)

- レポート 1 配布日時: 2026 年 5 月 21 日. レポート 1 締切: 2026 年 6 月 4 日 23:59:59 (日本標準時刻, GMT+9)
- レポート 2 配布日時: 2026 年 7 月 16 日. レポート 1 締切: 2026 年 7 月 30 日 23:59:59 (日本標準時刻, GMT+9)

配布したレポート問題に解答し, CLE にて提出してください. レポートに関する注意事項は以下の通りです。

- レポートで出した問題の何問かを中間試験や期末試験に数値や表現など少し変えて出す予定です.
- レポートにおいて, 答えのみならず, 答えを導出する過程をきちんと記してください.
- レポートは, 協力してといて良く, 本などなんでも参考して良い.
- レポートにおいて, 答えの丸写しが確認できた場合は加担した人全員の単位を不可にします.¹

要はレポート・演習は試験の練習だと思ってください.

2-1. 中間試験に関して

現時点での中間試験の予定は次のとおりです.

- 日時: 2026 年 6 月 4 日 木曜 2 限 (10:30-12:00) 10:15 までには着席してください.
- 場所: 共 C206 (授業の部屋)
- 持ち込みに関して: 無し
- 試験内容: (未定. 5/21 に詳しい範囲をいいます)

2-2. 期末試験に関して

現時点での期末試験の予定は次のとおりです.

- 日時: 2026 年 7 月 30 日 木曜 2 限 (10:30-12:00) (予定) 10:15 までには着席してください.
- 場所: 共 C206 (授業の部屋)
- 持ち込みに関して: 無し
- 試験内容: 授業・演習でやった範囲 (7/16 に詳しい範囲をいいます)

以上は予定であるため, 変更の可能性があります. もし変更する場合はホームページや CLE で連絡します. 正当な理由 (病気・忌引き) などで欠席する場合は必ず岩井 (masataka[at]math.sci.osaka-u.ac.jp) へ連絡してください. 代替手段で別途対応いたします.

2-3. 追試験に関して

中間試験・期末試験でよくない成績を取った人が受けることになります. 7/30 の試験が終了した後に, 岩井からのメールを受け取った人のみがこの試験を受けることになります. 詳細はメールを見てください.

- 日時: 2026 年 8 月 7 日 木曜 2 限 (10:30-12:00) (予定)
- 場所: 共 C206 (授業の部屋)

¹ 答えの丸写しとは何も考えずに他人のレポートをコピーする行為です. この行為を厳禁とする理由とは”レポートと演習で出した問題の何問か試験に出すと言う状況下で, そのようなことをやっても意味がなく, 時間の無駄だと思う”からです. 協力して解いた場合でも, 全く同じ解答になることは稀で, 表記など微妙にずれます.

まとめ

1. 単位が欲しい方はレポートに取り組み、中間・期末試験で成績が取れるくらいの点を取ること.
2. 単位を認定するくらいの成績が取れていない場合、容赦無く不合格を出します. ただし

全員が単位を取れるようなレポート・試験を作る予定です.

今回追試験もする予定です. 必ず単位を取ってください. 理由は1年の線形代数でつまづく
と今後の数学科の授業もつまづくからです.

3. 良い成績が欲しい人は試験で計算ミスをしないように心がけてください. (去年の工学部・経済学部の授業ではほとんど多くの人が解けて成績に差がつかないことがありました.)
4. 講義への出席は自由です. 授業資料・授業の板書を CLE や授業ホームページにアップロードするので, 自分の好きな方法で線形代数への理解を進めてください.²

その他

- 休講予定: 2026 年 5 月 28 日 (確定), 2025 年 6 月 25 日 (予定) 休講情報は KOAN・ホームページでもお知らせいたします.
- 授業の資料・授業の板書, 休講情報, 資料の修正などのため, こまめに CLE・ホームページを確認してください.
- 教科書は「朝倉政典・落合理・北山貴裕・田口雄一郎『数理情報・工学系のための数学教程基礎編2 線形代数』(培風館)を用いる. なお後期の太田 和惟先生の授業でも同じ教科書を用いる(と聞いています.)
- オフィスアワーを月曜 16:00-17:00 に設けています. この時間に私の研究室に来て構いません(ただし来る場合は前もって連絡してくれると助かります.)
- 岩井へメールする際は, masataka[at]math.sci.osaka-u.ac.jp にメールしてください. CLE でもメールできますが, すぐに気づかないかもしれません.

²理由としては「私は講義をするのが上手くない」と「もっと効率的な理解の方法があると思う」からです. この授業内容を理解するのに $1.5 \times 14 = 21$ 時間も本当にかかるのかと思います. (というか今の私は 90 分じっと講義を受けるのが好きではないです. 14 週に分けて講義を聞くのも好きではないです.) そして世の中には私よりもわかりやすい授業する人もいますので, そちらで理解を進めても良いと思います. 学び方は自由であり, その方法を制限するのは好きではありません. (つまり出席を取るのも好きではないです).

演義の進め方

いつもは演習問題を作っていましたが、今回は作っていません。代わりに演義時に教科書の演習問題を指定するので、その問題を解いてってください。(追加で問題を出すかも) 協力してといて良く、本などなんでも参考して良いです。演習問題を自由に解いてください。レポート問題を解いてもいいです。

詳細解答は下の培風館の教科書のページに載っております。教科書 ii ページにも記載があります。³わからないことがあれば岩井にどんどん聞いてください。



Figure 1: 教科書のページ

授業との振替

万が一授業の進度が悪い場合は演義の授業に講義を行います。次の日は 30 分ほど講義を行います。

- 2026 年 6 月 4 or 11 日 木曜 3 限. 中間試験の解説をするため
- 2026 年 7 月 30 日 木曜 3 限. 期末試験の解説をするかもしれません。(未定)

授業・演義に関して

今回は教科書通りに授業・演義をするので、できる人にとっては物足りないかもしれません。なのでできる人はどんどん別のことを勉強してってください。⁴

もし何を勉強すればわからない場合とか数学科でどう暮らせばわからない場合などは、数学科の先輩たちに聞いてみるのもありだと思います。なお私の授業後、理学部 E 棟 E404 教室木曜 4 限に”What is ... ?セミナー”が行われます。⁵ ティータイムではコーヒーや(ちょっといい)お菓子があります。そこで先輩たちに聞いてみるのも一つの手だと思います。



Figure 2: ”What is ... ?セミナー” のページ

³ 著者の落合先生から私にこのリンクを学生に教えて欲しいとメールがありました。

⁴ 逆にできない人は少なくとも演義にはきてください。13:30 開始なので寝過ごすことはないと思います。(たぶん)

⁵ 場所がわからない場合は岩井と一緒に行きましょう。

0 はじめに

このノートは岩井が授業する際に用いるメモです。この内容+教科書通りに説明していきます。[\[教科書, 例 2.2.2\] を見る](#)。など書いていますが, これは板書時のメモです。

なお例に関しては, 前の授業で使った内容を書いております。教科書の例はあまりフォローしていませんので, 授業の際に教科書を見てフォローしていきます。

授業と文字が違うかもしれません。また $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \lambda, \mu$ などのギリシャ文字をしばしば用います。

1 平面や空間の線形変換 [\[教科書, 1 章\]](#)

1.1 幾何ベクトルと数ベクトル [\[教科書, 1.1 節\]](#)

1.1.1 数ベクトル空間

以下 [\[教科書, 1 章\]](#) では実数の上で行う。⁶

定義 1 (実数・平面・空間・数ベクトル)。

- $\mathbb{R}$ で実数の集合を表す。 $\lambda \in \mathbb{R}$ で λ は実数 (の元・要素) であることを表す。 [\[教科書, 1.2 節\]](#) で詳しく述べる。
- $\mathbb{R}^2$ で平面をあらわし, $\mathbb{R}^2$ の元を 2 次元 (平面) 数ベクトルという。
- $\mathbb{R}^3$ で空間を表し, $\mathbb{R}^3$ の元を 3 次元 (空間) 数ベクトルという。 $\mathbb{R}^3$ の数ベクトルを以下のように表す。

$$(a_1, a_2, a_3) \quad \text{または} \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

また a や $\vec{a}$ のように略記する。

補足 2. 数ベクトルに関して, 横に並べるか縦に並べるかは状況によって異なる。例えば教科書などの本では (a_1, a_2, a_3) のように横に並べる。これは紙の印刷量を減らすためのように思う。資料や板書ではどちらも用いる。

また資料では a を用いるが, 板書では $\vec{a}$ を用いる。教科書では $[1, 2]$ のように鍵括弧を用いているが, が授業では $(1, 2)$ のように丸括弧を用いる。

補足 3. 幾何学的ベクトル⁷は数ベクトルを用いて表すことができる。(これは 17 世紀のデカルトによる発明らしい。)

⁶実数とは何か?となるのでこれに関しては後で説明を与える。

⁷有向線分 (線分に向きをつけたもの) を並行移動で移り合うものを同一視したもの

定義 4. $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ について和, 差, スカラー倍, 線形結合を次で定める.

- 和 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$.
- 差 $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$.
- スカラー倍 $\lambda \mathbf{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$.
- 線形結合 $\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$. 一般的に $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ と $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ についてその線形結合を $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n$ で表す.

1.1.2 内積

定義 5 (内積). $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ についてその内積を次で定義する.

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

命題 6 (内積の性質). 内積について次の性質がなりたつ.

- $(\mathbf{a} + \mathbf{a}', \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}) + (\mathbf{a}', \mathbf{b})$, $(\mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{b}') = (\mathbf{a}, \mathbf{b}) + (\mathbf{a}, \mathbf{b}')$
- $(\lambda \mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \lambda \mathbf{b}) = \lambda (\mathbf{a}, \mathbf{b})$
- $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{a})$
- $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0$ であり, 等号成立は $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ に限る

補足 7. 数ベクトル空間 $\mathbb{R}^3$ やその内積 $(\bullet, \bullet)$ は後期の授業で一般化・抽象化される. その抽象化によって n 次元ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ や, 関数の空間, 数列の空間などをベクトル空間として扱うことができる.

命題 8. $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ とする.

1. (ピタゴラスの定理) $\mathbf{a}$ の長さ (ノルム) $\|\mathbf{a}\|$ は以下で与えられる.

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

2. [教科書, 問題 1.1.1] $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ がなす角を θ とすると

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$

特に $\|a\| \neq 0$ かつ $\|b\| \neq 0$ のとき,

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{\|a\| \|b\|}$$

と表される. そして $a \cdot b = 0$ は, a, b が直交していること ($a \perp b$) と同値である.
よってユークリッド空間においては内積によって角度や長さも決まる.

1.1.3 外積

定義 9. $a = (a_1, a_2, a_3), b = (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ について, 外積 $a \times b$ を次で定める.

$$a \times b = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

幾何学的には a, b について外積 $a \times b \in \mathbb{R}^3$ で

- 長さは x, y の貼る平行四辺形の面積
- 向きは x から y に右ネジを回した時に進む向き⁸

として定義する.

例 10. $a = (3, 5, 0), b = (6, 1, 0)$ とすると

$$a \times b = \left(\begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 6 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} \right) = (0, 0, -27), \quad b \times a = \left(\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \right) = (0, 0, 27).$$

命題 11. [教科書, 問題 1.1.2]

- (1) $a \times b = -b \times a$
- (2) $(\lambda a) \times b = a \times (\lambda b) = \lambda(a \times b)$
- (3) $a \times (b + b') = a \times b + a \times b'$
- (4) $a \times a = 0$
- (5) 数ベクトル a と数ベクトル b がなす角を θ とするとき, $\|a \times b\| = \|a\| \|b\| \sin \theta$
- (6) $(a \times b, a) = (a \times b, b) = 0$

⁸右ネジの部分が“反時計回り”と同じく現代で通じるのか謎である. 現代的に言うとも“YouTube における高評価の手の形”ということである.

1.1.4 直線と平面のパラメーター表示

定義 12 (直線と平面のパラメーター表示). 1. 空間の異なる 2 点 a, b を通る直線はただ一つに定まり, パラメーター (変数) $t \in \mathbb{R}$ を用いて以下で表される.

$$x = a + (b - a)t$$

2. 空間内の一般の位置にある 3 点 a, b, c を通る平面はただ一つに定まり, パラメーター (変数) $s, t \in \mathbb{R}$ を用いて以下で表される.

$$x = a + (b - a)s + (c - a)t$$

空間内の一般の位置にある 3 点とはそれらの 3 点全てを通過する直線が存在しないこと. これは代数幾何・数論幾何で出てくる "general point" の言い方になぞらえている. (very general point という表現もある.)

例 13. 空間の点 $(1, 2, 3)$ を通り, 方向 $(0, 2, 1)$ を持つ直線のパラメーター表示は

$$x = 1, y = 2 + 2t, z = 3 + t$$

となる. まとめて書くなら以下のようになる.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 + 2t \\ 3 + t \end{pmatrix}$$

他にも [教科書, 問題 1.1.3-4] を参照.

1.2 線形写像の定義と例 [教科書, 1.2 節]

1.2.1 線形写像の定義

定義 14. S, S', S'' を集合とする.

- $x \in S$ を, x が S の元 (要素) であることとして定める.
- $x \in S$ に対し, S' の元をただ一つ対応させる規則のことを写像といい, $f: S \rightarrow S'$ と表す. $x \in S$ に対応させる S' の元を $f(x)$ とかく.
- 写像 $f: S \rightarrow S', g: S' \rightarrow S''$ について, 写像 $(g \circ f): S \rightarrow S''$ を $(g \circ f)(x) := g(f(x))$ で定め, 合成写像という.
- 写像 $f: S \rightarrow S$ を変換ともいう. (これは一般的でないかも)
- 写像 $id_S: S \rightarrow S$ を $id_S(x) = x$ で定まる. これを恒等写像・恒等変換という.

- 写像 $f: S \rightarrow S', g: S' \rightarrow S$ が

$$g \circ f = id_S \quad \text{かつ} \quad f \circ g = id_{S'}$$

を満たすとき, g を f の逆写像という. ($S' = S$ のときは逆変換という.) この g を f^{-1} とかく.

$:=$ は定義するという意味の記号である. $\stackrel{\text{def}}{=}$ とも使うことがある.

補足 15. この授業においては集合の定義はしない. 集合を単に”物の集まり”として定義すると, ”集合の集合”は集合ではないことがわかっている (ラッセルのパラドックス). なので集合を公理を満たすものとして定義する公理的集合論というものがある. が, かなり難しいのでこの授業では触れないことにする.⁹

例 16. $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ を $f(x) = x^2$ で定めると写像になる. $g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ を $g(x) = \sqrt{x}$ とすると g は f の逆変換となる.

一方で $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ の規則 f を $f(x) = \pm 1$ で定めると写像ではない.

定義 17 (1 次変換).

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

を $\mathbb{R}^2$ の 1 次変換という. 同様に

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ dx + ey + fz \\ gx + hy + iz \end{pmatrix}$$

を $\mathbb{R}^3$ の 1 次変換という.

[教科書, 2 章] でやる行列を用いれば次のようにかける. 2×2 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ として.

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$\mathbb{R}^3$ でも同様. このノートでは行列も使って書いておく.

⁹数学科の教員に公理的集合論に基づく集合の定義を聞いてもほぼ答えることができないと思う.

命題 18. f, g を $\mathbb{R}^2$ の 1 次変換とする. ($\mathbb{R}^3$ の 1 次変換でも同様)

1. [教科書, 命題 1.2.1] $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
2. [教科書, 命題 1.2.2] $g \circ f$ も 1 次変換である. (行列の積を用いて, 命題 64 のようにかける)

命題 19. [教科書, 命題 1.2.3] $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を 1 次変換 $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ とする.
 f が逆変換を持つ必要十分条件は $ad - bc \neq 0$ であること. このとき

$$f^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} dx - by \\ -cx + ay \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

で与えられる. 特に f が 1 次変換ならば f^{-1} も 1 次変換になる.

A が B の必要十分条件とは「 A ならば B 」と「 B ならば A 」が成り立つこと. 「 A と B は同値である」ともいう.

補足 20. [教科書, 2 章] でやる行列の言葉を用いると, A の逆行列を A^{-1} とすると, $f^{-1}(x) = A^{-1}x$ となる. また $ad - bc = \det A$ なので, 「 $\det A \neq 0$ は A が逆行列を持つ (A が正則) であることと同値」の 2 次の場合である.

1.2.2 1 次変換の例 (2 次元の場合)

以下 1 次変換の例をやる. 名前は覚えなくて良い.

例 21 (恒等変換). $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (単位行列) ならば $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ である. 何も変化しない変換 (恒等変換) である. 逆変換は $f^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ である.

例 22 (引き伸ばし変換). $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$ ならば $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \mu y \end{pmatrix}$ である. これは x 軸を λ 倍して y 軸を μ 倍するものである. 特に $\lambda = \mu$ ならば普通の相似拡大である. 例えば $\lambda = \mu = -1$ ならば 180 度回転となる.

$\lambda, \mu \neq 0$ ならば逆変換は $f^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^{-1}x \\ \mu^{-1}y \end{pmatrix}$ である.

例 23 (斜倒変換). $A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ならば $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + by \\ y \end{pmatrix}$ である. 逆変換は

$$f^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - by \\ y \end{pmatrix} \text{ である.}$$

例 24 (回転). θ を実数とし $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ ならば $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\cos \theta)x - (\sin \theta)y \\ (\sin \theta)x + (\cos \theta)y \end{pmatrix}$ である. これは反時計回りに θ 回転する変換である.¹⁰

逆変換は $f^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(-\theta)x - \sin(-\theta)y \\ \sin(-\theta)x + \cos(-\theta)y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\cos \theta)x + (\sin \theta)y \\ -(\sin \theta)x + (\cos \theta)y \end{pmatrix}$ である.

次は教科書では 3 次元のところに書いてあったが, 2 次元の場合でも使うので書いておく.

例 25 (y 軸に関する鏡映・折り返し). $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ならば $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ y \end{pmatrix}$ である. これは y 軸に関する鏡映と呼ばれる. y 軸に関して鏡のように反転する変換である.

例 26 (鏡映・折り返し変換). 直線 l の法線ベクトルを $u \in \mathbb{R}^2$ とする. l に関する折り返し変換 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を

$$f(x) = x - 2 \frac{(u, x)}{(u, u)} u$$

とする. これは 1 次変換となる.

実際 $l: y = mx$ となる $m \in \mathbb{R}$ がある場合は $u = (m, -1)$ とすると

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1-m^2}{1+m^2} & \frac{2m}{1+m^2} \\ \frac{2m}{1+m^2} & -\frac{1-m^2}{1+m^2} \end{pmatrix}$$

として

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1-m^2}{1+m^2} & \frac{2m}{1+m^2} \\ \frac{2m}{1+m^2} & -\frac{1-m^2}{1+m^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

で与えられる. 特に x 軸に関する鏡映は $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$ である.

$f \circ f = id_{\mathbb{R}^2}$ なので, $f^{-1} = f$ である.

命題 27. [教科書, 命題 1.2.4 (岩澤分解)] 1 次変換 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ が逆変換を持つならば, 引き伸ばし変換 f_1 , 斜倒変換 f_2 , 回転変換 f_3 を用いて

$$f = \underbrace{f_3}_{\text{回転変換}} \circ \underbrace{f_1}_{\text{引き伸ばし変換}} \circ \underbrace{f_2}_{\text{斜倒変換}}$$

¹⁰ 反時計周りとは左回りのこと. 今の時代の時計はデジタル時計なので, この表現はあと 20 年で廃れると思う. なのでここは阪大らしく「大阪環状線での内回り (京橋から大阪に最短で行く方向)」として定義する. なおこの表現は電車が廃れると意味をなさなくなる.

証明は行列の積を終えたあと、追加問題で扱う。

補足 28. 本当の岩澤分解は、「任意の正則行列が直交行列, 対角行列, 対角行列が 1 である上三角行列の積で表せられる」ということ。¹¹ そのため教科書と順番をちょっと変えた。

1.2.3 1 次変換の例 (3 次元の場合)

命題 29. [教科書, 命題 1.2.5]

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ dx + ey + fz \\ gx + hy + iz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

とする. f が逆変換を持つ必要十分条件は

$$aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi \neq 0$$

が成り立つことである.

これは $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ とするとき

$$\det A = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

であるので, $aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi \neq 0$ という条件は $\det A \neq 0$ という条件になる.

実は $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$ なので, $ad - bc \neq 0$ という条件も $\det A \neq 0$ と同じである.

例 30. a, e, i を 0 でない実数として,

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ ey \\ iz \end{pmatrix}$$

x 軸に a 倍, y 軸に e 倍, z 軸に i 倍する 1 次変換

例 31.

$$f_\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \cos \alpha - z \sin \alpha \\ y \sin \alpha + z \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad g_\beta \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \beta - z \sin \beta \\ y \\ x \sin \beta + z \cos \beta \end{pmatrix}, \quad h_\gamma \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \gamma - y \sin \gamma \\ x \sin \gamma + y \cos \gamma \\ z \end{pmatrix}.$$

¹¹https://tyamada1093.web.fc2.com/math/files/LAKobe2024_Gex.pdf

これは各々 x 軸, y 軸, z 軸を回転軸とする回転である。¹²

例 32 (鏡映・折り返し変換). 平面 H の法線ベクトルを $u \in \mathbb{R}^3$ とする. H に関する折り返し変換 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を

$$f(x) = x - 2 \frac{(u, x)}{(u, u)} u$$

とする. これは 1 次変換となる. (これは線形変換になるから)

定義 33 (固有値・固有ベクトル). 1 次変換 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ について, ある実数 α があって $f(v) = \alpha v$ となるとき, α を f の固有値といい, v を f の固有ベクトルという.

本当は” α は複素数”の方がいい. これに関しては後期に詳しく習う.

例 34. (1). $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ ey \\ iz \end{pmatrix}$ の固有値は a, e, i で固有ベクトルはそれぞれ $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ である.

(2). 回転行列に関して. $\mathbb{R}^2$ の場合は $\theta = n\pi$ を除いて実数の固有値をもたない. (固有値が実数ではない複素数になる.) $\mathbb{R}^3$ の場合は $\theta = n\pi$ を除いて固有値 1 と複素数の固有値 2 つを持つ.

(3) 折り返し変換に関して. H の法線ベクトルが固有値-1, H 内の点 P についてベクトル $p = \vec{OP}$ に関する固有値は 1 となる. この三つに尽きる.

1.2.4 線形変換

定義 35 (線形変換). 変換 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ が線形変換であるとは $a, b \in \mathbb{R}^2$ と $\lambda \in \mathbb{R}$ について次が成り立つこと

$$1. f(a + b) = f(a) + f(b)$$

$$2. f(\lambda a) = \lambda f(a)$$

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ に関しても同様に定める.

定理 36. [教科書, 定理 1.2.6] 変換 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ が線形変換であることは, 1 次変換であることと同値である.

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ に関しても同様である.

¹²教科書には「 f_α は x 軸を回転軸として x 軸の正の方向から負の方向を向いたときに時計まわりに角度 α だけ回転させる 1 次変換である。」と書いてあったがこれ間違っていないですかね?

2 行列 [教科書, 2章]

2.0 数について

[教科書, 2.1 節] で次の記述がある.

本書で”数”というときは加減乗除が考えられる集合の元のことをさす. 専門用語でいうと, ある一つ決めた体 K を想定していて, 数とはその体 K の元を考えている. (中略) 本書における定理や証明などの議論は 1・7・8 章を除き (つまり 2-6 章) 任意の体 K で成り立つ.

この体 K についてももう少し深くみていく. なお 2-3 年の授業で詳しくやるので

現時点でわからなければ K は実数 (たまに有理数・複素数) と思って良い!

2.0.1 整数・有理数・実数などの略記に関して

以下次の略記をする.

- $\mathbb{N}$ 0以上の整数の集合 (場合によっては自然数の集合ともいう). 英語の Natural number から.
- $\mathbb{Z}$ 整数の集合. ドイツ語の Zahlen(数) から.
- $\mathbb{Q}$ 有理数の集合. Quotient(商) から来ている
- $\mathbb{R}$ 実数の集合. 英語の Real number から.
- $\mathbb{C}$ 複素数の集合. 英語の Complex number から.

これらがどのように構成されるかは後で説明を加える.

2.0.2 環・体の定義

定義 37 (環 (ring)). 空でない集合 R について, 二項演算の加法 $+: R \times R \rightarrow R$ と乗法 $\bullet: R \times R \rightarrow R$ があって以下の条件を満たすとき, R を 環 (ring) という.

1. (和の交換法則) $a, b \in R$ について, $a + b = b + a$
2. (和の結合法則) $a, b, c \in R$ について, $(a + b) + c = a + (b + c)$
3. (ゼロ元の存在) ゼロ元と呼ばれる $0 \in R$ があって, 任意の $a \in R$ について, $a + 0 = 0 + a = a$
4. (和の逆元の存在) 任意の $a \in R$ について, ある $b \in R$ があって, $a + b = b + a = 0$. この b を $-a$ とかく.
5. (積の結合法則) $a, b, c \in R$ について, $(a \bullet b) \bullet c = a \bullet (b \bullet c)$
6. (単位元の存在) 単位元と呼ばれる $1 \in R$ があって, 任意の $a \in R$ について, $a \bullet 1 = 1 \bullet a = a$.

7. (分配法則) $a, b, c \in R$ について, $a \bullet (b + c) = a \bullet b + a \bullet c, (a + b) \bullet c = a \bullet c + b \bullet c$
 任意の $a, b \in \mathbb{R}$ について $a \bullet b = b \bullet a$ となる環を可換環 (commutative ring) といい, そうでない環を非可換環 (non-commutative ring) という.

例 38. 整数 $\mathbb{Z}$ は可換環である. 一方 0 以上の整数の集合 $\mathbb{N}$ は環ではない. (モノイドと呼ばれるものになる.)

例 39. 後にやる n 次正方行列は環の構造を持つ. (71 参照) $n \geq 2$ ならば非可換環である.

定義 40 (体 (field)). 環 K が次を満たすとき, 体 (field) という.

- 8. (積の交換法則) $a, b \in K$ について, $a \bullet b = b \bullet a$
- 9. (積の逆元の存在) 0 でない任意の $a \in K$ について, ある $b \in K$ があって, $a \bullet b = b \bullet a = 1$. この b を a^{-1} とかく.

2.0.3 体の例

例 41 (自明な体). $R = \{0\}$ として $+, \bullet$ を

$$0 + 0 = 0 \bullet 0 = 0$$

とすれば体となる. (が面白くないのでこれは考えないことが多い)

例 42. 有理数体 $\mathbb{Q}$, 実数体 $\mathbb{R}$, 複素数体 $\mathbb{C}$ は体である. 整数の集合 $\mathbb{Z}$ は体ではない.

例 43. $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ について, 加法 $+$ と乗法 $\bullet$ を次で定義する.

- $a, b \in \mathbb{F}_2$ について $a + b := (a \text{ たす } b \text{ を } 2 \text{ で割ったあまり})$.
- $a, b \in \mathbb{F}_2$ について $a \bullet b := (a \text{ かける } b \text{ を } 2 \text{ で割ったあまり})$.

これによって, $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ は体となる. 例えば $1^{-1} = -1 = 1$ である.

例 44. $\mathbb{F}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ について, 加法 $+$ と乗法 $\bullet$ を次で定義する.

- $a, b \in \mathbb{F}_5$ について $a + b := (a \text{ たす } b \text{ を } 5 \text{ で割ったあまり})$.
- $a, b \in \mathbb{F}_5$ について $a \bullet b := (a \text{ かける } b \text{ を } 5 \text{ で割ったあまり})$.

これによって, $\mathbb{F}_5$ は体となる.

例えば次がわかる.

$$-0 = 0, -1 = 4, -2 = 3, -3 = 2, -4 = 1$$

$$1^{-1} = 1, 2^{-1} = 3, 3^{-1} = 2, 4^{-1} = 4$$

例 45. 一般に素数 p について, $\mathbb{F}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ として, 加法 $+$ と乗法 $\bullet$ を次で定義する.

- $a, b \in \mathbb{F}_p$ について $a + b := (a \text{ たす } b \text{ を } p \text{ で割ったあまり})$.
- $a, b \in \mathbb{F}_p$ について $a \bullet b := (a \text{ かける } b \text{ を } p \text{ で割ったあまり})$.

これによって, $\mathbb{F}_p$ は体となる. この場合一番非自明なのは, a^{-1} の存在であるがそれは次のフェルマーの小定理からわかる.

定理 46 (フェルマーの小定理). p を素数とする. $1 \leq a \leq p-1$ となる整数について $a^{p-1} - 1$ は p で割り切れる. 特に a^{p-2} を p で割った余りが $\mathbb{F}_p$ における a の積の逆元である.

例 47. $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ について, 加法 $+$ と乗法 $\bullet$ を次で定義する.

- $a, b \in \mathbb{F}_4$ について $a + b := (a \text{ 足す } b \text{ を } 4 \text{ で割ったあまり})$.
- $a, b \in \mathbb{F}_4$ について $a \bullet b := (a \text{ かける } b \text{ を } 4 \text{ で割ったあまり})$.

しかし $\mathbb{F}_4$ は体にならない. 2 の積の逆元が存在しないためである.

2.0.4 実数の構成方法

自然数・整数・有理数・実数の構成は難しい. 尾畑伸明先生の 2022 年度解析学入門のノート 1

- https://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata/student/subject/TaikeiBook/Taikei-Book_15.pdf
- https://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata/student/subject/TaikeiBook/Taikei-Book_16.pdf

に詳細があるので気になる人は参照してほしい. (がそこまで重要ではない)

簡潔にまとめると次の通り.

- $\mathbb{N}$ の構成は, 集合論的に行う. ここが一番難しい. (学部でも習わないかも)
- $\mathbb{Z}$ の構成は, $\mathbb{N}$ がモノイドなので, 可換モノイドから群を作る方法 (グロタンディークの構成) を用いる. (学部でも習わないかも)
- $\mathbb{Q}$ の構成は, 環の局所化 (localization) を用いる. これは”分数”の一般化である (学部 3 年に習う)
- $\mathbb{R}$ の構成は, 距離空間の完備化を用いる. (学部 2 年に習う) より詳しくいうと $\mathbb{Q}$ の距離を

$$d(a, b) := |a - b|$$


と定義したときの完備化として $\mathbb{R}$ は特徴づけられる.

- $\mathbb{C}$ の構成は, $\mathbb{R}$ の代数的閉包をとる. (学部3年に習う) $\mathbb{R}$ を含む体 K で次を満たすものとして特徴づけられる.

- (代数拡大) 任意の $\alpha \in K$ について, $\mathbb{R}$ 係数の多項式 $f(x)$ があって, $f(\alpha) = 0$
- (代数的に閉じている) K 係数多項式 $g(x)$ について, ある $\gamma \in K$ があって $g(\gamma) = 0$

2 個めに関しては代数学の基本定理とも呼ばれる. この証明は2年の複素解析で習う.

この構成から外れた体もいっぱいある. 例えば $\mathbb{Q}$ の代数的閉包 $\overline{\mathbb{Q}}$ なども考えられる.(代数的数・超越数はこの話.) また $\mathbb{Q}$ に p 進距離 $d_p(\bullet, \bullet)$ を入れた完備化 $\mathbb{Q}_p$ もある.



2.1 行列と数ベクトルの演算 [教科書, 2.1 節]

2.1.1 数ベクトル・数ベクトル空間

以下断りがなければ, 体 K 上を考える.

定義 48. K を体とし, $n \geq 1$ なる自然数について

$$(x_1, \dots, x_n)$$

を n 次元の数ベクトル といい, その集合を

$$K^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_1, \dots, x_n \in K\}$$

といい数ベクトル空間という.

また原点に対応するもの $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$ を ゼロベクトル という.

基本単位ベクトル e_i を, i 番目のみ 1 で他は 0 である数ベクトル, つまり

$$e_i = (0, \dots, \underbrace{1}_i, \dots, 0)$$

で定める. ここで $i = 1, 2, \dots, n$ である.

例えば $\mathbb{R}^2$ は平面をあらわし, $\mathbb{R}^3$ は空間を表す. また 1 章と同様, 数ベクトルに関して, 横に並べるか縦に並べるかは状況によって異なる. 板書ではどちらも用いる.

数ベクトル空間に関しては後期の内容だが, 今ここでも触れておく.

定義 49. $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n) \in K^n, \alpha, \beta \in K$ について和, 差, スカラー倍,

- 和 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$.
- 差 $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_1 - b_1, \dots, a_n - b_n)$.
- スカラー倍 $\alpha \mathbf{a} = (\alpha a_1, \dots, \alpha a_n)$.
- 線形結合 $\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}$ とする. 一般的に $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ と $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ についてその線形結合を $\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{a}_n$ で表す.

補足 50. $\mathbf{x} \in K$ は n 個の基本単位ベクトルの線形結合で表される. 具体的には次であらわされる

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

2.1.2 行列の定義

定義 51 (行列). m, n を正の整数とする.

- $m \times n$ 個の数 (K の元) a_{ij} ($i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$) を

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

のように並べたものを $m \times n$ の行列, (m, n) 型行列, m 行 n 列の行列という.

- 上の行列を A としたとき, a_{ij} を行列 A の (i, j) 成分という. 行列 A を (a_{ij}) や $(a_{ij})_{m \times n}$ と略記することもある.
- $(a_{i1} \ \cdots \ a_{in})$ を A の行といい, 上から第 1 行, 第 2 行, $\dots$, 第 m 行という.
- $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$ を A の列といい, 上から第 1 列, 第 2 列, $\dots$, 第 n 列という.
- $m = n$ のとき, n 次正方行列という.
- $M_{m,n}(K)$ を $m \times n$ の行列の集合とする. $M_n(K)$ を n 次正方行列の集合とする.

• $(a_1, \dots, a_n)$ を行ベクトル, $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ を列ベクトルともいう.

最初の添字 i が行 (横のカウンター) を表し, 二つ目の添字 j が列 (縦のカウンター) を表す.

2.1.3 行列の足し算・引き算

定義 52 (行列の和と差).

$m \times n$ 行列 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$ とする.

このとき行列の和 $A + B$ と差 $A - B$ を次で定める.

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

$$A - B = \begin{pmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} & \cdots & a_{1n} - b_{1n} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} & \cdots & a_{2n} - b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} - b_{m1} & a_{m2} - b_{m2} & \cdots & a_{mn} - b_{mn} \end{pmatrix}.$$

例 53. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 8 \\ 2 & 5 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ とする.

このとき $A + B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 9 \\ 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $A - B = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 7 \\ -1 & 6 & -3 \end{pmatrix}$ である.

例 54. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$ とする.

このとき $A + B = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$, $A - B = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$ である.

例 55. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 6 & 7 \end{pmatrix}$ とする. このとき $A + B$ は型が違うため定義されない.

2.1.4 行列のスカラー倍

定義 56 (行列のスカラー倍).

$m \times n$ 行列 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ とし, c を数とする (c をスカラーとも呼ぶ).

A の c 倍 cA を次で定める.

$$cA = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & \cdots & ca_{1n} \\ ca_{21} & ca_{22} & \cdots & ca_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{m1} & ca_{m2} & \cdots & ca_{mn} \end{pmatrix}.$$

例 57. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 8 \\ 2 & 5 & -1 \end{pmatrix}$, $c = 3$ とする. このとき $cA = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 24 \\ 6 & 15 & -3 \end{pmatrix}$ である.

2.1.5 行列の積

ここ難しいので 2×2 行列の積を最初に定義するかも.

定義 58 (行列の積). $m \times n$ 行列 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ と $n \times l$ 行列 $B = (b_{jk})_{n \times l}$ とする. このとき A と B の積 AB は $m \times l$ 行列で, 次の式で定義される.

$$AB = (c_{ik})_{m \times l} \text{としたとき, } c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}.$$

例 59. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ とする.

A は 2×2 行列で B は 2×1 行列なので, 行列の積 AB が 2×1 行列として定義でき,

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 5 + 2 \times 1 \\ 4 \times 5 + 3 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 23 \end{pmatrix}.$$

例 60. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ とする.

A は 2×2 行列で B は 2×2 行列なので, 行列の積 AB が 2×2 行列として定義でき,

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 5 + 3 \times 2 & 2 \times 2 + 3 \times 3 \\ 1 \times 5 + 4 \times 2 & 1 \times 2 + 4 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 13 \\ 13 & 14 \end{pmatrix}.$$

また B は 2×2 行列で A は 2×2 行列なので、行列の積 BA が 2×2 行列として定義でき、

$$BA = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 23 \\ 7 & 18 \end{pmatrix}.$$

よって行列の積に関して $AB = BA$ とは限らない ($AB \neq BA$ となることがある).

例 61. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}$ とする.

A は 1×3 行列で B は 3×1 行列なので、行列の積 AB が 1×1 行列として定義でき、

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix} = (1 \times 5 + 2 \times 7 + 3 \times 2) = (5 + 14 + 6) = (25).$$

例 62. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -5 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ とする.

A は 2×3 行列で B は 1×4 行列であるので、行列の積 AB は定義されない.

問題 63. 次の行列 A, B, C において、 AB, BA, BC, CB, CA, AC の 6 個のうち積が定義される全ての組み合わせを求め、その積を計算せよ.

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

命題 64. 2×2 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ とする. $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ として、1 次変換

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Ax = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix} \quad g \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Bx = \begin{pmatrix} px + qy \\ rx + sy \end{pmatrix}$$

について $g \circ f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ も 1 次変換で

$$g \circ f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (BA)x$$

で与えられる.

2.1.6 特別な行列

定義 65 (転置行列). 行列 A の行と列を入れ替えた行列を転置行列と言い tA とかく.
 A が $m \times n$ 行列なら tA は $n \times m$ 行列となり, $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ とし, ${}^tA = [b_{ij}]_{n \times m}$ と成分表示するとき, $b_{ij} = a_{ji}$ となる.

例 66. $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ についてその転置行列は ${}^tA = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$ であり, ${}^t({}^tA) = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = A$ である.

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ についてその転置行列は ${}^tA = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ であり, ${}^t({}^tA) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = A$ である.

命題 67 (転置行列の性質).

- ${}^t({}^tA) = A$.
- [教科書, 問題 2.1.10] ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$

定義 68. • $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, (0), \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ のように全ての成分が 0 の行列をゼロ行列という. $m \times n$ のゼロ行列を $O_{m,n}$ とかく.(たまに O ともかく)

- n 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

について, $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ を A の対角成分という.

- 対角成分以外 0 の行列を対角行列という. 例えば以下の行列は対角行列である:

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, (3), \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

- 対角成分が全て 1 な n 次対角行列を単位行列と言い, E_n とかく. (たまに E ともかく)

例えば以下の行列は単位行列である:

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, E_1 = (1), E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- n 次正方行列で $i > j$ なる i, j について $a_{ij} = 0$ となる行列を 上三角行列 という.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

同様に n 次正方行列で $j > i$ なる i, j について $a_{ij} = 0$ となる行列を 下三角行列 という.

- A を n 次正方行列とするととき $A^m = \underbrace{A \cdots A}_{m \text{ 個}}$ とする
- $A^m = O$ となる行列を べきゼロ行列 (nilpotent) という.
- $AB = O$ となる行列 A, B を ゼロ因子 という.

命題 69. [教科書, 問題 2.1.3, 2.1.4] 行列の演算 (和, 差, スカラー倍, 積) に関しては, 行列 A, B, C と数 s, s' を任意にとるとき, 次のような性質が成り立つ.

1. (和の可換性) A, B が同じ型をもつとき, $A + B = B + A$.
2. (和の結合法則) A, B, C が同じ型をもつとき, $(A + B) + C = A + (B + C)$.
3. (積の結合法則) AB, BC が定まるとき, $(AB)C, A(BC)$ も定まり $(AB)C = A(BC)$.
4. (スカラー倍の結合法則) $(s's)A = s'(sA)$.
5. (スカラー倍の結合法則) AB が定まるとき, $(sA)B = s(AB)$.
6. (スカラー倍の分配法則) $(s + s')A = sA + s'A$.
7. (スカラー倍の分配法則) A, B が同じ型をもつとき, $s(A + B) = sA + sB$.
8. (積の分配法則) AB, AC が定まるとき, $A(B + C) = AB + AC$.
9. (積の分配法則) AC, BC が定まるとき, $(A + B)C = AC + BC$.

これは覚えなくて良い. また [教科書, 問題 2.1.3, 2.1.4] と演習問題にあるがそこまで重要ではない.
補足 70. こちらより下の命題の方が重要な気がする.

命題 71. n 次正方行列の全体は和と積に関して以下の性質を満たす.

1. (和の交換法則) $A + B = B + A$
2. (和の結合法則) $(A + B) + C = A + (B + C)$

3. (ゼロ元の存在) $A + O = O + A = A$
4. (和の逆元の存在) $-A$ を $(-1)A$ で定義するとき, $A + (-A) = O$
5. (積の結合法則) $(AB)C = A(BC)$
6. (単位元の存在) $AE = EA = A$
7. (分配法則) $A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC$

このとき n 次正方行列の全体は行列環と呼ばれる.

また行列は一般的に $AB \neq BA$ である. このような環を非可換環という. なお上のような法則は暗記する必要はない. 私も忘れていた.

2.1.7 正則行列・逆行列

定義 72. A を n 次正方行列とする. ある行列 B があって

$$AB = BA = E$$

となるとき B を A の逆行列といい $B = A^{-1}$ とかく.

行列 A が逆行列 A^{-1} を持つとき, A は正則行列という (A は正則であるともいう).

正則行列の存在の判定法, 逆行列の計算方法は後に出てくる.

例 73. $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ の逆行列は $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ である.

実際 $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ である. 特に A は正則行列である.

例 74. [教科書, 例 2.1.2] $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ は逆行列を持たない. 特に A は正則行列ではない.

例 75. [教科書, 例 2.1.4] 2 次正方行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ について $ad - bc \neq 0$ ならば, A は逆行列を持ち

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \text{ である.}$$

特に A は正則行列である.

命題 76. [教科書, 命題 2.1.1] A, B, C を n 次正方行列とする. $BA = AC = E_n$ ならば $B = C$ である. 特に A が正則ならば, 逆行列はただ一つに定まる.

2.1.8 行列のブロック分解

行列をいくつかの行列に分割して書くことがある。例えば

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix}$$

と言うふうを書くことである。特に行ベクトル, 列ベクトルでこの表記をすることが多い。

例 77. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} = (\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4)$. ここで $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ は次で定義する。

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

例 78. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{pmatrix}$. ここで $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ は次で定義する。

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

よく使う方法は

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{pmatrix} = (\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4 \quad \mathbf{a}_5)$$

と書く方法で, これによって

$$BA = (B\mathbf{a}_1 \quad B\mathbf{a}_2 \quad B\mathbf{a}_3 \quad B\mathbf{a}_4 \quad B\mathbf{a}_5)$$

と書くことができる。

2.2 行列の基本変形 [教科書, 2.2 節]

以下体 K 上で考える。

2.2.1 行基本変形

定義 79 ([教科書, 定義 2.2.1] 行基本変形・列基本変形). 行列 A の次の 3 つの変形を行基本変形という.

- (I) A の第 i 行を λ 倍 ($\lambda \neq 0$) する.
- (II) A の第 i 行と A の第 j 行を入れ替える.
- (III) A の第 j 行の λ 倍を A の第 i 行に加える.

同様に列基本変形を, 上の定義において”行”の部分をも”列”に変えたものとする.

行列の転置を取れば同じことなので, 基本的には行基本変形を用いる. [教科書, 例 2.2.2] を見る.

例 80. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ を基本変形で変形すると次のとおりである.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

命題 81 ([教科書, 命題 2.2.3] 行基本変形の可逆性). 3 つの行基本変形はそれぞれ逆変換が存在し, その逆変換もまた行基本変形である. より詳しく言うと次が言える.

- (I) の逆変換は, A の第 i 行を λ^{-1} 倍 ($\lambda \neq 0$) する変換.
- (II) の逆変換は, A の第 i 行と A の第 j 行を入れ替える変換.
- (III) の逆変換は, A の第 j 行の $-\lambda$ 倍を A の第 i 行に加える変換.

特に A に行基本変形を何回か繰り返して A' に変換できるとき, A' に行基本変形を何回か繰り返して A に変換できる.

2.2.2 基本行列

基本行列の定義に関しては [教科書, 定義 2.2.4] 参照.(ただし基本行列の定義はそこまで重要ではなく次の性質が重要である) [教科書, 定義 2.2.4] を見る.

命題 82 ([教科書, 命題 2.2.6] 基本行列と基本変形). A を $m \times n$ 行列, $s \in \mathbb{R}$, $i, j = 1, \dots, m$ とする. $E_n(i, s), E_n(i, j), E_n(i, j, s)$ を [教科書, 定義 2.2.4] にある基本行列とする.

- (I) 行列 $E_n(i, s)$ は, A の第 i 行を s 倍した行列である. ただし $s \neq 0$ とする.
- (II) 行列 $E_n(i, j)A$ は, A の第 i 行と第 j 行を入れ替えた行列である.
- (III) 行列 $E_n(i, j, s)A$ は, A の第 j 行の s 倍を第 i 行に加えた行列である.

命題 81 から直ちにしたがう.

- 命題 83. 1. [教科書, 命題 2.2.7] 基本行列は正則で逆行列 (定義 72) を持ち, 逆行列もまた基本行列となる. 詳しい形は [教科書, 命題 2.2.7] を見る.
2. [教科書, 命題 2.2.8] $m \times n$ 行列 A に行基本変形を何回か繰り返して A' に変換できるとき, ある m 次正則行列 P があって $A' = PA$ となる.
3. [教科書, 命題 2.2.9] $m \times n$ 行列 A について $(m, m+n)$ 型行列を $\tilde{A} = (A, E_m)$ とする. (m, n) 型行列 A' と m 次正方行列 B があって, $\tilde{A}$ を行基本変形を用いて (A', B) となるとする. このとき B は上の (2). における P に等しく, 特に $A' = PA = BA$ となる.

2.3 行列の簡約化や標準化と行列の階数 [教科書, 2.3 節]

2.3.1 行列の簡約化や標準化

以下基本変形などは行のみ考える. 列は同様に定義する.

定義 84 (先頭項). 行列 A の第 i 行の先頭項とは, それぞれの行の最初に現れる 0 でない成分のことを言う.

[教科書, 例 2.3.1] を見る.

例 85.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

の先頭項は赤色のものである.

定義 86 ([教科書, 定義 2.3.2] 行簡約行列). 行列 A が次の 4 つの条件を満たすとき, A を行簡約行列という.

1. A のある行がゼロベクトルならば, その行より下の行はすべてゼロベクトルである. (全ての成分が 0 である行は 0 以外の値を含む行より下側)
2. ゼロベクトルでないすべての行において先頭項は 1 である. (先頭項は全て 1.)
3. 第 i 行と第 $i+1$ 行がともに先頭項をもつとき, 第 $i+1$ 行の先頭項は第 i 行の先頭項より右にある. (右側の列に行くほど, 先頭項は下側.)
4. すべての行の先頭項に対して, 先頭項と同じ列の他の成分はすべて 0 である. (先頭項を持つ列は, その先頭項を除く全てが 0.)

列簡約行列も同様に定める.

定義 87 ([教科書, 定義 2.3.2] 標準形). $m \times n$ 行列 A がある s を用いて

$$A = \begin{pmatrix} E_s & O_{s,n-s} \\ O_{m-s,s} & O_{m-s,n-s} \end{pmatrix}$$

と表せるとき, A は標準形であるという. これは A が行簡約かつ列簡約であることと同値である.

例 88. 以下の行列は全て簡約な行列である.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 7 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 6 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 89. 次に簡約ではない行列の例を理由とともに挙げる.

- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ は 1 番目の条件が満たされていないので簡約ではない.
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ は 2 番目の条件が満たされていないので簡約ではない.
- $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ は 3 番目の条件が満たされていないので簡約ではない.
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ は 4 番目の条件が満たされていないので簡約ではない.

[教科書, 例 2.3.4] を見る.

定理 90. [教科書, 定理 2.3.5]

1. 任意の行列 A は行基本変形を繰り返して, 行簡約行列に変形できる. この操作を行簡約化と言う. (列も同様)
2. 任意の行列 A は行基本変形と列基本変形を繰り返して, 標準形に変形できる. この操作を標準化という.

定理 91. [教科書, 定理 2.3.6]

1. 行列 A の行簡約化は (行基本変形のやり方によらず) ただ一つに定まる. (列も同様)
2. 行列 A の標準化は (行基本変形・列基本変形のやり方によらず) ただ一つに定まる.
3. 行列の行簡約化における 0 でない行の個数, 行列の列簡約化における 0 でない列の個

数, 行列の行標準化における 0 でない単位行列の次数は全て等しい.

2.3.5, 2.3.6 の証明は後に回す. 大変なので 3×5 行列で証明する.

定義 92 ([教科書, 定義 2.3.7] 階数 (rank)). A を行列とし, B を A に基本変形を繰り返して得られた行簡約行列とする. $\text{rank}(A)$ を B のゼロベクトルでない行の個数とし A の階数 (ランク) と呼ぶ.

[教科書, 定義 2.3.7] と定義が少し違うが, 定理 91 より同じである.

例 93. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ とすると, これは簡約な行列でありゼロベクトルでない行の個数は 2 個である. よって $\text{rank}(A) = 2$.
 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 7 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ とすると, これは簡約な行列でありゼロベクトルでない行の個数は 3 個である. よって $\text{rank}(B) = 3$.

2.3.2 行簡約化のやり方

<https://www2.sci.hokudai.ac.jp/dept/math/wp/wp-content/uploads/2020/05/vol11.pdf> の説明がわかりやすかったので参考にした.

まとめ 94 (行簡約化のやり方). 行列の行基本変形を用いた行簡約化は次のように行う.

- 操作 1. 各行の先頭項のうち, 一番左にあるものを含む行の一つをとり, 行基本変形 (II) で 1 行目と入れ替える.
- 操作 2. 1 行目の先頭項を行基本変形の (I) で 1 にする.
- 操作 3. 1 行目の先頭項を含む列について, その先頭項以外の成分を行基本変形の (III) で 0 にする.
- 操作 4. 各行の先頭項のうち, 一番左にあるものを含む行の一つをとり, 行基本変形 (II) で 2 行目と入れ替える.
- 操作 5. 2 行目の先頭項を行基本変形の (I) で 1 にする.
- 操作 6. 2 行目の先頭項を含む列について, その先頭項以外の成分を行基本変形の (III) で 0 にする.
- 操作 7. 以下 3 行目, 4 行目と操作 4-6 が終わるまで繰り返していく.

補足 95. 実際に行列を簡約化するプログラミングは上の方法を使って作られる. <https://drken1215.hatenablog.com/entry/2019/03/20/202800>

例 96. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ を行基本変形で簡約化すると次のとおりである.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

よってこの行列の階数 (ランク) は 3 である.

[教科書, 例 2.3.8] を見る.

定理 90 から次を得る.

定理 97. 任意の行列は行簡約行列と基本行列 (定理 82) の積で書ける.

補題 98. [教科書, 注意 2.3.9] A を行列とする.

- $m \times n$ 行列 A について $0 \leq \text{rank} A \leq \min\{m, n\}$
- $\text{rank} A = 0$ であることは, $A = 0$ と同値
- $\text{rank}^t A = \text{rank} A$
- n 次正方行列において, 次は同値
 1. $\text{rank} A = n$
 2. A の行簡約化が E_n
 3. A の列簡約化が E_n
 4. A の標準化が E_n

2.4 行基本変形による連立 1 次方程式の解法 [教科書, 2.4 節]

2.4.1 係数行列・拡大係数行列

定義 99 ([教科書, 定義 2.4.1] 係数行列, 拡大係数行列). m 個の式からなる n 変数連立 1 次

方程式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \text{ に対して}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \text{ とおく.}$$

行列 A を連立 1 次方程式の係数行列といい,

$$\tilde{A} = [A : \mathbf{b}] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \text{ を連立 1 次方程式の拡大係数行列という.}$$

これにより上の連立 1 次方程式は $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ とかける.

補足 100. 列基本変形を考えれば次がわかる.

$$\text{rank } A \leq \min\{m, n\} \quad \text{rank } A \leq \text{rank } \tilde{A} \leq \text{rank } A + 1$$

例 101. 連立 1 次方程式 $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - 4y = 9 \end{cases}$ について, 係数行列は $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ で, 拡大係数行列は $[A : \mathbf{b}] = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \end{pmatrix}$ である.

例 102. 連立 1 次方程式 $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 4x_4 = 7 \\ x_1 - 3x_3 + x_4 = 5 \\ 2x_1 - x_2 + 9x_3 = 0 \end{cases}$ について,
係数行列は $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 9 & 0 \end{pmatrix}$ で, 拡大係数行列は $[A : \mathbf{b}] = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & 4 & 7 \\ 1 & 0 & -3 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 9 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ である.

2.4.2 ガウス・ジョルダンの消去法・掃き出し法

[教科書, 定理 2.4.2] の前に連立 1 次方程式の具体例を扱う.

補題 103 ([教科書, 定義 2.4.3, 補題 2.4.4] 行基本変形と連立 1 次方程式). 連立 1 次方程式 $Ax = b$ とその拡大係数行列 $[A : b]$ について, 次が成り立つ.

1. 「連立 1 次方程式の i 番目の方程式を λ 倍 ($\lambda \neq 0$) する」ことは, 「拡大係数行列 $[A : b]$ の第 i 行を λ 倍 ($\lambda \neq 0$) する」ことに対応する.
2. 「連立 1 次方程式の i 番目の方程式と j 番目の方程式を入れ替える」ことは, 「拡大係数行列 $[A : b]$ の第 i 行と A の第 j 行を入れ替える」ことに対応する.
3. 「連立 1 次方程式の j 番目の方程式の λ 倍を i 番目の方程式に加える」ことは, 「拡大係数行列 $[A : b]$ の第 j 行の λ 倍を A の第 i 行に加える」ことに対応する.

特に $[A : b]$ の行基本変形によって $[A' : b']$ が得られたとき, 連立 1 次方程式 $Ax = b$ の解と $A'x = b'$ の解は一致する.

行基本変形を用いて連立 1 次方程式の解を求める方法を ガウス・ジョルダンの消去法 (掃き出し法) という.

例 104. 連立 1 次方程式 $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - 4y = 9 \end{cases}$ はガウスの消去法で解けて, 解は $x = 5, y = -1$ である. これは拡大係数行列 $[A : b] = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \end{pmatrix}$ の行基本変形 (定義 79) の変換と対応がある.

まとめ 105 ($Ax = b$ の解きかた (掃き出し法・ガウスの消去法)). (斉次) 連立 1 次方程式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

は以下の手順で解くことができる.

1. 連立方程式 $Ax = b$ から拡大係数行列

$$[A : b] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \text{ とおく.}$$

2. 定理 90 のように拡大係数行列 $[A : b]$ に行基本変形を繰り返して標準形 (簡約行列) $[C : d]$ を得る.
3. $Cx = d$ をとく. 補題 103 より, これが連立方程式 $Ax = b$ の解になる.

[教科書, 例 2.4.5] を見る.

例 106. 連立 1 次方程式
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_4 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 2 \\ 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 5x_4 + 2x_5 = 5 \end{cases}$$
 を解け.

(解). 拡大係数行列は $[A : \mathbf{b}] = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -4 & 1 & 5 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ である. これを基本変形で簡約化すると

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
 となる. これをもう一回式に書き下すと

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_4 = 2 \\ x_3 - x_4 = -1 \\ x_5 = 1 \end{cases} \text{ である.}$$

以上より解は
$$\begin{cases} x_1 = 2 + 2c_2 - 3c_4 \\ x_2 = c_2 \\ x_3 = -1 + c_4 \\ x_4 = c_4 \\ x_5 = 1 \end{cases} \quad (c_2, c_4 \text{ は任意}) \text{ となる.}$$

解の書き方として
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (s, t \in \mathbb{R}) \text{ と書くこともある.}$$

この s, t がパラメーターである. この方程式の解は 2 個である.

定理 107. A を $m \times n$ 行列とする.

1. [教科書, 定理 2.4.2] 連立 1 次方程式 $Ax = \mathbf{b}$ が解を持つことは, $\text{rank}(A) = \text{rank}([A : \mathbf{b}])$ であることと同値.
2. [教科書, 定理 2.4.6] $r = \text{rank}(A) = \text{rank}([A : \mathbf{b}])$ のとき, 連立 1 次方程式 $Ax = \mathbf{b}$ の解は $n - r$ 個のパラメーターで表示される. つまりある $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-r} \in K^n$ と $A\mathbf{w} = \mathbf{b}$ となる $\mathbf{w} \in K^n$ があって, $Ax = \mathbf{b}$ の解はある $c_1, \dots, c_{n-r} \in K$ があって

$$\mathbf{x} = \mathbf{w} + c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_{n-r} \mathbf{v}_{n-r}$$

とかける.

3. [教科書, 系 2.4.8] $Ax = \mathbf{0}$ の解が $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 以外の解を持つことは, $\text{rank}(A) < n$ が成り立つことと同値である.

[教科書, 例 2.4.7] を見る. また $\mathbb{F}_5$ または $\mathbb{F}_7$ の場合はどうなる?

2.5 基本変形による逆行列の計算 [教科書, 2.5 節]

命題 108. [教科書, 命題 2.5.3] A, B を n 次正方行列とする. $BA = E_n$ ならば A, B は正則であり, $AB = E_n$ である.

定理 109. [教科書, 命題 2.5.1, 定理 2.5.4] A を n 次正方行列とすると, 以下は同値.

1. $\text{rank}(A) = n$
2. A は正則行列.
3. A は基本行列の積として表される.
4. $n \times 2n$ 行列 $[A : E_n]$ の行簡約化が $[E_n : B]$ となる.

また 4 の B が A の逆行列となる.

この定理により掃き出し法を用いて逆行列を得ることができる. [教科書, 例 2.5.5] を見る.

例 110. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ の逆行列を求めよ.

(解). $[A : E_3] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ を基本変形を用いて簡約化すると,
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ となる. よって A の逆行列は $\begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ である.

定理 98, 107, 109, 152 を次のようになる.

命題 111. A を n 次正方行列とすると, 以下は同値.

1. $\text{rank}(A) = n$
2. A は正則行列.
3. A は基本行列の積として表される.
4. $n \times 2n$ 行列 $[A : E_n]$ の行簡約化が $[E_n : B]$ となる.
5. A の簡約化は E_n である.
6. 任意の n 次列ベクトル b について, $Ax = b$ はただ一つの解をもつ.
7. $Ax = 0$ の解は $x = 0$ に限る.
8. A の行列式 $\det(A)$ は 0 ではない (行列式に関しては 3 章にて扱う).

3 行列式 [教科書, 3 章]

3.1 置換, 行列式の定義 [教科書, 3.1 節]

3.1.1 置換の定義

定義 112. • $\{1, \dots, n\}$ から $\{1, \dots, n\}$ への 1 対 1 写像を置換と言い σ で表す. つまり置換 σ とは $k_1, \dots, k_n$ を 1 から n の並び替えとして, 1 を k_1 に, 2 を k_2 に, $\dots$, n を k_n にと変化させる規則のことである.

- 上の置換 σ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \end{pmatrix}$$

とかき, $\sigma(1) = k_1, \sigma(2) = k_2, \dots, \sigma(n) = k_n$ とする.

- S_n を n 文字置換の集合とし, n 次対称群と言う. 個数は $n!$ である.

例 113. 置換 σ を $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ とする. これは「1 を 3 に, 2 を 1 に, 3 を 4 に, 4 を 2 にと変化させる規則」である. $\sigma(1) = 3, \sigma(2) = 1, \sigma(3) = 4, \sigma(4) = 2$ である.

例 114. 置換 σ を $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ とする. これは「1 を 2 に, 2 を 1 に, 3 を 3 にと変化させる規則」である. $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 1, \sigma(3) = 3$ である.

この置換は 3 に関しては何も変化させていないので $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ とにかく.

定義 115. 置換 σ, τ について, その積 $\sigma\tau$ を $\sigma(\tau(i))$ で定める.

例 116. [教科書, 例 3.1.1] 置換 σ, τ を $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ とすると,

$$\begin{array}{llll} \sigma(\tau(1)) & = & \sigma(1) & = & 4 \\ \sigma(\tau(2)) & = & \sigma(4) & = & 3 \\ \sigma(\tau(3)) & = & \sigma(2) & = & 2 \\ \sigma(\tau(4)) & = & \sigma(3) & = & 1 \end{array} \text{ であるので, } \sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ である.}$$

定義 117. • $\epsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$ を単位置換・恒等置換という.

- $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \end{pmatrix}$ について, $\begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$ を σ の逆置換と言い σ^{-1} で表す.

例 118. [教科書, 例 3.1.2] $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ とするとき $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ である.

3.1.2 置換の符号

定義 119. σ を n 次の置換とする.

- $1 \leq i < j \leq n$ となる (i, j) が $\sigma(i) > \sigma(j)$ を満たすとき, (i, j) は転倒しているという.
- 転倒している $1 \leq i < j \leq n$ となる (i, j) の個数を σ の転倒数という.
- $(-1)^{(\sigma \text{ の転倒数})}$ を σ の符号といい $\text{sgn}(\sigma)$ と表す. $+1$ か -1 のどちらかである.
- $\text{sgn}(\sigma) = 1$ の置換を偶置換, $\text{sgn}(\sigma) = -1$ の置換を奇置換という.

$\leq$ は $\leq$ と同じである. (なぜか大学以降は線が1本になる.)

例 120. [教科書, 例 3.1.3] $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ の転倒数は5で符号は-1である

補足 121. n 次の置換の転倒数の個数を数えるのには $\frac{n(n-1)}{2}$ 回の計算が必要だが, うまいアルゴリズムを考えると (BIT) $n \log n$ 回の計算で転倒数を数えることができる.

次に関しては [教科書, 3.5 節] で用いるので今定義しておく. (教科書にはこの記述がなかった)

定義 122. K を体とする.

- x を変数とする. 0 以上の整数 l と, $a_0, \dots, a_l \in K$ を用いて (ただし $a_l \neq 0$)

$$f(x) = \sum_{i=0}^l a_i x^i = a_l x^l + a_{l-1} x^{l-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

とかけるととき, $f(x)$ を K 係数の多項式という.

- 上に置いて $\deg(f(x)) = l$ とおき次数という.
-

$$K[X] := \{f(x) = \sum_{i=0}^l a_i x^i \mid f(x) \text{ は } K \text{ 係数の多項式} \}$$

とする. これは (実数係数のときと同様に) 以下の和と積の構造によって環になる.

$$1. \text{ 和 } \sum_{i=0}^l a_i x^i + \sum_{i=0}^l b_i x^i = \sum_{i=0}^l (a_i + b_i) x^i$$

$$2. \text{ 積 } (\sum_{i=0}^l a_i x^i) \cdot (\sum_{j=0}^m b_j x^j) = \sum_{0 \leq i \leq l, 0 \leq j \leq m} (a_i b_j) x^{i+j}$$

- K 係数 n 変数多項式 $f(x_1, \dots, x_n)$ を, ある正の整数 m があって,

$$f(x_1, \dots, x_n) := \sum_{1 \leq i_j \leq m} a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$$

とかけるものとする. ここで $a_{i_1, \dots, i_n} \in K$ とする. $K[x_1, \dots, x_n]$ を K 係数 n 変数多項式 $f(x_1, \dots, x_n)$ の集合とする. 上と同様に環の構造を持つ.

環という用語や n 変数多項式の定義がややこしいが, (この定義は今後あまり出てこない) 気にしないで良い.

定義 123. K を体とする. n 個の変数 $x_1, \dots, x_n$ を考える.

- n 個の変数 $x_1, \dots, x_n$ について

$$D(x_1, \dots, x_n) := \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$$

を $x_1, \dots, x_n$ の差積という. ここで $\prod_{1 \leq i < j \leq n}$ は積の記号で, $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$ は「 $1 \leq i < j \leq n$ を満たす (i, j) について $(x_j - x_i)$ を全てかけた数」を表している.

- σ を n 次の置換, $f(x_1, \dots, x_n)$ を多項式として

$$f^\sigma(x_1, \dots, x_n) := f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

と定義する. n 次対称群 S_n が K 係数 n 変数多項式の環 $K[x_1, \dots, x_n]$ に作用しているともみれる ($S_n \curvearrowright K[x_1, \dots, x_n]$ とも書かれる)

補題 124. σ を n 次の置換に関して, $D^\sigma(x_1, \dots, x_n) = \text{sgn}(\sigma) \cdot D(x_1, \dots, x_n)$ となる.

[教科書, 例 3.1.5] を見る.

定理 125. [教科書, 定理 3.1.6] 置換 σ, τ について, $\text{sgn}(\epsilon) = 1$, $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$, $\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)$, が成り立つ (ただし ϵ は単位置換とする).

命題 126. [教科書, 命題 3.1.7]

$S_n = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m\}$ とおく. ただし, $m = n!$ とする.

1. $i \neq j$ ならば $\sigma_i^{-1} \neq \sigma_j^{-1}$ である. 特に

$$\{\sigma_1^{-1}, \sigma_2^{-1}, \dots, \sigma_m^{-1}\} = S_n$$

2. 任意の $\sigma \in S_n$ について, $i \neq j$ ならば $\sigma\sigma_i \neq \sigma\sigma_j$ かつ $\sigma_i\sigma \neq \sigma_j\sigma$ である. 特に

$$\{\sigma\sigma_1, \sigma\sigma_2, \dots, \sigma\sigma_m\} = \{\sigma_1\sigma, \sigma_2\sigma, \dots, \sigma_m\sigma\} = S_n$$

命題 127. [教科書, 命題 3.1.8] $n \geq 2$ を整数とし,

- A_n を偶置換のなす集合.
- B_n を奇置換のなす集合.

とするとき次が成り立つ.

1. τ を偶置換とすると, $A_n = \tau A_n = A_n \tau$, $B_n = \tau B_n = B_n \tau$
2. τ を奇置換とすると, $B_n = \tau A_n = A_n \tau$, $A_n = \tau B_n = B_n \tau$

ただし $\sigma \in S_n$ と部分集合 $X \subset S_n$ に対し, $\sigma X := \{\sigma x \mid x \in X\}$ と定義する.

補足 128. A_n は n 交代群 と呼ばれる. 上から次がわかる. ¹³

- (部分群) $\sigma, \tau \in A_n$ ならば $\sigma\tau \in A_n, \sigma^{-1} \in A_n$.
- (正規部分群) 任意の $\sigma \in S_n$ について $\sigma A_n \sigma^{-1} = A_n$.
- (剰余類と指数) $n \geq 2$ のとき, $\tau \in S_n \setminus A_n$ とすると, $S_n = A_n \cup \tau A_n$ かつ $A_n \cap \tau A_n = \emptyset$.
特に A_n の個数は $\frac{n!}{2}$ 個である.

A_n は 5 次以上の解の公式が存在しない証明に用いられる. 専門的にいうと, $n \geq 5$ ならば A_n が可解 (solvable) でないことが用いられる.

3.1.3 互換と符号

定義 129. [教科書, 問題 3.1] $\sigma = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_l \\ k_2 & k_3 & \cdots & k_1 \end{pmatrix}$ となる置換 σ を 巡回置換 と言い $\sigma = (k_1 \ k_2 \ \cdots \ k_l)$ と表す.

¹³左に書いてある用語は関連していることである. 気になる人は各自調べてみよ.

特に $\sigma = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \\ k_2 & k_1 \end{pmatrix}$ となる巡回置換を互換と言い $\sigma = (k_1 \ k_2)$ と表す.

定理 130. [教科書, 定理 3.1.9] 互換は奇置換である.

定理 131. [教科書, 定理 3.1.10] 任意の置換 σ は互換の積 $\tau_1 \cdots \tau_l$ で表わすことができる.

定理 132. [教科書, 定理 3.1.11] 置換 σ が互換の積 $\tau_1 \cdots \tau_r$ となるとき, $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^r$ である. 特に r の偶奇は σ によってのみ定まる.

例 133. $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 1 & 6 & 2 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$ を互換の積で表し, その符号を求めよ.

(解). $1 \xrightarrow{\sigma} 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\sigma} 1$ と変化し, $3 \xrightarrow{\sigma} 6 \xrightarrow{\sigma} 5 \xrightarrow{\sigma} 7 \xrightarrow{\sigma} 3$ と変化するので,

$$\sigma = (1 \ 4 \ 2)(3 \ 6 \ 5 \ 7) \text{ である.}$$

さらに $(1 \ 4 \ 2) = (1 \ 4)(4 \ 2), (3 \ 6 \ 5 \ 7) = (3 \ 6)(6 \ 5)(5 \ 7)$ であるので,

$$\sigma = (1 \ 4)(4 \ 2)(3 \ 6)(6 \ 5)(5 \ 7)$$

となり, $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^5 = -1$ である.

3.1.4 行列式の定義

定義 134. n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ について

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} \text{ を } A \text{ の行列式} \text{ と言う.}$$

$$A \text{ の行列式は } \det(A), |A|, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \text{ ともかく.}$$

例 135. [教科書, 例 3.1.14] $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ とすると $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ である.

(証). $S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ であるので, A の行列式は

$$\det(A) = \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} a_{11}a_{22} + \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} a_{12}a_{21} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

例 136. [教科書, 例 3.1.15] $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ の行列式を求める.

$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$ であるので, A の行列式は

$$\begin{aligned} \det(A) &= \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} a_{11}a_{22}a_{33} + \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} a_{12}a_{21}a_{33} + \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} a_{11}a_{23}a_{32} \\ &\quad + \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} a_{13}a_{22}a_{31} + \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} a_{12}a_{23}a_{31} + \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} a_{13}a_{21}a_{32} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \end{aligned}$$

以上より $\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33}$ である.

補足 137. 2 次正方行列や 3 次正方行列の行列式は視覚的に綺麗に表わすことができる (サラスの公式と呼ばれる).

4 次以上にはこのような暗記法はない

例 138. [教科書, 例 3.1.12] ある行がゼロベクトル, またはある列がゼロベクトルである行列の行列式は 0.

例 139. [教科書, 例 3.1.13] 上三角行列の行列式は対角成分の積である.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n-1} & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & & \ddots & a_{n-1n-1} & a_{n-1n} \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

下三角行列も同様である.

3.2 基本変形と行列式 [教科書, 3.2 節]

3.2.1 行列式の性質

以下行ベクトル $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ を用いて

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{vmatrix}$$

と略記する. $\mathbf{a}_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ である.

定理 140. [教科書, 定理 3.2.1] s, t を数とすると

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ s\mathbf{a}_i + t\mathbf{b}_i \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{vmatrix} = s \begin{vmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_i \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{vmatrix} + t \begin{vmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_i \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{vmatrix}$$

定理 141. [教科書, 定理 3.2.2] $\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_j$ ならば $\det(A) = 0$.

定理 142. [教科書, 定理 3.2.3] $i < j$ について

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_j \\ \vdots \\ \mathbf{a}_i \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_i \\ \vdots \\ \mathbf{a}_j \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{vmatrix}$$

定理 143. [教科書, 定理 3.2.4] s を数として, $i \neq j$ について

$$\begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i + sa_j \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix}$$

定理 144. [教科書, 定理 3.2.8] $\det({}^t A) = \det(A)$

以上をまとめると次を得る.

定理 145. [教科書, 定理 3.2.5, 3.2.9] 行基本変形と行列式には以下のように対応する.

1. ある行を λ 倍すると, 行列式も λ 倍される.
2. 二つの行を入れ替えると, 行列式は -1 倍になる.
3. ある行のスカラー倍を他の行に加えても行列式は不変である.

また”行”の部分をも”列”に変えても同様のことが成り立つ.

3.2.2 行列式の計算方法

[教科書, 3.3 節] の内容だが, 計算に使えるため先に紹介しておく. (証明は後ほど)

定理 146. [教科書, 定理 3.3.2] A を $n-1$ 次正方行列とすると, $a \in K$ について次が成り立つ.

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ * & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & * \\ 0 & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & * \\ 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ * & a \end{vmatrix} = a|A|$$

まとめ 147 (行列式の計算方法 1.).

操作 1. 次の行基本変形を繰り返して操作 2 の左辺の形にする.

- (I) ある行を λ 倍すると, 行列式も λ 倍される.
- (II) 二つの行を入れ替えると, 行列式は -1 倍になる.
- (III) ある行のスカラー倍を他の行に加えても行列式は不変である.

なお列基本変形を用いても良い.

操作 2. [教科書, 定理 3.3.2] を用いる.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

操作 3. 行列のサイズが 2 の場合は操作 4 に, そうでない場合は行列のサイズが 2 になるまで操作 1 と 2 を繰り返す.

操作 4. 行列の 2 の場合の行列式の公式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ を用いる.

ただし操作 4 に関しては 3×3 行列の行列式の公式 (サラスの公式) を用いても良い. [教科書, 例 3.2.7, 3.2.10, 3.3.3] を見る.

例 148. $\begin{pmatrix} 2 & -4 & -5 & 3 \\ -6 & 13 & 14 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & -8 \\ 2 & -5 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ の行列式は次のように求められる.

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 & -5 & 3 \\ -6 & 13 & 14 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & -8 \\ 2 & -5 & 0 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{操作 1 (I)} (-1)} \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 & -8 \\ -6 & 13 & 14 & 1 \\ 2 & -4 & -5 & 3 \\ 2 & -5 & 0 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{操作 1 (III)} (-1)} \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & -47 \\ 0 & 0 & -1 & 19 \\ 0 & -1 & 4 & 21 \end{vmatrix} \\ \xrightarrow{\text{操作 2} (-1)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -47 \\ 0 & -1 & 19 \\ -1 & 4 & 21 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{操作 1 (III)} (-1)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -47 \\ 0 & -1 & 19 \\ 0 & 6 & -26 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{操作 2} (-1)} \begin{vmatrix} -1 & 19 \\ 6 & -26 \end{vmatrix} \\ \xrightarrow{\text{操作 4} (-1)} \{(-1) \times (-26) - 6 \times 19\} = 88.$$

補足 149. この計算方法により行列式の計算は定義では $O(n!)$ の計算量だが, $O(n^3)$ に改善される.

3.3 行列式に関する幾つかの定理 [教科書, 3.3 節]

定理 150. [教科書, 定理 3.3.1-2] A を n 次正方行列, B を m 次正方行列とすると, 次が成り立つ.

$$\begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

特に A を $n-1$ 次正方行列とすると、 $a \in K$ について次が成り立つ。

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ * & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & * \\ 0 & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & * \\ 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ * & a \end{vmatrix} = a|A|$$

定理 151. [教科書, 定理 3.3.4] $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

定理 152. [教科書, 定理 3.3.5] n 次正方行列 A について次は同値。

1. $\text{rank}(A) = n$ (これは A が正則と同値)
2. 連立 1 次方程式 $Ax = 0$ の解は $x = 0$ のみ。
3. $\det(A) \neq 0$

3.4 余因子展開と余因子行列 [教科書, 3.4 節]

3.4.1 余因子展開と余因子展開を用いた行列式の計算

定義 153. n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ の i 行と j 列を取り除いた $n-1$ 次正方行列を A_{ij} とかき、小行列という。つまり

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-11} & \cdots & a_{i-1j-1} & a_{i-1j+1} & \cdots & a_{i-1n} \\ a_{i+11} & \cdots & a_{i+1j-1} & a_{i+1j+1} & \cdots & a_{i+1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ とする.}$$

補題 154. A を n 次正方行列とする。任意の $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$ なる i, j について、次が成り立つ。

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}) + \cdots + (-1)^{n+j} a_{nj} \det(A_{nj}) \\ &= (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1}) + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} \det(A_{in}). \end{aligned}$$

これを余因子展開という。

まとめ 155 (行列式の計算方法 2.). 行列に 0 が多めにある場合は余因子展開を用いても良い.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} \begin{vmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix}$$

例 156. 行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 13 & 5 \\ 5 & 3 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & 9 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ の行列式は次のように求められる.

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+1} a_{11} \det(A_{11}) + (-1)^{2+1} a_{21} \det(A_{21}) + (-1)^{3+1} a_{31} \det(A_{31}) + (-1)^{4+1} a_{41} \det(A_{41}) \\ &= 2 \begin{vmatrix} 3 & 8 & 2 \\ 0 & 9 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 7 & 13 & 5 \\ 0 & 9 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 7 & 13 & 5 \\ 3 & 8 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 7 & 13 & 5 \\ 3 & 8 & 2 \\ 0 & 9 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} 3 & 8 & 2 \\ 0 & 9 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 7 & 13 & 5 \\ 0 & 9 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \times 3 \begin{vmatrix} 9 & 4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - 5 \times 7 \begin{vmatrix} 9 & 4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = (2 \times 3 - 5 \times 7) \times (9 \times 1 - 4 \times (-2)) = -493. \end{aligned}$$

[教科書, 例 3.4.1] を見る.

3.4.2 余因子行列

定義 157. n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ について, A の余因子行列 $\tilde{A}$ を A を次で定義する.

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} |A_{11}| & -|A_{21}| & \cdots & (-1)^{n-1}|A_{n1}| \\ -|A_{12}| & |A_{22}| & \cdots & (-1)^n|A_{n2}| \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (-1)^{n-1}|A_{1n}| & (-1)^n|A_{2n}| & \cdots & (-1)^{2n-2}|A_{nn}| \end{pmatrix}$$

+ と - が交互に現れることと, A_{ij} の場所に注意する.

例 158. [教科書, 例 3.4.2] $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ のときの余因子行列 $\tilde{A}$ は $\begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$ となる.

定理 159. [教科書, 定理 3.4.3-4] A を n 次正方行列とする. このとき

$$A\tilde{A} = \tilde{A}A = (\det A)E$$

特に A が正則であることは $\det(A) \neq 0$ であることと同値であり, このとき次が成り立つ.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A}.$$

例 160. 2 次正方行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ で $\det(A) = ad - bc \neq 0$ となるものとする. このとき上の定理から

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \text{となる.}$$

[教科書, 例 3.4.5] を見る.

3.5 行列式の応用 [教科書, 3.5 節]

3.5.1 平行多面体の体積と行列式

線形代数的に n 次元の体積を定義する.¹⁴

定理 161 ([教科書, 定理 3.5.1] n 次元体積の定義). 実数係数の n 次正方行列 A に対して, 次の条件 (V1) – (V4) を満たす体積が $v(A)$ ただ一つ存在し, それは $v(A) = |\det(A)|$ となる.

$$(V1) \quad v(E_n) = 1$$

$$(V2) \quad c \in \mathbb{R} \text{ について, } v(\mathbf{a}_1, \dots, c\mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) = |c|v(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n)$$

$$(V3) \quad i \neq j \text{ と } c \in \mathbb{R} \text{ について, } v(\mathbf{a}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{a}_i + c\mathbf{a}_j}_i, \dots, \mathbf{a}_n) = v(\mathbf{a}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{a}_i}_i, \dots, \mathbf{a}_n)$$

$$(V4) \quad v(\mathbf{a}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{a}_j}_i, \dots, \underbrace{\mathbf{a}_i}_j, \dots, \mathbf{a}_n) = v(\mathbf{a}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{a}_i}_i, \dots, \underbrace{\mathbf{a}_j}_j, \dots, \mathbf{a}_n)$$

ただし $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ を列ベクトルとする.

¹⁴面積・体積に関しては 1 年の後期の解析の授業 (リーマン積分) で詳しいことを学ぶ. なお 3 年の授業でルベーグ積分論の授業もあり, それにはより抽象的 (でかなり難しい!) 面積・体積の定義を学ぶ.

この証明を真似ると次を得る.

定理 162 (行列式の唯一性). n 次正方行列の集合から体 K への関数

$$f: \{n \text{ 次正方行列} \} \rightarrow K$$

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{pmatrix} \mapsto f(A) = f(\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n)$$

で次を満たすとする.

1. (多重線形性) $\mathbf{b}_i \in K^n$ と $\lambda, \mu \in K$ について

$$f(\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \lambda \mathbf{a}_i + \mu \mathbf{b}_i \ \cdots \ \mathbf{a}_n)$$

$$= \lambda f(\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_i \ \cdots \ \mathbf{a}_n) + \mu f(\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_i \ \cdots \ \mathbf{a}_n).$$

2. (交代性) $1 \leq i < j \leq n$ なる i, j について, i 番目と j 番目を入れ替えると符号が変わる.

$$f(\mathbf{a}_1, \cdots, \underbrace{\mathbf{a}_j}_i, \cdots, \underbrace{\mathbf{a}_i}_j, \cdots, \mathbf{a}_n) = -f(\mathbf{a}_1, \cdots, \underbrace{\mathbf{a}_i}_i, \cdots, \underbrace{\mathbf{a}_j}_j, \cdots, \mathbf{a}_n).$$

このとき $f(A) = f(E_n) \det A$ となる.

特に 1, 2 を満たす f で $f(E_n) = 1$ となるものは行列式 $\det$ のみに限る.

3.5.2 ヴァンデルモンドの行列式と因数定理

定理 163 ([教科書, 定理 3.5.2] ヴァンデルモンドの行列式).

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

定理 164 (ユークリッド環・因数定理). K を体とし, x を変数とする. $K[x]$ を K 係数多項式がなす環とする.

任意の $f(x), g(x) \in K[x]$ について, $g(x) \neq 0$ ならば, ある $q(x), r(x) \in K[x]$ があって

1. $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$
2. $\deg r(x) < \deg g(x)$

が成り立つ. (つまり $K[x]$ はユークリッド環 (整域) となる)
 特に因数定理が成り立つ. つまり任意の $a \in K$ と $f(x) \in K[x]$ について, $f(a) = 0$ ならば $f(x)$ は $(x - a)$ で割り切れる. (ある $q(x) \in K[x]$ があって $f(x) = (x - a)q(x)$ となる.)

証明には K が体であることが使われる. A が環の場合でも, 近い定理がある. (ヒルベルトの基底定理「 A がネーター環ならば, $A[x]$ もネーター環である.」)

定理 165 ([教科書, 例 3.5.3] ヴァンデルモンドの行列式の応用). $a_1, \dots, a_n \in K$ は相異なる数, $b_1, \dots, b_n \in K$ とする. このとき K 係数 $n - 1$ 次多項式

$$f(x) = c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \dots + c_1x + c_0$$

があって, 任意の $i = 1, \dots, n$ について $f(a_i) = b_i$ となる.

3.5.3 クラメルの公式

定理 166. [教科書, 定理 3.5.4] A を正則な n 次正方行列とし, 列ベクトル $a_1, \dots, a_n$ を用いて $A = (a_1 \ \dots \ a_n)$ と表されているとする. このとき連立 1 次方程式 $Ax = b$ の解は次のようになる.

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, x_i = \frac{\det \begin{pmatrix} a_1 & \dots & \overbrace{b}^i & \dots & a_n \end{pmatrix}}{\det A}.$$

例 167. $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ とする. 連立 1 次方程式 $Ax = b$ の解を $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ とすると,

$$x_1 = \frac{\det \begin{pmatrix} b & a_2 \end{pmatrix}}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{4}{7}, x_2 = \frac{\det \begin{pmatrix} a_1 & b \end{pmatrix}}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{1}{7} \text{ となる.}$$

References

[教科書] 朝倉政典・落合理・北山貴裕・田口雄一郎『数理情報・工学系のための数学教程 基礎編 2 線形代数』(培風館) [http://www.baifukan.co.jp/cgi-bin/db/baifu_new_search.pl?](http://www.baifukan.co.jp/cgi-bin/db/baifu_new_search.pl?ISBN=4-563-00623-8)
 ISBN=4-563-00623-8

4 演習問題

演習問題の解答は教科書のホームページ http://www.baifukan.co.jp/cgi-bin/db/baifu_new_search.pl?ISBN=4-563-00623-8 の web 資料にあります。基本的には教科書の問題をやっていきます。追加問題があるものだけここに書いていきます。追加問題は黒板に書くか配布します。レポートで重要な問題をまとめて出す予定です。

- 問題 1. 「 x 軸に関しての鏡映 (折り返し) を行い, $\frac{3}{4}\pi (=135 \text{ 度})$ 反時計回りに回転する」1 次変換求めよ.
- 問題 2. 「 x 軸に関しての鏡映 (折り返し) を行い, $\frac{3}{4}\pi (=135 \text{ 度})$ 反時計回りに回転し, さらに x 軸に関しての鏡映 (反転) を行う」1 次変換を求めよ. またその変換は θ 反時計回りの変換に等しいが, その θ を求めよ. ただし $0 \leq \theta < 2\pi$ とする.
- 問題 3. 回転や鏡映は内積を変えないことを示せ, つまり f を回転や鏡映とするとき, 任意の $x, y \in \mathbb{R}^2$ について以下が成り立つことを示せ.

$$(f(x), f(y)) = (x, y)$$

- 問題 4. 上の問題において, 逆は成り立つか? つまり 任意の $x, y \in \mathbb{R}^2$ について

$$(f(x), f(y)) = (x, y)$$

が成り立つ変換は, 回転や鏡映 $f_1, \dots, f_r$ を用いて, $f = f_r \circ \dots \circ f_1$ となるか?(なお岩井は答えを知らない)

- 問題 5. $\mathbb{F}_7 = \{0, 1, 2, \dots, 6\}$ として, 加法 $+$ と乗法 $\bullet$ を次で定義する.

- $a, b \in \mathbb{F}_7$ について $a + b := (a \text{ たす } b \text{ を } 7 \text{ で割ったあまり})$.
- $a, b \in \mathbb{F}_7$ について $a \bullet b := (a \text{ かける } b \text{ を } 7 \text{ で割ったあまり})$.

(これによって $\mathbb{F}_7$ は体となる) $a = 1, 2, \dots, 6$ について $\mathbb{F}_7$ での $-a, a^{-1}$ をそれぞれ求めよ.

- 問題 6. 回転変換 f は何個かの鏡映変換 $f_1, \dots, f_r$ を用いて, $f = f_r \circ \dots \circ f_1$ となるか?

補足 168. n 次正方行列の全体は和と積に関して以下の性質を満たす.

- (1). (和の交換法則) $A + B = B + A$
- (2). (和の結合法則) $(A + B) + C = A + (B + C)$
- (3). (ゼロ元が存在) $A + O_n = O_n + A = A$
- (4). (和の逆元が存在) $-A$ を $(-1)A$ で定義するとき, $A + (-A) = O$
- (5). (積の結合法則) $(AB)C = A(BC)$
- (6). (単位元が存在) $AE_n = E_n A = A$
- (7). (分配法則) $A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC$

このとき n 次正方行列の全体は行列環と呼ばれる. また行列は一般的に $AB \neq BA$ である. このような環を非可換環という. なお上のような法則は暗記する必要はない. 私も忘れていた.

授業で言い忘れていたが次が成り立つ.

- (3) より, 行列 A にゼロ行列 O_n を足しても引いても変わらない.
- (6) より, 行列 A に単位行列 E_n をかけても変わらない.

行列のブロック分解の補足. 行ベクトル, 列ベクトルでこの表記をすることが多い.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 \end{pmatrix}. \text{ ここで } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4 \text{ は次で定義する.}$$

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{pmatrix}. \text{ ここで } \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3 \text{ は次で定義する.}$$

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

よく使う方法は $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 & \mathbf{a}_5 \end{pmatrix}$ と書く方法で, これによって下のようにかける.

$$BA = \begin{pmatrix} B\mathbf{a}_1 & B\mathbf{a}_2 & B\mathbf{a}_3 & B\mathbf{a}_4 & B\mathbf{a}_5 \end{pmatrix}$$

問題 7. 2×2 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ について $ad - bc \neq 0$ であると仮定する. この時 $B = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ について $AB = BA = E_2$ を示せ. ¹⁵ よって A は正則で B は A の逆行列 A^{-1} である.

問題 8. n 次正方行列 A が正則行列であるとする. この時 n 次正方行列 B について, $AB = O_n$ ならば $B = O_n$ であることを示せ. (ヒント: 教科書 p.23 の (3) と p.22 の $AE_n = E_nA = A$ を使う. 上の補足の (3) と (6) でも良い.)

問題 9. 2×2 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ について $ad - bc = 0$ であると仮定する. この時 A は正則でないことを示せ. (ヒント: ゼロ行列でない B で $AB = O_2$ となるものを構成し, 前の問題を使う.)

問題 10. 2×2 行列の岩澤分解の証明をあたえる.

命題 169. [教科書, 命題 1.2.4 (岩澤分解)] 1 次変換 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ が逆変換を持つならば, 引き伸ばし変換 f_1 , 斜倒変換 f_2 , 回転変換 f_3 を用いて

$$f = \underbrace{f_3}_{\text{回転変換}} \circ \underbrace{f_1}_{\text{引き伸ばし変換}} \circ \underbrace{f_2}_{\text{斜倒変換}}$$

の証明を考える. これは行列の言葉で言うと次を示せば良い.

命題 170. 実数係数の 2×2 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ が $ad - bc \neq 0$ ならば, ある実数 θ, λ, μ, r があって

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}}_{\text{回転変換}} \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}}_{\text{引き伸ばし変換}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{斜倒変換}}$$

(a) (a, c) の極座標変換を考えることで, ある $p, q, s, \theta \in \mathbb{R}$ があって

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & q \\ 0 & s \end{pmatrix} \quad \text{かつ} \quad s \neq 0$$

とできることを示せ. (ここに $ad - bc \neq 0$ を用いる)

(b)

$$\begin{pmatrix} p & q \\ 0 & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となる $\lambda, \mu, r \in \mathbb{R}$ が存在することを示し, 岩澤分解の証明を完成させよ. ¹⁶

¹⁵ E_2 は単位行列で $E_2 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ とする.

¹⁶ 余力があれば 3 次元, それ以上の岩澤分解について調べ, その証明をみよ. リー環・リー代数の勉強の架け橋になるかもしれない.

行簡約化のやり方

<https://www2.sci.hokudai.ac.jp/dept/math/wp/wp-content/uploads/2020/05/vol11.pdf> の説明がわかりやすかったので参考にした.

まとめ 171 (行簡約化のやり方). 行列の行基本変形を用いた行簡約化は次のように行う.

- 操作 1. 各行の先頭項のうち, 一番左にあるものを含む行の一つをとり, 行基本変形 (II) で 1 行目と入れ替える.
 操作 2. 1 行目の先頭項を行基本変形の (I) で 1 にする.
 操作 3. 1 行目の先頭項を含む列について, その先頭項以外の成分を行基本変形の (III) で 0 にする.
 操作 4. 各行の先頭項のうち, 一番左にあるものを含む行の一つをとり, 行基本変形 (II) で 2 行目と入れ替える.
 操作 5. 2 行目の先頭項を行基本変形の (I) で 1 にする.
 操作 6. 2 行目の先頭項を含む列について, その先頭項以外の成分を行基本変形の (III) で 0 にする.
 操作 7. 以下 3 行目, 4 行目と操作 4-6 が終わるまで繰り返していく.

補足 172. 実際に行列を簡約化するプログラミングは上の方法を使って作られる. <https://drken1215.hatenablog.com/entry/2019/03/20/202800>

例 173. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ を行基本変形で簡約化すると次のとおりである.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} \rightarrow \textcircled{2} + \textcircled{1} \times (-2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3} \rightarrow \textcircled{3} + \textcircled{2} \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\textcircled{3} \rightarrow \textcircled{3} \times \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{1} + \textcircled{3} \times (-1) \quad \textcircled{2} \rightarrow \textcircled{2} + \textcircled{3} \times \frac{3}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3} \rightarrow \textcircled{3} \times \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

よってこの行列の階数 (ランク) は 3 である.

問題 11. 次の行列を簡約化し, その階数を求めよ. (1) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 9 & 1 & 8 \\ 2 & 0 & 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 7 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

定理 2.4.6 の具体例. 例 2.4.5 を用いる. 行簡約化をして

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{w} := \begin{pmatrix} 2 \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

とおく. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ をとく. 今 $A\mathbf{w} = \mathbf{b}$ であるので

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Leftrightarrow A(\mathbf{x} - \mathbf{w}) = \mathbf{0}$$

である. $\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{w}$ として $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$ の解を探すと

$$A\mathbf{y} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 + 2y_3 + 5x_4 = 0 \\ y_2 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}y_4 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = c_1 \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{v}_1} + c_2 \underbrace{\begin{pmatrix} -5 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{v}_2}$$

となる. よって

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$$

となる. この例では $n = 4, r = 2$ である. □

定理 2.3.5 の行簡約化可能の証明の概略. $m \times n$ 行列 A に関して n に関する帰納法

簡単のため $m = 2, n = 5$ とする. また $*$ で数を表す. 帰納法の仮定で $n \leq 4$ までは行簡約化できると仮定する. $a \neq 0$ として次の 3 パターンが考えられる.

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} a & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}}_{\text{case 1}} \quad \text{or} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & * & * & * & * \\ a & * & * & * & * \end{pmatrix}}_{\text{case 2}} \quad \text{or} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \end{pmatrix}}_{\text{case 3}}$$

に限られる. あとは 3 つの場合に簡約化できることを言えば良い.

[Case 1] の場合

$$\begin{pmatrix} a & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{1} \times (\frac{1}{a})} \begin{pmatrix} 1 & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} \rightarrow \textcircled{2} - \textcircled{1} \times (*)} \begin{pmatrix} 1 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

とできる. あとは右の 2×4 行列を簡約化すれば良い (帰納法の仮定よりできる.)

[Case 2] の場合

$$\begin{pmatrix} 0 & * & * & * & * \\ a & * & * & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}} \begin{pmatrix} a & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{1} \times (\frac{1}{a})} \begin{pmatrix} 1 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

とできる. あとは右の 2×4 行列を簡約化すれば良い (帰納法の仮定よりできる.)

[Case 3] の場合. 右の 2×4 行列を簡約化すれば良い (帰納法の仮定よりできる.) □

証明をきちんと完成させるには, $n = 1$ の時と, 一般の m について上の議論をやれば良い.

定理 2.3.5 の標準化可能の証明の概略. 行簡約可能性は示した. 簡単のため

$$A = \begin{pmatrix} 1 & * & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \end{pmatrix}$$

としてどのように操作すればいいかをいう.

$$\begin{pmatrix} 1 & * & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow{2 \text{ 列目に } 1 \text{ 列目の } * \text{ 倍を引く}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow{4 \text{ 列目, } 5 \text{ 列目に } 1 \text{ 列目の } * \text{ 倍を引く}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & * & * \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{2 \text{ 列目と } 3 \text{ 列目を交換}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow{4 \text{ 列目, } 5 \text{ 列目に } 2 \text{ 列目の } * \text{ 倍を引く}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

□

証明をきちんと完成させるには, 一般の m について上の議論をやれば良い.

定理 2.3.6 行簡約行列の唯一性の証明. A の行簡約化が B, B' として $B = B'$ を示せば良い. 教科書命題 2.2.3 より行基本変形は可逆なので

$$A \xrightarrow{\text{行基本変形}} B \Leftrightarrow B \xrightarrow{\text{行基本変形}} A$$

となる. 以上より

$$A \xrightarrow{\text{行基本変形}} B \quad \text{and} \quad A \xrightarrow{\text{行基本変形}} B' \Rightarrow B \xrightarrow{\text{行基本変形}} A \quad \text{and} \quad A \xrightarrow{\text{行基本変形}} B' \Rightarrow B \xrightarrow{\text{行基本変形}} B'$$

よって B から B' へ行基本変形で変換できる. 命題 2.2.8 より, ある基本行列の積 P があって

$$PB = B'$$

となる. こっから後の議論は簡単な掛け算と簡約行列の定義に基づく. 以下簡単のため $m = 3, n = 5$

とする. そして

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B' = \begin{pmatrix} 1 & * & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

であった場合にどのような矛盾が起きるか観察する. $PB = B'$ より

$$PB = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & * & * & * \\ d & e & d*+e* & * & * \\ g & h & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B'$$

である. 第 2 行を見比べれば

$$d = 0, e = 0, d* + e* = 1$$

である. よって矛盾する. □

証明をきちんと完成させるには, $B \neq B'$ として, 1 の位置が一致していない一番左端の部分をとって上の議論をすれば良い (と思う).

定理 2.3.6 列簡約化と標準化の唯一性の証明. これは上から従う, というのも A の行基本変形は ${}^t A$ の列基本変形と授業で触れなかった内容より

$$A \text{ の列簡約化} = {}^t A \text{ の行簡約化} \quad \text{標準化} = \text{行簡約化} + \text{列簡約化}$$

であるため. □

定理 2.3.6 階数が等しいことの証明. 行列 A とする. B を A の行簡約化とする. A の行簡約化の 0 でない行ベクトルの個数が標準形の単位行列の次数であることを示すには,

$$\underbrace{B \text{ の 0 でない行ベクトルの個数}}_{=:s} = B \text{ の標準化の } \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ の } r \quad (1)$$

を示せば良い. B の 0 でない行ベクトルの個数を s とすると, 標準化可能の証明を見れば,

$$B \xrightarrow{\text{列基本変形}} \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

とできる. よって

$$A \xrightarrow{\text{行基本変形}} B \xrightarrow{\text{列基本変形}} \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となる. A の標準化は一意的なので $s = r$ を得る.

最後に A の列簡約化の 0 でない行ベクトルの個数が標準形の単位行列の次数であることを示す. A

の行基本変形は tA の列基本変形なので

$$A \text{ の標準化} = {}^tA \text{ の標準化}$$

である. 以上より

A の列簡約化の 0 でない行ベクトルの個数 $= {}^tA$ の行簡約化の 0 でない行ベクトルの個数

$$\stackrel{(1)}{=} {}^tA \text{ の標準化の } \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ の } r \stackrel{\text{上の事実}}{=} A \text{ の標準化の } \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ の } r$$

□

問題 12. 連立 1 次方程式
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 - 2x_3 - 5x_4 = a \end{cases}$$
 の解が存在するような a の値を
全て求めよ.

中間試験の情報

2026 年度春夏学期 大阪大学 全学共通教育科目 線形代数学・同演義 I (理 (数))

期末試験の情報は次のとおりです.

- 日時: 2026 年 6 月 4 日 木曜 2 限 (10:30-12:00) 10:25 までには着席してください.
- 場所: 共 C206 (授業の部屋)
- 持ち込みに関して: 無し (ただしあまりにも暑い場合, 飲み物等の持ち込み可)
- 試験内容: 第 1 回 ~ 第 5 回授業の内容

以下は注意事項です.

- 解答に関して, 答えのみならず, 答えを導出する過程をきちんと記してください. きちんと記していない場合は大幅に減点する場合があります.
- レポート問題の何問かを数値や表現など少し変えて出す予定です.
- 途中退出は 11:00-11:45 までとします. 試験が早く解けたものや諦めたものはこの時間に試験を提出し, その後退出してください.

演習問題及び授業の資料・板書内容は CLE や授業ページ (https://masataka123.github.io/2026_summer_linear_algebra/) にもあります.

試験の欠席対応について

正当な理由での欠席と認められれば別途対応をいたします. ここで正当な理由とはインフルエンザなどの病気または忌引き等です. その場合は岩井に連絡し, 教務課に授業・試験欠席届 (下記 URL 参照) を提出してください.

<https://www.celas.osaka-u.ac.jp/education/absence/>

中間レポート 1 問題

提出締め切り 2026 年 6 月 4 日 (木) 23 時 59 分 59 秒 (日本標準時刻)

- 2026 年 6 月 4 日 (木) 23 時 59 分 59 秒までに CLE にて提出してください。
- レポート問題に関しては提出すれば点数を与えるつもりなので、必ず提出してください。なおレポートは中間と期末の練習も兼ねています。
- レポート問題は全て演習で取り扱ったため、演習での解答を再利用して良い。例えば、演習でといたノートの画像を写真で撮り、それを組み合わせて pdf ファイルを作って提出しても良い。その場合多少字が汚くても良い。
- 解答に関しては答えのみならず、答えを導出する過程をきちんと記すこと。
- レポート問題に関しては、演習で取り扱ったため、CLE や教科書に解答が全てあります。

問題 1. (第 2 回演習追加問題 1) 「 x 軸に関しての鏡映 (折り返し) を行い、 $\frac{3}{4}\pi (=135 \text{ 度})$ 反時計回りに回転する」1 次変換求めよ。

問題 2. (第 2 回演習追加問題 2) 「 x 軸に関しての鏡映 (折り返し) を行い、 $\frac{3}{4}\pi (=135 \text{ 度})$ 反時計回りに回転し、さらに x 軸に関しての鏡映 (反転) を行う」1 次変換を求めよ。またその変換は θ 反時計回りの変換に等しいが、その θ を求めよ。ただし $0 \leq \theta < 2\pi$ とする。

問題 3. (第 2 回演習追加問題 5) $\mathbb{F}_7 = \{0, 1, 2, \dots, 6\}$ として、加法 $+$ と乗法 $\bullet$ を次で定義する。

- $a, b \in \mathbb{F}_7$ について $a + b := (a \text{ たす } b \text{ を } 7 \text{ で割ったあまり})$ 。
- $a, b \in \mathbb{F}_7$ について $a \bullet b := (a \text{ かける } b \text{ を } 7 \text{ で割ったあまり})$ 。

(これによって $\mathbb{F}_7$ は体となる) $a = 1, 2, \dots, 6$ について $\mathbb{F}_7$ での $-a, a^{-1}$ をそれぞれ求めよ。

問題 4. (第 3 回演習 教科書 2.1.2)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

とする。

(1) AB, BA, BC, CB, CA, AC の 6 個のうち、行列の積として定まらないものをすべてあげよ。

(2) AB, BA, BC, CB, CA, AC の 6 個のうち、行列の積として定まるものすべてに対して積を計算せよ。

問題 5. (第 3 回演習 教科書 2.1.11) n 次正方行列 $A = [a_{ij}]$ に対して、対角成分の和 $a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ を A のトレースとよび、 $\text{tr}(A)$ で記す。任意の n 次正方行列 A, B に対して、 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ が成り立つことを示せ。

問題 6. (第 3 回演習追加問題 8) n 次正方行列 A が正則行列であるとする。この時 n 次正方行列 B について、 $AB = O_n$ ならば $B = O_n$ であることを示せ。(ヒント: 教科書 p.23 の (3) と p.22 の $AE_n = E_nA = A$ を使う。)

問題 7. (第 4 回演習 教科書 2.2.3) 正方行列 A に何回かの行基本変形を施して

$$\begin{bmatrix} A' \\ 0 \cdots 0 \end{bmatrix}$$

という最後の行がすべて 0 であるような行列に変換できるとする. このとき, A は逆行列をもたないことを証明せよ.

問題 8. (第 4 回演習 教科書 2.3.2) $C = \begin{bmatrix} 4 & -7 & 6 & 1 \\ 1 & 0 & 5 & 2 \\ -1 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ の行簡約化, 階数, 標準化を求めよ.

問題 9. (第 5 回演習 教科書 2.4.1(3)) 連立方程式を解け.

$$\begin{cases} 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 3 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 1 \\ -2x_1 - x_2 + x_4 = 1 \end{cases}$$

問題 10. (第 5 回演習 教科書 2.5.2(2)) 次で与えられた n 次正方行列 A に対して, $\tilde{A} = \begin{bmatrix} A & E_n \end{bmatrix}$ の行簡約化を計算することによって, A の逆行列 A^{-1} を求めよ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

問題 11. (第 5 回演習 教科書 2.5.3) A を n 次正方行列とすると, A が正則であるための必要十分条件は A が零因子でないことである. このことを証明せよ. ここで A が零因子であるとは, あるゼロ行列でない n 次正方行列 B があって AB または BA がゼロ行列となることとする.

問題 12. (第 5 回演習 追加問題 12) 連立 1 次方程式 $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 - 2x_3 - 5x_4 = a \end{cases}$ の解が存在するような a の値を全て求めよ.

命題 2.5.3 の証明を再度紹介しておく. 使う事実は以下の通り.

- (教科書 2.3.9) n 次正方行列 A が行簡約で $\text{rank} A = n$ ならば $A = E_n$
- (教科書 2.3.9) n 次正方行列 A が行簡約で $\text{rank} A < n$ ならば

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

としたに 0 が並ぶ.

- (教科書 2.2.8, 2.3.5)

$$A \xrightarrow{\text{行基本変形}} B \text{ 行簡約行列} \Leftrightarrow \text{ある基本行列の積 } P \text{ があって } PA = B$$

- (教科書 2.2.7) 基本行列は正則で, その逆行列も基本行列

命題 174 (教科書 命題 2.5.3). A, B を n 次正方行列とする. もし $BA = E_n$ ならば, A と B はともに正則行列であり, $B = A^{-1}$ である.

Proof. B が正則であることを示す.

$$B \xrightarrow{\text{行基本変形}} C \text{ 行簡約行列}$$

と簡約化すると, ある基本行列の積でかける P があって

$$PB = C$$

である.

$\text{rank} B = n$ を背理法で示す. $\text{rank} B < n$ ならば, $\text{rank} C < n$ より, 上の事実から

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

としたに 0 が並ぶ. すると

$$P = P \underbrace{(BA)}_{=E_n \text{ 仮定}} = (PB)A = CA$$

である. よって行列の積を考えれば

$$CA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{n-1,1} & d_{n-1,2} & \cdots & d_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

としたに 0 が並ぶ. 教科書問題 2.2.3 より P は逆行列を持たない. しかし P は基本行列の積より, 正則行列である. よって矛盾.

よって $\text{rank} B = n$ である. $\text{rank} C = n$ より, 上の事実から

$$C = E_n \Rightarrow B = P^{-1}C = P^{-1}$$

P は基本行列の積より, P^{-1} もそうなる. よって正則である. よって B 正則である.

また

$$BA = B^{-1}B = E_n \Rightarrow A = B^{-1} \Rightarrow A \text{ は正則で } B = A^{-1}$$

教科書 2.1.1

□

定理 175. n 次正方行列 A に対して, 次の条件はすべて同値である.

- (1) $\text{rank} A = n$.
- (2) A は正則行列である.
- (3) A は基本行列の積で表される.
- (4) 拡大行列 $[A \mid E_n]$ は, 行基本変形によって $[E_n \mid B]$ の形に変形できる.
- (5) A は行基本変形によって E_n に変形できる.
- (6) 任意の $b \in \mathbb{R}^n$ に対して, 連立一次方程式 $Ax = b$ は解をもつ.
- (7) 同次連立一次方程式 $Ax = 0$ の解は $x = 0$ のみである.

また, (4) において $[A \mid E_n] \longrightarrow [E_n \mid B]$ となったとき, $B = A^{-1}$ である.

Proof. [(1) $\Rightarrow$ (3)]

$$A \xrightarrow{\text{行基本変形}} C \text{ 行簡約行列}$$

と簡約化すると, ある基本行列の積でかける P があって

$$PA = C$$

である. $\text{rank} A = \text{rank} C = n$ より, 上の事実から

$$C = E_n \Rightarrow A = P^{-1}C = P^{-1}$$

P は基本行列の積より, P^{-1} もそうなる.

[(3) $\Rightarrow$ (2)] 基本行列は正則で正則行列の積は正則なので.

[(2) $\Rightarrow$ (1)] 対偶を示す. つまり

$$\text{rank}(A) < n \Rightarrow A \text{ は正則でない}$$

を示す.

$$A \xrightarrow{\text{行基本変形}} C \text{ 行簡約行列}$$

と簡約化すると, ある基本行列の積でかける P があって

$$PA = C$$

である. $\text{rank} A < n$ ならば, $\text{rank} C < n$ より, 上の事実から

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

としたに 0 が並ぶ. よって教科書問題 2.2.3 より C は逆行列を持たず, 正則でない. よって A は正則でない.¹⁷

[(3) $\Rightarrow$ (4)] $A = P$ を基本行列の積でかくと, P^{-1} も基本行列の積であり

$$P^{-1}[A : E_n] = [E_n : P^{-1}] \Leftrightarrow [A : E_n] \xrightarrow{\text{行基本変形}} [E_n : P^{-1}]$$

よって $B = P^{-1}$ とおけば良い

[(4) $\Rightarrow$ (2)]

$$[A : E_n] \xrightarrow{\text{行基本変形}} [E_n : B]$$

と簡約化すると, ある基本行列の積でかける P があって

$$P[A : E_n] = [E_n : B] \Leftrightarrow PA = E_n, P = B$$

となる. よって $BA = E_n$ なので, 命題 2.5.3 から A は正則で $B = A^{-1}$ である.

[(4) $\Leftrightarrow$ (5)] 明らか. (もしわからない場合は示してみよう.)

[(1) $\Leftrightarrow$ (6) $\Leftrightarrow$ (7)] 定理 2.4.6(2) および系 2.4.8 による. □

¹⁷もし A が正則なら $C = PA$ より C も正則になってしまう.

中間レポート1 解答例

2026 年度 線形代数

ほとんどの解答を chatGPT に書いてもらいました.

問題 1. (第 2 回演習追加問題 1) 「 x 軸に関しての鏡映 (折り返し) を行い, $\frac{3}{4}\pi (=135 \text{ 度})$ 反時計回りに回転する」1 次変換求めよ.

問題 2. (第 2 回演習追加問題 2) 「 x 軸に関しての鏡映 (折り返し) を行い, $\frac{3}{4}\pi (=135 \text{ 度})$ 反時計回りに回転し, さらに x 軸に関しての鏡映 (反転) を行う」1 次変換を求めよ. またその変換は θ 反時計回りの変換に等しいが, その θ を求めよ. ただし $0 \leq \theta < 2\pi$ とする.

解答 1. x 軸に関する鏡映を

$$\sigma_x(x, y) = (x, -y)$$

とおく. また, 角度 α の反時計回りの回転を

$$\rho_\alpha(x, y) = (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha)$$

とおく.

問題の変換は, まず x 軸に関する鏡映を行い, その後に $3\pi/4$ 反時計回りに回転する変換である. したがって, 求める変換は

$$T_1 = \rho_{3\pi/4} \circ \sigma_x$$

である.

実際に計算する. まず

$$\sigma_x(x, y) = (x, -y)$$

であるから,

$$T_1(x, y) = \rho_{3\pi/4}(x, -y).$$

ここで

$$\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

である. よって

$$\begin{aligned} T_1(x, y) &= \left(x \cos \frac{3\pi}{4} - (-y) \sin \frac{3\pi}{4}, x \sin \frac{3\pi}{4} + (-y) \cos \frac{3\pi}{4} \right) \\ &= \left(x \cos \frac{3\pi}{4} + y \sin \frac{3\pi}{4}, x \sin \frac{3\pi}{4} - y \cos \frac{3\pi}{4} \right) \\ &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y, \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y \right). \end{aligned}$$

[別解] x 軸に関する鏡映を

$$S_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

とおく. また, $3\pi/4$ 反時計回りの回転を

$$R_{3\pi/4} = \begin{pmatrix} \cos \frac{3\pi}{4} & -\sin \frac{3\pi}{4} \\ \sin \frac{3\pi}{4} & \cos \frac{3\pi}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

とおく. 先に x 軸に関する鏡映を行い, その後に回転するので, 求める行列は

$$R_{3\pi/4} S_x = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

したがって

$$T(x, y) = \left(-\frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}}, \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}} \right)$$

である.

解答 2.

問題の変換は, まず x 軸に関する鏡映を行い, 次に $3\pi/4$ 反時計回りに回転し, 最後にもう一度 x 軸に関する鏡映を行う変換である. したがって, 求める変換は

$$T_2 = \sigma_x \circ \rho_{3\pi/4} \circ \sigma_x$$

である.

問題 1 で

$$\rho_{3\pi/4} \circ \sigma_x$$

は

$$(x, y) \mapsto \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y, \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y \right)$$

であった. これに最後の σ_x を合成する. すなわち,

$$\sigma_x(X, Y) = (X, -Y)$$

であるから,

$$\begin{aligned} T_2(x, y) &= \sigma_x \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y, \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y \right) \\ &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y, -\frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y \right). \end{aligned}$$

したがって、行列表示は

$$T_2 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

一方、角度 θ の反時計回りの回転行列は

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

である。今、

$$T_2 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

なので、

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

である。よって

$$\theta = \frac{5\pi}{4}$$

である。

したがって

$$T_2 = R_{5\pi/4}$$

であり、

$$\theta = \frac{5\pi}{4}$$

である。

[別解] x 軸に関する鏡映を

$$S_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

とおく。変換は

$$x \text{ 軸鏡映} \longrightarrow 3\pi/4 \text{ 回転} \longrightarrow x \text{ 軸鏡映}$$

の順であるから、求める行列は

$$S_x R_{3\pi/4} S_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

これは

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

の形で, $\cos \theta = \sin \theta = -\sqrt{2}/2$ である. よって

$$\theta = \frac{5\pi}{4}$$

である.

問題 3. (第 2 回演習追加問題 5) $\mathbb{F}_7 = \{0, 1, 2, \dots, 6\}$ として, 加法 $+$ と乗法 $\bullet$ を次で定義する.

- $a, b \in \mathbb{F}_7$ について $a + b := (a \text{ たす } b \text{ を } 7 \text{ で割ったあまり})$.
- $a, b \in \mathbb{F}_7$ について $a \bullet b := (a \text{ かける } b \text{ を } 7 \text{ で割ったあまり})$.

(これによって $\mathbb{F}_7$ は体となる) $a = 1, 2, \dots, 6$ について $\mathbb{F}_7$ での $-a, a^{-1}$ をそれぞれ求めよ.

解答. $\mathbb{F}_7$ ではすべての計算を 7 で割った余りで行う.

まず $-a$ は

$$a + (-a) \equiv 0 \pmod{7}$$

を満たす元である. よって

a	1	2	3	4	5	6
$-a$	6	5	4	3	2	1

である.

次に a^{-1} は

$$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{7}$$

を満たす元である. 直接計算すると

$$1 \cdot 1 \equiv 1, \quad 2 \cdot 4 \equiv 1, \quad 3 \cdot 5 \equiv 1, \quad 4 \cdot 2 \equiv 1, \quad 5 \cdot 3 \equiv 1, \quad 6 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

したがって

a	1	2	3	4	5	6
a^{-1}	1	4	5	2	3	6

である.

問題 4. (第 3 回演習 教科書 2.1.2)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

とする.

(1) AB, BA, BC, CB, CA, AC の 6 個のうち, 行列の積として定まらないものをすべてあげよ.

(2) AB, BA, BC, CB, CA, AC の 6 個のうち, 行列の積として定まるものすべてに対して積を計算せよ.

解答.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

である. サイズは

$$A : 2 \times 3, \quad B : 3 \times 2, \quad C : 2 \times 2$$

である.

(1) 積が定まるかどうかは, 左の行列の列数と右の行列の行数が一致するかで決まる.

$$AB, BA, BC, CA$$

は定まるが,

$$\boxed{CB, AC}$$

は定まらない.

(2) 定まる積を計算する.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$BA = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 9 \\ 2 & -2 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$BC = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 10 \\ 6 & 8 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$CA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 7 & 2 & 12 \end{pmatrix}.$$

問題 5. (第 3 回演習 教科書 2.1.11) n 次正方行列 $A = [a_{ij}]$ に対して, 対角成分の和 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ を A のトレースとよび, $\text{tr}(A)$ で記す. 任意の n 次正方行列 A, B に対して, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ が成り立つことを示せ.

解答. $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ とする. このとき

$$(AB)_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji}$$

であるから,

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n (AB)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji}.$$

一方,

$$(BA)_{jj} = \sum_{i=1}^n b_{ji} a_{ij}$$

であるから,

$$\operatorname{tr}(BA) = \sum_{j=1}^n (BA)_{jj} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ji} a_{ij}.$$

成分は数であるから $a_{ij} b_{ji} = b_{ji} a_{ij}$ であり, 和をとる順序も入れ替えられる. したがって

$$\boxed{\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)}$$

である.

問題 6. (第 3 回演習追加問題 8) n 次正方行列 A が正則行列であるとする. この時 n 次正方行列 B について, $AB = O_n$ ならば $B = O_n$ であることを示せ. (ヒント: 教科書 p.23 の (3) と p.22 の $AE_n = E_n A = A$ を使う.)

解答. A は正則行列なので逆行列 A^{-1} が存在する. $AB = O_n$ とする. 左から A^{-1} をかけると

$$A^{-1}AB = A^{-1}O_n.$$

左辺は

$$A^{-1}AB = (A^{-1}A)B = E_n B = B$$

であり, 右辺は O_n である. よって

$$\boxed{B = O_n}$$

である.

問題 7. (第 4 回演習 教科書 2.2.3) 正方行列 A に何回かの行基本変形を施して

$$\begin{bmatrix} A' \\ 0 \cdots 0 \end{bmatrix}$$

という最後の行がすべて 0 であるような行列に変換できるとする. このとき, A は逆行列をもたないことを証明せよ.

解答. 背理法. A が正則とする. 仮定より

$$A \xrightarrow{\text{行基本変形}} \begin{bmatrix} A' \\ 0 \cdots 0 \end{bmatrix}$$

であるので, ある基本行列の積でかける P があって

$$PA = \begin{bmatrix} A' \\ 0 \cdots 0 \end{bmatrix}$$

となる. 今

$$A^{-1}P^{-1} := \begin{bmatrix} B & \mathbf{b} \end{bmatrix}$$

とブロック分解する. B は $n \times (n-1)$ 行列で, $\mathbf{b}$ は $n \times 1$ 行列である. すると

$$E_n = PA(A^{-1}P^{-1}) = \begin{bmatrix} A' \\ 0 \cdots 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & \mathbf{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A'B & A'\mathbf{b} \\ 0 \cdots 0 & 0 \end{bmatrix}$$

としたに 0 が続く. これは nn 成分が $1 = 0$ となり矛盾. よって A は正則でなく逆行列をもたない.

問題 8 (第 4 回演習 教科書 2.3.2) $C = \begin{bmatrix} 4 & -7 & 6 & 1 \\ 1 & 0 & 5 & 2 \\ -1 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ の行簡約化, 階数, 標準化を求めよ.

解答.

$$C = \begin{pmatrix} 4 & -7 & 6 & 1 \\ 1 & 0 & 5 & 2 \\ -1 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

である. 行基本変形を行うと

$$\begin{pmatrix} 4 & -7 & 6 & 1 \\ 1 & 0 & 5 & 2 \\ -1 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 2 \\ 4 & -7 & 6 & 1 \\ -1 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -7 & -14 & -7 \\ 0 & 5 & 10 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 10 & 5 \\ 0 & -7 & -14 & -7 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

となる. よって階数は

$$\boxed{\text{rank } C = 2}$$

である.

標準化は

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となる.

問題 9. (第 5 回演習 教科書 2.4.1(3)) 連立方程式を解け.

$$\begin{cases} 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 3 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 1 \\ -2x_1 - x_2 + x_4 = 1 \end{cases}$$

解答. 拡大係数行列を行簡約化する.

$$[A : \mathbf{b}] = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 3 & 6 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = [A' : \mathbf{b}']$$

したがって $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ をとくと

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = -1, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$$

$x_3 = s, x_4 = t$ とおくと,

$$x_1 = s + t - 1, \quad x_2 = -2s - t + 1.$$

よって解は

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (s + t - 1, -2s - t + 1, s, t) \quad (s, t \text{ は任意})$$

である.

$$\text{答えの書き方として } \begin{cases} x_1 = -1 + c_1 + c_2 \\ x_2 = 1 - 2c_1 - c_2 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2 \end{cases} \quad (c_2, c_4 \text{ は任意}) \text{ でも良い}$$

問題 10. (第 5 回演習 教科書 2.5.2(2)) 次で与えられた n 次正方行列 A に対して, $\tilde{A} = [A \ E_n]$ の行簡約化を計算することによって, A の逆行列 A^{-1} を求めよ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

解答.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

である. 拡大行列 $[A \ E_3]$ を行簡約化する.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{8}{3} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{5}{3} & -1 \end{array} \right).$$

したがって

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{8}{3} & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ \frac{1}{3} & -\frac{5}{3} & -1 \end{pmatrix}$$

である.

問題 11. (第 5 回演習 教科書 2.5.3) A を n 次正方行列とすると, A が正則であるための必要十分条件は A が零因子でないことである. このことを証明せよ. ここで A が零因子であるとは, あるゼロ行列でない n 次正方行列 B があって AB または BA がゼロ行列となることとする.

解答. まず A が正則であるとする. $AB = O_n$ なら, 左から A^{-1} をかけて

$$B = A^{-1}AB = O_n$$

となる. また $BA = O_n$ なら, 右から A^{-1} をかけて

$$B = BAA^{-1} = O_n$$

となる. よって, A は零因子ではない.

A が正則でなければ A が零因子を示す. A を

$$A \xrightarrow{\text{行基本変形}} C \text{ 行簡約行列}$$

と簡約化すると, ある基本行列の積でかける P があって

$$PA = C$$

である.

A が正則でないので、定理から $\text{rank} A < n$ である。よって $\text{rank} C < n$ となり、

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

としたに 0 が並ぶ。そこで

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。(成分表示すれば $(1, n)$ 成分が 1 で他が 0 の行列) B は零行列ではない。また

$$CB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = O$$

となる。よって P は正則なので、

$$AB = P^{-1}PAB = P^{-1}CB = P^{-1}O = O$$

であるので、 A は定義から零因子である。

以上より、 A が正則であることと、 A が零因子でないことは同値である。

[別解 chatGPT による賢い方法] 「 A が正則でない $\Rightarrow$ 零因子である。」の証明

逆に A が正則でないとする。このとき同次連立一次方程式

$$Ax = 0$$

は零ベクトルでない解 $x \neq 0$ をもつ。そこで、 x を第 1 列とし、それ以外の列をすべて 0 とする行列

$$B = \begin{pmatrix} x & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

を考える。 $x \neq 0$ なので $B \neq O_n$ である。しかし

$$AB = \begin{pmatrix} Ax & A0 & \cdots & A0 \end{pmatrix} = O_n.$$

したがって A は零因子である。

問題 12. (第 5 回演習 追加問題 12) 連立 1 次方程式
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 - 2x_3 - 5x_4 = a \end{cases}$$
 の

解が存在するような a の値を全て求めよ.

解答. 拡大係数行列を考え簡約化すると

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -5 & a \end{array} \right) &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & -5 & a \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+3 \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

となる. これを拡大係数行列になるような連立一次方程式は

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + 7x_4 = 5 \\ x_2 - 2x_3 - 5x_4 = -3 \\ 0 = a+3 \end{cases}$$

となる. 解が存在するためには, 最後の行に関して

$$a+3=0$$

である必要がある. 実際 $a=-3$ の場合

$$\begin{cases} x_1 = 5 + c_1 - 7c_2 \\ x_2 = -3 + 2c_1 + 5c_2 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2 \end{cases} \quad (c_1, c_2 \text{ は任意})$$

と解が存在し, 十分性も示された. したがって

$$\boxed{a = -3}$$

である.

問題 13. 5 次置換 σ, τ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

とする. 次の問いに答えよ.

- (a) $\sigma\tau, \tau\sigma, \sigma^{-1}$ を求めよ.
- (b) σ と τ の転倒数と符号を求めよ.
- (c) $\sigma\tau$ の転倒数と符号を求め, $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$ を確認せよ.

問題 14. 4 次置換 σ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

とする. 次の問いに答えよ.

- (a) σ の符号 $\text{sgn}(\sigma)$ を求めよ
- (b) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 3x_1x_2 + x_3^2 + 4x_1x_2x_3$ とする. $f^\sigma(x_1, x_2, x_3, x_4)$ を求めよ.
- (c) 差積 $D(x_1, \dots, x_4) := \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (x_i - x_j)$ を書き下せ.
- (d) $D^\sigma(x_1, \dots, x_4)$ を求めよ. また $D^\sigma(x_1, \dots, x_4) = \text{sgn}(\sigma)D(x_1, \dots, x_4)$ を確かめよ.
- (e) 判別式

$$\Delta(x_1, \dots, x_4) := \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (x_i - x_j)^2$$

とする. $\Delta^\sigma(x_1, \dots, x_4)$ を求めよ.

問題 15. 異なる二つの整数 i, j のみを入れ替え, 他の k を入れ替えない置換を互換といい (i, j) とかく. 例えば

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = (1, 2) \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} = (3, 4) \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} = (1, 4)$$

は全て互換である. 次の問いに答えよ.

- (a) (定理 3.1.9) 互換の符号を求めよ.
- (b) (定理 3.1.11) r 個の互換の積で表される置換の符号を求めよ.

問題 16. $n \geq 2$ となる整数とする. 次の問いに答えよ.

- (a) n 次対称群 S_n の個数が $n!$ 個であることを示せ.
- (b) n 次交代群 A_n の個数が $\frac{n!}{2}$ 個であることを示せ. ここで n 次交代群 A_n とは偶置換全体の集合である.
- (c) 偶置換と偶置換の積は偶置換であることを示せ.

このページの問題はとても難しいので解けなくても全く問題ないです。3年の授業で詳しく習うと思います。

問題 17. ある部屋に 100 人集められている。別の部屋に 100 個のロッカーがあり、それぞれのロッカーには 100 人のうち 1 人の名前が書かれた紙が入れてある。違うロッカーには違う名前の紙が入っている。

順番を決め、1 人がロッカーの部屋に入り、50 個のロッカーを開ける。その中に自分の名前があれば、ロッカーを元の状態に戻し、次の人がロッカー部屋に入り、50 個のロッカーを開ける。これを繰り返し、100 人が皆自分の名前を見つけられたらゲームは成功。1 人でも名前が見つけれなければゲームは失敗である。

100 人はゲームを始める前に議論し戦略を決めることができる。ただしゲームが始まったらお互いに話すこと・情報を伝えることはできない。

普通に戦略なしでやれば

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{100} \times 100 \sim 7.88 \times 10^{-29}\%$$

でクリア不可能に思われる。しかしこのゲームにおいて、30%以上の確率で成功する戦略が存在する。その戦略を考えよ。¹⁸

問題 18.

$$(12)(34) = (132)(134) \quad (12)(13) = (132)$$

を示せ。これを用いて $n \geq 3$ について、 n 次交代群 A_n の任意の元は 3 cycle の積でかけることを示せ。ここで 3 個からなる巡回置換 $(k_1, k_2, k_3) \in S_n$ を 3 cycle という。

問題 19. $\sigma, \tau \in S_n$ について

$$[\sigma, \tau] := \sigma^{-1}\tau^{-1}\sigma\tau$$

と定義する。以下の式を示せ。

$$(123) = [(12), (134)] \quad (123) = [(124), (135)]$$

問題 20. 上の 2 問を用いて次の問いに答えよ。

- $[S_n, S_n] := \{[\sigma_1, \tau_1] \cdots [\sigma_l, \tau_l] \mid \sigma_1, \tau_1, \dots, \sigma_l, \tau_l \in S_n, l \in \mathbb{N}\}$ と定義する。 $n \geq 3$ について、 $[S_n, S_n] = A_n$ を示せ。
- $[A_n, A_n] := \{[\sigma_1, \tau_1] \cdots [\sigma_l, \tau_l] \mid \sigma_1, \tau_1, \dots, \sigma_l, \tau_l \in A_n, l \in \mathbb{N}\}$ と定義する。 $n \geq 5$ について、 $[A_n, A_n] = A_n$ を示せ。特にこれから S_n, A_n が $n \geq 5$ について、可解でないことがわかる。(詳しいことは学部 3 年で習う)
- ε を恒等置換とする。 $[A_3, A_3] = \{\varepsilon\}$ であることを示せ。
- $[A_4, A_4] = \{\varepsilon, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ であることを示せ。また右辺の集合を V とし $[V, V]$ を上と同様に考えるとき、 $[V, V]$ を求めよ。これから S_3, A_3, S_4, A_4 が可解 (solvable) であることがわかる (詳しいことは学部 3 年で習う)。

¹⁸ えびまらボさんによる 20 人の囚人と 12 個の箱【ゆっくり解説】があります。 <https://www.youtube.com/watch?v=gLHWaYhssXY>

授業で行列式を定義した。しかし定義だけで行列式を計算するのは難しい。そこで今日の演習では、とりあえず以下の定理を認めて行列式を計算できるようになることを目標とする。

定理 176. [教科書, 定理 3.2.5, 3.2.9] 行基本変形と行列式は以下のように対応する。

1. 第 i 行を c 倍すると、行列式も c 倍される。
2. $i \neq j$ について、第 i 行と第 j 行入れ替えると、行列式は -1 倍になる。
3. $i \neq j$ について、第 i 行に第 j 行の c 倍を足しても、行列式は不変である。

また”行”の部分をも”列”に変えても同様のことが成り立つ。

定理 177. [教科書, 定理 3.3.2] A を $n-1$ 次正方行列とすると、 $a \in K$ について次が成り立つ。

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ * & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & * \\ 0 & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & * \\ 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ * & a \end{vmatrix} = a|A|$$

定理 178. [教科書, 定理 3.2.8] $\det({}^t A) = \det(A)$

これを使うと行列式が計算できるようになる。

まとめ 179 (行列式の計算方法 1.).

操作 1. 次の行基本変形を繰り返して操作 2 の左辺の形にする。

- (I) ある行を λ 倍すると、行列式も λ 倍される。
- (II) 二つの行を入れ替えると、行列式は -1 倍になる。
- (III) ある行のスカラー倍を他の行に加えても行列式は不変である。

なお必要ならば、行列の転置をとってもいい。転置をとっても行列式は不変である。(もちろん列基本変形を用いても良い)。

操作 2. [教科書, 定理 3.3.2] を用いる。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

操作 3. 行列のサイズが 2 の場合は操作 4 に、そうでない場合は行列のサイズが 2 になるまで操作 1 と 2 を繰り返す。

操作 4. 行列の 2 の場合の行列式の公式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ を用いる.

ただし操作 3, 4 に関しては 3×3 行列の行列式の公式 (サラスの公式) を用いても良い.

例 180. $\begin{pmatrix} 2 & -4 & -5 & 3 \\ -6 & 13 & 14 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & -8 \\ 2 & -5 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ の行列式は次のように求められる.

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 & -5 & 3 \\ -6 & 13 & 14 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & -8 \\ 2 & -5 & 0 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{操作 1 (I)}]{(-1)} \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 & -8 \\ -6 & 13 & 14 & 1 \\ 2 & -4 & -5 & 3 \\ 2 & -5 & 0 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{操作 1 (III)}]{(-1)} \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & -47 \\ 0 & 0 & -1 & 19 \\ 0 & -1 & 4 & 21 \end{vmatrix} \\
 \xrightarrow[\text{操作 2}]{(-1)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -47 \\ 0 & -1 & 19 \\ -1 & 4 & 21 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{操作 1 (III)}]{(-1)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -47 \\ 0 & -1 & 19 \\ 0 & 6 & -26 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{操作 2}]{(-1)} \begin{vmatrix} -1 & 19 \\ 6 & -26 \end{vmatrix} \\
 \xrightarrow[\text{操作 4}]{(-1)} (-1) \{(-1) \times (-26) - 6 \times 19\} = 88.$$

例 181. [教科書, 例 3.1.13] 上三角行列の行列式は対角成分の積である.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

下三角行列も同様である. 授業で示したが, 上を用いてもわかる. 特に単位行列の行列式は 1.

演習問題 3.3.2 を解く上では必要であり, かつ下の性質は重要なので書いておく.

定理 182. [教科書, 定理 3.3.4] $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

補足 183. 演習問題 3.2.3 によって基本変形での振る舞いと $\det E_n = 1$ という条件があれば $\det$ はただ一つに定まる. 他にも交代性 (基本変形の 2 つ目) と多重線形性 (基本変形の 1 つ目と [教科書, 定理 3.2.1]), そして $\det(E_n) = 1$ という条件があれば $\det$ はただ一つに定まる.

なので $\det$ の形が理解できなくてもそこまで問題ない. 実際上の唯一性を用いて $\det$ を定義している教科書もある.

教科書の定理 2.3.9, 2.4.8, 2.5.1, 2.5.4, 3.3.5 をまとめると以下のことが言える. これは正則行列の特徴づけともいえ重要である.

定理 184. 体 K 上の n 次正方行列 A に対して, 次の条件はすべて同値である.

- (1) $\text{rank } A = n$.
- (2) A は正則行列である. つまり逆行列 A^{-1} が存在する.
- (3) A は有限個の基本行列の積で表される.
- (4) 拡大行列 $[A \mid E_n]$ は, 行基本変形によって $[E_n \mid B]$ の形に変形できる.
- (5) A は行基本変形によって E_n に変形できる.
- (6) 任意の $b \in K^n$ に対して, 連立一次方程式 $Ax = b$ はただ一つの解をもつ.
- (7) 同次連立一次方程式 $Ax = 0$ の解は $x = 0$ のみである.
- (8) $\det A \neq 0$

また, (4) において $[A \mid E_n] \rightarrow [E_n \mid B]$ となったとき, $B = A^{-1}$ である.

また行列式の次の性質は重要である.

定理 185. [教科書, 定理 3.3.4] 体 K 上の n 次正方行列 A, B に対して,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

問題 21. 以下の問題は他学科の期末試験で出した証明問題である. 次の問題に答えよ.

- (1) $n \times n$ 行列 A, B, C について, $\det(ABC) = \det(BAC)$ であることを示せ.
- (2) $n \times n$ 行列 A, B について, A と B が正則ならば, AB もまた正則行列であることを示せ.
- (3) $n \times n$ 行列 A, B について, AB が正則行列であるならば, A も B も正則であることを示せ.
- (4) 実数係数の $n \times n$ 行列 A について, ${}^tAA = E_n$ ならば, $\det(A) = \pm 1$ であることを示せ. ここで tAA は tA と A の積のことである.
- (5) 実数係数の $n \times n$ 行列 A について, $A^7 = E_n$ ならば, $\det(A) = 1$ であることを示せ.
- (6) 実数係数の 2×2 行列 A について, $A^7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ かつ $A \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ となるものの例を一つあげよ.

まとめ 186 (行列式の計算方法 2.). 行列に 0 が多めにある場合は余因子展開を用いても良い.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} \begin{vmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix}$$

例 187. 行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 13 & 5 \\ 5 & 3 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & 9 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ の行列式は次のように求められる.

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+1} a_{11} \det(A_{11}) + (-1)^{2+1} a_{21} \det(A_{21}) + (-1)^{3+1} a_{31} \det(A_{31}) + (-1)^{4+1} a_{41} \det(A_{41}) \\ &= 2 \begin{vmatrix} 3 & 8 & 2 \\ 0 & 9 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 7 & 13 & 5 \\ 0 & 9 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 7 & 13 & 5 \\ 3 & 8 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 7 & 13 & 5 \\ 3 & 8 & 2 \\ 0 & 9 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} 3 & 8 & 2 \\ 0 & 9 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 7 & 13 & 5 \\ 0 & 9 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \times 3 \begin{vmatrix} 9 & 4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - 5 \times 7 \begin{vmatrix} 9 & 4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = (2 \times 3 - 5 \times 7) \times (9 \times 1 - 4 \times (-2)) = -493. \end{aligned}$$

問題 22. 実数係数の連立 1 次方程式

$$\begin{cases} x_1 & & - x_3 & = & 0 \\ 2x_1 & + & \lambda x_2 & - & x_3 & = & 0 \\ (\lambda + 1)x_1 & + & x_2 & + & \lambda x_3 & = & 0 \end{cases}$$

が $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ 以外の解を持つような λ の値を全て求めよ. (ヒント: 前回の演習追加プリントにある行列の正則性の特徴づけを用いる.)

問題 23. 次の行列の行列式をそれぞれ求めよ. (1). $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (2). $\begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 7 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

問題 24. $a_0, \dots, a_n \in K$ かつ x を変数とする. 以下の等式を示せ.

$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & & x & -1 \\ a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n.$$

(ヒント: 余因子展開と帰納法を用いる.)

問題 25. 整数からなる n 次正方行列 A について, $\det A = 1$ ならば, 逆行列 A^{-1} のどの成分も整数であることを示せ. (ヒント: 余因子行列を用いる.)

授業の最後に行っていた内容は次の定理のことである.

定理 188 (行列式の唯一性). n 次正方行列の集合から体 K への関数

$$f: \{n \text{ 次正方行列} \} \rightarrow K$$

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{pmatrix} \mapsto f(A) = f(\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n)$$

で次を満たすとする.

1. (多重線形性) $\mathbf{b}_i \in K^n$ と $\lambda, \mu \in K$ について

$$\begin{aligned} & f(\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \lambda \mathbf{a}_i + \mu \mathbf{b}_i \ \cdots \ \mathbf{a}_n) \\ &= \lambda f(\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_i \ \cdots \ \mathbf{a}_n) + \mu f(\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_i \ \cdots \ \mathbf{a}_n). \end{aligned}$$

2. (交代性) $1 \leq i < j \leq n$ なる i, j について, i 番目と j 番目を入れ替えると符号が変わる.

$$f(\mathbf{a}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{a}_j}_i, \dots, \underbrace{\mathbf{a}_i}_j, \dots, \mathbf{a}_n) = -f(\mathbf{a}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{a}_i}_i, \dots, \underbrace{\mathbf{a}_j}_j, \dots, \mathbf{a}_n)$$

このとき $f(A) = f(E_n) \det A$ となる. 特に 1, 2 を満たす f で $f(E_n) = 1$ となるものは行列式 $\det$ のみに限る.

期末試験の情報

2026 年度春夏学期 大阪大学 全学共通教育科目 線形代数学・同演義Ⅰ（理（数））

期末試験の情報は次のとおりです。

- 日時: 2026 年 7 月 30 日 木曜 2 限 (10:30-12:00) 10:25 までには着席してください。
- 場所: 共 C206 (授業の部屋)
- 持ち込みに関して: 筆記用具以外の持ち込みは不可。ただし暑いので飲み物の持ち込みは認める。
- 試験内容: 授業全体の内容

以下は注意事項です。

- 解答に関して、答えのみならず、答えを導出する過程をきちんと記してください。 きちんと記していない場合は大幅に減点する場合があります。
- 期末試験に
 - － 中間レポート 2 (7/30 締切)
 - － 中間試験の大問 1 から大問 8(1) まで (大問 8(2), 大問 8(3) は除く)の何問かを数値や表現など少し変えて出す予定です。なので優先的にこの 2 つを先に勉強すると思います。
中間レポート 1(6/4 締切) の内容を出す可能性もあります。ただし現時点で問題を作っていないので、どうなるか分かりません。
- 途中退出は 11:00-11:45 までとします。試験が早く解けたものや諦めたものはこの時間に試験を提出し、その後退出してください。

演習問題及び授業の資料・板書内容は CLE や授業ページ (https://masataka123.github.io/2026_summer_linear_algebra/) にもあります。中間レポート 2・中間試験・中間レポート 1 に関しても CLE や授業ページに問題と解答があります。

試験の欠席対応について

正当な理由での欠席と認められれば別途対応をいたします。ここで正当な理由とはインフルエンザなどの病気または忌引き等です。その場合は岩井に連絡し、教務課に授業・試験欠席届 (下記 URL 参照) を提出してください。

<https://www.celas.osaka-u.ac.jp/education/absence/>

追試験に関して

中間試験・期末試験でよくない成績を取った人が受けることになります。7/30 の試験が終了した後に、岩井からのメールを受け取った人のみがこの試験を受けることになります。そのため CLE やメールを確認できる状態にしておいてください。

中間レポート 2 問題

提出締め切り 2026 年 7 月 30 日 (木) 23 時 59 分 59 秒 (日本標準時刻)

- 2026 年 7 月 30 日 (木) 23 時 59 分 59 秒までに CLE にて提出してください。
- レポート問題に関しては提出すれば点数を与えるつもりなので、必ず提出してください。なおレポートは期末試験の練習も兼ねています。
- レポート問題は全て演習で取り扱ったため、演習での解答を再利用して良い。例えば、演習で問題を解いたノートを撮影し、それを組み合わせて pdf ファイルを作って提出しても良い。その場合多少字が汚くても良い。
- 解答に関しては答えのみならず、答えを導出する過程をきちんと記すこと。
- レポート問題に関しては、演習で取り扱ったため、CLE や教科書に解答が全てあります。

問題 1. (第 6 回演習追加問題 13) 5 次置換 σ, τ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

とする。次の問いに答えよ。

- (1) $\sigma\tau, \tau\sigma, \sigma^{-1}$ を求めよ。
- (2) σ と τ の転倒数と符号を求めよ。
- (3) $\sigma\tau$ の転倒数と符号を求め、 $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$ を確認せよ。

問題 2. (第 7 回演習 教科書 3.2.1 (8), 教科書 3.3.1) 次の行列式を求めよ。

$$(1). \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & 5 & -4 \\ 8 & 6 & 2 & -7 & 0 \end{vmatrix} \quad (2). \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & 5 & 5 \\ 8 & 6 & 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} \quad (3). \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & -2 & 7 \\ -6 & 7 & 8 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

問題 3. (第 8 回演習追加問題 21) 以下の問題は他学科の期末試験で出した証明問題である。次の問題に答えよ。

- (1) $n \times n$ 行列 A, B, C について、 $\det(ABC) = \det(BAC)$ であることを示せ。
- (2) $n \times n$ 行列 A, B について、 A と B が正則ならば、 AB もまた正則行列であることを示せ。
- (3) $n \times n$ 行列 A, B について、 AB が正則行列であるならば、 A も B も正則であることを示せ。
- (4) 実数係数の $n \times n$ 行列 A について、 ${}^tAA = E_n$ ならば、 $\det(A) = \pm 1$ であることを示せ。ここで tAA は tA と A の積のことである。
- (5) 実数係数の $n \times n$ 行列 A について、 $A^7 = E_n$ ならば、 $\det(A) = 1$ であることを示せ。
- (6) 実数係数の 2×2 行列 A について、 $A^7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ かつ $A \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ となるものの例を一つあげよ。

問題 4. (第 8 回演習 教科書 3.3.3 (2)) A を n 次正方行列, k を正の整数とする. A の階数が n であることと A^k の階数が n であることは, 同値であることを示せ.

問題 5. (第 9 回演習追加問題 22) 実数係数の連立 1 次方程式

$$\begin{cases} x_1 & & - x_3 & = & 0 \\ 2x_1 & + & \lambda x_2 & - & x_3 & = & 0 \\ (\lambda + 1)x_1 & + & x_2 & + & \lambda x_3 & = & 0 \end{cases}$$

が $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ 以外の解を持つような λ の値を全て求めよ. (ヒント: 前回の演習追加プリントにある行列の正則性の特徴づけを用いる.)

問題 6. (第 9 回演習追加問題 24) $a_0, \dots, a_n \in K$ かつ x を変数とする. 以下の等式を示せ.

$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & & x & -1 \\ a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n.$$

(ヒント: 余因子展開と帰納法を用いる.)

問題 7. (第 9 回演習追加問題 25) 整数からなる n 次正方行列 A について, $\det A = 1$ ならば, 逆行列 A^{-1} のどの成分も整数であることを示せ. (ヒント: 余因子行列を用いる.)

問題 8. (第 9 回演習 教科書 3.4.4) $n \geq 2$ とする. n 次正方行列 A の余因子行列を $\tilde{A}$ とする. また A は正則であると仮定する.

(1) $A\tilde{A} = (\det A)E$ であることを利用して, $\det(\tilde{A})$ を求めよ.

(2) $\tilde{A}$ の余因子行列は, $(\det A)^{n-2}A$ であることを示せ.

問題 9. (第 10 回授業 教科書 例題 3.5.3) $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$ を相異なる数, $b_1, b_2, \dots, b_n \in K$ を任意の数 (同じものがあってもよい) とする. このとき, K 係数の $n-1$ 次以下の多項式 $f(x)$ であって

$$f(a_i) = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

を満たすものがただ 1 つ存在することを, ヴァンデルモンドの行列式を用いて示せ.

中間レポート2 解答例

2026 年度 線形代数

ほとんどの解答を chatGPT に書いてもらいました.

問題 1. (第 6 回演習追加問題 13) 5 次置換 σ, τ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

とする. 次の問いに答えよ.

(1) $\sigma\tau, \tau\sigma, \sigma^{-1}$ を求めよ.

(2) σ と τ の転倒数と符号を求めよ.

(3) $\sigma\tau$ の転倒数と符号を求め, $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$ を確認せよ.

解答 (1). まず、各 $i = 1, \dots, 5$ に対して $\sigma(\tau(i))$ を計算すると、

i	1	2	3	4	5
$\tau(i)$	2	1	4	5	3
$\sigma(\tau(i))$	1	4	3	2	5

となる. したがって

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

同様に、

i	1	2	3	4	5
$\sigma(i)$	4	1	5	3	2
$\tau(\sigma(i))$	5	2	3	4	1

より

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

また、

$$\sigma(2) = 1, \quad \sigma(5) = 2, \quad \sigma(4) = 3, \quad \sigma(1) = 4, \quad \sigma(3) = 5$$

であるから、

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

解答 (2). σ の下段は $(4, 1, 5, 3, 2)$ である. その転倒は

$$(1, 2), (1, 4), (1, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)$$

の 6 個である。したがって、 σ の転倒数は 6 であり、 $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^6 = 1$ である。
一方、 τ の下段は $(2, 1, 4, 5, 3)$ である。その転倒は

$$(1, 2), (3, 5), (4, 5)$$

の 3 個である。したがって、 τ の転倒数は 3 であり、 $\text{sgn}(\tau) = (-1)^3 = -1$ である。
 $\sigma\tau$ の下段は $(1, 4, 3, 2, 5)$ である。その転倒は

$$(2, 3), (2, 4), (3, 4)$$

の 3 個である。したがって、 $\sigma\tau$ の転倒数は 3 であり、 $\text{sgn}(\sigma\tau) = (-1)^3 = -1$ 。

解答 (3). また、前問より

$$\text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau) = 1 \cdot (-1) = -1$$

であるから、 $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$ が確認できる。

問題 2. (第 7 回演習 教科書 3.2.1 (8), 教科書 3.3.1) 次の行列式を求めよ。

$$(1). \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & 5 & -4 \\ 8 & 6 & 2 & -7 & 0 \end{vmatrix} \quad (2). \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & 5 & 5 \\ 8 & 6 & 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} \quad (3). \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & -2 & 7 \\ -6 & 7 & 8 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

解答.

解答 (1). 第 1 行について余因子展開し、さらに行基本変形を行うと、

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & 5 & -4 \\ 8 & 6 & 2 & -7 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -4 & 5 & -4 \\ 6 & 2 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -4 & 5 & -4 \\ 2 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & -9 & -2 \end{vmatrix} \\ = 7 \cdot 9 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 7 \cdot 9 \cdot (-2) = -126.$$

(1) の別解. 教科書定理 3.3.1 を使って

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & 5 & -4 \\ 8 & 6 & 2 & -7 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -4 & 5 & -4 \\ 2 & -7 & 0 \end{vmatrix}.$$

ここで

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 7 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -4 & 5 & -4 \\ 2 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ -7 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -4 & -4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -4 & 5 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} = -28 - 8 + 18 = -18.$$

したがって -126 である。

解答 (2). 行列式の値を変えない行基本変形を行うと,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & 5 & 5 \\ 8 & 6 & 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 5 & 5 \\ 0 & -10 & 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -4 & 5 & 5 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & -16 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot (-16) = -16$$

他にも余因子展開を用いたり教科書定理 3.3.1 を用いても良い。

解答 (3). 第 1 列と第 2 列を第 5 列の後ろに移す. この操作は合計 6 回の列の入れ替えに当たるので, 行列式の符号は変わらない. したがって, 教科書定理 3.3.1 を用いて

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & -2 & 7 \\ -6 & 7 & 8 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 7 & 3 & -1 \\ 8 & 2 & 5 & -6 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= \left(3 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \right) (3 \cdot 7 - (-1)(-6))$$

$$= (3(1+2) - 1)(21-6) = 8 \cdot 15 = 120.$$

問題 3. (第 8 回演習追加問題 21) 以下の問題は他学科の期末試験で出した証明問題である. 次の問題に答えよ.

- (1) $n \times n$ 行列 A, B, C について, $\det(ABC) = \det(BAC)$ であることを示せ.
- (2) $n \times n$ 行列 A, B について, A と B が正則ならば, AB もまた正則行列であることを示せ.
- (3) $n \times n$ 行列 A, B について, AB が正則行列であるならば, A も B も正則であることを示せ.
- (4) 実数係数の $n \times n$ 行列 A について, ${}^tAA = E_n$ ならば, $\det(A) = \pm 1$ であることを示せ. ここで tAA は tA と A の積のことである.
- (5) 実数係数の $n \times n$ 行列 A について, $A^7 = E_n$ ならば, $\det(A) = 1$ であることを示せ.
- (6) 実数係数の 2×2 行列 A について, $A^7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ かつ $A \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ となるものの例を

一つあげよ.

解答 (1). 行列式の積に関する公式より、

$$\begin{aligned}\det(ABC) &= \det(A) \det(B) \det(C) \\ &= \det(B) \det(A) \det(C) \\ &= \det(BAC).\end{aligned}$$

ここで、 $\det(A), \det(B), \det(C)$ は数であるため積の順序を入れ替えられることを用いた。

解答 (2). A, B は正則であるから、逆行列 A^{-1}, B^{-1} が存在する。このとき

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AE_nA^{-1} = E_n$$

かつ

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}E_nB = E_n.$$

したがって、 AB は正則であり、

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

である。

解答 (2) の別解. A, B は正則であるから、

$$\det(A) \neq 0, \quad \det(B) \neq 0.$$

一方、

$$\det(A) \det(B) = \det(AB)$$

である。よって

$$\det(AB) \neq 0.$$

したがって、 AB も正則である。

解答 (3). AB が正則であるから

$$\det(AB) \neq 0.$$

一方、

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

である。積が 0 でないので

$$\det(A) \neq 0, \quad \det(B) \neq 0.$$

したがって、 A も B も正則である。

解答 (4). 両辺の行列式を取ると、

$$1 = \det(E_n)$$

$$\begin{aligned}
&= \det({}^tAA) \\
&= \det({}^tA) \det(A) \\
&= \det(A) \det(A) \\
&= (\det A)^2.
\end{aligned}$$

ここで $\det({}^tA) = \det(A)$ を用いた。 $\det(A)$ は実数であるから、

$$\det(A) = \pm 1$$

である。

解答 (5). 両辺の行列式を取ると、

$$(\det A)^7 = \det(A^7) = \det(E_n) = 1.$$

$\det(A)$ は実数であり、実数 t に対して $t^7 = 1$ ならば $t = 1$ である。したがって

$$\det(A) = 1$$

である。

解答 (6). $\theta = \frac{2\pi}{7}$ とし、

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

とおく。これは角度 θ の回転を表す行列であるから、 A^7 は角度 $7\theta = 2\pi$ の回転を表す。したがって

$$A^7 = E_2.$$

一方、 $0 < \theta < 2\pi$ であるから $A \neq E_2$ である。よって一例は

$$A = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{7} & -\sin \frac{2\pi}{7} \\ \sin \frac{2\pi}{7} & \cos \frac{2\pi}{7} \end{pmatrix}$$

である。

問題 4. (第 8 回演習 教科書 3.3.3 (2)) A を n 次正方行列, k を正の整数とする。 A の階数が n であることと A^k の階数が n であることは、同値であることを示せ。

解答. n 次正方行列について、階数が n であることと行列式が 0 でないことは同値である。

$\det(A^k) = (\det A)^k$ であるので、

$$\begin{aligned}
\text{rank}(A) = n &\iff \det(A) \neq 0 \\
&\iff (\det A)^k \neq 0 \\
&\iff \det(A^k) \neq 0
\end{aligned}$$

$$\iff \text{rank}(A^k) = n.$$

したがって、 A の階数が n であることと A^k の階数が n であることは同値である。

問題 5. (第 9 回演習追加問題 22) 実数係数の連立 1 次方程式

$$\begin{cases} x_1 & & - x_3 & = & 0 \\ 2x_1 & + & \lambda x_2 & - & x_3 & = & 0 \\ (\lambda + 1)x_1 & + & x_2 & + & \lambda x_3 & = & 0 \end{cases}$$

が $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ 以外の解を持つような λ の値を全て求めよ. (ヒント: 前回の演習追加プリントにある行列の正則性の特徴づけを用いる.)

解答. 係数行列を

$$M(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & \lambda & -1 \\ \lambda + 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

とおく. 斉次連立一次方程式が自明でない解を持つことと、係数行列が正則でないことは同値である. したがって、求める条件は

$$\det M(\lambda) = 0$$

である。

第 1 行で展開すると、

$$\begin{aligned} \det M(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & \lambda \\ \lambda + 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda^2 + 1) - \{2 - \lambda(\lambda + 1)\} \\ &= 2\lambda^2 + \lambda - 1 \\ &= (\lambda + 1)(2\lambda - 1). \end{aligned}$$

よって

$$(\lambda + 1)(2\lambda - 1) = 0$$

であり、

$$\boxed{\lambda = -1, \frac{1}{2}}$$

である。

問題 6. (第 9 回演習追加問題 24) $a_0, \dots, a_n \in K$ かつ x を変数とする. 以下の等式を示せ.

$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & & x & -1 \\ a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n.$$

(ヒント: 余因子展開と帰納法を用いる.)

解答. 左辺の行列式を $D_n(a_0, \dots, a_n)$ と書く. すなわち

$$D_n(a_0, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}.$$

第 1 行に沿って余因子展開すると、第 $(1, 1)$ 成分に対応する小行列は対角成分がすべて x の上三角行列であり、その行列式は x^n である。また、第 $(1, 2)$ 成分から生じる小行列は $D_{n-1}(a_1, \dots, a_n)$ である。したがって

$$D_n(a_0, \dots, a_n) = a_0 x^n + D_{n-1}(a_1, \dots, a_n).$$

$n = 1$ のとき、

$$D_1(a_0, a_1) = \begin{vmatrix} a_0 & -1 \\ a_1 & x \end{vmatrix} = a_0 x + a_1$$

であり、主張は成り立つ。

帰納法の仮定として

$$D_{n-1}(a_1, \dots, a_n) = a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$$

とする。このとき

$$\begin{aligned} D_n(a_0, \dots, a_n) &= a_0 x^n + D_{n-1}(a_1, \dots, a_n) \\ &= a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n. \end{aligned}$$

よって数学的帰納法により

$$D_n(a_0, \dots, a_n) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$$

が成り立つ。

問題 7. (第 9 回演習追加問題 25) 整数からなる n 次正方行列 A について, $\det A = 1$ ならば, 逆行列 A^{-1} のどの成分も整数であることを示せ. (ヒント: 余因子行列を用いる.)

解答. $A = (a_{ij})$ とし, A の余因子行列を $\tilde{A}$ とする. 逆行列の公式より

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A}.$$

仮定 $\det A = 1$ より

$$A^{-1} = \tilde{A}.$$

A の各成分は整数であるため, 各余因子は整数からなる行列の行列式であり, 整数である. したがって, $\tilde{A}$ のすべての成分は整数である. ゆえに A^{-1} のすべての成分も整数である.

問題 8. (第 9 回演習 教科書 3.4.4) $n \geq 2$ とする. n 次正方行列 A の余因子行列を $\tilde{A}$ とする. また A は正則であると仮定する.

(1) $A\tilde{A} = (\det A)E$ であることを利用して, $\det(\tilde{A})$ を求めよ.

(2) $\tilde{A}$ の余因子行列は, $(\det A)^{n-2}A$ であることを示せ.

解答 (1). 等式

$$A\tilde{A} = (\det A)E_n$$

の両辺の行列式を取ると,

$$\begin{aligned} \det(A) \det(\tilde{A}) &= \det((\det A)E_n) \\ &= (\det A)^n. \end{aligned}$$

A は正則であるから $\det A \neq 0$ である. したがって両辺を $\det A$ で割ることができ,

$$\boxed{\det(\tilde{A}) = (\det A)^{n-1}}$$

を得る.

解答 (2). A は正則であるから,

$$\tilde{A} = (\det A)A^{-1}$$

も正則である. $\tilde{A}$ の余因子行列を $\tilde{\tilde{A}}$ と書く. 正則行列に対する逆行列の公式より

$$\tilde{\tilde{A}} = \det(\tilde{A})(\tilde{A})^{-1}.$$

前問の結果と

$$(\tilde{A})^{-1} = ((\det A)A^{-1})^{-1} = \frac{1}{\det A}A$$

を用いると,

$$\begin{aligned} \tilde{\tilde{A}} &= (\det A)^{n-1} \cdot \frac{1}{\det A}A \\ &= (\det A)^{n-2}A. \end{aligned}$$

したがって、 $\tilde{A}$ の余因子行列は

$$(\det A)^{n-2} A$$

である。

問題 9. (第 10 回授業 教科書 例題 3.5.3) $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$ を相異なる数, $b_1, b_2, \dots, b_n \in K$ を任意の数 (同じものがあってもよい) とする. このとき, K 係数の $n-1$ 次以下の多項式 $f(x)$ であって

$$f(a_i) = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

を満たすものがただ 1 つ存在することを, ヴァンデルモンドの行列式を用いて示せ.

解答. 求める多項式を

$$f(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$$

とおく. 条件 $f(a_i) = b_i$ ($i = 1, \dots, n$) は、係数 $c_0, \dots, c_{n-1}$ に関する連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

と同値である。

左辺の係数行列を V とすると、 V はヴァンデルモンド行列であり、

$$\det V = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

である。 $a_1, \dots, a_n$ は互いに異なるので、すべての $i < j$ に対して $a_j - a_i \neq 0$ である。 K は体であるから

$$\det V \neq 0.$$

したがって V は正則であり、任意の $b_1, \dots, b_n$ に対して係数ベクトル

$$\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-1} \end{pmatrix}^t$$

はただ一つに定まる。よって、条件

$$f(a_i) = b_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

を満たす K 係数の $n-1$ 次以下の多項式 $f(x)$ はただ一つ存在する。