

第 10 回. 累次積分 (川平先生の本, 第 26 章の内容)

岩井雅崇, 2020/12/15

1 縦線領域と累次積分

定義 1. $\phi_1(x), \phi_2(x)$ を $\phi_1(x) \leq \phi_2(x)$ となる $[a, b]$ 上の連続関数とする.

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$$

で表せられる領域を縦線領域という.

例 2. • $D = [a, b] \times [c, d]$ は縦線領域. $\phi_1(x) = c, \phi_2(x) = d$ とすれば良い.

- 縦線領域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}$ とおくと D は原点中心の半径 1 の円.

定理 3. 縦線領域を $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$ とし, $f(x, y)$ を D 上の連続関数とする. このとき, $f(x, y)$ は D 上で積分可能であり,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx \text{ となる.}$$

これを $f(x, y)$ の累次積分という.

特に D は面積確定で

$$\text{Area}(D) = \iint_D dx dy = \int_a^b \{\phi_2(x) - \phi_1(x)\} dx.$$

例 4. $D = [0, 1] \times [0, 1], f(x, y) = x^2 + y^2$ とする. $\iint_D f(x, y) dx dy$ を求めよ.

(解.) $\phi_1(x) = 0, \phi_2(x) = 1$ とすると上の定理より,

$$\iint_D x^2 + y^2 dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 x^2 + y^2 dy \right) dx = \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 dx = \int_0^1 x^2 + \frac{1}{3} dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

例 5. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}$ とする. $\text{Area}(D) = \iint_D dx dy$ を求めよ.

(解.) $\phi_1(x) = -\sqrt{1-x^2}, \phi_2(x) = \sqrt{1-x^2}$ とすると上の定理より,

$$\iint_D dx dy = \int_{-1}^1 \left\{ \sqrt{1-x^2} - \left(-\sqrt{1-x^2} \right) \right\} dx = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \pi.$$

つまり半径 1 の円の面積は π .

例 6. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$ とし, $f(x, y) = xe^{-y^2}$ とするとき, $\iint_D f(x, y) dx dy$ を求めよ.

(解.) 普通に定理を適用すると,

$$\iint_D xe^{-y^2} dx dy = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^1 xe^{-y^2} dy \right) dx$$

となるが, e^{-y^2} の不定積分がわからないため, ここで手詰まりとなる.

そこで $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{y}\}$ に注意すると,

$$\begin{aligned} \iint_D xe^{-y^2} dx dy &= \int_0^1 \left(\int_0^{\sqrt{y}} xe^{-y^2} dx \right) dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{x^2 e^{-y^2}}{2} \right]_0^{\sqrt{y}} dy = \int_0^1 \frac{ye^{-y^2}}{2} dy = \left[\frac{-e^{-y^2}}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{e} \right). \end{aligned}$$