

○ 2つ以上は
本質は同じ

2つ以上の
確率変数の分布

○ 連続と離散は

\int と \sum の違い

$\forall x_1, x_2 \exists \underbrace{f(x_1, x_2)}_{\text{同時確率密度 } f}$

$$(1) f(x_1, x_2) \geq 0$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$$

$$(3) P(a < x_1 < b, c < x_2 < d) \\ = \int_a^b \int_c^d f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

$f(x_1, x_2)$ は X_1, X_2 の
同時確率密度 f

X_1, X_2 に対し,

$$\exists f(x_1, x_2) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$$

$$\forall a, b, c, d: a < b, c < d$$

$$P(a < X_1 < b, c < X_2 < d)$$

$$= \int_a^b \int_c^d f(x_1, x_2) dx_2 dx_1$$

確率変数
の
独立

確率
密度 f

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_2 = P(a < X_1 < b, -\infty < X_2 < \infty) \\ = P(a < X_1 < b)$$
$$f_2(x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1 \quad "$$

X_1, X_2 が独立

$$\underline{\text{独立}} \equiv f(x_1, x_2) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \quad (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$$

$$P(a < X_1 < b, c < X_2 < d)$$

$$= \int_a^b \int_c^d f(x_1, x_2) dx_2 dx_1$$

$$= \int_a^b f_1(x_1) dx_1 \cdot \int_c^d f_2(x_2) dx_2$$

$$= P(a < X_1 < b) \cdot P(c < X_2 < d)$$

$$\begin{aligned}
 & f(x_1, x_2) \text{ given} \rightarrow P(a < x_1 < b) \\
 & = P(a < x_1 < b, -\infty < x_2 < +\infty) \\
 & = \int_a^b \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2) dx_2 \right\} dx_1
 \end{aligned}$$

x_1 の密度 f_1

$\rightarrow f_1(x_1)$

x_1 の周辺確率密度 f_1

x_2 について

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2) dx_2$$

(3)

 X_1, X_2 の同時密度 f

$$f(x_1, x_2)$$

X_1 と X_2 が独立の時
 \times

1. 辺り $f_1, f_1(x_1), f_2(x_2)$

$$P(a < X_1 < b, c < X_2 < d) \quad \text{if} \quad f(x_1, x_2) = f_1(x_1) f_2(x_2)$$

$$= \int_a^b \int_c^d f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

の時、 X_1, X_2 は独立、

$$= \int_a^b f_1(x_1) dx_1 \cdot \int_c^d f_2(x_2) dx_2$$

$$= P(a < X_1 < b) \cdot P(c < X_2 < d)$$

同時密度関数

$$f(\vec{x}, x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$f(x_1, \dots, x_n) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{x}) d\vec{x} = 1$$

$$\vec{a} < \vec{b}$$

$$P(\vec{a} < \vec{X} < \vec{b})$$

$$= \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} f(\vec{x}) d\vec{x}$$

確率変数

n 個

$$X_1, \dots, X_n$$

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) dx_2 \dots dx_n$$

X_1 の周辺密度 f .

$$f(x_1, \dots, x_n) = f_1(x_1) \dots f_n(x_n) \text{ の時.}$$

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ は 互に独立}$$

$$P(\vec{a} < \vec{X} < \vec{b}) = P(a_1 < X_1 < b_1) \dots P(a_n < X_n < b_n)$$

$$M_{X_1 + \dots + X_n}(t) = M_{X_1}(t) \cdot \dots \cdot M_{X_n}(t)$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad \underbrace{E(\varphi(X_1, X_2))}_{\text{平均}} \\
 & \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x_1, x_2) f(x_1, x_2) dx_1 dx_2
 \end{aligned}$$

$\varphi(X_1, X_2)$ の

定理 1 X_1, X_2 は独立
 $\varphi(X_1), \varphi(X_2)$ も独立

$$\begin{aligned}
 & E(\varphi_1(X_1) \cdot \varphi_2(X_2)) \\
 & = E(\varphi_1(X_1)) \cdot E(\varphi_2(X_2))
 \end{aligned}$$

特 1. $E(X_1 X_2) = E(X_1) E(X_2)$

独立性より

$$f(x_1, x_2) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2)$$

よって

$$\varphi(x_1, x_2) = \varphi_1(x_1) \cdot \varphi_2(x_2)$$

定理1の証明

$$E(\varphi_1(X_1) \cdot \varphi_2(X_2))$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_1(x_1) \varphi_2(x_2) f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_1(x_1) f_1(x_1) dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_2(x_2) f_2(x_2) dx_2$$

$$= E(\varphi_1(X_1)) \cdot E(\varphi_2(X_2))$$

系2 X_1 と X_2 は互独立, 積率母関数

$$M_{X_1+X_2}(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t)$$

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tX}) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{X_1+X_2}(t) &= E(e^{t(X_1+X_2)}) \\ &= E(e^{tX_1} \cdot e^{tX_2}) \\ &= E(e^{tX_1}) \cdot E(e^{tX_2}) \\ &= M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t) \end{aligned}$$

13/2

P55

 X_1, X_2 : 独立

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}\right)$$

$$X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \quad f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)$$

 $Y = X_1 - X_2$ は正規分布

$$M_{X_1}(t) = E(e^{tX_1}) = \exp\left(\mu_1 t + \frac{1}{2}\sigma_1^2 t^2\right)$$

$$M_{X_2}(t) = E(e^{tX_2}) = \exp\left(\mu_2 t + \frac{1}{2}\sigma_2^2 t^2\right)$$

$$M_{X_1 - X_2}(t) = E(e^{t(X_1 - X_2)})$$

$$= \exp E(e^{tX_1}) \cdot E(e^{-tX_2})$$

$$= \exp\left(\mu_1 t + \frac{1}{2}\sigma_1^2 t^2\right) \cdot \exp\left(-\mu_2 t + \frac{1}{2}\sigma_2^2 t^2\right)$$

$$= \exp\left((\mu_1 - \mu_2)t + \frac{1}{2}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2\right)$$

$$Y = X_1 - X_2$$

$$\sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

例3 独立 $X_1, X_2 \sim N(0, 1)$

$$Y = X_1^2 + X_2^2$$

a 密度 $f(y)$ 怎样求

$$X_i^2 \sim \chi^2(1) \text{ 自由度} \quad M_{X_i^2}(t) = (1-2t)^{-\frac{1}{2}} \\ t < \frac{1}{2}, \quad i=1, 2$$


$$M_Y(t) = M_{X_1^2}(t) \cdot M_{X_2^2}(t) \\ = (1-2t)^{-1}, \quad t < \frac{1}{2}$$

$$\therefore Y \sim \chi^2(2)$$

$$f_Y(x) = \frac{1}{\Gamma(\frac{\nu}{2}) 2^{\frac{\nu}{2}}} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \quad 0 < x < \infty$$

$$f(y) = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{y}{2}\right)$$

$$0 < y < \infty$$



独立正準変数の和
の分布

$$X_1, X_2 \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$$

定理2

$$Y = k_1 X_1 + k_2 X_2$$

$$\sim N(k_1 \mu_1 + k_2 \mu_2, k_1^2 \sigma_1^2 + k_2^2 \sigma_2^2)$$

定理3

X_1 と X_2 は独立変数

$$\textcircled{1} E(k_1 X_1 + k_2 X_2) = k_1 E(X_1) + k_2 E(X_2)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} V(k_1 X_1 + k_2 X_2) \\ = k_1^2 V(X_1) + k_2^2 V(X_2) \end{aligned}$$

$$E(k_1 X_1 + k_2 X_2)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (k_1 x_1 + k_2 x_2) f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

$$= k_1 \int_{-\infty}^{\infty} x_1 \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_2 \right\} dx_1 \\ + k_2 \int_{-\infty}^{\infty} x_2 \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1 \right\} dx_2$$

$$= k_1 \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1 + k_2 \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_2(x_2) dx_2$$

$$= k_1 E(X_1) + k_2 E(X_2)$$

$$E(k_1 X_1 + \dots + k_n X_n)$$

$$= k_1 E(X_1) + k_2 E(X_2) + \dots + k_n E(X_n)$$

$$= \exp\left(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right)$$

$$M_X(t) = E\{e^{tX}\}$$

$$Y = k_1 X_1 + k_2 X_2$$

$$\sim N(k_1 \mu_1 + k_2 \mu_2, k_1^2 \sigma_1^2 + k_2^2 \sigma_2^2)$$

の証明

定義
↓

$$M_Y(t) = E\{\exp(t(k_1 X_1 + k_2 X_2))\}$$

$$= E\{\exp(tk_1 X_1) \cdot \exp(tk_2 X_2)\}$$

$$= \exp\left\{(k_1 \mu_1 + k_2 \mu_2)t + \frac{1}{2}(k_1^2 \sigma_1^2 + k_2^2 \sigma_2^2)t^2\right\}$$

(2) 分散

$$V(k_1 X_1 + k_2 X_2) = E\left\{ \left[(k_1 X_1 + k_2 X_2) - E(k_1 X_1 + k_2 X_2) \right]^2 \right\}$$

$$= E\left\{ \left[k_1 (X_1 - \mu_1) + k_2 (X_2 - \mu_2) \right]^2 \right\}$$

$$= k_1^2 E\{ (X_1 - \mu_1)^2 \} + k_2^2 E\{ (X_2 - \mu_2)^2 \}$$

$$+ 2k_1 k_2 E\{ (X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2) \} \rightarrow \underbrace{X_1 X_2 - \mu_1 X_2 - \mu_2 X_1 + \mu_1 \mu_2}_{\text{分散 (co variance)}}$$

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2) \rightarrow \underbrace{E(X_1 X_2) - \mu_1 \mu_2}_0$$

X_1 と X_2 が独立ならば

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = 0$$

$$\therefore V(k_1 X_1 + k_2 X_2) = k_1^2 V(X_1) + k_2^2 V(X_2)$$

定理4 $X_1, \dots, X_n \sim \chi^2(v_i) \quad i=1, \dots, n$

则 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 是

自由度 $v_1 + \dots + v_n$ 的 χ^2 分布

再生的

$$M_{X_i}(t) = E\{e^{tX_i}\} = (1-2t)^{-\frac{v_i}{2}}$$
$$t < \frac{1}{2}$$

$$M_Y(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t) \cdot \dots \cdot M_{X_n}(t) \text{ 因为 } \chi^2$$

$$M_Y(t) = (1-2t)^{-\frac{1}{2} \sum v_i}, \quad t < \frac{1}{2}$$

例4 X_1 と X_2 は独立

$X_1 \sim$ パラメータ2の指数分布

$$X_2 \sim \chi^2(4)$$

$Y = 4X_1 - X_2$ の時

$$E(X_1) = \frac{1}{2}$$

$$V(X_1) = \frac{1}{4}$$

$$E(X_2) = 4$$

$$V(X_2) = 8$$

$$E(4X_1 - X_2) = 4E(X_1) - E(X_2) = -2$$

$$V(4X_1 - X_2) = 4^2 V(X_1) + V(X_2) = 12$$

確率変数の和
の
確率密度関数

X_1 と X_2 は互いに独立

$f(x_1), f(x_2)$ が密度 f .

$Y = X_1 + X_2$, Y の密度 $f \cdot g(y)$

$$\begin{aligned} g(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_2(y-x_1) \cdot f_1(x_1) dx_1 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(y-x_2) \cdot f_2(x_2) dx_2 \end{aligned}$$

証明

X_1, X_2, Y 独立変数

$F_1(x), F_2(x), G(y)$ 分布関数

$$G(y) = P\{X_1 + X_2 \leq y\}$$

$$= \iint_{x_1 + x_2 \leq y} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \left\{ \int_{-\infty}^{y-x_1} f_2(x_2) dx_2 \right\} dx_1$$


$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) F(y-x_1) dx_1$$

$$\therefore F(\infty) = 1$$

$$g(y) = G'(y)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) f_2(y-x_1) dx_1$$

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(x_2) f_1(y-x_2) dx_2$$



$$x_1, x_2 > 0$$

$$g(y) = \int_0^y f_1(x_1) f_2(y-x_1) dx_1$$

$$= \int_0^y f_2(x_2) f_1(y-x_2) dx_2$$

例5 X_1, X_2 互独立

$\sim \lambda$ の指数分布


$$Y = X_1 + X_2$$





X_i の密度 $\lambda e^{-\lambda x_i}$

$$g(y) = \int_0^y \lambda e^{-\lambda(y-x_1)} \lambda e^{-\lambda x_1} dx_1$$

$$= \int_0^y \lambda^2 e^{-\lambda y} dx_1$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda y} \quad (0 < y < \infty)$$





例6

独立 X_1, X_2

$$X_1 \sim f_1(x_1) = 1, 0 < x_1 < 1$$

$$X_2 \sim f_2(x_2) = \frac{1}{2}, 0 < x_2 < 2$$

の時

$Y = X_1 + X_2$ の確率密度 f


$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f(y-x_1)}_{\frac{1}{2} [0 < y-x_1 < 2]} \underbrace{f(x_1)}_{1 [0 < x_1 < 1]} dx_1$$

$$x_1 < y < x_1 + 2$$

$$= \int_0^y \frac{1}{2} dx_1 = \frac{y}{2} \quad 0 < y \leq 1$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2} dx_1 = \frac{1}{2} \quad 1 \leq y < 2$$

$$= \int_{3-y}^1 \frac{1}{2} dx_1 = \frac{1}{2} (1 - (3-y)) \quad 2 \leq y < 3$$



例6 独立 X_1, X_2

X

$$X_1 \sim f_1(x_1) = 1 \quad 0 < x_1 < 1$$

$$X_2 \sim f_2(x_2) = \frac{1}{2} \quad 0 < x_2 < 2$$

の時

$Y = X_1 + X_2$ の確率分布 f_Y は

$$0 \leq y \leq 3 \text{ で } \neq 0$$


$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f(y-x_1)}_{0 < y-x_1 < 2 \text{ で定義}} \underbrace{f(x_1)}_{0 < x_1 < 1} dx_1$$

$$f(y-x_1) \quad 0 < y-x_1 < 2 \text{ で定義}$$

$$x_1 < y < 2+x_1$$

$$0 < x_1 < 1$$

$$0 < y < 3$$



4.3 無作為標本

定義3.

互独立 $X_1, \dots, X_n \Rightarrow I \pm \underline{n}$ の
 同じ分布に従う 無作為標本
 (random sample)

例) $\left\{ \begin{array}{l} X_1, \dots, X_n \text{ の同時密度 } f(x_1, \dots, x_n) \\ X_i \text{ の周辺密度 } f_i(x_i) \\ \text{共通密度 } f(x) \end{array} \right.$

X_1, \dots, X_n が互に独立

$$\Rightarrow f(x_1, \dots, x_n) = f_1(x_1) \cdots f_n(x_n)$$

$$\text{同じ分布に従う} = f(x_1) \cdots f(x_n)$$

無作為標本 ならば

$$f(x_1, \dots, x_n) = f(x_1) \cdots f(x_n)$$

定義4. 無作為標本 X_1, \dots, X_n からの

函数 $Y = \varphi(X_1, \dots, X_n) \in$

統計量 (statistic)

例えば

$$\bar{X} = \frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n)$$

標本平均 sample mean

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

標本分散

無作為標本

定理6 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad i=1:n$

無作為標本. とする

標本平均

$$\bar{X} = \frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n)$$

$$\sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

平均は同じ"2"

分散は $1/n$ になる

定理2

$$E(\sum k_i X_i) = \sum k_i E(X_i) \rightarrow k_i = \frac{1}{n}$$

$$E\left(\sum \frac{1}{n} X_i\right) = \frac{1}{n} \sum \mu_i$$

$$V(\sum k_i X_i) = \sum k_i^2 V(X_i)$$

$$V\left(\sum \frac{1}{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum \sigma_i^2 = \frac{1}{n} \sigma^2$$

定理7

母集団

X_1, \dots, X_n は $N(\mu, \sigma^2)$ からの
大きさ n の無作為標本とする

$$\sum \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$$

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum (X_i - \mu)^2 \text{ は}$$

自由度 n の χ^2 分布に従う

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\rightarrow \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right) \sim N(0, 1)$$

$$\rightarrow \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2_1(1)$$

定理4

$X_i \sim \chi^2_{(r_i)}$ の時

$Y = \sum X_i$ は 自由度 $\sum r_i$ の χ^2 分布に従う

$$\chi^2_{\sum r_i}$$

$$\therefore \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2_n$$

↑
再生性