

# **В матане как на войне**

Учебное пособие о том как затащить у Кохася К. П.

@irdkwmnsb - Альжанов Максим  
@JelluSandro - Никита Шемякин  
@Dalvikk - Владислав Ковальчук  
@Turukmokto - Евгений Бессоницын  
@Onexx7 - Илья Зайцев  
@NULL3301 - Вадим Нагибин  
@DimaUtyuz - Дмитрий Утюжников  
@RahimHakimov - Рахим Хакимов  
@Shady712 - Данил Крайнов  
@Moroness - Михаил Галибов  
@abramkht - Хетаг Дзестелов  
@whicha - Иван Алексеев  
@maksimShekhunov - Максим Шехунов

December 2020



# Содержание

<b>1</b>	<b>Теоремы</b>	<b>7</b>
1.3	Законы Де Моргана	7
1.4	Единственность предела и ограниченность сходящейся последовательности	10
1.5	Теорема о предельном переходе в неравенствах для последовательностей и для функций	11
1.6	Теорема о двух городских	12
1.7	Бесконечно малая последовательность	13
1.8	Теорема об арифметических свойствах предела последовательности в нормированном пространстве и в $\mathbb{R}$	14
1.9	Неравенство Коши-Буняковского в линейном пространстве, норма, порожденная скалярным произведением	16
1.10	Леммы о непрерывности скалярного произведения и покоординатной сходимости в $\mathbb{R}^n$	17
1.11	Аксиома Архимеда. Плотность множества рациональных чисел в $\mathbb{R}$	18
1.12	Неравенство Бернулли (Якоба)	19
1.13	Открытость открытого шара	20
1.14	Теорема о свойствах открытых множеств	21
1.15	Теорема о связи открытых и замкнутых множеств, свойства замкнутых множеств	22
1.16	Теорема об арифметических свойствах предела последовательности (в $\bar{\mathbb{R}}$ ). Неопределенности.	23
1.17	Теорема Кантора о стягивающихся отрезках	24
1.18	Теорема о существовании супремума	25
1.19	Лемма о свойствах супремума	26
1.20	Теорема о пределе монотонной последовательности (Теорема Вейерштрасса)	27
1.21	Определение числа $\epsilon$ , соответствующий замечательный предел	28
1.22	Теорема об открытых и замкнутых множествах в пространстве и в подпространстве	30
1.23	Теорема о компактности в пространстве и в подпространстве	32
1.24	Простейшие свойства компактных множеств	32
1.25	Лемма о вложенных параллелепипедах	33
1.26	Компактность замкнутого параллелепипеда в $\mathbb{R}^m$	33
1.27	Теорема о характеристике компактов в $\mathbb{R}^m$	34
1.28	Эквивалентность определений Гейне и Коши	36
1.29	Единственность предела, локальная ограниченность отображения, имеющего предел, теорема о стабилизации знака	37
1.30	Арифметические свойства предела отображений. Формулировка для $\mathbb{R}$ с чертой	38
1.31	Принцип выбора Больцано-Вейерштрасса	39
1.32	Сходимость в себе и ее свойства	40
1.33	Критерий Больцано-Коши для последовательностей и отображений	41
1.34	Теорема о пределе монотонной функции	42
1.35	Теорема о замене на эквивалентную при вычислении пределов. Таблица эквивалентных	43
1.36	Теорема единственности асимптотического разложения	44



1.37	Арифметические свойства непрерывных отображений, теорема о стабилизации знака . . . . .	45
1.38	Непрерывность композиции и соответствующая теорема для пределов . .	46
1.39	Теорема о топологическом определении непрерывности . . . . .	47
1.40	Теорема Вейерштрасса о непрерывном образе компакта. Следствия . . .	48
1.41	Теорема о вписанном $n$ -угольнике максимальной площади . . . . .	49
1.42	Лемма о связности отрезка . . . . .	50
1.43	Теорема Больцано–Коши о промежуточном значении . . . . .	51
1.44	Теорема о бутерброде . . . . .	52
1.45	Теорема о сохранении промежутка . . . . .	53
1.46	Теорема Больцано–Коши о сохранении линейной связности . . . . .	54
1.47	Описание линейно связных множеств в $\mathbb{R}$ . . . . .	55
1.48	Теорема о непрерывности монотонной функции. Следствие о множестве точек разрыва . . . . .	56
1.49	Теорема о существовании и непрерывности обратной функции . . . . .	56
1.50	Счетность множества рациональных чисел. . . . .	57
1.51	Несчетность отрезка. . . . .	57
1.52	Континуальность множества бинарных последовательностей . . . . .	58
1.53	Замечательные пределы . . . . .	59
1.54	Равносильность двух определений производной. Правила дифференцирования. . . . .	60
1.55	Дифференцирование композиции и обратной функции . . . . .	62
1.56	Теорема о свойствах показательной функции . . . . .	63
1.57	Выражение произвольной показательной функции через экспоненту. Два следствия . . . . .	64
1.58	Показательная функция от произведения . . . . .	65
1.59	Теорема Ферма (с леммой) . . . . .	66
1.60	Теорема Ролля. Вещественность корней многочлена Лежандра . . . . .	67
1.61	Теоремы Лагранжа и Коши. Следствия об оценке приращения и о пределе производной . . . . .	68
1.62	Теорема Дарбу. Следствия . . . . .	69
1.63	Формула Тейлора с остатком в форме Пеано . . . . .	70
1.64	Теорема о разложении рациональной функции на простейшие дроби . . .	71
1.65	Формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа . . . . .	72
1.66	Метод Ньютона . . . . .	72
1.67	Иррациональность числа $e^2$ . . . . .	73
1.68	Следствие об оценке сходимости многочленов Тейлора к функции. Примеры . . . . .	73
1.69	Критерий монотонности функции. Следствия . . . . .	73
1.70	Теорема о необходимом и достаточном условиях экстремума . . . . .	73
1.71	Теорема Кантора о равномерной непрерывности . . . . .	73
<b>2</b>	<b>Определения и формулировки</b>	<b>74</b>
2.3	Упорядоченная пара . . . . .	74
2.4	Декартово произведение . . . . .	75
2.5	Аксиомы вещественных чисел . . . . .	76
2.6	Аксиома Кантора, аксиома Архимеда . . . . .	78
2.7	Пополненное множество вещественных чисел, операции и порядок в нем	79



2.8	Последовательность	81
2.9	Образ и прообраз множества при отображении	82
2.10	Инъекция, сюръекция, биекция	83
2.11	Векторнозначная функция, ее координатные функции	84
2.12	График отображения	85
2.13	Композиция отображений	86
2.14	Сужение и продолжение отображений	87
2.15	Предел последовательности (эпсилон-дельта определение)	88
2.16	Окрестность точки, проколота окрестность	89
2.17	Предел последовательности (определение на языке окрестностей)	90
2.18	Метрика, метрическое пространство, подпространство	91
2.19	Шар, замкнутый шар, окрестность точки в метрическом пространстве	92
2.20	Линейное пространство	93
2.21	Норма, нормированное пространство	94
2.22	Ограниченное множество в метрическом пространстве	95
2.23	Скалярное произведение	96
2.24	Максимум, верхняя граница, множество, ограниченное сверху	97
2.25	Внутренняя точка множества, открытое множество, внутренность	98
2.26	Предельная точка множества	98
2.27	Замкнутое множество, замыкание, граница	99
2.28	Изолированная точка, граничная точка	100
2.29	Описание внутренности множества	101
2.30	Описание замыкания множества в терминах пересечений	102
2.31	Верхняя, нижняя границы; супремум, инфимум	103
2.32	Техническое описание супремума	104
2.33	Последовательность, стремящаяся к бесконечности	105
2.34	Определения предела отображения (3 шт)	106
2.35	Определения пределов в $\mathbb{R}$ с чертой	107
2.36	Компактное множество	108
2.37	Секвенциальная компактность	109
2.38	Предел по множеству	110
2.39	Односторонние пределы	111
2.40	Конечная эпсилон-сеть	112
2.41	Теорема о характеристике компактных множеств в терминах эпсилон-сетей	113
2.42	Непрерывное отображение (4 определения)	114
2.43	Непрерывность слева	115
2.44	Разрыв, разрывы первого и второго рода	116
2.45	О большое	117
2.46	о маленькое	118
2.47	Эквивалентные функции, таблица эквивалентных	119
2.48	Асимптотически равные (сравнимые) функции	120
2.49	Асимптотическое разложение	120
2.50	Наклонная асимптота графика	120
2.51	Путь в метрическом пространстве	120
2.52	Линейно связное множество	120
2.53	Счетное множество, эквивалентные множества	121
2.54	Множество мощности континуума	122



2.55	Функция, дифференцируемая в точке . . . . .	123
2.56	Производная . . . . .	124
2.57	Касательная прямая к графику функции . . . . .	125
2.58	Классы функций $C^n([a, b])$ . . . . .	126
2.59	Производная $n$ -го порядка . . . . .	127
2.60	Многочлен Тейлора $n$ -го порядка . . . . .	128
2.61	Разложения Тейлора основных элементарных функций . . . . .	129

В матане как на войне



## Как это редактировать?

Таблицу можно сделать так:

Распределение вариантов

Строчки в табличке Кохася	Кто
3 – 7	Шемякин
8 – 12	Зайцев
13 – 17	Бессонницын
18 – 22	Крайнов
23 – 27	Ковальчук
28 – 32	Утюжников
33 – 37	Нагибин
38 – 42 + 59	Алексеев
43 – 47 + 60	Галибов
48 – 52 + 61	Хакимов
53 – 57 + 62	Дзестелов

Формулы вы делать умеете, АИСД сдаете же как-то

Картинки можно вставлять так:



Внизу в левом углу вы видите File outline, в нем содержатся ссылки на заголовки, чтобы можно было быстро перейти к своей части

**Пожалуйста, следите за тем чтобы после вашего кода не возникало кучу ошибок при компиляции!**

Если что то похерилось — писать Владу или Максиму (@Dalvikk, @irdkwmnsb)

$a\ b$  — маленький пробел в режиме набора мат формул

$a\ b$  — средний

$a\ b$  — большой

Лайфхак: дважды нажмите на текст в пдфке и ваш курсор переместится на ее латех код

Комент

Как написать комент: В правом верхнем углу есть кнопка Review, после ее нажатия откроется поле где видны комментарии + выделив текст можно можно добавить новый тыкнув на Add comment



# 1 Теоремы

## 1.3 Законы Де Моргана

Теорема.

$$Y \setminus \left( \bigcup_{\alpha \in A} X_{\alpha} \right) = \bigcap_{\alpha \in A} (Y \setminus X_{\alpha}) \quad (1)$$

$$Y \setminus \left( \bigcap_{\alpha \in A} X_{\alpha} \right) = \bigcup_{\alpha \in A} (Y \setminus X_{\alpha}) \quad (2)$$

$$Y \cap \left( \bigcup_{\alpha \in A} X_{\alpha} \right) = \bigcup_{\alpha \in A} (Y \cap X_{\alpha}) \quad (3)$$

$$Y \cup \left( \bigcap_{\alpha \in A} X_{\alpha} \right) = \bigcap_{\alpha \in A} (Y \cup X_{\alpha}) \quad (4)$$

*Доказательство.* Докажем (1), остальные аналогично (см. фото)

$$\begin{aligned} x \in \text{левой части} &\Leftrightarrow (x \in Y) \text{ и } \left( x \notin \bigcup_{\alpha \in A} X_{\alpha} \right) \Leftrightarrow x \in Y \text{ и } \forall \alpha \in A \ x \notin X_{\alpha} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \forall \alpha \in A \ (x \notin X_{\alpha} \text{ и } x \in Y) \Leftrightarrow \forall \alpha \in A \ x \in (Y \setminus X_{\alpha}) \Leftrightarrow \bigcap_{\alpha \in A} (Y \setminus X_{\alpha}) \end{aligned}$$

□





## Законы Де Моргана

$(X_\alpha)_{\alpha \in A}$  - семейство множеств,  $Y$  - множество

тогда

$$1) Y \setminus \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha = \bigcap_{\alpha \in A} (Y \setminus X_\alpha)$$

$$2) Y \setminus \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} (Y \setminus X_\alpha)$$

$$3) Y \cap \left( \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha \right) = \bigcup_{\alpha \in A} (Y \cap X_\alpha)$$

$$4) Y \cup \left( \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha \right) = \bigcap_{\alpha \in A} (Y \cup X_\alpha)$$

Доказательство:

$$1) \exists x \text{ некий элемент множества, такое } x \in Y \setminus \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha, \\ \Leftrightarrow x \in Y \text{ и } x \notin \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha \Leftrightarrow x \in Y \text{ и } \forall \alpha \ x \notin X_\alpha \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \forall \alpha (x \in X_\alpha \text{ и } x \in Y) \Leftrightarrow \forall \alpha \ x \in Y \setminus X_\alpha \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x \in \bigcap_{\alpha \in A} (Y \setminus X_\alpha), \text{ Доказательство второго закона} \\ \text{аналогично} \Rightarrow \text{заменив на } \Leftrightarrow, \text{ идем к следующему.}$$



2)  $Y \setminus \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} (Y \setminus X_\alpha)$   
Докажем, что  $x \in Y \setminus \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha \Leftrightarrow x \in \bigcup_{\alpha \in A} (Y \setminus X_\alpha)$   
 $\Rightarrow$  Пусть  $x \in Y \setminus \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha$ . Тогда  $x \notin \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha$ . Значит, существует  $\alpha \in A$  такой, что  $x \notin X_\alpha$ . Тогда  $x \in Y \setminus X_\alpha$ . Следовательно,  $x \in \bigcup_{\alpha \in A} (Y \setminus X_\alpha)$ .  
 $\Leftarrow$  Пусть  $x \in \bigcup_{\alpha \in A} (Y \setminus X_\alpha)$ . Тогда существует  $\alpha \in A$  такой, что  $x \in Y \setminus X_\alpha$ . Значит,  $x \notin X_\alpha$ . Следовательно,  $x \notin \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha$ . Тогда  $x \in Y \setminus \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha$ .

3)  $Y \cap (\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in A} (Y \cap X_\alpha)$   
Докажем, что  $x \in Y \cap (\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha) \Leftrightarrow x \in \bigcup_{\alpha \in A} (Y \cap X_\alpha)$   
 $\Rightarrow$  Пусть  $x \in Y \cap (\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha)$ . Тогда  $x \in Y$  и  $x \in \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha$ . Значит, существует  $\alpha \in A$  такой, что  $x \in X_\alpha$ . Тогда  $x \in Y \cap X_\alpha$ . Следовательно,  $x \in \bigcup_{\alpha \in A} (Y \cap X_\alpha)$ .  
 $\Leftarrow$  Пусть  $x \in \bigcup_{\alpha \in A} (Y \cap X_\alpha)$ . Тогда существует  $\alpha \in A$  такой, что  $x \in Y \cap X_\alpha$ . Значит,  $x \in Y$  и  $x \in X_\alpha$ . Следовательно,  $x \in Y \cap (\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha)$ .

4)  $Y \cap (\bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha) = \bigcap_{\alpha \in A} (Y \cap X_\alpha)$   
Докажем, что  $x \in Y \cap (\bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha) \Leftrightarrow x \in \bigcap_{\alpha \in A} (Y \cap X_\alpha)$   
 $\Rightarrow$  Пусть  $x \in Y \cap (\bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha)$ . Тогда  $x \in Y$  и  $x \in \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha$ . Значит,  $x \in X_\alpha$  для любого  $\alpha \in A$ . Тогда  $x \in Y \cap X_\alpha$  для любого  $\alpha \in A$ . Следовательно,  $x \in \bigcap_{\alpha \in A} (Y \cap X_\alpha)$ .  
 $\Leftarrow$  Пусть  $x \in \bigcap_{\alpha \in A} (Y \cap X_\alpha)$ . Тогда  $x \in Y \cap X_\alpha$  для любого  $\alpha \in A$ . Значит,  $x \in Y$  и  $x \in X_\alpha$  для любого  $\alpha \in A$ . Следовательно,  $x \in Y \cap (\bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha)$ .

## 1.4 Единственность предела и ограниченность сходящейся последовательности

**Определение.** Последовательность  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  - семейство, заиндексированное натуральными числами.

**Теорема.** (О единственности предела)  $x_n$ - последовательность в метрическом пространстве  $(X, \rho)$

$$a, b \in X, x_n \rightarrow a, x_n \rightarrow b \Rightarrow a = b$$

*Доказательство.* Предположим  $a \neq b$ , следовательно существуют окрестности точек  $a$  и  $b$ , что они не пересекаются:

$$U(a) = B_1(a, \frac{1}{2}r) \quad V(b) = B_2(b, \frac{1}{2}r)$$

$$r = \rho(a, b)$$

Докажем от противного, что эти шары  $B_1$  и  $B_2$  не пересекаются.

Пусть  $z \in B_1$  и  $z \in B_2$  - точка пересечения

$$\rho(a, z) < \frac{1}{2}r$$

$$\rho(b, z) < \frac{1}{2}r$$

$\rho(a, b) = r > \rho(a, z) + \rho(z, b) \Rightarrow \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}r < r$  — противоречие по неравенству треугольников  $\Rightarrow$  шары не пересекаются

Рассмотрим непересекающиеся окрестности  $U(a), V(b)$ . Вне  $U(a)$  конечное число членов последовательности  $\Rightarrow$  в  $V(b)$  конечное число членов последовательности. Получили противоречие.  $\square$

**Теорема.** (Об ограниченности сходящейся последовательности) В метрическом пространстве сходящаяся последовательность ограничена.

*Последовательность  $x_n$  ограничена, если множество ее значений ограничено.*

*Доказательство.* Для  $\varepsilon = 1 \exists N \forall n > N \quad \rho(x_n, a) < 1$  определение предела для  $\varepsilon = 1$

$R = \max(\rho(x_i, a))$  Берем конечные точки и раширяем шар до максимального среди них радиуса. Откуда  $x_n \subset B(a, R)$ .  $\square$



## 1.5 Теорема о предельном переходе в неравенствах для последовательностей и для функций

**Теорема.**  $x_n, y_n$  - вещественные последовательности.

$a, b \in X, x_n \rightarrow a, x_n \rightarrow b$ . Если  $\forall n \in N \quad x_n \leq y_n \Rightarrow a \leq b$ .

*Доказательство.* Докажем от противного.

Пусть  $b < a$

$\varepsilon = \frac{a-b}{2}$  расстояние от  $a$  до  $b \Rightarrow b + \varepsilon = a - \varepsilon$

Для этого же  $\varepsilon \exists N_1 \forall n > N_1 |x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow a - \varepsilon < x_n$

Для этого же  $\varepsilon \exists N_2 \forall n > N_2 |y_n - b| < \varepsilon \Rightarrow y_n < b + \varepsilon$

Тогда при  $n > \max(N_1, N_2)$

$y_n < b + \varepsilon = a - \varepsilon < x_n$

$y_n < x_n$  — противоречие □

*Примечание.*  $x_n = -\frac{1}{n} \quad y_n = \frac{1}{n} \quad x_n < y_n$

Знак не может быть строгим  $0 \leq 0$

Верны варианты теорем с одной последовательностью  $\forall n \quad x_n \leq b$

$x_n \rightarrow a$

Тогда  $a \leq b$

Если  $x_n \in [a; b], x_n \rightarrow \alpha$  тогда  $\alpha \in [a; b]$



## 1.6 Теорема о двух городских

**Теорема.** Пусть есть 3 последовательности  $(x_n), (y_n), (z_n)$  - вещественные последовательности

$\forall n \ x_n \leq y_n \leq z_n$  Пусть  $x_n \rightarrow a, z_n \rightarrow a$  Тогда,  $\exists$  предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$  и это предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$

*Доказательство.*  $\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_1 \ \forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow a - \varepsilon < x_n$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_2 \ \forall n > N_2 \quad z_n < a + \varepsilon$

$N = \max(N_1, N_2), \forall n > N$

$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon$

$a - \varepsilon < y_n < a + \varepsilon$  □

*Примечание.*  $\forall n \ x_n < y_n$  и  $x_n \leq y_n \leq z_n$

$\exists k \ \forall n > k$  неравенство с некоторого номера  $k$  выполняется

Частный случай  $(x_n), (y_n), \forall n \ |x_n| \leq y_n$  и  $y_n \rightarrow 0$

Тогда  $x_n \rightarrow 0, -y_n \leq x_n \leq y_n, y_n \rightarrow 0, -y_n \rightarrow 0$

Для комплексного  $x_n$  и  $y_n \in \mathbb{R}, \operatorname{Re}(x_n) \leq |x_n| \leq y_n$

$-y_n \leq -|x_n| \leq \operatorname{Re}(x_n) \leq |x_n| \leq y_n$



## 1.7 Бесконечно малая последовательность

Вещественная последовательность, называется бесконечно малой, если она стремится к 0, т. е.  $x_n \rightarrow 0$

*Примечание.* Бесконечно малых чисел не бывает (Аксиома Архимеда), поэтому записать стремление к нулю в предыдущих терминах не очень содержательно.

**Теорема.**  $(x_n), (y_n)$  — вещественные последовательности

$x_n$  — бесконечно малая,  $y_n$  — ограниченная

Тогда  $z_n = x_n \cdot y_n$  бесконечно малая.

*Доказательство.*  $\exists M \forall n |y_n| \leq M$ , так как  $y_n$  — ограничена.

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N |x_n| < \varepsilon$  заменяем на  $|x_n \cdot y_n| < M\varepsilon$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N |x_n| \cdot |y_n| = |z_n| < M\varepsilon$

Заменим  $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{M}$  (Китайский фокус)

Тогда  $\forall \varepsilon' \exists N \forall n > N |z_n| < \varepsilon'$

□



## 1.8 Теорема об арифметических свойствах предела последовательности в нормированном пространстве и в $\mathbb{R}$

**Теорема.** Об арифметических свойствах предела последовательности в нормированном пространстве.

Пусть даны:

$(X, \|\cdot\|)$  — нормированное пространство

$(x_n), (y_n)$  — последовательности элементов  $X$

$\lambda_n$  — последовательность скаляров  $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y, \lambda_n \rightarrow \lambda, x \in X, y \in X, \lambda \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$

Тогда утверждается несколько свойств:

1.  $x_n \pm y_n \rightarrow x \pm y$
2.  $\lambda_n x_n \rightarrow \lambda x$
3.  $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$

Доказательство.

1.  $\forall \varepsilon > 0$

$$\exists N_1 \forall n > N_1 \quad \|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists N_2 \forall n > N_2 \quad \|y_n - y\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда при  $n > \max(N_1, N_2)$  выполняется

$$\|x_n + y_n - (x + y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

2.  $\|\lambda_n x_n - \lambda x\| = \|(\lambda_n x_n - \lambda_n x) + (\lambda_n x - \lambda x)\| \leq \|\lambda_n(x_n - x)\| + \|(\lambda_n - \lambda)x\| =$

$$|\lambda_n| \cdot \|x_n - x\| + |\lambda_n - \lambda| \cdot \|x\|$$

$|\lambda_n|$  — ограничено

$\|x_n - x\|$  — бесконечно малое

$|\lambda_n - \lambda|$  — бесконечно малое

$\|x\|$  — ограничено

б.м.  $\cdot$  огр. + огр.  $\cdot$  б.м.  $\Rightarrow$  все выражение бесконечно малое по теореме о бесконечно малой последовательности (пункт 1.7)

3.  $\left| \|x_n\| - \|x\| \right| \leq \|x_n - x\| \rightarrow 0$

□

### Арифметические свойства предела в $\mathbb{R}$

$(x_n), (y_n)$  — вещественные последовательности

$x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y, x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$

Тогда утверждается несколько свойств:

1.  $x_n \pm y_n \rightarrow x \pm y$
2.  $x_n y_n \rightarrow xy$
3.  $|x_n| \rightarrow |x|$
4. Если  $y \neq 0$  и  $\forall n \ y_n \neq 0$  то  $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{x}{y}$



$\mathbb{R}$  — нормированное пространство, следовательно, 1-3 — доказаны

Доказательство 4:

Заметим  $\frac{x_n}{y_n} = x_n \cdot \frac{1}{y_n}$

Достаточно проверить  $\frac{1}{y_n} \rightarrow \frac{1}{y}$  (далее по свойству 2)

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{y} \right| = |y_n - y| \cdot \left| \frac{1}{y} \right| \cdot \left| \frac{1}{y_n} \right|$$

$|y_n - y|$  — бесконечно малое

$\left| \frac{1}{y} \right|$  — ограничено

Докажем, что  $\left| \frac{1}{y_n} \right|$  — ограничено

$y_n \rightarrow y \neq 0$

Для  $\varepsilon = |y| \cdot \frac{1}{2} \quad \exists N \forall n > N$

Для случая  $y > 0$

$$\frac{y}{2} < y_n < \frac{3}{2}y$$

$$\frac{2}{3y} < \frac{1}{y_n} < \frac{2}{y}$$

В общем случае  $\left| \frac{2}{3y} \right| < \left| \frac{1}{y_n} \right| < \left| \frac{2}{y} \right|$

Тогда число  $M = \max\left(\frac{1}{|y_1|}, \frac{1}{|y_2|} \dots \frac{1}{|y_N|}, \frac{2}{|y|}\right) + 1$  — верхняя граница последовательности  $\frac{1}{y_n}$ ,

т. е.  $\forall n \in \mathbb{N} \quad 0 \leq \left| \frac{1}{y_n} \right| \leq M$ , следовательно,  $\left| \frac{1}{y_n} \right|$  ограничена.

Из этого следует, что  $\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{y} \right| = |y_n - y| \cdot \left| \frac{1}{y} \right| \cdot \left| \frac{1}{y_n} \right| \rightarrow 0$ , следовательно,  $\frac{1}{y_n} \rightarrow \frac{1}{y}$ , что и требовалось проверить.





## 1.9 Неравенство Коши-Буняковского в линейном пространстве, норма, порожденная скалярным произведением

### Неравенство Коши-Буняковского в линейном пространстве

$\forall x, y \quad |\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$  — нер-во Коши-Буняковского в линейном пространстве

Доказательство:

$0 \leq \langle x + ty, x + ty \rangle = \langle x, x \rangle + t \langle y, x \rangle + \bar{t} \langle x, y \rangle + t \cdot \bar{t} \langle y, y \rangle$  по свойствам скалярного произведения.

Подставим  $t = \frac{-\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle}$  (при  $y = 0$  изначальное неравенство тривиально, рассматриваем  $y \neq 0$ )

$$\langle x, x \rangle - \frac{\langle x, y \rangle \langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle} - \frac{\overline{\langle x, y \rangle} \langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} + \frac{\langle x, y \rangle \langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle} = \langle x, x \rangle - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle} \geq 0 \quad (\text{пояснение: } \overline{\langle x, y \rangle} = \langle y, x \rangle \text{ и } \overline{\langle x, y \rangle} \langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle|^2)$$

Преобразуя финальное неравенство можно получить исходное  $\Rightarrow$  доказано.

Пример:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

$$(x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) \cdot (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2)$$

$$\Leftrightarrow |x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n| \leq \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \cdot \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2}$$

### Норма, порожденная скалярным произведением

$X$  — линейное пространство со скалярным произведением

Тогда функция  $\rho(x) := \sqrt{\langle x, x \rangle}$  — норма в  $X$

Свойства нормы:

$$1. \rho(x) \geq 0 \quad \rho(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$2. \rho(\alpha x) = |\alpha| \rho(x)$$

$$\text{Доказательство: } \rho(\alpha x) = \sqrt{\langle \alpha x, \alpha x \rangle} = \sqrt{\alpha \bar{\alpha} \langle x, x \rangle} = |\alpha| \rho(x)$$

$$3. \rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$$

Доказательство:

Возведем обе части в квадрат

$$\langle x + y, x + y \rangle \leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$$

Используем часть из доказательства неравенства Коши-Буняковского

$$\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle \leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$$

Сокращаем

$$\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle \leq 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$$

Верно по неравенству Коши-Буняковского

$$2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq 2 |\langle x, y \rangle| \leq 2 \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$$



## 1.10 Леммы о непрерывности скалярного произведения и покоординатной сходимости в $\mathbb{R}^n$

### Лемма о непрерывности скалярного произведения

$X$  - пространство со скалярным произведением

Зададим с помощью скалярного произведения норму на  $X$

$x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y, x \in X, y \in X$

Тогда  $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$

Доказательство

$|\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| = |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle + \langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| \leq |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle| + |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| = |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x_n, x_n \rangle} \sqrt{\langle y_n - y, y_n - y \rangle} + \sqrt{\langle x_n - x, x_n - x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle} \leq \|x_n\| \cdot \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \cdot \|y\|$  (согласно неравенству Коши-Буняковского (взять под корень) и тому факту, что норма задана скалярным произведением)

$\|x_n\|$  — ограничено

$\|y_n - y\|$  — бесконечно малое

$\|x_n - x\|$  — бесконечно малое

$\|y\|$  — ограничено

$\Rightarrow \|x_n\| \cdot \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \cdot \|y\| \rightarrow 0$

### Лемма о покоординатной сходимости в $\mathbb{R}^n$

Будем нумеровать рисунки индекс последовательности сверху

$(x^{(n)})$  — последовательность векторов из  $\mathbb{R}^m$

$(x^{(10)}) = (x_1^{(10)}, x_2^{(10)}, \dots, x_m^{(10)}) \in \mathbb{R}^m$  — координаты этого вектора

#### Собственно сама лемма

В качестве нормы используется Евклидова норма

Если  $x^{(n)}$  — последовательность векторов в  $\mathbb{R}^m$ , тогда эквивалентны два утверждения:

1)  $x^{(n)} \rightarrow a$  (по Евклидовой норме)

2)  $\forall k \in \{1, 2, \dots, m\} \quad x_k^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a_k$

Доказательство:

•  $1 \Rightarrow 2$

Берём сумму по Евклидовой норме, в сумме есть в том числе и  $k$ -тый элемент  $\Rightarrow$  имеет место неравенство, от чего из условия следует покоординатная сходимость:

$$|x_k^{(n)} - a_k| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^m |x_i^{(n)} - a_i|^2} = \|x^{(n)} - a\| \rightarrow 0$$

Следовательно  $|x_k^{(n)} - a_k| \rightarrow 0 \Rightarrow \forall k \in \{1, 2, \dots, m\} \quad x_k^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a_k$ .

•  $2 \Rightarrow 1$

$$\|x^{(n)} - a\| \leq \sqrt{m} \cdot \max_{k \in [1..m]} |x_k^{(n)} - a_k| \rightarrow 0$$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^m |x_i^{(n)} - a_i|^2} \leq \sqrt{m \cdot (\text{максимальное слагаемое})^2}$$

Следовательно  $\|x^{(n)} - a\| \rightarrow 0 \Rightarrow x^{(n)} \rightarrow a$



## 1.11 Аксиома Архимеда. Плотность множества рациональных чисел в $\mathbb{R}$

### Аксиома Архимеда

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x > 0, y > 0 \quad \exists n \in \mathbb{N} : nx > y$$

### Сомнительное упарывание от Кохася

было скрыто, см. источник.

### Плотность множества рациональных чисел в $\mathbb{R}$

Множество  $A \subset \mathbb{R}$  — всюду плотно в  $\mathbb{R}$ , если

$\forall x, y, x < y \quad (x, y) \cap A \neq \emptyset$  — в любом промежутке имеются точки из множества  $A$

### $\mathbb{Q}$ плотно в $\mathbb{R}$

Доказательство:

$\forall x, y \quad x < y \quad ? \exists q \in (x, y)$  — ищем такое  $q$

Будем рассматривать только случай  $x, y > 0$  тк, если  $x, y < 0$ , то это симметрично нашему случаю, а если  $x < 0, y > 0$  то просто возьмем новый  $x > 0, x < y$

Возьмем  $n > \frac{1}{y-x}$  — возможно по аксиоме Архимеда

$$\frac{1}{n} < y - x$$

$$\text{Возьмем } q := \frac{[nx]+1}{n}$$

Проверяем

$$q \leq \frac{nx+1}{n} = x + \frac{1}{n} < x + (y - x) = y$$

$$q > \frac{(nx-1)+1}{n} = x$$

$x < q < y \Rightarrow q \in (x, y)$  — мы доказали, что  $\forall x, y, x < y \quad \exists q \in (x, y)$ .



## 1.12 Неравенство Бернулли (Якоба)

Лайт-версия: при  $x > -1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (1+x)^n \geq 1+nx$

Продвинутая версия: при  $x > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (1+x)^n \geq 1+nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$

(Продвинутую версию Кохась не доказывал)

Доказательство лайт-версии:

По индукции

База:  $n = 1 \quad 1+x \geq 1+x$  — верно

Переход:

Дано:  $(1+x)^n \geq 1+nx$

Доказать:  $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$

$(1+x)^{n+1} = (1+x)(1+x)^n \geq (1+x)(1+nx) = 1+x+nx+nx^2 \geq 1+(n+1)x \iff$

$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$  — чтд



### 1.13 Открытость открытого шара

Определения:

$a$  — внутренняя точка  $D \Rightarrow$

$$\exists U(a) : U(a) \subset D(a)$$

$$\exists r : B(a, r) \subset D(a)$$

$a$  — не внутренняя точка  $D \Rightarrow$

$$\forall U(a) \exists y \notin D : y \in U(a)$$

$D$  — открытое множество, если все его точки внутренние.

$X$  — открыто

$\bigcirc$  — открыто

**Теорема.** *Открытый шар — открытое множество*

*Доказательство.*  $B(a, r) = \{x \in X : q(x, a) < r\}$

$\forall b \in B(a, r) : B(b, r - q(a, b)) \subset B(a, r)$  — это  $r - q(a, b)$  по определению, т. к.  $b \in B(a, r)$ , докажем этот факт:

$$x \in B(b, r - q(a, b)) \Rightarrow$$

$$q(x, b) < r - q(a, b)$$

$$q(a, b) + q(b, x) < r$$

$$q(a, x) \leq q(a, b) + q(b, x) < r$$

$$q(a, x) < r$$

Мы доказали, что  $\forall b \in B(a, r) : B(b, r - q(a, b)) \subset B(a, r) \Rightarrow \exists B(b, r') \subset B(a, r)$ , следовательно, все точки открытого шара — внутренние, следовательно, открытый шар — открытое множество.  $\square$



## 1.14 Теорема о свойствах открытых множеств

$X$  – метрическое пространство

$(G_\alpha)_{\alpha \in A}$  – семейство открытых в  $X$  множеств

**Теорема 1.**  $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$  – открыто в  $X$

*Доказательство.*  $x \in D = \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$

$x$  – внутренняя точка?

$$\forall x \in \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \Rightarrow$$

$$\exists d_0 : x \in G_{d_0} \Rightarrow$$

$$\exists U(x) \subset G_{d_0} \Rightarrow$$

$$\text{Тогда } U(x) \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha = D \Rightarrow x \text{ – внутренняя точка } D \Rightarrow D \text{ – открыто}$$

□

**Теорема 2.**  $A$  – конечное, тогда  $\bigcap_{\alpha \in A} G_\alpha$  – открыто в  $X$

*Доказательство.*  $D = \bigcap_{\alpha \in A} G_\alpha = \bigcap_{i=1}^n G_{\alpha_i}$  – открытое?

$$x \in \bigcap_{i=1}^n G_{\alpha_i} \Rightarrow \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$x \in G_{\alpha_i}$  – открытое, следовательно

$$\exists B(x, r_i) \subset G_{\alpha_i}$$

Пусть  $r_0 := \min_{i=1}^n (r_i)$ , тогда

$$\forall i : B(x, r_0) \subset B(x, r_i) \Rightarrow$$

$$\forall i : B(x, r_0) \subset G_{\alpha_i} \Rightarrow$$

$$\forall i : B(x, r_0) \subset \bigcap_{i=1}^n G_{\alpha_i} \Rightarrow$$

$x$  – внутренняя точка, следовательно

$$\bigcap_{i=1}^n G_{\alpha_i} \text{ – открыто}$$

□



### 1.15 Теорема о связи открытых и замкнутых множеств, свойства замкнутых множеств

**Теорема 1.** О связи открытых и замкнутых множеств:  $X$  — метрическое пространство;  $D \subset X \Rightarrow$

$D$  — замкнуто  $\Leftrightarrow D^c = X \setminus D$  — открыто

$D^c$  — дополнение  $D$

*Доказательство.*

В ту сторону ( $\Rightarrow$ ):

$D$  — замкнутое,  $D^c$  — открытое?

$\forall x \in D^c : ?x$  — внутренняя точка  $D^c$

$x \in D^c \Rightarrow x \notin D$

$x$  — не предельная точка  $D$  (т.к. все предельные точки  $D$  в  $D$ )  $\Rightarrow$

$\exists U(x) : U(x) \cap D = \emptyset \Rightarrow$

$U(x) \subset D^c$

В обратную сторону ( $\Leftarrow$ ):

$D^c$  — открытое,  $D$  — замкнутое?

$\forall x$  — предельная точка  $D : ?x \in D$

Если это не так, то  $x \in D^c \Rightarrow$

$\exists U(x) : U(x) \subset D^c \Rightarrow U(x) \cap D = \emptyset$

Это противоречит тому, что  $x$  — предельная точка  $D \Rightarrow$  противоречие  $\Rightarrow D$  — замкнуто.  $\square$

*Примечание.*  $A \subset X$ ,  $A$  — не открыто  $\nRightarrow A$  — замкнуто!!!

**Теорема 2.** О свойствах замкнутого множества

$X$  — метрическое пространство  $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$  — семейство замкнутых в  $X$  множеств.

1)  $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$  — замкнуто в  $X$

2)  $\bigcup_{\alpha \in A} F_\alpha$  — замкнуто в  $X$  ( $A$  — конечно)

*Доказательство.*  $D = \bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$

$D^c = X \setminus \bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha =$  (по законам де Моргана)  $\bigcup_{\alpha \in A} (X \setminus F_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in A} F_\alpha^c$  — открыто

$D^c$  — открыто  $\Rightarrow D$  — замкнуто.

Пункт 2 аналогично.  $\square$





### 1.16 Теорема об арифметических свойствах предела последовательности (в $\bar{\mathbb{R}}$ ). Неопределенности.

**Теорема 1.**  $(x_n), (y_n)$  — вещественные последовательности:  $a, b \in \bar{\mathbb{R}}$   $x_n \rightarrow a$   $y_n \rightarrow b$

1.  $x_n \pm y_n \rightarrow a \pm b$
2.  $x_n \cdot y_n \rightarrow a \cdot b$  ( $0 \cdot \inf, \inf \cdot 0$  — не определены)
3. Если  $\forall n$   $y_n \neq 0$   $b \neq 0$ , то  $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{a}{b}$  при условии, что правые части имеют смысл.

*Доказательство.*

1)  $x_n \rightarrow a \in \mathbb{R}, y_n \rightarrow +\inf$

$x_n + y_n \rightarrow +\inf$ ?

$\forall \epsilon > 0 \exists N_1 \forall n > N_1 : a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$

$\forall E > 0 \exists N_2 \forall n > N_2 : E < y_n$

$N = \max(N_1, N_2)$

$\forall n > N : x_n + y_n > E + a - \epsilon$

3)  $x_n \rightarrow a \in \mathbb{R}, y_n \rightarrow +\inf$

$\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{a}{+\inf} = 0$ ?

Если  $y_n$  — бесконечно большая, то  $\frac{1}{y_n}$  — бесконечно малая.

$\forall E > 0 \exists N \forall n > N : E < y_n$

□



### 1.17 Теорема Кантора о стягивающихся отрезках

**Теорема.** Пусть дана убывающая система:  $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$

Пусть  $(b_n - a_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , тогда:

$\exists! c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k]$  и при этом  $b_n \rightarrow c$  и  $a_n \rightarrow c$

*Доказательство.*

По аксиоме Кантора:  $\exists c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k] \Rightarrow$

$\forall n : c \in [a_n, b_n] \Rightarrow$

$0 \leq b_n - c \leq b_n - a_n$

$b_n - a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow b_n \rightarrow c$  по теореме о двух городских.

Аналогично  $a_n \rightarrow c$ .

$c$  — однозначно заданно в силу единственности предела. □



## 1.18 Теорема о существовании супремума

**Теорема.** Если  $X$  — непустое подмножество  $\mathbb{R}$ , ограниченное сверху, то  $\exists \sup X < \infty$

*Доказательство.* Строим систему вложенных отрезков  $[a_i, b_i]$ . Берём  $a_1 \in E$ , берём  $b_1$  — любую верхнюю границу множества  $E$  верхних границ:

Найдём следующий вложенный отрезок (бинпоиском).

Для этого возьмём центр -  $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ . Если не существует  $x \in X$ , что  $c_i \leq x$  (справа нет элементов множества), то мы должны сместить  $a_{i+1}$  в  $c_i$ . Если такой  $x \in X$  существует и он  $x \leq c_i$ , то мы должны сместить  $b_{i+1}$  в  $c_i$ .

Таким образом мы каждый раз уменьшаем наш отрезок и все отрезки вложенные.

При этом на каждом шагу «алгоритма» поддерживается требуемый инвариант, наш искомый супремум находится внутри нашего отрезка, т.к. если мы отрезаем левый отрезок, то в нём нет потенциальных супремумов, а если мы отрезаем правый отрезок, то мы берём центр - верхнюю точку, значит потенциальный супремум остаётся в наших отрезках, т. е. результирующее единственное число  $c$  будет являться супремумом.  $\square$

*Примечание.* Возможно, Кохась потребует доказать теорему о существовании infimum, хотя ее нет в списке вопросов. По сути, это та же теорема, что и о существовании supremum. Вам нужно просто поменять знаки в неравенствах и заявить о победе :)



### 1.19 Лемма о свойствах супремума

$$1. D \subset E \subset \mathbb{R} \Rightarrow \sup D \leq \sup E$$

Доказательство:

Заметим, что  $\sup E$  — верхняя граница множества  $D$  (так как это верхняя граница множества  $E$ , содержащего в себе  $D$ ). Тогда  $\sup D \leq \sup E$ , что и требовалось доказать.

$$2. \forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda > 0 \text{ выполняется } \sup(\lambda E) = \lambda \sup E$$

Доказательство:

$\forall x \in E$  верно  $x \leq \sup E$ . Значит  $\lambda x \leq \lambda \sup E$ . Отсюда непосредственно следует, что  $\sup(\lambda E) = \lambda \sup E$ , что и требовалось доказать.

$$3. \sup(-1 \cdot E) = -1 \cdot \inf E$$

Доказательство:

Найдем  $M : \forall x \in (-E) : x \leq M$ . Тогда  $\forall -x \in E : -x \geq -M$ . Значит  $-M$  — нижняя граница  $E$ . Тогда  $-\sup(-E) = \inf E \Rightarrow \sup(-E) = -\inf E$ , что и требовалось доказать.

Примечание:

Первое свойство верно для  $\inf$ им со знаком  $\geq$ .

Второе свойство верно для  $\inf$ им.



## 1.20 Теорема о пределе монотонной последовательности (Теорема Виейрштасса)

Если  $x_n$  монотонна и ограничена, то существует конечный  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

Доказательство (рассмотрим случай для возрастающей ограниченной сверху последовательности):

Рассмотрим  $M = \sup(x_n)$ . Вспомним техническое определение супремума:

$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : M - \epsilon < x_n$ .

То, что последовательность возрастающая, означает, что  $\forall n > N : x_N \leq x_n$

Воспользуемся двумя неравенствами и свойством супремума сразу:

$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : M - \epsilon < x_N \leq x_n \leq M < M + \epsilon$

Получили, что в  $\epsilon$ -окрестности точки  $M$  лежит бесконечно много элементов из последовательности  $x_n$ . Значит,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = M = \sup(x_n)$ . То есть существует конечный предел, что и требовалось доказать.

Случай с убывающей последовательностью, ограниченной снизу, доказывается аналогично через  $\inf$ .

Предел возрастающей последовательности, неограниченной сверху, равен, очевидно,  $+\infty$ . Аналогично для убывающей, неограниченной снизу.



## 1.21 Определение числа $e$ , соответствующий замечательный предел

Рассмотрим последовательности  $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$  и  $y_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ . Утверждается, что их пределы совпадают и равны  $e$ .

Доказательство:

Очевидно, что  $y_n \geq 1$

Заметим, что  $y_n$  — убывающая последовательность, так как:

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{(\frac{n}{n-1})^n}{(\frac{n+1}{n})^{n+1}} = (1 + \frac{1}{n^2-1})^{n+1} \cdot \frac{n-1}{n} \geq$$

(По неравенству Бернулли)

$$(1 + \frac{n+1}{n^2-1}) \cdot (\frac{n-1}{n}) = (1 + \frac{1}{n-1}) \cdot (\frac{n-1}{n}) = \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} = 1$$

Получили, что  $y_n$  — убывающая последовательность, ограниченная снизу, а значит имеет предел.

Заметим, что  $x_n$  — возрастающая последовательность, так как:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(\frac{n+2}{n+1})^{n+1}}{(\frac{n+1}{n})^n} = (1 + \frac{1}{n+1}) \cdot (1 - \frac{1}{(n+1)^2}) \geq$$

(По неравенству Бернулли)

$$(1 + \frac{1}{n+1}) \cdot (1 - \frac{n}{(n+1)^2}) = 1 - \frac{n}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{n}{(n+1)^3} = 1 + \frac{1}{(n+1)^3} > 1$$

Покажем, что  $x_n$  ограничено сверху. Сделаем это методом от противного:

Пусть  $x_n$  не ограничена сверху. Значит  $\forall c \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N x_n > c$

Возьмем  $c = 1000$ . Тогда неравенство  $(1 + \frac{1}{n})^n > 1000$  имеет бесконечно много решений.

$$1 + \frac{1}{n} > \sqrt[n]{1000} = (1 + 999)^{\frac{1}{n}}$$

(По неравенству Бернулли)

$$1 + \frac{1}{n} > 1 + \frac{999}{n}$$

$$\frac{998}{n} < 0$$

У неравенства нет решений. Получили противоречие. Значит  $x_n$  ограничена сверху.  $x_n$  также возрастает, а значит имеет предел.



Пусть  $\lim x_n = e$ . Покажем, что  $\lim y_n = e$ :

$$\lim y_n = \lim \left( x_n \cdot \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \right) = e \cdot 1 = e$$

Получили, что две этих последовательности имеют одинаковый замечательный предел, равный  $e$ .

В матане как на войне





## 1.22 Теорема об открытых и замкнутых множествах в пространстве и в подпространстве

Пусть  $X$  — метрическое пространство,  $Y \subset X$ ,  $Y$  — подпространство  $X$  (имеет ту же метрику  $\rho_y(y_1, y_2) = \rho_x(y_1, y_2)$ ),  $D \subset Y \subset X$

**Теорема.**

1.  $D$  — открыто в пространстве  $Y \Leftrightarrow \exists G$  — открытое в  $X$ :  $D = G \cap Y$
2.  $D$  — замкнуто в пространстве  $Y \Leftrightarrow \exists F$  — замкнутое в  $X$ :  $D = F \cap Y$

(Заметим, что  $\forall a \in Y, B^y(a, r) = B^x(a, r) \cap Y$ )

Доказательство:

1.

•  $\Rightarrow$

$D$  открыто в  $Y$ . Значит  $\forall a \in D \exists r_a : B^y(a, r_a) \subset D$

Пусть  $G := \bigcup_{a \in D} B^x(a, r_a)$  — открыто в  $X$  (объединение открытых множеств)

Тогда:

$$G \cap Y = \left( \bigcup_{a \in D} B^x(a, r_a) \right) \cap Y = \bigcup_{a \in D} (B^x(a, r_a) \cap Y) = \bigcup_{a \in D} B^y(a, r_a) = D$$

Получили, что  $G \cap Y = D$ , что и требовалось доказать.

•  $\Leftarrow$

$G$  — открыто в  $X$ ,  $G \cap Y = D$ .

Пусть  $a \in D \Rightarrow a \in G \Rightarrow \exists r : B^x(a, r) \subset G$  (следует из того, что  $G$  открыто в  $X$ )

Рассмотрим пересечение с  $Y$ :

$$\exists r : B^x(a, r) \subset G$$

$$\exists r : B^x(a, r) \cap Y \subset G \cap Y$$

$$\exists r : B^y(a, r) \subset G \cap Y$$

$$\exists r : B^y(a, r) \subset D$$

То есть  $\forall a \in D$  Эокрестность  $a$ , также принадлежащая  $D$ . Значит  $D$  — открыто, что и требовалось доказать.

2.

•  $\Rightarrow$

Рассмотрим дополнение:

$D$  — замкнуто в  $Y \Rightarrow D^c = Y \setminus D$  — открыто в  $Y \Rightarrow \exists G$  — открытое в  $X$ :  $D^c =$



$G \cap Y$  (по пункту 1)

Тогда  $\exists F = G^c = X \setminus G$  — замкнуто в  $X$ .

$$D^c = G \cap Y \Rightarrow D = Y \setminus (G \cap Y) = (Y \setminus G) \cup (Y \setminus Y) = Y \setminus G = G^c \cap Y.$$

Получили  $D = F \cap Y$ , что и требовалось доказать.

•  $\Leftarrow$

$\exists F$  — замкнутое в  $X$ .  $F^c = X \setminus F$  — открыто в  $X$

$F^c \cap Y$  — открыто в  $Y$

$Y \setminus (F^c \cap Y)$  — замкнуто в  $Y$

Применим закон Де-Моргана:

$$Y \setminus (F^c \cap Y) = (Y \setminus F^c) \cup (Y \setminus Y) = Y \setminus F^c = Y \cap F = D$$

Получили, что  $F \cap Y = D$  — замкнуто, что и требовалось доказать.

В матане как на войне



### 1.23 Теорема о компактности в пространстве и в подпространстве

Пусть  $(X, \rho)$  — метрическое пространство,  $Y \subset X$  — подпространство,  $K \subset Y$ . Тогда  $K$  — компактно в  $Y \Leftrightarrow K$  — компактно в  $X$ .

*Доказательство.*

•  $\Rightarrow$

Пусть  $K \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ , где  $G_\alpha$  — открытые в  $X$

Тогда так как  $K \subset Y : K \subset \bigcup_{\alpha \in A} (G_\alpha \cap Y) \Rightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n : K \subset \bigcup_{i=1}^n (G_{\alpha_i} \cap Y)$  (т.е. существует конечное подмножество, так как  $K$  компактно в  $Y$ ). И раз  $K \subset \bigcup_{i=1}^n (G_{\alpha_i} \cap Y)$ , то тем более  $K \subset \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i}$

•  $\Leftarrow$

Дано:  $K$  — компактно в  $X$ , правда ли что  $K$  — компактно в  $Y$ ?

$$K \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha, G_\alpha \text{ — открытые в } Y$$

$\exists \tilde{G}_\alpha$  — открыто в  $X : G_\alpha = \tilde{G}_\alpha \cap Y \Rightarrow$  [по Т. об открытых и замкнутых множествах]  $\Rightarrow$

$$K \subset \bigcup \tilde{G}_\alpha \Rightarrow \text{[по компактности в } X] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow K \subset \bigcup_{i=1}^n \tilde{G}_\alpha \Rightarrow K \subset \bigcup_{i=1}^n G_\alpha$$

□

### 1.24 Простейшие свойства компактных множеств

Пусть  $X$  — метрическое пространство,  $K \subset X$ . Тогда:

1.  $K$  — компактно  $\Rightarrow$  замкнуто + ограничено
2.  $Y \subset X, Y$  — компактно,  $K$  замкнуто в  $Y \Rightarrow K$  — компактно (замкнутое подмножество компактного множества компактно)

*Доказательство.*

1. (а) Замкнуто ли  $K$ ? Для этого достаточно проверить что  $K^c = X \setminus K$  — открыто. Пусть  $a \in K^c$ . Окружим каждую точку  $K$  каким нибудь шаром, не задевая  $a$ . Тогда  $K \in \bigcup_{x \in K} B(x, \frac{1}{2}\rho(x, a))$  — открытое покрытие  $\Rightarrow$  [по компактности]  $\exists x_1, \dots, x_n : K = \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \frac{1}{2}\rho(x_i, a))$ . Возьмем  $R := \min\{\frac{1}{2}\rho(x_i, a) : 1 \leq i \leq n\} \Rightarrow$  очевидно, что  $B(a, R) \subset K^c$ . Таким образом каждая точка  $K^c$  входит вместе с некоторым шаром  $\Rightarrow K^c$  — открыто



(b) Ограничено ли  $K$ ? Пусть  $a \in X$  — любая точка,  $K \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} B(a, n)$  [формально — это открытое подпокрытие, тогда по компактности]  $\Rightarrow \exists n_1 \dots n_l : K \subset$

$$\bigcup_{n=1}^l B(a, n_l)$$

Ну и тут написано что  $a$  содержится в каком то шаре большого радиуса, если взять наибольший

2. Проверим, компактно ли  $K$  в  $Y$

$$K \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \text{ — открытые в } Y$$

$K$  — замкнуто, значит  $K^c$  открыто  $\Rightarrow Y \subset$  (на самом деле  $=$ )  $K^c \cup \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$  (это открытое покрытие)  $\Rightarrow \exists$  конечное открытое подпокрытие  $Y$ :

$$Y \subset \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i}, \text{ и, возможно, } \cup K^c. \text{ Тогда}$$

$$K \subset \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i}$$

□

*Примечание.* В  $X = \mathbb{R}^m$   $K$  — компактно  $\Leftrightarrow$  замкнуто + ограничено, но в любом  $X$  (и даже подпространстве  $\mathbb{R}^m$ ) это неверно!

*Пример.*  $X = (0, 1)$  — ограничено и замкнуто (в  $X$ ), но некомпактно, так как можем взять следующее открытое покрытие:

$$X = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left( \frac{1}{k+2}; \frac{1}{k} \right)$$

*Примечание.*  $K \subset X$ ,  $K$  — конечное множество, тогда очевидно, что  $K$  — компактно

## 1.25 Лемма о вложенных параллелепипедах

Параллелепипед:  $[a, b] = \{x \in \mathbb{R}^m : \forall i : a_i \leq x_i \leq b_i\}$

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3] \dots$$

Тогда  $\bigcap_{i=1}^{\infty} [a_i, b_i]$  — непусто

*Доказательство.* Рассмотрим по координатам:

$\forall i = 1 \dots m, [(a_k)_i, (b_k)_i] \supset [(a_{k+1})_i, (b_{k+1})_i] \dots$  — к этой системе вложенных промежутков применим аксиому Кантора.

$$\exists c_i \subset \bigcap_{i=1}^{\infty} [(a_k)_i, (b_k)_i]$$

Тогда, очевидно,  $c = (c_1 \dots c_m) \subset \bigcap_{i=1}^{\infty} [a_i, b_i]$ , так как  $\forall i : (a_k)_i \leq c_i \leq (b_k)_i$

□

## 1.26 Компактность замкнутого параллелепипеда в $\mathbb{R}^m$

Пусть  $K = [a, b]$  — замкнутый параллелепипед в  $\mathbb{R}^m$ . Тогда  $K$  — компактно



*Доказательство.*  $[(a, b)] \subset \bigcup G_\alpha$  — открытое покрытие в  $\mathbb{R}^m$

Допустим из этого открытого покрытия невозможно выбрать конечное подпокрытие. Тогда осуществляем половинное деление. Тогда обязательно (так как мы предположили что конечного покрытия не существует) будет существовать четвертинка (в двумерном случае, в произвольном  $\frac{1}{2^m}$  часть) которую нельзя накрыть конечным покрытием множеств. Запускаем такой алгоритм, изначально  $a_1 = a, b_1 = b$

Получилась цепочка вложенных параллелепипедах. Тогда лемма о вложенных параллелепипедах:

$\exists c \in \bigcap [a_k, b_k]$ .

$\text{diam}[a_k, b_k] = \frac{\text{diam}[a_1, b_1]}{2^{k-1}}$ , очевидно, длина диаметра стремится к нулю

Тогда  $\exists G_\alpha : c \in G_\alpha$ , и так как  $G_\alpha$  открытое, то  $c$  входит с некоторой окрестностью  $\Rightarrow \exists B(c, r) \subset G_\alpha$ , и когда диаметр параллелепипеда станет меньше  $r$ , мы получим что весь параллелепипед вместе с точкой  $c$  содержится в этом одном шаре  $G_\alpha$ , но мы ведь строили параллелепипеды так, чтобы их нельзя было накрыть конечным подпокрытием. Мы получили противоречие.  $\square$

## 1.27 Теорема о характеристике компактов в $\mathbb{R}^m$

Дано множество  $K$  лежащее в  $\mathbb{R}^m : K \subset \mathbb{R}^m$ . Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1.  $K$  — замкнуто и ограничено (Мы доказывали что компактное множество обязательно замкнуто и ограничено, но в  $\mathbb{R}^m$  это работает еще в обратную сторону)
2.  $K$  — компактно
3.  $K$  — секвенциально компактно. Это значит, что  $\forall (x_n) \in K \exists n_k$  — строго возрастающая последовательность номеров,  $\exists x \in K : x_{n_k} \rightarrow x$  (у любой последовательности имеется сходящаяся подпоследовательность, причем  $x$  тоже должен лежать в  $K$ )

*Доказательство.*

- $1 \Rightarrow 2$

$K$  — замкнуто и (ограничено, значит можем заключить в шар, да и не только в шар, давайте в параллелепипеде) содержится в параллелепипеде. Замкнутое подмножество компактного множества компактно (по теореме о простейших свойствах)  $\Rightarrow K$  — компактно

- $2 \Rightarrow 3$

Пусть дана последовательность  $x_n$ . Можем ли мы найти такую подпоследовательность  $x_{n_k}$ ? Разберем два случая:

1. Множество значений  $x_n$  конечно. Очевидно, можем. Допустим у нас есть 10 значений  $x_n$ , а самих номеров бесконечно много. Значит одному из значений отвечает бесконечно много номеров. Берем эти номера, это и будут  $n_k$ , значит  $\exists$  бесконечная стационарная подпоследовательность.



2. Множество значений  $x_n$  бесконечно.  $D = \{x_n\}$ .

Предположим что у  $D$  нет предельных точек в  $K$ , тогда построим покрытие:

$$K = \bigcup_{x \in K} B(x, \varepsilon_x)$$

$x \in K$  не предельная точка для  $D \Rightarrow$  можем окружить таким шаром, что там нет точек  $D : \exists \varepsilon_x : \dot{B}(x, \varepsilon_x)$  не пересекается с  $D$ .

Тогда это открытое покрытие. У этого открытого покрытия нет конечного подпокрытия, потому что множество  $D$  бесконечно и не может быть покрыто конечным количеством шаров. Но это противоречие, так как  $K$  компактно и значит у любого открытого покрытия есть конечно подпокрытие  $\Rightarrow$  у  $D$  есть предельные точки

Тогда пусть  $x$  — предельная точка. Значит  $\exists x_{m_k} \rightarrow x$ , где  $x_{m_k} \in D, x_{m_k} \neq x$  (ко всякой предельной точке можно подойти не наступая на саму точку)

Последовательность номеров должна быть возрастающей, поэтому отсортируем последовательность  $m_k$  и удалим повторы

Рассмотрим  $x_{m_1} : \exists K \forall k > K : |x_{m_k} - x| < \underbrace{|x_{m_1} - x|}_{\varepsilon}$

То есть при  $k > K$   $m_k \neq m_1 \Rightarrow m_1$  встретится конечное число раз Аналогично  $\forall i : m_i$  встречается в последовательности  $(m_k)$  конечное число раз

Итого, алгоритм построения  $n_k$ : Берем  $m_1$ , при  $k > K_1$  выбираем наименьшее значение  $m_l$

Обозначим  $n_1 = 1, n_2 = l$ . Аналогично запускаем выше проделанное наблюдение

$\exists K_1$  при  $k > K_1 : m_i \neq m_l$ , берем наименьшее значение  $m_i$ , обозначим  $n_2 \dots$

• 3  $\Rightarrow$  1

Может ли  $K$  быть неограниченно?

Тогда  $\forall n \exists x_n \in K : \|x_n\| > n$ . Возьмем шар радиусом  $n$  в нуле,  $K$  из него вылезает. Возьмем  $x_n$  за пределами шара и так при каждом  $n$ . Получили какую то последовательность. Но тут нет сходящейся подпоследовательности, потому что если  $x_n \rightarrow x$ , то  $\|x_{n_k}\| \rightarrow \|x\|$ , а у нас  $\|x_{n_k}\| \rightarrow +\infty \Rightarrow K$  — ограничено

Замкнуто ли  $K$ ? А что если  $\exists a$  — предельная точка  $K, a \notin K$

К предельной точке всегда можно подойти сколько угодно близко  $\Rightarrow \exists x_n \rightarrow a, x_n \in K$ . Любая подпоследовательность должна стремиться к  $a$ , но согласно секвенциальной компактности,  $a \in K$ , но у нас  $a \notin K \Rightarrow$  противоречие. Значит все предельные точки лежат в  $K$ .

□

*Примечание.* Утверждение 2 равносильно утверждению 3 в любом метрическом пространстве. Из 2 следует 1 по теореме о простейших свойствах компактов. Но из 1, к сожалению, не следует 2:

Рассмотрим интервал  $(0,1)$ . Он не компактен, ограничен и замкнут если мы его рассматриваем в себе (как самостоятельное пространство).



## 1.28 Эквивалентность определений Гейне и Коши

1) Определение на  $\varepsilon$ -языке, или по Коши:  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D \setminus \{a\} : \rho(x, a) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), A) < \varepsilon$ .

2) Определение на языке последовательностей, или по Гейне:  $\forall \{x_n\} : x_n \in D \setminus \{a\}, x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow A$ .

Теорема: определения предела отображения по Коши и по Гейне равносильны.

Доказательство:

Слева направо. Дано (1).

Берём  $x_n \rightarrow a, x_n \in D, x_n \neq a$ .  $f(x_n) \rightarrow A$ .

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \rho(f(x_n), A) < \varepsilon$ .

$\exists \delta > 0$  (из (1)),  $x_n \rightarrow a \Rightarrow \exists N \forall n > N \rho(x_n, a) < \delta \Rightarrow \rho(f(x_n), A) < \varepsilon$  (из (1)).

Справа налево. Пусть  $A$  - не есть предел по Коши:

Тогда  $\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D \ 0 < \rho(x, a) < \delta \ \rho(f(x), A) \geq \varepsilon$

$\delta = 1 \ \exists x_1 \dots \rho(f(x_1), A) \geq \varepsilon$

$\delta = \frac{1}{2} \ \exists x_2 \dots \rho(f(x_2), A) \geq \varepsilon$

$\delta = \frac{1}{n} \ \exists x_n \in D \ 0 < \rho(x_n, a) < \frac{1}{n} : \rho(f(x_n), A) \geq \varepsilon$

$x_n \in D \ x_n \neq a \ x_n \rightarrow a \ \rho(f(x_n), A) \not\rightarrow 0$ , то есть  $f(x_n) \not\rightarrow A$ . Противоречие.





## 1.29 Единственность предела, локальная ограниченность отображения, имеющего предел, теорема о стабилизации знака

Теорема: если  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$  и  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$ , то  $A = B$ .

Доказательство:

По Гейне. По единственности предела последовательности  $A = B$ .

Теорема: локальная ограниченность отображения, имеющего предел.

Пусть  $X$  и  $Y$  - метрические пространства,  $f : D \subset X \rightarrow Y$ ,  $a$  - предельная точка  $D$ ,  $A \in Y$ ,  $f(x) \rightarrow A$  при  $x \rightarrow a$ . Тогда  $\exists V_a$  точки  $a$ , что  $f$  ограничено в  $V_a \cap D$ .

Доказательство:

Для  $\varepsilon = 1$ :  $\exists U_a \forall x \in U_a \cap D f(x) \in B(a, 1)$ . Если  $a \in D$  увеличим радиус шара до  $R = \rho(f(x), A) + 1$ . (\*)

Тогда  $\forall x \in U_a \cap D f(x) \in B(A, R)$ .

Теорема: о стабилизации знака: Дано (\*). Тогда  $\forall L \neq A (L \in Y) \exists U_a f(x) \neq L$  при  $x \in U_a \cap D$ .

Доказательство:

Берём  $0 < \varepsilon < \rho(L, a) \exists U_a \forall U_a \cap D: \rho(f(x), A) < \varepsilon < \rho(L, a)$ , то есть  $f(x) \neq L$ ,  $f(x) > 0$  (для  $\mathbb{R}$ ).



### 1.30 Арифметические свойства предела отображений. Формулировка для $\mathbb{R}$ с чертой

Теорема: об арифметических свойствах предела в  $\mathbb{R}$ .  $X$  - метрическое пространство,  $D \subset X$ ,  $a$  - предельная точка  $D$ ,  $f, g : D \rightarrow Y$ ,  $A, B \in Y$ ,  $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ :  $f(x) \rightarrow A$ ,  $g(x) \rightarrow B$ ,  $\lambda(x) \rightarrow \lambda_0$  при  $x \rightarrow a$ . Тогда  $\lambda : D \rightarrow \mathbb{R}$ .

- 1)  $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm g(x) = A \pm B$ . 2)  $\exists \lim_{x \rightarrow a} \lambda(x)g(x) = \lambda_0 B$ . 3)  $\exists \lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = \|A\|$ . 4)

Для  $Y = \mathbb{R}$ , если  $B \neq 0$ , то  $\exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$ . Замечание: аналогичная теорема верна для  $Y = \mathbb{R}$  и/или  $X = \mathbb{R}$ . /возможно  $a, A, B, \lambda_0 = \pm\infty$ /. Тогда утверждения 1-4 верны, если правые части имеют смысл.

Доказательство:

- 3)  $x_n \rightarrow a$ ,  $x_n \neq a$ ,  $x_n \in D$  ?  $\|f(x_n)\| \rightarrow \|A\|$ . Да, так как  $f(x_n) \rightarrow A$  по Гейне.

- 4) ?  $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow \frac{A}{B}$ .  $x_n \rightarrow a$ , берём  $U_a$  из замечания  $\exists N \forall n > N x_n \in U_a$ .



### 1.31 Принцип выбора Больцано–Вейерштрасса

**Теорема.** Из всякой ограниченной последовательности  $\mathbb{R}^m$  можно извлечь сходящуюся подпоследовательность.

*Доказательство.* В силу ограниченности все члены последовательности принадлежат некоторому замкнутому кубу  $I$ . Поскольку  $I$  компактен, из этой последовательности можно извлечь подпоследовательность, имеющую предел, принадлежащий  $I$ .  $\square$

В матане как на войне



### 1.32 Сходимость в себе и ее свойства

**Лемма 1.** *Сходящаяся в себе последовательность ограничена.*

*Доказательство.*  $\{x_n\}$  сходится в себе, тогда  $\exists N$ , что  $\forall n, l > N$  будет  $\rho(x_n, x_l) < 1$ . То есть  $\rho(x_n, x_{N+1}) < 1$ .

Пусть  $b \in X$ . Тогда по неравенству треугольника  $\rho(x_n, b) < 1 + \rho(x_{N+1}, b)$ .

Пусть  $R = \max\{\rho(x_1, b), \dots, \rho(x_{N+1}, b), 1 + \rho(x_{N+1}, b)\}$ , тогда  $\rho(x_n, b) \leq R$  для всех номеров  $n$ .  $\square$

**Лемма 2.** *Если у сходящейся в себе последовательности есть сходящаяся подпоследовательность, то сама последовательность сходится.*

*Доказательство.* Пусть  $\{x_n\}$  сходится в себе и  $\exists x_{n_k} \rightarrow a$ .

Возьмём  $\varepsilon > 0$ . По определению предела  $\exists K \forall k > K: \rho(x_{n_k}, a) < \frac{\varepsilon}{2}$ , а по определению сходимости в себе  $\exists N \forall n, l > N: \rho(x_n, x_l) < \frac{\varepsilon}{2}$ .

Покажем, что найденное  $N$  - требуемое для  $\varepsilon$  из определения предела. Пусть  $n > N$ . Положим  $M = \max\{N + 1, K + 1\}$ , тогда  $n_M \geq n_{N+1} > n_N \geq N$  и, аналогично  $n_M > K$ . Следовательно,  $\rho(x_n, a) \leq \rho(x_n, x_{n_M}) + \rho(x_{n_M}, a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ .

В силу произвольности  $\varepsilon$  это означает, что  $x_n \rightarrow a$ .  $\square$

**Теорема 1.** *Во всяком метрическом пространстве любая сходящаяся последовательность сходится в себе.*

*Доказательство.* Обозначим  $\lim x_n = a$ . Тогда  $\exists N \forall n > N: \rho(x_n, a) < \frac{\varepsilon}{2}$ . Тогда  $\forall n, m > N: \rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, a) + \rho(a, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ . В силу произвольности  $\varepsilon$  это означает, что  $\{x_n\}$  сходится в себе.  $\square$

**Теорема 2.** *В  $\mathbb{R}^m$  любая сходящаяся в себе последовательность сходится.*

*Доказательство.* Пусть  $\{x^{(n)}\}$  - сходящаяся в себе последовательность в  $\mathbb{R}^m$ . По пункту 1 леммы она ограничена. По принципу выбора Больцано-Вейерштрасса из неё можно извлечь сходящуюся подпоследовательность, а тогда по пункту 2 леммы она сама сходится.  $\square$



### 1.33 Критерий Больцано-Коши для последовательностей и отображений

**Определение.**  $X$  — м. п.,  $X$  — полное  $\Leftrightarrow \forall \{x_n\}$  фундаментальная сходится в  $X$

**Теорема.** Пусть  $f : D \subset X \rightarrow Y$ ,  $Y$  — полное,  $a$  — предельная точка  $D$ :

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists V(a) \forall x_1, x_2 \in V(a) \rho(x_1, x_2) < \varepsilon$$

*Доказательство.*  $(\Rightarrow)$  Доказывается аналогично переходу от предела к сходимости к себе (по факту, это абсолютно тоже самое), т. е. достаточно записать определение и проявить волю к победе!

$(\Leftarrow)$  По Гейне. □

*Примечание.* Теорема записана для отображений в терминах окрестностей, для последовательностей утверждение тривиальнее в силу полноты образа отображения.



### 1.34 Теорема о пределе монотонной функции

**Теорема 1.** Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  и монотонная,  $a$  — предельная точка,  $D_1 = D \cup (-\infty; a)$  тогда:

1.  $f$  — возрастает и ограничено сверху на  $D_1 \Rightarrow \exists$  предел —  $f(x - a)$
2.  $f$  — убывает и ограничено снизу на  $D_1 \Rightarrow \exists$  предел —  $f(x - a)$

*Доказательство.* Положим  $A := \sup_{x \in D_1} f(x)$ . Осталось проверить  $f(x) \rightarrow A \in \mathbb{R}$ .

По техническому определению супремума  $\forall \varepsilon > 0 \exists x_1 \in D_1 : A - \varepsilon < f(x_1) \leq A$ . Берём  $\delta = a - x_1 \Rightarrow \forall x \in D_1 : a - \delta < x < a \Rightarrow x_1 < x < a$  отсюда в силу монотонности  $A - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq A$   $\square$



### 1.35 Теорема о замене на эквивалентную при вычислении пределов. Таблица эквивалентных

**Теорема.** Пусть  $X$  — м. п.,  $f, \hat{f}, g, \hat{g} : D \subset X \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$ ,  $x_0$  — предельная точка  $D$ ,  $f(x) \sim \hat{f}(x)$ ,  $g(x) \sim \hat{g}(x)$  при  $x \rightarrow x_0$ . Тогда справедливы следующие утверждения:

1.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \hat{f}(x)\hat{g}(x)$$

2. Если  $x_0$  — предельная точка области определения  $\frac{f}{g}$ ,  $g(x) \neq 0$  и  $\hat{g}(x) \neq 0$ , то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\hat{f}(x)}{\hat{g}(x)}$$

*Доказательство.* Доказывается, раскладывая обе функции по определению эквивалентных функций.  $\square$



### 1.36 Теорема единственности асимптотического разложения

**Теорема.** Пусть  $f, g_k : D \subset X \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0$  — предельная точка  $D$ ,  $\forall k \ g_{k+1} = o(g_k)$ ,  $\exists U(x_0) \forall k \ g_k \neq 0$  для  $x \in \dot{U}(x_0) \cap D$ . Если

$$f(x) = \sum_{k=0}^n c_k g_k + o(g_n)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n d_k g_k + o(g_n)$$

Тогда  $\forall k \ c_k = d_k$ .

*Доказательство.* Возьмём первый индекс, на котором соответствующие коэффициенты различаются и обозначим его за  $m$ , далее вычтем одно выражение из другого:

$$0 = (c_m - d_m)g_m + \sum_{k=m+1}^n (c_k - d_k)g_k + o(g_n) = (c_m - d_m)g_m + o(g_m) \Rightarrow 0 = (c_m - d_m) + \frac{o(g_m)}{g_m}$$

Отсюда, используя предельный переход, получаем, что такого индекса не существует, а значит все коэффициенты совпадают.  $\square$





### 1.37 Арифметические свойства непрерывных отображений, теорема о стабилизации знака

**Теорема 1.** (Арифметические свойства непрерывных отображений) Пусть  $f, g : D \subset X \rightarrow Y$  (нормированное пространство),  $x_0 \in D$ ,  $\lambda : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f, g, \lambda$  — непрерывны в  $x_0$ . Тогда  $f \pm g, \lambda f, \|f\|$  — непрерывны в  $x_0$ .

*Примечание.* Если к тому же  $g(x_0) \neq 0 \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)}$  — непрерывна в  $x_0$ .

*Доказательство.* Если  $x_0$  является изолированной точкой  $D$ , то всё выполняется, в противном случае пользуемся арифметическими свойствами предела и получаем аналогичный результат.  $\square$

**Теорема 2.** (О стабилизации знака) Пусть  $f : D \subset X \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in D$ ,  $f$  — непрерывна в  $x_0$  и  $f(x_0) \neq 0$ . Тогда  $\exists U(x_0) : \forall x \in U(x_0) \text{ sign}(x) = \text{sign}(x_0)$

*Доказательство.* Тривиально по определению предела.  $\square$



## 1.38 Непрерывность композиции и соответствующая теорема для пределов

**Теорема.** (о непрерывности композиции)

$$f : D \subset X \rightarrow Y, \quad g : E \subset Y \rightarrow Z, \quad f(D) \subset E,$$

$f$  — непрерывно в  $x_0 \in D$ ,  $g$  — непрерывно в  $f(x_0)$ ,

Тогда  $g \circ f$  непрерывно в  $x_0$

*Доказательство.* Воспользуемся определением непрерывности по Гейне:

Так как  $f$  — непрерывно в  $x_0$ , то выберем последовательность  $x_n$  такую, что  $x_n \rightarrow x_0$ ,  $x_n \in D$ ,  $x_n \neq x_0$ , тогда по определению непрерывности  $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ , при этом  $f(x_n) \in E$ ,  $f(x_n) \neq f(x_0)$ . Так как  $g$  — непрерывно, то по определению получаем  $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(x_0))$   $\square$

**Теорема.** (о пределе композиции)

$$f : D \subset X \rightarrow Y, \quad g : E \subset Y \rightarrow Z, \quad f(D) \subset E$$

1.  $a$  — предельная точка  $D$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ ,

2.  $A$  — предельная точка  $E$ ,  $\lim_{y \rightarrow A} g(y) = B$ ,

3.  $\exists U(a) : f(x) \neq A$  в этой окрестности,

Тогда  $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B$

*Доказательство.* Воспользуемся определением предела отображения по Гейне:

Так как  $f$  имеет предел в  $x_0$ , то выберем последовательность  $x_n$  такую, что  $x_n \rightarrow a$ ,  $x_n \in D$ ,  $x_n \neq a$ , тогда по определению предела  $y_n = f(x_n) \rightarrow A$ , при этом  $y_n \in E$ ,  $y_n \neq A$ , тогда, так как  $g$  имеет предел в точке  $A$ , то  $g(y_n) \rightarrow B$   $\square$

*Примечание.*

$$f : D \subset X \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad x \mapsto \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)\},$$

Тогда  $f$  — непрерывно в  $x_0$  (или на  $E \subset D$ )  $\Leftrightarrow \forall i \quad f_i$  — непрерывно

*Доказательство.* По принципу покоординатной сходимости:

$x^{(n)}$  — последовательность в  $\mathbb{R}^m$ ,  $a \in \mathbb{R}^m$

$x^{(n)} \rightarrow a \Leftrightarrow \forall i = 1 \dots m \quad x_i^{(n)} \rightarrow a_i$

$f$  — непрерывно в  $x_0 \Leftrightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} \forall x^{(n)} \rightarrow x_0 \\ x^{(n)} \in D \\ x^{(n)} \neq x_0 \end{array} \right\} \Rightarrow f(x^{(n)}) \rightarrow f(x_0)$$

Тогда  $\forall i \quad f_i(x^{(n)}) \rightarrow f_i(x_0)$   $\square$



### 1.39 Теорема о топологическом определении непрерывности

**Теорема.**  $Y$  — метрическое пространство,  $f: X \rightarrow Y$

Тогда  $f$  непрерывно на  $X$  тогда и только тогда, когда для любого открытого  $G \subset Y$ ,  $f^{-1}(G)$  — открытое в  $X$

*Доказательство.* ( $\Rightarrow$ ) Если  $f^{-1}(G) = \emptyset$ , то оно открытое, что и надо. Иначе пусть  $x_0 \in f^{-1}(G)$ ,  $f(x_0) = y \in G$ , тогда, так как  $G$  — открытое,  $\exists V(y) \subset G$ . Тогда по определению непрерывности  $f$  в точке  $x_0$  для  $V(y)$   $\exists U(x_0): \forall x \in U(x_0) \quad f(x) \in V(y)$ , то есть  $\forall x_0 \quad U(x_0) \subset f^{-1}(V(y)) \subset f^{-1}(G)$ , тогда  $f^{-1}(G)$  — открытое

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $f(x_0) = y$ , тогда  $\forall V(y)$  — открытое множество.  $\Rightarrow f^{-1}(V(y))$  — открытое и содержит  $x_0$ . То есть  $\exists U(x_0) \subset f^{-1}(V(y))$ , тогда  $\forall x \in U(x_0) \quad f(x) \in V(y)$ , значит  $f$  — непрерывно.  $\square$



## 1.40 Теорема Вейерштрасса о непрерывном образе компакта. Следствия

**Теорема.** (Теорема Вейерштрасса)

$X, Y$  — метрические пространства,  $f : X \rightarrow Y$ ,  $f$  — непрерывно на  $X$

Тогда если  $X$  — компактное множество, то  $f(X)$  — тоже компактное.

*Доказательство.* Пусть  $f(X) \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ , где  $G_\alpha$  — открыто в  $Y$ . По теореме о топологическом определении непрерывности  $\forall \alpha \quad f^{-1}(G_\alpha)$  — открытое множество. Тогда  $X \subset \bigcup_{\alpha \in A} f^{-1}(G_\alpha)$ . Так как  $X$  — компакт, то существует конечный набор  $\alpha_1 \dots \alpha_n$  :  $X \subset \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(G_{\alpha_i})$ . Тогда  $f(X) \subset \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i} \Rightarrow f(X)$  — компакт.  $\square$

*Следствие.* 1. Непрерывный образ компакта замкнут и ограничен.

2. **1 теорема Вейерштрасса.**

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  — непрерывна на  $[a, b]$ , тогда  $f$  — ограничена.

3.  $X$  — компактно,  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  — непрерывна на  $X$ , тогда  $\exists \max f(x), \min f(x)$

*Доказательство.* По теореме  $f(X)$  — компактно, значит  $f$  замкнута в  $\mathbb{R}$ . Тогда  $\sup f(x) \in f(X) \Rightarrow \max f(X) = \sup f(X)$   $\square$

4. **2 теорема Вейерштрасса.**

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  — непрерывна на  $[a, b] \rightarrow \exists \max f(x), \min f(x)$



## 1.41 Теорема о вписанном $n$ -угольнике максимальной площади

**Теорема.** Пусть дана окружность фиксированного радиуса  $R$ . Тогда для любого  $n$  наибольшим по площади вписанным  $n$ -угольником будет правильный многоугольник.

*Доказательство.* Пусть какие-либо две соседних стороны не равны. Тогда заменим их на отрезки к самой далекой от хорды точке окружности (то есть сделаем эти отрезки равными). При этом площадь многоугольника вырастет. Таким образом, мы доказали, что не бывает площади многоугольника больше, но теперь надо проверить, достигается ли максимум. Рассмотрим площадь многоугольника как функцию от вектора центральных углов треугольника.

$$S(x) = S(\alpha_1 \dots \alpha_n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} R^2 \sin \alpha_i,$$

где  $0 \leq \alpha_i \leq \pi$ ,  $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 2\pi$ . При этом данная функция непрерывна по теоремам об арифметических свойствах и композиции непрерывных функций ( $\alpha \mapsto \sin \alpha \mapsto \frac{1}{2} R^2 \sin \alpha \mapsto \sum \frac{1}{2} R^2 \sin \alpha$ ). Заметим, что множество векторов-аргументов ограничено (очевидно) и замкнуто (все ограничения на  $\alpha$  либо равенства, либо нестрогие неравенства). Тогда оно компактно. По следствию из теоремы Вейерштрасса функция, непрерывная на компакте, имеет максимум.  $\square$



## 1.42 Лемма о связности отрезка

**Определение.** Множество  $A \subset X$  — связное, если его нельзя представить в виде объединения двух непересекающихся открытых множеств.

**Лемма 1.** Пусть  $\langle a, b \rangle \subset \mathbb{R}$ .  $\langle a, b \rangle$  — связное множество, то есть не существует открытых в  $\mathbb{R}$ , непустых и непересекающихся  $G_1, G_2$  таких, что  $\langle a, b \rangle \subset G_1 \cup G_2$ ,  $\langle a, b \rangle \cap G_1$  и  $\langle a, b \rangle \cap G_2$  — непустые.

*Доказательство.* Пусть  $\alpha \in \langle a, b \rangle \cap G_1, \beta \in \langle a, b \rangle \cap G_2$ . Не умаляя общности пусть  $\alpha < \beta$ . Пусть  $t = \sup \{x : [\alpha, x) \subset G_1\}$ . Заметим, что это множество непустое (так как  $G_1$  — открытое, то  $\exists U(\alpha) \subset G_1$ , значит есть значения больше  $\alpha$ ) и ограниченное ( $x \in G_1, G_1 \cap G_2 = \emptyset \Rightarrow x < \beta$ ), поэтому супремум существует. При этом  $t \in [\alpha, \beta)$ , а значит  $t \in \langle a, b \rangle$ . Если  $t \in G_1$ , тогда, так как  $G_1$  — открытое,  $\exists U(t) \subset G_1$ , что противоречит тому, как было выбрано  $t$ . Если  $t \in G_2$ , тогда  $\exists U(t) \subset G_2$ . Тогда не весь промежуток  $[\alpha, \beta)$  попадает в  $G_1$ . Значит существует точка на  $\langle a, b \rangle$ , которая не покрывается ни одним из отрезков.  $\square$



## 1.43 Теорема Больцано–Коши о промежуточном значении

Теорема (Больцано–Коши о промежуточ. значении)

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , непрерывна на  $[a, b]$ ,  $f(a) \neq f(b)$


Тогда  $\forall t$  между  $f(a)$  и  $f(b)$   $\exists x \in (a, b) : f(x) = t$ .

Доказ.  $[a, b] = f^{-1}(-\infty, t) \cup f^{-1}(t, +\infty)$ .  
откр. откр.

Зам. Т.обр. Если непрерывная функция принимает какое-то значение, то она принимает и все значения между ними.



## 1.44 Теорема о бутерброде



Доказательство:

Лемма:

$A \subset R^2$ ,  $V$  - произвольный вектор. Тогда ∃ прямая с направлением вектора  $V$ , делящая фигуру на части одинаковой площади.

Доказательство Леммы:

Пусть  $A \subset [a, b] \times [c, d]$ . Не уводя общности пусть  $[a, b] \parallel V$ . Где  $[a, b]$  - часть оси  $OX$ . Рассмотрим координату на оси  $OX \forall t f(t) = S_l(t) - S_r(t)$   $f(a) = -S$ , а  $f(b) = S$ .  $f$  - непрерывна:  $|f(t_1) - f(t_2)| \leq 2 * \text{площадь слоя фигуры между } t_1 \text{ и } t_2 \leq 2 * (d - c) * |t_1 - t_2|$ . По теореме Больцано-Коши о промежуточном значении  $\exists t_0 : f(t_0) = 0$

Доказательство Теоремы:

$\forall \phi \in [0, 2 * \pi]$  построим по лемме прямую направленную под углом  $\phi$  к оси  $OX$ . Она делит  $A$  на равновеликие части.  $g(\phi) = S_l^B(\phi) - S_r^B(\phi)$ . (Площади фигуры  $B$ ).

1 утверждение (очевидное) (для получения периодичности)

$$g(\phi + \pi) = -g(\phi)$$

2 утверждение ( $g$  - непрерывно)

$g(\phi_1) - g(\phi_2) \leq 4 * 1/2 * d^2 * |\sin(\phi_1 - \phi_2)|$ , где  $d$  - диагональ стола. По теореме Больцано-Коши о промежуточном значении все получается.





## 1.45 Теорема о сохранении промежутка

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , непрерыв.

Тогда  $f((a, b))$  — промежуток.

Доказ.  $m := \inf_{(a, b)} f$ ,  $M := \sup_{(a, b)} f$

Дост. проверить  $(m, M) \subset f((a, b))$

$\forall t \in (m, M) \quad ? \exists x : f(x) = t$

Если нет, то  $f^{-1}(-\infty, t) \cap (m, M)$ ,  $f^{-1}(t, +\infty) \cap (m, M)$

— два непересекающихся

мн-ва точек в отрезке  $(m, M)$ .

→ но  $\sup, \inf$

□

Зам. Вид промежутка не сохраняется.

$\sin : (0, 2\pi) \rightarrow [-1, 1]$

$(0, \pi) \rightarrow (0, 1]$  и т.п.



### 1.46 Теорема Больцано–Коши о сохранении линейной связности

Определение: Пусть  $Y$  - метрическое пространство и  $E \subset Y$ .

$E$  - линейно связное если  $\forall A, B \in E \exists$  путь  $c : [a, b] \rightarrow E$  - непрерывный, такой что  $c(a) = A, c(b) = B$ .

Пример 1 - круг в  $\mathbb{R}^2$  - линейно связный потому что выпуклый.  
 $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$   
 $t \rightarrow A + t(B - A)$

Пример 2 -  $A \subset \mathbb{R}^2$   $A = (0 \times [-1, 1]) \cup \{(x, \sin \frac{1}{x}) : x \in \mathbb{R}, x \neq 0\}$

Теорема :

$X$  - линейное связное множество.  $f : X \rightarrow Y$  (на  $Y$  - сюръекция) - непрерывно.  
 Тогда  $Y$  - линейное связно.

Доказательство :

$A, B \in Y$  подберем  $U, V \in X : f(U) = A, f(V) = B$ ;

Соединим  $U$  и  $V$  путем  $c$  (т.е. возьмем  $c : [a, b] \rightarrow X, c(a) = U, c(b) = V$ ). Тогда композиция  $f$  и  $c$  соединяет точки  $A$  и  $B$ .



### 1.47 Описание линейно связных множеств в $\mathbb{R}$

Определение: Пусть  $Y$  - метрическое пространство и  $E \subset Y$ .

$E$  - линейно связное если  $\forall A, B \in E \exists$  путь  $c : [a, b] \rightarrow E$  - непрерывный, такой что  $c(a) = A, c(b) = B$ .

Пример 1 - круг в  $\mathbb{R}^2$  - линейно связный потому что выпуклый.

$$g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$t \rightarrow A + t(B - A)$$

Пример 2 -  $A \subset \mathbb{R}^2$   $A = (0 * [-1, 1]) \cup (x, \sin \frac{1}{2} : x \in \mathbb{R}, x \neq 0)$

Теорема :

В  $\mathbb{R}^1$  линейно связными множествами являются только промежутки.

Доказательство :

В утверждении спрятана  $\leftrightarrow$ .  $E$  - промежуток  $\rightarrow E$  - линейно связно. Очевидно.  $E$  - линейно связно.  $m = \inf E, M = \sup E$ . Проверим, что  $(m, M) \subset E$ . Пусть  $t \in (m, M)$ :  $t \notin E$ . Возьмем  $A \in E : A < t, B \in E : t < B$

Тогда  $\nexists$  пути из  $A$  в  $B$ . (Если бы существовал такой путь, то в некоторой точке  $d \in (a, b) : c(d) = t$ ).



## 1.48 Теорема о непрерывности монотонной функции. Следствие о множестве точек разрыва

### Теорема о непрерывности монотонной функции

Пусть  $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  монотонна. Тогда справедливы следующие утверждения.

1.  $f$  не может иметь разрывов второго рода.
2. Непрерывность  $f$  равносильна тому, что её множество значений - промежуток.

*Доказательство.* Пусть  $f$  возрастает (для других случаев доказывается аналогично).

1. Пусть  $x_0 \in (a, b)$ ,  $x_1 \in \langle a, b \rangle$ . Тогда  $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_0)$  для всех  $x \in (x_1, x_0)$ , поэтому  $f$  возрастает и ограничена сверху на  $\langle a, x_0 \rangle$ . По теореме о пределе монотонной функции существует конечный предел  $f(x_0-)$ , причём по теореме о предельном переходе в неравенстве  $f(x_1) \leq f(x_0-) \leq f(x_0)$ . Аналогично доказывается, что для любой точки  $x_0 \in \langle a, b \rangle$  существует конечный предел  $f(x_0+)$ , причём  $f(x_0) \leq f(x_0+) \leq f(x_2)$  для всех  $x_2 \in (x_0, b)$ .
2. Ввиду следствия, остаётся доказать только достаточность.  
Пусть  $f(\langle a, b \rangle)$  — промежуток. Докажем непрерывность  $f$  слева в любой точке  $x_0 \in (a, b)$  от противного. Пусть  $f(x_0-) < f(x_0)$  (мы уже доказали, что существует конечный левосторонний предел). Возьмём  $y \in (f(x_0-), f(x_0))$ . Тогда если  $a < x_1 < x_0$ , то  $y \in [f(x_1), f(x_0)]$ . Следовательно,  $y \in f(\langle a, b \rangle)$ , т.е.  $y$  - значение функции. С другой стороны

$$\forall x \in \langle a, x_0 \rangle \Rightarrow f(x) \leq f(x_0-) < y,$$

а

$$\forall x \in [x_0, b) \Rightarrow f(x) \geq f(x_0) > y,$$

т.е. функция не принимает значение  $y$ . Получаем противоречие. Т.е.  $f(x_0-) = f(x_0)$ . Аналогично  $f$  непрерывна справа в любой точке  $x'_0 \in \langle a, b \rangle$ .

## 1.49 Теорема о существовании и непрерывности обратной функции

### Теорема о существовании и непрерывности обратной функции

Пусть  $f \in C(\langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R})$ ,  $f$  строго монотонна,

$$m = \inf_{x \in \langle a, b \rangle} f(x), \quad M = \sup_{x \in \langle a, b \rangle} f(x).$$

Тогда справедливы следующие утверждения.

1.  $f$  обратима,  $f^{-1} : \langle m, M \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$  - биекция.
2.  $f^{-1}$  строго монотонна одноимённо с  $f$ .



3.  $f^{-1}$  непрерывна.

*Доказательство.* Пусть для определённости  $f$  строго возрастает.

Если  $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ ,  $x_1 < x_2$ , то  $f(x_1) < f(x_2)$ ; следовательно,  $f$  обратима. По теореме о сохранении промежутка  $f(\langle a, b \rangle) = \langle m, M \rangle$ . По общим свойствам обратного отображения  $f^{-1}$  – биекция  $\langle m, M \rangle$  и  $\langle a, b \rangle$ .

Докажем, что  $f^{-1}$  строго возрастает. Если  $y_1, y_2 \in \langle m, M \rangle$ ,  $y_1 < y_2$ , то  $y_1 = f(x_1)$ ,  $y_2 = f(x_2)$ , где  $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ ,  $x_1 = f^{-1}(y_1)$ ,  $x_2 = f^{-1}(y_2)$ . При этом  $x_1 < x_2$ , так как возможность  $x_1 \geq x_2$  исключена в силу строгого возрастания  $f$ .

Возрастающая функция  $f^{-1}$  задана на промежутке  $\langle m, M \rangle$ , а её множество значений – промежуток  $\langle a, b \rangle$ . По теореме о непрерывности монотонной функции она непрерывна.

## 1.50 Счетность множества рациональных чисел.

**Множество рациональных чисел счётно**

*Доказательство.* Обозначим

$$Q_+ = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}, \quad Q_- = \{x \in \mathbb{Q}\}$$

При всех  $q \in \mathbb{N}$  множество  $Q_q = \{\frac{1}{q}, \frac{2}{q}, \frac{3}{q}, \dots\}$  счётно. По теореме об объединении не более чем счётных множеств и  $Q_+ = \bigcup_{q=1}^{\infty} Q_q$  счётно. Очевидно, что  $Q_- \subset Q_+$ . Снова по той же теореме множество

$$\mathbb{Q} = Q_+ \cup Q_- \cup \{0\}$$

счётно.

## 1.51 Несчетность отрезка.

**Несчетность отрезка** Отрезок  $[0, 1]$  несчетен

*Доказательство.* Допустим противное: пусть отрезок  $[0, 1]$  счетен, т.е. все числа отрезка  $[0, 1]$  можно расположить в виде последовательности:

$$[0, 1] = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, \dots\}$$

Разобьем отрезок  $[0, 1]$  на три равных отрезка  $[0, \frac{1}{3}]$ ,  $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ ,  $[\frac{2}{3}, 1]$  и обозначим через  $[a_1, b_1]$  тот из них, который не содержит точки  $x_1$  (если таких два, то всё равно, какой). Далее разобьем отрезок  $[a_1, b_1]$  на три равных отрезка и обозначим через  $[a_2, b_2]$  тот из них, который не содержит  $x_2$  (если таких более одного, то всё равно, какой). Этот процесс продолжим неограниченно. В результате мы построим последовательность вложенных отрезков  $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ , причём  $x_n \notin [a_n, b_n]$  для любого  $n$ . По аксиоме о вложенных отрезках существует точка  $x^*$ , принадлежащая одновременно всем отрезкам  $[a_n, b_n]$ . Тем более,  $x^* \in [0, 1]$ . Но тогда  $x^*$  имеет номер:  $x^* = x_m$  при некотором  $m$ . По построению  $x^* \notin [a_m, b_m]$ , что противоречит принадлежности  $x^*$  всем отрезкам  $[a_n, b_n]$ .



436. Bin  $\sim [2, 1]$

BLE Bin  $A = 0110 \dots \mapsto \underbrace{0,0110 \dots}_{f(A)}$  <sup>-Zahl</sup>  
 <sub>6 gl. Cifere</sub>

$\left. \begin{matrix} 0,1000\dots \\ 0,0111\dots \end{matrix} \right\} \text{одна и та же}$   $B_{10} = \text{много кон. суммирование}$

$$a = a_1 \dots a_k \underbrace{000\dots}_1 \mapsto a_1 \dots a_k \underbrace{000\dots}_h(a)$$

$$\varphi: \text{Bin} \mapsto [0,1] \cup \text{Bin}_0$$

$$\varphi: a \mapsto \begin{cases} h(a) \in \text{Bin}_0, & \text{если } a - \text{н.с.н.м. сдв} \geq \text{ггн} \\ f(a) \in [0, 1] \end{cases}$$

## 1.53 Замечательные пределы

*Утверждение.* Из геом. соображений верно следующее неравенство  $\sin x < x < \tan x$  для  $0 < x < \pi/2$

### Замечательные пределы

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

*Доказательство.* Для  $0 < x < \pi/2$   $x < \tan x \Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$ , откуда по теореме о двух городских имеем замечательный предел.

.....

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

*Доказательство.* (Кохась взял кредит, док-во не требуется)

.....

3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

*Доказательство.* Положим  $t = \ln(1+x) \Rightarrow e^t = 1+x \Rightarrow x = e^t - 1 \Rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

Подстановка  $t$  справедлива по пределу композиции, т. к.  $\ln(1+x)$  непрерывная функция

.....

4.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

*Доказательство.*  $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} \rightarrow e^1 = e$

.....

5.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

*Доказательство.* Положим  $f(x) = (1+x)^\alpha - 1 \Rightarrow \ln(f(x)+1) = \alpha \ln(1+x)$ . Тогда при  $x \rightarrow 0$  по двум замечательным пределам:

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \frac{f(x)}{x} = \frac{f(x)\alpha \ln(1+x)}{x \ln(f(x)+1)} = \frac{f(x)}{\ln(f(x)+1)} \cdot \alpha \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1 \cdot \alpha \cdot 1 = \alpha$$



## 1.54 Равносильность двух определений производной. Правила дифференцирования.

Пусть функция  $f$  действует из отрезка  $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in (a, b)$ .

### Определение производной №1

Если  $\exists A \in \mathbb{R} : f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0), x \rightarrow x_0$ , тогда  $f$  - дифф. в  $x_0$ , а  $A$  - производная в этой точке.

### Определение производной №2

Если  $\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = A \in \mathbb{R}$ , тогда  $f$  - дифф. в  $x_0$ , а  $A$  - производная в этой точке.

### Эквивалентность определений

Определение №1 эквивалентно определению №2.

*Доказательство.*

$$(1) \Leftrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A + \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} \Leftrightarrow \left( \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} = 0 \right) \Leftrightarrow (2)$$

### Правила дифференцирования

Пусть функции  $f, g$  действуют из отрезка  $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in (a, b)$ , дифф. в  $x_0 \Rightarrow \varphi$  дифф. в  $x_0$  и справедливо:

1.  $\varphi'(x_0) = (f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$  *Доказательство.* По определению.

2.  $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \varphi'(x_0) = (\alpha f(x_0))' = \alpha f'(x_0)$

*Доказательство.* По определению.

3.  $\varphi'(x_0) = (fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$  *Доказательство.*

$$\begin{aligned} (fg)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f \Delta g}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g \Delta f}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta g = \\ &= f \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta x} + g \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta g = fg' + gf' + f' \cdot 0 = f'g + fg'. \end{aligned}$$

(optional)

$$\begin{aligned} (f(x) \cdot g(x))' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(f(x) \cdot g(x))}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) \cdot g(x + \Delta x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x) + \Delta f(x)) \cdot (g(x) + \Delta g(x)) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot g(x) + g(x) \cdot \Delta f(x) + f(x) \cdot \Delta g(x) + \Delta f(x) \cdot \Delta g(x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x) \cdot \Delta f(x) + f(x) \cdot \Delta g(x) + \Delta f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x) \cdot \Delta f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta g(x) = \\ &= g(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} + f(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} + f'(x) \cdot 0 = \\ &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \end{aligned}$$





$$4. \ g(x_0) \neq 0 \Rightarrow \varphi'(x_0) = \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) \cdot g(x) - g(x+\Delta x) \cdot f(x)}{\Delta x \cdot g(x+\Delta x) \cdot g(x)} = \\ &= \frac{1}{g^2(x)} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x) + \Delta f(x)) \cdot g(x) - (g(x) + \Delta g(x)) \cdot f(x)}{\Delta x} = \\ &= \frac{1}{g^2(x)} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot g(x) + g(x) \cdot \Delta f(x) - f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} = \\ &= \frac{1}{g^2(x)} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x) \cdot \Delta f(x) - f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} = \\ &= \frac{1}{g^2(x)} \cdot \left( g(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} - f(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} \right) = \\ &= \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)} \end{aligned}$$

Доказательство.



## 1.55 Дифференцирование композиции и обратной функции

Теорема (прообразная обр. функц.)

$f \in (a, b)$ , строго монот., дифер. в  $x$ ,

$f'(x) \neq 0$ . Тогда  $f^{-1}$  - дифер. в  $f(x)$

$$\text{и } (f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}.$$

Зам. 1) Строгая монот. + непрерыв.  $\Rightarrow \exists f^{-1}$

2) Если бы знали, что  $f^{-1}$  - дифер. в  $f(x)$

то ф-ла очевидна:

$$f \circ f^{-1} = \text{id} \quad f^{-1}(f(x)) = x$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$



Док. Свойство:

$$k = f(x+h) - f(x) \quad y = f^{-1}(y)$$

$$h = f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y) = \tau(k) \rightarrow \text{при } k \rightarrow 0 \quad \tau(k) \rightarrow 0 \text{ по непрерыв. } f^{-1}$$

$$\frac{f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y)}{k} = \frac{\tau(k)}{f(x+\tau(k)) - f(x)} \rightarrow \frac{1}{f'(x)}$$

Зам.



$$f'(x) = \tan \alpha$$



$$(f^{-1})'(y) = \text{изм. к-во арг.} = \tan(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cot(\alpha) = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{f'(x)}$$

4) Прямая ф-ла

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

Пример:  $f(x) = 5^x$

## 1.56 Теорема о свойствах показательной функции

Покажем что  $f(a) = (a_{x_1})^{x_1} \cdot (a_{x_2})^{x_2} \cdot \dots \cdot (a_{x_n})^{x_n}$

Опред: Показат. функция  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 это не тривиальное решение (\*)

Th 1:  $f$  - показ. функция. Тогда:

- 1)  $\forall x \in \mathbb{R}: f(x) > 0, f(0) = 1$
- 2)  $\forall z \in \mathbb{Q} \quad \forall x \in \mathbb{R}: f(zx) = (f(x))^z$
- 3)  $f$  - строго монот., точнее: число  $a = f(1)$ . Тогда  $a \neq 1$   
 при  $a > 1$  -  $f$  - строго возр.  
 $a < 1$  -  $f$  - строго убыв.
- 4) Можно з.н.  $f = (0; +\infty)$
- 5) Пусть  $\tilde{f}$  - еще одна показ. фр.  
 $f(1) = \tilde{f}(1)$ . Тогда  $f \equiv \tilde{f}$

Доказ-во: 1)  $f \neq 0 \quad \exists x_0: f(x_0) \neq 0$



**1.57** Выражение произвольной показательной функции через экспоненту. Два следствия

В матане как на войне



## 1.58 Показательная функция от произведения

В матане как на войне



### 1.59 Теорема Ферма (с леммой)


В математике как на войне



## 1.60 Теорема Ролля. Вещественность корней многочлена Лежандра

Теорема Ролля

$f \in C[a, b]$ , дифф.  $(a, b)$   
 $f(a) = f(b)$  Тогда  $\exists \xi \in (a, b) f'(\xi) = 0$



Док.  $f$ -непр.  $\Rightarrow \exists \max f, \min f$   
 Т. Вейерштрасса

Если  $\max f$  и  $\min f$  достигаются на концах  $[a, b]$   
 то  $f = \text{const}$  тогда подходит любое  $\xi$ .

Если  $\exists \xi \in (a, b) f(\xi) = \max$  или  $\min \Rightarrow f'(\xi) = 0$   
 — Т. Ферма.

Пр. Пусть  $L_n(x) = \left( (x^2 - 1)^n \right)^{(n)}$  (н.д. — производная)  
 — многочлен степени  $n$ . (многочлен Лежандра)

Тогда  $L_n(x)$  имеет  $n$  вещ. корней на  $(-1, 1)$ .  
 разл.

$f$  — многочлен  
 $f(a) = 0$   
 $f = (x-a)g(x)$



### 1.61 Теоремы Лагранжа и Коши. Следствия об оценке приращения и о пределе производной

**Теорема Лагранжа.** Пусть функция  $f$  непрерывна на  $[a, b]$  и дифференцируема на  $(a, b)$ . Тогда найдётся такая точка  $c \in (a, b)$ , что

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

**Теорема Коши.** Пусть функции  $f$  и  $g$  непрерывны на  $[a, b]$  и дифференцируемы на  $(a, b)$ ,  $g'(x) \neq 0$  для любого  $x \in (a, b)$ . Тогда найдётся такая точка  $c \in (a, b)$ , что

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

**Замечание.** Теорема Лагранжа - частный случай теоремы Коши, где  $g(x) = x$ . Поэтому достаточно доказать теорему Коши.

*Доказательство* теоремы Коши. Заметим, что  $g(a) \neq g(b)$ , так как иначе по теореме Ролля нашлась бы точка  $t \in (a, b)$ , в которой  $g'(t) = 0$ . Положим  $h = f - Kg$ , где  $K = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ , т.е.  $h(a) = h(b)$ . Тогда  $h$  удовлетворяет условиям теоремы Ролля. Поэтому найдётся такая точка  $c \in (a, b)$ , что  $h'(c) = 0$ , т.е.  $f'(c) = Kg'(c)$ . Что и требовалось доказать.

**Следствие. Оценка приращения функции.** Пусть функция  $f$  непрерывна на  $\langle a, b \rangle$ , дифференцируема на  $(a, b)$ , а число  $M > 0$  таково, что  $|f'(t)| \leq M$  для всех  $t \in (a, b)$ . Тогда для любых точек  $x$  и  $x + \Delta x$  из  $\langle a, b \rangle$

$$|f(x + \Delta x) - f(x)| \leq M|\Delta x|.$$





## 1.62 Теорема Дарбу. Следствия

Теорема (Дарбу)

 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  — непрерывнаТогда  $\forall C$  между  $f(a), f(b)$   $\exists c \in (a, b)$   $f(c) = C$ .Доказ.  $g(x) := f(x) - Cx$ ,  $x \in [a, b]$  Пусть  $f'(a) < f'(b)$ .

$$g' = f' - C \quad g'(a) < 0 \quad g'(b) > 0$$

Пусть  $c$  — точка минимума  $g$   $C \neq a, C \neq b$   
по лемме

$$\Rightarrow c \in (a, b) \quad g'(c) = 0$$

по т. Ферма

$$\text{т. е. } f(c) - C = 0$$

с.т.д.

Сл. 1.  $f$  — дифференцируемаТогда  $f'([a, b])$  — промежуток.Сл. 2.  $f'$  не может иметь разрывов I родаПусть  $\exists A = f'(x_0+0) \neq f'(x_0-0) = B$ , пусть  $A < B$ тогда  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$   $f'(x) \approx A$  при  $x \in (x_0, x_0 + \delta)$   $f'(x) \approx B$ 

### 1.63 Формула Тейлора с остатком в форме Пеано

Пусть в точке  $x_0$  функция  $f(x)$  имеет производную  $n$ -го порядка,  $P_n(x)$  - её многочлен Тейлора степени  $n$  в точке  $x_0$  ( $n \geq 1$ ).  $f(x) = P_n(x) + o(x - x_0)^n$ , при  $x \rightarrow x_0$

**Доказательство.**

Напомним **основное свойство многочлена Тейлора**: Функция  $f(x)$  и её многочлен Тейлора  $P(x)$  степени  $n$  в точке  $x_0$ , а так же все их производные до  $n$ -го порядка включительно имеют равные значения.

Обозначим  $R(x) = f(x) - P_n(x)$  Из основного свойства многочлена Тейлора следует  $R(x_0) = R'(x_0) = R''(x_0) = \dots = R^{(n)}(x_0) = 0$

Из непрерывности в точке  $x_0$  функций  $R(x), R'(x), \dots, R^{(n-1)}(x)$  следует, что:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} R'(x) = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} R^{(n-1)}(x) = 0$$

Нам надо доказать, что  $R(x) = o(x - x_0)$  при  $x \rightarrow x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R(x)}{(x - x_0)^n} = 0$

Применим  $n - 1$  раз правило Лопиталья:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R(x)}{(x - x_0)^n} &= \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R''(x)}{n(n-1)(x - x_0)^{n-2}} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \\ &= \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R^{(n-1)}(x)}{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot (x - x_0)} = \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R^{(n-1)}(x) - R^{(n-1)}(x_0)}{(x - x_0)} = \\ &= \frac{1}{n!} (R^{(n-1)}(x_0))' = \frac{1}{n!} R^{(n)}(x_0) = 0 \end{aligned}$$

На последнем этапе мы получили по определению производную функции  $R^{(n-1)}(x)$  в точке  $x_0$ .  $\square$



## 1.64 Теорема о разложении рациональной функции на простейшие дроби

**Теорема 1.**  $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$  несократимая дробь,  $P, Q$  — многочлены, такие что степень многочлена  $P <$  степени многочлена  $Q$ , ( $\deg P < \deg Q$ )

$Q(x)$  разлагается на множители.

$Q(x) = (x - \alpha_1)^{k_1} \cdot (x - \alpha_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - \alpha_m)^{k_m}$ ,  $\alpha$  — вещественные

Тогда  $\exists A_1, \dots, A_{k_1}; B_1, \dots, B_{k_2}; \dots; D_1, \dots, D_{k_m} \in \mathbb{R}$ , где  $A, B, \dots, D$  — для каждого корня соответственно, такие что:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \left( \frac{A_1}{x - \alpha_1} + \frac{A_2}{(x - \alpha_1)^2} + \dots + \frac{A_{k_1}}{(x - \alpha_1)^{k_1}} \right) + \left( \frac{B_1}{x - \alpha_1} + \dots + \frac{B_{k_2}}{(x - \alpha_1)^{k_1}} \right) + \dots + \left( \frac{D_1}{x - \alpha_1} + \dots + \frac{D_{k_m}}{(x - \alpha_1)^{k_1}} \right) \quad (*)$$

*Доказательство.* Для  $\alpha_1$ :

$$Q(x) = (x - \alpha_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - \alpha_m)^{k_m}$$

$$\frac{P}{Q} = \frac{1}{(x - \alpha_1)^{k_1}} \cdot \frac{P}{Q_1}$$

$$Q_1^{(\alpha_1)} \neq 0 \Rightarrow \frac{P}{Q_1} \text{ — бесконечно дифференцируема в окрестности точки } \alpha_1 \text{ (из опыта}$$

дифференцируемости)

Воспользуемся формулой Тейлора:

$$x_0 = \alpha_1$$

$$\frac{P}{Q_1} = A_{k_1} + A_{k_1-1} \cdot (x - \alpha_1) + \dots + A_1 (k - \alpha_1)^{k_1-1} + A_0 (k - \alpha_1)^{k_1} + o((x - \alpha_1)^{k_1}), x \rightarrow \alpha_1$$

$$\frac{P}{Q} = \frac{A_{k_1-1}}{(x - \alpha_1)^{k_1}} + \dots + \frac{A_1}{x - \alpha_1} + A_0 + o(1), x \rightarrow \alpha_1$$

Аналогично получаем  $B, \dots, D$

Проверим, что равно предположению:

$$\frac{P}{Q} - (*) = \left( \frac{P}{Q} - \left( \frac{A_{k_1}}{(x - \alpha_1)^{k_1}} + \dots + \frac{A_1}{x - \alpha_1} \right) \right) - \left( \frac{B_1}{x - \alpha_1} + \dots \right) - \dots$$

Из этой разности при "упрощении выражения" сокращаются все множители знаменателя, значит останется многочлен (или константа)

$$\frac{P}{Q} - (*) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \text{это} \equiv 0$$

□



## 1.65 Формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа

**Теорема.**  $f \in C^n(a; b)$  - дифф.  $n$  раз на отрезке  $(a; b)$ ;  $(n+1)$  раз дифф. на  $(a; b)$ ;  $x_\alpha, x_0 \in (a; b)$

Тогда  $\exists c \in (x_0, x)$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \varphi(t) &:= f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k \\ \varphi'(t) &= -f'(t) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x - t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x - t)^{k-1} \\ &= -f'(t) - \left( -f'(t) + \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n \right) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n \\ \varphi(x_0) &= f(x) - T_n(f, x_0)(x) = R_n(f, x_0)(x) \\ \psi(t) &:= (x - t)^{n+1} \end{aligned}$$

По Т. Коши:  $\exists c$  :

$$\begin{aligned} \frac{-R_n}{-(x - x_0)^{n+1}} &= \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\psi(x) - \psi(x_0)} = \frac{\varphi'(c)}{\psi'(c)} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}}{-(n+1)(x - c)^n} \\ R_n &= \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \end{aligned}$$

□

## 1.66 Метод Ньютона

Находит приближённое решение уравнения

Так же называют метод Касательных.

Берём "хорошее" начало прикл.  $x_1$ . Какое для нас будет хорошее - выясним потом.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Оценим скорость сходимости.

Пусть  $\xi$  — это корень

$$\xi - x_{n+1} = \xi - x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{f(x_n) + f'(x_n)(\xi - x_n)}{f'(x_n)} \ominus - \text{в числителе кусок формулы}$$

тейлора. Напомним:  $f(\xi) = f(x_n) + f'(x_n)(\xi - x_n) + \frac{1}{2}f''(c)(\xi - x_n)^2$ ,  $c$  - между  $x_n$  и  $\xi$

$$\ominus - \frac{1}{2} \frac{f''(c)}{f'(x_n)} (\xi - x_n)^2$$

Пусть  $\max |f''| = M$ , а  $\min |f'| = m > 0$ ,

Теперь мы можем сказать, что



$$\begin{aligned}
|\xi - x_n + 1| &\leq \frac{M}{2m} - |\xi - x_n|^2 \leq \frac{M}{2m} \cdot \left(\frac{M}{2m} |\xi - x_{n-1}|^2\right)^2 \leq \left(\frac{M}{2m}\right)^{1+2} \cdot \left(\frac{M}{2m} |\xi - x_{n-2}|^2\right)^2 \leq \\
&\dots \leq \left(\frac{M}{2m}\right)^{1+2+4+\dots+2^{n-1}} \cdot |\xi \cdot x_1|^{2^n} = \frac{2m}{M} \cdot \left(\frac{M}{2m} |\xi - x_1|\right)^{2^n} \\
&\text{Теперь можем составить "хорошее" определение для } x_1: \\
&\frac{M}{2m} |\xi - x_1| < 1
\end{aligned}$$

## 1.67 Иррациональность числа $e^2$

**Теорема.**  $e^2$  - иррационально

*Доказательство.* От противного.

Пусть  $e = \frac{2k}{n}$  (м.б.  $n$  - чётно)

$$en = 2k \cdot e^{-1} \Rightarrow en \cdot (2k-1)! = (2k)!e^{-1}$$

$$e^1 = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{(2k-1)!} + \frac{e^c}{(2k)!} - \text{ по формуле Тейлора. } x_0 = 0, x = 1, 0 < c < 1$$

$$\text{Левая часть: } e(2k-1)! = n(2k-1)! \left( 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{(2k-1)!} \right) + \underbrace{\frac{n}{2k} \cdot e^c}_{\substack{\text{Целое число} \\ \frac{e^c}{e^2} = e^{c-2} < \frac{1}{e}}}$$

Получаем, что левая часть чуть больше целого числа.

Так же распишем  $e^{-1}$  используя ф. Тейлора  $x_0 = 0, x = -1, -1 < c_1 < 0$

$$e^{-1} = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{(2k)!} - \frac{e^{c_1}}{(2k+1)!}$$

$$\text{Правая часть: } (2k)! \left( \underbrace{1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{(2k)!}}_{\text{Целое число}} \right) - \underbrace{(2k)! \cdot \frac{e^{c_1}}{(2k+1)!}}_{\frac{e^{c_1}}{2k+1} < \frac{1}{3}}$$

Получилось, что правая часть чуть меньше целого

Получили противоречие, следовательно  $e^2$  - иррационально □

## 1.68 Следствие об оценке сходимости многочленов Тейлора к функции. Примеры

F

## 1.69 Критерий монотонности функции. Следствия

**Теорема.**

## 1.70 Теорема о необходимом и достаточном условиях экстремума

## 1.71 Теорема Кантора о равномерной непрерывности



## 2 Определения и формулировки

### 2.3 Упорядоченная пара

Упорядоченная пара — двухэлементное семейство, где множеством индексов является  $\{1,2\}$ .

Множество — набор различных элементов. Неопределяемое понятие.

Семейство — мультимножество, индексированное элементами другого множества

В матане как на войне



## 2.4 Декартово произведение

Декартовым или прямым произведением множеств  $X$  и  $Y$  называется множество всех упорядоченных пар, таких, что первый элемент пары принадлежит  $X$ , а второй —  $Y$ :

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$$

В матане как на войне



## 2.5 Аксиомы вещественных чисел

### I Аксиомы Поля

Множество  $R$  действительных чисел, в котором введены операции  $+$  и  $*$  и отношения порядка, если выполняются следующие аксиомы

- + 1. Коммутативность  $\forall a, b \in R : a + b = b + a$
- + 2. Ассоциативность  $(a + b) + c = a + (b + c)$
- + 3. Существование нейтрального элемента по сложению:  $\exists 0 : \forall a : a + 0 = a$
- + 4. Существование обратного элемента по сложению:  $\forall a \exists (-a) : a + (-a) = 0$

- 1. Коммутативность  $a \cdot b = b \cdot a$
- 2. Ассоциативность  $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
- 3. Существование нейтрального элемента по умножению:  $\exists 1 \neq 0 : \forall a : a \cdot 1 = a$
- 4. Существование обратного элемента по умножению:  $\forall x \neq 0 \exists x^{-1} : x \cdot x^{-1} = 1$

- + · 1. Дистрибутивность  $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$

*Примечание.* Нетривиальность поля  $1 \neq 0$

**Определение. Поле** — множество в котором введены операции "+" и "." удовлетворяющие I группе аксиом. Например,  $\mathbb{R}, \mathbb{Q}$

### II Аксиомы порядка

*Примечание.* На элементах должно быть введено отношение порядка :  $a \in x, b \in x \quad a < b$ ,  $<$  — неравенство

1. Рефлексивность:  $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$  или  $y \leq x$
2. Транзитивность:  $x \leq y, y \leq z \Rightarrow x \leq z$
3. Антисимметричность:  $x \leq y, y \leq x \Rightarrow x = y$
4. Связь сложения и порядка  $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$
5. Связь умножения и порядка  $0 \leq x, 0 \leq y \Rightarrow 0 \leq xy$

**Определение.** Поле, удовлетворяющие аксиомам I - II называется **упорядоченным полем**. Например,  $\mathbb{R}, \mathbb{Q}$  — упорядоченное поле,  $\mathbb{C}$  — нет.

*Упражнение.* Докажите что  $0 < 1$ , используя аксиомы I - II

(Если спросит - гугли. Есть в зориче, лучше прочитать заранее. Добавил док-во.)

Докажем, что  $(-1) * (-1) = 1$ .  $(-1) * (-1) + (-1) = (-1) * (-1) + (-1) * 1 = (-1) * ((-1) + 1) = (-1) * 0 = 0$ . Так как обратный элемент по сложению единственен, то  $(-1) * (-1) = 1$ . Теперь предположим, что  $1 \leq 0$ . Тогда  $1 \leq 0 \Rightarrow 0 \leq -1$ . Но так как  $0 \leq -1$  и  $0 \leq -1$ , то  $0 \leq (-1) * (-1) = 1$ , противоречие. Значит  $0 \leq 1$ . Так как по аксиоме  $1 \neq 0$ , то  $0 < 1$ .





*Примечание.*

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

**Луч:**  $[a, +\infty) = \{x : a \leq x\}$

Аксиома Архимеда и Полноты читать далее.

В матане как на войне



## 2.6 Аксиома Кантора, аксиома Архимеда

### III Аксиома Архимеда

$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad x > 0, y > 0 \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad nx > y$

*Следствие.* Существуют сколько угодно большие числа

*Пример.* Здесь был пример но он такой хуевый что мы его закомментировали. Оставь надежду всяк его читающий.

### Аксиома Кантора

Пусть у нас есть последовательность вложенных отрезков  $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3] \dots$ . Тогда для любой бесконечной последовательности вложенных отрезков их пересечение не пусто:  $\bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k] \neq \emptyset$

*Примечание.* Аксиома Кантора не выполняется для последовательности вложенных промежутков.  $\bigcap_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k) = \emptyset$

Например,  $(a_k, b_k) = (0, \frac{1}{k})$ . Тогда  $\bigcap_{k=1}^{\infty} = \emptyset$

*Доказательство.* От противного. Пусть существует  $\alpha > 0$  ( $\alpha \leq 0$  очевидно, не подходит), что  $\alpha \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (0, \frac{1}{k})$

$$\forall k : \alpha < \frac{1}{k}$$

$$\forall k : ak < 1$$

— Противоречие аксиоме Архимеда

□



## 2.7 Пополненное множество вещественных чисел, операции и порядок в нем

Операции над множествами

Пусть  $(x_n)_{\alpha \in A}$  — семейство множеств. Объединением семейства  $(x_n)_{\alpha \in A}$  называется множество всех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из множеств  $X_\alpha$ :

$$\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha = \{x : \exists \alpha \in A \quad x \in X_\alpha\}$$

Пусть  $(x_n)_{\alpha \in A}$  — семейство множеств. Пересечением семейства  $(x_n)_{\alpha \in A}$  называется множество всех элементов, которые принадлежат каждому из множеств  $X_\alpha$ :

$$\bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha = \{x : \forall \alpha \in A \quad x \in X_\alpha\}$$

Разностью множеств  $X$  и  $Y$  называется множество всех элементов, которые принадлежат  $X$ , но не принадлежат  $Y$ :

$$X \setminus Y = \{x : x \in X, x \notin Y\}$$

Дополнение множества:  $\bar{A} = A^c = \{x \in \mathbb{U} : x \notin A\}$ ,  $\mathbb{U}$  — универсум

$$A \setminus B = A \cap B^c$$

Пополненное множество вещественных чисел, операции и порядок в нем

Множество  $\bar{R} = R \cup \{-\infty, \infty\}$  называется расширенной числовой прямой. Множество  $E \subset R$  называется ограниченным сверху, если существует такое число  $M \in R$ , что  $x \leq M$  для всех  $x \in E$ . Число  $M$  называется верхней границей множества.

Множество  $E \subset R$  называется ограниченным снизу, если существует такое число  $m \in R$ , что  $x \geq m$  для всех  $x \in E$ . Число  $m$  называется нижней границей множества.

Множество  $E \subset R$  называется ограниченным, если оно ограничено и сверху, и снизу.

Пусть  $\bar{\mathbb{R}}$  — **расширенное множество** вещественных чисел.  $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$  — не поле, так как некоторые операции не определены

+	$x \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$\cdot$	$x > 0$	0	$+\infty$	$-\infty$
$y \in \mathbb{R}$	$x + y$	$+\infty$	$-\infty$	$y < 0$	$xy$	0	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$\odot$	$+\infty$	$+\infty$	$\odot$	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$\odot$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\odot$	$-\infty$	$+\infty$

*Примечание.*

$\odot$  — не определено

$\odot$  — тоже не определено, но уже чуть лучше потому, что в некоторых случаях можно доопределить (например площадь прямоугольника со сторонами  $\infty$  и 0 очевидно равна 0)

$\frac{0}{0}$  = неопределенность

$\frac{\infty}{\infty}$  = неопределенность

$0 * \infty$  = неопределенность

$\infty - \infty$  = неопределенность

$1^\infty$  = неопределенность

$0^0$  = неопределенность

$\infty^0$  = неопределенность

$-\infty < \infty$

$\infty * \infty = \infty$

$-\infty * \infty = -\infty$

$-\infty * -\infty = \infty$

$-\infty < X < \infty$

$x + x = 2x$



$$x + \infty = \infty$$

$$x - \infty = -\infty$$

$$\infty + \infty = \infty$$

$$-\infty - \infty = -\infty$$

$$x * x = x^2$$

$$x * \infty = \infty$$

$$x * (-\infty) = -\infty$$

В матане как на войне



## 2.8 Последовательность

**Последовательность** - частный случай отображения

$$\mathbb{N} \rightarrow Y$$

По натуральному номеру генерируем точку в пространстве

$$n \mapsto x_n$$

Числу  $n$  ставим в соответствие элемент из  $Y$  который называем  $x_n$ .

При желании можно считать последовательность функцией

Если выписать множество значений последовательности  $(x_1, x_2, x_3 \dots)$ ,

то можно воспринимать ее как список.

**Отображение** - Неопределяемое понятие.

Это тройка  $(X, Y, f)$ :

$X$  - область определения

$Y$  - множество на котором отображение принимает значения

$f$  - правило которое по элементам множества  $X$  генерирует элементы множества  $Y$

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x)$$

**Частные случаи отображения:**

- Последовательность

- Функция:

$$f : X \rightarrow \mathbb{R}$$

- Семейство:

$A$  - множество меток

$X$  - множество объектов

По каждой метке  $\alpha$  из  $A$  генерируем  $x_\alpha$

$$\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$$



## 2.9 Образ и прообраз множества при отображении

Пусть дано отображение  $f : X \rightarrow Y$ , тогда образом множества  $A \subset X$  под действием  $f$  называется

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

Прообразом множества  $B \subset Y$  относительно отображения  $f$  называется

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

В матане как на войне



## 2.10 Инъекция, сюръекция, биекция

Отображение  $f$  называется:

- Сюръекцией (отображением на):  
 $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$   
 $\Leftrightarrow f(X) = Y$   
 $\Leftrightarrow \forall y \in Y$  уравнение относительно  $x$ ,  $f(x) = y$  - имеет решение
- Инъекцией (отображением в):  
 $\forall x_1 \in X \forall x_2 \neq x_1 f(x_1) \neq f(x_2)$   
 $\Leftrightarrow \forall y \in Y$  уравнение  $f(x) = y$  имеет не более одного решения (относительно  $x$ )
- Биекцией:  
Если обладает свойствами инъективности и сюръективности  
 $\Leftrightarrow \forall y \in Y$  уравнение  $f(x) = y$  имеет ровно одно решение



## 2.11 Векторнозначная функция, ее координатные функции

Если отображение действует из  $X$  в  $\mathbb{R}^n$ , то его называют векторнозначной функцией  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$  - векторнозначная функция

$\mathbb{R}^n$  - декартово произведение  $n$  копий множества вещественных чисел  $\mathbb{R}$ , т.е. множество всевозможных наборов  $(y_1 \dots y_n)$ ,  $y_i \in \mathbb{R}$

Отображение переводит  $x$  в вектор  $f(x) \in \mathbb{R}^n$   
 $x \mapsto f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$

Вместе с этим появляются вспомогательные отображения  $f_i(x)$   
 $x \mapsto f_i(x) \in \mathbb{R}$  - координатная функция отображения  $f$

В матане как на войне





## 2.12 График отображения

Пусть дано отображение  $f : X \rightarrow Y$ , тогда графиком называется множество в декартовом произведении  $X \times Y$

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}$$

В матане как на войне



### 2.13 Композиция отображений

Композицией отображений  $f : U \rightarrow V$  и  $g : V \rightarrow W$  называется такое отображение  $h : U \rightarrow W$

$h = g \circ f$ , что  $\forall u \in U \quad h(u) = (g \circ f)(u) = g(f(u))$

В матане как на войне



## 2.14 Сужение и продолжение отображений

$F : X \rightarrow Y; A \subset X$

$F|_A : A \rightarrow Y$  — называется сужение на мн-во  $A$ :  $F : X \rightarrow Y; X \subset f(a)$  — множество  $A$

.....

$F : x \rightarrow Y; X \subset B$

Продолжение отображения  $f$  на множество  $B$  :

$\tilde{f} : B \rightarrow Y$

$\forall x \in X : \tilde{f}(x) = f(x)$

$\tilde{f}|_X = f$



## 2.15 Предел последовательности (эпсилон-дельта определение)

*Примечание.* "Дельта—это байт. Кто скажет Кохасю что в определении фигурирует дельта — тому бан.

**Определение.**  $(x_n)$  — последовательность в метрическом пространстве  $(X, q)$ ;  $a \in X$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N : q(a, x_n) < \varepsilon$$

*Примечание.* Чтобы не писать много обычно пишут  $q(a, x_n) \rightarrow 0$

*Примечание.* Если  $x_n$  - вещественная последовательность в  $\mathbb{R}$  с евклидовой нормой, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N : |x_n - a| < \varepsilon$$



## 2.16 Окрестность точки, проколота окрестность

**Определение.**  $(X, q)$  — метрическое пространство

$$a \in X, r > 0$$

$B(a, r) = \{x : q(a, x) < r\}$  — открытый шар

$B(a, r) = \{x : q(a, x) \leq r\}$  — закрытый шар.

$U(a) = B(a, \varepsilon)$  —  $\varepsilon$ -окрестность точки  $a$

$\dot{U}(a) = U(a) \setminus \{a\}$  — проколота  $\varepsilon$ -окрестность точки  $a$

В матане как на войне



## 2.17 Предел последовательности (определение на языке окрестностей)

**Определение.**  $(x_n)$  — последовательность в метрическом пространстве  $(X, q)$ ;  $a \in X$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\forall U(a) \exists N \forall n > N x_n \in U(a)$$

Вне любой окрестности точки  $a$  лежит конечное число членов последовательности



## 2.18 Метрика, метрическое пространство, подпространство

**Определение.** Метрика — это функция на парах элементов какого-либо множества, возвращающая расстояние между этими элементами. Пусть  $\rho(x, y)$  — метрика. Тогда она обладает следующими свойствами:

- $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$  (аксиома тождества)
- $\rho(x, y) = \rho(y, x)$  (аксиома симметрии)
- $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$  (неравенство треугольника)

**Определение.** Метрическое пространство — это пара из множества и метрики (метрика определена на парах элементов множества). То есть это множество различных элементов, между которыми можно найти расстояние с помощью заданной функции — метрики. ( $X$  — множество,  $\rho$  — метрика, то  $(X, \rho)$  — метрическое пространство)

**Определение.** Метрическое пространство  $(M, \rho_M)$  называется подпространством метрического пространства  $(X, \rho)$ , если  $M \subset X$  и  $\rho_M = \rho|_M$ .



## 2.19 Шар, замкнутый шар, окрестность точки в метрическом пространстве

**Определение.** Шар с центром в точке  $a$  радиуса  $r > 0$  — это множество всех точек, таких что расстояние от  $a$  до них меньше заданного  $r$ . То есть  $B(a, r) = \{x \in X : \rho(a, x) < r\}$

**Определение.**  $D(a, r)$  называют замкнутым шаром с центром  $a$  радиуса  $r$ , если  $r > 0$  и  $D(a, r) = \{x \in X : \rho(a, x) \leq r\}$

**Определение.** Окрестностью точки  $x_0$  в метрическом пространстве  $(X, \rho)$  называют шар  $B(x_0, \varepsilon)$ . То есть это множество точек  $Y \subset X$  такое что  $\forall y \in Y : \rho(x_0, y) < \varepsilon$





## 2.20 Линейное пространство

**Определение.** (Строгое определение) Линейное пространство — это упорядоченная четверка  $(V, F, +, \cdot)$ , где  $V$  — множество векторов,  $F$  — поле скаляров,  $+$  — определенная в пространстве операция сложения векторов,  $\cdot$  — определенная операция умножения векторов на скаляры

(По сути) Линейное пространство — это множество векторов и поле скаляров, на которых определены операции сложения векторов и умножения их на скаляры

Заданные операции  $+$  и  $\cdot$  должны удовлетворять следующим аксиомам:

- $x + y = y + x$  (коммутативность сложения)
- $x + (y + z) = (x + y) + z$  (ассоциативность сложения)
- $\exists 0 \in V : 0 \cdot x = 0$  (существование нейтрального элемента относительно сложения)
- $\forall \alpha, \beta \in F$  выполняется  $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$  (ассоциативность умножения на скаляр)
- $\forall x \in V$  выполняется  $1 \cdot x = x$  (умножение на нейтральный элемент поля  $F$  сохраняет вектор из  $V$ )
- $\forall \alpha, \beta \in F \forall x \in V$  выполняется  $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$  (дистрибутивность умножения относительно сложения скаляров)
- $\forall \alpha \in F \forall x, y \in V$  выполняется  $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$  (дистрибутивность умножения относительно сложения векторов)



## 2.21 Норма, нормированное пространство

**Определение.** Норма — это функция, которая каждому вектору сопоставляет число из  $\mathbb{R}$ .

$$\rho: V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

Норма обладает следующими свойствами (аксиомы нормированного пространства):

- $\rho(x) = 0 \Rightarrow x = 0$  ( $0 \in V$ )
- $\forall x, y \in V$  выполняется  $\rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$  (неравенство треугольника)
- $\forall \alpha \in \mathbb{C}, \forall x \in V$  выполняется  $\rho(\alpha x) = |\alpha| \rho(x)$

**Определение.** Нормированное пространство — это линейное пространство с заданной на нем нормой.

В нормированном пространстве  $d(x, y) = \|x - y\|$  определяет метрику.

Свойства метрики и связь с нормой:

- $d(x, y) = \|x - y\| = 0 \Rightarrow x = y$
- $d(x, y) = \|x - y\| = \|y - x\| = d(y, x)$
- $d(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y)$   
(неравенство треугольника)
- $d(x, y) = d(x + z, y + z)$  (инвариантность относительно сдвига)
- $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$  (положительная однородность)



## 2.22 Ограниченное множество в метрическом пространстве

**Определение.** Ограниченное множество в метрическом пространстве — это множество конечного диаметра. То есть:

Пусть  $(M, \rho)$  — метрика. Тогда множество  $X \subset M$  является ограниченным, если  $\exists$  шар  $U$  радиуса  $r > 0$  с центром  $0$  такой, что  $\forall x \in X : x \in U$ , то есть  $\rho(x, 0) < r$ . То есть существует какой-то шар, в котором уместятся все элементы множества.



## 2.23 Скалярное произведение

**Определение.**  $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$ , где  $X$  — линейное пространство над  $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ , называется скалярным произведением, если соблюдаются аксиомы 1-3

### Аксиомы скалярного произведения

1.  $\forall x_1, x_2, y \in X \ \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) : \langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y \rangle = \alpha_1 \langle x_1, y \rangle + \alpha_2 \langle x_2, y \rangle$
2. Симметричность (эрмитовость)  $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
3.  $\forall x \in X : \langle x, x \rangle \geq 0$  и  $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$



## 2.24 Максимум, верхняя граница, множество, ограниченное сверху

**Определение.** Число  $x \in A$  — называется максимальным элементом  $A$  (максимум  $A$ ):  
 $\forall a \in A : a \leq x$

**Определение.**  $M$  — верхняя граница  $A$ , если :  $\forall x \in A : x \leq M$

**Определение.** Множество  $A$  называется **ограниченным сверху**, если  $\exists M : \forall x \in A : x \leq M$

*Примечание.* Пусть  $A = (0, 1)$  (интервал). Максимальный элемент не существует



## 2.25 Внутренняя точка множества, открытое множество, внутренность

Пусть у нас есть  $(X, \rho)$  — метрическое пространство,  $\alpha \in X, D \subset X$

**Определение.**  $\alpha$  — **внутренняя** точка множества  $D$ , если  $\exists U(\alpha) : U(\alpha) \subset D$

$$\exists r > 0 : B(\alpha, r) \subset D$$

**Определение.**  $D$  — **открытое множество**, если  $\forall \alpha \in D : \alpha$  — внутренняя точка  $D$

*Пример.*

1.  $X$
2.  $\emptyset$
3.  $B(\alpha, r)$

*Доказательство.*  $x \in B(\alpha, r)$ , доказать:  $x$  — внутренняя точка. Возьмем  $R < r - \rho(\alpha, x)$ . Докажем, что  $B(x, R) \subset B(\alpha, r)$  Возьмем  $y \in B(x, R)$  :

$$\rho(y, \alpha) \leq \rho(y, x) + \rho(x, \alpha) < R + \rho(\alpha, x) < r \Rightarrow y \in B(\alpha, r)$$

□

**Определение.** Внутренность  $D : \text{Int}(D) = \{x \in D : x \text{ — внутренняя точка } D\}$

*Примечание.*

1.  $\text{Int}D$  — открытое множество
2.  $\text{Int}D = \bigcup_{\substack{D \supset G, \\ G \text{ — открыто}}} G$  — максимальное открытое множество содержащееся в  $D$
3.  $D$  — открыто в  $X \Leftrightarrow D = \text{Int}D$

## 2.26 Предельная точка множества

**Определение.**  $\alpha$  — **предельная точка** множества  $D$ , если:

$$\forall \dot{U}(\alpha) \quad \dot{U}(\alpha) \cap D \neq \emptyset$$

*Пример.* Пусть  $D = (0, 1)$   $X = \mathbb{R}$

$\alpha$	IsLimitPoint
-1	False, $B(-1, \frac{1}{2}) \cap D = \emptyset$
$\frac{1}{2}$	True, $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \subset D$
1	True, $B(1, \frac{1}{2}) \cap D = (\frac{1}{2}, 1)$



## 2.27 Замкнутое множество, замыкание, граница

**Определение.**  $D$  — замкнутое множество в  $X$ , если все предельные точки  $D$  лежат в  $D$ .

*Пример.*

- $\mathbb{N}$  в  $\mathbb{R}$  — замкнуто (нет предельных точек)
- $(0, 1)$  в  $\mathbb{R}$  — незамкнуто,  $1 \notin (0, 1)$  и  $1$  — предельная точка
- $X$  — одновременно и замкнуто, и открыто
- $\emptyset$  — одновременно и замкнуто, и открыто

**Определение.**  $D \subset X$ , тогда замыкание  $D$  :  $\overline{D} = D \cup (\text{предельные точки } D)$

*Примечание.*

1.  $a \in \overline{D} \Leftrightarrow \exists (x_n) : x_n \in D, x_n \rightarrow a$
2.  $\overline{D} = \bigcap_{\substack{F: F \text{ — замкнуто} \\ F \supset D}} F$  — мин. по включению замкнутое множество, содержащее  $D$
3.  $D$  — замкнуто  $\Leftrightarrow D = \overline{D}$

**Определение.** Граница  $D$  — множество граничных точек

*Пример.* Пусть у нас множество  $\mathbb{Q}$  в пространстве  $\mathbb{R}$ , граница  $\mathbb{Q} = \mathbb{R}$



## 2.28 Изолированная точка, граничная точка

**Определение.** Точка  $a$  называется изолированной точкой множества  $D$ , если существует такая выколота окрестность этой точки, которая в пересечении с  $D$ , даёт пустое множество, т. е. для  $a \in D \exists \dot{U}(a) : \dot{U}(a) \cap D = \emptyset$ .

**Определение.** Точка  $a$  называется граничной точкой множества  $D$ , если в  $\forall \mathcal{U}(a)$  найдётся точка как из  $D$ , так и не из  $D$ . Граница  $D$  - множество граничных точек.





## 2.29 Описание внутренней множества

Определение: точка  $a$  называется внутренней точкой множества  $D$ , если  $\exists \mathcal{U}(a) \subset D$

Определение: множество  $D$  называется открытым, если все его точки внутренние.

Определение: Множество всех внутренних точек множества  $D$  называется внутреннейностью  $D$ .

Upd: Внутренности множества — объединение всех открытых множеств, содержащихся в нашем множестве  $D$  или это наибольшее по включению открытое множество, содержащееся в  $D$



### 2.30 Описание замыкания множества в терминах пересечений

Определение: для  $D \in X$  замыканием называется такое  $\overline{D}$ , что  $\overline{D} = D \cup T$ , где  $T$  - множество предельных точек  $D$ .  $\overline{D}$  - замкнуто.

Замечание:

- 1)  $a \in \overline{D} \leftrightarrow \exists (x_n) : x_n \in D, x_n \rightarrow a$
- 2)  $\overline{D} = \bigcap F_i$ , где  $F_i$  - замкнуто и  $D \in F_i$ .
- 3)  $D$  - замкнуто  $\leftrightarrow D = \overline{D}$ .

Пересечение всех замкнутых множеств, содержащих наше множество  $D$  или это наименьшее по включению замкнутое множество, содержащее наше множество  $D$



### 2.31 Верхняя, нижняя границы; супремум, инфимум

Определение:  $E \in \mathbb{R}$ ,  $E \neq \emptyset$  - ограничена сверху:  $\exists M \forall x \in E: x \leq M$ .  $M$  - верхняя граница.

Определение:  $E \in \mathbb{R}$ ,  $E \neq \emptyset$  - ограничена снизу:  $\exists m \forall x \in E: x \geq m$ .  $m$  - нижняя граница.

Определение:  $E$  - ограничена сверху. Число  $b \in \mathbb{R}$  - супремум множества  $E$  ( $b = \sup(E)$ ), если  $b$  - наименьшая из верхних границ.

Определение:  $E$  - ограничена снизу. Число  $b \in \mathbb{R}$  - инфимум множества  $E$  ( $b = \inf(E)$ ), если  $b$  - наибольшая из нижних границ.



### 2.32 Техническое описание супремума

Определение:  $b = \sup E$ , если выполняется:

- 1)  $b$  - верхняя граница:  $\forall x \in E : x \leq b$
- 2)  $b$  - самая маленькая верхняя граница:  $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in E : b - \varepsilon < x$

В матане как на войне



### 2.33 Последовательность, стремящаяся к бесконечности

Определение: Последовательность, стремящаяся к бесконечности называется бесконечно большой

В матане как на войне



## 2.34 Определения предела отображения (3 шт)

$$\lim_{x \rightarrow a} x = A$$

1) Определение на  $\varepsilon - \delta$  -языке, или по Коши.

Для любого положительного числа  $\varepsilon$  существует такое положительное число  $\delta$ , что для всех точек  $x$  множества  $D$ , отличных от  $a$  и удовлетворяющих неравенству  $\rho_x(x, a) < \delta$ , выполняется неравенство  $0 < \rho_y(f(x), a) < \varepsilon$ :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : 0 < \rho_x(x, a) < \delta \Rightarrow 0 < \rho_y(f(x), a) < \varepsilon$$

2) Определение на языке окрестностей.

Для любой окрестности  $V_a$  точки  $A$  существует такая окрестность  $V_A$  точки  $a$ , что образ пересечения проколотой окрестности  $V_a$  с множеством  $D$  при отображении  $f$  содержится в окрестности  $V_A$

3) Определение на языке последовательностей, или по Гейне

Для любой последовательности  $x_n$  точек множества  $D$ , отличных от  $a$ , стремящейся к  $a$ , последовательность  $f(x_n)$  стремится к  $A$ :

$$\forall (x_n) : 1) x_n \rightarrow a \ 2) x_n \in D \ 3) x_n \neq a \implies f(x_n) \rightarrow A$$



### 2.35 Определения пределов в $R$ с чертой

Утверждение 2 из на прошлой странице прекрасно работает

Первое не подходит т.к. очень далеко.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = A$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \forall x \in D, x > \Delta |f(x) - A| < \varepsilon$$

В матане как на войне



### 2.36 Компактное множество

$K \subset X$  называется компактным если:  $\forall$  открытое покрытие

$$K \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_{\alpha}$$

$\exists$  конечный набор  $\alpha_i$  :

$$\bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i}$$

В матане как на войне





### 2.37 Секвенциальная компактность

Пространство называется секвенциально компактным, если из любой последовательности в нём можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

$K$  — секвенциально компактно. Это значит, что  $\forall (x_n) \in K \exists n_k$  — строго возрастающая последовательность номеров,  $\exists x \in K : x_{n_k} \rightarrow x$  (у любой последовательности имеется сходящаяся подпоследовательность, причем  $x$  тоже должен лежать в  $K$ )

В матане как на войне



### 2.38 Предел по множеству

$f : D \subset X \rightarrow Y, D_1 \subset D, x_0$  — пред. точка  $D_1$

Тогда **предел по множеству**  $D_1$  в точке  $x_0$  — это  $\lim_{x \rightarrow x_0} f|_{D_1}(x)$

В матане как на войне



## 2.39 Односторонние пределы

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow Y$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .

Если  $a$  — предельная точка множества  $D_1 = D \cap (-\infty, a)$ , то предел отображения  $f$  в точке  $a$  по множеству  $D_1$  называется **левосторонним пределом** отображения  $f$  в точке  $a$  и обозначается  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$  или  $f(a-0)$ .

Если  $a$  — предельная точка множества  $D_2 = D \cap (a, +\infty)$ , то предел отображения  $f$  в точке  $a$  по множеству  $D_2$  называется **правосторонним пределом** отображения  $f$  в точке  $a$  и обозначается  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$  или  $f(a+0)$ .



## 2.40 Конечная эpsilon-сеть

$(X, q)$  - м.п.,  $D \subset X$ .

Говорят, что множество  $D$  имеет конечную эpsilon-сеть (в  $X$ ), если  $\exists N \subset X$ ,  $N$  - конечное и  $N$  —  $\epsilon$ -сеть, т.е.  $\forall x \in D \exists y \in N : q(x, y) < \epsilon$ .

**Определение:**  $D \subset X$  называется **сверхограниченным**, если  $\forall \epsilon > 0$   $D$  имеет конечную эpsilon-сеть.

### Замечание:

1) Если  $D$  в  $X$  сверхограниченно, то и  $D$  в  $D$  сверхограниченно. В обе стороны.

Берем  $\epsilon/2$  сеть в  $X$ , пусть точки будут  $x_1, x_2, \dots$ .  $\forall i$  отметим в  $B(x_i, \epsilon/2)$  точку  $y_i$ . Тогда, докажем, что  $y_1, y_2, \dots$  конечная эpsilon-сеть в  $D$ .  $\forall z \in D \exists x_k : q(z, x_k) < \epsilon/2$ . Найдем расстояние от  $q(z, y_k) \leq q(z, x_k) + q(x_k, y_k) \leq \epsilon$ .

2)  $D$  сверхограниченно в  $X$ , тогда замыкание  $D$  тоже сверхограниченно в  $X$ .

3) Если  $D$  сверхограниченно, то  $D$  ограничено.



## 2.41 Теорема о характеристике компактных множеств в терминах $\epsilon$ -сетей

**Лемма:** Если  $D$  - свёрхограниченно, то любая последовательность точек в  $D$  содержит в себе фундаментальную подпоследовательность.

**Теорема:** Если  $X$  - компактно  $\Leftrightarrow X$  свёрхограниченно и полно.

**Замечание:** Если  $X$  - полно,  $D \subset X$ , то если  $D$  - компактно  $\Leftrightarrow D$  свёрхограниченно и замкнуто.

**Док-во:** Слева направо. Пусть  $X$  - не полное. Значит  $\exists (x_n)$  у которой нет фундаментальной подпоследовательности.



## 2.42 Непрерывное отображение (4 определения)

§ Непр.-отобр-я

Опр.  $f: D \subset X \rightarrow Y$   $x_0 \in D$   
 $f$ -непр. в точке  $x_0$  если (одно из четырех)

- ①  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  либо  $x_0$ -изол. точка  $D$   
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x: |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$
- ②  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x: \rho(x, x_0) < \delta \implies \rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$
- ③  $\forall U(f(x_0)) \exists V(x_0) \forall x \in V(x_0) \implies f(x) \in U(f(x_0))$
- ④  $\forall (x_n): x_n \rightarrow x_0$  выполняется  $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$   
 $x_n \in D$

Зам. 1)  $x_0$ -изол.  $\Rightarrow$  (2)-(4) все ок  
 2) Равносильность стр. очевидна

### 2.43 Непрерывность слева

Пусть  $Y$  — метрическое пространство,  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow Y$ ,  $x_0 \in D$ . Если сужение отображения  $f$  на множество  $E_1 = D \cap (-\infty, x_0]$ , ( $E_2 = D \cap [x_0, +\infty)$ ) непрерывно в точке  $x_0$ , то говорят, что отображение  $f$  непрерывно слева (справа) в точке  $x_0$ .

В матане как на войне



## 2.44 Разрыв, разрывы первого и второго рода

Разрыв. Точки, в которых нарушается условие непрерывности, называют точками разрыва функции.

Разрыв 1 порядка. Точка разрыва  $x_0$  называется точкой разрыва первого порядка, если существуют конечные односторонние пределы в этой точке.

Разрыв 2 порядка. Точка  $x_0$  называется точкой разрыва второго порядка, если она не является точкой разрыва первого рода (если хотя бы один из односторонних пределов не существует или равен  $+\infty$  или  $-\infty$ ).





### 2.45 О большое

Пусть  $X$  - метрическое пространство,  $D \subset X$ ,  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$ ,  $x_0$  - предельная точка  $D$ . Если существует функция  $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$  и окрестность  $V_{x_0}$  точки  $x_0$ , такие, что  $f(x) = \phi(x)g(x)$  для всех  $x \in V_{x_0} \cap D$ .

$\phi$  ограничена на  $V_{x_0} \cap D$ , то говорят, что функция  $f$  ограничена по сравнению с  $g$  при  $x \rightarrow x_0$ .



**2.46 о маленькое**

Пусть  $X$  - метрическое пространство,  $D \subset X$ ,  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$ ,  $x_0$  - предельная точка  $D$ . Если существует функция  $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$  и окрестность  $V_{x_0}$  точки  $x_0$ , такие, что  $f(x) = \phi(x)g(x)$  для всех  $x \in V_{x_0} \cap D$ .

$\phi \rightarrow 0$ , то говорят, что функция  $f$  бесконечная малая по сравнению с  $g$  при  $x \rightarrow x_0$ .



## 2.47 Эквивалентные функции, таблица эквивалентных

Пусть  $X$  - метрическое пространство,  $D \subset X$ ,  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$ ,  $x_0$  - предельная точка  $D$ . Если существует функция  $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$  и окрестность  $V_{x_0}$  точки  $x_0$ , такие, что  $f(x) = \phi(x)g(x)$  для всех  $x \in V_{x_0} \cap D$ .

$\phi \rightarrow 1$ , то говорят, что функция  $f$  и  $g$  эквивалентны при  $x \rightarrow x_0$ .  
 $\sin(x) \approx \arcsin(x) \approx \tan(x) \approx \arctan(x) \approx e^x - 1 \approx x$



## 2.48 Асимптотически равные (сравнимые) функции

**Определение.** Если  $f(x) = O(g(x))$  и  $g(x) = O(f(x))$  (при  $x \rightarrow x_0$  или  $x \in D$ ), то говорят, что функции  $f$  и  $g$  *сравнимы* (при  $x \rightarrow x_0$  или  $x \in D$  соответственно), и пишут  $f \asymp g$

## 2.49 Асимптотическое разложение

**Определение.** Пусть  $X$ –метрическое пространство,  $D \subset X$ ,  $x_0$ –предельная точка  $D$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  или  $\mathbb{C}$  и задана

конечная или счётная система функций  $\{g_k\}_{k=0}^N$  ( $N \in \mathbb{N}$ ) или  $\{g_k\}_{k=0}^\infty$ ,  $g_k : D \rightarrow \mathbb{R}$  или  $\mathbb{C}$ , каждая из которых бесконечно мала по сравнению с предыдущей при всех  $k \in [0 : N - 1]$  или  $k \in \mathbb{Z}_+$

$$g_{k+1}(x) = o(g_k(x)), \quad x \rightarrow x_0.$$

Большую роль в анализе играют асимптотические формулы вида

$$f(x) = \sum_{k=0}^n c_k g_k(x) + o(g_n(x)), \quad x \rightarrow x_0.$$

Это и есть асимптотическое разложение по заданной системе функций.

## 2.50 Наклонная асимптота графика

**Определение.** Пусть  $\langle a, +\infty \rangle \subset D \subset \mathbb{R}$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A, B \in \mathbb{R}$ . Прямая  $y = ax + b$  называется *наклонной асимптотой* графика функции  $f$  при  $x \rightarrow +\infty$ , если

$$f(x) = Ax + B + o(1), \quad x \rightarrow +\infty.$$

## 2.51 Путь в метрическом пространстве

**Определение.** Пусть  $Y$ –метрическое пространство,  $E \subset Y$ . Непрерывное отображение отрезка в множество  $E$ :

$$\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow E$$

называется *путём* в  $E$ . Точка  $\gamma(a)$  называется началом,  $\gamma(b)$  – концом пути.

## 2.52 Линейно связное множество

**Определение.** Пусть  $Y$ –метрическое пространство,  $E \subset Y$ . Множество  $E$  называется *линейно связным*, если любые две его точки можно соединить путём в  $E$ :

$$\forall A, B \in E, \exists \gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow E : \gamma(a) = A, \gamma(b) = B.$$



### 2.53 Счетное множество, эквивалентные множества

**Определение.** Множества  $A$  и  $B$  называют эквивалентными или равномошными, если между ними есть биекция, т. е. если между ними можно установить взаимнооднозначное соответствие.

**Определение.**  $A$  — счётное множество  $\Leftrightarrow$  равномошно/эквивалентно  $\mathbb{N}$



## 2.54 Множество мощности континуума

**Определение.**  $A$  — множество мощности континуума  $\Leftrightarrow$  равномощно/эквивалентно  $[0; 1]$  из  $\mathbb{R}$ .

*Следствие.*  $\mathbb{R}^m, m \in \mathbb{N}$ , " $\mathbb{R}^\infty$ " — континуум (под  $\mathbb{R}^\infty$  понимается все возможные последовательности, состоящие из чисел  $\mathbb{R}$ ).

*Примечание.* На самом деле, обобщение континуальности на размерности  $\mathbb{R}$  напрямую следует из того факта, что  $\mathbb{R} \Leftrightarrow [0; 1] \Leftrightarrow \text{Bin}$  — множеству бинарных последовательностей. А т. к. декартово произведение двух последовательностей можно представить как последовательность, где на нечетных местах стоят элементы первой последовательности, а на четных элементы второй последовательности, то  $\mathbb{R}^m$  для натуральных  $m$  тоже континуально.



## 2.55 Функция, дифференцируемая в точке

Пусть  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in (a, b)$ , тогда имеют место быть два эквивалентных определения:

**Определение.** Если  $\exists A \in \mathbb{R} : f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0), x \rightarrow x_0$ , тогда  $f$  - дифф. в  $x_0$ , а  $A$  - производная в этой точке.

**Определение.** Если  $\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = A \in \mathbb{R}$ , где  $h = x - x_0$ , тогда  $f$  - дифф. в  $x_0$ , а  $A$  - производная в этой точке.

*Примечание.* Функция, дифференцируемая в точке - это функция, которая имеет конечную производную в точке. На самом деле, функция может иметь бесконечную производную, тогда фактически говорят о наличии производной, однако не считают функцию дифференцируемой в этой точке.



## 2.56 Производная

**Определение.** Пусть  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $D_1 \in D$  — множество точек дифференцирования, тогда производной называется функция:

$$\phi : D_1 \xrightarrow{x \mapsto f'(x)} \mathbb{R} : f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0$$





## 2.57 Касательная прямая к графику функции

**Определение.** Касательной к графику функции  $f(x)$ ,  $f(x)$  — определена и дифф. в некоторой окрестности точки  $x_0$ , называется прямая  $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ .

*Примечание.* По второму определению производной угловой коэффициент касательной равен пределу угловых коэффициентов секущих.



## 2.58 Классы функций $C^n([a, b])$

### Определение гладкой функции

**Гладкая функция** — функция имеющая непрерывную производную на всем множестве определения.

Рассматривают также гладкие функции высших порядков, а именно, функция с порядком гладкости  $\mathbf{r}$  имеет непрерывную производную порядка  $\mathbf{r}$ .

Множество таких функций, определённых в области  $\Omega$  обозначается  $\mathbf{C}^{\mathbf{r}}(\Omega)$

$\mathbf{f} \in \mathbf{C}^\infty(\Omega)$  означает, что  $\forall \mathbf{r} \in \mathbb{N} : \mathbf{f} \in \mathbf{C}^{\mathbf{r}}(\Omega)$



## 2.59 Производная $n$ -го порядка

$X, Y$  - произвольные метрические пространства

Пусть функция  $f : X \rightarrow Y$  имеет конечную производную  $f'(x)$  в некотором интервале  $(a, b)$ ,  $f'(x)$  так же является функцией в этом интервале, если она дифференцируема, то мы так же можем вычислить от неё производную:  $f''(x) = (f'(x))' = ((\frac{dy}{dx}))' = \frac{d^2y}{dx^2}$   $f''(x)$  так же обозначается как  $f^{(2)}(x)$  и называется производной второго порядка. Аналогично мы можем вычислить производную третьего, четвертого ... порядков.

Таким образом понятие **производной  $n$ -го** порядка вводится индуктивно, через последовательное вычисление  $n$  производных, начиная с производной 1-го порядка.



## 2.60 Многочлен Тейлора n-го порядка

Пусть функция  $f(x)$  определена в некоторой окрестности точки  $x_0$  и  $n$  раз дифференцируема в точке  $x_0$ .

Данный многочлен называется многочленом Тейлора  $n$ -го порядка функции  $f(x)$  в точке  $x_0$ :

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

а.н. Тейлора.

Наблюдение.  $P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$

Хотим записать в виде  $P(x) = C_0 + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + \dots + C_n(x-a)^n$ .

Тогда  $C_0 = P(a)$   $P' = C_1 + 2C_2(x-a) + \dots + nC_n(x-a)^{n-1}$

$C_1 = P'(a)$

$\vdots$

$P^{(k)} = k! \cdot C_k + (k+1)k(k-1) \cdot 2C_{k+1}(x-a) + \dots + n(n-1) \cdot (n-k+1)C_n(x-a)^{n-k}$

$$C_k = \frac{P^{(k)}(a)}{k!}$$

Т.о.р.  $P(x) = P(a) + \frac{P'(a)}{1!}(x-a) + \frac{P''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{P^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ . - это Тейлорное многочлен.

Диф.  $f$  -  $n$  раз дифф. в точке  $a$

$$T_n(f, a)(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

- это Тейлорное  $n$ -го пор. функ  $f$  в точке  $a$ .

$$R_n(f, a)(x) = f(x) - T_n(f, a)(x)$$

## 2.61 Разложения Тейлора основных элементарных функций

что то  $\frac{1}{1-x}$  -

$$\sin x = \sin 0 + \frac{\cos 0}{1!}(x-0) + \frac{-\sin 0}{2!}(x-0)^2 + \frac{\cos 0}{3!}(x-0)^3 + \dots = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + o(x^{2n})$$

$$2) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n+1})$$

$$3) (e^x)^{(k)} = e^x \quad (e^x)^{(0)} = 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), x \rightarrow 0$$

$$4) f = (1+x)^{\sigma} \quad f' = \sigma(1+x)^{\sigma-1} \quad f'' = \sigma(\sigma-1)(1+x)^{\sigma-2}$$

$$(1+x)^{\sigma} = 1 + \sigma x + \frac{\sigma(\sigma-1)}{2!}x^2 + \frac{\sigma(\sigma-1)(\sigma-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{(\sigma)_n}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$\frac{\sigma(\sigma-1)\dots(\sigma-k+1)}{k!} = \frac{\sigma!}{k!} \approx \left(\frac{\sigma}{k}\right)^k$$

$$4) \text{ случай } \sigma = -1 \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n), x \rightarrow 0$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n), x \rightarrow 0$$

$$\sigma = \frac{1}{2} \quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

$$5) f(x) = \ln(1+x) \quad f'(x) = \frac{1}{1+x} \quad (0^-)$$

Зам. Разложения Тейлора можно дифференцировать (и интегрировать)

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$$

т.е. замена формулы

$$\frac{d}{dx} T_{n+1}(f, x_0) = T_n(f, x_0)$$

$$Q_n(1+x) = 0 \cdot 1 \cdot x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n!}x^n + o(x^{n+1})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} Q_n(1+x) = 0$$

Зам. В свободной гл. асимпт. разл.

$$f(x) = x^2 + o(x^2), x \rightarrow 0 \Rightarrow f'(x) = 2x + o(x), x \rightarrow 0$$

$$\text{НЕТ: } f(x) = x^2 + x^0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$

$$f'(x) = 2x + 0 \cdot \cos\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right) = 2x + o(x)$$