

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

—*—

TIỂU LUẬN CUỐI KÌ

MÔ HÌNH HÓA THỐNG KÊ

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc**

Nhóm thực hiện: **Nhóm 4**

Học viên: **Phan Thị Thùy An**

MSHV: 20C29002

Đinh Thị Nữ

MSHV: 20C29013

Lý Phi Long

MSHV: 20C29028

Đặng Khánh Thi

MSHV: 20C29038

TP. Hồ Chí Minh – Tháng 04, 2021

Mục lục

1	Dữ liệu tự chọn	5
1.1	Dữ liệu 1: Mô hình hồi quy đa biến	6
1.2	Dữ liệu 2: Hồi quy thành phần chính	7
1.2.1	Giới thiệu bộ dữ liệu	7
2	Dữ liệu có sẵn	9
2.1	Dữ liệu 1	10
2.2	Dữ liệu 2	15
2.3	Dữ liệu 3	21
2.4	Dữ liệu 4	26

Chương 1

Dữ liệu tự chọn

- Tên "đề tài", nguồn gốc của dữ liệu, giới thiệu các biến.
- Mô hình chọn được; phân tích kết quả
- Đưa ra những phương pháp/phân tích khác có thể giúp cho kết quả tốt hơn.
- Kết luận.

1.1 Dữ liệu 1: Mô hình hồi quy đa biến

1.2 Dữ liệu 2: Hồi quy thành phần chính

1.2.1 Giới thiệu bộ dữ liệu

Hiện nay, Xe đạp cho thuê được giới thiệu ở nhiều thành phố để nâng cao sự thoải mái khi di chuyển. Điều cần quan tâm khi cho thuê xe đạp là xe đạp phải luôn sẵn sàng và tiếp cận được người dùng vào đúng thời điểm, giúp giảm bớt thời gian chờ đợi. Do đó, việc đảm bảo một nguồn cung cấp xe đạp cho thuê ổn định cho thành phố trở thành mối quan tâm lớn. Phần quan trọng là cần dự đoán được số lượng xe đạp cần thiết tại mỗi giờ, để có được nguồn cung cấp xe đạp cho thuê ổn định.

Nhóm em sử dụng Bộ dữ liệu Nhu cầu thuê xe đạp ở Seoul (**Seoul Bike Sharing Demand Data Set**).

Nguồn: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Seoul+Bike+Sharing+Demand?fbclid=IwAR1b9vg38PvINI2V7K9ZfVoJNx0Vmp8GUbuLV04JGsCdEC_-hHVtUKqXX9Y).

Bộ dữ liệu ghi lại các thông tin về thời tiết, số lượng xe đạp được thuê mỗi giờ và thông tin ngày. Bộ dữ liệu có 8760 quan trắc, gồm 14 biến.

Date - year-month-day

Rented Bike count - Count of bikes rented at each hour

Hour - Hour of the day

Temperature-Temperature in Celsius

Humidity -

Windspeed - m/s

Visibility - 10m

Dew point temperature - Celsius

Solar radiation - MJ/m²

Rainfall - mm

Snowfall - cm

Seasons - Winter, Spring, Summer, Autumn

Holiday - Holiday/No holiday

Functional Day- NoFunc(Non Functional Hours), Fun(Functional hours)

Chương 2

Dữ liệu có sẵn

- Chọn mô hình phù hợp nhất giải thích biến phụ thuộc với từng bộ dữ liệu.
- Nêu rõ phương pháp chọn mô hình và lý do chọn phương pháp đó.
- Nói rõ ý nghĩa của mô hình đã chọn.

2.1 Dữ liệu 1

Những thông tin về các giám đốc điều hành các tập đoàn Hoa Kỳ. Bộ dữ liệu gồm 177 quan trắc và 15 biến.


* Phương pháp chọn: Stepwise - tiến; tiêu chuẩn chọn: AIC.

Tìm hiểu và tiền xử lý dữ liệu

Một số biến trong bộ dữ liệu kiểu số có đơn vị tính lớn như: *sales'*, *profits*, *lmktval*. Nếu đưa những biến này vào phương trình hồi quy có thể dẫn tới hiện tượng bias do tác động của những biến này lên model lẫn át những biến khác còn lại như *age*, *ceoten*.... Nên ta sẽ dùng phương pháp logarit cho 3 biến này trong model tương ứng với 3 biến mới là: *lsales''*, *lmktval* và *profmarg*. (1)

Từ biểu đồ dưới ta thấy ba biến định lượng *lsales*, *lmktval* và *profmarg* xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Tuy nhiên có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa 2 biến *sales* và *profit* luôn (hình 2.1.1).

Tính độ correlation của biến *salary* với lần lượt 2 biến trên ta có:



Hình 2.1.1: Mối tương quan giữa các biến

```
> cor(train[c("salary", "lsales", "lmktval", "profmarg")])
      salary    lsales    lmktval    profmarg
salary 1.0000000 0.4912099 0.51978488 -0.24975911
lsales 0.4912099 1.0000000 0.75006264 -0.42949701
lmktval 0.5197849 0.7500626 1.00000000 0.04471558
profmarg -0.2497591 -0.4294970 0.04471558 1.00000000
```

Hình 2.1.2: Mức độ tương quan giữa biến *lsales* và *profmarg* Correlation

Xét bảng correlation giữa các biến độc lập với nhau và giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc, ta thấy: Giữa hai biến *lmktval* và biến *lsales* có mối tương quan rất cao (≈ 0.75). Tuy nhiên biến *lmktval* lại có mối tương quan cao hơn với biến phụ thuộc *salary*. Mặt khác giữa biến *profmarg* và *lsales* cũng có mối tương quan cao (≈ -0.42). Nên ta loại bỏ biến *lsales* khỏi danh sách các biến được xét. (2)

Từ (1) và (2) ta có mô hình với đầy đủ các biến cần lựa chọn như sau:

$$\begin{aligned} salary = \beta_0 + \beta_1 * age + \beta_2 * college + \beta_3 * grad + \beta_4 * comten \\ + \beta_5 * ceoten + \beta_6 * lmktval + \beta_7 * profmarg \end{aligned} \quad (2.1.1)$$

Thực hiện phân rã hai biến phân loại gồm *college* và *grad* trước khi thực hiện phương pháp chọn biến **Stepwise tiến** với **tiêu chuẩn AIC**.

Để đánh giá chất lượng mô hình ta chia tập dữ liệu thành hai phần, training và testing, với tỷ lệ 80 : 20 sau đó tiến hành phương pháp chọn biến trên tập training.

Chọn biến bằng phương pháp StepWise tiến và tiêu chuẩn AIC

```
[1] "salary" "age" "college" "grad" "comten" "ceoten" "lmktval" "profmarg"
> l0 = lm(formula = train$salary ~ 1, data = train) # non independence variable
> l1 = lm(formula = train$salary ~ ., data = train) # full independence variable
> modbest_Fow = step(l0, scope = list(lower = l0,
+                                     upper = l1), direction = 'forward', k = 2)
Start: AIC=1825.78
train$salary ~ 1
```

	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
+ lmktval	1	11242276	42481047	1794.4
+ profmarg	1	993901	52729423	1825.1
+ age	1	833601	52889723	1825.6
+ ceoten	1	816752	52906571	1825.6
+ comten	1	784116	52939207	1825.7
<none>			53723323	1825.8
+ college	1	225711	53497612	1827.2
+ grad	1	1333	53721991	1827.8

```
Step: AIC=1794.44
train$salary ~ lmktval
```

	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
+ profmarg	1	1319152	41161895	1792.0
+ ceoten	1	1069953	41411095	1792.8
<none>			42481047	1794.4
+ grad	1	398593	42082454	1795.1
+ comten	1	199305	42281743	1795.8
+ age	1	177509	42303538	1795.8
+ college	1	90861	42390186	1796.1

```
Step: AIC=1791.96
train$salary ~ lmktval + profmarg
```

	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
+ ceoten	1	1067048	40094847	1790.2
<none>			41161895	1792.0
+ grad	1	215822	40946074	1793.2
+ age	1	170753	40991143	1793.4
+ college	1	92712	41069183	1793.6
+ comten	1	33866	41128029	1793.8

```
Step: AIC=1790.23
train$salary ~ lmktval + profmarg + ceoten
```

	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
<none>			40094847	1790.2
+ grad	1	142580	39952267	1791.7
+ college	1	38627	40056220	1792.1
+ comten	1	28636	40066211	1792.1
+ age	1	1	40094846	1792.2

Hình 2.1.3: Kết quả chọn biến theo phương pháp StepWise tiến với tiêu chuẩn AIC

Tổng quan tiêu chuẩn AIC thì mô hình tốt là mô hình có giá trị AIC nhỏ nhất. Ở mô hình 1, biến *lmktval* được chọn vào mô hình vì có AIC nhỏ nhất trong tất cả các kết hợp với các biến còn lại. Tương tự AIC được tính cho mô hình thêm biến thứ 2, *ceoten*, và biến thứ 3 là *ceoten* (hình 2.1.4).

```
> summary(modbest_Fow)

Call:
lm(formula = train$salary ~ lmktval + profmarg + ceoten, data = train)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1339.1  -227.0   -72.8   163.7  4351.3

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -950.696    302.598   -3.142  0.00206 **
lmktval       248.204     38.909    6.379  2.5e-09 ***
profmarg     -13.929      6.544   -2.128  0.03508 *
ceoten        11.714      6.113    1.916  0.05738 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 539 on 138 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2537,    Adjusted R-squared:  0.2375
F-statistic: 15.64 on 3 and 138 DF,  p-value: 8.262e-09
```

Hình 2.1.4: Kết quả hồi quy mô hình với các biến được chọn

Với ba biến được chọn ở trên, mô hình 2.1.1 trở thành mô hình mới:

$$salary = -950.6 + 248.2 * lmktval - 13.9 * profmarg + 11.7 * ceoten \quad (2.1.2)$$

Tuy nhiên ta nhận thấy biến *ceoten* có $p_{value} \geq \alpha$ ($0.05738 \geq 0.05$) nên không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Ta tiến hành bỏ biến *ceoten* và hồi quy mô hình với hai biến còn lại kết quả thu được từ phần mềm R như hình 2.1.5:

```
> new_train = train[c("salary", "lmktval", "profmarg")]
> newModel = lm(formula = new_train$salary ~ ., data = new_train)
> summary(newModel)

Call:
lm(formula = new_train$salary ~ ., data = new_train)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1127.7  -256.6   -85.3   246.7  4404.8

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -830.739    298.886   -2.779  0.0062 **
lmktval       245.323     39.252    6.250  4.71e-09 ***
profmarg     -13.944      6.607   -2.111  0.0366 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 544.2 on 139 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2338,    Adjusted R-squared:  0.2228
F-statistic: 21.21 on 2 and 139 DF,  p-value: 9.143e-09
```

Hình 2.1.5: Kết quả hồi quy mô hình với hai biến còn lại

Mô hình thống kê mới:

$$salary = -830.7 + 245.3 * lmktval - 13.9 * profmarg \quad (2.1.3)$$

Trường hợp này hai biến còn lại có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên mô hình được tạo bởi hai biến này chỉ giải thích được 23% sự biến thiên của biến phụ thuộc (hình 2.1.5). Nguyên nhân dẫn tới kết quả thấp là do số lượng data ít, các biến giải thích ít không tạo nên mô hình đặc trưng được.

Test trên tập test và nhận xét kết quả

Thực hiện dự đoán trên tập dữ liệu test từ kết quả mô hình 2.1.3 và dùng chỉ số đánh giá MSE (trung bình bình phương sai số) ta có:

```
> SE = sum((pred_test-y_test) ^2)
> SE
[1] 15893414
> MSE = SE / nrow(test)
> print(MSE)
[1] 454097.5
```

Hình 2.1.6: Chỉ số đo lường kết quả MSE

Kết quả $MSE \approx 454097$ lớn hơn nhiều so với giá trị Mean : 887.5 nên ta có thể thấy hai yếu tố gồm: giá thị trường (*lmktval*) và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận (*profmarg*) là chưa đủ để giải thích mức độ tăng giảm của tiền lương của các giám đốc điều hành các tập đoàn Hoa Kỳ.

Để cải thiện kết quả mô hình ta nên tiến hành thu thập thêm dữ liệu và tiến hành lựa chọn biến dựa trên dữ liệu mới này. Bên cạnh đó có thể xem xét tới xem xét tới các nhân tố khác ảnh hưởng tới tiền lương của các giám đốc Hoa kỳ như: Lĩnh vực hoạt động (ngân hàng, hàng không, công nghệ, vận tải...); mức lương trước đó; số năm kinh nghiệm, giới tính,...

2.2 Dữ liệu 2

Bộ dữ liệu ghi lại lịch sử về những ngôi nhà được bán từ 5/2014 đến 5/2015 ở quận King, bang Washington, Hoa Kỳ. Bộ dữ liệu bao gồm 21613 quan trắc, gồm 21 biến.

* Phương pháp chọn: Stepwise - lùi; tiêu chuẩn chọn: BIC.

Tìm hiểu dữ liệu


```
> mydata <- read.csv("data2.csv")
> head(mydata)
```

	id	date	price	bedrooms	bathrooms	sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront	view
1	7129300520	10/13/2014	221900	3	1.00	1180	5650	1	0	0
2	6414100192	12/9/2014	538000	3	2.25	2570	7242	2	0	0
3	5631500400	2/25/2015	180000	2	1.00	770	10000	1	0	0
4	2487200875	12/9/2014	604000	4	3.00	1960	5000	1	0	0
5	1954400510	2/18/2015	510000	3	2.00	1680	8080	1	0	0
6	7237550310	5/12/2014	1230000	4	4.50	5420	101930	1	0	0


	condition	grade	sqft_above	sqft_basement	yr_built	yr_renovated	zipcode	lat	long
1	3	7	1180	0	1955	0	98178	47.5112	-122.257
2	3	7	2170	400	1951	1991	98125	47.7210	-122.319
3	3	6	770	0	1933	0	98028	47.7379	-122.233
4	5	7	1050	910	1965	0	98136	47.5208	-122.393
5	3	8	1680	0	1987	0	98074	47.6168	-122.045
6	3	11	3890	1530	2001	0	98053	47.6561	-122.005

	sqft_living15	sqft_lot15
1	1340	5650
2	1690	7639
3	2720	8062
4	1360	5000
5	1800	7503
6	4760	101930

(a) Một số quan trắc đầu tiên



(b) Hệ số tương quan giữa các biến



(c) Phân bố của biến phụ thuộc

Hình 2.2.1: Một số quan sát ban đầu của bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu cung cấp gồm 21 biến, trong đó biến **id** và **date** được loại bỏ khỏi dữ liệu trước khi tiến hành phân tích, vì nhóm em nghĩ các biến này chỉ để ghi lại chỉ số và thời gian mua bán, không mang nhiều ý nghĩa thống kê.

Quan sát ban đầu cho thấy: các biến độc lập **sqft_living**, **grade**, **sqft_above**,

sqft_living15 có mối tương quan cao với biến phụ thuộc **Price**; biến phụ thuộc **Price** phân bố không đều, bị lệch hẳn về một phía và giá trị chủ yếu từ 0 đến 2 000 000.

Phân tích, chọn mô hình

```
> # Create full model
> mod_full_1 = lm(price ~ ., data2) #full model
> summary(mod_full_1)
```

Call:
lm(formula = price ~ ., data = data2)

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1291631	-99089	-9569	77778	4330096

Coefficients: (1 not defined because of singularities)

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	6.564e+06	2.933e+06	2.238	0.02523	*
bedrooms	-3.556e+04	1.901e+03	-18.707	< 2e-16	***
bathrooms	4.128e+04	3.268e+03	12.632	< 2e-16	***
sqft_living	1.496e+02	4.397e+00	34.033	< 2e-16	***
sqft_lot	1.289e-01	4.792e-02	2.690	0.00714	**
floors	6.474e+03	3.602e+03	1.797	0.07229	.
waterfront	5.833e+05	1.736e+04	33.593	< 2e-16	***
view	5.278e+04	2.141e+03	24.652	< 2e-16	***
condition	2.679e+04	2.353e+03	11.387	< 2e-16	***
grade	9.701e+04	2.161e+03	44.894	< 2e-16	***
sqft_above	3.129e+01	4.361e+00	7.174	7.53e-13	***
sqft_basement	NA	NA	NA	NA	
yr_built	-2.628e+03	7.272e+01	-36.135	< 2e-16	***
yr_renovated	1.983e+01	3.656e+00	5.425	5.87e-08	***
zipcode	-5.819e+02	3.299e+01	-17.635	< 2e-16	***
lat	6.022e+05	1.074e+04	56.071	< 2e-16	***
long	-2.156e+05	1.316e+04	-16.385	< 2e-16	***
sqft_living15	2.116e+01	3.451e+00	6.131	8.88e-10	***
sqft_lot15	-3.907e-01	7.334e-02	-5.327	1.01e-07	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 201300 on 21579 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7001, Adjusted R-squared: 0.6999
F-statistic: 2964 on 17 and 21579 DF, p-value: < 2.2e-16

Hình 2.2.2: Mô hình hồi quy đầy đủ ban đầu

Bộ dữ liệu (sau khi loại bỏ id và date) có 18 biến giải thích, do đó nhóm em chọn phương pháp lùi (**stepwise - backward**) cho bộ dữ liệu này. Trong mô hình hồi quy đầy đủ (Hình 2.2.2), đa số các biến giải thích đều có ý nghĩa thống kê, do đó tiến hành phương pháp lùi (loại biến dần dần) sẽ tiết kiệm thời gian hơn so với các phương pháp còn lại. Tiêu chuẩn BIC có xu hướng chọn các mô hình ít phức tạp hơn so với tiêu chuẩn AIC, đặc biệt khi số lượng quan trắc lớn.


```

> summary(mod_BIC_1)

Call:
lm(formula = price ~ bedrooms + bathrooms + sqft_living + waterfront +
    view + condition + grade + sqft_above + yr_built + yr_renovated +
    zipcode + lat + long + sqft_living15 + sqft_lot15, data = data2)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1284799   -99272    -9674    77773   4326048

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  6.017e+06  2.885e+06   2.085  0.0371 *
bedrooms    -3.578e+04  1.900e+03 -18.826 < 2e-16 ***
bathrooms     4.285e+04  3.154e+03  13.587 < 2e-16 ***
sqft_living   1.475e+02  4.181e+00  35.280 < 2e-16 ***
waterfront    5.826e+05  1.736e+04  33.554 < 2e-16 ***
view          5.306e+04  2.140e+03  24.797 < 2e-16 ***
condition     2.645e+04  2.349e+03  11.256 < 2e-16 ***
grade         9.746e+04  2.152e+03  45.284 < 2e-16 ***
sqft_above    3.501e+01  3.910e+00   8.952 < 2e-16 ***
yr_built     -2.609e+03  7.094e+01  -36.779 < 2e-16 ***
yr_renovated  2.003e+01  3.651e+00   5.487  4.14e-08 ***
zipcode      -5.764e+02  3.286e+01  -17.542 < 2e-16 ***
lat           6.027e+05  1.070e+04  56.341 < 2e-16 ***
long         -2.152e+05  1.308e+04 -16.451 < 2e-16 ***
sqft_living15 1.989e+01  3.423e+00   5.811  6.30e-09 ***
sqft_lot15   -2.613e-01  5.311e-02  -4.919  8.74e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 201300 on 21581 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7, Adjusted R-squared:  0.6998
F-statistic: 3357 on 15 and 21581 DF, p-value: < 2.2e-16

```

(a) Chọn biến
 Stepwise Model Path
 Analysis of Deviance Table
 Initial Model:
 price ~ bedrooms + bathrooms + sqft_living + sqft_lot + floors +
 waterfront + view + condition + grade + sqft_above + sqft_basement +
 yr_built + yr_renovated + zipcode + lat + long + sqft_living15 +
 sqft_lot15
 Final Model:
 price ~ bedrooms + bathrooms + sqft_living + waterfront + view +
 condition + grade + sqft_above + yr_built + yr_renovated +
 zipcode + lat + long + sqft_living15 + sqft_lot15

Step	DF	Deviance	Resid. DF	Resid. Dev	AIC	
1			21579	8.739836e+14	527659.9	
2	- sqft_basement	0	21579	8.739836e+14	527659.9	
3	- floors	1	130842954998	21580	8.741144e+14	527653.1
4	- sqft_lot	1	284802633671	21581	8.743992e+14	527650.2


(a) Chọn biến

(b) Kết quả mô hình

Hình 2.2.3: Mô hình khi chọn bằng tiêu chuẩn BIC

Bằng phương pháp lùi và tiêu chuẩn BIC (Hình 2.2.3), các biến **sqft_basement**, **floors**, **sqft_lot** đã bị loại bỏ khỏi mô hình. Mô hình được chọn có $R^2 = 0.7$, $R^2_{adj} = 0.69$, các tham số ước lượng của mô hình đều có ý nghĩa thống kê.


Ta tiến hành kiểm tra xem mô hình này có thỏa mãn các giả thiết của mô hình hồi quy hay không.



Hình 2.2.4: Các biểu đồ kiểm định mô hình

Dựa vào hình 2.2.4, phương sai của sai số không phải là hằng số, kì vọng của sai số bằng 0; sai số có vẻ tuân theo phân phối chuẩn nhưng phần đuôi trên bị lệch khá nhiều.

Kết hợp với nhận xét ban đầu, về việc biến **Price** phân bố không đều, nhóm em tiến hành biến đổi biến này thành $\log(\text{Price})$.



Hình 2.2.5: Phân bố của biến **Price** sau khi biến đổi

Sau khi biến đổi, ta tiến hành hồi quy cho: **mô hình 1** mô hình có 15 biến đã chọn bằng tiêu chuẩn BIC trước đó, và **mô hình 2** mô hình đầy đủ rồi áp dụng tiêu chuẩn BIC để chọn biến.

```
> summary(mod_2)
```

```
Call:
lm(formula = log(price) ~ bedrooms + bathrooms + sqft_living +
  waterfront + view + condition + grade + sqft_above + yr_built +
  yr_renovated + zipcode + lat + long + sqft_living15 + sqft_lot15,
  data = data2)
```

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.72685 -0.16385  0.00299  0.16386  1.18219
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-1.436e+01	3.645e+00	-3.940	8.18e-05 ***
bedrooms	-1.351e-02	2.400e-03	-5.629	1.83e-08 ***
bathrooms	8.720e-02	3.984e-03	21.891	< 2e-16 ***
sqft_living	1.238e-04	5.282e-06	23.444	< 2e-16 ***
waterfront	3.702e-01	2.193e-02	16.881	< 2e-16 ***
view	6.195e-02	2.703e-03	22.919	< 2e-16 ***
condition	5.984e-02	2.968e-03	20.163	< 2e-16 ***
grade	1.643e-01	2.719e-03	60.449	< 2e-16 ***
sqft_above	2.582e-05	4.939e-06	5.228	1.73e-07 ***
yr_built	-3.126e-03	8.960e-05	-34.882	< 2e-16 ***
yr_renovated	4.008e-05	4.612e-06	8.690	< 2e-16 ***
zipcode	-5.816e-04	4.150e-05	-14.014	< 2e-16 ***
lat	1.414e+00	1.351e-02	104.612	< 2e-16 ***
long	-1.741e-01	1.652e-02	-10.537	< 2e-16 ***
sqft_living15	8.802e-05	4.324e-06	20.355	< 2e-16 ***
sqft_lot15	1.512e-07	6.709e-08	2.254	0.0242 *

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 0.2543 on 21581 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.767,    Adjusted R-squared:  0.7668
F-statistic: 4736 on 15 and 21581 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
> summary(mod_BIC_2)
```

```
Call:
lm(formula = log(price) ~ bedrooms + bathrooms + sqft_living +
  sqft_lot + floors + waterfront + view + condition + grade +
  yr_built + yr_renovated + zipcode + lat + long + sqft_living15,
  data = data2)
```

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.7953 -0.1615  0.0037  0.1590  1.1735
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-6.932e+00	3.639e+00	-1.905	0.0568 .
bedrooms	-1.174e-02	2.382e-03	-4.930	8.27e-07 ***
bathrooms	7.137e-02	4.047e-03	17.634	< 2e-16 ***
sqft_living	1.403e-04	4.197e-06	33.431	< 2e-16 ***
sqft_lot	3.426e-07	4.355e-08	7.868	3.78e-15 ***
floors	6.979e-02	4.049e-03	17.234	< 2e-16 ***
waterfront	3.686e-01	2.176e-02	16.937	< 2e-16 ***
view	6.148e-02	2.649e-03	23.205	< 2e-16 ***
condition	6.352e-02	2.941e-03	21.594	< 2e-16 ***
grade	1.591e-01	2.682e-03	59.299	< 2e-16 ***
yr_built	-3.419e-03	9.120e-05	-37.494	< 2e-16 ***
yr_renovated	3.650e-05	4.585e-06	7.962	1.78e-15 ***
zipcode	-6.441e-04	4.137e-05	-15.569	< 2e-16 ***
lat	1.404e+00	1.337e-02	104.988	< 2e-16 ***
long	-1.715e-01	1.619e-02	-10.590	< 2e-16 ***
sqft_living15	9.566e-05	4.278e-06	22.359	< 2e-16 ***

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 0.2524 on 21581 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7703,    Adjusted R-squared:  0.7702
F-statistic: 4826 on 15 and 21581 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

(a) Mô hình 1


(b) Mô hình 2

Hình 2.2.6: Kết quả khi biến đổi **Price** thành $\log(\text{Price})$

Cả hai mô hình đều gồm 15 biến giải thích, mô hình 2 đã loại bỏ các biến **sqft_basement**, **sqft_above**, **sqft_lot15** khác với 3 biến đã loại trước khi biến đổi **Price**.

Nhóm em chọn **mô hình 2** là mô hình cuối cùng, vì: mô hình 2 có hệ số xác định lớn hơn ($R^2 = 77.03\%$), các biến liên quan đến diện tích tầng hầm (**sqft_basement**, **sqft_above**) đã được bao gồm trong **sqft_living**, diện tích khu đất vào năm 2015 cũng không mang nhiều ý nghĩa thống kê trong mô hình 1 nên có thể loại bỏ.

Kiểm tra giả thiết mô hình 2: phương sai của sai số không thay đổi, kì vọng bằng 0 và đã tuân theo phân phối chuẩn, chưa phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình (các chỉ số $VIF < 5$) (Hình 2.2.7).



(a) Các biểu đồ kiểm định

```
> vif(mod_BIC_2)
```

bedrooms	bathrooms	sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront
1.649892	3.283149	5.032386	1.102209	1.618698	1.202269
view	condition	grade	yr_built	yr_renovated	zipcode
1.397185	1.241008	3.356002	2.432360	1.150352	1.661301
lat	long	sqft_living15			
1.163852	1.759544	2.912665			

(b) Kiểm tra đa cộng tuyến

Hình 2.2.7: Kết quả khi biến đổi thành $\log(\text{Price})$

Kết luận

Vậy mô hình cuối cùng được chọn có các hệ số ước lượng như hình 2.2.8.

```
> coef(mod_BIC_2)
(Intercept)      bedrooms      bathrooms    sqft_living    sqft_lot      floors
-6.932157e+00 -1.174353e-02  7.137346e-02  1.403104e-04  3.426024e-07  6.978707e-02
waterfront      view      condition      grade      yr_built    yr_renovated
 3.685686e-01  6.147550e-02  6.351646e-02  1.590506e-01 -3.419313e-03  3.650388e-05
zipcode        lat        long    sqft_living15
-6.441469e-04  1.404181e+00 -1.714684e-01  9.565513e-05
```

Hình 2.2.8: Hệ số mô hình được chọn

Có 77.06% sự biến thiên của giá nhà ở quận King được giải thích bởi 15 biến độc lập, trong đó các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất gồm *số phòng ngủ*, *số phòng tắm*, *diện tích nhà*, *số tầng*, *hướng nhà ra bờ sông*, *tình trạng ngôi nhà (mới/cũ)*, *điểm theo phân loại của quận*, *vị trí (kinh độ - vĩ độ)*, *năm xây dựng*.

Giá trị của một căn nhà **không bị ảnh hưởng nhiều** bởi các yếu tố: diện tích tầng hầm, diện tích khu đất, diện tích ngoài tầng hầm, năm sửa chữa căn nhà, zipcode (mã vùng) của ngôi nhà. Diện tích của căn nhà cũng có ảnh hưởng, tuy nhiên sự ảnh hưởng là không nhiều.

Số phòng ngủ có mối tương quan nghịch với giá nhà, vì khi số phòng ngủ tăng lên, nhưng các yếu tố còn lại không thay đổi, thì diện tích của mỗi phòng ngủ sẽ giảm đi, gây cảm giác chật chội.

2.3 Dữ liệu 3

Bộ dữ liệu ghi lại tỷ lệ tai nạn, gồm 39 quan trắc được thực hiện trên vài đoạn đường cao tốc ở tiểu bang Minnesota vùng Trung Tây của Hoa Kỳ.

Tìm hiểu dữ liệu

Bộ dữ liệu gồm 1 biến phụ thuộc và 13 biến giải thích sau:

- Y : tỷ lệ % tai nạn trên đoạn đường khảo sát.
- $X1$: chiều dài đoạn đường (dặm).
- $X2$: lượng giao thông trung bình hàng ngày (nghìn xe).
- $X3$: tỷ lệ % xe tải trên tổng số.
- $X4$: tốc độ giới hạn cho phép (dặm/giờ).
- $X5$: chiều rộng làn đường (bước chân).
- $X6$: chiều rộng làn đường khẩn cấp (bước chân).
- $X7$: số làn đường thay đổi tự do trên đoạn đường cao tốc.
- $X8$: số làn đường thay đổi (báo hiệu) trên đoạn đường cao tốc.
- $X9$: số cửa vào đoạn đường cao tốc.
- $X10$: tổng số làn đường (trên hai chiều của đường cao tốc).
- $X11$: 1 nếu là tuyến đường liên thông xa lộ và cao tốc, 0 nếu ngược lại.
- $X12$: 1 nếu là tuyến đường lớn của cao tốc, 0 nếu ngược lại.
- $X13$: 1 nếu là tuyến đường cao tốc chính, 0 nếu ngược lại.


Một vài quan trắc đầu tiên trong bộ dữ liệu (hình 2.3.1).

```
> mydata <- read.csv("data/data3.csv")
> head(mydata)
  x_i.1 x_i.2 x_i.3 x_i.4 x_i.5 x_i.6 x_i.7 x_i.8 x_i.9 x_i.10 x_i.11 x_i.12 x_i.13 y_i
1  4.99   69    8   55   12   10  1.20  0.00  4.6    8    1    0    0  4.58
2 16.11   73    8   60   12   10  1.43  0.00  4.4    4    1    0    0  2.86
3  9.75   49   10   60   12   10  1.54  0.00  4.7    4    1    0    0  3.02
4  1.65   61   13   65   12   10  0.94  0.00  3.8    6    1    0    0  2.29
5 20.01   28   12   70   12   10  0.65  0.00  2.2    4    1    0    0  1.61
6  5.97   30    6   55   12   10  0.34  1.84 24.8    4    0    1    0  6.87
```


Hình 2.3.1: Một vài quan trắc đầu tiên

Một số phân bố theo biến:


- X_4 : Có 33 trong 39 quan trắc có tốc độ tối đa là 50, 55 và 60 (hình 2.3.2).

Hình 2.3.2: Phân bố theo tốc độ giới hạn cho phép (X_4) (dặm/giờ)

- X_{10} : Có 32 trong 39 quan trắc có tổng số làn đường là 2 hoặc 4 (hình 2.3.3).

Hình 2.3.3: Phân bố theo tổng số làn đường (X_{10})

- Y : Phần lớn tỷ lệ tai nạn là 1 – 5% (hình 2.3.4).



Hình 2.3.4: Phân bố theo tỷ lệ % tai nạn (Y)

Trung bình của tổng tỷ lệ tai nạn theo các loại tuyến đường (hình 2.3.5) cho thấy loại tuyến đường cao tốc chính có tỷ lệ tai nạn cao nhất.

```
> aggregate(y_i ~ x_i.11 + x_i.12 + x_i.13, data3, mean)
  x_i.11 x_i.12 x_i.13      y_i
1      0      0      0 3.585000
2      1      0      0 2.872000
3      0      1      0 3.608421
4      0      0      1 4.870000
```

Hình 2.3.5: Trung bình của tổng tỷ lệ tai nạn theo các loại tuyến đường

Trung bình của tổng tỷ lệ % tai nạn theo các mức tốc độ giới hạn cho phép (hình 2.3.6) cho thấy giới hạn tốc độ cho phép trên đường cao tốc càng thấp thì xảy ra tai nạn càng nhiều, tỷ lệ tai nạn giảm dần đều khi giới hạn tốc độ cho phép tăng.

```
> aggregate(y_i ~ x_i.4, data3, mean)
  x_i.4      y_i
1    40 9.230000
2    45 7.283333
3    50 4.055714
4    55 3.985333
5    60 2.750000
6    65 2.290000
7    70 1.610000
```


Hình 2.3.6: Trung bình của tổng tỷ lệ % tai nạn theo các mức tốc độ giới hạn cho phép

Trung bình của tổng tỷ lệ % tai nạn theo tổng số làn đường (hình 2.3.7) cho thấy trên đoạn đường có 8 làn đường có tỷ lệ xảy ra tai nạn cao nhất, kể đến là đoạn đường có 2 làn.

```
> aggregate(y_i ~ x_i.10, data3, mean)
  x_i.10    y_i
1      2 4.000500
2      4 3.912941
3      6 2.290000
4      8 4.580000
```

Hình 2.3.7: Trung bình của tổng tỷ lệ % tai nạn theo tổng số làn đường

Ma trận ở hình 2.3.8 thể hiện độ tương giữa các biến, thấy rằng tốc độ giới hạn cho phép (X_4) có tương quan nghịch và số cửa đoạn đường cao tốc (X_9) có tương quan thuận đối với tỷ lệ % tai nạn (Y).



Hình 2.3.8: Ma trận tương quan giữa các biến

Phân tích, chọn mô hình

Mô hình hồi quy đầy đủ có các thông số ở hình 2.3.9, ta thấy được gần như tất cả các biến đều không có ý nghĩa thống kê. Ta tiến hành kiểm tra sự đa cộng tuyến có trong mô hình này bằng phương pháp VIF, ta có kết quả ở hình 2.3.10. Nhận xét rằng hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra nặng nề giữa các biến, có 7/13 biến giải thích vượt ngưỡng chấp nhận được của VIF là 5.


```

> ## Create full model
> mod_full_1 = lm(y_i ~ ., data3) #full model
> summary(mod_full_1)

Call:
lm(formula = y_i ~ ., data = data3)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.00773 -0.63409 -0.04212  0.63969  2.53722

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 13.7129031   6.9126865   1.984  0.0584 .
x_i.1        -0.0589293   0.0314673  -1.873  0.0728 .
x_i.2        -0.0054182   0.0337952  -0.160  0.8739 .
x_i.3        -0.1106588   0.1134557  -0.975  0.3387
x_i.4        -0.1266860   0.0817554  -1.550  0.1338
x_i.5        -0.1196817   0.5985717  -0.200  0.8431
x_i.6         0.0183357   0.1628311   0.113  0.9112
x_i.7        -0.3882033   1.1811637  -0.329  0.7451
x_i.8         0.7087845   0.5245588   1.351  0.1887
x_i.9         0.0654378   0.0427391   1.531  0.1383
x_i.10        0.0006672   0.2864299   0.002  0.9982
x_i.11        0.5033821   1.7304348   0.291  0.7735
x_i.12       -0.9602033   1.1124585  -0.863  0.3963
x_i.13       -0.5605308   0.9784518  -0.573  0.5718
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.202 on 25 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7589,    Adjusted R-squared:  0.6335
F-statistic: 6.053 on 13 and 25 DF,  p-value: 6.176e-05

```

Hình 2.3.9: Mô hình hồi quy đầy đủ ban đầu

```

> vif(mod_full_1)
      x_i.1      x_i.2      x_i.3      x_i.4      x_i.5      x_i.6      x_i.7      x_i.8      x_i.9
1.588934 10.400300  1.875948  6.011025  1.957449  6.426287  6.226508  2.901934  4.169496
      x_i.10     x_i.11     x_i.12     x_i.13
3.993268  9.029566  8.341780  5.739884

```

Hình 2.3.10: Hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến trong mô hình

Kết luận

2.4 Dữ liệu 4