



# ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΜ&ΜΥ  
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα  
1<sup>η</sup> Σειρά Γραπτών Ασκήσεων  
Ακ. έτος 2010-2011

Λύρας Γρηγόρης Α.Μ.: 03109687

2 Δεκεμβρίου 2011

# 1 Ασυμπτωτικός συμβολισμός, Αναδρομικές Σχέσεις

α' Ταξινόμηση

$$\begin{aligned}n * 3^n &\Rightarrow O(3^n) \\ n^{1.01} &\Rightarrow O(n^{1.01}) \\ 5^{\log_2 n} &\Rightarrow O(n^{2.321}) \\ \sum_{k=1}^n k^5 &\Rightarrow O(n^6) \\ 2^{\log_2 n^4} &\Rightarrow O(n^4) \\ \log^{\log n} n &\Rightarrow O() \\ \frac{n}{\log \log n} &\Rightarrow O() \\ \exp \frac{n}{\ln n} &\Rightarrow O() \\ \log n^3 &\Rightarrow O() \\ \sqrt{n} * (\log n)^{50} &\Rightarrow O() \\ n * (\log n)^{10} &\Rightarrow O() \\ (\log n)^{\sqrt{n}} &\Rightarrow O() \\ n^{\log \log n} &\Rightarrow O() \\ 2^{2*n} &\Rightarrow O(2^n) \\ \sqrt{n!} &\Rightarrow O() \\ \log(n!) &\Rightarrow O(n * \log n)\end{aligned}$$

β' Τάξη Μεγέθους

- (i)  $T(n) = 5 * T(n/7) + n * \log(n) \Rightarrow n^{\log_7 5} = n^{0.827} \Rightarrow n^{0.827} < n * \log n$   
 $\Rightarrow T(n) \in \Theta(n * \log n)$
- (ii)  $T(n) = 4 * T(n/5) + n / \log^2 n \Rightarrow n^{\log_5 4} = n^{0.861} \Rightarrow n^{0.861} < n / \log^2 n$   
 $\Rightarrow T(n) \in \Theta(n / \log^2 n)$
- (iii)  $T(n) = T(n/3) + 3 * T(n/7) + n$   
 $\Rightarrow T(n) \in O(n)$
- (iv)  $T(n) = 6 * T(n/6) + n \Rightarrow n^{\log_6 6} = n$   
 $\Rightarrow T(n) \in \Theta(n * \log n)$
- (v)  $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n$   
 $\Rightarrow T(n) \in \Theta(n * \log n)$
- (vi)  $T(n) = 16 * T(n/4) + n^3 * \log^2 n \Rightarrow n^{\log_4 16} = n^2 \Rightarrow n^2 < n^3 * \log^2 n$   
 $\Rightarrow T(n) \in \Theta(n^3 * \log^2 n)$
- (vii)  $T(n) = T(\sqrt{n}) + \Theta(\log \log n) \ (k = \log n, f(k) = T(n))$   
 $\Rightarrow T(\sqrt{n}) = f(\log \sqrt{n}) = f(\frac{1}{2} * \log n) = f(\frac{k}{2})$   
 $\Rightarrow f(k) = f(\frac{k}{2}) + \Theta(\log k)$   
 $\Rightarrow \Theta(n)$
- (viii)  $T(n) = T(n-3) + \log n$   
 $\Rightarrow T(n) \in \Theta(n * \log n)$

## 2 Ταξινόμηση σε Πίνακα με Πολλά Ίδια Στοιχεία

## 3 Δυαδική Αναζήτηση

α' Ξεκινάμε με ένα στοιχείο. Και συγκρίνουμε με τον  $x$ . Όσο ο  $x$  είναι μεγαλύτερος από αυτόν διπλασιάζουμε τον αριθμό των στοιχείων και ελέγχουμε πάλι με τον τελευταίο. Μόλις φτάσουμε σε μεγαλύτερο αριθμό από τον  $x$  έστω στη θέση  $k$  και εφαρμόζουμε κλασσική δυαδική αναζήτηση στο τμήμα  $A[1...k]$ . Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων είναι  $O(\log k)$ .

β' Παίρνω τα  $k$  πρώτα στοιχεία από κάθε πίνακα. Τα χωρίζω στη μέση και συγκρίνω τα  $A[k/2]$  με  $B[k/2 + 1]$  και  $A[k/2 + 1]$  με  $B[k/2]$ . Αν  $A[k/2] < B[k/2 + 1]$  και  $B[k/2] < A[k/2 + 1]$  τότε το  $k$ -οστό στοιχείο είναι το  $\max\{A[k/2], B[k/2]\}$ . Αν  $A[k/2] < B[k/2 + 1]$  και  $B[k/2] > A[k/2 + 1]$  τότε επαναλαμβάνω χρησιμοποιώντας τα στοιχεία  $[A[k/2 + 1]..A[k]]$  και  $[B[1]..B[k/2]]$ .

## 4 Συλλογή Comics

## 5 Πολυκατοικίες χωρίς Θέα

Ξεκινάμε με τον από τον  $A[1]$  θέτοντας το  $B[1] = 0$  εφόσον δεν υπάρχει κάποιος δυτικότερα από αυτόν. Προχωράμε στον επόμενο  $A[2]$  και συγκρίνουμε το ύψος του με τον  $A[1]$ . Αν  $A[2] < A[1]$  τότε θέτουμε  $B[2] = 1$  αλλιώς συγκρίνουμε το ύψος  $A[2]$  με το ύψος του στόχου του  $A[1]$ . Αν πάλι δεν βρούμε ψηλότερο τρέχουμε πάλι για το στόχο του στόχου αναδρομικά μέχρι να φτάσουμε σε 0 ή σε κάποιον ψηλότερο του  $A[2]$  και τον θέτουμε ως στόχο στο πεδίο  $B[2]$ . Επαναλαμβάνουμε μέχρι  $n$ . Μέγιστος αριθμός συγκρίσεων είναι  $2n$ .