


6.3 Volumes by cylindrical shells

另一種求體積法: 剝殼法 (洋葱)

英語教室: cylindrical [sə'lɪdrɪkl] 柱狀的, shell [ʃɛl] 殼。

Cylindrical shell 柱狀殼:




$$V = \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h = 2\pi \frac{r_2 + r_1}{2} h (r_2 - r_1) = 2\pi r h \Delta r,$$

where $r = \frac{r_2 + r_1}{2}$ the average radius 平均半徑 of the shell
and $\Delta r = r_2 - r_1$ the thickness 厚度 of the shell.

體積	(平均) 圓周長	高度	厚度
Volume =	Circumference	× Height	× Thickness

當 $y = f(x)$ 繞著 y -軸 or 垂直線 $x = a$, 體積用 disk/washer 對 y 積分:
圓盤法 $V = \int_c^d A(y) dy$ 但是有時候很難去算出 $x = f^{-1}(y)$ 來得到內/外半徑。

Example 0.1 Find the volume of the solid obtained by rotating about the y -axis the region bounded by $y = 2x^2 - x^3$ and $y = 0$.




Note: 算出 $x = f^{-1}(y)$ 要解三次方程, 還要算出上下限 (極值 0, $d = \frac{32}{27}$), 判斷左右的函數, 是非常的複雜。

The **method of cylindrical shells** 剝殼法:


Let S 是由 $y = f(x) (\geq 0)$, $y = 0$, $x = a$, $x = b (> a \geq 0)$ 所圍區域, 繞 y -軸所成。

把 $[a, b]$ 分成 n 等分, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + i\Delta x$. 考慮中點 $\bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$.
Let V_i 是面積 $f(\bar{x}_i)\Delta x$ 的第 i 條長方形繞 y -軸的體積, then

$$\begin{aligned} V_i &= 2\pi\bar{x}_i f(\bar{x}_i) \Delta x, \\ V &\approx \sum_{i=1}^n V_i = \sum_{i=1}^n 2\pi\bar{x}_i f(\bar{x}_i) \Delta x, \\ V &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2\pi\bar{x}_i f(\bar{x}_i) \Delta x. \end{aligned}$$



如果你願意
一層一層一層
的剝開我的心
你會發現
你會訝異
你 最壓抑
這是我剝殼法
最深處
算體積的秘密



Theorem 1 (Method of cylindrical shells) The volume of the solid obtained by rotating about the y -axis the region bounded under the curve $y = f(x)$ from a to b , where $b > a \geq 0$, is (體積是近似柱狀殼體積和的極限)


$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

Note:

$y = f(x)$ 繞 y -軸, $V = \int 2\pi x f(x) dx$. 橫著剝, 對 x 積。
 $x = f(y)$ 繞 x -軸, $V = \int 2\pi y f(y) dy$. 縱著剝, 對 y 積。

Example 0.2 (Continuous) $f(x) = 2x^2 - x^3$.

$$V = \int_0^2 2\pi x(2x^2 - x^3) dx = 2\pi \int_0^2 2x^3 - x^4 dx = 2\pi \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \frac{16\pi}{5}. \quad \blacksquare$$




Skill: 畫圖找半徑 $r(x)/r(y)$ 與高度 $h(x)/h(y)$:

$$V \stackrel{\Phi}{=} \int_a^b \underbrace{2\pi r(x)}_{\text{圓周長}} \underbrace{h(x)}_{\text{高度}} \underbrace{dx}_{\text{厚度}} \quad V \stackrel{\Theta}{=} \int_c^d 2\pi r(y) h(y) dy$$

Example 0.3 Find the volume of the solid obtained by rotating about the y -axis the region between $y = x$ and $y = x^2$.

When radius x from 0 to 1, the circumference $2\pi x$ and height $x - x^2$.

$$V = \int_0^1 2\pi x(x - x^2) dx = 2\pi \int_0^1 x^2 - x^3 dx = 2\pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{6}. \quad \blacksquare$$




Example 0.4 Use cylindrical shells to find the volume of the solid obtained by rotating about the x -axis the region under the curve $y = \sqrt{x}$ from 0 to 1.





$x = y^2$ (解反函數: $y = \sqrt{x} \rightarrow x = y^2$), circumference $2\pi y$, height $1 - y^2$.

$$V = \int_0^1 2\pi y(1 - y^2) dy = 2\pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

Recall (§ 6.2.ex2) disk: $V = \int_0^1 \pi x dx = \frac{\pi}{2}$ is simpler.



(比較剝殼法 (順紋切) 與切片法 (逆紋切)。)



Observation: 計算旋轉體體積的剝殼法與切片法, 一個對 x 積分, 另一個就對 y 積分。