

GRATIS

Guia de Protocolos Clinicos

MBGR, DOSS, GRBAS e FOIS - guia pratico para sua documentacao

useevolua.com.br

Protocolos abordados

1. MBGR - Avaliacao Miofuncional Orofacial
2. DOSS - Dysphagia Outcome and Severity Scale
3. GRBAS - Escala de Qualidade Vocal
4. FOIS - Functional Oral Intake Scale
5. Como usar no dia a dia clinico
6. Integracao com prontuario digital



01

MBGR

Avaliacao Miofuncional Orofacial



O protocolo MBGR (Avaliacao Miofuncional Orofacial) e um instrumento validado que avalia de forma sistematica a aparencia, postura, mobilidade e funcao dos orgaos fonoarticulatorios.

Estrutura do protocolo:

- Face e bochechas: simetria, tonus, mobilidade
- Labios: vedamento labial, forca, mobilidade
- Lingua: postura, mobilidade, forca
- Palato duro e mole: formato, integridade, funcao velofaringea
- Mandibula: abertura, desvios, ruidos


O MBGR e um dos protocolos mais citados na literatura fonoaudiologica brasileira, com validacao para populacao adulta e infantil.

Aplicacao clinica:

- Indicado para: respiradores orais, disfuncoes temporomandibulares, paralisia facial, pre e pos-operatorio de cirurgia ortognatica
- Tempo de aplicacao: 20 a 30 minutos na primeira avaliacao
- Pontuacao: escala Likert de 0 a 4 para cada item, onde 0 = normal e 4 = severamente alterado

Escore total: some todos os itens e divida pelo numero de itens avaliados. Valores acima de 1.5 indicam comprometimento miofuncional significativo.

Dados normativos (populacao brasileira, 2024):



Adulto Crianças 6-12 DTM PO cirurgia
Escore médio MBGR por grupo (quanto menor, melhor)
Fonte: Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2024.

Dicas para documentacao:

- Fotografe ou filme os itens mais relevantes (ex: vedamento labial, postura de lingua)
- Registre o escore total e por sub-item no prontuario
- Reavalie a cada 12 sessoes ou quando houver mudanca significativa

No Evolua, o MBGR esta disponivel como protocolo integrado ao prontuario. Os escores sao registrados e os relatorios gerados automaticamente.

PARA LEMBRAR

- MBGR: 5 subitens (face, labios, lingua, palato, mandibula)
- Escala Likert 0-4, 20-30 min de aplicacao
- Escore > 1.5 = comprometimento significativo
- Disponivel no prontuario digital Evolua



02


DOSS

Dysphagia Outcome and Severity Scale



. DOSS - Dysphagia Outcome and Severity Scale

A DOSS (Dysphagia Outcome and Severity Scale) é uma escala de 7 pontos que classifica a severidade da disfagia e orienta a conduta terapêutica.



Os 7 níveis da DOSS:

- Nível 7: Função normal - alimentação independente sem restrições
- Nível 6: Função funcional limitada - dieta modificada, mas sem supervisão
- Nível 5: Disfagia leve - necessidade de dieta modificada e supervisão mínima
- Nível 4: Disfagia moderada - supervisão necessária durante as refeições
- Nível 3: Disfagia moderada-severa - assistência total nas refeições
- Nível 2: Disfagia severa - nutrição via alternativa parcial
- Nível 1: Disfagia severa - nutrição exclusivamente não oral

Aplicacao clinica:

- Indicado para: pacientes neurologicos, idosos, pos-AVC, doencas neurodegenerativas
- Tempo de aplicacao: 10 minutos
- Instrumentos: avaliacao clinica + observacao da degluticao com consistencias variadas

A DOSS e recomendada pela American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) como instrumento padrao para disfagia.

Como documentar:

- Registre o nível DOSS na primeira avaliação e a cada reavaliação
- Associe a FOIS para uma visão mais completa da ingestão oral
- Use o nível DOSS para comunicar com médicos e nutricionistas
- Acompanhe a evolução do paciente ao longo do tempo

IMPORTANTE: A DOSS deve ser aplicada por fonoaudiólogo habilitado em disfagia. Não substitui a avaliação instrumental (videofluoroscopia).

Estudo de caso:

Paciente de 72 anos, pos-AVC isquêmico, com disfagia moderada (DOSS 4). Após 12 sessões de reabilitação fonoaudiológica com manobras posturais e exercícios de força lingual, evoluiu para DOSS 6.

Acompanhamento: 3 meses.

Quando encaminhar para avaliação instrumental:

A DOSS é uma avaliação clínica, mas em alguns casos a videofluoroscopia ou nasofaringoscopia são indispensáveis:

- Paciente com DOSS 1 a 3 (disfagia severa)
- Pneumonia de repetição ou suspeita de broncoaspiração
- Pós-operatório de câncer de cabeça e pescoço
- Dúvida diagnóstica entre disfagia orofaríngea e esofágica

A videofluoroscopia é o padrão-ouro para avaliação objetiva da deglutição. A DOSS clínica é complementar, não substitutiva.

PARA LEMBRAR

- DOSS: escala de 7 níveis para severidade da disfagia
- 10 min de aplicação, recomendada pela ASHA
- Combine com FOIS para visão funcional completa
- Não substitua videofluoroscopia em casos severos



03

GRBAS

Escala de Qualidade Vocal




. GRBAS - Escala de Qualidade Vocal

A escala GRBAS é o padrão-ouro internacional para avaliação perceptual da qualidade vocal. Desenvolvida por Hirano em 1981, é amplamente utilizada na prática clínica e em pesquisas.

Parâmetros avaliados:

- G (Grade): Grau geral de alteração vocal - 0 (normal) a 3 (grave)
- R (Roughness): Rugosidade - irregularidade nas vibrações das pregas vocais
- B (Breathiness): Soprosidade - escape de ar durante a fonação
- A (Asthenia): Astenia - fraqueza ou perda de potência vocal
- S (Strain): Tensão - esforço vocal excessivo

Dados de incidencia (populacao brasileira, 2025):



Porcentagem de pacientes com escore ≥ 2 por parametro GRBAS

Fonte: Arquivos Internacionais de Otorrinolaringologia, 2025.

Aplicacao clinica:

- Indicado para: todos os disturbios de voz - nodulos, polipos, paralisia de pregas vocais, disfonia funcional
- Tempo de aplicacao: 5 minutos
- Recomendacao: grave a voz do paciente lendo um texto padrao (ex: "O sol")

Dica: Faca 2 avaliacoes GRBAS em momentos diferentes para garantir confiabilidade. O ideal e que o mesmo avaliador reavalie o paciente.

Como integrar ao Evolua:

- Registre os 5 parametros GRBAS no prontuario do paciente
- Anexe a gravacao da voz para comparacao futura
- O sistema gera grafico de evolucao dos parametros ao longo do tratamento
- Relatorios automaticos incluem a escala GRBAS no formato CFoF

PARA LEMBRAR

- GRBAS: G-R-B-A-S, cada parametro 0-3
- 5 min de aplicacao, padrao-ouro internacional
- Grave a voz com texto padrao (ex: "O sol")
- Integrado ao Evolua com graficos de evolucao



04

FOIS


Functional Oral Intake Scale



4

. FOIS - Functional Oral Intake Scale

A FOIS (Functional Oral Intake Scale) classifica a ingestao oral funcional do paciente em 7 niveis, da dependencia total de nutricao alternativa ate a ingestao oral irrestrita.



Distribuicao de pacientes por tipo de ingestao (%)

Os 7 níveis da FOIS:

- Nível 7: Ingestão oral total sem restrições
- Nível 6: Ingestão oral total com restrições (consistência modificada)
- Nível 5: Ingestão oral total com múltiplas consistências, mas com precauções
- Nível 4: Ingestão oral total de uma única consistência
- Nível 3: Ingestão oral suplementada por nutrição alternativa
- Nível 2: Nutrição alternativa com tentativa oral limitada
- Nível 1: Nada por via oral, nutrição exclusivamente alternativa

Aplicacao clinica:

- Indicado para: disfagia orofaringea, pos-operatorio de cabeca e pescoco, pacientes neurologicos
- Tempo de aplicacao: 5 minutos
- Pode ser aplicado por enfermeiros treinados, com supervisao do fonoaudiologo

Relacao com a DOSS:

- Enquanto a DOSS mede a severidade da disfagia, a FOIS mede a funcionalidade da ingestao oral
- Juntas, oferecem uma visao completa: gravidade + impacto funcional
- Paciente com DOSS 3 e FOIS 3 = disfagia moderada com dependencia de nutricao alternativa

No Evolua, DOSS e FOIS sao registrados em conjunto, gerando relatorios completos de disfagia no padrao CFoF.

Fonte:

Crary MA, Mann GD, Groher ME. Initial psychometric assessment of a functional oral intake scale for dysphagia in stroke patients. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86(8):1516-20.

Exemplo de uso combinado FOIS + DOSS no prontuario:

Paciente: Sr. Jose, 65 anos, pos-AVC ha 45 dias.

Avaliacao inicial (10/01/2026):

- DOSS: Nivel 3 (disfagia moderada-severa, assistencia total)
- FOIS: Nivel 3 (ingestao oral suplementada por sonda)
- Conduta: reabilitacao fonoaudiologica intensiva, consistencia pastosa homogenea

Reavaliacao (28/02/2026):

- DOSS: Nivel 5 (disfagia leve, supervisao minima)
- FOIS: Nivel 5 (ingestao oral com precaucoes)
- Conduta: progressao para consistencia picada, alta prevista em 2 meses

PARA LEMBRAR

- FOIS: 7 niveis de ingestao oral funcional
- 5 min de aplicacao, ideal combinada com DOSS
- DOSS = severidade, FOIS = funcionalidade
- Registradas em conjunto no Evolua para relatorios CFoF



05

Como usar no dia a dia clinico

Fluxo pratico de avaliacao com protocolos



. Como usar no dia a dia clinico

A combinacao dos protocolos na avaliacao inicial:

- 1. Anamnese completa e queixa principal (15 min)
- 2. MBGR para base orofacial (20 min)
- 3. GRBAS para qualidade vocal (5 min) - se aplicavel
- 4. FOIS + DOSS para disfagia (10 min) - se aplicavel
- 5. Documentacao no formato SOAP (10 min)

Tempo total estimado: 60 minutos para uma avaliacao completa.

Frequencia de reavaliacao:

- MBGR: a cada 12 sessoes ou 3 meses
- GRBAS: a cada 6 sessoes ou quando houver mudanca na voz
- DOSS/FOIS: a cada 6 sessoes para disfagia em reabilitacao

Dica: Crie um "kit de avaliacao" com todos os protocolos impressos e salvos no prontuario digital. Isso agiliza o processo e garante consistencia.

Erros comuns:

- Não documentar o escore inicial (sem baseline, sem progresso)
- Usar protocolos sem validação brasileira
- Não reavaliar com a frequência recomendada
- Ignorar a queixa do paciente em favor do escore

PARA LEMBRAR

- Avaliação completa em 60 min: anamnese + MBGR + GRBAS + DOSS/FOIS
- Protocolos digitais: economizam 3h/semana em documentação
- Reavalie MBGR a cada 12 sessões, GRBAS a cada 6
- Documente sempre o escore inicial (baseline)



06

Integracao com prontuario digital

Economize 3 horas por semana em documentacao



. Integracao com prontuario digital

O prontuario digital com protocolos integrados elimina o retrabalho de documentacao e garante que nenhum dado clinico seja perdido.

Beneficios da integracao:

- Escore registrado automaticamente ao final do protocolo
- Relatorios gerados no padrao CFoF com 1 clique
- Graficos de evolucao automaticos ao longo do tratamento
- Protocolos pre-carregados: MBGR, DOSS, GRBAS, FOIS
- Nao precisa mais de planilhas ou papeis avulsos

O Evoluta ja possui todos estes protocolos integrados ao prontuario. Teste gratis por 14 dias.

Exemplo de fluxo com o Evolua:

- 1. Abre o protocolo MBGR no prontuario do paciente
- 2. Preenche os escores na tela durante a avaliacao
- 3. O sistema calcula automaticamente o escore total
- 4. Relatorio CFoF gerado e disponivel para download/impressao
- 5. Grafico de evolucao atualizado a cada reavaliacao

ECONOMIA: Fonoaudiologas que usam protocolos digitais integrados economizam em media 3 horas por semana em documentacao.

Comparativo entre protocolos:

MBGR (30 min) - Avaliacao completa orofacial - Likert 0-4 - Motricidade, respiracao, degluticao

GRBAS (5 min) - Qualidade vocal - 0-3 por parametro - Disturbios de voz

DOSS (10 min) - Severidade da disfagia - 7 niveis - Disfagia orofaringea

FOIS (5 min) - Ingestao oral funcional - 7 niveis - Disfagia e reabilitacao

Combine MBGR + GRBAS para avaliacao vocal completa. Use DOSS + FOIS juntos para disfagia.

Caso clinico completo:

Paciente: Joao, 68 anos, pos-AVC ha 3 meses. Encaminhado pelo neurologista com suspeita de disfagia e disturbio de fala.

Avaliacao inicial:

- MBGR: escore 2.4 (comprometimento moderado em labios, lingua e palato)
- DOSS: nivel 3 (disfagia moderada-severa, assistencia total nas refeicoes)
- FOIS: nivel 3 (ingestao oral suplementada por sonda)

Apos 16 sessoes de reabilitacao (4 meses):

- MBGR: escore 1.1 (leve)
- DOSS: nivel 6 (disfagia leve, dieta modificada)
- FOIS: nivel 6 (ingestao oral total com restricoes)

Conclusao: Joao evoluiu da sonda para alimentacao oral com consistencia pastosa em 4 meses. Continuara em terapia para progressao de consistencia.

PARA LEMBRAR

- Prontuario digital integrado: 3h/semana economizadas
- Fluxo: abrir protocolo > preencher > escore automatico > relatorio CFoF
- MBGR + GRBAS para voz; DOSS + FOIS para disfagia
- Caso clinico: DOSS 3 → DOSS 6 em 4 meses de terapia

Quer colocar isso em pratica?

Teste o Evolua gratis por 14 dias.

COMECAR GRATIS

useevolua.com.br/cadastro