

Conferencia 11 - Relaciones de Recurrencia

November 30, 2025

Teorema. Sea $q \in \mathbb{R}$ raíz de multiplicidad 2 de la ecuación $x^2 - c_1x - c_2 = 0$, entonces x_n es solución de la relación de recurrencia $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2}$ si y solo si $x_n = Aq^n + Bnq^n$

Demostración Ya se vio que las sucesiones de la forma x_n son solución

Ahora se debe demostrar que cualquier solución es de esta forma, que es equivalente a demostrar que el sistema siguiente tiene una única solución

$$Aq + Bq = a_1$$

$$Aq^2 + 2Bq^2 = a_2$$

para ello el determinante debe ser distinto de 0 y se cumple pues

$$2q^3 - q^3 = q^3 \neq 0$$

Definición. La ecuación característica de la relación de recurrencia

$a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \dots + c_ka_{n-k}$ es de la forma

$$p(x) = x^k - c_1x^{k-1} - c_2x^{k-2} - \dots - c_k = 0$$

Teorema. Si la ecuación característica de la relación de recurrencia homogénea $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \dots + c_ka_{n-k}$ tiene k raíces distintas, entonces $A_1q_1^n + A_2q_2^n + \dots + A_kq_k^n$ es solución de la relación, donde q_i $1 \leq i \leq k$ son raíces de la ecuación característica $(p(x))$.

Teorema. Sea $q \in \mathbb{R}$ raíz de multiplicidad t , $t \geq 1$, de la ecuación característica de la relación de recurrencia $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \dots + c_ka_{n-k}$, entonces $q^n, nq^n, n^2q^n, \dots, n^{t-1}q^n$ son soluciones de la relación de recurrencia.

Teorema. Si la ecuación característica de la relación de recurrencia

$a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \dots + c_ka_{n-k}$ tiene raíces q_1, q_2, \dots, q_t con multiplicidades m_1, m_2, \dots, m_t , entonces la relación de recurrencia tiene como solución $P_1(n)q_1^n + P_2(n)q_2^n + \dots + P_t(n)q_t^n$ donde P_i es un polinomio en n de grado m_i

Definición. Una solución particular de una relación de recurrencia es una sucesión que cumple la recurrencia aunque no satisfaga las condiciones iniciales

Teorema. Sea P_n una solución particular de la relación de recurrencia

$a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \dots + c_ka_{n-k} + f(n)$ entonces la solución general de la misma es $P_n + H_n$, donde H_n es la solución de la relación homogénea asociada

Solución Particular

Una solución particular P_n se puede encontrar en algunos casos:

Si $f(n) = a^n T_k(n)$ entonces $P_n = a^n Q_k(n)$ excepto si a es raíz característica con multiplicidad s , en cuyo caso $P_n = n^s a^n Q_k(n)$

Solución General

La solución general se obtiene de la siguiente forma:

1. Se calcula la solución general de la ecuación homogénea

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$
2. Se calcula una solución particular P_n de la ecuación

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} + f(n)$$
3. La suma de ambas soluciones es una solución general de la ecuación

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} + f(n)$$
4. Se obtiene la solución correspondiente a las condiciones iniciales

Ejemplo 1

Sea la recurrencia $a_0 = 5$, $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} - 6n^2 + 26n - 25$

La relación homogénea tiene como polinomio característico a $P(x) = x^2 - x - 6$ cuyas raíces son $q_1 = -2$ $q_2 = 3$ por lo que la solución general de la ecuación es $a_n = A(-2)^n + B3^n$

Como $f(n) = -6n^2 + 26n - 25$ es un polinomio de grado 2 entonces P_n es de grado 2 por lo que se prueba una solución particular de la forma $P_n = an^2 + bn + c$ que sustituida en la relación de recurrencia da una solución $a = 1$ $b = 0$ $c = 0$ por lo que una solución particular es $P_n = n^2$

Entonces la solución general de la no homogénea es $a_n = A(-2)^n + B3^n + n^2$

Cómo las condiciones iniciales son $a_0 = 5 = A+B$ y $a_1 = 1 = -2A+3B+1$ entonces $A = 3$ y $B = 2$ y la solución de la recurrencia es

$$a_n = 3(-2)^n + 2 * 3^n + n^2$$

Ejemplo 2

Sea la recurrencia lineal $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} + 2^n$

La homogénea tiene como polinomio característico $P(x) = x^2 - x - 6$ cuyas raíces son $q_1 = -2$ $q_2 = 3$ por lo que la solución general de la ecuación es $a_n = A(-2)^n + B3^n$

Como $f(n) = 2^n$ y $b = 2$ no es raíz del polinomio característico entonces

se puede probar una solución particular de la forma $P_n = c2^n$ que cuando se sustituye en la recurrencia da como solución $c = -1$ luego una solución particular de la recurrencia es $P_n = -2^n$

Entonces la solución general de la no homogénea es $a_n = A(-2)^n + B3^n - 2^n$ y como las condiciones iniciales son $a_0 = 0 = A + B - 1$ y $a_1 = 1 = -2A + 3B - 2$ entonces $A = 0$ y $B = 1$ por lo que la solución de la recurrencia es $a_n = 3^n - 2^n$

Ejemplo 3

Sea la recurrencia lineal $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} + 3^n$

La homogénea tiene como polinomio característico $P(x) = x^2 - x - 6$ cuyas raíces son $q_1 = -2$ $q_2 = 3$ por lo que la solución general de la ecuación es $a_n = A(-2)^n + B3^n$

cuyas raíces son $q_1 = -2$ $q_2 = 3$ por lo que la solución general de la ecuación es $a_n = A(-2)^n + B3^n$

Como $f(n) = 3^n$ y $b = 3$ es raíz del polinomio característico con multiplicidad 1 entonces se prueba con una solución particular de la forma $P_n = cn3^n$ que cuando se sustituye en la recurrencia da $c = 3/5$ entonces la solución particular queda $P_n = \frac{n3^{n+1}}{5}$

Entonces la solución general de la no homogénea queda $a_n = A(-2)^n + B3^n + \frac{n3^{n+1}}{5}$ que, evaluando en las condiciones iniciales, queda $a_0 = 0 = A + B$ y $a_1 = 1 = -2A + (\frac{3}{5} + B)3$ luego $A = \frac{4}{25}$ y $B = -\frac{4}{25}$ por tanto la solución de la recurrencia es $a_n = \frac{4}{25}(-2)^n + (\frac{15n-4}{25})3^n$

Ejemplo 4

Sea la recurrencia $a_1 = 1$, $a_n = 2A_{n-1} + 1$ (Torres de Hanoi)

La relación homogénea ($a_n = 2A_{n-1}$) tiene como polinomio característico $P(x) = x - 2$ cuya raíz es $q = 2$ luego la solución general de la homogénea es $P_n = A2^n$

Entonces se prueba una solución particular de tipo $P_n = c$ que sustituida en la recurrencia da $c = -1$ luego la solución particular es $P_n = -1$ entonces la solución general de la homogénea es $a_n = A2^n - 1$ como la condición inicial es $a_1 = 1 = 2A - 1$ entonces $A = 1$

por lo que la solución de la recurrencia es $a_n = 2^n - 1$

Teorema. *Si el término no homogéneo de la relación de recurrencia de orden k es de la forma $P_1(n)S_1^n + P_2(n)S_2^n + \dots + P_n(n)S_n^n$ entonces hay una solución particular $f_1(n) + f_2(n) + \dots + f_n(n)$ donde $f_i(n)$ es solución particular de la recurrencia de orden k $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \dots + c_ka_{n-k} + P_i(n)S_i^n$*