

Schwarzov princip zrcaljenja za harmonične funkcije

Matej Novoselec

FMF Fakulteta za matematiko in fiziko

4. september 2023

Definicija

Naj bo U odprta podmnožica v \mathbb{R}^n . Naj bo u funkcija, definirana na U in naj bo na definicijskem območju dvakrat zvezno odvedljiva. Pravimo, da je funkcija $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ **harmonična**, če velja

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = 0.$$

Operatorju $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$ pravimo **Laplaceov operator** in pišemo

$$\Delta u = 0.$$

Lastnost povprečne vrednosti

Definicija (Lastnost povprečne vrednosti)

Naj bo h kompleksna zvezna funkcija, definirana na območju D . Pravimo, da ima funkcija h na D **lastnost povprečne vrednosti**, če za vsak $z_0 \in D$ obstaja $\epsilon_0 > 0$, da je $\overline{\mathbb{D}}(z_0, \epsilon_0) \subseteq D$ in za vsak $0 < \epsilon \leq \epsilon_0$ velja

$$h(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(z_0 + \epsilon e^{i\theta}) d\theta.$$

Lastnost povprečne vrednosti

Definicija (Lastnost povprečne vrednosti)

Naj bo h kompleksna zvezna funkcija, definirana na območju D . Pravimo, da ima funkcija h na D **lastnost povprečne vrednosti**, če za vsak $z_0 \in D$ obstaja $\epsilon_0 > 0$, da je $\overline{\mathbb{D}}(z_0, \epsilon_0) \subseteq D$ in za vsak $0 < \epsilon \leq \epsilon_0$ velja

$$h(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(z_0 + \epsilon e^{i\theta}) d\theta.$$


Izrek (Princip maksima za funkcije z lastnostjo povprečne vrednosti)

Naj bo h zvezna kompleksna funkcija, definirana na območju D . Naj ima h na D lastnost povprečne vrednosti in naj obstaja $M \in \mathbb{R}$, da velja $|h(z)| \leq M$ za vsak $z \in D$. Če obstaja $z_0 \in D$, da je $|h(z_0)| = M$, potem je funkcija h na D konstantna.

Dirichletov problem za enotski disk

Dirichletov problem za enotski disk

Naj bo h kompleksna zvezna funkcija, definirana na $\partial\mathbb{D}$. Ali obstaja razširitev H , ki je zvezna na $\overline{\mathbb{D}}$ in harmonična na \mathbb{D} ?



Definicija

Poissonovo jedro je funkcija, definirana s predpisom

$$P_r(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{ik\theta}, \text{ kjer je } \theta \in [-\pi, \pi] \text{ in } 0 \leq r < 1.$$

Reševanje Dirichletovega problema za enotski disk

Definicija

Poissonovo jedro je funkcija, definirana s predpisom

$$P_r(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{ik\theta}, \text{ kjer je } \theta \in [-\pi, \pi] \text{ in } 0 \leq r < 1.$$

Definicija

Naj bo h zvezna funkcija, definirana na robu enotskega diska.


Poissonov integral funkcije h , ki ga označimo s \tilde{h} , je funkcija, definirana na notranjosti enotskega diska s predpisom

$$\tilde{h}(z) = \int_0^{2\pi} h(e^{i\varphi}) P_r(\theta - \varphi) \frac{d\varphi}{2\pi}, \quad z = re^{i\theta} \in \mathbb{D}.$$

Rešitev Dirichletovega problema za enotski disk

Izrek

Naj bo h zvezna kompleksna funkcija, definirana na $\partial\mathbb{D}$. Rešitev Dirichletovega problema, z robnim pogojem h , za enotski disk obstaja in je na \mathbb{D} definirana kot Poissonov integral funkcije h .



A light gray circle representing the unit disk \mathbb{D} . The boundary of the circle is labeled $\partial\mathbb{D}$ on the right. The interior of the circle is labeled $\overline{\mathbb{D}}$ at the top right. Inside the circle, the following equations are written:

$$H|_{\mathbb{D}} = \tilde{h}$$
$$\Delta \tilde{h} = 0$$

Outside the circle, to the right, the boundary condition is given as:

$$H|_{\partial\mathbb{D}} = h$$

Izrek (Karakterizacija harmoničnih funkcij)

Naj bo h zvezna funkcija, definirana na območju $D \subseteq \mathbb{C}$. Velja, da je h harmonična funkcija natanko tedaj, ko ima na D lastnost povprečne vrednosti.

Karakterizacija harmoničnih funkcij

Izrek (Karakterizacija harmoničnih funkcij)

Naj bo h zvezna funkcija, definirana na območju $D \subseteq \mathbb{C}$. Velja, da je h harmonična funkcija natanko tedaj, ko ima na D lastnost povprečne vrednosti.

Izrek Morera

Naj bo D območje in f kompleksna zvezna funkcija, definirana na D . Denimo, da za vsak zaprt trikotnik $T \subseteq D$ velja


$$\int_{\partial T} f(\xi) d\xi = 0.$$

Tedaj je f holomorfna na D .

Izrek (Schwarzov princip zrcaljenja za harmonične funkcije)

Naj bo $D \subseteq \mathbb{C}$ območje, simetrično glede na realno os. Označimo $D^+ = \{z \in D \mid \operatorname{Im}[z] > 0\}$, $D^- = \{z \in D \mid \operatorname{Im}[z] < 0\}$ in $D^0 = \{z \in D \mid \operatorname{Im}[z] = 0\}$. Naj bo u realna zvezna funkcija, definirana na $D^+ \cup D^0$. Naj bo u na D^+ harmonična in naj za vsak $z \in D^0$ velja $u(z) = 0$. Potem obstaja harmonična razširitev funkcije u na D , ki je eksplicitno podana prek zveze $u(\bar{z}) = -u(z)$, $z \in D$.

Schwarzov princip zrcaljenja za harmonične funkcije



Izrek (Schwarzov princip zrcaljenja za harmonične funkcije)

Naj bo $D \subseteq \mathbb{C}$ območje, simetrično glede na realno os. Označimo $D^+ = \{z \in D \mid \operatorname{Im}[z] > 0\}$, $D^- = \{z \in D \mid \operatorname{Im}[z] < 0\}$ in $D^0 = \{z \in D \mid \operatorname{Im}[z] = 0\}$. Naj bo f zvezna funkcija, definirana na $D^+ \cup D^0$. Naj bo f na D^+ holomorfna in naj f na D^0 zavzame realne vrednosti. Potem je funkcija F , definirana s predpisom

$$F(z) = \begin{cases} f(z) , & z \in D^+ \cup D^0 \\ \overline{f(\bar{z})} , & z \in D^- \cup D^0 \end{cases} ,$$

na območju D holomorfna.