# Beadandó dolgozat megoldások

ötödik osztály, 2019. április, 1/12

# 1. Összeadás és kivonás

# Megoldás 1.2

 $2 \cdot 5 = 10$  pont

Forrás: Imrecze et al.: Fejtörő feladatok felsősöknek

770 és 77. Ha a kisebbik szám x, akkor a nagyobb 10x. Márpedig x + 10x = 11x, és így 11x = 847, amiből x = 77.

A feladat rendesen valószínűleg kevesebbet érne, de a cél a magasabb pontszámmal most az, hogy motiváljon arra, hogy foglalkozzanak vele, ami viszont előkészíti az egyenlettel való megoldás és így az egyenletek bemutatását.

# Megoldás 1.3

2 pont/db

4748 + 459720 = 464468	999129 + 839015 = 1838144
25283 + 31420 = 56703	3153 + 411269 = 414422
31853 + 8694 = 40547	1528 + 899317 = 900845
3711 + 21175 = 24886	829927 + 93277 = 923204
931439 + 85878 = 1017317	95038 + 7548 = 102586
65860 - 48427 = 17433	806605 - 13923 = 792682
792937 - 7812 = 785125	800171 - 279714 = 520457
38378 - 6600 = 31778	892664 - 18215 = 874449
399368 - 3946 = 395422	64787 - 7659 = 57128
19875 - 2990 = 16885	81466 - 2609 = 78857

# Megoldás 1.4

2 pont/db

$$4 + (-29) + 86 = 61$$

$$93 - 56 + (-95) = -58$$

$$30 + 6 + (-700) = -664$$

$$56 - (-52) + 56 = 164$$

$$384 + 581 + (-751) = 214$$

$$25 - (-13) + 20 = 58$$

$$(-4) + (-16) + (-126) = -146$$

$$(-5) + 411 + 36 = 442$$

$$(-84) + 211 - 4 = 123$$

$$4 - 16 + (-434) = -446$$

## Megoldás 1.5

 $5 \cdot 2 = 10 \text{ pont}$ 

Forrás: Imrecze et al.: Fejtörő feladatok felsősöknek (III.2.9)

Mivel:

$${f B} + {f B} < 19, \quad {
m az\'ert} \quad {f A} = 1;$$
  ${f E} + {f E} = {f E}, \quad {
m az\'ert} \quad {f E} = 0;$   ${f E} = 0, \quad {
m az\'ert} \quad {f B} + {f B} = 10 \quad {
m \'es} \quad {f B} = 5;$   ${f C} + {f A} = 5, \quad {
m az\'ert} \quad {f C} = 4;$   ${f C} = 4, \quad {
m az\'ert} \quad {f D} + {f D} = 4 \quad {
m \'es} \quad {f D} = 2.$ 

Az összeadás tehát:

$$5240 \\ +5210 \\ 10450$$

# Megoldás 1.6

20 pont

A megoldás 5050. Egy Gaussról szóló híres történet, amely a szájhagyomány útján átalakult, arról szól, hogy Gauss általános iskolai tanára, J. G. Büttner diákjait azzal akarta lefoglalni, hogy 1-től 100-ig adják össze az egész számokat. A fiatal Gauss mindenki megdöbbenésére másodpercek alatt előrukkolt a helyes megoldással, megvillantva matematikai éleselméjűségét: a számsor alá visszafele leírta a számokat, majd az oszlopokat összeadta, így azonos összegeket kapott:

$$1 + 100 = 2 + 99 = 3 + 98 = \dots = 50 + 51 = 101.$$

Ez összesen 50 darab számpárt jelentett, és így  $50 \cdot 101 = 5050$ .

A 20 pont a fáradságos munkát vagy a találékonyságot hivatott díjazni, valamint motivál a feladat elvégzésére és ezzel megágyaz a fenti történet és egyúttal a számtani sorok bemutatásának.

#### Megoldás 1.7

10 pont

A = 1, 
$$\acute{A}$$
 = 2, B = 3, C = 4, Cs = 5, D = 6, Dz = 7, Dzs = 8, E = 9,  $\acute{E}$  = 10, F = 11, G = 12, Gy = 13, H = 14, I = 15,  $\acute{I}$  = 16, J = 17, K = 18, L = 19, Ly = 20, M = 21, N = 22, Ny = 23, O = 24,  $\acute{O}$  = 25,  $\ddot{O}$  = 26,  $\ddot{O}$  = 27, P = 28, Q = 29, R = 30, S = 31, Sz = 32, T = 33, Ty = 34, U = 35,  $\acute{U}$  = 36,  $\ddot{U}$  = 37,  $\ddot{U}$  = 38, V = 39, W = 40, X = 41, Y = 42, Z = 43, Zs = 44.

A feladat burkoltan az is, hogy megtanuljuk, hogy mi a különbség a 40 betűs magyar ábécé és a 44 betűs kiterjesztett magyar ábécé között. Ez utóbbi tartalmazza a Q, W, X, Y betűket is. Az interneten a "magyar ábécé" keresőszó segítségével nyerhet az ember felvilágosítást erről. Emellet a adatok kódolásába is bevezet.

## 2. Prímszámok

### Megoldás 2.2

4 + 4 = 8 pont

Forrás: Imrecze et al.: Fejtörő feladatok felsősöknek

(III.1.10)

Sárinak igaza volt és a kockák felső lapján 3, 3, és 5 vagy 5, 5 és 3 pötty lehetett.

A három kockával legfeljebb  $3\cdot 6=18$ -at lehet dobni. Ennél kisebb, de 10-nél nagyobb törzsszámok: 11 és 13. A 11 három törzsszám összegeként csak mint 3+3+5 kapható, a 13 pedig mint 5+5+3. Más megoldás nincs.

Megoldás 2	.3				20 pont
2	3	5	7	11	13
17	19	23	29	31	37
41	43	47	53	59	61
67	71	73	79	83	89
97	101	103	107	109	113
127	131	137	139	149	151
157	163	167	173	179	181
191	193	197	199		

# Megoldás 2.4

12 pont

Forrás: Imrecze et al.: Fejtörő feladatok felsősöknek (III.1.5)

Az ötjegyű szám: 23572. Az egyjegyű törzsszámok: 2, 3, 5, 7 összege 17, és ha közülük a 2-t adjuk a 17-hez, csak akkor jutunk törzsszámhoz. Az  $\mathbf{M}\mathbf{A}$  csak 23 lehet, mert sem 25, sem 27 nem prímszám. Tehát  $\mathbf{M}=2, \mathbf{A}=3$ . Az  $\mathbf{M}\mathbf{L}\mathbf{O}$  vagy 257 vagy 275 lehetne, de 275 nem törzsszám, ezért  $\mathbf{L}=5, \mathbf{O}=7$ .

## Megoldás 2.5

2 pont/db

$140 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7$	$286 = 2 \cdot 11 \cdot 13$
$98 = 2 \cdot 7^2$	$2210 = 2 \cdot 5 \cdot 13 \cdot 17$
$96 = 2^5 \cdot 3$	$666 = 2 \cdot 3^2 \cdot 37$
$12376 = 2^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17$	$182 = 2 \cdot 7 \cdot 13$
$2200 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 11$	$1120 = 2^5 \cdot 5 \cdot 7$
$16 = 2^4$	$330 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$
$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$	$1012 = 2^2 \cdot 11 \cdot 23$
$600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$	$4524 = 2^2 \cdot 3 \cdot 13 \cdot 29$
$112 = 2^4 \cdot 7$	$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$
$2100 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$	$3150 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7$

#### Megoldás 2.6

Forrás: Imrecze et al.: Fejtörő feladatok felsősöknek (III.1.27)

Egy kész törzszsámtáblázat segítségével (lásd Feladat 2.3) könnyen megoldhatjuk a feladatot – azonban e nélkül is célhoz érhetünk.

Az a) kérdésre a választ megtaláljuk a Prímszámok segédanyag Eratosztenész szitája című fejezetében. De a következőképpen is gondolkodhatunk: jelöljük n-nel a  $2\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdot 11$  számot, ekkor az  $n+2,\ n+3,\ n+4,\ ...,\ n+11$  tíz egymást

követő szám között nincs prímszám, hiszen mindegyiknek van 1-nél nagyobb és nála kisebb osztója, mert mindegyik osztható a 2, 3, 5, 7, 11 törzsszámok valamelyikével. A prímszámtáblázatból azt olvashatjuk ki, hogy először a 114-gyel kezdődő 10 (13) egymást követő szám között nem találunk prímet.

3 pont

- b) Például: 48, 49, 50, 51, 52, <u>53</u>, 54, 55, 56, 57; 3 pont
- c) Például:  $\underline{19}$ , 20, 21, 22,  $\underline{23}$ , 24, 25, 26, 57, 28; 3 pont
- d) Például: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- e) Például: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 pont

Öt prímszám is előfordulhat tíz egymást követő szám között:  $\underline{2}, \underline{3}, 4, \underline{5}, 6, \underline{7}, 8, 9, 10, \underline{11},$  de ennél több nem, hiszen a 2-nél nagyobb páros számok nem törzsszámok és tíz egymást követő szám között öt páros van. 3 pont

Hosszúhetény, 2019. április 14.