MatemáticaFC

Boletim de Desempenho

6º ano, Bloco 1 — Números e Operações

Nome do estudante: Ana Júlia — exemplo fictício

Data de realização: 13/10/2026

Resumo do desempenho

Total de questões: 30

Acertos: 2 | Erros: 1 | Não respondidas: 27

Percentual de aproveitamento: 6,7%

Desempenho por assunto

Assunto	Acertos	Total	Aproveitamento
Sistema de numeração	0	6	0%
Operações com números naturais	0	6	0%
Múltiplos e divisores	0	6	0%
Frações	0	6	0%
Números decimais	2	6	33,3%

Questões sem resposta são consideradas sem acerto e estão separadas dos erros.

Para continuar estudando

Consulte as resoluções das questões sem acerto e retome os assuntos em que encontrou dificuldades. Depois, tente uma nova aplicação.

Gabarito comentado completo

Questão 1 — Comparação de etiquetas com zeros

Assunto: Números decimais

Uma balança registrou uma massa. Uma segunda etiqueta acrescentou um zero no final da parte decimal. Observe as duas etiquetas e o quadro das ordens decimais. Qual afirmação compara corretamente as massas das duas etiquetas?

Etiquetas de massa

Etiqueta A
1,50 kg

Etiqueta B
1,500 kg

Ordens da parte decimal

	U	d	c	m
A	1	5	0	—
B	1	5	0	0

U: unidade; d: décimo

c: centésimo; m: milésimo

A) As duas etiquetas indicam a mesma massa.

B) B indica 0,05 kg a mais.

C) A indica mais porque tem menos casas decimais.

D) B indica dez vezes a massa de A.

Alternativa escolhida: A) As duas etiquetas indicam a mesma massa.

Resposta correta: A) As duas etiquetas indicam a mesma massa.

Situação: Correta


Resolução comentada

1,50 kg e 1,500 kg têm o mesmo valor: 1,5 kg. Zero à direita da parte decimal não acrescenta massa; indica outra forma de escrever o mesmo valor.

Questão 2 — Litros e mililitros no pedido

Assunto: Números decimais

Uma jarra precisa atender a um pedido em litros, mas seu conteúdo e sua reserva obrigatória estão indicados em mililitros. Observe a jarra graduada, o pedido e a indicação da reserva. O pedido pode ser atendido preservando a reserva?



A) Não; faltam 50 mL.

B) Não; faltam 500 mL.

C) Sim; sobram 625 mL além da reserva.

D) Sim; sobram 50 mL além da reserva.

Alternativa escolhida: A) Não; faltam 50 mL.

Resposta correta: A) Não; faltam 50 mL.

Situação: Correta

Resolução comentada

O pedido é de 750 mL. Preservando 100 mL, só há 700 mL disponíveis. Faltam 50 mL; os 800 mL totais não estão todos livres para o pedido.

Questão 3 — A igualdade perdida na cópia

Assunto: Números decimais

Uma planilha registra 6,08 m. Ao copiar para um campo com uma casa decimal, o operador arredonda ao décimo mais próximo. Quanto a nova indicação difere da original? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) Fica 0,08 m menor.

B) Não muda o valor.

C) Fica 0,02 m maior.

D) Fica 0,2 m maior.

Alternativa escolhida: A) Fica 0,08 m menor.

Resposta correta: C) Fica 0,02 m maior.

Situação: Incorreta


Resolução comentada

6,08 arredonda para 6,1. A diferença é $6{,}10 - 6{,}08 = 0{,}02$ m a mais. Reduzir casas decimais não é simplesmente cortar o último algarismo.

Questão 4 — Caminho com uma ponte fechada

Assunto: Operações com números naturais

Um mapa simplificado oferece dois caminhos entre a mesma origem e o mesmo destino. A ponte da rota A está fechada, e o desvio substitui o trecho da ponte: não se percorrem os dois. Observe o esquema e as distâncias em metros; o desenho não está em escala. Depois do fechamento, qual caminho é mais curto?



A) B, com 400 m; A fica com 440 m.

B) A, com 350 m; B tem 400 m.

C) A, com 270 m; B tem 400 m.

D) B, com 400 m; A fica com 520 m.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) B, com 400 m; A fica com 440 m.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

A passa a 120+170+150=440 m; B mede 190+210=400 m. B é 40 m mais curto. Somar o desvio sem retirar a ponte contaria dois caminhos para o mesmo trecho.

Questão 5 — Numeração dos dois lados

Assunto: Sistema de numeração

Uma encadernadora numera todas as páginas de um caderno, inclusive as páginas em branco. O trecho mostrado é formado apenas por folhas completas: cada folha tem uma página na frente e outra no verso. A primeira folha começa na página 41 e a última termina na página 80. Observe o esquema das folhas. Quantas folhas completas há nesse trecho?



A) 19 folhas.

B) 39 folhas.

C) 40 folhas.

D) 20 folhas.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) 20 folhas.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

O trecho inclui as páginas de 41 a 80: são 80 − 41 + 1 = 40 páginas. Como todas pertencem a folhas completas, com duas páginas por folha, há 40 ÷ 2 = 20 folhas. A primeira reúne as páginas 41 e 42; a última, 79 e 80.

Questão 6 — Usando a parte que sobrou

Assunto: Frações

Uma oficina utiliza uma fração de uma cartolina no primeiro trabalho. No segundo, usa metade do que restou. Observe o esquema da cartolina e a indicação do segundo uso. Que fração da cartolina original sobra ao final?



A) 1/3.

B) 1/6.

C) 2/3.

D) 1/2.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) 1/3.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Depois do primeiro trabalho restam 2/3. Metade desses 2/3 é 1/3, usada no segundo; a outra metade, também 1/3, fica. Não se subtrai 1/2 do inteiro original.

Questão 7 — Encontro impossível dos alertas

Assunto: Múltiplos e divisores

Um alerta aparece nos minutos 0,4,8,12,...; outro nos minutos 1,5,9,13,... . O monitor pergunta se haverá um encontro se esperar bastante. Qual conclusão é correta? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) Não; os instantes mantêm restos diferentes na divisão por quatro.

B) Sim; no minuto cinco, os dois já apareceram antes.

C) Sim; todo par de ciclos acaba coincidindo.

D) Sim; basta esperar quatro minutos.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) Não; os instantes mantêm restos diferentes na divisão por quatro.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Não há encontro: o primeiro alerta deixa resto zero ao dividir seu minuto por quatro; o segundo deixa resto um. Esperar mais repete esses restos, sem uni-los.

Questão 8 — Zero à esquerda de um protocolo

Assunto: Sistema de numeração

Um sistema de protocolos usa seis posições e completa à esquerda com zeros. O protocolo numérico é 4.812. Qual texto de seis posições identifica o mesmo protocolo? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) 040812.

B) 481200.

C) 048120.

D) 004812.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) 004812.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Completar com dois zeros à esquerda produz 004812. Zeros à esquerda não mudam o valor; colocar zeros no meio ou no fim muda o número.

Questão 9 — Excluindo cópias e preservando originais

Assunto: Operações com números naturais

Uma pasta tem 8 arquivos originais. Cada um foi copiado duas vezes, além do original. Apagar apenas todas as cópias deixa quantos arquivos? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) 0.

B) 24.

C) 8.

D) 16.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: C) 8.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Cada original gera duas cópias, mas continua existindo. Apagar as 16 cópias deixa os oito originais. Não se apagam todos os 24 arquivos.

Questão 10 — Leitura com unidade abreviada

Assunto: Sistema de numeração

O portal de um projeto escolar mostra a quantidade de acessos usando a letra k para indicar mil. Observe o painel. Qual quantidade de acessos ele apresenta?



A) 24.000 acessos.

B) 2.400 acessos.

C) 24 acessos.

D) 2.040 acessos.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) 2.400 acessos.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

A unidade k significa mil: 2,4 milhares são 2 milhares e 4 décimos de milhar, isto é, 2.400. Não são 24 nem 2.040.

Questão 11 — Porções não significam copos inteiros

Assunto: Frações

Uma reserva de tinta corresponde a 7/3 de um copo-padrão. Qual descrição indica corretamente quantos copos completos e qual sobra podem ser separados? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) 3 copos completos, sem sobra.

B) 7 copos e 1/3.

C) 2 copos completos e 1/3 de copo.

D) 2 copos e 1/7.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: C) 2 copos completos e 1/3 de copo.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

7/3=6/3+1/3=2+1/3. É possível separar dois copos completos e um terço, não sete copos.

Questão 12 — Mesma tinta, dois tamanhos

Assunto: Números decimais

Uma loja vende a mesma tinta em dois tamanhos de frasco. A compra deve ser feita em frascos inteiros, todos do mesmo tamanho: somente A ou somente B. O volume total adquirido precisa ser exatamente 2 litros, sem falta nem excedente. Observe as capacidades e os preços por frasco. Qual escolha atende ao pedido pelo menor preço?



A) Dois frascos A: 2 L por R$ 6,40.

B) Três frascos B: exatamente 2 L por R$ 14,40.

C) Dois frascos B: 2 L por R$ 9,60.

D) Quatro frascos A: 2 L por R$ 12,80.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) Quatro frascos A: 2 L por R$ 12,80.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

São quatro frascos A, total 2 L e 12,80 reais. Frascos B não podem fornecer exatamente 2 L em quantidade inteira: $2 \div 0{,}8 = 2{,}5$ frascos. Apesar de B custar menos por litro, essa compra não permite abrir frascos.

Questão 13 — Maior número sem ultrapassar o teto

Assunto: Sistema de numeração

Um equipamento aceita identificadores de quatro algarismos diferentes. Deve-se usar cada algarismo disponível uma única vez. Observe os algarismos disponíveis e os espaços do identificador. Qual é o maior identificador permitido abaixo do teto?



A) 5.812.

B) 5.521.

C) 5.821.

D) 8.521.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: C) 5.821.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

O primeiro algarismo não pode ser 8. Usamos 5 para maximizar os milhares e depois 8, 2 e 1 em ordem decrescente: 5.821, ainda abaixo de 6.000.

Questão 14 — Pontos com penalidade

Assunto: Operações com números naturais

Uma oficina de programação criou uma regra de pontuação: acertos dão pontos e tentativas inválidas retiram pontos. Observe os grupos de acertos e penalidades no esquema. Qual é o saldo da rodada?



A) 35 pontos.

B) 41 pontos.

C) 29 pontos.

D) 32 pontos.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: C) 29 pontos.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

Os acertos geram 35 pontos; as três penalidades retiram 6. O saldo é 29, não 35 nem 41.

Questão 15 — Comparar pedaços de duas fitas

Assunto: Frações

Um pedaço da fita A será expresso como fração da fita B inteira. A medida física desse pedaço permanece a mesma: ele não é cortado nem ampliado quando muda o inteiro de referência. Observe as fitas e seus comprimentos. Qual fração da fita B equivale ao pedaço da fita A?



A) 3/5.

B) 1/4.

C) 5/6.

D) 1/2.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) 1/2.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

O pedaço A mede 20×3/5=12 cm. Em uma fita B de 24 cm, 12 cm representam 12/24=1/2. Não se conserva automaticamente a fração ao trocar o inteiro.

Questão 16 — Uma planta entre estacas

Assunto: Múltiplos e divisores

Uma borda de jardim tem estacas igualmente espaçadas. As plantas serão colocadas junto às estacas correspondentes, começando na primeira estaca e avançando dois espaços entre estacas a cada plantio. Observe o esquema. Quantas plantas ficam da primeira até a última estaca, incluindo uma planta em cada extremo?



A) 10 plantas.

B) 19 plantas.

C) 18 plantas.

D) 9 plantas.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) 10 plantas.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

Dezoito espaços correspondem a nove intervalos de plantio. Contando a planta inicial, são dez plantas nas posições 0,2,4,...,18.

Questão 17 — Duas telas, um intervalo

Assunto: Sistema de numeração

Duas telas independentes arredondam a mesma contagem: uma à centena e outra ao milhar. Nos pontos médios, ambas arredondam para cima. Observe as leituras e os passos das duas escalas; elas estão desenhadas com ampliações diferentes. Qual opção apresenta todos os valores inteiros compatíveis com as duas telas?



A) De 8.500 a 9.499.

B) De 8.700 a 9.000.

C) De 8.650 a 8.750.

D) De 8.650 a 8.749.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) De 8.650 a 8.749.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

A primeira tela admite 8.650 a 8.749. A segunda admite 8.500 a 9.499. A interseção é 8.650 a 8.749, incluindo ambos os extremos.

Questão 18 — Metade de uma metade

Assunto: Frações

Uma folha foi dobrada ao meio; depois, apenas uma das metades foi dividida em duas partes iguais para fazer etiquetas. Observe o esquema da folha. Uma dessas etiquetas corresponde a qual fração da folha original?



A) 1/2.

B) 1/3.

C) 1/4.

D) 2/3.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: C) 1/4.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

A etiqueta é metade de uma metade: 1/2 × 1/2 = 1/4 da folha. O inteiro de referência continua sendo a folha inicial, não a metade. As três regiões finais não possuem todas a mesma área: a metade não subdividida ocupa 1/2 da folha, enquanto cada uma das duas etiquetas ocupa 1/4. Por isso, contar três regiões e concluir que cada uma representa 1/3 seria incorreto.

Questão 19 — Borda de uma placa

Assunto: Operações com números naturais

Uma placa retangular tem quadradinhos em linhas e colunas. Só os da borda serão pintados; cada canto conta uma vez. Observe a grade de seis linhas e oito colunas. Quantos quadradinhos serão pintados?



A) 20.

B) 48.

C) 28.

D) 24.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) 24.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

Duas linhas externas têm 16 quadradinhos. Nas duas colunas externas sobram 4 quadradinhos por coluna, sem os cantos. Total 16+8=24.

Questão 20 — Desconto ou entrega grátis

Assunto: Operações com números naturais

Duas lojas vendem o mesmo equipamento pelo mesmo preço. A loja A dá desconto no produto e cobra entrega; a loja B vende pelo preço anunciado e oferece entrega grátis. Observe os dois esquemas de preço. Qual oferta gera o menor gasto total?



A) Loja B: R$ 80,00; A custa R$ 83,00.

B) Loja A: R$ 65,00; B custa R$ 80,00.

C) Loja A: R$ 68,00; B custa R$ 80,00.

D) Loja B: R$ 80,00; A custa R$ 95,00.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) Loja B: R$ 80,00; A custa R$ 83,00.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

A custa $80-12+15=83$ reais; B custa 80. A entrega grátis de B economiza três reais em relação ao desconto de A.

Questão 21 — Organizar duas prateleiras sem conhecer o total

Assunto: Múltiplos e divisores

Cada uma de duas caixas tem uma quantidade ímpar de peças. Ao reunir as caixas, é garantido que o total seja par? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) Não; juntar dois ímpares sempre dá ímpar.

B) Sim; as sobras de uma peça se juntam e completam outro par.

C) Não; só se as caixas tiverem a mesma quantidade.

D) Não; só se as quantidades forem múltiplas de dez.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) Sim; as sobras de uma peça se juntam e completam outro par.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

Sim. Cada caixa deixa uma peça ao formar pares; as duas peças restantes formam outro par. Ímpar mais ímpar é par.

Questão 22 — Sinal que começou depois

Assunto: Múltiplos e divisores

O sinal luminoso A aparece inicialmente no minuto zero e depois volta a aparecer a cada seis minutos. O sinal B aparece inicialmente no minuto três e depois volta a aparecer a cada nove minutos. Observe as linhas do tempo. Em qual minuto eles aparecem juntos pela primeira vez?



A) 6 minutos.

B) 12 minutos.

C) 9 minutos.

D) 18 minutos.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) 12 minutos.

Situação: Não respondida

Resolução comentada


A aparece nos minutos 0, 6, 12, 18, 24, ...; B aparece nos minutos 3, 12, 21, 30, ... O primeiro instante comum é o minuto 12. Calcular MMC(6, 9) = 18 sem considerar os instantes iniciais ignoraria que B começou três minutos depois de A.

Questão 23 — Passos de uma peça de precisão

Assunto: Números decimais

Uma máquina faz cortes somente nas marcas de uma escala com passo fixo. A peça pedida tem uma medida intermediária. Observe a reta decimal e a posição do pedido. Qual marca

permitida fica mais perto da medida pedida?



A) 1,20 cm.

B) 1,13 cm.

C) 1,10 cm.

D) 1,15 cm.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) 1,15 cm.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

As marcas vizinhas são 1,10 e 1,15. As distâncias ao pedido são 0,03 e 0,02, respectivamente. A marca 1,15 é a mais próxima; 1,13 não é múltipla do passo 0,05.

Questão 24 — Total desconhecido, parte conhecida

Assunto: Frações

O esquema representa o estoque inteiro dividido em cinco partes com a mesma quantidade de objetos. As três partes destacadas correspondem aos 18 objetos já catalogados. Quantos objetos existem no estoque completo?



A) 30 objetos.

B) 24 objetos.

C) 90 objetos.

D) 10,8 objetos.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) 30 objetos.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

Se três quintos são 18 objetos, cada quinto tem seis. O total de cinco quintos é 30. Multiplicar 18 por 3/5 calcularia uma fração da parte já conhecida.

Questão 25 — Cartaz retangular com linhas limitadas

Assunto: Múltiplos e divisores

Um painel será montado com todas as peças, em um retângulo com pelo menos duas linhas e duas colunas. Observe as peças disponíveis no esquema; elas podem ser reorganizadas para montar o painel. Qual conclusão é correta para a quantidade dada?



A) É possível usar 4 linhas de 9 peças.

B) Não é possível; não há divisor que produza duas dimensões maiores que 1.

C) É possível usar 3 linhas de 12 peças.

D) É possível usar 2 linhas, pois todo ímpar é divisível por 2.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) Não é possível; não há divisor que produza duas dimensões maiores que 1.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

Para usar todas as 37 peças, o número de linhas deve dividir 37 sem sobra. Se houvesse pelo menos sete linhas e sete colunas, seriam necessárias pelo menos 7 × 7 = 49 peças. Assim, em qualquer retângulo permitido, uma das dimensões teria de ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Ao agrupar 37 peças nessas quantidades, há sobra: 37 = 2 × 18 + 1; 37 = 3 × 12 + 1; 37 = 4 × 9 + 1; 37 = 5 × 7 + 2; 37 = 6 × 6 + 1. Portanto, nenhum desses agrupamentos usa todas as peças. Só são possíveis 1 × 37 e 37 × 1, que não atendem à exigência de pelo menos duas linhas e duas colunas.

Questão 26 — A prateleira e a folga

Assunto: Números decimais

Uma prateleira precisa de uma folga total mínima além da soma das larguras de três caixas. Observe a prateleira e as caixas, desenhadas na mesma escala, e a folga mínima exigida. As três caixas cabem respeitando a folga?



A) Sim; a folga é 0,015 m.

B) Sim; sobram 0,035 m.

C) Sim; sobram 0,15 m.

D) Não; faltam 0,015 m.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) Sim; a folga é 0,015 m.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

As caixas ocupam 0,24+0,315+0,28=0,835 m. Sobram 0,015 m, mais que a folga mínima de 0,01; cabem. Arredondar cada largura antes da soma pode falsear a conclusão.

Questão 27 — Caixas e recombinação dos agrupamentos

Assunto: Múltiplos e divisores

Duas caixas foram embaladas separadamente em grupos de seis objetos. As sobras podem ser reunidas sem alterar os grupos completos. Observe o esquema das caixas e dos agrupamentos. Ao reunir as duas caixas, será possível embalar tudo em grupos de seis?



A) Não; só os quatro grupos já completos podem ser usados.

B) Sim, formam cinco grupos completos.

C) Sim, formam seis grupos completos.

D) Não; só há dois grupos completos no total.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) Sim, formam cinco grupos completos.

Situação: Não respondida


Resolução comentada

A primeira caixa deixa quatro objetos e a segunda deixa dois. As sobras juntas formam outro grupo de seis. O total é 30, suficiente para cinco grupos sem sobra; não é necessário que cada caixa individual seja múltipla de seis.

Questão 28 — Completar com placas iguais

Assunto: Frações

Uma faixa de isolamento já está parcialmente coberta. As peças disponíveis são todas iguais, e cada uma cobre 1/16 da faixa inteira. Elas devem cobrir exatamente toda a parte restante, sem sobreposição nem sobras. Observe a faixa e o modelo de uma peça na mesma escala de comprimento. Quantas peças são necessárias?



A) 3 peças.

B) 6 peças.

C) 10 peças.

D) 16 peças.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) 6 peças.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Falta 3/8=6/16 da faixa. Cada peça cobre 1/16, então são necessárias seis peças. Dividir a parte já coberta pelo tamanho da peça responderia outra pergunta.

Questão 29 — Comparação sem calcular os produtos inteiros

Assunto: Operações com números naturais

Uma escola precisa escolher entre a oferta A, com 49 caixas de 20 folhas cada, e a oferta B, com 50 caixas de 19 folhas cada. Qual oferta tem mais folhas e por quantas? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) A, com 1 a mais.

B) Empate.

C) B, com 30 a mais.

D) A, com 30 folhas a mais.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) A, com 30 folhas a mais.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Podemos comparar por compensação, usando a mesma referência: 50 caixas com 20 folhas cada. A oferta A tem uma caixa de 20 folhas a menos que essa referência, portanto retira 20 folhas. A oferta B tem uma folha a menos em cada uma das 50 caixas, portanto retira 50 folhas. Como a oferta A retira 30 folhas a menos (50 − 20 = 30), ela fornece 30 folhas a mais que B, sem precisar calcular os dois produtos completos. Como conferência, A fornece 49 × 20 = 980 folhas e B fornece 50 × 19 = 950 folhas; a diferença também é 30.

Questão 30 — Estimativa que cabe no intervalo

Assunto: Sistema de numeração

Uma contagem exata está entre 18.000 e 19.000, sem incluir esses limites. Um relatório dá uma estimativa que deve ter diferença menor que 100 para qualquer contagem possível. É possível escolher uma única estimativa inteira com essa garantia? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) Não; os valores 18.001 e 18.999, ambos possíveis, não podem ficar a menos de 100 de uma mesma estimativa.

B) Sim; qualquer estimativa de 18 mil atende.

C) Sim; 18.500 fica a menos de 100 de qualquer valor da faixa.

D) Sim; 19.000 é sempre a aproximação mais próxima.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) Não; os valores 18.001 e 18.999, ambos possíveis, não podem ficar a menos de 100 de uma mesma estimativa.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Não. Considere duas contagens possíveis: 18.001 e 18.999. Para ficar a menos de 100 de 18.001,

uma estimativa inteira deve estar de 17.902 a 18.100. Para ficar a menos de 100 de 18.999, deve estar de 18.900 a 19.098. Esses intervalos não têm nenhum número em comum. Assim, nenhuma estimativa única atende à precisão exigida para todas as contagens possíveis. Isso não significa que todas as contagens estejam distantes entre si: há também contagens consecutivas no intervalo.