

Estado	Finalizado
Comenzado	sábado, 30 de mayo de 2026, 10:18
Completado	sábado, 30 de mayo de 2026, 10:21
Duración	3 minutos 6 segundos
Puntos	10,00/10,00
Calificación	20,00 de 20,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la aceleración angular?

Seleccione una:

- ☐ a. La distancia recorrida en la circunferencia
- ☐ b. El producto de la masa por la aceleración
- ☐ c. La velocidad lineal entre el radio
- ☒ d. El cambio de velocidad angular por unidad de tiempo ✓

La respuesta correcta es: El cambio de velocidad angular por unidad de tiempo



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes situaciones representa un MCUV?

Seleccione una:

- ☒ a. Un ventilador que disminuye su velocidad angular hasta detenerse ✓
- ☐ b. Una piedra cayendo libremente
- ☐ c. Una bicicleta avanzando en línea recta
- ☐ d. Un satélite en órbita circular con velocidad constante

La respuesta correcta es: Un ventilador que disminuye su velocidad angular hasta detenerse

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV)?

Seleccione una:

- ☐ a. No hay aceleración
- ☐ b. La trayectoria no es circular
- ☐ c. La aceleración angular es variable
- ☒ d. La velocidad angular cambia uniformemente con el tiempo ✓



La respuesta correcta es: La velocidad angular cambia uniformemente con el tiempo

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la expresión para la velocidad angular final en el MCUV?

Seleccione una:

- ☒ a. $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$ ✓
- ☐ b. $\omega = 2\pi \alpha \cdot t$
- ☐ c. $\omega = \omega_0 \cdot t^2$
- ☐ d. $\omega = \alpha \cdot \omega_0$

La respuesta correcta es: $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se calcula el desplazamiento angular en MCUV?

Seleccione una:

- ☐ a. $\theta = \omega_0^2 + \alpha$
- ☐ b. $\theta = \omega \cdot t^2$
- ☒ c. $\theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$ ✓
- ☐ d. $\theta = \alpha \cdot t$

La respuesta correcta es: $\theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$ ^

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si la aceleración angular es negativa?

Seleccione una:

- ☒ a. La velocidad angular disminuye con el tiempo ✓
- ☐ b. El cuerpo se detiene de inmediato
- ☐ c. La velocidad angular aumenta
- ☐ d. No cambia la velocidad

La respuesta correcta es: La velocidad angular disminuye con el tiempo

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un objeto que gira y reduce su velocidad angular con el tiempo realiza:

Seleccione una:

- ☐ a. Un MCU con aceleración positiva
- ☐ b. Un movimiento con aceleración nula
- ☒ c. Un movimiento circular uniformemente retardado ✓
- ☐ d. Un movimiento rectilíneo

La respuesta correcta es: Un movimie ^ circular uniformemente retardado

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la unidad de aceleración angular en el Sistema Internacional?

Seleccione una:

- ☐ a. Metros por segundo cuadrado
- ☐ b. Radianes por segundo (rad/s)
- ☐ c. Grados por segundo
- ☒ d. Radianes por segundo al cuadrado (rad/s²) ✓

La respuesta correcta es: Radianes por segundo al cuadrado (rad/s²)

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede con la velocidad angular en el MCUV?

Seleccione una:

- ☒ a. Aumenta o disminuye linealmente con el tiempo ✓
- ☐ b. Se anula en todo instante
- ☐ c. Cambia aleatoriamente
- ☐ d. Permanece constante

La respuesta correcta es: Aumenta o  disminuye linealmente con el tiempo

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se relaciona la velocidad tangencial con la velocidad angular?

Seleccione una:

- ☐ a. $v = a \cdot t^2$
- ☒ b. $v = \omega \cdot r$ ✓
- ☐ c. $v = r / \omega$
- ☐ d. $v = \omega / r$

La respuesta correcta es: $v = \omega \cdot r$

