

**Rješenja Završnog ispita iz Fizike 1**  
**ponedjeljak, 29. 06. 2015.**

**Teorijska pitanja**

**1.**

(a) U relativističkoj fizici *Lorentzov faktor*  $\gamma$  iznosi (zaokruži točnu tvrdnju):

**(1 bod)**

a)  $\gamma = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

b)  $\gamma = v/c$

c)  $\gamma = 1$

d)  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

e) Ništa od navedenog nije točno.

**Rješenje: d)**

(b) U gibanju *Foucaultovog njihala* (pokus u B<sub>1</sub>), *zakret ravnine* njihala daje (zaokruži točnu tvrdnju):

**(1 bod)**

a) samo težina (gravitacija) kugle njihala,

b) samo cetrifugalna sila zbog vrtnje Zemlje,

c) centrifugalna i Coriolisova sila,

d) samo Coriolisova sila,

e) sve tri spomenute sile zajedno.

**Rješenje: d)**

(c) Krivuljom *adijabatom* u  $p - V$  dijagramu opisujemo proces u kojemu idealni plin (zaokruži točnu tvrdnju):

**(1 bod)**

a) ne razmjenjuje rad s okolinom ( $\delta W = 0$ ),

b) nema promjenu svoje unutrašnje energije ( $dU = 0$ ),

c) vrši rad na račun promjene svoje unutrašnje energije,

d) tlak o volumenu ovisi prema Boyle–Mariotteovu zakonu,

e) ništa navedeno nije točno.

**Rješenje: c)**

(d) Pri adijabatskoj ekspanziji plina vrijedi (zaokruži točnu tvrdnju):

**(1 bod)**

- a) Temperatura i tlak se smanjuju.
- b) Temperatura se povećava, a tlak se smanjuje.
- c) Plin prima toplinu i temperatura mu se povećava.
- d) Plin ne prima toplinu i temperatura mu je stalna.
- e) Temperatura se smanjuje, a tlak se povećava.

**Rješenje: a)**

(e) Kada se lonac vode na štednjaku zagrije do  $100^\circ\text{C}$  (točna vrijednost ovisi o trenutnoj vrijednosti atmosferskog tlaka) te štednjak nastavlja grijati lonac (zaokruži točnu tvrdnju):

**(1 bod)**

- a) sva voda trenutno prelazi u paru,
- b) voda ne prelazi u paru sve dok temperatura bitno ne premaši  $100^\circ\text{C}$ ,
- c) voda postupno prelazi u paru jer ona ima velik specifični toplinski kapacitet,
- d) voda postupno prelazi u paru jer je za to potrebna latentna toplina isparavanja,
- e) ništa od navedenog nije točno.

**Rješenje: d)**

(f) Od dva metala različitih gustoća izliveno se dvije homogene kugle koje su potpuno uronjene u istu tekućinu. Obje su kugle zbog toga za jednaki iznos "prividno izgubile na težini" (uzgoni na kugle su jednaki). Ako se gustoće kugala odnose kao  $\rho_1 = 3\rho_2$  tada je ( $V_{1,2}$  su volumeni,  $m_{1,2}$  su mase,  $G_{1,2}$  su težine,  $R_{1,2}$  su polumjeri,  $U_{1,2}$  su uzgoni) (Zaokruži točnu tvrdnju.)

**(1 bod)**


- a)  $V_1 = 3V_2$
- b)  $G_2 = 3G_1$
- c)  $G_1 - U_1 = G_2 - U_2$
- d)  $m_1 = 3m_2$
- e)  $R_1 = \sqrt[3]{R_2}$

**Rješenje: d)**

(g) Rad pri izotermnoj promjeni stanja  $n$  molova idealnog plina od stanja A do B jednak je radu pri izobarnoj promjeni stanja plina od 1 do 2 (prema slici). Ako je  $V_1 = (V_B - V_A)/2$ , tada je (zaokruži točnu tvrdnju):

**(1 bod)**

- a)  $V_B = 2V_A$
- b)  $T_1 = 400\text{K}$  i  $V_B = 400V_A$
- c)  $V_B = V_A + nRT_1$
- d)  $V_B = e^2V_A$
- e)  $V_B/V_A = \ln 2$



**Rješenje: d)**

2.

(a) Detaljno izvedi Lorentzove transformacije.

**(4 boda)**

(b) Za Carnotov proces izračunaj:

- Topline koje toplinski stroj uzme iz spremnika na višoj temperaturi i preda spremniku na nižoj temperaturi.

- Faktor korisnog djelovanja kao funkciju temperatura spremnika.

**(5 bodova)**

### Zadaci

1. Žica polukružnog oblika polumjera  $r = 1,6$  m, mase  $m_1 = 30$  g djeluje gravitacijskom silom  $F = 1,2 \cdot 10^{-15}$  N na materijalnu točku smještenu u središtu zakrivljenosti polukružnice koju čini žica. Kolika je masa materijalne točke?

**(6 bodova)**

### **Rješenje:**

$$r = 1,6 \text{ m}$$

$$m_1 = 30 \text{ g} = 0,03 \text{ kg}$$

$$F = 1,2 \cdot 10^{-15} \text{ N}$$

$$G = 6,672 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg s}^2)$$

---

$$m_2 = ?$$

Postavimo Cartesijev dvodimenzionalni koordinatni sustav tako da ishodište sustava bude u centru zakrivljenosti polukružnice a os y prolazi kroz oba kraja polukružnice. Da bismo izračunali gravitacijsku silu između žice i materijalne točke smještene u ishodištu odaberimo proizvoljni infinitezimalni djelić mase žice  $dm_2$  smješten u točki čiji radijvektor zatvara s pozitivnim smjerom osi x kut  $\alpha$ . Gravitacijska sila  $dF$  između materijalne točke u ishodištu mase  $m_1$  i infinitezimalnog djelića mase žice  $dm_2$  jednaka je po iznosu  $G \cdot m_1 \cdot dm_2 / r^2$  i ima smjer radijvektora proizvoljnog infinitezimalnog djelića mase žice. Rastavimo li tu infinitezimalnu silu na komponente u smjeru osi x i y uočavamo da će se y komponente sile poništavati zbog djelovanja gravitacijske sile od s obzirom na os x simetričnog infinitezimalnog djelića mase žice. Infinitezimalna gravitacijska sila bit će u smjeru osi x i iznositi će  $2 \cos \alpha \cdot G \cdot m_1 \cdot dm_2 / r^2$ . Rezultantnu silu dobit ćemo integracijom po kutu  $\alpha$  od 0 do  $\pi/2$  infinitezimalne gravitacijske sile. Pošto je  $dm_2 = (m_2 / \pi) \cdot d\alpha$  i pošto  $G$ ,  $m_1$  i  $r$  ne ovise o  $\alpha$  to ostaje samo  $\int \cos \alpha \cdot d\alpha$  u granicama od 0 do  $\pi/2$ . Taj je integral jednak jedinici tako da na kraju dobivamo da je rezultatna gravitacijska sila

$$F = (2G \cdot m_1 \cdot m_2) / (r^2 \cdot \pi).$$

Iz gornjeg izraza možemo masu materijalne točke  $m_2$  dati sljedećom relacijom

$$m_2 = (F \cdot r^2 \cdot \pi) / (2G \cdot m_1)$$

Uvrštavanjem zadanih veličina u gornji izraz dobivamo  $m_2 = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ .

2. Galaksija G1 se od nas udaljava brzinom  $0.4 c$ . Druga galaksija G2 se istim iznosom brzine  $0.4 c$  od nas udaljava u suprotnom smjeru. Za promatrača koji miruje u G1, kojom brzinom se giba G2? (6 bodova)


**Rješenje:**

Brzine  $v_1 = +0.4 c$  i  $v_2 = -0.4 c$  mjerene su u sustavu naše galaksije, koji ćemo nazvati sustav  $S$ . Brzinu  $v_2 = -0.4 c$  potrebno je transformirati u sustav galaksije G1 (nazovimo ga  $S'$ ), koji se u odnosu na  $S$  giba brzinom  $v = +0.4 c$ .

$$v'_2 = \frac{v_2 - v}{1 - vv_2/c^2} ,$$

$$v'_2 = \frac{-0.4 c - 0.4 c}{1 - 0.4 c(-0.4 c)/c^2} = -\frac{0.8 c}{1 + 0.4^2} = -0.7 c .$$

3. Radnici znaju da je dio sustava vodoopskrbe napravljen cijevima različitih promjera. Nove cijevi imaju promjer  $d_1 = d_3 = 5$  cm i kroz njih je izmjereno da voda teče brzinom  $v_1 = v_3 = 3$  m/s. Stari dio, između novih dijelova (vidi sliku), je nepoznatog promjera  $d_2$ . Ako je u točki A puštena boja, koja se pojavila u točki B nakon 40 s, koliki je promjer stare cijevi  $d_2$ ? Udaljenost točaka A i B je 80 m, udaljenost točke A (i B) do starog dijela cijevi  $l_1 = l_3 = 20$  m.



(6 bodova)

**Rješenje:**

Ukupno vrijeme putovanja boje možemo napisati kao zbroj vremena putovanja po segmentima  $T = 80 \text{ s} = t_1 + t_2 + t_3$ . Vremena u novim cijevima određena su zadanim duljinama i brzinama  $t_1 = t_3 = l_1/v_1 = 6.67 \text{ s}$ , pa slijedi da je vrijeme potrebno za prolazak boje starim cijevima  $t_2 = 26.67 \text{ s}$ . Iz toga slijedi da je brzina vode kroz stari dio cijevi  $v_2 = l_2/t_2 = 1.5 \text{ m/s}$ .

Pomoću jednadžbe kontinuiteta određujemo promjer stare cijevi:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 ,$$

$$\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 v_1 = \left(\frac{d_2}{2}\right)^2 v_2 .$$

$$d_2 = d_1 \sqrt{\frac{v_1}{v_2}} .$$

Za zadane brojeve  $d_2 = 7.07 \text{ cm}$ .

4. Deset grama kisika je pod tlakom od  $3 \cdot 10^5 \text{ Nm}^{-2}$  na temperaturi  $12 \text{ }^\circ\text{C}$ . Nakon grijanja na konstantnom tlaku, plin ima volumen  $10 \text{ litara}$ . Koja količina topline je predana plinu? Kisik se ponaša kao idealni plin.

**(6 bodova)**

**Rješenje:**

$$n = \frac{10}{32} \text{ mol} = 0,3125 \text{ mol}$$

$$T_2 = \frac{p V_2}{n R}$$

$$T_2 = \frac{3 \cdot 10^5 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{0,3125 \cdot 8,314} \text{ K} = 1154,679 \text{ K}$$

$$C_p = \frac{7}{2} R$$

$$\Delta Q = n C_p (T_2 - T_1)$$

$$\Delta Q = 0,3125 \cdot \frac{7}{2} \cdot 8,314 (1154,679 - 285,15) \text{ J} = 7907 \text{ J}$$