

Fizika 1 završni (odabrani izvodi)

Jednadžba kontinuiteta

Zbog zakona očuvanja mase količina mase koja se promijeni u vremenu, mora biti stalna.




$$\frac{\Delta m_1}{\Delta t} = \frac{\Delta m_2}{\Delta t} \quad |$$

$$\frac{\rho \cdot \Delta V_1}{\Delta t} = \frac{\rho \cdot \Delta V_2}{\Delta t} \quad |$$

$$\frac{\rho \cdot S_1 \cdot v_1 \cdot \Delta t}{\Delta t} = \frac{\rho \cdot S_2 \cdot v_2 \cdot \Delta t}{\Delta t} \quad |$$

$$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2 \quad |$$

Bernoullijeva jednadžba



$$\Delta W_1 = \Delta W_2 + \Delta K + \Delta U$$

$$\Delta m = \rho \cdot \Delta V$$

Sila:

$$F = p \cdot S$$

Put na kojem djeluje sila:

$$s = v \cdot \Delta t$$

Slijedi:

$$p_1 \cdot S_1 \cdot v_1 \cdot \Delta t = p_2 \cdot S_2 \cdot v_2 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \Delta V \cdot (v_2^2 - v_1^2) + \rho \cdot \Delta V \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$$

Interludij:

$$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2 = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Slijedi:

$$p_1 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2) + \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$$

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

Jednadžba adijabate

$$dQ = 0 = dU + dW$$

Zamijenom:

$$dU = n \cdot C_v \cdot dT$$

$$dW = p \cdot dV$$

Idealni plin:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Deriviranjem prethodnog izraza:

$$p \cdot dV + dp \cdot V = n \cdot R \cdot dT$$

$$dT = \frac{p \cdot dV + dp \cdot V}{n \cdot R}$$

Kada sve ubacimo:

$$0 = n \cdot C_v \cdot \frac{p \cdot dV + dp \cdot V}{n \cdot R} + p \cdot dV$$

Množimo s $\frac{R}{p \cdot V \cdot C_v}$

$$0 = \frac{C_v + R}{C_v} \cdot \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p}$$

$$\kappa = \frac{C_v + R}{C_v}$$

Dobili smo dif. jednadžbu adijabatskog procesa:

$$\kappa \cdot \frac{dV}{V} = - \frac{dp}{p}$$


Integracijom se dobiva:

$$\kappa \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = -\ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

$$\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\kappa = \ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right)$$

$$\frac{V_2^\kappa}{V_1^\kappa} = \frac{p_1}{p_2}$$

Lorentzove transformacije



Lorentzove transformacije možemo izvesti u sljedeća četiri koraka:

1. Razmatranjem koordinata čestice koja miruje u jednom od dva referentna okvira dolazimo do općenitog oblika transformacije x , x' , t i t' koordinata. Ako čestica miruje u S' , njena je x' -koordinata stalna u vremenu, dok se u odnosu na S ona giba brzinom iznosa v u pozitivnom smjeru x -osi, što znači da je veličina $x - vt$ stalna u vremenu. S obzirom da Lorentzova transformacija mora biti linearna transformacija, zaključujemo da ona mora imati oblik

$$x' = \gamma(x - vt), \quad (\text{B.1})$$

gdje je γ za sada nepoznati koeficijent koja ne ovisi o koordinatama događaja, ali može ovisiti o iznosu relativne brzine v . Ponavljajući isti argument za česticu koja miruje u S , a u S' se giba brzinom iznosa v u negativnom smjeru x' -osi, nalazimo

$$x = \gamma(x' + vt'), \quad (\text{B.2})$$

gdje je γ ista za sada nepoznati koeficijent kao i u (B.1).

2. Razmatranjem koordinata fotona (čestice koja se u svim referentnim okvirima giba brzinom svjetlosti c) koji je u trenutku $t = t' = 0$ iz ishodišta odalsan u smjeru x odnosno x' -osi određujemo koeficijent γ u transformacijama (B.1) i (B.2). Koordinate fotona su

$$x = ct, \quad x' = ct'. \quad (\text{B.3})$$

S obzirom da općenite transformacije (B.1) i (B.2) moraju vrijediti i za foton koji razmatramo, koordinate (B.3) uvrštavamo u (B.1) i (B.2) te nakon algebarskih manipulacija nalazimo $\gamma^2 = \pm 1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$, gdje odabiremo pozitivan predznak kako bi transformacije (B.1) i (B.2) težile prema Galilejevim transformacijama kad $v \rightarrow 0$. Zaključujemo da je koeficijent γ dan izrazom

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad (\text{B.4})$$

čime je je oblik transformacija (B.1) i (B.2) u potpunosti određen.

3. Transformaciju vremenske koordinate nalazimo eliminacijom x odnosno x' -koordinate iz sustava (B.1) i (B.2), što vodi na

$$t' = \gamma(t - (1 - \gamma^{-2})x/v), \quad t = \gamma(t' + (1 - \gamma^{-2})x'/v). \quad (\text{B.5})$$

Koristeći (B.4), gornje se izraze može sažetije napisati u obliku

$$t' = \gamma(t - vx/c^2), \quad t = \gamma(t' + vx'/c^2). \quad (\text{B.6})$$

4. Transformacije y i y' koordinata nalazimo razmatranjem fotona koji se u \mathcal{S} giba u smjeru pozitivne y -osi. Ako je foton odaslan u trenutku $t = t' = 0$ iz ishodišta, koordinate njegovog položaja u \mathcal{S} su

$$x = 0, \quad y = ct, \quad z = 0, \quad (\text{B.7})$$

dok u \mathcal{S}' mora vrijediti

$$\sqrt{x'^2 + y'^2} = ct', \quad z' = 0. \quad (\text{B.8})$$

Koristeći transformacije (B.1) i (B.6) koordinate x' i t' u gornjem izrazu možemo izraziti preko koordinata x i t što vodi na $y' = ct$ te nakon usporedbe s (B.7) zaključujemo

$$y' = y. \quad (\text{B.9})$$


S obzirom da se istovjetno razmatranje može provesti i za foton koji se giba u smjeru z -osi, također mora vrijediti

$$z' = z. \quad (\text{B.10})$$

Lorentzove transformacije su sadržane u relacijama (B.1), (B.2), (B.4), (B.6), (B.9) i (B.10), koje ovdje ponavljamo zbog preglednosti. Transformacije kojima su koordinate u \mathcal{S}' izražene preko koordinata u \mathcal{S} su

$$x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \gamma(t - vx/c^2), \quad (\text{B.11})$$

Carnotov kružni proces



$$W_{1,2} = nRT_H \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = Q_H > 0$$

$$W_{2,3} = \frac{nR}{\kappa-1} (T_H - T_C) > 0$$

$$W_{3,4} = nRT_C \cdot \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right) = Q_C < 0$$

$$W_{4,1} = \frac{nR}{\kappa-1} (T_C - T_H) < 0$$

$$W = Q_H + Q_C$$

$$p_2 \cdot V_2^\kappa = p_3 \cdot V_3^\kappa \mid$$

$$p_1 \cdot V_1^\kappa = p_4 \cdot V_4^\kappa \mid$$

Koristimo ovo za sve tlakove:

$$p_2 = n \cdot R \cdot T_H \cdot V_2^{-1} \mid$$

Podijelimo sljedeće dvije jednadžbe:

$$n \cdot R \cdot T_H \cdot V_2^{\kappa-1} = n \cdot R \cdot T_C \cdot V_3^{\kappa-1} \mid$$

$$n \cdot R \cdot T_H \cdot V_1^{\kappa-1} = n \cdot R \cdot T_C \cdot V_4^{\kappa-1} \mid$$

Dobivamo:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \mid$$

Podijelimo Q_H i Q_C iz kružnog procesa i iskoristimo $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$:

$$\left| \frac{Q_H}{Q_C} \right| = \frac{T_H}{T_C} \mid$$

$$\frac{Q_H}{Q_C} = - \frac{T_H}{T_C} \mid$$

$$\eta = \frac{\text{dobiveno}}{\text{uloženo}} = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \frac{T_C}{T_H} \mid$$

Mayerova relacija

Gledamo izobarni proces:

$$dQ = dU + p \cdot dv = n \cdot C_p \cdot dT$$

Za idealni plin

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Derivacijom toga:

$$p \cdot dV + dp \cdot V = n \cdot R \cdot dT$$

Za izobarni proces vrijedi $dp \cdot V = 0$.

Dakle:

$$p \cdot dV = n \cdot R \cdot dT$$

Koristeći:

$$dU = n \cdot C_v \cdot dT$$

Dobivamo:

$$dQ = n \cdot C_v \cdot dT + n \cdot R \cdot dT = n \cdot C_p \cdot dT$$

Dijelimo s $n \cdot dT$

$$C_p = C_v + R$$