

2. Auditorne iz Raspoznavanja uzoraka

Zadatak 1.

Fisher – 2 razreda – dvodimenzionalni uzorci

$$\omega_1 = \{(1,1)^T, (1,2)^T\}$$

$$\omega_2 = \{(-1,-1)^T, (-2,-1)^T\}$$

$$\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{x}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{x}_4 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{m}_1 = \frac{1}{2}(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

$$\vec{m}_2 = \frac{1}{2}(\vec{x}_3 + \vec{x}_4) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -1.5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$S_1 = \sum_{\vec{x}_i \in \omega_1} (\vec{x}_i - \vec{m}_1)(\vec{x}_i - \vec{m}_1)^T$$

$$S_1 = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \end{bmatrix} \right)^T + \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \end{bmatrix} \right)^T$$

$$S_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -0.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$S_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$S_2 = \sum_{\vec{x}_i \in \omega_2} (\vec{x}_i - \vec{m}_2)(\vec{x}_i - \vec{m}_2)^T$$

$$S_2 = \left(\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1.5 \\ -1 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1.5 \\ -1 \end{bmatrix} \right)^T + \left(\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1.5 \\ -1 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1.5 \\ -1 \end{bmatrix} \right)^T$$

$$S_2 = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S_2 = \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S_w = S_1 + S_2 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$S_w^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
S_B &= (\vec{m}_1 - \vec{m}_2)(\vec{m}_1 - \vec{m}_2)^T \\
&= \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1.5 \\ -1 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1.5 \\ -1 \end{bmatrix} \right)^T \\
&= \begin{bmatrix} 2.5 \\ 2.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2.5 & 2.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.25 & 6.25 \\ 6.25 & 6.25 \end{bmatrix} \\
\vec{w} &= S_w^{-1}(\vec{m}_1 - \vec{m}_2) \\
&= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2.5 \\ 2.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} \\
\vec{y}_1 &= \vec{w}^T \vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 10 \\
\vec{y}_2 &= \vec{w}^T \vec{x}_2 = \begin{bmatrix} 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 15 \\
\vec{y}_3 &= \vec{w}^T \vec{x}_3 = \begin{bmatrix} 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} = -10 \\
\vec{y}_4 &= \vec{w}^T \vec{x}_4 = \begin{bmatrix} 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = -15
\end{aligned}$$

drugi način

$$\begin{aligned}
\lambda S_w \vec{w} &= S_B \vec{w} \quad / S_w^{-1} \\
\lambda \vec{w} &= (S_w^{-1} S_B) \vec{w}
\end{aligned}$$

problem svojstvenih vektora

$$\lambda \vec{w} = A \vec{w}$$

$$A = S_w^{-1} S_B$$

$$(A - \lambda I) \vec{w} = \vec{0}$$

$$\vec{w} = (A - \lambda I)^{-1} \vec{0}$$

da bi mogli izračunati $(A - \lambda I)^{-1}$ mora biti $|A - \lambda I| \neq 0$, da bi dobili netrivialno rješenje uvjet je $|A - \lambda I| = 0$, ovo je polinom n-tog stupnja, nul-točke su svojstvene vrijednosti

$$A = S_w^{-1} S_B$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6.25 & 6.25 \\ 6.25 & 6.25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12.5 & 12.5 \\ 12.5 & 12.5 \end{bmatrix}$$

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$= \begin{vmatrix} 12.5 - \lambda & 12.5 \\ 12.5 & 12.5 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (12.5 - \lambda)^2 - 12.5^2$$

$$= \lambda(\lambda - 25) = 0$$

$$\lambda = 25$$

$$(A - \lambda I)\vec{w} = \vec{0}$$

$$\begin{bmatrix} 12.5 - 25 & 12.5 \\ 12.5 & 12.5 - 25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \vec{0}$$

$$\begin{bmatrix} -12.5 & 12.5 \\ 12.5 & -12.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \vec{0}$$

$$w_1 = w_2$$

$$\vec{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Zadatak 2.

Fisher – 3 razreda – dvodimenzionalni uzorci

$$\omega_1 = \{(2,0)^T, (4,0)^T\}$$

$$\omega_2 = \{(0,-2)^T, (0,-4)^T\}$$

$$\omega_3 = \{(2,-2)^T, (4,-4)^T\}$$

$$\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \vec{x}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}, \vec{x}_5 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \vec{x}_6 = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$\vec{m}_1 = \frac{1}{2}(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{m}_2 = \frac{1}{2}(\vec{x}_3 + \vec{x}_4) = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{m}_3 = \frac{1}{2}(\vec{x}_5 + \vec{x}_6) = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$S_1 = \sum_{\vec{x}_i \in \omega_1} (\vec{x}_i - \vec{m}_1)(\vec{x}_i - \vec{m}_1)^T$$

$$S_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S_2 = \sum_{\vec{x}_i \in \omega_2} (\vec{x}_i - \vec{m}_2)(\vec{x}_i - \vec{m}_2)^T$$

$$S_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$S_3 = \sum_{\vec{x}_i \in \omega_3} (\vec{x}_i - \vec{m}_3)(\vec{x}_i - \vec{m}_3)^T$$

$$S_3 = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$S_w = S_1 + S_2 + S_3 = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$S_B = \sum_{i=1}^3 n_i (\vec{m}_i - \vec{m})(\vec{m}_i - \vec{m})^T$$

$$S_B = \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}$$

drugi način

$$\lambda S_w \vec{w} = S_B \vec{w}$$

$$(S_B - \lambda S_w) \vec{w} = 0$$

$$\left\| \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \right\| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 12 - 4\lambda & 6 + 2\lambda \\ 6 + 2\lambda & 12 - 4\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 - 10\lambda + 9 = 0$$

$$\lambda_1 = 9$$

$$\lambda_2 = 1$$

$$\lambda_1 = 9$$

$$\begin{bmatrix} -24 & 24 \\ 24 & -24 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$-w_1 + w_2 = 0$$

$$w_1 - w_2 = 0$$

$$w_1 = w_2$$

$$\vec{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Zadatak 3.

Fisher – 3 razreda – trodimenzionalni uzorci

$$\omega_1 = \{(2,0,-1)^T, (4,0,1)^T\}$$

$$\omega_2 = \{(0,-2,1)^T, (0,-4,0)^T\}$$

$$\omega_3 = \{(2,-2,1)^T, (4,-4,-1)^T\}$$

$$\vec{m}_1 = \frac{1}{2}(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{m}_2 = \frac{1}{2}(\vec{x}_3 + \vec{x}_4) = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\vec{m}_3 = \frac{1}{2}(\vec{x}_5 + \vec{x}_6) = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$S_1 = \sum_{\vec{x}_i \in \omega_1} (\vec{x}_i - \vec{m}_1)(\vec{x}_i - \vec{m}_1)^T$$

$$S_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$S_2 = \sum_{\vec{x}_i \in \omega_2} (\vec{x}_i - \vec{m}_2)(\vec{x}_i - \vec{m}_2)^T$$

$$S_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$S_3 = \sum_{\vec{x}_i \in \omega_3} (\vec{x}_i - \vec{m}_3)(\vec{x}_i - \vec{m}_3)^T$$

$$S_3 = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$S_w = S_1 + S_2 + S_3 = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 4.5 \end{bmatrix}$$

$$S_B = \sum_{i=1}^3 n_i (\vec{m}_i - \vec{m})(\vec{m}_i - \vec{m})^T$$

$$S_B = \begin{bmatrix} 12 & 6 & -2 \\ 6 & 12 & -1 \\ -2 & -1 & 1/3 \end{bmatrix}$$

drugi način

$$\lambda S_w \vec{w} = S_B \vec{w}$$

$$(S_B - \lambda S_w) \vec{w} = \vec{0}$$

$$\left\| \begin{bmatrix} 12 & 6 & -2 \\ 6 & 12 & -1 \\ -2 & -1 & 1/3 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 4.5 \end{bmatrix} \right\| = 0$$

$$\lambda_1 = 25.8173$$

$$\lambda_2 = 1.0716$$

$$\lambda_3 = 0$$

$$\lambda_1 = 25.8173 \quad \vec{w} = \begin{bmatrix} -0.62 \\ -0.9587 \\ 0.66 \end{bmatrix}$$

Zadatak 4.

PCA – 3 – razreda – dvodimenzionalni uzorci

$$\omega_1 = \{(2,0)^T, (4,0)^T\}$$

$$\omega_2 = \{(0,-2)^T, (0,-4)^T\}$$

$$\omega_3 = \{(2,-2)^T, (4,-4)^T\}$$

$$\vec{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \vec{x}_i = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

srednja vrijednost se oduzima od svih uzoraka

$$X = [(\vec{x}_1 - \vec{m}) \ (\vec{x}_1 - \vec{m}) \ \dots]$$

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & -2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & -2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{y} = \vec{w}^T X$$

$$J^{PCA}(\vec{w}) = \frac{1}{n} \vec{y} \vec{y}^T = \frac{1}{n} \vec{w}^T X X^T \vec{w} = \vec{w}^T C \vec{w} \text{ uvjet } \vec{w}^T \vec{w} = 1$$

$$K = \frac{1}{N-1} X X^T$$

$$J^{PCA}(\vec{w}) = \vec{w}^T K \vec{w} - \lambda(\vec{w}^T \vec{w} - 1)$$

$$(K - \lambda I) \vec{w} = \vec{0}$$

$$K \vec{w} = \lambda \vec{w}$$

$$K = \frac{1}{6-1} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & -2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & -2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \\ -2 & 0 \\ -2 & -2 \\ 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 16 \end{bmatrix}$$

$$\left\| \begin{bmatrix} 16/5 & 4/5 \\ 4/5 & 16/5 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 16/5 - \lambda & 4/5 \\ 4/5 & 16/5 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda_1 = 4$$

$$\lambda_2 = 2.4$$

$$\lambda_1 = 4$$

$$\begin{bmatrix} -4/5 & 4/5 \\ 4/5 & -4/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$-w_1 + w_2 = 0$$

$$w_1 - w_2 = 0$$

$$w_1 = w_2$$

$$\vec{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Zadatak 5.

SVM – 2 razreda – dvodimenzionalni uzorci – dualni problem

$$\omega_1 = \{(0,0)^T\}$$

$$\omega_2 = \{(2,0)^T, (1,2)^T\}$$

Rješavanje dualnog problema

$$J(\lambda) = \sum_{i=1}^N \lambda_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \lambda_i \lambda_j d_i d_j \bar{x}_i^T \bar{x}_j \quad \text{uvjet} \quad \sum_{i=1}^N \lambda_i d_i = 0 \quad \text{i} \quad \lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, 3$$

$$d_i = 1 \text{ za } x_i \in \omega_1 \quad d_i = -1 \text{ za } x_i \in \omega_2$$

Langrangeovi multiplikatori α

$$F = \sum_{i=1}^N \lambda_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \lambda_i \lambda_j d_i d_j \bar{x}_i^T \bar{x}_j + \alpha \sum_{i=1}^N \lambda_i d_i$$

$$F = \sum_{i=1}^N \lambda_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \lambda_i \lambda_j d_i d_j \bar{x}_i^T \bar{x}_j + \alpha \sum_{i=1}^N \lambda_i d_i$$

$$\begin{aligned} F &= \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 - \frac{1}{2} \lambda_1 \lambda_1 \bar{x}_1^T \bar{x}_1 + \frac{1}{2} \lambda_1 \lambda_2 \bar{x}_1^T \bar{x}_2 + \frac{1}{2} \lambda_1 \lambda_3 \bar{x}_1^T \bar{x}_3 \\ &+ \frac{1}{2} \lambda_2 \lambda_1 \bar{x}_2^T \bar{x}_1 - \frac{1}{2} \lambda_2 \lambda_2 \bar{x}_2^T \bar{x}_2 - \frac{1}{2} \lambda_2 \lambda_3 \bar{x}_2^T \bar{x}_3 \\ &+ \frac{1}{2} \lambda_3 \lambda_1 \bar{x}_3^T \bar{x}_1 - \frac{1}{2} \lambda_3 \lambda_2 \bar{x}_3^T \bar{x}_2 - \frac{1}{2} \lambda_3 \lambda_3 \bar{x}_3^T \bar{x}_3 \\ &+ \alpha(\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3) \end{aligned}$$

$$F = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 - 2\lambda_2^2 - \frac{5}{2}\lambda_3^2 - 2\lambda_2\lambda_3 + \alpha(\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_1} = 1 + \alpha = 0 \quad \alpha = -1$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_2} = 1 - 4\lambda_2 - 2\lambda_3 - \alpha = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_3} = 1 - 5\lambda_3 - 2\lambda_2 - \alpha = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha} = \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \quad \alpha = -1$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & -5 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & -5 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \alpha \end{bmatrix} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} -5 & -3 & -2 & 16 \\ -3 & -5 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & -4 & 0 \\ 16 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \\ -8 \end{bmatrix}$$

$$2 - 4\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0$$

$$2 - 5\lambda_3 - 2\lambda_2 = 0/2$$

$$2 - 4\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0$$

$$4 - 10\lambda_3 - 4\lambda_2 = 0$$

$$8\lambda_3 - 2 = 0$$

$$\lambda_3 = \frac{1}{4}$$

$$\lambda_2 = \frac{2 - 2\lambda_3}{4} = \frac{3}{8}$$

$$\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 = 0$$

$$\lambda_1 = \frac{5}{8}$$

$$\vec{w} = \sum_{i=1}^N \lambda_i d_i \vec{x}_i = \frac{5}{16} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{3}{8} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

$$b = \pm 1 - \vec{w}^T \vec{x} = 1$$

$$-x_1 - \frac{1}{2}x_2 + 1 = 0$$

Zadatak 6.

SVM – 2 razreda – dvodimenzionalni uzorci – dualni problem

Analitički naći rješenje dualnog problema za skup uzoraka

$$\omega_1 = \{(0,0)^T\}$$
$$\omega_2 = \{(2,0)^T, (1,2)^T, (2,2)^T\}$$

Rješavanje dualnog problema

$$J(\lambda) = \sum_{i=1}^N \lambda_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \lambda_i \lambda_j d_i d_j \vec{x}_i^T \vec{x}_j \quad \text{uvjet} \quad \sum_{i=1}^N \lambda_i d_i = 0 \text{ i } \lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, 4$$

$$d_i = 1 \text{ za } x_i \in \omega_1 \text{ i } d_i = -1 \text{ za } x_i \in \omega_2$$

Langrangeovi multiplikatori α

$$F = \sum_{i=1}^N \lambda_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \lambda_i \lambda_j d_i d_j \vec{x}_i^T \vec{x}_j + \alpha \sum_{i=1}^N \lambda_i d_i$$

$$\begin{aligned} F &= \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 - \frac{1}{2} \lambda_1 \lambda_1 \vec{x}_1^T \vec{x}_1 + \frac{1}{2} \lambda_1 \lambda_2 \vec{x}_1^T \vec{x}_2 + \frac{1}{2} \lambda_1 \lambda_3 \vec{x}_1^T \vec{x}_3 + \frac{1}{2} \lambda_1 \lambda_4 \vec{x}_1^T \vec{x}_4 \\ &+ \frac{1}{2} \lambda_2 \lambda_1 \vec{x}_2^T \vec{x}_1 - \frac{1}{2} \lambda_2 \lambda_2 \vec{x}_2^T \vec{x}_2 - \frac{1}{2} \lambda_2 \lambda_3 \vec{x}_2^T \vec{x}_3 - \frac{1}{2} \lambda_2 \lambda_4 \vec{x}_2^T \vec{x}_4 \\ &+ \frac{1}{2} \lambda_3 \lambda_1 \vec{x}_3^T \vec{x}_1 - \frac{1}{2} \lambda_3 \lambda_2 \vec{x}_3^T \vec{x}_2 - \frac{1}{2} \lambda_3 \lambda_3 \vec{x}_3^T \vec{x}_3 - \frac{1}{2} \lambda_3 \lambda_4 \vec{x}_3^T \vec{x}_4 \\ &+ \frac{1}{2} \lambda_4 \lambda_1 \vec{x}_4^T \vec{x}_1 - \frac{1}{2} \lambda_4 \lambda_2 \vec{x}_4^T \vec{x}_2 - \frac{1}{2} \lambda_4 \lambda_3 \vec{x}_4^T \vec{x}_3 - \frac{1}{2} \lambda_4 \lambda_4 \vec{x}_4^T \vec{x}_4 \\ &+ \alpha(\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4) \end{aligned}$$

$$F = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 - 2\lambda_2^2 - \frac{5}{2}\lambda_3^2 - 2\lambda_2\lambda_3 - 4\lambda_2\lambda_4 - 6\lambda_3\lambda_4 - 4\lambda_4^2 + \alpha(\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_1} = 1 + \alpha = 0 \quad \alpha = -1$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_2} = 1 - 4\lambda_2 - 2\lambda_3 - 4\lambda_4 - \alpha = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_3} = 1 - 5\lambda_3 - 2\lambda_2 - 6\lambda_4 - \alpha = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_4} = 1 - 6\lambda_3 - 4\lambda_2 - 8\lambda_4 - \alpha = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha} = \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -2 & -4 & -1 \\ 0 & -2 & -5 & -6 & -1 \\ 0 & -4 & -6 & -8 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -2 & -4 & -1 \\ 0 & -2 & -5 & -6 & -1 \\ 0 & -4 & -6 & -8 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Pretpostavka $\lambda_2 = 0$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & -6 & -1 \\ 0 & -6 & -8 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & -6 & -1 \\ 0 & -6 & -8 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \\ -0.5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Pretpostavka $\lambda_4 = 0$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & -5 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & -5 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \alpha \end{bmatrix} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} -5 & -3 & -2 & 16 \\ -3 & -5 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & -4 & 0 \\ 16 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \\ -8 \end{bmatrix}$$

$$2 - 4\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0$$

$$2 - 5\lambda_3 - 2\lambda_2 = 0/2$$

$$2 - 4\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0$$

$$4 - 10\lambda_3 - 4\lambda_2 = 0$$

$$8\lambda_3 - 2 = 0$$

$$\lambda_3 = \frac{1}{4}$$

$$\lambda_2 = \frac{2 - 2\lambda_3}{4} = \frac{3}{8}$$

$$\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 = 0$$

$$\lambda_1 = \frac{5}{8}$$

$$\vec{w} = \sum_{i=1}^N \lambda_i d_i \vec{x}_i = \frac{5}{16} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{3}{8} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

$$b = \pm 1 - \vec{w}^T \vec{x} = 1$$

$$-x_1 - \frac{1}{2}x_2 + 1 = 0$$