

1. Četiri razreda dvodimenzionalnih uzoraka zadana su svojim matricama raspršenja, središtima i brojem uzoraka u razredu

$$S_1 = \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} \quad m_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad n_1 = 5$$

$$S_2 = \begin{bmatrix} 20 & 20 \\ 20 & 20 \end{bmatrix} \quad m_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad n_2 = 5$$

$$S_3 = \begin{bmatrix} 20 & 20 \\ 20 & 20 \end{bmatrix} \quad m_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad n_3 = 5$$

$$S_4 = \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} \quad m_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad n_4 = 5$$

Pronaći vektor \mathbf{w} koji daje optimalnu projekciju ovakvih uzoraka u smislu Fisherovog kriterija.

2. Za općeniti problem kvadratnog programiranja:

$$\min_x \quad \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x$$

uz uvjete

$$Ax \leq b$$

$$Ex = d$$

naći vrijednost matrica Q, A, E te vektora c, b i d tako da rješenje gornjeg problema daje rješenje dualnog problema SVM za skup uzoraka

$$\omega_1 = \{[0,0]^T\}$$

$$\omega_2 = \{[0,1]^T, [1,0]^T, [-1,-1]^T\}$$

Pretpostavite da tražimo nelinearnu decizijsku funkciju pomoću jezgrene funkcije

$$K(x, x_i) = e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \|x - x_i\|^2} \quad \text{uz } \sigma = 1.$$

3. Za skup uzoraka

$$\omega_1 = \{[0,0]^T\}$$

$$\omega_2 = \{[0,1]^T, [1,0]^T, [1,-2]^T\}$$

napisati jednadžbu granice između razreda koja se dobiva postupkom učenja potencijalnim funkcijama, ako je potencijal u točki x izazvan elementarnim nabojem u točki x_k jednak

$$K(x, x_k) = e^{-\|x - x_k\|^2}$$

Redoslijed uzoraka neka je onaj kojim su napisani u zadatku.

