

Zadnjič smo reševali Laplaceovo enačbo z robnimi pogoji

1.  $U(x, 0) = 0$
2.  $U(x, a) = 0$
3.  $U(0, 0 < y < a) = U_0$
4.  $U(x \rightarrow \infty, y) < \infty$

Uporabili bomo separacijo spremenljivk:

$$X''Y + XY'' = 0$$

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0$$

Sledi:

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = \kappa^2$$

Dobimo splošno rešitev

$$X = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}$$

$$Y = A \sin(\kappa y) + B \cos(\kappa y)$$

Zaradi četrtega robnega pogoja je  $C = 0$ , zaradi prvega pa  $B = 0$ . Sledi:

$$U(x, y) = K \sin(\kappa y) e^{-\kappa x}$$

Iz drugega robnega pogoja je  $a\kappa = n\pi$  Iz tretjega pogoja dobimo, da je

$$\sum_n K_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) = U_0$$

To nam pove nekaj o koeficientih  $K_n$ . Izračunajmo najprej skalarni produkt z neko drugo lastno funkcijo:

$$\int_0^\infty \sum_{n=0}^\infty K_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a}y\right) dy = \sum_{n=0}^\infty K_n \int_0^\infty \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a}y\right) dy = \sum_{n=0}^\infty \frac{K_n a}{2} \delta_{mn} = \frac{K_m a}{2}$$

Zdaj izračunajmo še koeficiente  $K_n$ :

$$\int_0^\infty U_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}y\right) y dy = \dots = -\frac{U_0 a}{m\pi} (\cos m\pi - 1) = \frac{U_0 a}{m\pi} (1 - (-1)^m)$$

Se pravi je

$$K_m = \frac{2U_0}{m\pi} (1 - (-1)^m)$$

Končni rezultat je tedaj:

$$U(x, y) = \sum_{m=1}^\infty \frac{2U_0}{m\pi} (1 - (-1)^m) \sin\left(\frac{m\pi}{a}y\right) e^{-\frac{m\pi}{a}x}$$

Tega ne moremo izraziti analitično, lahko pa si ogledamo limito  $x \gg a$ :

$$U(x, y) \approx \frac{4U_0}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{a}y\right) e^{-\frac{\pi}{a}x}$$

Izračunamo lahko tudi  $\vec{E}(x, \frac{a}{2})$  in izrazimo le komponento  $x$ :

$$\begin{aligned} E_x(x) &= -\frac{\partial U(x, a/2)}{\partial x} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \sum_{n=1}^\infty \frac{2U_0}{n\pi} (1 - (-1)^n) \sin\left(\frac{n\pi}{a} \frac{a}{2}\right) e^{-\frac{n\pi}{a}x} \end{aligned}$$

$$= \frac{2U_0}{a} \sum_{n=1}^{\infty} (1 - (-1)^n) \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) e^{-\frac{n\pi}{2}x}$$

Vidimo, da velja:

$$(1 - (-1)^n) \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \begin{cases} 2, & \text{mod}_4 n = 1 \\ -2, & \text{mod}_4 n = 3 \\ 0, & \text{sicer} \end{cases}$$

Se pravi je

$$E_x = \frac{4U_0}{a} \left[ e^{-\frac{\pi}{a}x} - e^{-\frac{3\pi}{a}x} + e^{-\frac{5\pi}{a}x} + \dots \right]$$

Označimo  $\alpha = \exp\left(-\frac{2\pi}{a}x\right)$

$$E_x(x) = \frac{4U_0}{a} e^{-\frac{\pi x}{a}} [1 - \alpha + \alpha^2 - \alpha^3 + \dots]$$

Prepoznamo geometrijsko vrsto in iz dobljenega izrazimo hiperbolično funkcijo:

$$E_x(x) = \frac{2U_0/a}{\cosh(\pi x/a)}$$

**Naloga.** Prepolovljena prevodna cev s polmerom  $a$ . Uporabimo jo kot kondenzator in ga napojimo z napetostjo  $U_0$ . V cilindričnih koordinatah želimo izraziti  $U$ , kar seveda naredimo z Laplaceovo enačbo  $\nabla^2 U(r, \varphi) = 0$ .

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial r^2}$$

Uporabimo separacijo:  $U(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi)$  Po nekaj računanja dobimo enačbo

$$\frac{\frac{1}{r}R' + r^2R''}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} =: m^2$$

Dobimo dve diferencialni enačbi:

$$\begin{aligned} \Phi'' + m^2\Phi &= 0 \\ r^2R'' + rR' - m^2R &= 0 \end{aligned}$$

Rešitev prve so kotne funkcije:

$$\Phi(\varphi) = A_m \sin(m\varphi) + B_m \cos(m\varphi)$$

Iz periodičnosti dobimo pogoj, da mora biti  $m$  celo število, in sicer  $m = 1, 2, 3, \dots$  (negativna ne pridejo v poštev zaradi antisimetričnosti sinusa?)

Diferencialno enačbo za  $R$  rešijo potenčne funkcije.

$$R(r) = C_m r^m + D_m r^{-m}$$

Konstante  $A_m, B_m, C_m, D_m$  določimo z robnimi pogoji:

$$U(a, \varphi) = \begin{cases} \frac{U_0}{2}, & 0 < \varphi < \pi \\ -\frac{U_0}{2}, & \pi < \varphi < 2\pi \end{cases}$$

$$U(0, \varphi) < \infty \text{ (sledi } D_m = 0)$$

Opazimo: Robni pogoj pri  $r = a$  je liha funkcija  $\varphi$ , torej je tudi funkcija  $U$  liha. Sledi  $B_m = 0$ .

$$U_m(r, \varphi) = \sum_{m=1}^{\infty} K_m \sin(m\varphi) r^m$$

Skalarno množimo dve lastni funkciji:

$$\sum_{m=1}^{\infty} K_m a^m \sin(m\varphi) = \begin{cases} \frac{U_0}{2} \\ -\frac{U_0}{2} \end{cases}$$

Na obeh straneh skalarno pomnožimo z  $U_n$ . Leva stran:

$$\sum_{m=1}^{\infty} K_m a^m \int_0^{2\pi} \sin(m\varphi) \sin(n\varphi) \, d\varphi = \pi a^n K_n$$

Desna stran:

$$\int_0^{\pi} \frac{U_0}{2} \sin(n\varphi) \, d\varphi - \int_{\pi}^{2\pi} \frac{U_0}{2} \sin(n\varphi) \, d\varphi = \frac{U_0}{2n} [(1 - (-1)^n) + (1 - (-1)^n)]$$

Sledi:

$$U(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{U_0}{n\pi} (1 - (-1)^n) \sin(n\varphi) \left(\frac{r}{a}\right)^n$$