

# 1 Teorija motnje

**Anharmonski oscilator.** V Hamiltonian harmonskega oscilatorja dodamo motnjo, na primer

$$H = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2}kx^2 + \lambda x^4$$

Hamiltonian nemotenega oscilatorja označimo s  $H_0$ :

$$H_0 |n\rangle^0 = E_n^0 |n\rangle^0, \quad E_n^0 = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$$

V prvem redu popravka je

$$E_n = E_n^0 + {}^0\langle n | H' | n \rangle^0$$

Po dogovoru lastne funkcije nemotenega oscilatorja označimo kar z  $|n\rangle^0 = |n\rangle$ . Zdaj si oglejmo motnjo:

$$\langle n | \lambda x^4 | n \rangle = \lambda \langle x^2 n | x^2 n \rangle$$

Operator  $x^2$  zapišemo z operatorjema  $a$  in  $a^\dagger$ .

$$x = \frac{x_0}{\sqrt{2}} (a^\dagger + a)$$

$$x^2 = \frac{x_0^2}{2} (a^\dagger + a)^2$$

$$= \frac{x_0^2}{2} (a^{\dagger 2} + a^\dagger a + a a^\dagger + a^2)$$

Vemo, da je komutator teh operatorjev

$$[a^\dagger, a] = 1$$

. Sledi:

$$x^2 = \frac{x_0^2}{2} (a^{\dagger 2} + 1 + 2a^\dagger a + a^2)$$

$$|x^2 n\rangle = \frac{x_0^2}{2} (a^{\dagger 2} |n\rangle + |n\rangle + 2a^\dagger a |n\rangle + a^2 |1\rangle)$$

$$= \frac{x_0^2}{2} (\sqrt{(n+1)(n+2)} |n+2\rangle + |n\rangle + 2n |n\rangle + \sqrt{n(n-1)} |n-2\rangle)$$

$$\lambda \langle x^2 n | x^2 n \rangle = \lambda \frac{x_0^4}{4} ((n+1)(n+2) + (2n+1)^2 + n(n-1))$$

$$= \dots = \frac{3}{8} \lambda x_0^4 \left(n^2 + n + \frac{1}{2}\right)$$

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{8} \lambda x_0^4 \left(n^2 + n + \frac{1}{2}\right)$$

**Vodikov atom v električnem polju.** Električno polje kaže v smeri  $z$ . Tako imamo Hamiltonian

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} - e\epsilon z$$

Izračunati bomo morali matriko skalarnih produktov stanj  $|lm\rangle$ :

$$\begin{array}{c} \langle 0, 0 | \\ \langle 1, 1 | \\ \langle 1, 0 | \\ | 1, -1 \rangle \end{array} \begin{array}{c} | 0, 0 \rangle \\ | 1, 1 \rangle \\ | 1, 0 \rangle \\ | 1, -1 \rangle \end{array} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ u^* & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

V pomoč zapišemo nekaj fundamentalnih dejstev:

1.)

$$[H', L_z] = 0, \quad [H, L_z] = 0 \rightarrow \langle lm | H' | l' m' \rangle = 0 \text{ za } m' \neq m$$

2.) Če označimo operator  $P: \vec{r} \mapsto -\vec{r}$ :

$$[H_0, P] = \{H', P\} = 0$$

3.) V sferičnih koordinatah bo imela  $\psi$  obliko  $\psi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\vartheta, \varphi)$ .

$$PY_{lm}(\vartheta, \varphi) = (-1)^l Y_{lm}(\vartheta, \varphi)$$

Da so po diagonali ničle, sledi iz teh dejstev:

$$\langle lm | \{H', P\} | l' m' \rangle = \langle lm | H' P + P H' | l' m' \rangle =$$

$$\langle lm | P H' | l' m' \rangle + \langle lm | H' P | l' m' \rangle = \left( (-1)^{l'} + (-1)^l \right) \langle lm | H' | l' m' \rangle$$

Če je  $l = l'$ , je  $\langle lm | H' | l' m' \rangle = 0$ , torej imamo na diagonali ničle. Izračunati moramo še  $u$  in  $u^*$ :

$$u = \langle 0, 0 | H' | 1, 0 \rangle = \int R_{20}^*(r) Y_{00}^*(\vartheta, \varphi) (-e\varepsilon z) R_{21}(r) Y_{10}(\vartheta, \varphi) d^3 \vec{r}$$

Uporabimo:

$$R_{20}^* = \frac{2}{(2r_B)^{3/2}} \left( 1 - \frac{r}{2r_B} \right) e^{-r/2r_B}$$

$$Y_{00}^* = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$R_{21} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{(2r_B)^{3/2}} \frac{r}{r_B} e^{-r/2r_B}$$

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \vartheta$$

$$z = r \cos \vartheta$$

$$\begin{aligned} u &= -\frac{e\varepsilon}{(2r_B)^3} \frac{2}{4\pi} \int_0^\infty r^2 \left( 1 - \frac{r}{2r_B} \right) \frac{r^2}{r_B} e^{-r/r_B} dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 \cos^2 \vartheta d(\cos \vartheta) \\ &= -\frac{e\varepsilon}{(2r_B)^3} \frac{2}{4\pi} \int_0^\infty \frac{r^2}{r_B^2} \left( 1 - \frac{1}{2} \frac{r}{r_B} \right) \frac{r^2}{r_B^2} e^{-r/r_B} r_B^2 d\left( \frac{r}{r_B} \right) 2\pi \frac{2}{3} \\ &= -\frac{e\varepsilon}{12r_B} \int_0^\infty u^4 \left( 1 - \frac{u}{2} \right) e^{-u} du = -\frac{e\varepsilon}{12r_B} \left( \Gamma(3) - \frac{1}{2} \Gamma(4) \right) \\ &= -\frac{e\varepsilon}{12r_B} (24 - 60) = 3e\varepsilon/r_B \end{aligned}$$

Zdaj imamo matrične elemente matrike skalarnih produktov. Vidimo, da imamo takoj lastni vrednosti  $\lambda_{12} = 0$  in pripadajoča lastna vektorja  $|1, 1\rangle$  in  $|1, -1\rangle$ . Iščemo še lastne vrednosti matrike

$$\begin{bmatrix} 0 & u \\ u & 0 \end{bmatrix}$$

Dobimo  $\lambda_{34} = \pm u$ . Posebej iščemo lastne vektorje za vsako možnost.

1.  $\lambda = -u$ :

$$\begin{bmatrix} u & u \\ u & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \alpha = -\beta \\ \begin{pmatrix} \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Torej je lastno stanje  $\frac{1}{\sqrt{2}} (|0, 0\rangle - |1, 0\rangle) \equiv |-\rangle$

2.  $\lambda = u$ : Po popolnoma enakem postopku dobimo lastno stanje  $\frac{1}{\sqrt{2}} (|0, 0\rangle + |1, 0\rangle) \equiv |+\rangle$

Označili smo lastna vektorja  $|-\rangle$  in  $|+\rangle$ , izračunamo lahko npr.

$$\langle - | z | - \rangle = \dots = 3r_B$$

$$\langle + | z | + \rangle = \dots = -3r_B$$