Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija

II dalis. Nekompaktinių grupių įvaizdžiai, geometrija ir fizika

Vertimo projektas

Turinys

Kaip studijuoti šį kursą 5

II Nekompaktinių grupių įvaizdžiai, geometrija ir fizika 8

15 Stiprusis tolydumas ir infinitezimalieji generatoriai 9
15.1 Nuo matricų prie Hilberto erdvių . . . 9
15.2 Stiprusis tolydumas . . . 11
15.3 Glodieji vektoriai ir išvestinis įvaizdis . . . 13
15.4 Neaprėžti operatoriai ir Stouno teorema . . . 14
15.5 Postūmiai erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ . . . 16
15.6 Tolydžios dalimis funkcijos kaip vektoriai . . . 19
15.7 Savikontrolė . . . 20
15.8 Santrauka . . . 20
15.9 Literatūra . . . 21

16 Haro matas nekompaktinėse grupėse ir modulinė funkcija 22
16.1 Tankiai ir integravimas . . . 23
16.2 Kairysis ir dešinysis Haro tankiai . . . 24
16.3 Modulinė funkcija . . . 25
16.4 Afininė grupė . . . 27
16.5 Reguliarieji įvaizdžiai . . . 29
16.6 Lokaliai kompaktinės grupės . . . 31

17 Unitarioji indukcija 35
17.1 Ekvivariantinės funkcijos . . . 35
17.2 Faktoriniai matai . . . 36
17.3 Normuotasis indukuotasis įvaizdis . . . 39
17.4 Grupės $ax + b$ įvaizdžiai, indukuoti iš postūmių . . . 41
17.5 Dažnio mastelio keitimų orbita . . . 43

18 Heizenbergo grupė ir Veilio sąryšiai 47
18.1 Grupės dėsnis . . . 47
18.2 Šrėdingerio įvaizdis . . . 49
18.3 Stouno–fon Noimano teorema . . . 52
18.4 Gauso matriciniai koeficientai ir nulinis centrinis charakteris . . . 54

19 Kojungtinės orbitos ir orbitų metodas nilpotentinėms grupėms 59
19.1 Dualusis veikimas . . . 59
19.2 Simplektinė forma kiekvienoje orbitoje . . . 61
19.3 Heizenbergo plokštumos ir taškai . . . 64

19.4 Poliarizacijos ir orbitų teorema . . . 65
19.5 Indukcija atkuria Šrėdingerio formulę . . . 67

20 Realiosios formos ir nekompaktinė struktūra 71
20.1 Realiosios formos ir Kartano involiucijos . . . 71
20.2 Apribotosios šaknys ir globalieji skaidiniai . . . 74
20.3 Pirmojo rango modelis $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ . . . 76
20.4 Viršutinė pusplokštuma . . . 79
20.5 Savikontrolė . . . 81

21 Glodieji vektoriai, K-tipai ir $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai 83
21.1 Glodieji vektoriai ir K-baigtiniai vektoriai . . . 83
21.2 Suderinamumo sąlygos . . . 86
21.3 Apskritimo K-tipai grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ atveju . . . 88
21.4 Ko neužfiksuoja $(\mathfrak{g}, K)$-modulis . . . 91
21.5 Savikontrolė . . . 92

22 Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pagrindinė serija 95
22.1 Indukavimo duomenys . . . 95
22.2 Plokštumos modelis ir apskritimo modelis . . . 97
22.3 Unitarumas menamojoje ašyje . . . 99
22.4 K-tipai ir Lie algebros veikimas . . . 101
22.5 Uždarieji invariantiniai poerdviai . . . 103
22.6 Savikontrolė . . . 107
22.7 Santrauka . . . 108
22.8 Literatūra . . . 108

23 Diskrečiosios serijos ir pirmojo rango unitariųjų įvaizdžių visuma 109
23.1 Disko modelis . . . 109
23.2 K-tipai ir Lie algebros operatoriai . . . 114
23.3 Nusileidimo sąlygos . . . 116
23.4 Palyginimas ir unitariųjų įvaizdžių visuma . . . 116
23.5 Savikontrolė . . . 122
23.6 Santrauka . . . 122
23.7 Literatūra . . . 123

24 Lorenco grupės ir baigtinės dimensijos įvaizdžiai 124
24.1 Minkovskio erdvė ir Lorenco grupė . . . 124
24.2 Dvigubas padengimas . . . 126
24.3 Lorenco algebros kompleksifikacija . . . 130
24.4 Baigtinės dimensijos įvaizdžių klasifikacija . . . 131
24.5 Veilio spinoriai ir keturmačiai vektoriai . . . 133
24.6 Savikontrolė . . . 134
24.7 Santrauka . . . 134
24.8 Literatūra . . . 135

25 Puankarė grupės įvaizdžiai ir mažosios grupės 136
25.1 Puankarė grupė kaip pusiau tiesioginė sandauga . . . 136
25.2 Impulsų charakteriai ir masės paviršiai . . . 138
25.3 Mažosios grupės ir Makio klasifikacija . . . 141

25.4 Bemasiai sektoriai: spiralingumas ir tolydusis sukinys 144
25.5 Masyvusis indukuotasis modelis 146

26 Ekvivariantinės tiesinės sluoksniuotės ir Borelio–Veilio teorema 150
26.1 Nuo ekvivariantinių funkcijų prie pjūvių 150
26.2 Projekcinė tiesė ir jos du žemėlapiai 151
26.3 Holomorfinių pjūvių apskaičiavimas 153
26.4 Grupės veikimas ir jo dualusis įvaizdis 154
26.5 Bendroji Borelio–Veilio teorema 157

27 Kompaktinės orbitos ir geometrinis kvantavimas 169
27.1 Sferinė orbita ir jos plotas 169
27.2 Sietys, aprašytos lokaliaisiais reperiais 170
27.3 Sferos sluoksniuotė sveikuoju atveju 171
27.4 Holomorfiniai pjūviai ir ekvivariantiškumas 174
27.5 Kompaktinė konstrukcija ir poslinkis 179

28 Rekonstrukcija ir kvantinių grupių riba 181
28.1 Dvi algebros 181
28.2 Koeficientų diferencijavimas 182
28.3 Ką apima dualioji erdvė 185
28.4 Globaliosios formos ir tenzorinė rekonstrukcija 187
28.5 Ką keičia kvantinių grupių kursas 189

Kaip studijuoti šį kursą

Tai savarankiško skaitymo kursas, kurį sudaro dvi dalys po keturiolika paskaitų. Į paskaitas jis padalytas patogumo dėlei, todėl paskaitų ilgis skiriasi. Studijuokite savo tempu. Paskaitą gali tekti perskaityti kelis kartus. Uždavinių lapas yra atskiras. Jo pagrindiniams uždaviniams skirkite dar nuo dviejų iki keturių valandų.

Šiam kursui reikalingi kursai *Tiesinė algebra fizikams*, *Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai*, *Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija* bei kategorijų kalbos pagrindai. Jų algebrinius rezultatus naudojame visame kurse. Taip pat remiamės įprastine daugelio kintamųjų analize ir paprastųjų diferencialinių lygčių pradmenimis.

Kursas viename puslapyje

Šiame kurse klausiame, ką nusako grupė, bet nenusako jos Lie algebra. Pavyzdžiui, grupių $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$ Lie algebros yra izomorfiškos. Vienos antrosios sukinio modulis V_1 yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdis, bet nėra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdis. Taip pat klausiame, kaip grupės įvaizdžiai aprašo funkcijas toje grupėje.

I dalyje nagrinėjame kompaktines grupes. Ją galima skaityti atskirai. Paskaitose nuo 1 iki 4 sukonstruojame Lie grupes, eksponentinį atvaizdavimą, faktorerdves ir dengiančiąsias grupes. Kurie Lie algebros baigtinės dimensijos įvaizdžiai kyla iš duotosios grupės, nustatome 4-oje paskaitoje. Paskaitose nuo 5 iki 9 nagrinėjame kompaktinės grupės struktūrą: invariantinį integralą, maksimaliuosius torus ir jų gardeles, aukščiausiuosius svorius. Kompaktinės jungios grupės neredukuojamus įvaizdžius išvardijame 8-oje paskaitoje. Paskaitose nuo 10 iki 14 nagrinėjame funkcijas kompaktinėje grupėje. Peterio–Veilio teoremą, kuri apima Furjė eilutes, įrodome 10-oje paskaitoje. Paskaitose 11 ir 12 ją taikome sąsūkai ir funkcijoms vienalytėse erdvėse. Spinorines grupes ir projektyvinius įvaizdžius nagrinėjame 13-oje paskaitoje. Grupę iš jos įvaizdžių atkuriame 14-oje paskaitoje.

II dalyje atsisakome kompaktiškumo. Paskaitose nuo 15 iki 17 atkuriame I dalies įrankius: unitariųjų įvaizdžių generatorius, Haro matą, kurio visa masė begalinė, ir indukciją. Paskaitose 18 ir 19 nagrinėjame Heizenbergo grupę ir kojungtines orbitas. Paskaitose nuo 20 iki 23 nagrinėjame grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir baigiame jos neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių sąrašu. Paskaitose 24 ir 25 nagrinėjame Lorenco ir Puankarė grupes. Paskaitose 26 ir 27 grįžtame prie kompaktinių grupių ir jų įvaizdžius realizuojame tiesinėse sluoksniuotėse ir kojungtinėse orbitose. Grupės funkcijų algebrą su jos gaubiančiąja algebra lyginame 28-oje paskaitoje. Ši paskaita skirta ir pasirengti vėlesniam kursui apie kvantines grupes.

Kaip skaityti paskaitą

Pradėkite nuo tikslų ir studijų rezultatų. Išnagrinėkite atskiromis eilutėmis išskirtus skaičiavimus prieš skaitydami kitą pastraipą. Tada atsakykite į savikontrolės klausimus nežiūrėdami į jų atsakymus.

Pabandykite išspręsti pagrindinius uždavinius prieš atsiversdami pateiktus sprendimus. Palyginkite ne tik galutinį rezultatą, bet ir samprotavimus. Kai kuriuose lapuose yra neprivaloma papildoma dalis. Ji aiškiai pažymėta ir nėra reikalinga kitai paskaitai.

Konspektai kiekviename etape supažindina su tuo metu reikalinga geometrija ir analize. Jie nepakeičia diferencialinės geometrijos, topologijos ar funkcinės analizės kursų. Ilgos egzistavimo teoremos pateikiamos su prielaidomis ir šaltiniu. Pagrindiniai skaičiavimai atliekami čia.

Cituojama teorema pažymėta kaip cituojama: žodžiu *cituojama* ar šaltiniu jos pavadinime arba šalia esančiu sakiniu. Kai įrodymas tik pateiktas eskiziškai, tekste nurodytas praleistas žingsnis. Žyma [C: šaltinis] nurodo cituojamo teiginio šaltinį, o žyma [I] reiškia, kad rezultatas paimtas iš būtinojo ankstesnio kurso. Cituojama teorema naudojama kaip duotybė po jos einančiame samprotavime. Ilgesni patikrinimai, kad šaltinio prielaidos tenkinamos, surinkti paskaitos pabaigoje, skyrelyje *Šaltiniai ir prielaidos*.

Susitarimai

Lie grupės yra baigtinės dimensijos realiosios Lie grupės. Jų daugdaros yra Hausdorfo ir turi skaičiąsias topologijos bazes. Kompaktiškumą ir jungumą nurodome tada, kai jų reikia. Įvaizdžiai yra tolydūs ir veikia kompleksinėse tiesinėse erdvėse. Unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje yra stipriai tolydus. Skaliarinės sandaugos yra antitiesinės pirmojo argumento atžvilgiu.

Realioji Lie algebra ir jos kompleksifikacija yra skirtingi objektai. Atskiru atveju algebra $\mathfrak{k} = \mathrm{Lie}(K)$ yra realioji, o aukščiausiojo svorio teorija taikoma algebrai $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$. Torui, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}$, periodų gardelę apibrėžiame lygybe

$$\Lambda = \ker(\exp\colon \mathfrak{t} \to T).$$

Charakterį užrašome kaip $\chi(\exp H) = e^{i\ell(H)}$. Taigi jo periodų sąlyga yra sąryšis $\ell(\Lambda) \subseteq 2\pi\mathbb{Z}$.

Žymėjimas V_m reiškia grupės $\mathrm{SU}(2)$ modulį, kurio dimensija yra $m+1$, o sukinys lygus $m/2$. Grupės įvaizdžio operatorius žymimas $\Pi(g)$, o jo diferencialas – $d\Pi(X)$. Kai pasirinkta bazė, raidė D žymi operatoriaus matricą. Kiekvienas susitarimo pakeitimas paaiškinamas ten, kur jis naudojamas.

Konspektuose naudojamos knygos

Literatūros sąrašai nurodo, kurias knygų dalis skaityti. Kai kuriose paskaitose naudojami šie sutrumpinimai.

H Brian C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas, Springer, 2015. Tai pagrindinis šaltinis apie matricų grupes, kompaktines grupes ir įvaizdžių integravimą.

BD Theodor Bröcker ir Tammo tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, Springer, 1985. Šioje knygoje pateikiama bendroji kompaktinių grupių teorija ir rekonstrukcija.

S Mark R. Sepanski, *Compact Lie Groups*, Springer, 2007. Tai antrasis šaltinis apie kompaktinių grupių struktūrą ir Peterio–Veilio teoriją.

Knapp Beyond
Anthony W. Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, antrasis leidimas. Šioje knygoje pateikiama bendroji Lie grupių struktūra.

Knapp Representation Theory
Anthony W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples*, Princeton University Press, 2001 m. leidimas. Šioje knygoje pateikiami nekompaktinių grupių pavyzdžiai, glodieji vektoriai ir indukuotieji įvaizdžiai.

Kirillov Jr.
Alexander Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, Cambridge University Press, 2008.

Kirillov Elements
A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations*, Springer, 1976.

Kirillov Orbit Method
A. A. Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, American Mathematical Society, 2004.

Warner
Frank W. Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, leidyklos Springer leidimas, 1983.

Kiti pirminiai šaltiniai nurodomi atitinkamose paskaitose. Abi Knapp knygos skirtos skirtingiems tikslams. Visame kurse jų pavadinimai atskiriami.

Dalis II

Nekompaktinių grupių įvaizdžiai, geometrija ir fizika

Paskaita 15

Stiprusis tolydumas ir infinitezimalieji generatoriai

Tikslai. *Kurso II dalyje nagrinėjami unitarieji įvaizdžiai begalinės dimensijos Hilberto erdvėse. Jų išvestinės gali egzistuoti tik poerdvyje, nesutampančiame su visa erdve. Šioje paskaitoje fiksuosime tolydumo prielaidą ir apibrėšime išvestinę glodiesiems vektoriams. Remdamiesi Stouno teorema, kiekvienam vienparametriam pogrupiui nustatysime antisavijungį generatorių kartu su generatoriaus apibrėžimo sritimi. Visoje paskaitoje pagrindinis modelis yra postūmiai erdvėje* $L^2(\mathbb{R})$.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti homomorfizmo į unitariąją grupę stiprųjį tolydumą, kai tolydumas neutraliajame elemente yra žinomas tirštos vektorių aibės vektoriams.
- Apibrėžti glodžiuosius vektorius bei atvaizdavimą $d\Pi$ ir įrodyti, kad kiekvienas operatorius $d\Pi(X)$ yra antisimetrinis glodžiųjų vektorių aibėje.
- Suformuluoti Stouno teoremą su jos prielaidomis ir sutapatinti operatoriaus $d\Pi(X)$ uždarinį su generatoriumi.
- Nustatyti konkrečių vektorių padėtį apibrėžimo sričių atžvilgiu postūmių atveju: Švarco funkcijų, apibrėžimo sričiai priklausančio vektoriaus, kuris nėra Švarco funkcija, ir vektoriaus, kuris nepriklauso apibrėžimo sričiai. Įrodyti, kad postūmių įvaizdis neturi nenulinio baigtinės dimensijos invariantinio poerdvio.

15.1 Nuo matricų prie Hilberto erdvių

Tegul $\Pi\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ yra tolydusis įvaizdis baigtinės dimensijos kompleksinėje erdvėje V. Tolydieji Lie grupių homomorfizmai yra glodūs (3-ioji paskaita). Todėl kiekvienas elementas $X \in \mathfrak{g}$ apibrėžia operatorių

$$d\Pi(X) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Pi(\exp tX) \in \mathrm{End}(V), \qquad \Pi(\exp tX) = e^{t\,d\Pi(X)}.$$

Jei įvaizdis Π yra unitarusis, tai $d\Pi(X)^* = -d\Pi(X)$. Diferencijuoti galima kiekvieną vektorių.

Kai grupė G yra kompaktinė, Peterio–Veilio teorema (10-oji paskaita) kiekvieną unitarųjį įvaizdį išskaido į baigtinės dimensijos poįvaizdžius. Ši teorija remiasi vidurkinimu. Kompaktinės grupės Haro integralo visa masė yra baigtinė, todėl 5-oje paskaitoje galima vidurkinti skaliarinę sandaugą, o 10-oje paskaitoje – operatorių. Nekompaktinė Lie grupė taip pat

turi invariantinį integralą, tačiau jo visa masė yra begalinė (16-oji paskaita). Todėl ji neturi normuoto baigtinio Haro integralo, ir šie vidurkinimo argumentai bendruoju atveju nebetinka.

Teorija keičiasi taip. Pirmiausia baigtinės dimensijos įvaizdis nebūtinai išsaugo kokią nors skaliarinę sandaugą. Pavyzdžiui, kai $m \geq 1$ ir $t \neq 0$, matrica $\operatorname{diag}(e^t, e^{-t}) \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ modulyje V_m veikia su tikrine verte e^{mt}, o unitariojo operatoriaus tikrinių verčių modulis lygus vienetui. Toliau, 23-ioje paskaitoje, įrodysime daugiau: kiekvienas baigtinės dimensijos grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitarusis įvaizdis yra trivialus. Taigi netrivialus šios grupės unitarusis įvaizdis yra begalinės dimensijos.

Tai nėra kiekvienos nekompaktinės grupės savybė. Grupė $\mathbb{R}$ turi vienmačius unitariuosius charakterius $x \mapsto e^{icx}$. Ji parodo kitą pokytį. Jos postūmių įvaizdis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ yra unitarusis ir neturi nenulinio baigtinės dimensijos invariantinio poerdvio (toliau pateiktas Teiginys 15.4). Taigi unitarusis įvaizdis nebūtinai turi nenulinį baigtinės dimensijos poįvaizdį.

Galiausiai begalinės dimensijos erdvėje įvaizdžio išvestinė gali būti apibrėžta tik poerdvyje, nesutampančiame su visa erdve. Pradėsime nuo šio klausimo, nagrinėdami postūmius. Paskui 16-oje ir 17-oje paskaitose sukonstruosime Haro matą ir indukuotuosius įvaizdžius be kompaktiškumo prielaidos. Šiuos įrankius taikysime Heizenbergo grupei, grupei $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, Lorenco ir Puankarė grupėms. Prie kompaktinių grupių grįšime 26-ojoje ir 27-ojoje paskaitose, o 28-ojoje paskaitoje grįšime prie 14-osios paskaitos temos.

Pagrindinis pavyzdys yra postūmių įvaizdis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, todėl pirmiausia sukonstruosime šią erdvę.

Tegul $C_c(\mathbb{R})$ yra tolydžiųjų funkcijų $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$, turinčių kompaktinę atramą, erdvė su skaliarine sandauga

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)}\, g(x)\, dx.$$

Jos Hilberto papildinys yra erdvė $L^2(\mathbb{R})$.

Norime, kad indikatorinė funkcija $1_{[0,1]}$ būtų erdvės $L^2(\mathbb{R})$ vektorius, nes ji bus mūsų vektoriaus, neturinčio išvestinės, pavyzdys. Kaip ir 10-oje paskaitoje, bendras papildinio elementas neturi reikšmių atskiruose taškuose. Todėl nurodysime, kurios funkcijos apibrėžia vektorius. Funkcijos $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ *šuoliu* vadinsime tašką, kuriame funkcija f yra trūki, bet turi abi vienpuses ribas. Funkciją f vadinsime *tolydžia dalimis*, jei kiekviename aprėžtame intervale ji yra tolydi visur, išskyrus baigtinį skaičių šuolių. Jei, be to, netiesioginis integralas $\int_{\mathbb{R}} |f|^2\, dx$ yra baigtinis, funkciją f vadinsime *kvadratiškai integruojama*. Tokia funkcija f apibrėžia erdvės $L^2(\mathbb{R})$ vektorių. Dviem tokioms funkcijoms f ir $\tilde{f}$ galioja lygybės

$$\|f\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f|^2\, dx, \qquad \langle f, \tilde{f} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \bar{f}\tilde{f}\, dx.$$

Pakeitus funkcijos f reikšmes baigtinėje taškų aibėje, vektorius nepasikeičia. Skyrelyje 15.6 šį vektorių sukonstruosime ir šias formules įrodysime.

Kai $t \in \mathbb{R}$ ir $f \in C_c(\mathbb{R})$, apibrėžkime

$$(\lambda(t)f)(x) = f(x - t).$$

Tada $\lambda(s)\lambda(t) = \lambda(s+t)$. Pakeitę kintamąjį, gauname lygybę $\|\lambda(t)f\| = \|f\|$. Todėl kiekvienas operatorius $\lambda(t)$ tęsiasi iki unitariojo operatoriaus erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, kurio atvirkštinis operatorius yra $\lambda(-t)$. Aukščiau aptartoms tolydžioms dalimis funkcijoms operatorius $\lambda(t)$ tebėra postūmis.

Sutapatinkime grupės $\mathbb{R}$ Lie algebrą su tiesine erdve $\mathbb{R}$. Taip sutapatinus, eksponentinis atvaizdavimas $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ yra tapatusis, todėl vektorius $d\lambda(1)f$ yra atvaizdavimo $t \mapsto \lambda(t)f$ išvestinė taške $t = 0$. Formaliai gautume lygybę $\frac{d}{dt}\lambda(t)f\big|_{t=0} = -f'$. Bendram vektoriui ši formulė neturi prasmės. Pavyzdyje 15.16, skirtame apibrėžimo sritims, funkcijos $1_{[0,1]}$ skirtuminiai santykiai yra neaprėžti. Todėl operatoriui $d\lambda(1)$ reikia nurodyti apibrėžimo sritį.

15.2 Stiprusis tolydumas

Apibrėžimas 15.1. Tegul $\mathcal{H}$ yra kompleksinė Hilberto erdvė, o $\mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra jos unitariųjų operatorių grupė. Lie grupės G *unitariuoju įvaizdžiu* erdvėje $\mathcal{H}$ vadinamas homomorfizmas $\Pi\colon G \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$, kuriam atvaizdavimas $G \to \mathcal{H}$, apibrėžtas formule $g \mapsto \Pi(g)v$, yra tolydus kiekvienam vektoriui $v \in \mathcal{H}$. Ši sąlyga vadinama *stipriuoju tolydumu*. Homomorfizmas vadinamas *tolydžiu pagal normą*, jei atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)$ yra tolydus operatorinės normos atžvilgiu.

Lema 15.2. *Tegul $\Pi\colon G \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra homomorfizmas. Tegul aibė $D \subset \mathcal{H}$ yra tiršta ir atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)w$ yra tolydus taške e kiekvienam vektoriui $w \in D$. Tada homomorfizmas Π yra stipriai tolydus.*

Įrodymas. Tegul $v \in \mathcal{H}$ ir $w \in D$. Kadangi operatorius $\Pi(g)$ yra unitarusis, galioja įvertis

$$\|\Pi(g)v - v\| \le \|\Pi(g)(v-w)\| + \|\Pi(g)w - w\| + \|w - v\| = 2\|v - w\| + \|\Pi(g)w - w\|.$$

Tegul $\varepsilon > 0$. Pasirinkime vektorių w, kuriam $\|v - w\| < \varepsilon$. Tada $\limsup_{g\to e} \|\Pi(g)v - v\| \le 2\varepsilon$. Vadinasi, atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)v$ yra tolydus taške e. Kitame taške h naudojame lygybę

$$\|\Pi(g)v - \Pi(h)v\| = \|\Pi(h^{-1}g)v - v\|,$$

be to, $h^{-1}g \to e$, kai $g \to h$. ∎

Teiginys 15.3. *Postūmiai λ sudaro grupės $\mathbb{R}$ unitarųjį įvaizdį erdvėje $L^2(\mathbb{R})$.*

Įrodymas. Liko įrodyti tik stiprųjį tolydumą. Taikysime tirštosios aibės kriterijų (Lema 15.2), kai $D = C_c(\mathbb{R})$. Tegul funkcija $f \in C_c(\mathbb{R})$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$ ribų. Kai $|t| \le 1$, funkcija $\lambda(t)f - f$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų. Todėl

$$\|\lambda(t)f - f\|^2 \le (2R+2) \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)|^2.$$

Kadangi funkcija f yra tolydi ir turi kompaktinę atramą, ji yra tolygiai tolydi. Todėl nelygybės dešinioji pusė artėja prie 0, kai $t \to 0$. Taigi pagal tirštosios aibės kriterijų postūmių įvaizdis yra stipriai tolydus. ∎

Pagal Peterio–Veilio teoremą (10-oji paskaita) kiekvienas kompaktinės grupės unitarusis įvaizdis išsiskaido į baigtinės dimensijos poįvaizdžius. Kitas teiginys parodo, kad unitarusis įvaizdis λ, kurį turi nekompaktinė grupė $\mathbb{R}$, neturi nė vieno nenulinio tokio poįvaizdžio.

Teiginys 15.4. *Įvaizdis λ neturi nenulinio baigtinės dimensijos invariantinio poerdvio.*

Įrodymas. Pirmiausia parodysime, kad matriciniai koeficientai gęsta. Tegul $f, g \in C_c(\mathbb{R})$. Kai dydis $|t|$ yra didelis, funkcijų g ir $\lambda(t)f$ atramos nesikerta, todėl $\langle g, \lambda(t)f\rangle = 0$. Dabar tegul $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ ir pasirinkime $f_0, g_0 \in C_c(\mathbb{R})$, pagal normą artimas funkcijoms f ir g. Kadangi operatorius $\lambda(t)$ yra unitarusis, galioja įvertis

$$|\langle g, \lambda(t)f\rangle - \langle g_0, \lambda(t)f_0\rangle| \le \|g - g_0\|\,\|f\| + \|g_0\|\,\|f - f_0\|.$$

Todėl $\langle g, \lambda(t)f\rangle \to 0$, kai $|t| \to \infty$, visiems $f, g \in L^2(\mathbb{R})$.


Tarkime, kad $W \neq 0$ yra baigtinės dimensijos invariantinis poerdvis, kurio ortonormuotoji bazė yra $e_1, \dots, e_k$. Tegul $f \in W$ yra vienetinis vektorius. Tada $\lambda(t)f$ yra poerdvio W vienetinis vektorius, todėl

$$\sum_{j=1}^{k} |\langle e_j, \lambda(t)f\rangle|^2 = 1 \qquad \text{visiems } t \in \mathbb{R}.$$

Kiekvienas iš baigtinio skaičiaus šios sumos narių artėja prie 0, kai $|t| \to \infty$. Tai yra prieštara. ∎

Tolydumas pagal normą būtų per stiprus reikalavimas, nes postūmiai nėra tolydūs pagal normą. Uždavinyje 15.1 įrodyta, kad $\|\lambda(t) - I\| = 2$ kiekvienam skaičiui $t \neq 0$. Stiprusis tolydumas reikalauja tolydumo atskirai kiekvienam vektoriui. Jis nereikalauja, kad šis tolydumas būtų tolygus visų vienetinių vektorių atžvilgiu.

Skirtumą tarp fiksuoto vektoriaus ir vektoriaus, parinkto jau žinant skaičių t, rodo 15.1 pav. Imkime fiksuotą laiptinę funkciją $1_{[0,1]}$ ir mažą skaičių $t > 0$. Pastumta funkcija nuo pradinės skiriasi tik dviejuose siauruose intervaluose, kurių bendras ilgis lygus $2t$. Todėl $\|\lambda(t)1_{[0,1]} - 1_{[0,1]}\| \to 0$, kai $t \to 0$. Uždavinio 15.1 šukų pavidalo funkcija priklauso nuo skaičiaus t, nes jos dantų plotis lygus t. Postūmis per t persidengimo srityje pakeičia šios funkcijos ženklą. Todėl santykis $\|\lambda(t)f - f\|/\|f\|$ lieka atskirtas nuo 0 kiekvienam skaičiui t. Tai neprieštarauja stipriajam tolydumui, nes stipriojo tolydumo apibrėžime pirmiausia fiksuojamas vektorius.



15.1 pav.: Du vektoriai (stora linija) ir jų postūmiai per t (punktyrinė linija). Pirmoje dalyje pavaizduota fiksuota laiptinė funkcija $1_{[0,1]}$, o du siauri intervalai užtušuoti. Antroje dalyje pavaizduota Uždavinio 15.1 šukų pavidalo funkcija f_4, kurios dantų plotis lygus t.

15.3 Glodieji vektoriai ir išvestinis įvaizdis

Atvaizdavimas iš atvirojo erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibio į erdvę $\mathcal{H}$ vadinamas *glodžiu*, jei jo visų eilių dalinės išvestinės egzistuoja kaip ribos erdvės $\mathcal{H}$ normos atžvilgiu ir yra tolydžios. Atvaizdavimas $G \to \mathcal{H}$ vadinamas glodžiu, jei jis yra glodus kiekviename koordinačių žemėlapyje.

Apibrėžimas 15.5. Tegul Π yra grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Vektorius $v \in \mathcal{H}$ vadinamas *glodžiu*, jei formulė $g \mapsto \Pi(g)v$ apibrėžia glodų atvaizdavimą $G \to \mathcal{H}$. Glodžiųjų vektorių aibę žymėsime simboliu $\mathcal{H}^\infty$. Kai $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir $X \in \mathfrak{g}$, apibrėžkime

$$d\Pi(X)v = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Pi(\exp tX)v = \lim_{t\to 0} \frac{\Pi(\exp tX)v - v}{t}.$$

Aibė $\mathcal{H}^\infty$ yra erdvės $\mathcal{H}$ poerdvis, nes glodžiųjų atvaizdavimų $G \to \mathcal{H}$ tiesiniai dariniai yra glodūs. Riba, apibrėžianti vektorių $d\Pi(X)v$, egzistuoja, nes atvaizdavimas $t \mapsto \Pi(\exp tX)v$ yra glodžiosios kreivės $t \mapsto \exp tX$ ir glodžiojo atvaizdavimo iš glodžiojo vektoriaus apibrėžimo kompozicija.

Teiginys 15.6. *Tegul Π yra Lie grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$ ir tegul $g \in G$ bei $X \in \mathfrak{g}$.*

(a) Galioja sąryšiai $\Pi(g)\mathcal{H}^\infty \subset \mathcal{H}^\infty$ ir $d\Pi(X)\mathcal{H}^\infty \subset \mathcal{H}^\infty$.

(b) Poerdvis $\mathcal{H}^\infty$ yra tirštas erdvėje $\mathcal{H}$.

(c) Atvaizdavimas $X \mapsto d\Pi(X)$ yra algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$ ir lygybė $d\Pi(\mathrm{Ad}(g)X) = \Pi(g)\, d\Pi(X)\, \Pi(g)^{-1}$ galioja poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$.

(d) Kai $v, w \in \mathcal{H}^\infty$, galioja lygybė $\langle d\Pi(X)v, w\rangle = -\langle v, d\Pi(X)w\rangle$.

Įrodymas. Iš knygos Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups*, III.3–4 skyrelių cituojame (a) dalies invariantiškumą operatoriaus $d\Pi(X)$ atžvilgiu, (b) dalies tirštumą ir (c) dalies įvaizdžio savybę bei formulę su Ad. Likusius teiginius įrodysime.

Įrodykime (a) dalies invariantiškumą operatoriaus $\Pi(g)$ atžvilgiu. Tegul $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir $h \in G$, o atvaizdavimas yra apibrėžtas formule $F(g) = \Pi(g)v$. Tada $\Pi(g)\Pi(h)v = F(gh)$. Dešinysis postūmis elementu h yra glodus grupėje G, todėl atvaizdavimas $g \mapsto F(gh)$ yra glodus.

Įrodykime (d) dalies antisimetriškumą. Iš unitarumo išplaukia lygybė

$$\langle \Pi(\exp tX)v, w\rangle = \langle v, \Pi(\exp(-tX))w\rangle.$$

Atimkime iš abiejų lygybės pusių skaliarinę sandaugą $\langle v, w\rangle$ ir padalykime jas iš skaičiaus $t \neq 0$:

$$\left\langle \frac{\Pi(\exp tX)v - v}{t},\, w \right\rangle = -\left\langle v,\, \frac{\Pi(\exp(-tX))w - w}{-t} \right\rangle.$$

Skaliarinė sandauga yra tolydi, todėl, perėję prie ribos $t \to 0$, gauname (d) dalies lygybę. ∎

Praleistas (b) dalies tirštumo žingsnis yra sudėtingas, todėl pateiksime jo eskizą. Eskize naudojamas vektorinių reikšmių integralas pagal kairįjį Haro matą dg grupėje G. Kompaktinei grupei G Haro matas buvo įvestas 5-oje paskaitoje. Nekompaktinei grupei G jis bus įvestas 16-oje paskaitoje, todėl iki tol šiam integralui remiamės knyga Knapp. Kai $\varphi \in C_c^\infty(G)$ ir $v \in \mathcal{H}$, sudarykime *Gordingo vektorių*

$$\Pi(\varphi)v = \int_G \varphi(g)\, \Pi(g)v\, dg.$$

Tegul $h \in G$. Kadangi operatorius $\Pi(h)$ yra aprėžtas, jį galima įnešti po integralo ženklu. Tada mato dg kairysis invariantiškumas leidžia atlikti keitinį $g \mapsto h^{-1}g$. Gauname

$$\Pi(h)\Pi(\varphi)v = \int_G \varphi(g)\,\Pi(hg)v\,dg = \int_G \varphi(h^{-1}g)\,\Pi(g)v\,dg.$$

Dabar elementas h įeina tik į glodžiąją skaliarinę funkciją $(h,g) \mapsto \varphi(h^{-1}g)$. Diferencijuodami po integralo ženklu pagal elemento h lokaliąsias koordinates, matome, kad atvaizdavimas $h \mapsto \Pi(h)\Pi(\varphi)v$ yra glodus grupėje G. Todėl vektorius $\Pi(\varphi)v$ yra glodus. Jei $\varphi_n \geq 0$, $\int_G \varphi_n\,dg = 1$ ir funkcijų atramos traukiasi į elementą e, tai

$$\|\Pi(\varphi_n)v - v\| \leq \sup_{g \in \operatorname{supp}\varphi_n} \|\Pi(g)v - v\| \longrightarrow 0$$

pagal stiprųjį tolydumą. Uždavinyje 15.4 šis argumentas atliekamas, kai $G = \mathbb{R}$, naudojant Rymano integralus.

15.4 Neaprėžti operatoriai ir Stouno teorema

Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ operatorius $-d/dx$ yra apibrėžtas tik poerdvyje. Tokiems operatoriams aprašyti reikia tinkamų sąvokų.

Apibrėžimas 15.7. *Operatoriumi* A erdvėje $\mathcal{H}$ vadinamas tiesinis atvaizdavimas $A\colon D(A) \to \mathcal{H}$, apibrėžtas poerdvyje $D(A) \subset \mathcal{H}$ – operatoriaus *apibrėžimo srityje*. Operatorius vadinamas *tirštai apibrėžtu*, jei sritis $D(A)$ yra tiršta. Rašysime $B \subset A$, jei $D(B) \subset D(A)$ ir $Bv = Av$ visiems vektoriams $v \in D(B)$.

Apibrėžimas 15.8. Tegul operatorius A yra tirštai apibrėžtas. *Jungtinio operatoriaus* A^* apibrėžimo sritis yra aibė vektorių $w \in \mathcal{H}$, kuriems egzistuoja vektorius $u \in \mathcal{H}$, tenkinantis sąlygą

$$\langle w, Av\rangle = \langle u, v\rangle \qquad \text{visiems } v \in D(A),$$

ir tada $A^*w = u$. Operatorius A vadinamas *antisimetriniu*, jei $\langle Av, w\rangle = -\langle v, Aw\rangle$ visiems vektoriams $v, w \in D(A)$. Jis vadinamas *antisavijungiu*, jei $A^* = -A$, įskaitant apibrėžimo sričių lygybę $D(A^*) = D(A)$, ir *savijungiu*, jei $A^* = A$, įskaitant apibrėžimo sričių lygybę $D(A^*) = D(A)$.

Kadangi sritis $D(A)$ yra tiršta, vektorius u su šia savybe yra vienintelis. Operatoriaus A antisimetriškumas reiškia lygiai tai, kad $-A \subset A^*$.

Tarkime, kad $B \subset A$ ir operatorius B yra tirštai apibrėžtas. Tada sritis $D(A) \supset D(B)$ taip pat yra tiršta, todėl abu jungtiniai operatoriai egzistuoja. Šiuo atveju $A^* \subset B^*$, nes lygybė, apibrėžianti vektorių A^*w, atskiru atveju galioja vektoriams $v \in D(B)$.

Lema 15.9. *Tegul operatorius B yra tirštai apibrėžtas ir antisimetrinis. Jei $v_n \in D(B)$, $v_n \to 0$ ir $Bv_n \to u$, tai $u = 0$.*

Įrodymas. Kiekvienam vektoriui $w \in D(B)$ iš skaliarinės sandaugos tolydumo ir operatoriaus B antisimetriškumo gauname

$$\langle w, u\rangle = \lim_n \langle w, Bv_n\rangle = -\lim_n \langle Bw, v_n\rangle = 0.$$

Taigi vektorius u yra ortogonalus tirštam poerdviui $D(B)$, todėl $u = 0$. ∎

Apibrėžimas 15.10. Tegul operatorius B yra tirštai apibrėžtas ir antisimetrinis. Jo *uždarinio* $\bar{B}$ apibrėžimo sritis yra aibė vektorių $v \in \mathcal{H}$, kuriems egzistuoja tokie vektoriai $v_n \in D(B)$, kad $v_n \to v$ ir seka (Bv_n) konverguoja. Tada $\bar{B}v = \lim_n Bv_n$.

Reikšmė $\bar{B}v$ nepriklauso nuo sekos pasirinkimo, nes dviejų tokių sekų skirtumas tenkina antisimetrinių operatorių ribos lemos (Lema 15.9) prielaidas.

Apibrėžimas 15.11. Tegul $U\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra unitarusis įvaizdis. Jo *generatoriaus* A apibrėžimo sritis yra

$$D(A) = \left\{ v \in \mathcal{H} : \lim_{t\to 0} \frac{U(t)v - v}{t} \text{ egzistuoja erdvėje } \mathcal{H} \right\},$$

o vektorius Av yra lygus šiai ribai.

Teorema 15.12 (Stouno). *Tegul $U\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra stipriai tolydus unitarusis įvaizdis, kurio generatorius yra A.*

(a) Generatorius A yra tirštai apibrėžtas ir antisavijungis. Be to, $U(t)D(A) \subset D(A)$ ir $AU(t)v = U(t)Av$ visiems vektoriams $v \in D(A)$.

(b) Tegul $D \subset D(A)$ yra tirštas poerdvis, kuriam $U(t)D \subset D$ visiems skaičiams t. Tada apribojimas $A|_D$ yra antisimetrinis ir jo uždarinys yra operatorius A.

(c) Kiekvienas antisavijungis operatorius yra lygiai vieno grupės $\mathbb{R}$ stipriai tolydaus unitariojo įvaizdžio generatorius. Šis įvaizdis žymimas $t \mapsto e^{tA}$.

Daugumą šios teoremos teiginių cituojame, o įrodome tik (a) dalies invariantiškumo teiginį. Šaltiniai yra knygos Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, 10.2 skyrelis, ir Reed–Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I*, VIII.4 skyrelis. Šių knygų susitarimus su mūsiškiais suderina šios paskaitos pabaigos skyrelis apie šaltinius ir prielaidas. Tegul $v \in D(A)$. Kadangi operatorius $U(t)$ yra aprėžtas ir komutuoja su operatoriumi $U(h)$, gauname

$$\frac{U(h)U(t)v - U(t)v}{h} = U(t)\,\frac{U(h)v - v}{h} \longrightarrow U(t)Av \qquad (h \to 0).$$

Todėl $U(t)v \in D(A)$ ir $AU(t)v = U(t)Av$.

Pagal mūsų fizikinį susitarimą rašome $U(t) = e^{-itH}$ su savijungiu operatoriumi H, todėl $H = iA$.

Išvada 15.13. *Tegul Π yra Lie grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Tegul $X \in \mathfrak{g}$, o B_X yra įvaizdžio $t \mapsto \Pi(\exp tX)$ generatorius. Tada $\mathcal{H}^\infty \subset D(B_X)$ ir lygybė $B_X = d\Pi(X)$ galioja poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$. Operatoriaus $d\Pi(X)$ su apibrėžimo sritimi $\mathcal{H}^\infty$ uždarinys yra antisavijungis operatorius B_X. Be to, $\Pi(\exp tX) = e^{t\,\overline{d\Pi(X)}}$.*

Įrodymas. Atvaizdavimas $t \mapsto \exp tX$ yra tolydusis homomorfizmas $\mathbb{R} \to G$. Jo kompozicija su įvaizdžiu Π yra homomorfizmas $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$. Kiekvienam vektoriui v atvaizdavimas $t \mapsto \Pi(\exp tX)v$ yra tolydžiojo atvaizdavimo ir po jo taikomo tolydžiojo atvaizdavimo $g \mapsto \Pi(g)v$ kompozicija. Todėl atvaizdavimas $t \mapsto \Pi(\exp tX)$ yra stipriai tolydus grupės $\mathbb{R}$ unitarusis įvaizdis. Jo generatorius B_X yra apibrėžtas.

Pirmieji du teiginiai tik pakartoja operatoriaus $d\Pi(X)$ apibrėžimą. Pagal Teiginio 15.6 invariantiškumo ir tirštumo teiginius poerdvis $\mathcal{H}^\infty$ yra tirštas ir invariantinis kiekvieno operatoriaus $\Pi(\exp tX)$ atžvilgiu. Pritaikę Teoremos 15.12(b) tirštos invariantinės apibrėžimo

srities kriterijų, kai $D = \mathcal{H}^\infty$, gauname, kad operatoriaus $d\Pi(X)$ uždarinys yra operatorius B_X. Tada Teoremos 15.12(c) vienatinumo teiginys duoda lygybę $\Pi(\exp tX) = e^{t\overline{d\Pi(X)}}$. ∎

Generatoriaus B_X apibrėžimo sritis gali būti didesnė už poerdvį $\mathcal{H}^\infty$. Ši sritis gali priklausyti nuo elemento X, o operatorius B_X jos nebūtinai išsaugo. Pavyzdžiui, Uždavinyje 15.2 pateikiamas vektorius g, kuris priklauso postūmių generatoriaus apibrėžimo sričiai, tačiau jo vaizdas šiai sričiai nepriklauso. Komutatoriams $[d\Pi(X), d\Pi(Y)]$ reikia vieno poerdvio, kuriame apibrėžtas kiekvienas operatorius $d\Pi(X)$ ir kurį kiekvienas operatorius $d\Pi(X)$ išsaugo. Pagal Teiginį 15.6 poerdvis $\mathcal{H}^\infty$ turi abi šias savybes.

Pagal aukščiau aptartą fizikinį susitarimą įvaizdžio $t \mapsto \Pi(\exp tX)$ *fizikiniu generatoriumi* vadinamas operatorius $A_X = iB_X$, todėl $\Pi(\exp tX) = e^{-itA_X}$. Kadangi operatorius B_X yra antisavijungis, operatorius A_X yra savijungis. Postūmių atveju, kai $X = 1 \in \mathbb{R}$, generatorius B_1 yra operatorius, kurį kitame skyrelyje žymėsime A. Indeksas čia svarbus: fizikinis generatorius $A_1 = iA$ yra savijungis, o operatorius A yra antisavijungis. Kai $\hbar = 1$, operatorius A_1 yra impulso operatorius P, formaliai užrašomas kaip $-i\,d/dx$.

15.5 Postūmiai erdvėje $L^2(\mathbb{R})$

Švarco erdve $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ vadinama erdvė glodžiųjų funkcijų $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, tokių, kad

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |x^k f^{(j)}(x)| < \infty \qquad \text{visiems } j, k \geq 0.$$

Ji apima poerdvį $C_c^\infty(\mathbb{R})$ ir funkciją $e^{-x^2/2}$. Tegul A yra postūmių įvaizdžio λ generatorius.

Lema 15.14. *Tegul $f \in C^2(\mathbb{R})$, o funkcijos f ir f' yra kvadratiškai integruojamos. Tarkime, kad $|f''(y)| \leq C(1+y^2)^{-1}$ visiems skaičiams y. Tada $f \in D(A)$ ir $Af = -f'$.*

Įrodymas. Fiksuokime skaičių, tenkinantį sąlygą $0 < |h| \leq 1$. Teiloro formulė su integraline liekana, pritaikyta funkcijai $s \mapsto f(x - sh)$ intervale $[0, 1]$, duoda

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + h^2 \int_0^1 (1-s) f''(x-sh)\, ds.$$

Paklaidos funkcija tada apibrėžiama formule

$$q_h(x) = \frac{f(x-h) - f(x)}{h} + f'(x) = h \int_0^1 (1-s) f''(x-sh)\, ds,$$

iš kurios išplaukia įvertis $|q_h(x)| \leq \frac{|h|}{2} \sup_{|y-x|\leq 1} |f''(y)|$. Jei $|y-x| \leq 1$, tai $x^2 \leq (|y|+1)^2 \leq 2y^2 + 2$, todėl $1 + x^2 \leq 3(1+y^2)$. Vadinasi, galioja įverčiai

$$|q_h(x)| \leq \frac{3C|h|}{2(1+x^2)}, \qquad \|q_h\|^2 \leq \frac{9C^2h^2}{4} \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{9\pi C^2 h^2}{8}.$$

Taigi $\left\| \frac{\lambda(h)f - f}{h} - (-f') \right\| = \|q_h\| \to 0$. ∎

Esminė prielaida yra svertinis įvertis $|f''(y)| \le C(1+y^2)^{-1}$. Įrodyme nagrinėjamas skirtuminis santykis konverguoja taškas po taško kiekvienai C^1 klasės funkcijai f. Vien konvergavimas taškas po taško neužtikrina konvergavimo pagal normą. Dėl svertinio įverčio paklaidos q_h modulis neviršija tam tikros fiksuotos kvadratiškai integruojamos funkcijos, padaugintos iš $|h|$, todėl paklaidos q_h norma yra $O(|h|)$.

Teiginys 15.15. *Erdvė $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra tiršta erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, invariantinė kiekvieno operatoriaus $\lambda(t)$ atžvilgiu ir telpa poerdvyje $L^2(\mathbb{R})^\infty$. Kiekvienai funkcijai $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ galioja lygybė $d\lambda(1)f = -f'$. Operatoriaus $B = -d/dx$ su apibrėžimo sritimi $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ uždarinys yra antisavijungis generatorius A.*

Įrodymas. Invariantiškumas. Įveskime kintamąjį $y = x - t$. Išskleidus $x^k = (y+t)^k$, dydis $|x^k f^{(j)}(x-t)|$ neviršija baigtinės narių $\binom{k}{i}|t|^{k-i}|y^i f^{(j)}(y)|$ sumos.

Glodumas. Kiekviena funkcija $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ tenkina Teiloro liekanos lemos (Lema 15.14) prielaidas, nes funkcijos $(1+y^2)f$, $(1+y^2)f'$ ir $(1+y^2)f''$ yra aprėžtos. Todėl funkcijos f ir f' yra kvadratiškai integruojamos ir galioja įvertis $|f''| \le C(1+y^2)^{-1}$. Atskiru atveju gauname, kad $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$. Pagal lemą atvaizdavimas $t \mapsto \lambda(t)f$ yra diferencijuojamas taške 0 ir jo išvestinė šiame taške lygi $-f'$. Bet kuriame taške t_0 galioja sąryšis

$$\frac{\lambda(t_0+h)f - \lambda(t_0)f}{h} = \lambda(t_0)\,\frac{\lambda(h)f - f}{h} \longrightarrow \lambda(t_0)(-f'),$$

nes operatorius $\lambda(t_0)$ yra aprėžtas. Gautoji išvestinė yra atvaizdavimas $t \mapsto \lambda(t)(-f')$. Jis yra tolydus dėl postūmių stipriojo tolydumo (Teiginys 15.3). Kadangi $-f' \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, šį argumentą galima kartoti. Taigi k-oji išvestinė yra atvaizdavimas $t \mapsto \lambda(t)\big((-1)^k f^{(k)}\big)$, todėl funkcija f yra glodusis vektorius.

Tirštumas. Fiksuokime funkciją $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, tokią, kad $\varphi \ge 0$, jos atrama yra intervale $[-1,1]$ ir $\int \varphi = 1$. Apibrėžkime funkcijas formule $\varphi_n(t) = n\varphi(nt)$. Tegul funkcija $f \in C_c(\mathbb{R})$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R,R]$ ribų. Jai apibrėžkime funkcijas formule

$$f_n(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x-y)f(y)\,dy = \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(t)f(x-t)\,dt.$$

Pirmoji išraiška rodo, kad $f_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir šios funkcijos atrama yra intervale $[-R-1, R+1]$. Antroji išraiška duoda įvertį

$$|f_n(x) - f(x)| \le \sup_{|t|\le 1/n} |f(x-t) - f(x)|,$$

kurio dešinioji pusė artėja prie 0 tolygiai pagal x, nes funkcija f yra tolygiai tolydi. Kadangi funkcijos f_n ir f yra lygios nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų, gauname, kad $f_n \to f$ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Kadangi poerdvis $C_c(\mathbb{R})$ yra tirštas erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, erdvė $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ taip pat yra tiršta.

Uždarinys. Pagal tris aukščiau pateiktus žingsnius erdvė $D = \mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra tirštas invariantinis apibrėžimo srities $D(A)$ poerdvis. Todėl Teoremos 15.12(b) tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijus rodo, kad operatoriaus B uždarinys yra generatorius A. ∎

Funkcija f_n yra Gordingo vektorius $\lambda(\varphi_n)f$, užrašytas taškine forma. Pagal analogiją su 11-osios paskaitos kompaktinėmis grupėmis ši funkcija yra sąsūka $\varphi_n * f$.

Pavyzdys 15.16. Vektoriai w ir h bei operatorius $B = -d/dx$, apibrėžtas erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, parodo apibrėžimo sričių padėtį.

(i) Tegul funkcija yra apibrėžta formule $w(x) = (1+x^2)^{-1}$. Tada

$$w'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, \qquad w''(x) = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}.$$

Kadangi $|6x^2-2| \le 6(1+x^2)$, gauname įvertį $|w''(x)| \le 6(1+x^2)^{-2} \le 6(1+x^2)^{-1}$. Abi funkcijos w ir w' yra kvadratiškai integruojamos. Iš Teiloro liekanos lemos (Lema 15.14) išplaukia, kad $w \in D(A)$ ir

$$(Aw)(x) = \frac{2x}{(1+x^2)^2}.$$

Tačiau $x^2 w(x) \to 1$, todėl reiškinys $x^4 w(x)$ yra neaprėžtas ir $w \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

(ii) Pagal Teiginį 15.15 operatorius $B = -d/dx$ erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra operatoriaus $d\lambda(1)$ apribojimas erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Todėl operatorius B yra antisimetrinis, nes operatorius $d\lambda(1)$ yra antisimetrinis glodžiųjų vektorių poerdvyje (žr. Teiginio 15.6(d) dalį). Jis nėra antisavijungis. Kadangi $B \subset A$, apibrėžimo sritis $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra tiršta ir $A^* = -A$, gauname sąryšį $-A = A^* \subset B^*$. Vadinasi, $w \in D(A) \subset D(B^*)$, nors $w \notin D(B)$. Todėl $D(B^*) \ne D(B)$, taigi $B^* \ne -B$.

(iii) Tegul $h = 1_{[0,1]}$. Kai $0 < t \le 1$, išskyrus baigtinę taškų aibę, galioja lygybės

$$\lambda(t)h - h = 1_{[t,1+t]} - 1_{[0,1]} = 1_{(1,1+t]} - 1_{[0,t)}, \qquad \|\lambda(t)h - h\|^2 = 2t.$$

Kai $-1 \le t < 0$, tas pats skaičiavimas normos kvadratui duoda reikšmę $2|t|$. Todėl gauname

$$\left\| \frac{\lambda(t)h - h}{t} \right\| = \sqrt{\frac{2}{|t|}} \longrightarrow \infty.$$

Konverguojantys santykiai būtų aprėžti taško 0 aplinkoje. Todėl $h \notin D(A)$. Pagal Išvadą 15.13 glodieji vektoriai priklauso sričiai $D(A)$, todėl ir $h \notin L^2(\mathbb{R})^\infty$.

Kartu šie faktai duoda sąryšius

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})^\infty \subset D(A), \qquad w \in D(A) \setminus \mathcal{S}(\mathbb{R}), \qquad h \in L^2(\mathbb{R}) \setminus D(A).$$

Uždavinys 15.2 pateikia palapinės pavidalo funkciją, kuri priklauso sričiai $D(A)$, bet nėra glodusis vektorius. Visos funkcijos w išvestinės tenkina Teiloro liekanos lemos (Lema 15.14) prielaidas, todėl funkcija w yra glodusis vektorius, nepriklausantis erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Taigi abu poaibio sąryšiai yra griežti. Impulso operatoriaus $P = iA$ apibrėžimo sritis yra $D(A)$, o ne $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Pastaba 15.17. Cituojame Planšerelio teoremą (Folland, *Real Analysis*, antrasis leidimas, 8 skyrius). Furjė transformacija $\hat{f}(p) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ipx}\, dx$ tęsiasi iki unitariojo operatoriaus erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir operatorių $\lambda(t)$ paverčia daugyba iš e^{-ipt}. Kaip ir Uždavinyje 15.3, sritis $D(A)$ yra aibė funkcijų f, kurioms $\int_{\mathbb{R}} p^2 |\hat{f}(p)|^2\, dp < \infty$, o operatorius P veikia kaip daugyba iš p. Kvantinėje mechanikoje sritis $D(A)$ yra aibė būsenų, kurioms operatoriaus P^2 vidutinė reikšmė yra baigtinė.

Taip aprašomi trys aukščiau nagrinėti vektoriai. Laiptinei funkcijai $h = 1_{[0,1]}$ galioja lygybė $|\hat{h}(p)|^2 = 2\sin^2(p/2)/(\pi p^2)$, todėl integralas $\int p^2|\hat{h}|^2\,dp$ diverguoja. Uždavinio 15.2 palapinės pavidalo funkcijai g galioja lygybė $|\hat{g}(p)|^2 = 8\sin^4(p/2)/(\pi p^4)$, todėl integralas $\int p^2|\hat{g}|^2\,dp$ konverguoja, o integralas $\int p^4|\hat{g}|^2\,dp$ diverguoja. Funkcijai w galioja lygybė $\hat{w}(p) = \sqrt{\pi/2}\,e^{-|p|}$, todėl visi šie integralai konverguoja. Galiausiai $\|\lambda(t) - I\| = \sup_p |e^{-ipt} - 1| = 2$, kai $t \neq 0$, ir tai sutampa su Uždavinio 15.1 rezultatu.

15.6 Tolydžios dalimis funkcijos kaip vektoriai

Dabar sukonstruosime kvadratiškai integruojamos funkcijos vektorių, kaip nurodyta Skyrelyje 15.1. Pirmiausia nagrinėsime funkcijas, lygias nuliui už aprėžto intervalo ribų. Paskui nukirtimo būdu pereisime prie kvadratiškai integruojamų funkcijų.

Tegul funkcija f yra tolydi dalimis ir lygi nuliui už aprėžto intervalo ribų. Tada funkcija f turi baigtinį skaičių šuolių $x_1 < \cdots < x_J$. Dėl vienpusių ribų šiuose šuoliuose funkcija f yra aprėžta, tarkime, $|f| \le M$. Pasirinkime tokį mažą skaičių $\delta > 0$, kad intervalai $[x_j - \delta, x_j + \delta]$ nesikirstų. Tegul funkcija g_δ už šių intervalų ribų lygi funkcijai f, o kiekviename iš jų funkcija g_δ yra tiesinė ir abiejuose galuose įgyja funkcijos f reikšmes. Tada $g_\delta \in C_c(\mathbb{R})$ ir $|g_\delta| \le M$. Todėl $|f - g_\delta| \le 2M$, o funkcija $f - g_\delta$ yra lygi nuliui už J intervalų, kurių ilgis lygus 2δ, ribų. Vadinasi,

$$\int_{\mathbb{R}} |f - g_\delta|^2\,dx \le 8JM^2\delta.$$

Kai funkcijos u ir $\tilde{u}$ yra tolydžios dalimis ir lygios nuliui už aprėžto intervalo ribų, žymėsime $\|u\|_2 = \bigl(\int_{\mathbb{R}} |u|^2\,dx\bigr)^{1/2}$. Erdvėje $C_c(\mathbb{R})$ tai yra erdvės $L^2(\mathbb{R})$ norma. Koši ir Švarco nelygybė Rymano integralams, $\int_{\mathbb{R}} |\bar{u}\tilde{u}|\,dx \le \|u\|_2\|\tilde{u}\|_2$, duoda dydžio $\|\cdot\|_2$ trikampio nelygybę.

Imkime $\delta_n \to 0$ ir $g_n = g_{\delta_n}$. Tada $\|f - g_n\|_2 \to 0$. Kadangi $\|g_n - g_m\|_2 \le \|g_n - f\|_2 + \|f - g_m\|_2$, seka (g_n) yra Koši seka erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Jos ribą vadinsime vektoriumi f. Pagal tą pačią nelygybę kiekviena erdvės $C_c(\mathbb{R})$ seka, aproksimuojanti funkciją f dydžio $\|\cdot\|_2$ atžvilgiu, turi šią ribą. Aproksimuojančių sekų sumos ir skaliariniai kartotiniai aproksimuoja funkcijų sumas ir skaliarinius kartotinius, todėl vektorius tiesiškai priklauso nuo funkcijos f. Pagal trikampio nelygybę vektoriaus f norma yra $\|f\| = \lim_n \|g_n\|_2 = \|f\|_2$.

Tegul $\tilde{f}$ yra antra tokia funkcija, aproksimuojama funkcijomis $\tilde{g}_n \in C_c(\mathbb{R})$. Dėl skaliarinės sandaugos tolydumo $\langle f, \tilde{f}\rangle = \lim_n \int_{\mathbb{R}} \overline{g_n}\,\tilde{g}_n\,dx$. Be to,

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{g_n}\,\tilde{g}_n\,dx - \int_{\mathbb{R}} \bar{f}\tilde{f}\,dx = \int_{\mathbb{R}} \overline{(g_n - f)}\,\tilde{g}_n\,dx + \int_{\mathbb{R}} \bar{f}\,(\tilde{g}_n - \tilde{f})\,dx.$$

Pagal Koši ir Švarco nelygybę dešiniosios pusės modulis neviršija dydžio $\|g_n - f\|_2\|\tilde{g}_n\|_2 + \|f\|_2\|\tilde{g}_n - \tilde{f}\|_2$. Šis dydis artėja prie 0, nes dydžiai $\|\tilde{g}_n\|_2$ lieka aprėžti. Todėl $\langle f, \tilde{f}\rangle = \int_{\mathbb{R}} \bar{f}\tilde{f}\,dx$.

Dabar tegul funkcija f yra kvadratiškai integruojama. Kiekviena nukirstoji funkcija $f \cdot 1_{[-n,n]}$ yra tolydi dalimis ir lygi nuliui už intervalo $[-n, n]$ ribų, todėl ji apibrėžia vektorių. Dviejų nukirstųjų funkcijų skirtumas yra $f \cdot 1_{\{n<|x|\le m\}}$. Pagal tiesiškumą ir normos formulę nukirstosios funkcijos sudaro Koši seką, nes

$$\bigl\|f \cdot 1_{[-m,m]} - f \cdot 1_{[-n,n]}\bigr\|^2 = \int_{n<|x|\le m} |f|^2\,dx \longrightarrow 0 \qquad (m > n \to \infty).$$

Jų riba yra vektorius f. Kai funkcijos f ir $\tilde{f}$ yra kvadratiškai integruojamos, nukirstųjų funkcijų formulėse perėję prie ribos $n \to \infty$, gauname abi Skyrelio 15.1 formules. Antrasis netiesioginis integralas konverguoja absoliučiai, nes Koši ir Švarco nelygybė duoda įvertį $\int_{-n}^{n} |\bar{f}\tilde{f}|\,dx \le \|f\|\,\|\tilde{f}\|$.

Pakeitus funkcijos f reikšmes baigtinėje taškų aibėje, vektorius nepasikeičia. Abiejų funkcijų skirtumas nelygus nuliui tik baigtinėje taškų aibėje, todėl šio skirtumo vektoriaus norma lygi 0.

15.7 Savikontrolė

1. Tegul $\dim \mathcal{H} < \infty$. Kam lygūs poerdvis $\mathcal{H}^\infty$ ir apibrėžimo sritis $D(B_X)$?
   Atsakymas. Abi aibės yra lygios erdvei $\mathcal{H}$. Homomorfizmas $\Pi\colon G \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra tolydus, todėl jis yra ir glodus (3-ioji paskaita). Vadinasi, kiekvienas vektorius yra glodus. Kadangi tada operatorius $d\Pi(X)$ yra apibrėžtas visoje erdvėje $\mathcal{H}$, jo uždarinio B_X apibrėžimo sritis taip pat yra visa erdvė $\mathcal{H}$.
2. Tegul funkcija yra apibrėžta formule $f(x) = xe^{-x^2/2}$. Apskaičiuokite vektorių Af ir skaliarinę sandaugą $\langle f, Af\rangle$.
   Atsakymas. Kadangi $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, Švarco erdvės teiginys (Teiginys 15.15) duoda lygybę $Af = -f' = (x^2-1)e^{-x^2/2}$. Tada $\langle f, Af\rangle = \int_{\mathbb{R}} x(x^2-1)e^{-x^2}\,dx = 0$, nes pointegralinė funkcija yra nelyginė. Šis rezultatas yra suderinamas su antisimetriškumu, dėl kurio sandauga $\langle f, Af\rangle$ turi būti grynai menamas skaičius.
3. Tegul D yra erdvė glodžiųjų funkcijų, turinčių kompaktinę atramą intervale $(0,\infty)$. Tada $D \subset D(A)$. Ar Teoremos 15.12(b) tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijus taikomas erdvei D?
   Atsakymas. Ne. Erdvė D nėra tiršta, nes kiekvienas jos elementas yra ortogonalus vektoriui $1_{[-1,0]} \neq 0$. Ji nėra ir invariantinė. Kai $t < 0$, pasirinkime nenulinę funkciją $f \in D$, kurios atrama yra intervale $(0, |t|)$. Tada funkcijos $\lambda(t)f$ atrama yra intervale $(t, 0)$, todėl $\lambda(t)f \notin D$.
4. Tegul $D = C_c^\infty(\mathbb{R}\setminus\{0\})$. Ši erdvė yra tiršta erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir telpa srityje $D(A)$, bet nėra invariantinė. Ar apribojimo $A|_D$ uždarinys lygus operatoriui A?
   Atsakymas. Ne. Tegul g yra C^1 klasės funkcija, tokia, kad funkcijos g ir g' yra kvadratiškai integruojamos ir $g(x) \to 0$, kai $x \to -\infty$. Tada $|g(0)|^2 = \int_{-\infty}^{0} (|g|^2)'\,dx \le 2\|g\|\,\|g'\|$. Tarkime, kad egzistuoja $v_n \in D$, tenkinantys sąlygas $v_n \to w$ ir $Av_n \to Aw$, kur $w = (1+x^2)^{-1}$. Imkime $g = w - v_n$. Kadangi $v_n(0) = 0$ ir $w(0) = 1$, gauname $1 \le 2\|w - v_n\|\,\|w' - v_n'\| \to 0$, o tai neįmanoma. Todėl vektorius $w \in D(A)$ nepriklauso uždarinio apibrėžimo sričiai. Kriterijaus invariantiškumo prielaidos atsisakyti negalima.

15.8 Santrauka

Iš unitariųjų įvaizdžių reikalaujama stipriojo tolydumo, o ne tolydumo pagal normą. Postūmių įvaizdis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ neturi nenulinio baigtinės dimensijos invariantinio poerdvio. Glodieji vektoriai sudaro tirštą invariantinį poerdvį $\mathcal{H}^\infty$. Šiame poerdvyje atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis antisimetriniais operatoriais. Stouno teorema kiekvienam stipriai

tolydžiam grupės $\mathbb{R}$ unitariajam įvaizdžiui priskiria antisavijungį generatorių. Operatoriaus $d\Pi(X)$, apibrėžto poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$, uždarinys yra būtent šis generatorius. Postūmių atveju operatorius $-d/dx$, apibrėžtas erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, yra antisimetrinis, bet nėra antisavijungis. Jo uždarinio apibrėžimo sritis $D(A)$ yra griežtai didesnė už pradinę sritį, tačiau sritis $D(A)$ vis dar nesutampa su visa erdve $L^2(\mathbb{R})$.

Šaltiniai ir prielaidos

Stouno teoremą pateikia knygos Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, 10.2 skyrelio Teorema 10.15. Holas užrašo $U(t) = e^{itH_{\text{Hall}}}$ su savijungiu operatoriumi H_{Hall}, todėl $H_{\text{Hall}} = -iA$. Pagal mūsų fizikinį susitarimą $H = iA$, todėl $H_{\text{Hall}} = -H$. Tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijų iš Teoremos 15.12(b) pateikia knygos Reed–Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I*, VIII.4 skyrelio Teoremos VIII.10–11.

15.9 Literatūra

- Hall, *Quantum Theory for Mathematicians* (2013): neaprėžti savijungiai operatoriai ir Stouno teorema, 10.2 skyrelis.
- Reed–Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, VIII.4 skyrelis, ypač Teoremos VIII.10–11 apie tirštas invariantines apibrėžimo sritis.
- Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups* (2001), III.3–4 skyreliai: glodieji vektoriai, Gordingo vektoriai ir algebros $\mathfrak{g}$ veikimas.
- Etingof, MIT 18.757 paskaitų konspektai, 1–7 paskaitos: alternatyvus įvadas į Lie grupių tolydžiuosius įvaizdžius.

Paskaita 16

Haro matas nekompaktinėse grupėse ir modulinė funkcija

Tikslai. *Kompaktinėse grupėse integravome 5-oje paskaitoje. Šioje paskaitoje kompaktiškumo atsisakysime. Išsiaiškinsime, kokius postūmių atžvilgiu invariantinius integralus turi Lie grupė ir kuo skiriasi integravimas iš kairės ir iš dešinės. Nekompaktinės Lie grupės Haro tūris yra begalinis, todėl 5-osios paskaitos normuotas vidurkinimas bendruoju atveju nebetinka. Kiekviena Lie grupė turi kairiai invariantinį ir dešiniai invariantinį tankį. Kai abu tankiai neutraliajame elemente yra normuoti vienodai, kairiojo tankio ir dešiniojo tankio santykis yra modulinė funkcija. Ji nusako dešiniųjų postūmių, inversijos ir dešiniojo reguliariojo įvaizdžio elgesį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti Lie grupės kairįjį ir dešinįjį Haro tankius, įrodyti, kad kiekvienas iš jų yra vienatinis teigiamo daugiklio tikslumu, ir įrodyti, kad nekompaktinės grupės visa masė yra begalinė.
- Įrodyti dešiniojo postūmio ir inversijos tapatybes atvaizdavimui, apibrėžtam formule $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$.
- Apskaičiuoti abu Haro tankius ir funkciją Δ afininei grupei $ax + b$.
- Sukonstruoti kairįjį ir dešinįjį reguliariuosius įvaizdžius kaip stipriai tolydžius unitariuosius įvaizdžius erdvėje $L^2(G)$ ir suformuluoti II dalies integravimo taisykles su jų prielaidomis.

Kairiai invariantinį tankį kompaktinėje Lie grupėje sukonstravome 5-oje paskaitoje, perkeldami postūmiais tankį taške e. Ši konstrukcija kompaktiškumo nenaudojo. Kompaktiškumas buvo reikalingas vėliau. Dėl jo integralas buvo baigtinis kiekvienai tolydžiajai funkcijai, ir visą masę buvo galima normuoti iki 1. Dėl jo funkcijos $j(h) = |\det \mathrm{Ad}(h)|$ vaizdas buvo kompaktinis grupės $(0, \infty)$ pogrupis, todėl $j \equiv 1$. Iš jo gavome griežtąjį teigiamumą, naudodami baigtinį denginį. Be kompaktiškumo integruojame tik funkcijas su kompaktine atrama. Griežtasis teigiamumas gaunamas iš žemėlapių, o funkcija j išlieka kaip homomorfizmas. Toliau naudojamas kairysis Haro tankis μ_L yra 5-osios paskaitos tankis δ, o toliau naudojama modulinė funkcija yra $\Delta = j^{-1}$.

Visoje paskaitoje G yra n dimensijos Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g} = T_eG$. Kairįjį postūmį, dešinįjį postūmį, jungtinimą ir inversiją žymėsime taip:

$$L_g(x) = gx, \qquad R_g(x) = xg, \qquad C_g = L_g \circ R_{g^{-1}}, \qquad \iota(x) = x^{-1}.$$

Tada galioja lygybės $R_g \circ R_h = R_{hg}$ ir $d(C_g)_e = \mathrm{Ad}(g)$.

16.1 Tankiai ir integravimas

Tiesinis atvaizdavimas T, veikiantis erdvėje $\mathbb{R}^n$, Lebego matą padaugina iš daugiklio $|\det T|$. Tankis šią taisyklę taiko kiekvienoje liestinėje erdvėje.

Apibrėžimas 16.1. Tegul V yra n dimensijos realioji tiesinė erdvė. *Teigiamuoju tankiu* erdvėje V vadinama nenulinė funkcija $\delta\colon V^n \to [0,\infty)$, tenkinanti sąlygą

$$\delta(Tv_1,\dots,Tv_n) = |\det T|\,\delta(v_1,\dots,v_n) \qquad (T \in \operatorname{End} V).$$

Tegul $e_1,\dots,e_n$ yra bazė, ir tegul vektoriai yra apibrėžti lygybėmis $v_j = Te_j$. Tada iš teigiamojo tankio apibrėžimo gauname lygybę $\delta(v_1,\dots,v_n) = |\det T|\,\delta(e_1,\dots,e_n)$. Taigi tankį δ nusako skaičius $\delta(e_1,\dots,e_n)$, kuris yra teigiamas, nes $\delta \neq 0$. Todėl du teigiamieji tankiai erdvėje V skiriasi teigiamu daugikliu.

Apibrėžimas 16.2. *Glodusis teigiamasis tankis* μ grupėje G priskiria teigiamąjį tankį μ_x erdvėje T_xG kiekvienam taškui $x \in G$ taip, kad kiekviename žemėlapyje, kurio koordinatės yra y, koeficientas, apibrėžtas formule $m(y) = \mu_x(\partial_1,\dots,\partial_n)$, būtų glodus.

Tegul F yra grupės G difeomorfizmas, ir tegul funkcija $\varphi > 0$ yra glodi. Apibrėžkime

$$(F^*\mu)_x(v_1,\dots,v_n) = \mu_{F(x)}(dF_x v_1,\dots,dF_x v_n), \qquad (\varphi\mu)_x = \varphi(x)\,\mu_x.$$

Iš grandininės taisyklės išplaukia lygybė $(F\circ H)^* = H^*F^*$. Iš apibrėžimų gauname $F^*(\varphi\mu) = (\varphi\circ F)\,F^*\mu$.

Simboliu $C_c(G)$ žymėsime erdvę tolydžiųjų funkcijų $f\colon G \to \mathbb{C}$, kurių atrama yra kompaktinė.

Jei atrama $\operatorname{supp} f$ yra viename žemėlapyje, integralą apibrėžkime formule $\int_G f\mu = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\,m(y)\,dy$. Pakeitus žemėlapį, koeficientas m padauginamas iš Jakobio determinanto modulio. Todėl pagal kintamųjų keitimo formulę integralas yra gerai apibrėžtas.

Bet kuriai funkcijai $f \in C_c(G)$ naudosime vieneto skaidinį, pritaikę 5-osios paskaitos konstrukciją. Čia aibės $\operatorname{supp} f$ *vieneto skaidinys* yra baigtinė glodžiųjų funkcijų $\psi_i \geq 0$ grupėje G šeima, kurios kiekviena funkcija turi kompaktinę atramą viename žemėlapyje, o šių funkcijų suma tenkina lygybę $\sum_i \psi_i = 1$ aibėje $\operatorname{supp} f$. Kompaktinėje daugdaroje 5-oji paskaita reikalauja, kad suma visur būtų lygi 1. Kadangi funkcija f už aibės $\operatorname{supp} f$ ribų lygi nuliui, turime $f = \sum_i \psi_i f$. Sudėsime funkcijų $\psi_i f$ integralus atitinkamuose žemėlapiuose.

Cituojame šią konstrukciją ir tris toliau pateiktus faktus. Knapp knygos *Lie Groups Beyond an Introduction* VIII skyriuje ta pati konstrukcija atliekama diferencialinėmis formomis.

(I1) Atvaizdavimas $f \mapsto \int_G f\mu$ yra tiesinis, o nelygybė $\int_G f\mu > 0$ galioja, kai $f \geq 0$ ir $f \neq 0$.
(I2) Lygybė $\int_G (f\circ F)\,F^*\mu = \int_G f\mu$ galioja kiekvienam difeomorfizmui F, atvaizduojančiam grupę G į ją pačią.
(I3) Galioja lygybė $\int_G f\,(\varphi\mu) = \int_G (f\varphi)\,\mu$.

Žemėlapyje tankio $F^*\mu$ koeficientas yra $m(F(y))\,|\det DF(y)|$. Taigi savybė (I2) yra kintamųjų keitimo formulė.

16.2 Kairysis ir dešinysis Haro tankiai

Teorema 16.3 (Haro tankiai). *Tegul μ_e yra teigiamasis tankis algebroje $\mathfrak{g}$.*

(a) Egzistuoja lygiai vienas glodusis teigiamasis tankis μ_L, tenkinantis sąlygas $(\mu_L)_e = \mu_e$ ir $L_g^*\mu_L = \mu_L$ visiems $g \in G$. Kiekvienas kairiai invariantinis glodusis teigiamasis tankis yra tankio μ_L teigiamas kartotinis.

(b) Egzistuoja lygiai vienas glodusis teigiamasis tankis μ_R, tenkinantis sąlygas $(\mu_R)_e = \mu_e$ ir $R_g^*\mu_R = \mu_R$ visiems $g \in G$. Kiekvienas dešiniai invariantinis glodusis teigiamasis tankis yra tankio μ_R teigiamas kartotinis.

(c) Užrašas $\int_G f(x)\,d_Lx$ žymi integralą $\int_G f\mu_L$. Analogiškai apibrėžiamas užrašas d_Rx. Kai $f \in C_c(G)$ ir $g \in G$, galioja lygybės

$$\int_G f(gx)\,d_Lx = \int_G f(x)\,d_Lx, \qquad \int_G f(xg)\,d_Rx = \int_G f(x)\,d_Rx.$$

Įrodymas. Vienatinumas. Tegul ν yra kairiai invariantinis glodusis teigiamasis tankis. Užrašykime lygybę $L_{x^{-1}}^*\nu = \nu$ taške x:

$$\nu_x(v_1, \dots, v_n) = \nu_e\big(d(L_{x^{-1}})_x v_1, \dots, d(L_{x^{-1}})_x v_n\big). \tag{16.1}$$

Taigi tankį ν nusako tankis ν_e. Du teigiamieji tankiai algebroje $\mathfrak{g}$ skiriasi teigiamu daugikliu. Todėl $\nu_e = c\mu_e$ su tam tikru skaičiumi $c > 0$. Kai toliau sukonstruosime tankį μ_L, ši formulė duos lygybę $\nu = c\mu_L$.

Egzistavimas. Apibrėžkime tankį μ_L formule (16.1), kurioje $\nu_e = \mu_e$. Tiesiniai atvaizdavimai rinkiniams $v = (v_1, \dots, v_n)$ taikomi paelemenčiui. Kadangi $L_{(gx)^{-1}} \circ L_g = L_{x^{-1}}$, iš grandininės taisyklės gauname

$$(L_g^*\mu_L)_x(v) = \mu_e\big(d(L_{(gx)^{-1}})_{gx}\, d(L_g)_x v\big) = \mu_e\big(d(L_{x^{-1}})_x v\big) = (\mu_L)_x(v).$$

Glodumas. Šiame žingsnyje naudojamas glodus grupės dėsnis. Pasirinkime bazę $X_1, \dots, X_n$ Lie algebroje $\mathfrak{g}$. Kairiai invariantiniai laukai, apibrėžti formule $\tilde{X}_i(x) = d(L_x)_e X_i$, yra glodūs (žr. 1-ąją paskaitą). Kadangi $L_{x^{-1}} \circ L_x = \mathrm{id}$, turime $d(L_{x^{-1}})_x \tilde{X}_i(x) = X_i$. Todėl gauname

$$(\mu_L)_x\big(\tilde{X}_1(x), \dots, \tilde{X}_n(x)\big) = \mu_e(X_1, \dots, X_n) =: c_0 > 0.$$

Užrašykime žemėlapyje $\tilde{X}_i = \sum_j P_{ji}(y)\,\partial_j$. Matrica $P(y)$ yra glodi. Ji yra apgręžiama, nes diferencialas $d(L_x)_e$ yra izomorfizmas. Iš tankio taisyklės gauname $c_0 = |\det P(y)|\, m(y)$. Taigi koeficientas $m = c_0\,|\det P|^{-1}$ yra glodus.

Dešinieji postūmiai. Naudokime formulę $\nu_x(v) = \nu_e(d(R_{x^{-1}})_x v)$. Esminė tapatybė yra $R_{(xg)^{-1}} \circ R_g = R_{x^{-1}}$, nes $z\,g\,g^{-1}x^{-1} = zx^{-1}$. Laukai $d(R_x)_e X_i$ pakeičia laukus $\tilde{X}_i$.

Integralai. Pritaikykime kintamųjų keitimą (I2), kai $F = L_g$ arba $F = R_g$. ∎

Kompaktinėje grupėje visa masė normuojama taip, kad būtų lygi 1, kaip ir 5-oje paskaitoje. Nekompaktinei grupei G tai neįmanoma, kaip dabar įrodysime. Kadangi pastovioji funkcija 1 nepriklauso erdvei $C_c(G)$, rezultatą formuluojame funkcijoms su kompaktine atrama.

Teiginys 16.4 (Begalinis Haro tūris). *Tegul G yra nekompaktinė Lie grupė, o funkcija $f \in C_c(G)$ tenkina sąlygas $f \geq 0$ ir $f \neq 0$. Egzistuoja tokie elementai $g_1, g_2, \ldots$ grupėje G, kad pastumtųjų funkcijų $f_k(x) = f(g_k^{-1}x)$ atramos poromis nesikerta. Todėl funkcija $F_N = f_1 + \cdots + f_N$ priklauso erdvei $C_c(G)$, tenkina sąlygą $0 \leq F_N \leq \sup f$, ir galioja sąryšiai*

$$\int_G F_N \, d_L x = N \int_G f \, d_L x, \qquad \int_G f \, d_L x > 0.$$

Įrodymas. Elementus pasirinksime po vieną. Tegul $S = \operatorname{supp} f$. Ši aibė yra kompaktinė. Imkime $g_1 = e$. Tarkime, kad elementai $g_1, \ldots, g_{m-1}$ jau pasirinkti. Aibė $\bigcup_{k<m} g_k S S^{-1}$ yra kompaktinė, nes ji yra baigtinė aibės $S \times S$ tolydžiųjų vaizdų sąjunga. Kadangi grupė G nėra kompaktinė, egzistuoja elementas g_m, nepriklausantis šiai aibei.

Funkcijos f_k atrama yra aibė $g_k S$. Jei aibė $g_m S$ kirstųsi su aibe $g_k S$, kur $k < m$, tai $g_m s = g_k s'$ su tam tikrais $s, s' \in S$. Tada $g_m = g_k s' s^{-1} \in g_k S S^{-1}$, o tai prieštarauja elemento g_m pasirinkimui. Todėl atramos poromis nesikerta.

Kiekviename taške nelygus nuliui yra ne daugiau kaip vienas sumos F_N narys, todėl $0 \leq F_N \leq \sup f$. Teoremos 16.3(c) dalies kairysis invariantiškumas duoda lygybę $\int_G f_k \, d_L x = \int_G f \, d_L x$, o ši reikšmė yra teigiama pagal teigiamumo teiginį (I1). ∎

Taigi kairysis Haro integralas yra neaprėžtas erdvės $C_c(G)$ funkcijoms, kurių reikšmės yra intervale $[0, \sup f]$, o grupės G visa masė yra begalinė. Dešinysis Haro integralas elgiasi taip pat, tik su dešiniaisiais postūmiais. Todėl nekompaktinė Lie grupė neturi normuoto baigtinio Haro integralo, ir 5-osios paskaitos vidurkinimo argumentai bendruoju atveju nebetinka.

Naudosime tą patį tankį μ_e abiem tankiams μ_L ir μ_R.

16.3 Modulinė funkcija

Apibrėžimas 16.5. Grupės G *modulinė funkcija* yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\Delta(g) = |\det \operatorname{Ad}(g)|^{-1}$. Grupė G vadinama *unimoduline*, jei $\Delta \equiv 1$.

Kadangi atvaizdavimas $\operatorname{Ad}\colon G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ yra glodus homomorfizmas (žr. 2-ąją paskaitą), funkcija Δ yra glodus homomorfizmas į multiplikatyviąją grupę $(0, \infty)$.

Teorema 16.6 (Integravimo tapatybės). *Tegul $f \in C_c(G)$ ir $g \in G$.*

(i) Galioja lygybė $R_g^* \mu_L = \Delta(g)\, \mu_L$. Iš jos išplaukia lygybė $\int_G f(xg) \, d_L x = \Delta(g)^{-1} \int_G f(x) \, d_L x$.

(ii) Galioja lygybė $\mu_R = \Delta^{-1} \mu_L$, t.y. $\int_G f(x) \, d_R x = \int_G f(x)\, \Delta(x)^{-1} \, d_L x$.

(iii) Galioja lygybės $\int_G f(x^{-1}) \, d_L x = \int_G f(x) \, d_R x$ ir $\int_G f(x^{-1})\, \Delta(x^{-1}) \, d_L x = \int_G f(x) \, d_L x$.

Įrodymas. (i) Kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja. Todėl gauname

$$L_h^* R_g^* \mu_L = (R_g \circ L_h)^* \mu_L = (L_h \circ R_g)^* \mu_L = R_g^* L_h^* \mu_L = R_g^* \mu_L.$$

Taigi tankis $R_g^*\mu_L$ yra kairiai invariantinis. Pagal Teoremos 16.3(a) vienatinumo teiginį šis tankis lygus tankiui $c(g)\mu_L$ su tam tikru skaičiumi $c(g) > 0$. Koeficientą $c(g)$ rasime taške e. Kadangi $L_{g^{-1}} \circ R_g = C_{g^{-1}}$, gauname

$$(R_g^*\mu_L)_e(v) = \mu_e\big(d(L_{g^{-1}})_g\, d(R_g)_e v\big) = \mu_e\big(\mathrm{Ad}(g^{-1})v\big) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}\mu_e(v).$$

Taigi $c(g) = \Delta(g)$. Dabar kintamųjų keitimas (I2), kai $F = R_g$, ir daugybos taisyklė (I3) duoda

$$\int_G f\mu_L = \int_G (f \circ R_g)\, R_g^*\mu_L = \Delta(g) \int_G f(xg)\, d_L x.$$

(ii) Pasinaudokime lygybe $F^*(\varphi\mu) = (\varphi \circ F)F^*\mu$, dešiniojo postūmio tapatybe (i) ir funkcijos Δ homomorfizmo savybe:

$$\big(R_g^*(\Delta^{-1}\mu_L)\big)_x = \Delta(xg)^{-1}\Delta(g)\,(\mu_L)_x = \Delta(x)^{-1}(\mu_L)_x.$$

Taigi tankis $\Delta^{-1}\mu_L$ yra dešiniai invariantinis, o jo reikšmė yra μ_e taške e. Pagal Teoremos 16.3(b) vienatinumo teiginį jis lygus tankiui μ_R. Tada iš daugybos taisyklės (I3) gauname integralinę formą.

(iii) Pirmiausia parodysime, kad $d\iota_e = -\mathrm{id}$. Daugybos atvaizdavimas $\mathrm{mult}\colon G \times G \to G$ tenkina lygybes $\mathrm{mult}(x, e) = x$ ir $\mathrm{mult}(e, x) = x$, kai $x \in G$. Todėl $d(\mathrm{mult})_{(e,e)}(v, w) = v + w$, kai $v, w \in \mathfrak{g}$. Diferencijuodami lygybę $x\,\iota(x) = e$ taške e, gauname $v + d\iota_e v = 0$. Taigi galioja lygybės

$$(\iota^*\mu_L)_e(v_1, \dots, v_n) = \mu_e(-v_1, \dots, -v_n) = |\det(-\mathrm{id})|\,\mu_e(v_1, \dots, v_n) = \mu_e(v_1, \dots, v_n).$$

Toliau lygybė $(xg)^{-1} = g^{-1}x^{-1}$ reiškia, kad $\iota \circ R_g = L_{g^{-1}} \circ \iota$. Todėl gauname

$$R_g^*\iota^*\mu_L = (\iota \circ R_g)^*\mu_L = (L_{g^{-1}} \circ \iota)^*\mu_L = \iota^* L_{g^{-1}}^*\mu_L = \iota^*\mu_L.$$

Pagal Teoremos 16.3(b) vienatinumo teiginį galioja lygybė $\iota^*\mu_L = \mu_R$. Pritaikykime kintamųjų keitimą (I2), kai $F = \iota$, funkcijai $f \circ \iota$. Taip gauname lygybę $\int_G f\, d_R x = \int_G f(x^{-1})\, d_L x$. Antrajai tapatybei įrodyti pritaikykime pirmąją funkcijai $h = f\Delta \in C_c(G)$ ir pasinaudokime tankių sąryšiu (ii):

$$\int_G f(x^{-1})\Delta(x^{-1})\, d_L x = \int_G h(x)\, d_R x = \int_G f(x)\Delta(x)\Delta(x)^{-1}\, d_L x. \qquad \blacksquare$$

Pastaba 16.7. Dešiniojo postūmio tapatybė (i) yra lygiavertė lygybei $\int_G f(xg^{-1})\, d_L x = \Delta(g)\int_G f\, d_L x$. Borelio aibėms E, naudojant Skyrelio 16.6 Radono matą, ji užrašoma lygybe $\mu_L(Eg) = \Delta(g)\mu_L(E)$. Tai yra Folando susitarimas. Kai kuriuose tekstuose modulinė funkcija apibrėžiama kaip $|\det \mathrm{Ad}(g)|$. Lygindami šaltinius, patikrinkite, kuri apibrėžiančioji tapatybė naudojama.

Išvada 16.8. *(a) Kiekviena kompaktinė Lie grupė yra unimodulinė.*

(b) Jei grupė G yra jungi, tai galioja lygybė $\Delta(\exp X) = e^{-\operatorname{tr}\operatorname{ad} X}$. Taigi grupė G yra unimodulinė tada ir tik tada, kai $\operatorname{tr}\operatorname{ad} X = 0$ visiems $X \in \mathfrak{g}$. Ši sąlyga tenkinama, kai algebra $\mathfrak{g}$ yra Abelio, nilpotentinė arba pusiau paprastoji.

Įrodymas. (a) Kadangi grupė G yra kompaktinė, o funkcija Δ yra tolydi, vaizdas $\Delta(G)$ yra kompaktinis grupės $(0,\infty)$ pogrupis. Jei skaičius $t \neq 1$ priklauso šiam pogrupiui, tai neaprėžta aibė $\{t^k : k \in \mathbb{Z}\}$ taip pat yra jo poaibis. Todėl $\Delta(G) = \{1\}$.

(b) Turime $\operatorname{Ad}(\exp X) = e^{\operatorname{ad} X}$ (žr. 2-ąją paskaitą) ir $\det e^A = e^{\operatorname{tr} A}$. Iš šių lygybių išplaukia formulė. Jei visi pėdsakai lygūs nuliui, tai $\Delta = 1$ aibėje $\exp \mathfrak{g}$. Ši aibė apima aplinką U taške e (žr. 2-ąją paskaitą). Pogrupis H, generuojamas aplinkos U, yra atviras, nes $hU \subset H$, kai $h \in H$. Jis yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirų gretutinių klasių sąjunga. Kadangi grupė yra jungi, gauname $H = G$, todėl $\Delta \equiv 1$. Atvirkščiai, iš tapatybės $\Delta \equiv 1$ išplaukia lygybė $e^{-t \operatorname{tr} \operatorname{ad} X} = 1$ visiems t, todėl $\operatorname{tr} \operatorname{ad} X = 0$. Kai algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė, kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$ yra nilpotentinis. Kai algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, turime $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ ir $\operatorname{tr} \operatorname{ad}[X, Y] = \operatorname{tr}[\operatorname{ad} X, \operatorname{ad} Y] = 0$. ∎

16.4 Afininė grupė

Grupė $ax + b$ apibrėžiama taip:

$$G = \left\{ g(a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \ a > 0, \ b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ji veikia tiesę $\mathbb{R}$ atvaizdavimais $x \mapsto ax + b$. Pora (a, b) yra globalus žemėlapis, kurio vaizdas yra lygus aibei $(0,\infty) \times \mathbb{R}$. Todėl integralai grupėje G yra įprasti dvilypiai integralai. Iš matricų daugybos gauname

$$g(a,b)\, g(a',b') = g(aa',\ ab' + b), \qquad g(a,b)^{-1} = g(a^{-1}, -a^{-1}b).$$

Liestinis vektorius taške g yra matrica $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, kuri žemėlapyje užrašoma kaip $\alpha \partial_a + \beta \partial_b$. Lie algebra turi bazę

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [X, Y] = Y.$$

Postūmiai yra matricų erdvės tiesinių atvaizdavimų apribojimai. Todėl $d(L_g)_e Z = gZ$ ir $d(R_g)_e Z = Zg$. Užfiksuokime tankį μ_e algebroje $\mathfrak{g}$ sąlyga $\mu_e(X, Y) = 1$.

Kairysis tankis. Kai $g = g(a,b)$, turime

$$gX = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a\, \partial_a, \qquad gY = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a\, \partial_b.$$

Taigi matrica P iš Teoremos 16.3 įrodymo glodumo žingsnio yra

$$P = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

Tada gauname $m_L = |\det P|^{-1} = a^{-2}$.

Dešinysis tankis. Analogiškai gauname

$$Xg = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a\, \partial_a + b\, \partial_b, \qquad Yg = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \partial_b, \qquad P = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}.$$

Tada $m_R = a^{-1}$. Apibendrindami gauname

$$d_L x = a^{-2}\,da\,db, \qquad d_R x = a^{-1}\,da\,db.$$

Modulinė funkcija. Naudodami atvirkštinę matricą $g^{-1} = \begin{pmatrix} a^{-1} & -a^{-1}b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, apskaičiuojame

$$gXg^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = X - bY, \qquad gYg^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = aY.$$

Bazėje (X, Y) gauname

$$\operatorname{Ad}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -b & a \end{pmatrix}, \qquad \det \operatorname{Ad}(g) = a, \qquad \Delta(g(a,b)) = a^{-1}.$$

Tai atitinka Teoremos 16.6(ii) dalies tankių sąryšį: $\Delta^{-1} m_L = a \cdot a^{-2} = a^{-1} = m_R$. Tai atitinka ir Išvados 16.8(b) dalies pėdsako formulę. Iš tikrųjų operatorius $\operatorname{ad} X$ palieka vektorių Y nepakitusį, o vektorių X atvaizduoja į nulį, todėl $\operatorname{tr} \operatorname{ad} X = 1$. Be to, elementui $\exp tX = g(e^t, 0)$ turime $\Delta = e^{-t}$. Todėl grupė $ax + b$ nėra unimodulinė.

Išvados 16.8(b) dalies jungumo prielaidos atsisakyti negalima. Tegul H yra pogrupis, sudarytas iš elementų $g(a,b)$, kuriems $a \in 2^{\mathbb{Z}}$ ir $b \in \mathbb{R}$. Jis yra uždaras, nes aibė $2^{\mathbb{Z}}$ yra uždara aibėje $(0, \infty)$. Jo Lie algebra $\mathbb{R}Y$ yra Abelio algebra. Tačiau $\operatorname{Ad}(g)Y = gYg^{-1} = aY$, kai $g = g(a,b) \in H$. Taigi modulinė funkcija Δ_H, kurią turi pogrupis H, tenkina lygybę $\Delta_H(g(a,b)) = a^{-1}$ ir nėra tapačiai lygi 1.

Teoremos 16.6(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybės tiesioginis patikrinimas. Tegul $x = g(a', b')$ ir $g = g(a,b)$. Tada $xg = g(a'a,\ a'b + b')$. Įveskime naujus kintamuosius $u = a'a$ ir $v = a'b + b'$. Tada galioja lygybės $du\,dv = a\,da'\,db'$ ir $a'^{-2} = a^2 u^{-2}$. Taigi gauname

$$\int_G f(xg)\,d_L x = \iint f(a'a,\ a'b + b')\,\frac{da'\,db'}{a'^2} = \iint f(u,v)\,\frac{a^2}{u^2}\,\frac{du\,dv}{a} = a\int_G f\,d_L x.$$

Gautas reiškinys lygus $\Delta(g)^{-1}\int_G f\,d_L x$.

Teoremos 16.6(iii) dalies antrosios inversijos tapatybės tiesioginis patikrinimas. Šiuo atveju turime $x^{-1} = g(1/a, -b/a)$ ir $\Delta(x^{-1}) = a$. Įveskime naujus kintamuosius $u = 1/a$ ir $v = -b/a$. Atvaizdavimo $(a,b) \mapsto (u,v)$ Jakobio determinantas yra

$$\det \begin{pmatrix} -a^{-2} & 0 \\ ba^{-2} & -a^{-1} \end{pmatrix} = a^{-3}, \qquad \text{taigi} \qquad da\,db = u^{-3}\,du\,dv.$$

Kadangi $a \cdot a^{-2} = a^{-1} = u$, gauname

$$\int_G f(x^{-1})\Delta(x^{-1})\,d_L x = \iint f\left(\tfrac{1}{a}, -\tfrac{b}{a}\right)\frac{a\,da\,db}{a^2} = \iint f(u,v)\,u\,u^{-3}\,du\,dv = \int_G f\,d_L x.$$

Stačiakampio postūmis

Grupėje $ax + b$ modulinę funkciją galima apskaičiuoti iš svertinių plotų, nediferencijuojant matricos. Sričiai E žemėlapyje (a,b) rašome

$$\mu_L(E) = \iint_E a^{-2}\,da\,db$$

ir šį dydį vadiname srities E *kairiuoju Haro matu*. Dabar tegul

$$E = \{(a,b) : 1 \le a \le 2,\ 0 \le b \le 1\}.$$

Šios srities kairysis Haro matas yra


$$\mu_L(E) = \int_1^2 \int_0^1 a^{-2}\, db\, da = \left[-a^{-1}\right]_1^2 = \frac{1}{2}.$$

Kai $h = g(s,t)$, dešinysis postūmis perkelia tašką (a,b) į tašką $(as, b+at)$. Šio postūmio Jakobio determinantas pagal kintamuosius (a,b) yra s, o naujasis tankio koeficientas yra $(as)^{-2}$. Todėl gauname

$$\mu_L(Eh) = \int_E (as)^{-2} s\, da\, db = s^{-1}\mu_L(E) = \Delta(h)\mu_L(E).$$

Šlyties parametras t keičia srities formą, bet ne šį mastelio daugiklį. Kairysis postūmis elementu h turi Jakobio determinantą s^2 ir tankio koeficientą $(sa)^{-2}$, todėl šis postūmis nekeičia dydžio $\mu_L(E)$.

Pointegralinėje funkcijoje $f(xh)$ atsiranda trečia sritis. Funkcija $x \mapsto \mathbf{1}_E(xh)$ lygi 1 tada ir tik tada, kai $xh \in E$, todėl ji yra srities Eh^{-1} indikatorinė funkcija. Visas tris sritis, kai $h = g(2,1)$, vaizduoja 16.1 pav. Čia $hE = [2,4] \times [1,3]$, o Eh yra lygiagretainis, kurio viršūnės yra $(2,1)$, $(4,2)$, $(4,3)$ ir $(2,2)$. Sritis Eh^{-1} yra aibė taškų (a,b), kuriems $\frac{1}{2} \le a \le 1$ ir $-a \le b \le 1-a$.



16.1 pav.: Stačiakampis E pusplokštumėje (a,b) (pilkas), kairysis postūmis hE, dešinysis postūmis Eh ir sritis Eh^{-1}, kai $h = g(2,1)$. Srities matas yra reiškinio $a^{-2}\, da\, db$ integralas, o ne jos euklidinis plotas.

Svertinės masės yra

$$\mu_L(hE) = \tfrac{1}{2} = \mu_L(E), \qquad \mu_L(Eh) = \tfrac{1}{4} = \Delta(h)\mu_L(E), \qquad \mu_L(Eh^{-1}) = 1 = \Delta(h)^{-1}\mu_L(E).$$

Atvirkštinis elementas srityje Eh^{-1} paaiškina, kodėl Teoremos 16.6(i) dalies integralinėje tapatybėje yra daugiklis $\Delta(h)^{-1}$, o srities tapatybėje – daugiklis $\Delta(h)$.

16.5 Reguliarieji įvaizdžiai

Apibrėžimas 16.9. Erdvė $L^2(G)$ yra erdvės $C_c(G)$ Hilberto papildinys pagal skaliarinę sandaugą

$$\langle f, h\rangle = \int_G \overline{f(x)}\, h(x)\, d_L x.$$

Pagal teigiamumo teiginį (I1) ši skaliarinė sandauga yra teigiamai apibrėžta. Funkcijoms $f \in C_c(G)$ apibrėžkime

$$(\lambda(g)f)(x) = f(g^{-1}x), \qquad (\rho(g)f)(x) = \Delta(g)^{1/2} f(xg).$$

Lema 16.10. *Tegul $f \in C_c(G)$ ir $\varepsilon > 0$. Egzistuoja aplinka $V = V^{-1}$ taške e, tokia, kad nelygybės $|f(yx) - f(x)| < \varepsilon$ ir $|f(xy) - f(x)| < \varepsilon$ galioja visiems $x \in G$ ir $y \in V$.*

Įrodymas. Nagrinėkime atvejį $f(yx)$. Kitas atvejis yra simetriškas. Jei aplinka U_L tinka atvejui $f(yx)$, o aplinka U_R – atvejui $f(xy)$, imkime $V' = U_L \cap U_R$ ir $V = V' \cap V'^{-1}$.

Užfiksuokime kompaktinę aplinką W taške e. Pasirinkime mažėjančią aplinkų bazę $V_1 \supset V_2 \supset \cdots$ taške e, kurios visos aplinkos yra aplinkos W poaibiai. Tarkime, kad nė viena aplinka V_k netinka. Tada egzistuoja elementai $y_k \in V_k$ ir x_k, tenkinantys nelygybę $|f(y_k x_k) - f(x_k)| \geq \varepsilon$. Vienas iš elementų x_k ir $y_k x_k$ priklauso aibei $K = \operatorname{supp} f$. Todėl elementas x_k priklauso kompaktinei aibei $K \cup W^{-1}K$. Kadangi grupė G turi skaičiąją topologijos bazę ir yra Hausdorfo, jos kompaktiniai poaibiai yra nuosekliai kompaktiniai. Taigi egzistuoja posekis, kuriam $x_k \to x$. Kadangi $y_k \to e$, turime ir $y_k x_k \to x$. Iš tolydumo gauname $f(y_k x_k) - f(x_k) \to 0$, o tai yra prieštaravimas. ∎

Teiginys 16.11. *Atvaizdavimai λ ir ρ pratęsiami iki stipriai tolydžių unitariųjų grupės G įvaizdžių erdvėje $L^2(G)$, ir lygybė $\lambda(g)\rho(h) = \rho(h)\lambda(g)$ galioja visiems $g, h \in G$.*

Įrodymas. Abu atvaizdavimai yra homomorfizmai erdvėje $C_c(G)$. Pavyzdžiui, galioja lygybės

$$\rho(g)\rho(h)f(x) = \Delta(g)^{1/2}\Delta(h)^{1/2} f(xgh) = \rho(gh)f(x).$$

Abu operatoriai išsaugo normas. Pritaikę Teoremos 16.3(c) dalies kairįjį invariantiškumą ir Teoremos 16.6(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę funkcijai $|f|^2$, gauname

$$\|\lambda(g)f\|^2 = \int_G |f(g^{-1}x)|^2 \, d_L x = \|f\|^2, \qquad \|\rho(g)f\|^2 = \Delta(g) \int_G |f(xg)|^2 \, d_L x = \|f\|^2.$$

Kiekvienas operatorius yra erdvės $C_c(G)$ bijekcija, kurios atvirkštinė yra $\lambda(g^{-1})$ arba $\rho(g^{-1})$. Tiršto poerdvio izometrinė bijekcija pratęsiama iki izometrijos, kurios vaizdas yra uždaras ir tirštas, taigi iki unitariojo operatoriaus. Homomorfizmo savybė dėl tolydumo pereina į pratęsinius. Operatoriai komutuoja. Tai rodo skaičiavimas

$$\lambda(g)\rho(h)f(x) = \Delta(h)^{1/2} f(g^{-1}xh) = \rho(h)\lambda(g)f(x).$$

Stiprusis tolydumas. Užfiksuokime funkciją $f \in C_c(G)$, kurios atrama yra K, ir kompaktinę aplinką $W = W^{-1}$ taške e. Kai $g \in W$, funkcijos $\lambda(g)f - f$ ir $f(\cdot g) - f$ už aibės $WK \cup KW$ ribų lygios nuliui. Baigtinė žemėlapiuose apibrėžtų kauburio funkcijų suma duoda funkciją $\varphi \in C_c(G)$, tenkinančią sąlygas $\varphi \geq 0$ ir $\varphi \geq 1$ aibėje $WK \cup KW$. Užfiksuokime skaičių $\varepsilon > 0$. Paimkime aplinką, kurią duoda Lemos 16.10 tolygiojo tolydumo teiginys, ir, sukirtę ją su aplinka W, gaukime aplinką $V \subset W$. Kai $g \in V$, galioja nelygybė

$$\|\lambda(g)f - f\|^2 \leq \varepsilon^2 \int_G \varphi \, d_L x.$$

Funkcija φ buvo užfiksuota prieš skaičių ε, o skaičius $\varepsilon > 0$ yra bet koks. Todėl $\lambda(g)f \to f$, kai $g \to e$. Įvaizdžiui ρ naudokime nelygybę

$$\|\rho(g)f - f\| \le \Delta(g)^{1/2}\,\|f(\cdot g) - f\| + |\Delta(g)^{1/2} - 1|\,\|f\|$$

ir funkcijos Δ tolydumą. Pagal antrąjį Lemos 16.10 įvertį normos kvadratas $\|f(\cdot g) - f\|^2$ tenkina tą patį įvertį kaip ir normos kvadratas $\|\lambda(g)f - f\|^2$. Todėl $\rho(g)f \to f$, kai $g \to e$.

Taigi atvaizdavimai λ ir ρ yra tolydūs taške e tirštame poerdvyje $C_c(G)$. Pagal 15-osios paskaitos tirštosios aibės stipriojo tolydumo kriterijų tai galioja kiekvienam erdvės $L^2(G)$ vektoriui ir kiekvienam grupės G taškui. ∎

Be daugiklio $\Delta(g)^{1/2}$ dešinysis postūmis padaugina normų kvadratus iš daugiklio $\Delta(g)^{-1}$. Grupėje $ax + b$ daugiklis $\Delta(g)^{-1}$ lygus a, kai $g = g(a, b)$. Uždavinyje 16.5 parodoma, kad įvaizdžiai λ ir ρ yra unitariai ekvivalentūs.

Patikrinsime tai stačiakampiui E grupėje $ax + b$, kai $h = g(s, t)$, kaip Skyrelyje 16.4. Kai $f \in C_c(G)$, Teoremos 16.6(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybė, pritaikyta funkcijai $|f|^2$, duoda lygybę $\|f(\cdot h)\|_2^2 = \Delta(h)^{-1}\|f\|_2^2 = s\,\|f\|_2^2$.

Indikatorinė funkcija $\mathbf{1}_E$, atitinkanti sritį E, nėra tolydi, todėl ji nepriklauso erdvei $C_c(G)$. Ji apibrėžia erdvės $L^2(G)$ vektorių. Tai parodysime taip. Kai $0 < \delta \le \frac{1}{2}$, tegul $\varphi_\delta(a, b) = u_\delta(a)v_\delta(b)$ yra trapecijos pavidalo funkcijų sandauga. Funkcija u_δ lygi 1 intervale $[1, 2]$, lygi nuliui už intervalo $[1 - \delta, 2 + \delta]$ ribų, o tarp šių sričių yra tiesinė. Funkcija v_δ tokiu pat būdu sudaroma intervale $[0, 1]$. Tada $\varphi_\delta \in C_c(G)$ ir $0 \le \varphi_\delta \le 1$. Ši funkcija lygi funkcijai $\mathbf{1}_E$ visur, išskyrus sritį, kurios euklidinis plotas yra $4\delta + 4\delta^2$, o šioje srityje $a^{-2} \le 4$. Todėl $\int_G |\mathbf{1}_E - \varphi_\delta|^2\,d_L x \le 4(4\delta + 4\delta^2) \to 0$. Taigi funkcijos φ_δ sudaro Koši šeimą erdvėje $L^2(G)$. Šios šeimos riba yra vektorius $\mathbf{1}_E$, ir galioja lygybė $\|\mathbf{1}_E\|_2^2 = \mu_L(E)$. Pritaikę aukščiau pateiktą tapatybę funkcijoms φ_δ ir perėję prie ribos, gauname

$$\|\mathbf{1}_E(\,\cdot\, h)\|_2^2 = \mu_L(Eh^{-1}) = s\,\mu_L(E).$$

Daugyba iš daugiklio $\Delta(h)^{1/2} = s^{-1/2}$ abiem atvejais atkuria normą.

16.6 Lokaliai kompaktinės grupės

Topologinė grupė vadinama *lokaliai kompaktine*, jei elementas e turi kompaktinę aplinką. Cituojame toliau pateiktą rezultatą (Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2 skyrius). Tegul G yra lokaliai kompaktinė Hausdorfo grupė. Tiesinis funkcionalas I erdvėje $C_c(G)$ vadinamas *teigiamu*, jei $I(f) \ge 0$, kai tik $f \ge 0$. Egzistuoja nenulinis teigiamas tiesinis funkcionalas I erdvėje $C_c(G)$, tenkinantis lygybę $I(f(g\,\cdot)) = I(f)$ visiems $f \in C_c(G)$ ir $g \in G$. Jis yra vienatinis teigiamo daugiklio tikslumu. Egzistuoja vienintelis tolydus homomorfizmas $\Delta\colon G \to (0, \infty)$, tenkinantis lygybę $I(f(\cdot\, g^{-1})) = \Delta(g)I(f)$.

Bendrojoje lokaliai kompaktinėje grupėje nėra normavimo taške e, kuris leistų palyginti kairiuosius ir dešiniuosius integralus. Vietoj to cituojamame rezultate pateikiamos dvi tapatybės. Jos pakeičia Teoremos 16.6(ii) dalies tankių sąryšį ir (iii) dalies inversijos tapatybes. Pirma, funkcionalas $f \mapsto I(f\Delta^{-1})$ yra dešiniai invariantinis. Antra, funkcionalo I reikšmės funkcijai $f \in C_c(G)$ ir funkcijai $x \mapsto f(x^{-1})\Delta(x^{-1})$ sutampa.

Rysso atvaizdavimo teorema realizuoja funkcionalą I kaip Radono matą. Cituojame: Folland, *Real Analysis*, antrasis leidimas, Teorema 7.2 iš §7.1.

Lie grupės atveju dėl vienatinumo funkcionalas I yra funkcionalo $f \mapsto \int_G f\, d_L x$ kartotinis. Todėl abi modulinės funkcijos sutampa. Kadangi erdvė $C_c(G)$ yra tiršta Radono mato atžvilgiu apibrėžtoje erdvėje L^2 (Folland, *Real Analysis*, Teiginys 7.9 iš §7.2), mūsų erdvė $L^2(G)$ yra įprastoji toliau patikslinta prasme.

II dalies integravimo taisyklės

Dabar surinksime mato teorijos faktus, naudojamus likusioje II dalyje. Juos cituojame iš knygos Folland, *Real Analysis*, antrasis leidimas, 2, 6 ir 7 skyriai, ir neįrodinėjame. Tegul X yra Lie grupė, Lie grupės faktorerdvė G/H pagal uždarąjį pogrupį arba atvirasis erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibis. Tokia erdvė yra lokaliai kompaktinė, turi skaičiąją topologijos bazę ir yra skaičioji kompaktinių aibių sąjunga. Taisykles formuluosime tik šioms erdvėms. Bendrosioms lokaliai kompaktinėms grupėms teoremose apie sandaugas reikia papildomų prielaidų.

Erdvės X *Borelio aibė* yra σ-algebros, generuojamos atvirųjų aibių, elementas. Funkcija $f\colon X \to \mathbb{C}$ vadinama *mačia*, jei kiekvienos atvirosios aibės pirmavaizdis yra Borelio aibė. *Teigiamasis Radono matas* μ erdvėje X kiekvienai Borelio aibei priskiria reikšmę iš aibės $[0, \infty]$. Jis yra skaičiai adityvus ir baigtinis kompaktinėse aibėse. Mūsų erdvėse dydis $\mu(E)$ yra dydžių $\mu(U)$ infimumas pagal atvirąsias aibes $U \supset E$ ir dydžių $\mu(K)$ supremumas pagal kompaktines aibes $K \subset E$. *Nuline aibe* vadinama mato 0 Borelio aibė arba tokios aibės poaibis. Savybė galioja *beveik visur*, jei ji negalioja tik nulinėje aibėje.

Žodis „teigiamasis“ reiškia tik tai, kad reikšmės yra neneigiamos. Matas μ turi *pilną atramą*, jei $\mu(U) > 0$ kiekvienai netuščiai atvirajai aibei U. Lygiavertė sąlyga yra tokia: $\int_X \varphi\, d\mu > 0$ kiekvienai nenulinei funkcijai $\varphi \in C_c(X)$, tenkinančiai sąlygą $\varphi \geq 0$. Pavyzdžiui, taškinė masė taške e yra teigiamasis Radono matas be pilnos atramos. Haro matai turi pilną atramą pagal teigiamumo teiginį (I1), kaip ir 17-osios paskaitos faktoriniai matai. Teigiamuosius matus be pilnos atramos naudosime ir 25-ojoje paskaitoje.

Tarkime, kad matas μ turi pilną atramą. Tada $\int_X \bar{\varphi}\psi\, d\mu$ yra skaliarinė sandauga erdvėje $C_c(X)$, o jos Hilberto papildinys yra įprastoji erdvė $L^2(X, \mu)$. Šios erdvės vektoriai yra mačios funkcijos f, kurioms $\int_X |f|^2\, d\mu < \infty$, o dvi funkcijos apibrėžia tą patį vektorių, kai jos sutampa beveik visur. Todėl tiesėje $\mathbb{R}$ 15-osios paskaitos papildinio $L^2(\mathbb{R})$ elementai yra tokių funkcijų klasės.

Mati funkcija f vadinama *integruojama*, jei $\int_X |f|\, d\mu < \infty$. Tegul μ ir ν yra teigiamieji Radono matai tokiose erdvėse X ir Y. Naudosime šias taisykles.

- *Tonelio teorema.* Jei funkcija $F\colon X \times Y \to [0, \infty]$ yra mati, tai du funkcijos F pakartotiniai integralai yra lygūs. Jų bendra reikšmė gali būti begalinė.
- *Fubinio teorema.* Jei funkcija $F\colon X \times Y \to \mathbb{C}$ yra mati ir vienas funkcijos $|F|$ pakartotinis integralas yra baigtinis, tai du funkcijos F pakartotiniai integralai egzistuoja, yra baigtiniai ir yra lygūs. Šiai prielaidai patikrinti naudojame Tonelio teoremą.
- *Mažoruojamojo konvergavimo teorema.* Tegul funkcijos f_j yra mačios ir $f_j \to f$ beveik visur. Tarkime, kad egzistuoja viena integruojama funkcija g, tokia, kad $|f_j| \leq g$ beveik visur visiems j. Tada funkcija f yra integruojama ir $\int_X f_j\, d\mu \to \int_X f\, d\mu$.

- *Diferencijavimas po integralo ženklu.* Tegul $I \subset \mathbb{R}$ yra atvirasis intervalas. Tegul funkcija $F(s,\cdot)$ yra integruojama kiekvienam $s \in I$, o funkcija $s \mapsto F(s,x)$ yra diferencijuojama kiekvienam $x \in X$. Tarkime, kad egzistuoja viena integruojama funkcija g, tokia, kad $|\partial_s F(s,x)| \le g(x)$ visiems $s \in I$ ir $x \in X$. Tada $\frac{d}{ds}\int_X F(s,x)\,d\mu(x) = \int_X \partial_s F(s,x)\,d\mu(x)$. Iš tikrųjų pagal vidutinės reikšmės nelygybę skirtuminių santykių modulius mažoruoja funkcija g, todėl šiems santykiams galima taikyti mažoruojamojo konvergavimo teoremą.
- *Kintamųjų keitimas.* Tegul $\Phi\colon U \to V$ yra C^1 klasės difeomorfizmas tarp erdvės $\mathbb{R}^n$ atvirųjų poaibių, o funkcija $f\colon V \to \mathbb{C}$ yra integruojama arba mati su reikšmėmis aibėje $[0,\infty]$. Tada $\int_V f(y)\,dy = \int_U f(\Phi(x))\,|\det D\Phi(x)|\,dx$.

Bendro įverčio mažoruojamojo konvergavimo teoremoje atsisakyti negalima. Tiesėje $\mathbb{R}$ funkcijos $j\,\mathbf{1}_{(0,1/j)}$ visur artėja prie 0, bet kiekvienos iš jų integralas lygus 1. Diferencijavimo taisyklei imkime funkciją $F(s,t) = e^{-t^2+ist}$ tiesėje $\mathbb{R}$. Tada $|\partial_s F(s,t)| = |t|e^{-t^2}$. Ši funkcija yra integruojama ir nepriklauso nuo kintamojo s. Todėl integralą $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2+ist}\,dt$ galima diferencijuoti po integralo ženklu.

Tonelio ir Fubinio teoremoms pateikiame įvertį, kurį naudoja 18-oji paskaita. Tegul $f, h \in L^2(\mathbb{R})$ ir $\lambda \neq 0$. Pagal Tonelio teoremą pirmiausia galime integruoti pagal kintamąjį t. Pagal Koši ir Švarco nelygybę ir postūmių invariantiškumą vidinis integralas neviršija dydžio $\|h\|\,\|f\|$. Du Gauso integralai lygūs $2\sqrt{\pi}$ ir $2\sqrt{\pi}/|\lambda|$. Todėl

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(a^2+\lambda^2 b^2)/4} \int_{\mathbb{R}} |h(t)|\,|f(t+a)|\,dt\,da\,db \le \frac{4\pi}{|\lambda|}\,\|h\|\,\|f\|.$$

Šis baigtinis įvertis yra Fubinio teoremos prielaida tai pačiai pointegralinei funkcijai be modulių.

Savikontrolė

1. Grupėje $ax+b$ imkime elementą $g = g(2,5)$. Tarkime, kad $\int_G f\,d_L x = 7$. Raskite reikšmę $\Delta(g)$ ir integralą $\int_G f(xg)\,d_L x$.

   Atsakymas. Turime $\Delta(g) = 1/2$. Pagal Teoremos 16.6(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę integralas lygus $\Delta(g)^{-1}\cdot 7 = 14$.

2. Tarkime, kad kuris nors kairiai invariantinis glodusis teigiamasis tankis grupėje G yra ir dešiniai invariantinis. Ar grupė G būtinai yra unimodulinė?

   Atsakymas. Taip. Pagal Teoremos 16.3(a) vienatinumo teiginį šis tankis lygus tankiui $c\mu_L$ su tam tikru skaičiumi $c > 0$, todėl $R_g^*\mu_L = \mu_L$ visiems $g \in G$. Pagal Teoremos 16.6(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę tai reiškia, kad $\Delta(g) = 1$ visiems $g \in G$.

3. Grupėje $ax+b$ nagrinėkime atvaizdavimą $f \mapsto f(\cdot\, g(3,1))$. Iš kokio daugiklio jis padaugina normos kvadratą $\|f\|^2$ erdvėje $L^2(G)$?

   Atsakymas. Pagal Teoremos 16.6(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę, pritaikytą funkcijai $|f|^2$, daugiklis yra $\Delta(g(3,1))^{-1} = 3$. Todėl be daugiklio $\Delta^{1/2}$ šis atvaizdavimas nėra unitarusis.

Santrauka

Perkeldami postūmiais užfiksuotą teigiamąjį tankį algebroje $\mathfrak{g}$, gauname kairįjį ir dešinįjį Haro tankius. Kiekvienas iš jų yra vienatinis teigiamo daugiklio tikslumu. Nekompaktinėje Lie grupėje visa masė yra begalinė, todėl normuoto baigtinio Haro integralo nėra. Dešinysis postūmis padaugina tankį μ_L iš daugiklio $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$. Kai tankiai μ_L ir μ_R taške e įgyja tą pačią reikšmę, galioja lygybė $\mu_R = \Delta^{-1}\mu_L$, o inversija sukeičia tankius μ_L ir μ_R vietomis. Grupėje $ax+b$ turime $d_L x = a^{-2}\,da\,db$, $d_R x = a^{-1}\,da\,db$ ir $\Delta = a^{-1}$. Daugiklis $\Delta^{1/2}$ dešinįjį postūmį erdvėje $L^2(G)$ paverčia unitariuoju operatoriumi. Haro matai ir faktoriniai matai yra teigiamieji Radono matai su pilna atrama, o cituotos Skyrelio 16.6 integravimo taisyklės galioja II dalies erdvėse, turinčiose skaičiąją topologijos bazę.

Pagrindinės II dalies grupės yra unimodulinės: $\mathbb{R}^n$, Heizenbergo grupė, $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, Lorenco ir Puankarė grupės. Jų uždarieji pogrupiai dažnai tokie nėra. Pavyzdžiui, viršutinių trikampių matricų su teigiama įstrižaine pogrupis grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra grupė $ax+b$ (Uždavinys 20.6). Toliau, 17-oje paskaitoje, funkcijas Δ_G ir Δ_H palyginsime, kad sukonstruotume unitariuosius įvaizdžius.

Literatūra

- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, VIII skyrius „Integration“, skyreliai „Differential Forms and Measure Zero“ ir „Haar Measure for Lie Groups“. Palyginkite šios knygos modulinės funkcijos normavimą su mūsiškiu.
- Kirillov, *Elements of the Theory of Representations*, §9, pagal kurso literatūros planą. Patikrinkite, kokio modulinės funkcijos susitarimo laikomasi šioje knygoje.
- Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2 skyrius, skyreliai „Haar Measure“ ir „The Modular Function“, apie bendrąsias lokaliai kompaktines grupes.

Paskaita 17

Unitarioji indukcija

Tikslai. *Kompaktinių grupių indukuotuosius įvaizdžius 12-oje paskaitoje sukonstravome naudodami invariantinį matą erdvėje K/H. Nekompaktinės grupės G atveju faktorerdvėje G/H invariantinio mato gali nebūti. Vietoj jo naudosime* kvaziinvariantinį *matą, kurį postūmis grupės G elementu padaugina iš teigiamos tolydžios funkcijos. Tada veikimą pataisysime kvadratinės šaknies daugikliu. Modelinis pavyzdys yra grupė $ax+b$ ir įvaizdžiai, indukuoti iš jos postūmių pogrupio charakterių.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti faktorinių matų teoremą ir išvesti kvaziinvariantiškumo daugiklį bei jo kociklo tapatybę.
- Apibrėžti normuotąjį indukuotąjį įvaizdį ir įrodyti, kad jis yra unitarusis.
- Apskaičiuoti grupės $ax+b$ įvaizdžius, indukuotus iš postūmių charakterių, dviem realizacijomis su skirtingais matais.
- Paaiškinti, kodėl indukuotojo įvaizdžio unitariojo ekvivalentumo klasė priklauso tik nuo dažnio mastelio keitimų orbitos.

17.1 Ekvivariantinės funkcijos

Visoje paskaitoje G žymi Lie grupę, H – uždarąjį pogrupį, o formulė $q(x) = xH$ apibrėžia faktorinį atvaizdavimą $G \to G/H$. Pagal 3-iosios paskaitos rezultatus faktorerdvė G/H yra daugdara, kurią grupė G veikia taisykle $g \cdot xH = gxH$. Atvaizdavimas q yra tolydus ir atviras. Tegul (σ, V) yra pogrupio H unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje V.

Apibrėžimas 17.1. *Tipo σ ekvivariantinė funkcija* yra tolydus atvaizdavimas $f\colon G \to V$, tenkinantis sąlygą

$$f(xh) = \sigma(h)^{-1} f(x) \qquad (x \in G,\ h \in H). \tag{17.1}$$

Simboliu $\mathcal{F}_c(\sigma)$ žymėsime erdvę tų funkcijų f, kurioms aibė $q(\operatorname{supp} f)$ yra kompaktinė.

Tai yra 12-osios paskaitos susitarimas. Tegul $s\colon U \to G$ yra tolydus atvaizdavimo q pjūvis virš atviros aibės $U \subseteq G/H$. Tada galioja lygybė $f(s(p)h) = \sigma(h)^{-1} f(s(p))$. Todėl virš aibės U funkcija f yra tiesiog įprasta funkcija $f \circ s\colon U \to V$. Tolydieji lokalieji pjūviai egzistuoja kiekvieno taško aplinkoje. Jie yra 3-ioje paskaitoje pateiktos faktorerdvės G/H konstrukcijos dalis. Geometriškai funkcija f yra vektorinės sluoksniuotės virš faktorerdvės G/H pjūvis. Naudosime tik funkcinį aprašą.

Kadangi operatorius $\sigma(h)$ yra unitarusis, formulė $n_f(xH) = \|f(x)\|^2$ gerai apibrėžia funkciją faktorerdvėje G/H. Ši funkcija yra tolydi, nes atvaizdavimas q yra atviras. Be to, jos atrama yra kompaktinė.

Patikrinsime, kad erdvė $\mathcal{F}_c(\sigma)$ nėra nulinė, kai $V \neq 0$. Vidurkinimas pagal pogrupį H tolydžias funkcijas $G \to V$ su kompaktine atrama paverčia erdvės $\mathcal{F}_c(\sigma)$ elementais. Užfiksuokime kairįjį Haro matą dh pogrupyje H. Kai $F\colon G \to V$ yra tolydi funkcija su kompaktine atrama, apibrėžkime funkciją $P_\sigma F$ formule

$$P_\sigma F(x) = \int_H \sigma(h)F(xh)\,dh.$$

Šis integralas apibrėžiamas silpnąja prasme 10-osios paskaitos Rysso argumentu, pritaikytu tolydžiai funkcijai su kompaktine atrama, įgyjančiai reikšmes Hilberto erdvėje. Kai elementas x yra fiksuotas, pointegralinė funkcija už aibės $H \cap x^{-1}\operatorname{supp} F$ ribų lygi nuliui.

Kadangi matas dh yra kairiai invariantinis, keitinys $h' = h_0 h$ duoda

$$P_\sigma F(xh_0) = \int_H \sigma(h_0^{-1}h')F(xh')\,dh' = \sigma(h_0)^{-1}P_\sigma F(x).$$

Kai elementas x priklauso kompaktinei aplinkai, visų pointegralinių funkcijų atramos telpa viename kompaktiniame pogrupio H poaibyje. Tolygusis tolydumas šiame poaibyje užtikrina funkcijos $P_\sigma F$ tolydumą. Be to, galioja sąryšis $q(\operatorname{supp} P_\sigma F) \subseteq q(\operatorname{supp} F)$, o dešinėje pusėje esanti aibė yra kompaktinė. Taigi įrodėme, kad $P_\sigma F \in \mathcal{F}_c(\sigma)$.

Šis elementas gali būti nenulinis. Tegul $v \in V$ yra nenulinis vektorius. Dėl įvaizdžio σ stipriojo tolydumo galime pasirinkti funkciją $\beta \in C_c(G)$, tenkinančią sąlygas $\beta \geq 0$ ir $\beta(e) > 0$, kurios atrama yra taip arti elemento e, kad $\operatorname{Re}\langle v, \sigma(h)v\rangle > 0$ visiems $h \in H \cap \operatorname{supp}\beta$. Kai $F(x) = \beta(x)v$, skaičiaus $\langle v, P_\sigma F(e)\rangle = \int_H \beta(h)\langle v, \sigma(h)v\rangle\,dh$ realioji dalis yra teigiama. Todėl $\mathcal{F}_c(\sigma) \neq 0$.

17.2 Faktoriniai matai

Pakeiskime funkcijos tiesėje mastelį: $u \mapsto u((t - b_0)/a_0)$, kur $a_0 > 0$. Šis atvaizdavimas dydį $\|u\|^2$ padaugina iš daugiklio a_0, nes matas dt nėra invariantinis tempimų atžvilgiu. Dalyba iš dydžio $a_0^{1/2}$ atkuria normą. Šioje paskaitoje tokią pataisą atliksime bet kuriai faktorerdvei G/H.

Šioje paskaitoje *matu* lokaliai kompaktinėje erdvėje X vadiname teigiamąjį Radono matą su pilna atrama, kaip apibrėžta 16-oje paskaitoje. Lygiavertė formuluotė tokia: tai teigiamas tiesinis funkcionalas $\varphi \mapsto \int_X \varphi\,d\mu$ erdvėje $C_c(X)$, kuris yra griežtai teigiamas nenulinėms funkcijoms $\varphi \geq 0$. Haro matai turi šią savybę. Tada erdvė $L^2(X, \mu)$ yra erdvės $C_c(X)$ papildinys skaliarinės sandaugos $\langle \varphi, \psi\rangle = \int_X \bar\varphi\psi\,d\mu$ atžvilgiu.

Užfiksuokime kairiuosius Haro matus: matą dx grupėje G ir matą dh pogrupyje H. Modulines funkcijas apibrėžiame kaip 16-oje paskaitoje:

$$\int_G F(xg)\,dx = \Delta_G(g)^{-1}\int_G F(x)\,dx,$$

ir analogiškai funkciją Δ_H. Funkcijai $F \in C_c(G)$ apibrėžkime funkciją $F^H \in C_c(G/H)$ formule

$$F^H(xH) = \int_H F(xh)\,dh. \tag{17.2}$$

Ši funkcija yra gerai apibrėžta, nes matas dh yra kairiai invariantinis.

Lema 17.2. *Jei matas μ faktorerdvėje G/H tenkina lygybę $\int_G F\,dx = \int_{G/H} F^H\,d\mu$ visoms funkcijoms $F \in C_c(G)$, tai lygybė $\Delta_G(h) = \Delta_H(h)$ galioja visiems $h \in H$.*

Įrodymas. Užfiksuokime elementą $h_0 \in H$ ir pritaikykime tapatybę funkcijai, apibrėžtai formule $F_{h_0}(x) = F(xh_0)$. Kairioji pusė tampa lygi $\Delta_G(h_0)^{-1}\int_G F\,dx$. Dešinėje pusėje turime

$$(F_{h_0})^H(xH) = \int_H F(xhh_0)\,dh = \Delta_H(h_0)^{-1}F^H(xH).$$

Vadinasi, galioja lygybė $\Delta_G(h_0)^{-1}\int_G F\,dx = \Delta_H(h_0)^{-1}\int_G F\,dx$. Pasirinkime nenulinę funkciją $F \geq 0$. Tada galioja nelygybė $\int_G F\,dx > 0$. Padaliję abi lygybės puses iš integralo $\int_G F\,dx$, gauname lygybę $\Delta_G(h_0)^{-1} = \Delta_H(h_0)^{-1}$, iš kurios išplaukia lygybė $\Delta_G(h_0) = \Delta_H(h_0)$. ∎

Nagrinėdami grupę $ax+b$ ir jos mastelio keitimų pogrupį A, pamatysime, kad $\Delta_G(a,0) = 1/a$, o $\Delta_A = 1$. Todėl pagal modulinio suderinamumo lemą (Lema 17.2) faktorerdvė G/A tokio mato neturi. Vietoj to į integralą pagal grupę G įterpsime grupėje G apibrėžtą svorio funkciją.

Svorio funkcija turi transformuotis tam tikru apibrėžtu būdu. Tarkime, kad tolydi funkcija $\rho > 0$ ir matas μ tenkina lygybę $\int_G F\rho\,dx = \int_{G/H} F^H\,d\mu$ visoms funkcijoms $F \in C_c(G)$. Pritaikykime šią tapatybę funkcijai $F_{h_0}(x) = F(xh_0)$. Kaip ir Lemos 17.2 įrodyme, dešinioji pusė padauginama iš daugiklio $\Delta_H(h_0)^{-1}$. Kairėje pusėje modulinė tapatybė, pritaikyta funkcijai $x \mapsto F(x)\rho(xh_0^{-1})$, duoda

$$\int_G F(xh_0)\rho(x)\,dx = \Delta_G(h_0)^{-1}\int_G F(x)\rho(xh_0^{-1})\,dx.$$

Kadangi funkcija F yra bet kokia, lygybė $\Delta_G(h_0)^{-1}\rho(xh_0^{-1}) = \Delta_H(h_0)^{-1}\rho(x)$ galioja visiems $x \in G$. Pakeitę elementą x elementu xh_0, gauname kitos teoremos (a) dalies transformacijos dėsnį.

Teorema 17.3 (Faktoriniai matai; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o H yra jos uždarasis pogrupis.*

(a) Egzistuoja tolydi funkcija $\rho\colon G \to (0,\infty)$, tenkinanti sąlygą

$$\rho(xh) = \frac{\Delta_H(h)}{\Delta_G(h)}\,\rho(x) \qquad (x \in G,\ h \in H). \tag{17.3}$$

(b) Atvaizdavimas $F \mapsto F^H$ atvaizduoja erdvę $C_c(G)$ į visą erdvę $C_c(G/H)$. Jei $\varphi \geq 0$, tai pakėlimą F, kuriam $F^H = \varphi$, galima pasirinkti taip, kad $F \geq 0$.

(c) Kiekvienai funkcijai ρ, tokiai kaip punkte (a), egzistuoja vienintelis matas μ_ρ faktorerdvėje G/H, tenkinantis lygybę

$$\int_G F(x)\rho(x)\,dx = \int_{G/H} F^H\,d\mu_\rho \qquad (F \in C_c(G)). \tag{17.4}$$

Bendro uždarojo pogrupio atveju žr. G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, antrasis leidimas (2016), 2 skyrių „Measures on Homogeneous Spaces“. Toliau šią knygą cituosime kaip Folland, Abstract Harmonic Analysis. Šios knygos modulinis susitarimas sutampa su mūsiškiu. Mato μ_ρ vienatinumas išplaukia iš to, kad vidurkinimo atvaizdavimas yra siurjektyvus. Kvaziinvariantiniai matai ir modulinis kriterijus nagrinėjami knygoje A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations* (1976), 9.1 skyrelyje. Toliau šią knygą cituosime kaip Kirillov, Elements. Šios knygos susitarimus prieš naudojant reikia suderinti su mūsiškiais.

Tolydi teigiama funkcija ρ, tenkinanti transformacijos dėsnį (17.3), vadinama *ro funkcija*. Jei $\Delta_G|_H = \Delta_H$, tai galime imti $\rho = 1$. Šioje paskaitoje ρ žymi ro funkciją, o toliau λ žymi jos kociklą. Tai nėra 16-osios paskaitos reguliarieji įvaizdžiai.

Teiginys 17.4. *Tegul ρ yra ro funkcija, o $\mu = \mu_\rho$. Apibrėžkime funkciją λ formule $\lambda(g, xH) = \rho(gx)/\rho(x)$. Tada funkcija λ yra gerai apibrėžta. Su visais $g, g_1, g_2 \in G$, $p \in G/H$ ir $\varphi \in C_c(G/H)$ galioja lygybės*

$$\lambda(g_1 g_2, p) = \lambda(g_1, g_2 p)\,\lambda(g_2, p), \qquad \lambda(e, p) = 1, \tag{17.5}$$

$$\int_{G/H} \varphi(g^{-1}p)\,d\mu(p) = \int_{G/H} \varphi(p)\,\lambda(g, p)\,d\mu(p). \tag{17.6}$$

Įrodymas. Pagal transformacijos dėsnį (17.3) pakeitus elementą x elementu xh, reikšmės $\rho(gx)$ ir $\rho(x)$ padauginamos iš to paties daugiklio. Todėl funkcija λ yra gerai apibrėžta. Funkcija $(g, x) \mapsto \rho(gx)/\rho(x)$ yra tolydi ir pastovi atvaizdavimo $\mathrm{id} \times q$ sluoksniuose. Kadangi atvaizdavimas q yra atviras, atvaizdavimas $\mathrm{id} \times q$ yra atvira siurjekcija, todėl jis yra ir faktorinis atvaizdavimas. Taigi funkcija λ yra tolydi pagal abu kintamuosius (g, p) kartu. Kai $p = xH$, galioja lygybės

$$\lambda(g_1 g_2, p) = \frac{\rho(g_1 g_2 x)}{\rho(g_2 x)} \cdot \frac{\rho(g_2 x)}{\rho(x)} = \lambda(g_1, g_2 p)\,\lambda(g_2, p).$$

Be to, galioja lygybė $\lambda(e, p) = \rho(x)/\rho(x) = 1$.

Kvaziinvariantiškumo tapatybei (17.6) įrodyti pasinaudokime vidurkinimo siurjektyvumu (Teorema 17.3(b)) ir užrašykime $\varphi = F^H$, kur $F \in C_c(G)$. Funkcijos $x \mapsto F(g^{-1}x)$ vidurkis yra funkcija $\varphi(g^{-1}\cdot)$. Taikydami svertinio faktorinio integralo formulę (17.4) ir mato dx kairįjį invariantiškumą bei atlikę keitinį $y = g^{-1}x$, gauname

$$\int \varphi(g^{-1}p)\,d\mu(p) = \int_G F(g^{-1}x)\rho(x)\,dx = \int_G F(y)\rho(gy)\,dy = \int_G F(y)\,\lambda(g, yH)\,\rho(y)\,dy.$$

Kadangi funkcija $\lambda(g, \cdot)$ yra pastovi kiekvienoje gretutinėje klasėje, funkcijos $y \mapsto F(y)\lambda(g, yH)$ vidurkis lygus $\varphi\,\lambda(g, \cdot)$. Dar kartą pritaikę svertinio faktorinio integralo formulę (17.4), gauname lygybės (17.6) dešiniąją pusę. ∎

Matas μ vadinamas *kvaziinvariantiniu*, nes postūmis elementu g jį padaugina iš teigiamo tolydaus daugiklio $\lambda(g, \cdot)$. Jei $\rho = 1$, tai $\lambda = 1$, o matas μ yra G-invariantinis.

17.3 Normuotasis indukuotasis įvaizdis

Keitinys $p = gq$ kvaziinvariantiškumo tapatybėje (17.6) duoda lygybę $d\mu(gq) = \lambda(g,q)\,d\mu(q)$. Taigi $\lambda(g,\cdot)$ yra atvaizdavimo $q \mapsto gq$ jakobianas mato μ atžvilgiu, o kociklo tapatybė (17.5) yra grandininė taisyklė. Dydį $\|f\|^2\,d\mu$ laikykime tarytum tikimybės tankiu. Tada amplitudei tenka jakobiano kvadratinė šaknis.

Užfiksuokime ro funkciją ρ. Tegul matas μ ir funkcija λ yra tokie kaip kvaziinvariantiškumo teiginyje (Teiginys 17.4). Funkcijoms $f_1, f_2 \in \mathcal{F}_c(\sigma)$ apibrėžkime skaliarinę sandaugą ir normą

$$\langle f_1, f_2\rangle = \int_{G/H} \langle f_1(x), f_2(x)\rangle\, d\mu(xH), \qquad \|f\|^2 = \int_{G/H} n_f\, d\mu.$$

Pointegralinė funkcija yra gerai apibrėžta, nes įvaizdis σ yra unitarusis. Jei $\|f\| = 0$, tai dėl mato griežtojo teigiamumo $n_f = 0$, todėl $f = 0$.

Teorema 17.5. *Funkcijai $f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$ ir elementui $g \in G$ apibrėžkime funkciją formule*

$$(\Pi(g)f)(x) = \left(\frac{\rho(g^{-1}x)}{\rho(x)}\right)^{1/2} f(g^{-1}x) = \lambda(g^{-1}, xH)^{1/2} f(g^{-1}x). \tag{17.7}$$

Tada (a) *galioja sąryšis $\Pi(g)f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$;* (b) *galioja lygybės $\Pi(e) = I$ ir $\Pi(g_1g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$;* (c) *galioja lygybė $\|\Pi(g)f\| = \|f\|$.*

Įrodymas. (a) Daugiklis priklauso tik nuo gretutinės klasės xH. Todėl pakeitus elementą x elementu xh, reikšmė $f(g^{-1}x)$ tik pavirsta reikšme $\sigma(h)^{-1}f(g^{-1}x)$. Be to, aibė $q(\operatorname{supp}\Pi(g)f) = g\cdot q(\operatorname{supp} f)$ yra kompaktinė.

(b) Tegul $p = xH$. Du kartus pritaikę normuotąjį veikimą (17.7), gauname

$$(\Pi(g_1)\Pi(g_2)f)(x) = \lambda(g_1^{-1}, p)^{1/2}\,\lambda(g_2^{-1}, g_1^{-1}p)^{1/2}\,f(g_2^{-1}g_1^{-1}x).$$

Porai g_2^{-1}, g_1^{-1} pritaikyta kociklo tapatybė daugiklių sandaugą paverčia kvadratine šaknimi $\lambda((g_1g_2)^{-1}, p)^{1/2}$. Be to, lygybė $\lambda(e,p) = 1$ duoda lygybę $\Pi(e) = I$.

(c) Postūmis elementu g matą μ padaugina iš daugiklio $\lambda(g,\cdot)$. Kvadratinės šaknies daugiklis operatoriuje $\Pi(g)$ yra parinktas taip, kad panaikintų šį pokytį. Turime $n_{\Pi(g)f}(p) = \lambda(g^{-1},p)\,n_f(g^{-1}p)$. Apibrėžkime funkciją formule $\varphi(p) = n_f(p)\,\lambda(g^{-1},gp)$. Tada galioja lygybė $\varphi(g^{-1}p) = n_{\Pi(g)f}(p)$. Dabar kvaziinvariantiškumo tapatybė (17.6) duoda

$$\|\Pi(g)f\|^2 = \int \varphi(g^{-1}p)\,d\mu = \int n_f(p)\,\lambda(g^{-1},gp)\,\lambda(g,p)\,d\mu(p) = \int n_f\,d\mu.$$

Paskutiniame žingsnyje pritaikėme kociklo tapatybę (17.5), kai $g_1 = g^{-1}$ ir $g_2 = g$. ∎

Pagal normuotosios indukcijos teoremos (Teorema 17.5) įvaizdžio dėsnį ir izometrijos savybę kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra erdvės $\mathcal{F}_c(\sigma)$ izometrija, kurios atvirkštinis operatorius yra $\Pi(g^{-1})$. Todėl operatorių $\Pi(g)$ galima pratęsti iki unitariojo operatoriaus papildinyje. Dėl tolydumo įvaizdžio dėsnis išlieka.

Apibrėžimas 17.6. *Normuotasis indukuotasis įvaizdis* $\operatorname{Ind}_H^G \sigma$ yra erdvės $\mathcal{F}_c(\sigma)$ papildinys skaliarinės sandaugos, apibrėžtos naudojant pasirinktą ro funkciją ρ, atžvilgiu, kartu su šiais unitariaisiais operatoriais $\Pi(g)$.

Teiginys 17.7. *Indukuotasis įvaizdis* $\operatorname{Ind}_H^G \sigma$ *yra stipriai tolydus.*

Įrodymas. Pirmiausia imkime funkciją $f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$ ir pažymėkime kompaktinę aibę $C = q(\operatorname{supp} f)$. Tegul B yra kompaktinė elemento e aplinka grupėje G. Kai $g \in B$, abiejų funkcijų $\Pi(g)f$ ir f faktorinės atramos telpa kompaktinėje aibėje

$$S = B \cdot C \subset G/H.$$

Pakanka parodyti, kad šių funkcijų skirtumas aibėje S tolygiai artėja prie nulio sluoksnio normos prasme. Ši norma nepriklauso nuo atstovo grupėje G pasirinkimo, nes įvaizdis σ yra unitarusis.

Pasinaudoję aibės S kompaktiškumu ir faktorerdvės G/H daugdaros struktūra, aibę S galime padengti baigtiniu skaičiumi kompaktinių poaibių S_i. Kiekvienas poaibis S_i telpa atviroje aibėje, virš kurios yra apibrėžtas tolydus lokalusis pjūvis s_i atvaizdavimo q atžvilgiu. Pakeltosios aibės $s_i(S_i)$ yra kompaktinės. Šiems atstovams galioja lygybė

$$(\Pi(g)f - f)(s_i(p)) = \lambda(g^{-1}, p)^{1/2} f(g^{-1}s_i(p)) - f(s_i(p)).$$

Funkcija $(g, p) \mapsto \lambda(g^{-1}, p)$ yra tolydi pagal abu kintamuosius kartu ir lygi vienetui, kai $g = e$. Be to, atvaizdavimas $(g, p) \mapsto f(g^{-1}s_i(p))$, įgyjantis reikšmes Hilberto erdvėje, yra tolydus pagal abu kintamuosius kartu. Kompaktinėse aibėse $B \times S_i$ šis tolydumas yra tolygus. Taigi aukščiau užrašytas skirtumas artėja prie nulio tolygiai visiems $p \in S_i$, kai $g \to e$. Poaibių S_i yra tik baigtinis skaičius, todėl tas pats galioja aibėje S.

Pasirinkime funkciją $\varphi \in C_c(G/H)$, tenkinančią sąlygas $\varphi \geq 0$ ir $\varphi \geq 1$ aibėje S. Jei tolygusis įvertis yra ε, tai galioja nelygybė

$$\|\Pi(g)f - f\|^2 \leq \varepsilon^2 \int_{G/H} \varphi \, d\mu.$$

Tai įrodo, kad $\Pi(g)f \to f$ papildinio normos prasme, kai $g \to e$, kiekvienai funkcijai $f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$.

Papildinio vektoriui v pasirinkime funkciją f, kuriai $\|v - f\| < \varepsilon$. Iš unitarumo gauname nelygybę

$$\|\Pi(g)v - v\| \leq 2\varepsilon + \|\Pi(g)f - f\|.$$

Vadinasi, tolydumas taške e galioja kiekvienam vektoriui v. Pagal įvaizdžio dėsnį ir unitarumą iš tolydumo taške e išplaukia tolydumas kiekviename taške g_0. ∎

Pastaba 17.8. Be kvadratinės šaknies atvaizdavimas $f \mapsto f(g^{-1}\cdot)$ vis tiek išsaugo erdvę $\mathcal{F}_c(\sigma)$ ir tenkina įvaizdžio dėsnį. Pagal kvaziinvariantiškumo tapatybę (17.6) šis atvaizdavimas dydį $\|f\|^2$ paverčia dydžiu $\int n_f \, \lambda(g, \cdot) \, d\mu$. Todėl bendruoju atveju jis nėra unitarusis. Grupės $ax + b$ pavyzdyje jis dydį $\|\psi\|^2$ padaugina iš daugiklio a_0 (Teiginys 17.9(a)). Kai grupė G yra kompaktinė, o įvaizdis σ yra baigtinės dimensijos, imame $\rho = 1$ ir atgauname 12-osios paskaitos konstrukciją. Skirtingos ro funkcijos duoda unitariai ekvivalenčius įvaizdžius (Uždavinys 17.3). Baigtinių grupių Frobenijaus abipusiškumas čia nėra perkeliamas pažodžiui. Pavyzdžiui, Skyrelio 17.5 įvaizdis Π_0 yra indukuotas iš postūmių pogrupio N trivialiojo charakterio. Grupės $ax + b$ charakteris, kuris pogrupyje N yra trivialus, turėtų nenulinį N-atvaizdavimą į šį trivialųjį charakterį, tačiau tokio charakterio įvaizdyje Π_0 nėra. Abipusiškumo nenaudosime.

17.4 Grupės $ax + b$ įvaizdžiai, indukuoti iš postūmių

Tegul $G = \{(a, b) : a > 0,\ b \in \mathbb{R}\}$, kur

$$(a,b)(a',b') = (aa', b + ab'), \qquad (a,b)^{-1} = (a^{-1}, -a^{-1}b), \qquad (a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ši grupė veikia tiesę $\mathbb{R}$ taisykle $t \mapsto at + b$. Kaip parodėme 16-oje paskaitoje, matas $dx = a^{-2}\,da\,db$ yra kairysis Haro matas, o modulinė funkcija išreiškiama formule $\Delta_G(a,b) = 1/a$. Tegul $N = \{n_c = (1,c)\}$ yra postūmių pogrupis, o $A = \{(a,0)\}$ – mastelio keitimų pogrupis. Tada pogrupis $N \cong \mathbb{R}$ turi Haro matą dc, o $\Delta_N = 1$. Kiekvienam *dažniui* $\xi \in \mathbb{R}$ formulė $\chi_\xi(n_c) = e^{i\xi c}$ apibrėžia unitarųjį pogrupio N charakterį.

Faktorerdvė G/N turi invariantinį matą, kaip matysime toliau. Ją nagrinėjame pirmiausia, nes jos taškai nusako dažnio orbitą. Pradžioje minėta afinioji tiesė G/A invariantinio mato neturi. Ją nagrinėsime Skyrelio 17.5 pabaigoje.

17.4.1 Faktorerdvė ir du matai

Kadangi $(a,b)n_c = (a, b + ac)$, gretutinė klasė $(a,b)N$ yra lygi aibei $\{a\} \times \mathbb{R}$. Todėl atvaizdavimas $(a,b)N \mapsto a$ sutapatina faktorerdvę G/N su intervalu $(0,\infty)$, o atvaizdavimas, apibrėžtas formule $s(a) = (a,0)$, yra globalusis pjūvis. Veikimas užrašomas formule $(a_0,b_0)\cdot a = a_0 a$.

Kadangi $\Delta_G(n_c) = 1 = \Delta_N(n_c)$, transformacijos dėsnis (17.3) virsta lygybe $\rho(xn) = \rho(x)$. Taigi ro funkcijos yra teigiamos tolydžios funkcijos, priklausančios tik nuo kintamojo a. Keitinys $b = ac$ duoda

$$F^N(a) = \int_{\mathbb{R}} F(a, ac)\,dc = \frac{1}{a}\int_{\mathbb{R}} F(a,b)\,db.$$

Todėl ro funkcijai $\rho = \rho(a)$ turime

$$\int_G F\rho\,dx = \int_0^\infty \Big(\int_{\mathbb{R}} F(a,b)\,db\Big)\frac{\rho(a)\,da}{a^2} = \int_0^\infty F^N(a)\,\rho(a)\,\frac{da}{a}.$$

Pagal faktorinių matų teoremos (Teorema 17.3) vienatinumo dalį gauname $d\mu_\rho = \rho(a)\,da/a$.

Nagrinėsime du ro funkcijos pasirinkimus. Ro funkcija $\rho_1 = 1$ duoda invariantinį matą, o ro funkcija, apibrėžta formule $\rho_{\mathrm{Leb}}(a,b) = a$, duoda Lebego matą:

$$d\mu_{\rho_1} = \frac{da}{a}, \qquad d\mu_{\rho_{\mathrm{Leb}}} = da.$$

Lebego mato atveju imkime $g = (a_0, b_0)$ ir $x = (a, 0)$. Tada gauname lygybę $gx = (a_0 a, b_0)$, todėl $\lambda_{\mathrm{Leb}}(g,a) = a_0$. Šiuo atveju kvaziinvariantiškumo tapatybė (17.6) yra kintamojo keitimo taisyklė $\int_0^\infty \varphi(a/a_0)\,da = a_0\int_0^\infty \varphi(u)\,du$. Kociklo tapatybė virsta lygybe $a_1 a_2 = a_1 \cdot a_2$, nes sandaugos $g_1 g_2$ pirmoji komponentė yra $a_1 a_2$.


17.4.2 Ekvivariantinės funkcijos ir veikimas

Kai $\sigma = \chi_\xi$, ekvivariantiškumo sąlyga (17.1) virsta lygybe $f(a, b+ac) = e^{-i\xi c} f(a,b)$. Įstatę pirmiausia $b = 0$, o tada $c = b/a$, gauname

$$f(a,b) = e^{-i\xi b/a}\varphi(a), \qquad \varphi = f \circ s. \tag{17.8}$$

Atvirkščiai, kai $\varphi \in C_c((0,\infty))$, ši funkcija f priklauso erdvei $\mathcal{F}_c(\chi_\xi)$, nes galioja lygybė $e^{-i\xi(b+ac)/a} = e^{-i\xi c}e^{-i\xi b/a}$. Taigi atvaizdavimas $f \mapsto \varphi$ yra bijekcija į visą erdvę $C_c((0,\infty))$. Be to, galioja lygybės $n_f = |\varphi|^2$ ir $\|f\|^2 = \int_0^\infty |\varphi|^2 \rho(a)\, da/a$.

Tokią funkciją vaizduoja 17.1 pav. Kairysis postūmis elementu n_c perkelia tašką (a,b) į tašką $(a, b+c)$. Todėl gretutinėje klasėje virš taško a funkcija f pagal kintamąjį b osciliuoja dažniu ξ/a. Pagal gretutinės klasės parametrą $c = b/a$ dažnis yra ξ.



17.1 pav.: Ekvivariantinės funkcijos $f(a,b) = e^{-i\xi b/a}\varphi(a)$, kai $\xi = 2\pi$, realioji dalis, pavaizduota kaip horizontalus poslinkis trijose pogrupio N gretutinėse klasėse virš taškų $a = \frac{1}{2}, 1, 2$. Stora linija yra pjūvis s, o atvaizdavimas q kiekvieną vertikalią gretutinę klasę perkelia į jos tašką bazėje $(0,\infty)$.

Tegul $g = (a_0, b_0)$. Tada galioja lygybė $g^{-1}(a,0) = (a/a_0,\ -b_0/a_0)$, o ekvivariantinis pavidalas (17.8) duoda

$$f(g^{-1}(a,0)) = \exp\Big(-i\xi\,\frac{-b_0/a_0}{a/a_0}\Big)\varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big) = e^{i\xi b_0/a}\,\varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big).$$

Daugiklis taške $x = (a,0)$ yra $(\rho(a/a_0)/\rho(a))^{1/2}$. Taip gauname dvi realizacijas:

$$(\Pi_\xi(a_0,b_0)\varphi)(a) = e^{i\xi b_0/a}\,\varphi(a/a_0) \qquad \text{erdvėje } L^2((0,\infty), da/a), \tag{17.9}$$

$$(\Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(a_0,b_0)\psi)(a) = a_0^{-1/2} e^{i\xi b_0/a}\,\psi(a/a_0) \qquad \text{erdvėje } L^2((0,\infty), da). \tag{17.10}$$

Unitarumą jau užtikrina normuotosios indukcijos teorema (Teorema 17.5). Dabar unitarumą ir įvaizdžio dėsnį patikrinsime tiesiogiai šiame modelyje.

Teiginys 17.9. *Tegul $g = (a_0, b_0)$, $g_j = (a_j, b_j)$ ir $\varphi, \psi \in C_c((0,\infty))$.*

(a) Galioja lygybė $\|\Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(g)\psi\| = \|\psi\|$, o atvaizdavimas $\psi \mapsto e^{i\xi b_0/a}\psi(a/a_0)$ dydį $\|\psi\|^2$ padaugina iš daugiklio a_0.

(b) Galioja lygybė $\Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(g_1)\Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(g_2) = \Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(g_1 g_2)$.

(c) Atvaizdavimą, apibrėžtą formule $(W\varphi)(a) = a^{-1/2}\varphi(a)$, galima pratęsti iki unitariojo atvaizdavimo $L^2(da/a) \to L^2(da)$, tenkinančio sąlygą $W\Pi_\xi(g) = \Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(g)W$.

Įrodymas. (a) Atlikę keitinį $a = a_0 u$, gauname

$$\int_0^\infty a_0^{-1} |\psi(a/a_0)|^2 \, da = \int_0^\infty |\psi(u)|^2 \, du.$$

Be daugiklio a_0^{-1} rezultatas lygus $a_0 \|\psi\|^2$.

(b) Kadangi $g_1 g_2 = (a_1 a_2,\ b_1 + a_1 b_2)$, turime

$$\begin{aligned}(\Pi_\xi^{\mathrm{Leb}}(g_1)\Pi_\xi^{\mathrm{Leb}}(g_2)\psi)(a) &= a_1^{-1/2} e^{i\xi b_1/a}\, (\Pi_\xi^{\mathrm{Leb}}(g_2)\psi)(a/a_1) \\ &= a_1^{-1/2} a_2^{-1/2}\, e^{i\xi b_1/a} e^{i\xi a_1 b_2/a}\, \psi\Big(\frac{a}{a_1 a_2}\Big) \\ &= (a_1 a_2)^{-1/2} e^{i\xi (b_1 + a_1 b_2)/a}\, \psi\Big(\frac{a}{a_1 a_2}\Big) = (\Pi_\xi^{\mathrm{Leb}}(g_1 g_2)\psi)(a).\end{aligned}$$

Kvadratinės šaknys susijungia, nes funkcija λ_{Leb} yra multiplikatyvi. Šis multiplikatyvumas yra kociklo tapatybė. Fazės susijungia į sandaugos $g_1 g_2$ antrąją komponentę. Šiame žingsnyje naudojamas ekvivariantiškumas.

(c) Turime $\int |a^{-1/2}\varphi|^2 \, da = \int |\varphi|^2 \, da/a$, o atvaizdavimo W atvirkštinis atvaizdavimas yra daugyba iš funkcijos $a^{1/2}$. Galiausiai galioja lygybės

$$(\Pi_\xi^{\mathrm{Leb}}(g) W \varphi)(a) = a_0^{-1/2} e^{i\xi b_0/a} \Big(\frac{a}{a_0}\Big)^{-1/2} \varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big) = a^{-1/2} e^{i\xi b_0/a} \varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big) = (W \Pi_\xi(g)\varphi)(a). \qquad \blacksquare$$

Pastebėkime, kad atvaizdavimas W yra daugyba iš funkcijos $(\rho_1/\rho_{\mathrm{Leb}})^{1/2}$.

17.5 Dažnio mastelio keitimų orbita

Postūmių atveju pirmoji realizacija (17.9) duoda lygybę $(\Pi_\xi(n_c)\varphi)(a) = e^{i(\xi/a)c}\varphi(a)$. Taigi taške $a \in G/N$ grupė N veikia charakteriu $\chi_{\xi/a}$. Tegul pogrupis A veikia grupės N charakterius taisykle $(t \cdot \chi)(n) = \chi(t^{-1} n t)$. Kai $t = (a, 0)$, gauname

$$t^{-1} n_c t = (a^{-1}, a^{-1}c)(a, 0) = (1, c/a), \qquad \text{todėl} \qquad t \cdot \chi_\xi = \chi_{\xi/a}.$$

Taigi taško aN charakteris yra $s(a) \cdot \chi_\xi$. Kai kintamasis a perbėga intervalą $(0, \infty)$, dažnis ξ/a įgyja visas orbitos $\mathbb{R}_{>0}\,\xi$ reikšmes. Yra trys orbitos: $(0, \infty)$, $(-\infty, 0)$ ir $\{0\}$.

> **Teiginys 17.10.** *Tegul $\kappa > 0$. Operatorius, apibrėžtas formule $(U\varphi)(a) = \varphi(a/\kappa)$, yra unitarusis erdvėje $L^2((0,\infty), da/a)$. Be to, lygybė $U\Pi_\xi(g) = \Pi_{\kappa\xi}(g)U$ galioja su visais $g \in G$.*

Įrodymas. Keitinys $a = \kappa u$ išsaugo matą da/a, todėl operatorius U yra izometrinis erdvėje $C_c((0,\infty))$. Jo atvirkštinis operatorius yra $\varphi \mapsto \varphi(\kappa\,\cdot)$. Kai $g = (a_0, b_0)$, turime

$$\begin{aligned}(U\Pi_\xi(g)\varphi)(a) &= (\Pi_\xi(g)\varphi)(a/\kappa) = e^{i\xi b_0 \kappa/a}\, \varphi\Big(\frac{a}{\kappa a_0}\Big), \\ (\Pi_{\kappa\xi}(g)U\varphi)(a) &= e^{i\kappa\xi b_0/a}\, (U\varphi)(a/a_0) = e^{i\kappa\xi b_0/a}\, \varphi\Big(\frac{a}{a_0\kappa}\Big).\end{aligned}$$

Abu reiškiniai sutampa poerdvyje $C_c((0,\infty))$, kuris yra tirštas erdvėje $L^2((0,\infty), da/a)$. Abiejose pusėse yra aprėžti operatoriai, todėl jie sutampa visoje erdvėje. $\blacksquare$

Taigi pagal Teiginį 17.10 įvaizdžio Π_ξ unitariojo ekvivalentumo klasė priklauso tik nuo dažnio ξ mastelio keitimų orbitos. Įvesime žymenis $\Pi_+ = \Pi_1$ ir $\Pi_- = \Pi_{-1}$. Pagal Uždavinį 17.5 trys įvaizdžiai Π_+, Π_- ir Π_0 yra poromis neekvivalentūs.

Įvaizdyje Π_0 turime $(\Pi_0(a_0, b_0)\varphi)(a) = \varphi(a/a_0)$. Todėl pogrupis N veikia trivialiai. Įvaizdis Π_0 yra grupės $(0, \infty) \cong G/N$ kairiojo reguliariojo įvaizdžio ir faktorinio atvaizdavimo $G \to G/N$ kompozicija.

Neredukuojamumo čia neįrodinėsime. Makio teorema, cituojama 25-ojoje paskaitoje, taikoma, kai $n = 1$ ir $H = (0, \infty)$. Iš jos išplaukia, kad įvaizdžiai Π_+ ir Π_- yra neredukuojami. Iš jos taip pat išplaukia, kad kartu su charakteriais $(a, b) \mapsto a^{is}$, kur $s \in \mathbb{R}$, jie sudaro visus neredukuojamuosius unitariuosius grupės G įvaizdžius unitariojo ekvivalentumo tikslumu. Įvaizdis Π_0 nėra neredukuojamas. Pagal Uždavinio 17.4(a) dalį jis yra postūmių įvaizdžio erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir atvaizdavimo $(a_0, b_0) \mapsto \log a_0$ kompozicija. Pagal 15-osios paskaitos teiginį apie baigtinės dimensijos invariantinius poerdvius jis neturi invariantinės tiesės. Abelio grupės $(0, \infty)$ neredukuojamasis unitarusis įvaizdis yra vienmatis pagal Šūro lemą, kurią cituoja 18-oji paskaita. Todėl įvaizdis Π_0 yra redukuojamas.

Fizikoje tai yra Vignerio klasifikacijos schema. Postūmiai veikia fazėmis, likusioji grupė perkelia dažnį orbita, o įvaizdis yra apibrėžtas šioje orbitoje. Puankarė grupei tai atliksime 25-ojoje paskaitoje. Šioje paskaitoje niekas nuo to nepriklauso.

Faktorerdvė be invariantinio Radono mato

Palyginimui suteikime mastelio keitimų pogrupiui $A = \{(a, 0) : a > 0\}$ Haro matą da/a ir indukuokime jo trivialųjį charakterį. Sutapatinkime faktorerdvę G/A su tiese, naudodami atvaizdavimą $(a, b)A \mapsto b$. Kairioji daugyba duoda įprastą afinųjį veikimą

$$(a_0, b_0) \cdot t = b_0 + a_0 t.$$

Lebego matas dt yra kvaziinvariantinis, tačiau tempimas jį padaugina iš daugiklio a_0. Kiekvienas invariantinis Radono matas būtų invariantinis postūmių atžvilgiu. Pagal Haro mato vienatinumą tiesėje $\mathbb{R}$ toks matas būtų mato dt kartotinis su pastoviu daugikliu. Tada iš invariantiškumo tempimų atžvilgiu išplaukia, kad šis daugiklis lygus nuliui.

Čia galioja lygybės $\Delta_A = 1$ ir $\Delta_G(a, 0) = 1/a$, todėl ro funkciją galima apibrėžti formule $\rho(a, b) = a$. Faktorinio integralo tapatybė gaunama tiesiogiai:

$$\int_G F(a, b)\rho(a, b)\,\frac{da\,db}{a^2} = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_0^\infty F(a, t)\,\frac{da}{a} \right) dt.$$

Kadangi $(1, t)(a, 0) = (a, t)$, o pogrupis A turi Haro matą da/a, vidinis integralas yra gretutinės klasės vidurkis $F^A((1, t)A)$, apibrėžtas formule (17.2), kai $H = A$. Pagal faktorinių matų teoremos (Teorema 17.3) vienatinumo dalį matas dt yra būtent šios ro funkcijos duodamas matas μ_ρ.

Kvadratinės šaknies daugiklis normuotajame veikime (17.7) tampa lygus $a_0^{-1/2}$, o indukuotasis veikimas išreiškiamas formule

$$(\Pi(a_0, b_0)u)(t) = a_0^{-1/2} u\left(\frac{t - b_0}{a_0} \right).$$

Kad patikrintume normą, įveskime kintamąjį $r = (t - b_0)/a_0$. Tada $dt = a_0\,dr$, todėl galioja lygybės

$$\|\Pi(a_0, b_0)u\|_2^2 = a_0^{-1} \int_{\mathbb{R}} |u((t - b_0)/a_0)|^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |u(r)|^2 dr.$$

Be kvadratinės šaknies normos kvadratas būtų padaugintas iš daugiklio a_0. Ši faktorerdvė parodo mato pataisą vieno kintamojo atveju. Ankstesniame postūmių pogrupio modelyje faktorerdvė buvo teigiamoji mastelio keitimų pustiesė. Joje egzistavo invariantinis faktorinis matas. Atsakymą lemia pogrupis, o ne vien apimančioji grupė. Uždavinyje 17.6 parodoma, kad šis įvaizdis yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui $\Pi_1 \oplus \Pi_{-1}$.

Savikontrolė

1. Grupėje $ax + b$ išveskite ro funkcijos transformacijos dėsnį, kai $H = A$, ir patikrinkite, kad funkcija, apibrėžta formule $\rho(a, b) = a$, jį tenkina. Ar galimas pasirinkimas $\rho = 1$?
   Atsakymas. Elementui $h = (t, 0)$ turime $\Delta_A(h)/\Delta_G(h) = 1/(1/t) = t$, todėl reikia, kad galiotų lygybė $\rho(xh) = t\rho(x)$. Kadangi $(a, b)(t, 0) = (at, b)$, funkcija, apibrėžta formule $\rho(a, b) = a$, tinka. Pasirinkimas $\rho = 1$ netinka, kai $t \neq 1$.
2. Ar funkcija, apibrėžta formule $\rho(a, b) = a + b^2$, yra ro funkcija, kai $H = N$?
   Atsakymas. Ne. Pogrupio N ro funkcija turi tenkinti sąlygą $\rho(xn) = \rho(x)$. Tačiau šiai funkcijai gauname $\rho((a, 0)n_1) = \rho(a, a) = a + a^2 \neq a = \rho(a, 0)$.
3. Užrašykite operatorių $\Pi_\xi(g)^*$, kai $g = (a_0, b_0)$, pirmojoje realizacijoje (17.9).
   Atsakymas. Kadangi įvaizdis Π_ξ yra unitarusis, jungtinis operatorius yra $\Pi_\xi(g^{-1})$, kur $g^{-1} = (a_0^{-1}, -a_0^{-1}b_0)$. Todėl jungtinis operatorius išreiškiamas formule

   $$(\Pi_\xi(g)^*\varphi)(a) = e^{-i\xi b_0/(a_0 a)}\varphi(a_0 a).$$

   Šią formulę patvirtina keitinys $a = a_0 u$ skaliarinėje sandaugoje $\langle \Pi_\xi(g)\varphi, \psi\rangle$.

Santrauka

Ro funkcija duoda kvaziinvariantinį matą μ_ρ faktorerdvėje G/H. Šio mato postūmio daugiklis, apibrėžtas formule $\lambda(g, xH) = \rho(gx)/\rho(x)$, yra kociklas. Veikimas $f \mapsto \lambda(g^{-1}, \cdot)^{1/2} f(g^{-1}\,\cdot)$ ekvivariantinių funkcijų erdvėje yra unitarusis, nes kociklas panaikina mato pokytį. Tegul Π_ξ yra grupės $ax + b$ įvaizdis, indukuotas iš charakterio χ_ξ, apibrėžto postūmių pogrupyje N. Tada taškas $a \in G/N$ turi dažnį ξ/a. Įvaizdžio Π_ξ unitariojo ekvivalentumo klasė priklauso tik nuo dažnio ξ mastelio keitimų orbitos. Pagal Makio teoremą, cituojamą 25-ojoje paskaitoje, įvaizdžiai Π_+ ir Π_- yra neredukuojami, o įvaizdis Π_0 nėra neredukuojamas.

Literatūra

Folland, Abstract Harmonic Analysis, 2 skyrius „Measures on Homogeneous Spaces“: faktoriniai matai ir ro funkcijos bendro uždarojo pogrupio atveju. Kirillov, Elements, 9.1 skyrelis: kvaziinvariantiniai matai vienalytėse erdvėse. Kirillov, Elements, 13 skyrelis: indukuotųjų

įvaizdžių modeliai. A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups* (2001), VII.1–VII.2 skyreliai: įvaizdžių, indukuotų iš tiesinės jungios reduktyviosios grupės parabolinio pogrupio, realizacijos.

Paskaita 18

Heizenbergo grupė ir Veilio sąryšiai

Tikslai. *Heizenbergo grupė yra paprasčiausia nekomutatyvioji nilpotentinė Lie grupė. Šioje paskaitoje iš postūmių ir moduliacijų sukonstruosime jos Šrėdingerio įvaizdį erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir įrodysime Veilio sąryšius. Jie aprašo, kaip postūmiai ir moduliacijos komutuoja fazės daugiklio tikslumu. Šiame įvaizdyje komutatorius $[X, Y] = Z$ virsta kvantinės mechanikos komutavimo sąryšiu $[Q, P] = i\hbar$. Toliau nagrinėsime Stouno–fon Noimano teoremą. Pagal šią teoremą fiksuotas nenulinis centrinis charakteris unitariojo ekvivalentumo tikslumu nusako vieną neredukuojamą unitarųjį įvaizdį. Centrinis charakteris nurodo skaliarus, kuriais veikia grupės centras. Šrėdingerio įvaizdžio neredukuojamumą įrodysime naudodami išreikštinį pirmojo rango operatorių, o vienatinumą cituosime. Kai centrinis charakteris yra lygus nuliui, neredukuojamieji įvaizdžiai yra vienmačiai charakteriai, o postūmių įvaizdyje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ nėra nė vieno iš jų.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti Heizenbergo grupėje sandaugas, atvirkštinius elementus, komutatorius, eksponentinį atvaizdavimą ir jungtinį įvaizdį Ad.
- Įrodyti, kad Šrėdingerio formulė apibrėžia stipriai tolydų unitarųjį įvaizdį, tenkinantį Veilio sąryšius, ir apskaičiuoti jo išvestinę poerdvyje $C_c^\infty(\mathbb{R})$.
- Suformuluoti Stouno–fon Noimano teoremą su jos prielaidomis ir iš Veilio poros sudaryti įvaizdį, kuriam ši teorema taikoma.
- Apskaičiuoti Gauso matricinį koeficientą, juo remiantis įrodyti, kad įvaizdis Π_λ yra neredukuojamas, kai $\lambda \neq 0$, ir supriešinti nenulinio ir nulinio centrinio charakterio atvejus.

18.1 Grupės dėsnis

Apibrėžimas 18.1. *Heizenbergo grupė H* yra aibė, kurią sudaro realiosios matricos

$$(a, b, c) := \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad a, b, c \in \mathbb{R},$$

su matricų daugyba.

Sudauginę matricas, gauname

$$(a, b, c)(a', b', c') = (a + a',\ b + b',\ c + c' + ab'). \tag{18.1}$$

Neutralusis elementas yra $(0,0,0)$, o atvirkštinis elementas išreiškiamas formule

$$(a,b,c)^{-1} = (-a,-b,-c+ab).$$

Tai matyti iš sandaugos $(a,b,c)(-a,-b,-c+ab)$ trečiosios koordinatės: ji lygi $c-c+ab-ab=0$. Grupė H yra uždarasis grupės $\mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ pogrupis, todėl pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą ji yra Lie grupė. Koordinatės sutapatina grupę H su erdve $\mathbb{R}^3$, todėl grupė H yra jungi ir vienajungė.

Sukeitus daugiklius grupės dėsnyje (18.1), pasikeičia tik paskutinė koordinatė. Elementams $g=(a,b,c)$ ir $g'=(a',b',c')$ turime

$$gg' = (0,0,ab'-a'b)\,g'g. \tag{18.2}$$

Pagal grupės dėsnį (18.1) kiekvienas elementas $(0,0,d)$ komutuoja su visais grupės elementais. Todėl iš komutavimo formulės (18.2) matyti, kad elementas g yra centrinis tada ir tik tada, kai $ab'-a'b=0$ visiems a',b', t.y. kai $a=b=0$. Taigi centras yra

$$Z(H) = \{(0,0,c) : c\in\mathbb{R}\} \cong \mathbb{R},$$

o atvaizdavimas $(a,b,c)Z(H)\mapsto(a,b)$ sutapatina faktorgrupę $H/Z(H)$ su erdve $\mathbb{R}^2$.

Lie algebra $\mathfrak{h}$ turi bazę $X=E_{12}$, $Y=E_{23}$, $Z=E_{13}$, kur E_{ij} yra matriciniai vienetai. Šių bazės elementų komutatoriai yra

$$[X,Y]=Z, \qquad [X,Z]=[Y,Z]=0.$$

Tegul elementas $W=xX+yY+zZ$. Sudauginę matricinius vienetus, gauname $W^2=xyZ$ ir $W^3=0$. Todėl elemento W eksponentinė eilutė nutrūksta po kvadratinio nario:

$$\exp(xX+yY+zZ) = I+W+\tfrac12 W^2 = \big(x,\ y,\ z+\tfrac12 xy\big). \tag{18.3}$$

Taigi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{h}\to H$ yra difeomorfizmas, kurio atvirkštinis atvaizdavimas yra $(a,b,c)\mapsto aX+bY+(c-\frac12 ab)Z$. Atskiru atveju galioja lygybės $\exp(sX)=(s,0,0)$, $\exp(sY)=(0,s,0)$ ir $\exp(sZ)=(0,0,s)$.

Jungtinio veikimo skaičiavimą iliustruosime vienu būdingu žingsniu. Pagal grupės dėsnį (18.1) turime

$$g\exp(sX)g^{-1} = (a+s,b,c)(-a,-b,-c+ab) = (s,0,-sb) = \exp\big(s(X-bZ)\big).$$

Taigi $\mathrm{Ad}(g)X = X-bZ$. Lygiai taip pat gauname $\mathrm{Ad}(g)Y = Y+aZ$ ir $\mathrm{Ad}(g)Z=Z$. Surikiuotoje bazėje (X,Y,Z) turime

$$D_{\mathrm{Ad}}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -b & a & 1\end{pmatrix}, \qquad \det D_{\mathrm{Ad}}(g) = 1.$$

Taikydami 16-osios paskaitos susitarimą $\Delta(g)=|\det\mathrm{Ad}(g)|^{-1}$, gauname, kad grupė H yra unimodulinė. Tai matyti ir tiesiogiai. Kairieji ir dešinieji postūmiai yra erdvės $\mathbb{R}^3$ polinominiai atvaizdavimai, kurių Jakobio matricos yra trikampės ir įstrižainėje turi vienetus. Todėl Lebego matas $da\,db\,dc$ yra ir kairysis, ir dešinysis Haro matas.

18.2 Šrėdingerio įvaizdis

Nagrinėsime erdvę $L^2(\mathbb{R})$ su skaliarine sandauga $\langle f, h\rangle = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(t)}\, h(t)\, dt$. Naudosime integravimo taisykles, suformuluotas 16-osios paskaitos pabaigoje, jos skyrelyje apie lokaliai kompaktines grupes: erdvės $L^2(\mathbb{R})$ sutapatinimą su funkcijų klasėmis, Tonelio ir Fubinio teoremas, mažoruojamojo konvergavimo teoremą ir kintamųjų keitimą. Norėdami diferencijuoti po integralo ženklu, mažoruojamojo konvergavimo teoremą taikome skirtuminiams santykiams, naudodami bendrą integruojamą išvestinės įvertį. Taip pat naudosime du standartinius faktus. Pirma, Lebego integralai nekinta atlikus keitinį $t \mapsto t + a$. Antra, tolydžiųjų kompaktinę atramą turinčių funkcijų erdvė $C_c(\mathbb{R})$ ir jos glodžiųjų funkcijų poerdvis $C_c^\infty(\mathbb{R})$ yra tiršti erdvėje $L^2(\mathbb{R})$.

Apibrėžimas 18.2. Fiksuokime $\lambda \in \mathbb{R}$. Kai $g = (a, b, c) \in H$ ir $f \in L^2(\mathbb{R})$, *Šrėdingerio operatorius* $\Pi_\lambda(g)$ apibrėžiamas formule

$$(\Pi_\lambda(a, b, c) f)(t) = e^{i\lambda(c+bt)} f(t + a). \tag{18.4}$$

Postūmiai $U(a)$ ir *moduliacijos* $V_\lambda(b)$ apibrėžiami formulėmis

$$(U(a)f)(t) = f(t + a), \qquad (V_\lambda(b)f)(t) = e^{i\lambda bt} f(t).$$

Pagal apibrėžimus Šrėdingerio operatoriai išsiskaido į sandaugą

$$\Pi_\lambda(a, b, c) = e^{i\lambda c}\, V_\lambda(b)\, U(a).$$

Tai atitinka grupės elementų išskaidymą

$$(a, b, c) = (0, 0, c)(0, b, 0)(a, 0, 0).$$

Mūsų operatorius $U(a)$ pagal 15-osios paskaitos susitarimą yra postūmis per $-a$, o $V_1(b)$ yra Uždavinio 15.5 moduliacija $M(b)$. Todėl, kai $\lambda = 1$, toliau pateikti Veilio sąryšiai yra Uždavinio 15.5(d) dalies sąryšis.

Teiginys 18.3. *Kiekvienam $\lambda \in \mathbb{R}$ atvaizdavimas Π_λ yra stipriai tolydus grupės H unitarusis įvaizdis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir tenkina lygybę $\Pi_\lambda(0, 0, c) = e^{i\lambda c} I$. Galioja* Veilio sąryšiai*:*

$$U(a)V_\lambda(b) = e^{i\lambda ab} V_\lambda(b)U(a), \qquad a, b \in \mathbb{R}. \tag{18.5}$$

Įrodymas. Homomorfizmas. Tegul $g = (a, b, c)$ ir $g' = (a', b', c')$. Du kartus pritaikę apibrėžiančiąją formulę (18.4), gauname

$$\begin{aligned}(\Pi_\lambda(g)\Pi_\lambda(g')f)(t) &= e^{i\lambda(c+bt)}(\Pi_\lambda(g')f)(t + a)\\ &= e^{i\lambda(c+bt)} e^{i\lambda(c'+b'(t+a))} f(t + a + a')\\ &= e^{i\lambda(c+c'+ab'+(b+b')t)} f(t + a + a').\end{aligned}$$

Pagal grupės dėsnį (18.1) tai yra $(\Pi_\lambda(gg')f)(t)$. Be to, $\Pi_\lambda(0, 0, 0) = I$.

Unitarumas. Kadangi $|e^{i\lambda(c+bt)}| = 1$, iš integralo invariantiškumo postūmių atžvilgiu gauname $\|\Pi_\lambda(g)f\|^2 = \int |f(t + a)|^2 dt = \|f\|^2$. Kiekvienas operatorius $\Pi_\lambda(g)$ yra izometrija, kurios atvirkštinis operatorius yra $\Pi_\lambda(g^{-1})$, todėl šis operatorius yra unitarusis.

Centras ir Veilio sąryšiai. Pirmasis teiginys yra apibrėžiančioji formulė (18.4), kai $a = b = 0$. Antrąjį teiginį rodo skaičiavimas

$$(U(a)V_\lambda(b)f)(t) = (V_\lambda(b)f)(t+a) = e^{i\lambda b(t+a)}f(t+a) = e^{i\lambda ab}(V_\lambda(b)U(a)f)(t).$$

Stiprusis tolydumas. Tai yra vienintelis analizinis žingsnis. Pirmiausia tegul funkcija $f \in C_c(\mathbb{R})$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$ ribų ir tegul $|a| \le 1$. Tada funkcija $\Pi_\lambda(g)f - f$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų. Šiame intervale iš nelygybės $|e^{i\theta} - 1| \le |\theta|$ gauname

$$|(\Pi_\lambda(g)f)(t) - f(t)| \le |\lambda|\big(|c| + (R+1)|b|\big)\|f\|_\infty + \omega_f(|a|),$$

kur pažymėjome $\omega_f(\delta) = \sup\{|f(t+s) - f(t)| : t \in \mathbb{R},\ |s| \le \delta\}$. Iš funkcijos f tolygiojo tolydumo gauname, kad $\omega_f(\delta) \to 0$, kai $\delta \to 0$. Integruodami kvadratą intervale, kurio ilgis yra $2R+2$, gauname

$$\|\Pi_\lambda(g)f - f\| \le (2R+2)^{1/2}\Big(|\lambda|\big(|c| + (R+1)|b|\big)\|f\|_\infty + \omega_f(|a|)\Big) \longrightarrow 0 \quad (g \to e).$$

Dabar tegul $f \in L^2(\mathbb{R})$ ir $\varepsilon > 0$. Pasirinkime funkciją $h \in C_c(\mathbb{R})$, kuriai $\|f - h\| < \varepsilon$. Kadangi operatorius $\Pi_\lambda(g)$ yra unitarusis, gauname

$$\|\Pi_\lambda(g)f - f\| \le \|\Pi_\lambda(g)(f-h)\| + \|\Pi_\lambda(g)h - h\| + \|h - f\| < 2\varepsilon + \|\Pi_\lambda(g)h - h\|.$$

Todėl nelygybė $\limsup_{g\to e}\|\Pi_\lambda(g)f - f\| \le 2\varepsilon$ galioja kiekvienam ε. Galiausiai galioja lygybė $\|\Pi_\lambda(g)f - \Pi_\lambda(g_0)f\| = \|\Pi_\lambda(g_0^{-1}g)f - f\|$, o $g_0^{-1}g \to e$, kai $g \to g_0$. ∎

Sujungę komutavimo formulę (18.2) su centro skaliariniu veikimu iš Teiginio 18.3, gauname

$$\Pi_\lambda(g)\Pi_\lambda(g') = e^{i\lambda(ab' - a'b)}\,\Pi_\lambda(g')\Pi_\lambda(g).$$


Kai $\lambda \neq 0$, šie operatoriai nebūtinai komutuoja. Kai $\lambda = 0$, jie komutuoja.

Tai atsako į klausimą, kurį paliko 13-osios paskaitos Heizenbergo daugiklio pavyzdys. Ten $\omega(x,y) = x_1y_2 - x_2y_1$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ ir $c(x,y) = e^{i\omega(x,y)/2}$. Kai $x \in \mathbb{R}^2$, apibrėžkime $U_x = \Pi_1(\exp(x_1X + x_2Y))$. Eksponentinė formulė (18.3) ir grupės dėsnis duoda

$$U_xU_y = e^{i\omega(x,y)/2}\,U_{x+y}.$$

Taigi daugiklis c yra realizuotas erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Pagal Uždavinio 18.4(d) dalį įvaizdis Π_1 neturi nenulinio baigtinės dimensijos invariantinio poerdvio, kaip ir reikalauja tas pavyzdys. Uždavinio 13.5 plėtinys $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{T}$ yra faktorgrupė H/Γ, kur $\Gamma = \{(0,0,2\pi k) : k \in \mathbb{Z}\}$. Sutapatinimą duoda atvaizdavimas $(a,b,c) \mapsto ((a,b), e^{i(c-ab/2)})$.

Rodiklis $ab' - a'b$ yra orientuotas plotas plokštumoje $H/Z(H)$, kaip rodo 18.1 pav. Padauginkime iš dešinės elementu $(a,0,0)$, o paskui elementu $(0,b,0)$. Šis kelias baigiasi taške (a,b,ab). Kitas kelias baigiasi taške $(a,b,0)$. Centrinės koordinatės skiriasi stačiakampio plotu ab, ir tai yra Veilio sąryšių fazė. Panašiai keturi žingsniai g, g', g^{-1}, g'^{-1} sudaro uždarą kilpą plokštumoje, ir pagal formulę (18.2) jie baigiasi taške $(0,0,ab' - a'b)$. Kilpa einama prieš laikrodžio rodyklę, kai $ab' - a'b > 0$. Paveiksle užrašytos operatorių sandaugos įvardija šias grupės sandaugas. Operatoriai vektorių veikia iš dešinės, todėl veikimo tvarka yra atvirkštinė kelio tvarkai.



18.1 pav.: Keliai plokštumoje $H/Z(H)$, kurių kiekvienas žingsnis yra daugyba iš dešinės. Pirmoje dalyje du keliai jungia elementą e su tuo pačiu plokštumos tašku, o tarp jų yra stačiakampis. Antroje dalyje komutatoriaus kilpa apima lygiagretainį, nutiestą ant vektorių (a, b) ir (a', b'). Jo orientuotas plotas yra $ab' - a'b$.

Pastaba 18.4. Nagrinėkime uždarąjį Abelio normalųjį pogrupį $A = \{(0, b, c)\}$ ir jo charakterį, apibrėžtą formule $\chi_\lambda(0, b, c) = e^{i\lambda c}$. Uždavinyje 18.5 parodoma, kad įvaizdis, unitariai indukuotas iš charakterio χ_λ taip, kaip 17-ojoje paskaitoje, yra ekvivalentus įvaizdžiui Π_λ.

Toliau diferencijuosime. Įveskime žymenį $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R})$, o simboliu tf žymėsime funkciją $t \mapsto tf(t)$.

Teiginys 18.5. *Kiekvienas operatorius $\Pi_\lambda(g)$ atvaizduoja poerdvį $\mathcal{D}$ į poerdvį $\mathcal{D}$. Kai $f \in \mathcal{D}$ ir $W \in \{X, Y, Z\}$, riba*

$$d\Pi_\lambda(W)f = \lim_{s\to 0} s^{-1}(\Pi_\lambda(\exp sW)f - f)$$

egzistuoja erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Be to, galioja lygybės

$$d\Pi_\lambda(X)f = f', \qquad d\Pi_\lambda(Y)f = i\lambda tf, \qquad d\Pi_\lambda(Z)f = i\lambda f.$$

Poerdvyje $\mathcal{D}$ galioja lygybė $[d\Pi_\lambda(X), d\Pi_\lambda(Y)] = d\Pi_\lambda(Z) = d\Pi_\lambda([X, Y])$.

Įrodymas. Postūmis ir daugyba iš glodžiosios funkcijos $e^{i\lambda(c+bt)}$ išsaugo glodumą ir kompaktinę atramą. Tegul funkcija f yra lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$ ribų ir tegul $0 < |s| \le 1$. Elementui X pagal Teiloro teoremą gauname

$$\left|\frac{f(t+s) - f(t)}{s} - f'(t)\right| \le \tfrac{1}{2}|s|\,\|f''\|_\infty,$$

o kairioji pusė yra lygi nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų. Kairiosios pusės L^2 norma neviršija dydžio, kuris artėja prie nulio: $(2R+2)^{1/2}\frac{1}{2}|s|\|f''\|_\infty \to 0$. Elementui Y iš įverčio $|e^{i\theta} - 1 - i\theta| \le \theta^2/2$ gauname

$$\left|\frac{e^{i\lambda st} - 1}{s} - i\lambda t\right| |f(t)| \le \tfrac{1}{2}\lambda^2|s|R^2|f(t)|,$$

o kairiosios pusės L^2 norma artėja prie 0. Elementui Z turime $(e^{i\lambda s} - 1)/s \to i\lambda$. Galiausiai apskaičiuojame komutatorių:

$$[d\Pi_\lambda(X), d\Pi_\lambda(Y)]f = (i\lambda tf)' - i\lambda tf' = i\lambda f = d\Pi_\lambda(Z)f. \qquad \blacksquare$$

Pastaba 18.6. Kadangi įvaizdis Π_λ yra stipriai tolydus (Teiginys 18.3), šeima $s \mapsto \Pi_\lambda(\exp sW)$ yra stipriai tolydi vienparametrė unitarioji grupė. Jos generatorius B_W apibrėžiamas taip, kaip 15-ojoje paskaitoje. Jo apibrėžimo sritį sudaro lygiai tie vektoriai f, kuriems atvaizdavimas $s \mapsto \Pi_\lambda(\exp sW)f$ yra diferencijuojamas taške $s = 0$ erdvės $L^2(\mathbb{R})$ normos prasme. Stouno teorema (15-oji paskaita) rodo, kad generatorius B_W yra antisavijungis. Todėl fizikinis generatorius $A_W = iB_W$ yra savijungis ir tenkina lygybę $\Pi_\lambda(\exp sW) = \exp(-isA_W)$. Iš Teiginio 18.5 išvestinių formulių matyti, kad poerdvis $\mathcal{D}$ yra operatoriaus A_W apibrėžimo srities poaibis ir kad poerdvyje $\mathcal{D}$ galioja lygybės

$$A_X f = if', \qquad A_Y f = -\lambda t f, \qquad A_Z f = -\lambda f.$$

Kadangi poerdvis $\mathcal{D}$ yra tirštas ir invariantinis kiekvieno operatoriaus $\Pi_\lambda(\exp sW)$ atžvilgiu, 15-osios paskaitos Stouno teoremos tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijus rodo, kad generatorius B_W yra operatoriaus $d\Pi_\lambda(W)$, apibrėžto poerdvyje $\mathcal{D}$, uždarinys.

Kvantinėje mechanikoje tiesėje judančios dalelės būsenų erdvė yra $L^2(\mathbb{R})$. Imkime $\lambda = 1/\hbar$, kur $\hbar > 0$ yra redukuotoji Planko konstanta. Apibrėžkime impulso operatorių $P = -\hbar A_X$ ir koordinatės operatorių $Q = -\hbar A_Y$. Minuso ženklas operatoriuje P atsiranda todėl, kad $U(a)$ yra postūmis per $-a$. Poerdvyje $\mathcal{D}$ turime $Qf = tf$, $Pf = -i\hbar f'$ ir $[Q, P] = i\hbar$.

Šiais operatoriais postūmiai ir moduliacijos išreiškiami taip: $U(a) = \exp(iaP/\hbar)$ ir $V_\lambda(b) = \exp(ibQ/\hbar)$. Todėl Veilio sąryšiai (18.5) yra komutavimo sąryšio aprėžtoji, eksponentinė forma.

Komutavimo sąryšio niekur nenaudojame kaip prielaidos. Neaprėžtųjų operatorių komutavimo sąryšis tirštoje apibrėžimo srityje pats savaime nereiškia, kad galioja Veilio sąryšiai. Pavyzdžiui, erdvėje $L^2(0,1)$ imkime $Qf = tf$ ir $P = -i\hbar\, d/dt$ su periodinėmis kraštinėmis sąlygomis. Abu operatoriai yra savijungiai, ir lygybė $[Q, P] = i\hbar$ galioja poerdvyje $C_c^\infty(0,1)$. Čia $\exp(iP/\hbar) = I$, nes operatoriaus P tikriniai vektoriai yra $e^{2\pi int}$, o jų tikrinės vertės yra $2\pi\hbar n$. Tada Veilio sąryšis, kai $a = 1$, duotų lygybę $I = e^{ib/\hbar}I$ visiems $b \in \mathbb{R}$, o tai neteisinga (Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, 14.1 skyrelis). Uždavinyje 18.3 parodoma, kad jokie aprėžtieji operatoriai nenulinėje Hilberto erdvėje netenkina lygybės $[Q, P] = i\hbar I$.

18.3 Stouno–fon Noimano teorema

Apibrėžimas 18.7. Unitarusis įvaizdis ρ, kuriuo grupė H veikia Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, turi *centrinį charakterį* $\lambda \in \mathbb{R}$, jei $\rho(0,0,c) = e^{i\lambda c}I$ visiems $c \in \mathbb{R}$.

Pagal Teiginio 18.3 dalį apie centrą įvaizdis Π_λ turi centrinį charakterį λ. Dabar tegul ρ yra neredukuojamas grupės H unitarusis įvaizdis. Pagal Šūro lemą unitariesiems įvaizdžiams (Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 2004, V priedas) kiekvienas centrinis operatorius $\rho(0,0,c)$ yra skaliarinis. Šie skaliarai sudaro tolydų homomorfizmą $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$, todėl yra pavidalo $e^{i\lambda c}$. Taigi kiekvienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis turi centrinį charakterį. Redukuojamieji įvaizdžiai jo gali neturėti. Pavyzdžiui, jo neturi įvaizdis $\Pi_1 \oplus \Pi_2$.

Lema 18.8. *Tegul σ ir τ yra stipriai tolydžios vienparametrės unitariosios grupės Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$ ir tegul $\lambda \in \mathbb{R}$. Tarkime, kad $\sigma(a)\tau(b) = e^{i\lambda ab}\tau(b)\sigma(a)$ visiems $a, b \in \mathbb{R}$. Tada formulė $\rho(a,b,c) = e^{i\lambda c}\tau(b)\sigma(a)$ apibrėžia stipriai tolydų unitarųjį įvaizdį ρ, kuriuo grupė H veikia erdvėje $\mathcal{H}$ ir kurio centrinis charakteris yra λ.*

Įrodymas. Perkelkime operatorių $\sigma(a)$ už operatoriaus $\tau(b')$, pasinaudodami prielaida:

$$\rho(g)\rho(g') = e^{i\lambda(c+c')}\tau(b)\sigma(a)\tau(b')\sigma(a') = e^{i\lambda(c+c'+ab')}\tau(b+b')\sigma(a+a') = \rho(gg').$$

Kiekvienas operatorius $\rho(g)$ yra unitarusis. Be to, $\rho(0,0,c) = e^{i\lambda c}I$. Tolydumui taške (a_0, b_0, c_0) įrodyti paimkime vektorių $f \in \mathcal{H}$ ir apibrėžkime vektorių $h = \sigma(a_0)f$. Tada gauname

$$\|\tau(b)\sigma(a)f - \tau(b_0)\sigma(a_0)f\| \le \|\sigma(a)f - \sigma(a_0)f\| + \|\tau(b)h - \tau(b_0)h\| \to 0,$$

o skaliarinis daugiklis $e^{i\lambda c}$ yra tolydus. ∎

Porą (σ, τ), tenkinančią Lemos 18.8 prielaidas, vadinsime *Veilio pora* su parametru λ. Pagal Veilio sąryšius (18.5) ir stiprųjį tolydumą iš Teiginio 18.3 postūmiai ir moduliacijos sudaro Veilio porą (U, V_λ) su parametru λ. Dvi Veilio poros yra *ekvivalenčios*, kai vienas ir tas pats unitarusis operatorius iš pirmosios erdvės į antrąją jungtinimu perveda kiekvieną pirmosios poros grupę į atitinkamą antrosios poros grupę.

Teorema 18.9 (Stouno–fon Noimano). *Fiksuokime $\lambda \neq 0$.*

(a) Šrėdingerio įvaizdis Π_λ yra neredukuojamas.

(b) Tegul ρ yra stipriai tolydus grupės H unitarusis įvaizdis, veikiantis nenulinėje separabiliojoje Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, ir tegul šio įvaizdžio centrinis charakteris yra λ. Tada erdvė $\mathcal{H}$ yra tarpusavyje ortogonalių uždarųjų ρ-invariantinių poerdvių Hilberto tiesioginė suma. Kiekviename dėmenyje įvaizdis ρ yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui Π_λ.

Dalį (a) įrodysime Skyrelyje 18.4, atlikę branduolio skaičiavimą, kuriam ši teorema nenaudojama. Dalį (b), t.y. vienatinumo teiginį, cituojame iš šaltinio: Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 2 skyrius. Dalies (a) įrodymas dalies (b) neįrodo.

Neredukuojamojo grupės H įvaizdžio Hilberto erdvė savaime yra separabilioji. Dėl neredukuojamumo kiekvienas nenulinis vektorius yra ciklinis. Dėl stipriojo tolydumo tokio vektoriaus orbitos uždarąjį tiesinį apvalkalą jau generuoja to vektoriaus orbita, gaunama veikiant skaitaus tiršto grupės H poaibio elementais. Šis uždarasis tiesinis apvalkalas sutampa su visa erdve ir yra separabilusis.

Iš Stouno–fon Noimano teoremos (Teorema 18.9) vienatinumo teiginio išplaukia šios išvados.

- Kiekvienas neredukuojamas grupės H unitarusis įvaizdis, kurio centrinis charakteris yra $\lambda \neq 0$, yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui Π_λ.
- Pagal lemą apie Veilio poras (Lema 18.8) kiekviena Veilio pora su parametru $\lambda \neq 0$ nenulinėje separabiliojoje erdvėje yra ekvivalenti poros (U, V_λ) kopijų tiesioginei sumai. Atskiru atveju kiekviena Veilio pora su parametru $1/\hbar$ nenulinėje separabiliojoje erdvėje yra unitariai ekvivalenti poros $(\exp(iaP/\hbar), \exp(ibQ/\hbar))$ kopijų tiesioginei sumai.
- Skirtingos skaičiaus λ reikšmės duoda neekvivalenčius įvaizdžius Π_λ (apie neekvivalentumą žr. Uždavinio 18.6(c) dalį).

Kvantinėje mechanikoje pirmosios dvi išvados reiškia, kad kiekviena neredukuojama Veilio pora su parametru $1/\hbar$ yra Šrėdingerio pora. Tai tikslus teiginio, kad matricinė mechanika ir banginė mechanika sutampa, pavidalas.

Standartinis (b) dalies įrodymas, kilęs iš fon Noimano darbų, remiasi vienu esminiu žingsniu. Tegul ρ yra toks įvaizdis, kaip Teoremos 18.9 vienatinumo teiginyje (b). Kai $f, h \in \mathcal{H}$, nagrinėkime pusantratiesinę formą, apibrėžtą formule

$$B(f,h) = \frac{|\lambda|}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(a^2+\lambda^2 b^2)/4} \left\langle f, \rho(\exp(aX+bY))h \right\rangle da\, db.$$

Gauso svorio integralas yra lygus $4\pi/|\lambda|$, todėl galioja įvertis $|B(f,h)| \le 2\|f\|\|h\|$. Taigi pagal Rysso atvaizdavimo teoremą aprėžtosioms pusantratiesinėms formoms egzistuoja aprėžtasis operatorius E erdvėje $\mathcal{H}$, tenkinantis sąlygas $\|E\| \le 2$ ir $B(f,h) = \langle f, Eh\rangle$ visiems $f, h \in \mathcal{H}$.

Tas standartinis įrodymas, remdamasis Veilio sąryšiais ir stipriuoju tolydumu, parodo, kad operatorius E yra nenulinė ortogonalioji projekcija. Tada kiekvienas vienetinis vektorius $v \in E\mathcal{H}$ generuoja vieną įvaizdžio Π_λ kopiją. Toje kopijoje vektorius v atitinka kito skyrelio (Skyrelis 18.4) Gauso funkciją. Šis svoris yra minėtosios Gauso funkcijos matricinis koeficientas, kurį duoda formulė (18.6), kai $g = \exp(aX + bY)$.

18.4 Gauso matriciniai koeficientai ir nulinis centrinis charakteris

Nagrinėkime funkciją, apibrėžtą formule $\varphi(t) = \pi^{-1/4} e^{-t^2/2}$. Iš lygybės $\int e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ gauname $\|\varphi\| = 1$. Apskaičiuosime koeficientą $\langle \varphi, \Pi_\lambda(g)\varphi\rangle$, kai $g = (a,b,c)$. Naudosime analizės faktą

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-(t+w)^2} dt = \sqrt{\pi} \qquad (w \in \mathbb{C}).$$

Kai skaičius w yra realusis, ši lygybė gaunama atlikus postūmį. Užrašykime $w = u + iv$. Pointegralinės funkcijos išvestinė pagal v yra $i\frac{d}{dt} e^{-(t+w)^2}$, o šios išvestinės integralas yra lygus 0. Diferencijavimą po integralo ženklu, kai $|v| \le V$, pagrindžia bendras integruojamas išvestinės įvertis $2(|t+u|+V)e^{V^2} e^{-(t+u)^2}$. Todėl integralas nepriklauso nuo v.

Pasinaudoję apibrėžiančiąja formule (18.4) ir tuo, kad funkcija φ yra realioji, gauname

$$\langle \varphi, \Pi_\lambda(g)\varphi\rangle = \pi^{-1/2} e^{i\lambda c} \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2/2 - (t+a)^2/2 + i\lambda b t}\, dt.$$

Išskirkime pilnąjį kvadratą, pažymėję $w = \frac{1}{2}(a - i\lambda b)$:

$$-\tfrac{t^2}{2} - \tfrac{(t+a)^2}{2} + i\lambda b t = -t^2 - (a - i\lambda b)t - \tfrac{a^2}{2} = -(t+w)^2 + w^2 - \tfrac{a^2}{2},$$

$$w^2 - \tfrac{a^2}{2} = \tfrac{1}{4}\left(a^2 - 2i\lambda ab - \lambda^2 b^2\right) - \tfrac{a^2}{2} = -\tfrac{1}{4}\left(a^2 + \lambda^2 b^2\right) - \tfrac{i\lambda ab}{2}.$$

Integralas yra lygus skaičiui $\sqrt{\pi}$, padaugintam iš reiškinio $e^{w^2 - a^2/2}$. Todėl matricinis koeficientas išreiškiamas formule

$$\langle \varphi, \Pi_\lambda(a,b,c)\varphi\rangle = e^{i\lambda(c - ab/2)}\, e^{-(a^2+\lambda^2 b^2)/4}. \tag{18.6}$$

Atliksime du patikrinimus. Pirma, taške $g = e$ koeficiento reikšmė yra $1 = \|\varphi\|^2$. Antra, pakeitus elementą g elementu $g^{-1} = (-a, -b, -c + ab)$, reikšmė pereina į kompleksiškai jungtinę, kaip ir reikalauja unitarumas.

Pagal eksponentinę formulę (18.3) dydis $c - ab/2$ yra Z-koordinatė elemento $\log g$, kur atvaizdavimas log yra atvirkštinis eksponentiniam atvaizdavimui. Todėl taške $\exp(xX + yY + zZ)$ koeficientas yra $e^{i\lambda z} e^{-(x^2+\lambda^2 y^2)/4}$.

Koeficiento modulis priklauso tik nuo vaizdo (a, b) faktorgrupėje $H/Z(H) \cong \mathbb{R}^2$. Kai $\lambda \neq 0$, modulis gęsta visomis kryptimis ir galioja lygybė

$$\int_{\mathbb{R}^2} \bigl|\langle \varphi, \Pi_\lambda(a,b,c)\varphi\rangle\bigr|^2 da\, db = \int e^{-a^2/2} da \int e^{-\lambda^2 b^2/2} db = \sqrt{2\pi} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{|\lambda|} = \frac{2\pi}{|\lambda|}.$$

Šio integralo atvirkštinis dydis $|\lambda|/(2\pi)$ yra aukščiau pateiktos formos B normavimo konstanta.

Palyginkime su Šūro ortogonalumu (5-oji paskaita). Kai v yra vienetinis vektorius kompaktinės grupės neredukuojamame unitariajame įvaizdyje, kurio dimensija yra d, galioja lygybė $\int |\langle v, \Pi(g)v\rangle|^2\, dg = 1/d$, o $d \int \overline{\langle v, \Pi(g)v\rangle}\, \Pi(g)\, dg$ yra ortogonalioji projekcija į tiesę $\mathbb{C}v$. Forma B faktorgrupėje $H/Z(H)$ turi tą patį pavidalą, kur funkcija φ yra vietoj vektoriaus v. Skaičius $|\lambda|/(2\pi)$ užima dimensijos d vietą. Palyginti galima tik pavidalą, nes čia matas yra $da\, db$, o ne normuotas integralas.

Operatorių E, apibrėžtą po Stouno–fon Noimano teoremos, šiame modelyje galima apskaičiuoti išreikštiniu pavidalu, kai $\lambda \neq 0$. Šiam skaičiavimui ta teorema nenaudojama. Simboliu E_λ žymėsime šį operatorių, kai $\rho = \Pi_\lambda$. Kadangi galioja lygybė

$$\Pi_\lambda(\exp(aX + bY))f(t) = e^{i\lambda(bt + ab/2)} f(t + a),$$

pirmiausia integruosime pagal b. Kai $f, h \in C_c(\mathbb{R})$, iš Tonelio teoremos, Koši ir Švarco nelygybės, taikomos pagal kintamąjį t, ir invariantiškumo postūmių atžvilgiu, kaip ir 16-osios paskaitos pabaigoje, gauname įvertį

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(a^2+\lambda^2 b^2)/4} \int_{\mathbb{R}} |h(t)|\, |f(t+a)|\, dt\, da\, db \le \frac{4\pi}{|\lambda|} \|f\| \|h\|.$$

Taigi Fubinio teorema leidžia toliau pateiktą branduolio skaičiavimą sutapatinti su forma B, apibrėžiančia operatorių E_λ. Išskyrę pilnąjį kvadratą taip pat, kaip aukščiau, apskaičiuojame Gauso funkcijos Furjė integralą:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda^2 b^2/4} e^{i\lambda b(t+a/2)}\, db = \frac{2\sqrt{\pi}}{|\lambda|} e^{-(t+a/2)^2}.$$

Vadinasi, kai $f \in C_c(\mathbb{R})$, ieškomojo operatoriaus veikimą aprašo formulė

$$(E_\lambda f)(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2/4 - (t+a/2)^2} f(t + a)\, da.$$

Atlikime keitinį $u = t + a$. Tada eksponentės rodiklis supaprastėja:

$$-\frac{(u-t)^2}{4} - \frac{(t+u)^2}{4} = -\frac{t^2 + u^2}{2}.$$

Todėl operatoriaus formulė įgauna pavidalą

$$(E_\lambda f)(t) = \varphi(t) \int_{\mathbb{R}} \overline{\varphi(u)} f(u)\, du = \varphi(t) \langle \varphi, f \rangle.$$

Abu operatoriai yra aprėžtieji, todėl dėl tirštumo ši lygybė galioja visoje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Taigi operatorius E_λ yra būtent ortogonalioji projekcija į tiesę, kurią apvelka Gauso funkcija. Kai ρ yra bendrasis įvaizdis, kurio centrinis charakteris yra $\lambda \neq 0$, pagrindinis standartinio vienatinumo teiginio įrodymo žingsnis yra įrodyti, kad operatorius E yra nenulinė projekcija. Šiame modelyje matome šios projekcijos pirmojo rango integralinį branduolį. Kvantinėje mechanikoje, kai $\lambda = \hbar = 1$, funkcija φ yra osciliatoriaus $\frac{1}{2}(P^2 + Q^2)$ pagrindinė būsena, vektorius $\Pi_1(g)\varphi$ yra koherentinė būsena, o E_1 yra projekcija į pagrindinę būseną.

Dabar galime įrodyti teoremos (a) dalį. Dėl operatoriaus E_λ rango kiekvienas uždarasis invariantinis poerdvis arba apima funkciją φ, arba yra jai ortogonalus, o funkcijos φ orbita apvelka tirštą poerdvį.

Teoremos 18.9(a) *dalies įrodymas.* Fiksuokime $\lambda \neq 0$ ir tegul $W \subset L^2(\mathbb{R})$ yra uždarasis invariantinis poerdvis.

Funkcijos φ orbita apvelka tirštą poerdvį. Tegul funkcija $f \in L^2(\mathbb{R})$ yra ortogonali vektoriui $\Pi_\lambda(g)\varphi$ visiems $g \in H$. Imdami $g = (0, b, 0)$, gauname

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{f(t)}\, \varphi(t)\, e^{i\lambda b t}\, dt = 0 \qquad \text{visiems } b \in \mathbb{R}.$$

Pagal Koši ir Švarco nelygybę funkcija $u = \bar{f}\varphi$ yra integruojama. Cituojame Furjė transformacijos injektyvumą erdvėje $L^1(\mathbb{R})$: jei funkcija u yra integruojama ir $\int_{\mathbb{R}} u(t)e^{ist}\, dt = 0$ visiems $s \in \mathbb{R}$, tai $u = 0$ beveik visur (Folland, *Real Analysis*, antrasis leidimas, 8 skyrius). Kadangi $\lambda \neq 0$, skaičius $s = \lambda b$ perbėga visą aibę $\mathbb{R}$. Todėl $\bar{f}\varphi = 0$ beveik visur. Kadangi $\varphi > 0$ visur, gauname $f = 0$.

Operatorius E_λ komutuoja su projekcija į poerdvį W. Kadangi $\Pi_\lambda(g)^* = \Pi_\lambda(g^{-1})$, poerdvis $W^\perp$ taip pat yra invariantinis. Tegul $f \in W$ ir $h \in W^\perp$. Tada $\langle h, \Pi_\lambda(g) f \rangle = 0$ visiems $g \in H$. Todėl operatorių E_λ apibrėžianti forma duoda lygybę $\langle h, E_\lambda f \rangle = 0$. Vadinasi, $E_\lambda W \subset W$. Tas pats argumentas, sukeitus poerdvius W ir $W^\perp$ vietomis, duoda sąryšį $E_\lambda W^\perp \subset W^\perp$. Taigi operatorius E_λ komutuoja su ortogonaliąja projekcija P_W į poerdvį W.

Išvada. Kadangi $E_\lambda \varphi = \varphi$, gauname $E_\lambda P_W \varphi = P_W E_\lambda \varphi = P_W \varphi$. Todėl vektorius $P_W\varphi$ priklauso poerdviui $\mathbb{C}\varphi$, kuris yra operatoriaus E_λ vaizdas, ir $P_W\varphi = \kappa\varphi$ su tam tikru $\kappa \in \mathbb{C}$. Kadangi $P_W^2 = P_W$, turime $\kappa = 0$ arba $\kappa = 1$. Jei $\kappa = 1$, tai $\varphi \in W$, ir pirmasis žingsnis duoda $W = L^2(\mathbb{R})$. Jei $\kappa = 0$, tai $\varphi \in W^\perp$, ir pirmasis žingsnis duoda $W^\perp = L^2(\mathbb{R})$, todėl $W = 0$. ∎

Dabar tarkime, kad $\lambda = 0$. Apibrėžiančioji formulė (18.4) virsta grynu postūmiu: $(\Pi_0(a, b, c)f)(t) = f(t + a)$. Moduliacijos tampa trivialios, o Gauso koeficientas (18.6) tampa lygus $e^{-a^2/4}$. Šis koeficientas negęsta kintamojo b kryptimi, o aukščiau pateiktas integralas diverguoja.

Neredukuojamieji grupės H unitarieji įvaizdžiai, kurių centrinis charakteris yra 0, faktorizuojasi per faktorgrupę $H/Z(H) \cong \mathbb{R}^2$. Pagal Šūro lemą (Kirillov, V priedas) neredukuojamieji

Abelio grupės unitarieji įvaizdžiai yra vienmačiai. Todėl neredukuojamieji grupės H unitarieji įvaizdžiai, kurių centrinis charakteris yra 0, yra charakteriai

$$\chi_{\alpha,\beta}(a,b,c) = e^{i(\alpha a+\beta b)}, \qquad \alpha,\beta \in \mathbb{R}.$$

Kirilovo knygos 2 skyriuje šis rezultatas kartu su Stouno–fon Noimano teorema (Teorema 18.9) pateikiamas kaip visas neredukuojamųjų įvaizdžių sąrašas. Šį sąrašą 19-ojoje paskaitoje paaiškinsime kojungtinėmis orbitomis.

Teiginys 18.10. *Įvaizdis Π_0 neturi vienmačio invariantinio poerdvio. Todėl jis neturi neredukuojamojo uždarojo invariantinio poerdvio.*

Įrodymas. Tarkime, kad funkcija $f \neq 0$ apvelka invariantinę tiesę. Tada $U(a)f = \mu(a)f$, kur $|\mu(a)| = 1$. Kiekvienam sveikajam skaičiui n turime

$$\int_n^{n+1} |f(t)|^2 dt = \int_0^1 |f(t+n)|^2 dt = \int_0^1 |\mu(n)f(t)|^2 dt = \int_0^1 |f(t)|^2 dt.$$

Susumavę pagal $n \in \mathbb{Z}$, gauname $\|f\|^2 = \sum_n \int_0^1 |f|^2$. Ši suma yra baigtinė tik tada, kai $\int_0^1 |f|^2 = 0$. Tada $\|f\| = 0$, o tai yra prieštara. Neredukuojamajame uždarajame invariantiniame poerdvyje veiktų neredukuojamasis įvaizdis, kurio centrinis charakteris yra 0. Pagal aukščiau pateiktą klasifikaciją tas poerdvis būtų tiesė. ∎

Dalys, kurių galima tikėtis įvaizdyje Π_0, yra plokščiosios bangos $e^{i\alpha t}$, kuriose operatorius $U(a)$ veikia daugyba iš $e^{i\alpha a}$. Jos nėra kvadratiškai integruojamos. Furjė transformacija iš 15-osios paskaitos operatorių $U(a)$ paverčia daugyba iš $e^{i\alpha a}$ erdvėje $L^2(\mathbb{R}, d\alpha)$. Todėl įvaizdis Π_0 yra charakterių $\chi_{\alpha,0}$ integralas, o ne suma. Tai vadinama *tiesioginiu integralu*, ir šios temos neplėtosime.

Toliau pateiktoje lentelėje centrinis charakteris $\lambda \neq 0$ lyginamas su centriniu charakteriu 0.

	centrinis charakteris $\lambda \neq 0$	centrinis charakteris 0
neredukuojamieji	viena klasė, Π_λ	$\chi_{\alpha,\beta}$, $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$
dimensija	begalinė	lygi vienetui
modelis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$	pats Π_λ, neredukuojamas	Π_0 be neredukuojamų dalių
Gauso koeficientas	gęsta faktorgrupėje $H/Z(H)$	nepriklauso nuo b

Savikontrolė

1. Apskaičiuokite sandaugas gg' ir $g'g$, kai $g = (1,2,3)$ ir $g' = (4,5,6)$, ir patikrinkite komutavimo formulę (18.2).
   Atsakymas. Turime $gg' = (5,7,3+6+5) = (5,7,14)$ ir $g'g = (5,7,9+8) = (5,7,17)$. Čia $ab' - a'b = 5-8 = -3$ ir $(0,0,-3)(5,7,17) = (5,7,14)$.
2. Kodėl įvaizdžiai Π_2 ir Π_3 yra neekvivalentūs?
   Atsakymas. Persipynimo operatorius T tenkina lygybę $Te^{2ic} = e^{3ic}T$ visiems c. Kai $c = \pi$, ši lygybė virsta lygybe $T = -T$, todėl $T = 0$.
3. Apskaičiuokite koeficientus $\langle \varphi, \Pi_1(2,2,2)\varphi\rangle$ ir $\langle \varphi, \Pi_0(0,b,0)\varphi\rangle$.
   Atsakymas. Pagal Gauso koeficiento formulę (18.6) turime $c - ab/2 = 0$ ir $(a^2+b^2)/4 = 2$, todėl pirmasis koeficientas yra lygus e^{-2}. Antrasis koeficientas yra lygus 1 visiems b.

Santrauka

Heizenbergo grupės centras yra $Z(H) \cong \mathbb{R}$. Kiekvienas komutatorius priklauso šiam centrui. Postūmiai ir moduliacijos erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ sudaro Šrėdingerio įvaizdį Π_λ, kuris tenkina Veilio sąryšius. Kai $\lambda \neq 0$, Gauso forma duoda išreikštinę pirmojo rango projekciją, ir tai įrodo, kad įvaizdis Π_λ yra neredukuojamas. Cituotas Stouno–fon Noimano teoremos vienatinumo teiginys sako: kai $\lambda \neq 0$, kiekvienas stipriai tolydus unitarusis įvaizdis, veikiantis nenulinėje separabiliojoje erdvėje ir turintis centrinį charakterį λ, unitariojo ekvivalentumo tikslumu yra įvaizdžio Π_λ kopijų Hilberto tiesioginė suma. Kai $\lambda = 0$, neredukuojamieji įvaizdžiai yra charakteriai $\chi_{\alpha,\beta}$, o postūmių įvaizdyje Π_0 nėra nė vieno iš jų.

Literatūra

- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method* (2004), 2 skyrius: Heizenbergo grupė, jos neredukuojamieji unitarieji įvaizdžiai ir Stouno–fon Noimano teorema.
- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, V priedas: parengiamoji medžiaga apie unitariuosius įvaizdžius, įskaitant Šūro lemą ir indukuotuosius įvaizdžius.
- Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas (2015), 1 skyrius: Heizenbergo grupė tarp matricinių Lie grupių pavyzdžių.

Paskaita 19

Kojungtinės orbitos ir orbitų metodas nilpotentinėms grupėms

Tikslai. *Įvaizdis veikia vektorius. Lie grupės kojungtinis veikimas vietoj to veikia tiesinius funkcionalus, apibrėžtus jos Lie algebroje. Kiekviena šio veikimo orbita turi natūralią simplektinę formą. Jungioms ir vienajungėms nilpotentinėms grupėms šios orbitos sužymi visus neredukuojamus stipriai tolydžius unitariuosius įvaizdžius iki unitariojo ekvivalentumo. Įrodysime geometrinę konstrukciją ir išnagrinėsime Heizenbergo pavyzdį. Bendroji klasifikacija pateikiama kaip aiškiai cituojama teorema.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kojungtinį veikimą ir jo stabilizatorius.
- Sukonstruoti orbitos simplektinę formą ir patikrinti jos ženklus, naudojant 1-formų, išorinės išvestinės ir atitraukimo taisykles.
- Suformuluoti orbitų teoremą nilpotentinėms grupėms su jos globaliosiomis prielaidomis.
- Parinkti funkcionalo dvimatėje Heizenbergo orbitoje poliarizaciją ir indukcija atkurti Šrėdingerio įvaizdį.

19.1 Dualusis veikimas

Visoje paskaitoje G žymi baigtinės dimensijos realiąją Lie grupę, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Šios Lie algebros realioji dualioji erdvė yra $\mathfrak{g}^* = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathfrak{g}, \mathbb{R})$. Funkcionalo ℓ ir vektoriaus X porinimas yra reikšmė $\ell(X)$. Ši dualioji erdvė skiriasi nuo įvaizdžio erdvės kompleksinės dualiosios erdvės.

Pirmiausia paaiškinsime, kodėl atsiranda ši dualioji erdvė. Kai $G = \mathbb{R}^n$, unitarusis charakteris turi pavidalą $x \mapsto e^{i\ell(x)}$, kur $\ell \in \mathfrak{g}^*$. Taigi erdvė $\mathfrak{g}^*$ sužymi neredukuojamus unitariuosius grupės $\mathbb{R}^n$ įvaizdžius. Nekomutatyvi grupė veikia erdvę $\mathfrak{g}^*$. Pagrindinė šios paskaitos idėja yra tokia: du vienos orbitos funkcionalai turėtų žymėti vieną įvaizdį. Prisiminkime 17-ąją paskaitą: grupės $ax + b$ mastelio keitimų pogrupis dažnį ξ perkėlė į dažnį ξ/a, o įvaizdžio Π_ξ klasė priklausė tik nuo orbitos.

Apibrėžimas 19.1. *Kojungtinis veikimas* grupės G erdvėje $\mathfrak{g}^*$ apibrėžiamas formule

$$(g \cdot \ell)(X) = \ell(\mathrm{Ad}(g^{-1})X).$$

Kojungtinė orbita, einanti per funkcionalą ℓ, yra aibė $O_\ell = \{g \cdot \ell : g \in G\}$. Šio funkcionalo stabilizatorius yra pogrupis $G_\ell = \{g : g \cdot \ell = \ell\}$.

Atvirkštinio elemento reikia, kad galiotų veikimo dėsnis. Tai matyti iš lygybių

$$(g \cdot (h \cdot \ell))(X) = \ell(\mathrm{Ad}(h^{-1})\,\mathrm{Ad}(g^{-1})X) = \ell(\mathrm{Ad}((gh)^{-1})X) = ((gh) \cdot \ell)(X).$$

Stabilizatorius yra uždaras dėl tolydumo. Todėl pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą jis yra įdėtasis Lie pogrupis. Diferencijuodami veikimą, gauname

$$(\mathrm{ad}^*(X)\ell)(Y) = -\ell([X,Y]), \qquad \mathfrak{g}_\ell = \{X : \ell([X,Y]) = 0 \text{ kiekvienam } Y \in \mathfrak{g}\}. \tag{19.1}$$

Tapatybė $\exp(tX) \cdot \ell = e^{t\,\mathrm{ad}^*(X)}\ell$ rodo, kad sąlyga $\exp(tX) \in G_\ell$ galioja visiems t tada ir tik tada, kai $\mathrm{ad}^*(X)\ell = 0$. Taigi galioja lygybė $\mathrm{Lie}(G_\ell) = \mathfrak{g}_\ell$. Pavyzdžiui, centrinis elementas X priklauso kiekvienai stabilizatoriaus algebrai $\mathfrak{g}_\ell$. Todėl centrinės kryptys nesukuria judėjimo orbitoje.

Suteikime orbitai O_ℓ erdvės G/G_ℓ glodžiąją struktūrą. Tam naudojame vienalytės erdvės teoremą iš 3-iosios paskaitos. Natūralusis atvaizdavimas

$$G/G_\ell \longrightarrow \mathfrak{g}^*, \qquad gG_\ell \longmapsto g \cdot \ell$$

yra injektyvus ir yra imersija. Neutraliojo elemento gretutinės klasės taške natūraliojo atvaizdavimo išvestinę indukuoja atvaizdavimas $X \mapsto \mathrm{ad}^*(X)\ell$, kurio branduolys yra būtent $\mathfrak{g}_\ell$. Kituose taškuose dėl ekvivariantiškumo rangas yra toks pat. Todėl orbitos dimensija lygi $\dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{g}_\ell$.

Bendrosios Lie grupės orbita nebūtinai yra erdvės $\mathfrak{g}^*$ įdėtasis podaugdaris. Visi toliau pateikti teiginiai apie liestines erdves remiasi faktorine glodžiąja struktūra. Heizenbergo orbitos bus įprastos afininės plokštumos ir taškai, todėl ten šis skirtumas išnyksta.

Įveskime žymėjimą

$$\xi_X(\eta) = \left.\frac{d}{dt}\right|_0 \exp(tX) \cdot \eta = \mathrm{ad}^*(X)\eta, \qquad \eta \in O_\ell.$$

Vektoriai $\xi_X(\eta)$ apvelka orbitos O_ℓ liestinę erdvę taške η. Du elemento X pasirinkimai duoda tą patį vektorių tada ir tik tada, kai jų skirtumas priklauso poalgebrai $\mathfrak{g}_\eta$.

Pirmasis pavyzdys: Heizenbergo grupė

Tegul H žymi 18-osios paskaitos Heizenbergo grupę, kurios Lie algebrą $\mathfrak{h}$ apvelka elementai X, Y ir Z. Naudojame lygiai tas pačias jos matricines koordinates:

$$(a,b,c)(a',b',c') = (a+a', b+b', c+c'+ab'), \qquad [X,Y] = Z.$$

Pabrėžkime, kad koordinatė c yra matricos elementas. Ji nesutampa su centriniu logaritmo koeficientu, kuris lygus $c - ab/2$.

Naudosime žymėjimą $\ell = (p, q, \lambda)$, kai $\ell(X) = p$, $\ell(Y) = q$ ir $\ell(Z) = \lambda$. Prisiminkime 18-osios paskaitos jungtinio įvaizdžio formules:

$$\mathrm{Ad}(a,b,c)X = X - bZ, \qquad \mathrm{Ad}(a,b,c)Y = Y + aZ, \qquad \mathrm{Ad}(a,b,c)Z = Z.$$

Elemento $g = (a, b, c)$ atvirkštinio elemento pirmosios koordinatės yra $(-a, -b)$. Todėl galioja lygybės $\mathrm{Ad}(g^{-1})X = X + bZ$ ir $\mathrm{Ad}(g^{-1})Y = Y - aZ$. Pritaikę funkcionalą ℓ šiems vektoriams, gauname


$$(a,b,c) \cdot (p,q,\lambda) = (p + \lambda b, q - \lambda a, \lambda). \tag{19.2}$$

Kai $\lambda \neq 0$, šis veikimas pasiekia kiekvieną tašką plokštumoje, kurioje paskutinė koordinatė yra pastovi. Funkcionalo stabilizatorius tada yra centras. Kai $\lambda = 0$, kiekvienas taškas yra šio veikimo fiksuotasis taškas. Taigi orbitų sąrašą sudaro plokštumos, atitinkančios nenulines parametro λ reikšmes, ir pavieniai taškai $(p, q, 0)$.

Plokštumoje dydžiai p ir q yra koordinatės. Diferencijuodami veikimo formulę (19.2), gauname

$$\xi_X = -\lambda \partial_q, \qquad \xi_Y = \lambda \partial_p, \qquad \xi_Z = 0.$$

Šias orbitas ir laukus vaizduoja 19.1 pav.



19.1 pav.: Heizenbergo grupės kojungtinės orbitos koordinatėse (p, q, λ), kai ašis λ nukreipta į viršų. Kiekviena plokštuma $\lambda = \pm 1$ yra viena orbita, ir kiekvienas taškas lygyje $\lambda = 0$ yra viena orbita. Rodyklės vaizduoja laukus ξ_X ir ξ_Y viename kiekvienos plokštumos taške.

19.2 Simplektinė forma kiekvienoje orbitoje

Šio skyrelio formą naudosime taip. Pirmiausia ji parodo, kad orbitų dimensija yra lyginė. Be to, taške ℓ ji yra toliau pateikta forma B_ℓ faktorerdvėje $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_\ell$, o ši forma lemia, kas yra poliarizacija. Uždarumas šioje paskaitoje nenaudojamas. Jo reikia 27-osios paskaitos cituojamai teoremai.

Mums prireiks šiek tiek diferencialinių formų kalbos. Glodžioji 2-forma ω kiekvienai liestinei erdvei priskiria alternuojančią bitiesinę formą ω_x. Lokaliosiose koordinatėse šis priskyrimas yra glodus. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ galioja lygybė

$$(dp \wedge dq)((u_1,u_2),(v_1,v_2)) = u_1v_2 - u_2v_1.$$

Forma ω vadinama *neišsigimusia*, jei kiekviename taške x vienintelis liestinis vektorius u taške x, kuriam lygybė $\omega_x(u, v) = 0$ galioja kiekvienam liestiniam vektoriui v taške x, yra nulinis, t.y. $u = 0$.

Įveskime koordinatėse $x_1, \dots, x_d$ koeficientus $\omega_{ij} = \omega(\partial_i, \partial_j) = -\omega_{ji}$. Tada forma išreiškiama formule $\omega = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \omega_{ij}\, dx_i \wedge dx_j$. Forma ω vadinama *uždara*, kai galioja lygybės

$$\partial_i \omega_{jk} + \partial_j \omega_{ki} + \partial_k \omega_{ij} = 0 \quad \text{visiems } i, j, k.$$

Lygiavertė uždarumo sąlyga yra lygybė $d\omega = 0$. Uždara neišsigimusi 2-forma vadinama *simplektine forma*. Šios sąlygos nepriklauso nuo koordinačių. Šį elementarųjį diferencialinių formų skaičiavimą, įskaitant atitraukimus ir išorinę išvestinę d, perimame iš Vornerio knygos 2 skyriaus. Iš šio skaičiavimo naudosime tokias taisykles.

Glodžioji 1-*forma* α priskiria tiesinį funkcionalą α_x liestinėje erdvėje kiekviename taške x. Lokaliosiose koordinatėse šis priskyrimas yra glodus. Čia dx_j yra 1-forma, kuriai $dx_j(\partial_k) = \delta_{jk}$. Todėl koordinatėse $\alpha = \sum_j a_j\, dx_j$, kur $a_j = \alpha(\partial_j)$. Glodžios funkcijos f diferencialas yra 1-forma $df = \sum_j (\partial_j f)\, dx_j$. Dviejų 1-formų *išorinė sandauga* yra 2-forma, apibrėžta formule

$$(\alpha \wedge \beta)(u, v) = \alpha(u)\beta(v) - \alpha(v)\beta(u).$$

Atskiru atveju $\beta \wedge \alpha = -\alpha \wedge \beta$. Išorinė 1-formų išvestinė yra tiesinė ir tenkina lygybes $d(f\, dg) = df \wedge dg$ ir $d(dg) = 0$ glodžiosioms funkcijoms f ir g. Koordinatėse

$$\alpha = \sum_j a_j\, dx_j, \qquad d\alpha = \sum_{i<j} (\partial_i a_j - \partial_j a_i)\, dx_i \wedge dx_j.$$

Glodusis atvaizdavimas F turi *atitraukimą*, kuris 1-formoms ir 2-formoms apibrėžiamas formulėmis

$$(F^*\alpha)_x(u) = \alpha_{F(x)}(dF_x u), \qquad (F^*\omega)_x(u, v) = \omega_{F(x)}(dF_x u, dF_x v).$$

Jis tenkina lygybes $F^*(df) = d(f \circ F)$, $F^*(f\alpha) = (f \circ F)F^*\alpha$, $F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$ ir $d(F^*\alpha) = F^*(d\alpha)$.

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ turime $d(y\, dx) = dy \wedge dx = -dx \wedge dy$. Atvaizdavimas $F(s, t) = (s+t, st)$ į plokštumą (p, q) duoda

$$F^*(dp \wedge dq) = (ds + dt) \wedge (t\, ds + s\, dt) = (s - t)\, ds \wedge dt.$$

Toliau pateiktame įrodyme naudojamos dar dvi tapatybės, kurios ten suformuluotos.

Teorema 19.2 (Orbitos simplektinė forma). *Kiekviena kojungtinė orbita turi G-invariantinę simplektinę formą ω, apibrėžtą formule*

$$\omega_\eta(\xi_X(\eta), \xi_Y(\eta)) = \eta([X, Y]). \tag{19.3}$$

Ši forma yra Kirilovo–Kostanto–Surio forma su infinitezimaliojo veikimo (19.1) *ženklų susitarimu.*

Įrodymas. Forma yra gerai apibrėžta. Jei prie elemento X pridėsime elementą $A \in \mathfrak{g}_\eta$, tai galioja lygybė $\eta([A, Y]) = 0$. Dėl antisimetriškumo elemento Y pakeitimas turi tokį patį poveikį. Taigi apibrėžiančioji formulė (19.3) priklauso tik nuo dviejų liestinių vektorių. Taip apibrėžta forma yra alternuojanti ir bitiesinė.

Neišsigimimas. Jei lygybė $\omega_\eta(\xi_X, \xi_Y) = 0$ galioja kiekvienam elementui Y, tai pagal stabilizatoriaus formulę (19.1) galioja sąryšis $X \in \mathfrak{g}_\eta$. Todėl galioja lygybė $\xi_X(\eta) = 0$.

Glodumas. Laukai ξ_X yra glodūs ir apvelka kiekvieną liestinę erdvę. Pasirinkime iš šių laukų lokalųjį reperį. Apibrėžiančioji formulė (19.3) tame repere duoda glodžius koeficientus, todėl forma ω yra glodi.

Invariantiškumas. Elementui $g \in G$ tegul simbolis g_* žymi orbitoje apibrėžto atvaizdavimo $\eta \mapsto g \cdot \eta$ diferencialą. Kadangi galioja lygybė $g \exp(tX) = \exp(t \operatorname{Ad}(g)X)g$, diferencijuodami reiškinį $g \cdot (\exp(tX) \cdot \eta)$ taške $t = 0$, gauname

$$g_* \xi_X(\eta) = \xi_{\operatorname{Ad}(g)X}(g \cdot \eta).$$

Pasinaudoję tuo, kad atvaizdavimas $\operatorname{Ad}(g)$ išsaugo skliaustus, gauname

$$\begin{aligned} \omega_{g\cdot\eta}(g_*\xi_X, g_*\xi_Y) &= (g \cdot \eta)([\operatorname{Ad}(g)X, \operatorname{Ad}(g)Y]) \\ &= \eta([X, Y]). \end{aligned}$$

Taigi forma yra invariantinė.

Uždarumas. Tegul $\Phi : G \to \mathcal{O}_\ell$ yra orbitos atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\Phi(g) = g \cdot \ell$. Apibrėžkime formą $\beta = \Phi^* \omega$. Dėl invariantiškumo forma β yra kairiai invariantinė grupėje G. Be to, galioja lygybė $\beta_e(X, Y) = \ell([X, Y])$. Išorinis diferencijavimas komutuoja su atitraukimu. Kairiai invariantinės 2-formos diferencialą taške e išreiškia formulė

$$(d\beta)_e(X, Y, Z) = -\beta_e([X, Y], Z) + \beta_e([X, Z], Y) - \beta_e([Y, Z], X).$$

Taip suformulavome abi tapatybes, perimtas iš Vornerio knygos 2 skyriaus. Tai yra išorinės išvestinės d komutavimas su atitraukimu ir ankstesnė kairiai invariantinės 2-formos formulė. Įstatę gauname

$$(d\beta)_e(X, Y, Z) = -\ell([[X, Y], Z]) + \ell([[X, Z], Y]) - \ell([[Y, Z], X]) = 0$$

pagal Jakobio tapatybę. Dėl kairiojo invariantiškumo lygybė $d\beta = 0$ galioja visur. Vadinasi, galioja lygybė $\Phi^*(d\omega) = 0$. Kadangi atvaizdavimas Φ yra submersija, kiekvienas orbitos liestinių vektorių rinkinys pakeliamas į grupę G. Iš čia išplaukia lygybė $d\omega = 0$. ∎

Neišsigimusi alternuojanti forma egzistuoja tik lyginės dimensijos erdvėje. Kad tuo įsitikintume, tegul A yra tokios formos matrica tam tikroje bazėje. Tada galioja lygybė $A^T = -A$. Jei matricos dydis d būtų nelyginis, tai, kadangi matricos A determinantas transponuojant nekinta, gautume $\det A = \det(-A) = -\det A$. Todėl būtų $\det A = 0$. Taigi forma būtų išsigimusi. Atskiruoju atveju kiekvienos kojungtinės orbitos dimensija yra lyginė. Ši savybė yra naudingas pirmasis siūlomo skaičiavimo patikrinimas.

Formos aiškinimas tiesinėmis funkcijomis

Ženklą apibrėžiančiojoje formulėje (19.3) patogu įsiminti taip. Imkime elementą $X \in \mathfrak{g}$ ir apribokime orbitoje tiesinę funkciją, apibrėžtą formule $\mu_X(\eta) = \eta(X)$. Jos išvestinę liestine kryptimi išreiškia lygybės

$$(d\mu_X)_\eta(\xi_Y) = (\operatorname{ad}^*(Y)\eta)(X) = -\eta([Y, X]) = \eta([X, Y]).$$

Taigi galioja lygybė $d\mu_X = \iota_{\xi_X}\omega$, kur kontrakcija apibrėžiama formule $(\iota_V\omega)(W) = \omega(V, W)$. Ši lygybė infinitezimalųjį veikimą nusako tik orbitos forma ir tiesinėmis funkcijomis.

Glodžiajai realiajai funkcijai f neišsigimimas lemia vienintelį liestinį vektorinį lauką X_f, kuriam galioja lygybė $\iota_{X_f}\omega = df$. Laikantis šio susitarimo, jis vadinamas Hamiltono vektoriniu lauku. Ankstesnis skaičiavimas rodo, kad galioja lygybė $X_{\mu_X} = \xi_X$. Todėl formule

$$\{f, h\} = \omega(X_f, X_h)$$

apibrėžti skliaustai tenkina lygybę $\{\mu_X, \mu_Y\} = \mu_{[X,Y]}$. Šios tapatybės mums reikia tik tiesinėms funkcijoms. Ji rodo, kad Lie skliaustai išlieka matomi ir pereinant prie orbitos.

Jei elementas $W \in \mathfrak{g}$ yra centrinis, tai galioja lygybė $\xi_W = 0$. Taigi galioja lygybės $d\mu_W = \iota_{\xi_W}\omega = 0$, todėl funkcija μ_W kiekvienoje orbitoje yra lokaliai pastovi. Ji yra pastovi, kai grupė G yra jungi. Tokia konstanta vis tiek gali būti tiesinių funkcijų skliaustų reikšmė. Skyrelio 19.1 pirmojo pavyzdžio Heizenbergo bazei X, Y ir Z aukščiau pateikta tapatybė duoda lygybę $\{\mu_X, \mu_Y\} = \mu_Z$, o funkcija μ_Z kiekvienoje orbitoje įgyja vieną pastovią reikšmę.

Pakeitus Hamiltono vektorinių laukų susitarimą, kai kurie iš šių ženklų pasikeistų. Čia juos lemia apibrėžimai, o ne atmintinai prisimenama fizikos formulė. Šis skaičiavimas yra susijęs su baigtinės dimensijos glodžiosiomis daugdaromis. Jame nediferencijuojamas joks neaprėžtas operatorius ir neteigiama jokia kvantavimo taisyklė.

19.3 Heizenbergo plokštumos ir taškai

Plokštumoje laukai $\xi_X = -\lambda\partial_q$ ir $\xi_Y = \lambda\partial_p$ iš Skyrelio 19.1 pirmojo pavyzdžio apvelka liestines erdves, o $\xi_Z = 0$. Formos apibrėžimas duoda lygybes $\omega(\xi_X, \xi_Y) = \ell(Z) = \lambda$. Kadangi galioja lygybė $(dp \wedge dq)(\xi_X, \xi_Y) = \lambda^2$, gauname

$$\omega_\lambda = \frac{1}{\lambda}\, dp \wedge dq. \tag{19.4}$$

Koeficientas yra $1/\lambda$, o ne λ, nes vektoriai ξ_X ir ξ_Y jau turi daugiklį λ.

Pagal Uždavinį 19.2 orbitos atvaizdavimas formą ω_λ atitraukia į formą $\lambda\, da \wedge db$ grupėje H. Vektoriams (a, b) ir (a', b') jos reikšmė yra $\lambda(ab' - a'b)$. Tai yra komutatoriaus fazės rodiklis 18-oje paskaitoje, kur dydis $ab' - a'b$ pavaizduotas kaip orientuotas plotas.

Taškinių orbitų liestinės erdvės yra nulinės dimensijos. Nulinė forma tokioje liestinėje erdvėje yra neišsigimusi, nes jos branduolys yra nulinė erdvė. Orbitų metodas taškui $(p, q, 0)$ priskirs vienmatį charakterį, apibrėžtą formule

$$\chi_{p,q}(a, b, c) = e^{i(pa+qb)}.$$

Skirtingoms poroms (p, q) šie įvaizdžiai yra skirtingi. Trivialus centrinis charakteris, kai $\lambda = 0$, nereiškia, kad įvaizdis yra trivialus. Trivialų charakterį duoda tik taškas $(0, 0, 0)$.

19.4 Poliarizacijos ir orbitų teorema

Lie algebra vadinama *nilpotentine*, jei jos apatinė centrinė eilutė baigiasi:

$$\mathfrak{g}_1 = \mathfrak{g}, \qquad \mathfrak{g}_{r+1} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_r], \qquad \mathfrak{g}_s = 0 \text{ kuriam nors } s.$$

Heizenbergo algebrai galioja lygybės $\mathfrak{g}_2 = \mathbb{R}Z$ ir $\mathfrak{g}_3 = 0$. Nilpotentiškumas yra stipresnė sąlyga nei išsprendžiamumas.

Perimame globalų faktą: jungios ir vienajungės nilpotentinės grupės atveju eksponentė $\exp : \mathfrak{g} \to G$ yra difeomorfizmas, o BCH formulė yra baigtinis polinomas. Kiekviena Lie poalgebra $\mathfrak{m}$ duoda uždarąjį pogrupį $M = \exp \mathfrak{m}$. Taip yra todėl, kad baigtinė BCH formulė sandaugas palieka poalgebroje $\mathfrak{m}$, o uždarojo vektorinio poerdvio $\mathfrak{m}$ vaizdas, gautas eksponentės difeomorfizmu, yra uždaroji aibė. Žr. Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, I.16 skyrelį.

Apibrėžimas 19.3. *Realioji poliarizacija* funkcionalui $\ell \in \mathfrak{g}^*$ yra tokia Lie poalgebra $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{g}$, kad galioja sąlygos

$$\ell([\mathfrak{m}, \mathfrak{m}]) = 0, \qquad \dim \mathfrak{m} = \frac{\dim \mathfrak{g} + \dim \mathfrak{g}_\ell}{2}.$$

Poerdvis $A \subseteq \mathfrak{g}$ vadinamas *izotropiniu* funkcionalo ℓ atžvilgiu, kai galioja lygybė

$$\ell([A, A]) = 0.$$

Taigi realioji poliarizacija yra izotropinė Lie poalgebra, turinti išskirtoje formulėje nurodytą dimensiją. Ši dimensija reiškia, kad poalgebros $\mathfrak{m}$ vaizdas erdvėje $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_\ell$ yra toks didelis, koks tik gali būti izotropinio poerdvio vaizdas. Be to, abi išskirtos sąlygos lemia sąryšį $\mathfrak{g}_\ell \subset \mathfrak{m}$, nes maksimalios dimensijos izotropinis poerdvis apima poalgebrą $\mathfrak{g}_\ell$. Abu teiginius įrodysime toliau, poskyryje apie poliarizacijos dimensiją.

Apibrėžkime tokiai poalgebrai atvaizdavimą formule

$$\chi_\ell(\exp W) = e^{i\ell(W)}, \qquad W \in \mathfrak{m}.$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes atvaizdavimas exp yra bijektyvus. Šis atvaizdavimas yra grupės M charakteris. Kiekviena BCH pataisa yra poalgebros $\mathfrak{m}$ elementų skliaustas, todėl funkcionalas ℓ ją anuliuoja ir galioja lygybė $\chi_\ell(\exp U \exp V) = \chi_\ell(\exp U)\chi_\ell(\exp V)$.

Pavyzdžiui, imkime Heizenbergo algebrą ir funkcionalą $\ell = (0, 0, \lambda)$, kur $\lambda \neq 0$. Tada $\mathfrak{g}_\ell = \mathbb{R}Z$, todėl poliarizacija yra dvimatė. Abi poalgebros $\operatorname{span}\{Y, Z\}$ ir $\operatorname{span}\{X, Z\}$ yra poliarizacijos. Visa algebra $\mathfrak{h}$ yra per didelė: $\ell([X, Y]) = \lambda \neq 0$, todėl aukščiau pateikta formulė neapibrėžia grupės H charakterio. Tiesė $\mathbb{R}Z$ yra izotropinė, bet per maža. Įvaizdis $\operatorname{Ind}_{Z(H)}^{H} \chi_\lambda$ iš 17-osios paskaitos veikia dviejų kintamųjų funkcijas. Grupės H dešinieji postūmiai išsaugo jo erdvę, nes pogrupis $Z(H)$ yra centrinis. Šie postūmiai yra unitarieji ir komutuoja su veikimu. Todėl šis įvaizdis nėra neredukuojamas. Pagal 18-osios paskaitos Stouno–fon Noimano teoremą jis yra įvaizdžio Π_λ kopijų tiesioginė suma.

Teorema 19.4 (Orbitų teorema nilpotentinėms grupėms; cituojama)**.** *Tegul grupė G yra jungi, vienajungė ir nilpotentinė. Kiekvienas funkcionalas $\ell \in \mathfrak{g}^*$ turi realiąją poliarizaciją. Unitarusis indukuotasis įvaizdis*

$$\Pi_\ell = \operatorname{Ind}_{\exp \mathfrak{m}}^{G} \chi_\ell$$

yra neredukuojamas. Jo ekvivalentumo klasė nepriklauso nuo poliarizacijos. Du tokie įvaizdžiai yra ekvivalentūs tada ir tik tada, kai jų funkcionalai priklauso tai pačiai kojungtinei orbitai. Kiekvienas neredukuojamas stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis yra unitariai ekvivalentus kuriam nors įvaizdžiui Π_ℓ.

Tai yra Kirilovo teorema, perimta iš knygos *Lectures on the Orbit Method* 3 skyriaus. Indukcija čia reiškia unitariąją indukciją su 17-osios paskaitos faktorinio mato susitarimu. Teiginys yra skirtas įvaizdžiams kompleksinėse Hilberto erdvėse, o ne vien baigtinės dimensijos moduliams.

Be šių prielaidų išvada gali negalioti. Faktorgrupė pagal centrinį pogrupį gali apriboti, kurie įvaizdžiai į ją nusileidžia (Uždavinys 19.3). Grupės SU(2) kojungtinės orbitos yra koordinačių pradžia ir visų spindulių sferos, kaip apskaičiuojama 27-ojoje paskaitoje. Šios orbitos sudaro kontinuumą, o neredukuojamieji įvaizdžiai V_m žymimi sveikaisiais skaičiais. Išskyrus trivialiąją grupę, nė viena kompaktinė grupė ir nė viena pusiau paprastoji grupė netenkina šios teoremos prielaidų. Gimin̄ingas orbitų konstrukcijas sutiksime 27-ojoje paskaitoje. Ten jos turės kitą sveikumo sąlygą ir kitą įvaizdžio modelį.

Šios prielaidos yra pakankamos, bet nebūtinos. Išsprendžiamoji grupė nebūtinai yra nilpotentinė. Grupė $ax + b$ nėra nilpotentinė, tačiau jos orbitų sąrašas Uždavinyje 19.1 atitinka įvaizdžius Π_+, Π_- ir 17-osios paskaitos charakterius (Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 4 skyrius).

Poliarizacijos dimensija

Dabar atskirai išnagrinėsime poliarizacijos tiesinės algebros pagrindą. Apibrėžkime alternuojančią formą formule

$$B_\ell(X, Y) = \ell([X, Y])$$

erdvėje $\mathfrak{g}$. Jos branduolys yra poalgebra $\mathfrak{g}_\ell$. Tarkime, kad galioja lygybės $\dim O_\ell = 2d$ ir $\dim \mathfrak{g}_\ell = k$. Tada gauname $\dim \mathfrak{g} = 2d + k$. Forma B_ℓ indukuoja neišsigimusią alternuojančią formą faktorerdvėje $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_\ell$, kurios dimensija yra $2d$. Izomorfizmas $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_\ell \to T_\ell O_\ell$, apibrėžtas formule $X \mapsto \xi_X(\ell)$, šią indukuotąją formą perveda į formą ω_ℓ. Tiesinė erdvė, turinti neišsigimusią alternuojančią formą, vadinama *simplektine tiesine erdve*.

Tegul L yra šios faktorerdvės poerdvis. Jo *ortogonalusis poerdvis* $L^\perp$ susideda iš vektorių, kurių indukuotasis porinimas su kiekvienu poerdvio L vektoriumi lygus nuliui. Poerdvis L vadinamas *izotropiniu*, kai indukuotoji forma įgyja nulinę reikšmę kiekvienai poerdvio L vektorių porai, t.y. kai $L \subseteq L^\perp$. Iš neišsigimimo išplaukia lygybė $\dim L^\perp = 2d - \dim L$, todėl izotropinio poerdvio L dimensija tenkina nelygybę $\dim L \le d$. Tegul $A \subset \mathfrak{g}$ yra izotropinis poerdvis funkcionalo ℓ atžvilgiu. Jo vaizdas faktorerdvėje yra izotropinis, todėl šio vaizdo dimensija yra ne didesnė už d. Vadinasi, galioja nelygybė

$$\dim A = \dim(A \cap \mathfrak{g}_\ell) + \dim\bigl((A + \mathfrak{g}_\ell)/\mathfrak{g}_\ell\bigr) \le k + d.$$

Lygybės atveju galioja sąryšis $\mathfrak{g}_\ell \subset A$. Be to, tada poerdvio A vaizdas yra d dimensijų izotropinis poerdvis. Poliarizacijos apibrėžime nurodyta dimensija yra lygiai $k + d$.

Lieka vienas papildomas reikalavimas: poerdvis A turi būti Lie poalgebra. Maksimalus izotropinis vektorinis poerdvis šios savybės gali neturėti. Tinkamos poalgebros egzistavimas yra esminė orbitų teoremos nilpotentinėms grupėms dalis. Vien apibrėžimas egzistavimo neįrodo.

Šis skaičiavimas taip pat numato kintamųjų skaičių indukuotajame modelyje. Jei $\mathfrak{m}$ yra poliarizacija, tai galioja lygybės

$$\dim(G/M) = \dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{m} = d = \tfrac{1}{2} \dim O_\ell.$$

Heizenbergo plokštuma yra dvimatė, tačiau jos įvaizdis veikia vieno realiojo kintamojo funkcijas. Tokių kintamųjų skaičius lygus pusei orbitos dimensijos. Orbita neišskiria, kuriuos kintamuosius naudoti. Šį pasirinkimą atlieka poliarizacija.

19.5 Indukcija atkuria Šrėdingerio formulę

Paimkime funkcionalą $\ell = (0, 0, \lambda)$, kur $\lambda \neq 0$. Jo stabilizatoriaus algebra yra $\mathbb{R}Z$, todėl poliarizacija turi būti dvimatė. Pasirinkime

$$\mathfrak{m} = \operatorname{span}\{Y, Z\}, \qquad M = \{(0, b, c)\}, \qquad \chi_\ell(0, b, c) = e^{i\lambda c}.$$

Poalgebra $\mathfrak{m}$ yra Abelio ir dvimatė, todėl ji tenkina abi poliarizacijos sąlygas. Vienas faktorerdvės $H/M \cong \mathbb{R}$ pjūvis yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule $s(t) = (t, 0, 0)$. Faktorinis matas yra dt. Jis yra invariantinis indukuotojo postūmių veikimo atžvilgiu.

Indukuotoji funkcija tenkina sąlygą $f(gm) = \chi_\ell(m)^{-1} f(g)$. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $\varphi(t) = f(s(t))$. Kadangi galioja lygybė

$$(a, b, c) = s(a)(0, b, c - ab),$$

indukuotosios funkcijos reikšmės išreiškiamos formule

$$f(a, b, c) = e^{-i\lambda(c-ab)} \varphi(a).$$

Kairieji postūmiai veikia pagal taisyklę $(\Psi_\lambda(g)f)(h) = f(g^{-1}h)$. Kai $g = (a, b, c)$, turime

$$g^{-1}s(t) = (t - a, -b, -c + ab).$$

Įstatykime tai į ankstesnę kovariantiškumo formulę. Centrinis reiškinys joje supaprastėja taip: $-c + ab - (t - a)(-b) = -c + bt$. Todėl indukuotasis įvaizdis išreiškiamas formule

$$(\Psi_\lambda(a, b, c)\varphi)(t) = e^{i\lambda(c-bt)} \varphi(t - a). \tag{19.5}$$

Šis operatorius yra unitarusis, nes fazės modulis lygus vienetui, o postūmis išsaugo matą dt. Bendroji 17-osios paskaitos unitariosios indukcijos konstrukcija užtikrina įvaizdžio dėsnį ir stiprųjį tolydumą. Abi savybes galima patikrinti ir tiesiogiai iš šios formulės.


Uždavinyje 18.5 atliekamas tas pats skaičiavimas. Postūmio ženklas skiriasi nuo ženklo 18-osios paskaitos Šrėdingerio formulėje, tačiau gaunamas ekvivalentus modelis. Apibrėžkime operatorių formule $R\varphi(x) = \varphi(-x)$. Tada galioja lygybės $R^{-1} = R$ ir

$$(R\Psi_\lambda(a,b,c)R^{-1}u)(x) = e^{i\lambda(c+bx)}u(x+a) = \Pi_\lambda(a,b,c)u(x).$$

Taigi orbitų teorema atkuria Šrėdingerio įvaizdį būtent su jau naudotu susitarimu. Plokštumos parametras λ nusako jos nenulinį centrinį charakterį.

Taškui $(p,q,0)$ poliarizacija yra visa algebra $\mathfrak{h}$. Indukcija iš grupės H į ją pačią duoda charakterį $\chi_{p,q}$. Todėl plokštumų ir taškų skaičiavimai atkuria visą Heizenbergo klasifikaciją iš 18-osios paskaitos. Bendroji orbitų teorema šį dėsningumą išplečia kiekvienai jungiai ir vienajungei nilpotentinei grupei.

Poliarizacija parenka modelio kintamąjį. Plokštumoje grupė M funkcionalą ℓ perkelia tiesėmis lauko ξ_Y kryptimi, t.y. kryptimi ∂_p. Pagal veikimo formulę (19.2) funkcionalo $\ell = (0,0,\lambda)$ orbitoje galioja lygybė $q = -\lambda a$. Todėl modelio kintamasis $t = a$ yra skersinė koordinatė q daugiklio tikslumu. Antroji poliarizacija $\mathfrak{m}' = \operatorname{span}\{X,Z\}$ funkcionalą ℓ perkelia lauko ξ_X kryptimi, t.y. kryptimi ∂_q. Jos pjūvis $s(u) = (0,u,0)$ duoda modelį skersinės koordinatės $p = \lambda u$ funkcijų erdvėje. Abu pasirinkimus rodo 19.2 pav. Orbitų teorema sako, kad abu modeliai yra ekvivalentūs, o čia šį ekvivalentumą duoda Furjė transformacija.



19.2 pav.: Dvi poliarizacijos plokštumoje $\lambda = 1$. Lygiagrečios tiesės yra pogrupio $\exp\mathfrak{m}$ arba $\exp\mathfrak{m}'$ orbitos plokštumoje, o rodyklė rodo jų kryptį. Stora linija yra skersinė koordinatė, kuri daugiklio tikslumu yra atitinkamo indukuotojo modelio kintamasis.

Ką paaiškina Heizenbergo orbitų sąrašas

Orbitų skaičiavimas atskiria du reiškinius. Kai $\lambda \neq 0$, pakeitus koordinatę p arba q, liekama toje pačioje plokštumoje. Toks pakeitimas negali pakeisti įvaizdžio ekvivalentumo klasės. Kai $\lambda = 0$, kiekvienas taškas yra atskira orbita, todėl abu dydžiai p ir q išlieka kaip įvaizdžio žymės. Netolydus orbitos dimensijos pokytis atitinka perėjimą nuo begalinės dimensijos įvaizdžių prie charakterių.

Nulinio krūvio išvadą galima patikrinti ir be bendrosios orbitų teoremos. Pagal unitariąją Šūro lemą, naudotą 18-oje paskaitoje, neredukuojamame unitariajame įvaizdyje kiekvienas centrinis grupės elementas veikia kaip skaliaras. Jei šis skaliarinis charakteris yra trivialus, įvaizdis faktorizuojasi per faktorgrupę $H/Z(H) \cong \mathbb{R}^2$. Šios Abelio grupės neredukuojamas unitarusis įvaizdis yra vienmatis. Šios grupės tolydieji charakteriai yra $e^{i(pa+qb)}$. Jie gaunami kiekvienai koordinatei pritaikius vienparametrės grupės charakterių klasifikaciją.

Nenulinio centrinio charakterio atveju Stouno–fon Noimano teorema vienatinumą duoda tiesiogiai. Orbitų teorema atkuria šį rezultatą ir paaiškina jo geometrinę žymę. Ji taip pat rodo, ką bandyti didesnei nilpotentinei grupei: apskaičiuoti atvaizdavimą ad^*, rasti orbitų invariantus, nustatyti stabilizatoriaus dimensiją, parinkti funkcionalo ℓ realiąją poliarizaciją ir indukuoti šią poliarizaciją atitinkantį charakterį. Paskutiniame uždavinyje šie geometriniai žingsniai atliekami viename keturių dimensijų pavyzdyje.

Pastaba 19.5. Ši pastaba pateikia fizikinį žodynėlį. Palyginkime su 18-aja paskaita, kai $\lambda = 1/\hbar$. Kadangi $\chi_\ell(\exp W) = e^{i\ell(W)}$, reikšmė $\ell(W)$ atitinka operatorių $-i\,d\Pi(W) = -A_W$. Taigi p atitinka dydį $P/\hbar$, o q – dydį $Q/\hbar$, ir $\omega_\lambda = \hbar^{-1} dP \wedge dQ$ yra fazinės erdvės plotas dydžio $\hbar$ vienetais. Tai yra žymių atitikimas, o ne operatorių lygybė.

Savikontrolė

1. Kodėl stabilizatoriaus algebra turi apimti centrą?

Atsakymas. Jei elementas X yra centrinis, tai lygybė $[X, Y] = 0$ galioja kiekvienam elementui Y. Pagal stabilizatoriaus formulę (19.1) elementas X priklauso poalgebrai $\mathfrak{g}_\ell$ kiekvienam funkcionalui ℓ.

2. Ar formule $\omega_\lambda = \lambda\, dp \wedge dq$ apibrėžtos simplektinės formos koeficientas yra teisingai normuotas?

Atsakymas. Ne. Tokios formos reikšmė vektorių porai $(-\lambda\partial_q, \lambda\partial_p)$ būtų lygi λ^3. Reikalinga reikšmė yra λ, todėl koeficientas yra $1/\lambda$.

3. Ar orbitų teoremą galima tiesiogiai taikyti Heizenbergo grupei, kurios centras yra apskritimas?

Atsakymas. Ne. Ši grupė nėra vienajungė. Taikykime teoremą jos vienajungei dengiančiajai grupei. Tada pasinaudokime 4-osios paskaitos nusileidimo teorema. Nusileidžia tik tie įvaizdžiai, kurie padengimo branduolyje yra trivialūs.

Santrauka

Dėl kojungtinio veikimo erdvė $\mathfrak{g}^*$ tampa lyginės dimensijos simplektinių orbitų sąjunga. Jungioms ir vienajungėms nilpotentinėms grupėms poliarizacija orbitą paverčia neredukuojamu indukuotuoju įvaizdžiu. Heizenbergo grupės atveju plokštumos duoda Šrėdingerio įvaizdžius, o taškai – charakterius. Cituojama klasifikacija šiame kontekste yra tiksli. Jos prielaidos yra rezultato dalis.

Literatūra

- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 2–3 skyriai: Heizenbergo įvaizdžiai, poliarizacijos ir atitiktis nilpotentinių grupių atveju.
- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 4 skyrius: atitiktis eksponentinėms grupėms, kurioms priklauso ir grupė $ax + b$.
- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, I.16 skyrelis: vienajungės nilpotentinės grupės.
- Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, 2 skyrius: diferencialinės formos ir išorinis diferencijavimas. Šioje paskaitoje naudojamos tik taisyklės, suformuluotos prieš orbitos formos teoremą, ir dvi jos įrodyme suformuluotos tapatybės.

Paskaita 20

Realiosios formos ir nekompaktinė struktūra

Tikslai. *Jungią realiąją pusiau paprastąją grupę, kurios centras yra baigtinis, galima išskaidyti į kompaktinio pogrupio, Abelio pogrupio ir nilpotentinio pogrupio sandaugą. Orbitų teorema iš 19-osios paskaitos kalba apie nilpotentines grupes ir tokiai grupei netaikoma, todėl pradėsime nuo šios grupės struktūros. Šioje paskaitoje palyginsime kompaktines ir skeliamąsias realiąsias formas ir suformuluosime Kartano bei Ivasavos skaidinius. Abu skaidinius įrodysime grupei* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. *Šiuo atveju jie suteikia koordinates viršutinėje pusplokštumoje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti kompaktinius ir skeliamuosius realiųjų formų pavyzdžius pagal jų Kilingo formas ir Kartano involiucijas.
- Suformuluoti Kartano ir Ivasavos skaidinius su visomis jų prielaidomis.
- Apskaičiuoti skaidinius $g = kan$ ir $g = k\exp X$ konkrečiai matricai iš grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$.
- Aiškinti abu skaidinius kaip koordinates viršutinėje pusplokštumoje.

20.1 Realiosios formos ir Kartano involiucijos

Visame šiame skyrelyje $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kilingo forma

$$\kappa(X,Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad}X\ \operatorname{ad}Y).$$

Knygos Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, antrąjį skaitmeninį 2023 m. leidimą cituojame trumpiniu Knapp Beyond.

Apibrėžimas 20.1. Algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ *realiąja forma* vadinama realioji Lie poalgebra $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, tenkinanti realiųjų tiesinių erdvių lygybę $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \oplus i\mathfrak{g}$.

Tada algebros $\mathfrak{g}$ realioji bazė yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompleksinė bazė. Kiekvienam $X \in \mathfrak{g}$ operatoriaus $\operatorname{ad}X$ matrica šioje bazėje yra reali. Ši matrica yra ta pati virš $\mathbb{R}$ ir virš $\mathbb{C}$. Todėl algebros $\mathfrak{g}$ Kilingo forma yra apribojimas $\kappa|_{\mathfrak{g}}$. Ji yra reali ir neišsigimusi. Realieji izomorfizmai jos signatūros nekeičia.

Apibrėžimas 20.2. Realioji forma $\mathfrak{g}$ vadinama *kompaktine*, jei forma $\kappa|_{\mathfrak{g}}$ yra neigiamai apibrėžta. Realioji forma vadinama *skeliamąja*, jei joje yra Abelio poalgebra $\mathfrak{h}_0$, turinti šias dvi savybes. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad}H$, kai $H \in \mathfrak{h}_0$, yra diagonalizuojamas virš $\mathbb{R}$. Suma $\mathfrak{h}_0 \oplus i\mathfrak{h}_0$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ Kartano poalgebra.

Kiekviena kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra turi abiejų tipų realiąsias formas. Kurse „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ realiosios formos nenagrinėjamos, todėl šį faktą cituojame iš knygos Knapp Beyond, skyrelio VI.1 (Teorema 6.6, Išvada 6.10 ir Teorema 6.11).

Konstrukcija prasideda nuo *Ševalio bazės*. Šią bazę sudaro košaknys H_α ir šakniniai vektoriai E_α, kuriems $[E_\alpha, E_{-\alpha}] = H_\alpha$. Jos struktūrinės konstantos yra realiosios, o tiesinis atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis $E_\alpha \mapsto -E_{-\alpha}$ ir $H_\alpha \mapsto -H_\alpha$, yra automorfizmas. Knygoje Knapp Beyond šie vektoriai padauginami iš realiųjų daugiklių, bet toliau nagrinėjamų realiųjų tiesinių apvalkalų tai nekeičia. Ševalio bazės realusis tiesinis apvalkalas yra skeliamoji forma, o jos poalgebra $\mathfrak{h}_0$ yra vektorių H_α realusis tiesinis apvalkalas. Elementai iH_α, $E_\alpha - E_{-\alpha}$ ir $i(E_\alpha + E_{-\alpha})$ apvelka kompaktinę formą. Algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ atveju, kai $E_\alpha = E$, $E_{-\alpha} = F$ ir $H_\alpha = H$, šie elementai yra kito pavyzdžio matricos A, B ir C.

Pavyzdys 20.3 įrodo abu teiginius algebrai $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, o Teiginys 20.5 juos įrodo algebrai $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$. Bendrasis atvejis lieka cituojamas.

Pavadinimas „kompaktinė“ yra susijęs su kompaktinėmis grupėmis. Pagal 6-ąją paskaitą kompaktinės grupės Lie algebra turi Ad-invariantinę skaliarinę sandaugą, todėl kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$ yra antisimetrinis ir galioja nelygybė

$$\kappa(X,X) = \operatorname{tr}\left((\operatorname{ad} X)^2\right) \le 0.$$

Taigi realioji forma, kurios Kilingo forma įgyja teigiamą reikšmę, nėra kompaktinės grupės Lie algebra.

Pavyzdys 20.3 (Dvi algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ formos)**.** Algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ galioja lygybė $\kappa(X,Y) = 4\operatorname{tr}(XY)$. Imkime matricas

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tada $H^2 = I$, $(E+F)^2 = I$ ir $(E-F)^2 = -I$. Sandaugų

$$H(E+F) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H(E-F) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (E-F)(E+F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

pėdsakai lygūs nuliui. Todėl bazėje $(H, E+F, E-F)$, kuri yra algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ bazė, formos κ Gramo matrica yra $\operatorname{diag}(8,8,-8)$. Signatūra yra $(2,1)$. Realioji forma $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ yra skeliamoji su poalgebra $\mathfrak{h}_0 = \mathbb{R}H$, nes operatorius $\operatorname{ad} H$ turi tikrines vertes $2, 0, -2$, kurių tikriniai vektoriai yra atitinkamai E, H, F.

Kurse naudojama algebros $\mathfrak{su}(2)$ bazė yra

$$A = iH, \qquad B = E - F, \qquad C = i(E+F).$$

Todėl $\kappa(A,A) = i^2 \cdot 8 = -8$, $\kappa(C,C) = -8$ ir $\kappa(B,B) = -8$. Mišrieji nariai yra aukščiau gautų nulinių narių kartotiniai. Gramo matrica yra $-8I$, todėl algebra $\mathfrak{su}(2)$ yra kompaktinė. Signatūros $(2,1)$ ir $(0,3)$ skiriasi, todėl šios dvi realiosios formos nėra izomorfinės.

Abi pavyzdžio realiosios formos turi bendrą tiesę $\mathbb{R}B$. Skeliamoji forma prideda plokštumą $\operatorname{span}(H, E+F)$. Kompaktinė forma prideda plokštumą $i\operatorname{span}(H, E+F)$, kurią apvelka matricos A ir C. Taigi

$$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R}) = \mathbb{R}B \oplus \operatorname{span}(H, E+F), \qquad \mathfrak{su}(2) = \mathbb{R}B \oplus i\operatorname{span}(H, E+F).$$

Šį sąryšį tiksliai aprašo Kartano involiucija. Tegul dabar $\mathfrak{g}$ yra bet kuri realioji pusiau paprastoji Lie algebra. Formule $\kappa(X,Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} X \operatorname{ad} Y)$ apibrėžiama pačios algebros $\mathfrak{g}$ Kilingo forma. Algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ realiosios formos atveju ši forma yra aukščiau aprašytas apribojimas $\kappa|_{\mathfrak{g}}$.

Apibrėžimas 20.4. Algebros $\mathfrak{g}$ *Kartano involiucija* vadinamas Lie algebros automorfizmas θ, tenkinantis sąlygą $\theta^2 = \mathrm{id}$ ir toks, kad formule

$$\kappa_\theta(X,Y) = -\kappa(X,\theta Y)$$

apibrėžta forma algebroje $\mathfrak{g}$ yra teigiamai apibrėžta.

Forma κ_θ yra simetrinė. Kadangi θ yra automorfizmas, lygybė $[\theta X, Z] = \theta[X, \theta^{-1}Z]$ galioja visiems $Z \in \mathfrak{g}$. Taigi $\operatorname{ad}(\theta X) = \theta \operatorname{ad} X\, \theta^{-1}$. Todėl $\kappa(\theta X, \theta Y) = \operatorname{tr}(\theta \operatorname{ad} X \operatorname{ad} Y\, \theta^{-1}) = \kappa(X,Y)$. Pasinaudoję lygybe $\theta^2 = \mathrm{id}$ ir formos κ simetriškumu, gauname

$$\kappa(X,\theta Y) = \kappa(\theta X, \theta^2 Y) = \kappa(\theta X, Y) = \kappa(Y, \theta X).$$

Taigi $\kappa_\theta(X,Y) = \kappa_\theta(Y,X)$. Vadinasi, forma κ_θ yra skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{g}$, kaip reikalauja Skyrelyje 20.2 taikoma spektrinė teorema.

Simboliais $\mathfrak{k}$ ir $\mathfrak{p}$ žymėsime atitinkamai tikrines vertes $(+1)$ ir (-1) atitinkančius involiucijos θ tikrinius poerdvius. Kadangi $\theta^2 = \mathrm{id}$, turime $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$. Kadangi involiucija θ yra automorfizmas, galioja sąryšiai

$$[\mathfrak{k},\mathfrak{k}] \subset \mathfrak{k}, \qquad [\mathfrak{k},\mathfrak{p}] \subset \mathfrak{p}, \qquad [\mathfrak{p},\mathfrak{p}] \subset \mathfrak{k}.$$

Pavyzdžiui, kai $X, Y \in \mathfrak{p}$, gauname $\theta[X,Y] = [-X,-Y] = [X,Y]$. Iš knygos Knapp Beyond, skyrelio VI.2, cituojame, kad kiekviena realioji pusiau paprastoji Lie algebra turi Kartano involiuciją, kuri yra vienatinė vidinio automorfizmo tikslumu.

Teiginys 20.5. *Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$, o atvaizdavimas apibrėžtas formule $\theta(X) = -X^T$.*

(a) Atvaizdavimas θ yra Kartano involiucija. Čia $\mathfrak{k} = \mathfrak{so}(n)$, o erdvę $\mathfrak{p}$ sudaro realiosios simetrinės nulinio pėdsako matricos.

(b) Galioja lygybė $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p} = \mathfrak{su}(n)$, o algebra $\mathfrak{su}(n)$ yra algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ kompaktinė realioji forma.

(c) Nulinio pėdsako įstrižainines matricos sudaro maksimalųjį Abelio poerdvį $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} H$, kai $H \in \mathfrak{a}$, yra diagonalizuojamas virš $\mathbb{R}$. Todėl algebra $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ yra skeliamoji.

Įrodymas. (a) Akivaizdu, kad $\theta^2 = \mathrm{id}$. Šis atvaizdavimas yra automorfizmas, nes

$$[\theta X, \theta Y] = X^T Y^T - Y^T X^T = (YX - XY)^T = \theta[X,Y].$$

Algebroje $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ perimame lygybę $\kappa(X,Y) = 2n \operatorname{tr}(XY)$. Tada

$$\kappa_\theta(X,X) = 2n \operatorname{tr}(XX^T) = 2n \sum_{i,j} X_{ij}^2 > 0 \qquad (X \neq 0).$$

Tikrinių poerdvių aprašymai išplaukia tiesiogiai.

(b) Užrašykime matricą $Z \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$ pavidalu $Z = X + iY$, kur X, Y yra realiosios matricos. Tada $Z^* = X^T - iY^T$. Taigi lygybė $Z^* = -Z$ galioja tada ir tik tada, kai $X^T = -X$ ir $Y^T = Y$. Be

to, lygybė $\operatorname{tr} Z = 0$ galioja tada ir tik tada, kai $\operatorname{tr} Y = 0$, nes lygybė $\operatorname{tr} X = 0$ jau galioja. Todėl $\mathfrak{su}(n) = \mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$. Ši algebra yra realioji forma, nes

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) = (\mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}) \oplus i(\mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}) = (\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}) \oplus i(\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}).$$

Kiekvienai nenulinei matricai $Z \in \mathfrak{su}(n)$ gauname $\kappa(Z, Z) = 2n \operatorname{tr}(Z^2) = -2n \operatorname{tr}(Z^* Z) < 0$.

(c) Tegul matrica $H = \operatorname{diag}(h_1, \ldots, h_n)$, o simboliai E_{ij} žymi matricinius vienetus. Tada

$$[H, E_{ij}] = (h_i - h_j) E_{ij}.$$

Taigi operatorius $\operatorname{ad} H$ yra įstrižainis bazėje, kurią sudaro visos matricos E_{ij}, kai $i \neq j$, kartu su poerdvio $\mathfrak{a}$ baze. Šio operatoriaus tikrinės vertės yra realios. Maksimalumui įrodyti pasirinkime matricą $H \in \mathfrak{a}$, kurios įstrižainės elementai yra skirtingi. Jei matrica $Y \in \mathfrak{p}$ komutuoja su matrica H, tai $(h_i - h_j) Y_{ij} = 0$, todėl matrica Y yra įstrižaininė. Galiausiai poalgebra $\mathfrak{a} \oplus i\mathfrak{a}$ yra algebros $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ įstrižaininė Kartano poalgebra. ∎

Konstrukcija $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ iš Teiginio 20.5 dalies apie kompaktinę formą tinka ir bendruoju atveju. Jei atvaizdavimas θ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija, tai algebra $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ yra kompleksifikacijos $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompaktinė realioji forma. Čia algebros $\mathfrak{g}$ kompleksifikacija yra kompleksinė Lie algebra, kurios realioji forma yra $\mathfrak{g}$. Šis bendrasis faktas cituojamas iš knygos Knapp Beyond, skyrelių VI.1–VI.2. Algebrai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ ši konstrukcija duoda aukščiau pateiktą algebros $\mathfrak{su}(2)$ skaidinį.

20.2 Apribotosios šaknys ir globalieji skaidiniai

Fiksuokime realiąją pusiau paprastąją Lie algebrą $\mathfrak{g}$ su Kartano involiucija θ ir užrašykime $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$.

Lema 20.6. *Kai $X \in \mathfrak{p}$, operatorius $\operatorname{ad} X$ yra simetrinis formos κ_θ atžvilgiu.*

Įrodymas. Kadangi involiucija θ yra automorfizmas ir $\theta X = -X$, turime $[X, \theta Z] = -\theta[X, Z]$. Iš formos κ invariantiškumo gauname $\kappa([X, Y], W) = -\kappa(Y, [X, W])$. Todėl

$$\kappa_\theta([X, Y], Z) = \kappa(Y, [X, \theta Z]) = -\kappa(Y, \theta[X, Z]) = \kappa_\theta(Y, [X, Z]).$$ ∎

Pasirinkime maksimalųjį Abelio poerdvį $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$. Operatoriai $\operatorname{ad} H$, kai $H \in \mathfrak{a}$, komutuoja ir yra simetriniai formos κ_θ atžvilgiu. Pagal spektrinę teoremą jie yra kartu diagonalizuojami virš $\mathbb{R}$.

Apibrėžimas 20.7. Kiekvienam $\lambda \in \mathfrak{a}^*$ pažymėkime poerdvį

$$\mathfrak{g}_\lambda = \{X \in \mathfrak{g} : [H, X] = \lambda(H) X \text{ visiems } H \in \mathfrak{a}\}.$$

Apribotąja šaknimi vadinamas nenulinis funkcionalas λ, kuriam $\mathfrak{g}_\lambda \neq 0$. Algebros $\mathfrak{g}$ *realusis rangas* yra $\dim \mathfrak{a}$.

Šis pavadinimas susijęs su kompleksifikacijos $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ šaknimis. Imkime algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ Kartano poalgebrą, kurioje yra poerdvis $\mathfrak{a}$. Tada kiekviena apribotoji šaknis yra poerdvyje $\mathfrak{a}$ apribota

algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ šaknis. Pavyzdžiui, Skyrelyje 20.3 imame algebrą $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ ir poerdvį $\mathfrak{a} = \mathbb{R}H$ ir randame apribotąsias šaknis $\pm\lambda_1$, kur $\lambda_1(H) = 2$.

Fiksuokime elementą $H_0 \in \mathfrak{a}$, kuriam nelygybė $\lambda(H_0) \neq 0$ galioja visoms apribotosioms šaknims, kurių yra baigtinai daug. Toks elementas H_0 egzistuoja, nes erdvė $\mathfrak{a}$ nėra baigtinio skaičiaus hiperplokštumų $\ker\lambda$ sąjunga. Vadinkime šaknį λ teigiamąja, jei $\lambda(H_0) > 0$, ir apibrėžkime

$$\mathfrak{n} = \bigoplus_{\lambda(H_0)>0} \mathfrak{g}_\lambda.$$

Jakobio tapatybė duoda $[\mathfrak{g}_\lambda, \mathfrak{g}_\mu] \subset \mathfrak{g}_{\lambda+\mu}$. Todėl erdvė $\mathfrak{n}$ yra poalgebra. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$, kai $X \in \mathfrak{n}$, yra nilpotentinis, nes jis griežtai padidina reikšmę taške H_0.

Algebrai $\mathfrak{su}(n)$ tapatusis atvaizdavimas yra Kartano involiucija, nes forma $\kappa_{\mathrm{id}} = -\kappa$ yra teigiamai apibrėžta. Palyginkime dvi algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ formas lentelėje.

Realioji forma	θ	$\mathfrak{k}$	$\mathfrak{p}$	realusis rangas
$\mathfrak{su}(n)$, kompaktinė	id	$\mathfrak{su}(n)$	0	0
$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$, skeliamoji	$X \mapsto -X^T$	$\mathfrak{so}(n)$	nulinio pėdsako simetrinės	$n-1$

Algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ atveju, kai $H_0 = \operatorname{diag}(n-1, n-3, \ldots, 1-n)$, poalgebrą $\mathfrak{n}$ sudaro griežtai viršutinės trikampės matricos (Uždavinys 20.2).

Lentelėje nurodytas realusis rangas nepriklauso nuo involiucijos θ ir poerdvio $\mathfrak{a}$ pasirinkimo. Tai cituojame iš knygos Knapp Beyond, skyriaus VI. Pirmiausia fiksuokime involiuciją θ. Tada bet kurie du erdvės $\mathfrak{p}$ maksimalieji Abelio poerdviai yra jungtiniai. Vieną iš jų į kitą atvaizduoja baigtinė automorfizmų $e^{\operatorname{ad} Z}$, kur $Z \in \mathfrak{k}$, sandauga. Šis jungtinumas yra teiginys vien apie Lie algebrą $\mathfrak{g}$.

Toliau tegul θ' yra antroji algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija, kurios tikrinės vertės (-1) tikrinis poerdvis yra $\mathfrak{p}'$. Pagal Skyrelio 20.1 vienatinumo teiginį galioja lygybė $\theta' = \varphi\theta\varphi^{-1}$ su tam tikru vidiniu automorfizmu φ. Jei $\theta X = -X$, tai $\theta'(\varphi X) = \varphi\theta X = -\varphi X$. Simetriškai galioja lygybė $\theta = \varphi^{-1}\theta'\varphi$, todėl $\varphi^{-1}(\mathfrak{p}') \subseteq \mathfrak{p}$. Taigi automorfizmas φ erdvę $\mathfrak{p}$ atvaizduoja į visą erdvę $\mathfrak{p}'$. Kadangi atvaizdavimas φ yra Lie algebros automorfizmas, jis erdvės $\mathfrak{p}$ maksimaliuosius Abelio poerdvius atvaizduoja į erdvės $\mathfrak{p}'$ maksimaliuosius Abelio poerdvius. Todėl dimensija $\dim\mathfrak{a}$ nesikeičia.

Teorema 20.8 (Kartano ir Ivasavos skaidiniai; cituojama). *Tegul G yra jungi pusiau paprastoji Lie grupė, kurios centras yra baigtinis. Tegul θ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija su skaidiniu $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$, o K yra jungusis pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{k}$. Pasirinkime poerdvį $\mathfrak{a}$ ir poalgebrą $\mathfrak{n}$ kaip aukščiau ir pažymėkime aibes $A = \exp\mathfrak{a}$ bei $N = \exp\mathfrak{n}$. Tada:*

(a) pogrupis K yra kompaktinis ir atvaizdavimas $K \times \mathfrak{p} \to G$, $(k, X) \mapsto k\exp X$, yra difeomorfizmas;

(b) aibės A ir N yra uždarieji pogrupiai ir atvaizdavimas $K \times A \times N \to G$, $(k, a, n) \mapsto kan$, yra difeomorfizmas.

Įrodymai pateikiami Knapp Beyond skyreliuose VI.3 ir VI.4 arba P. Etingof, *Lie Groups and Lie Algebras*, MIT 18.755 paskaitų konspekte, paskaitose 15 ir 18. Baigtinio centro prielaida užtikrina, kad pogrupis K yra kompaktinis.

Grupės $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ atveju šie skaidiniai užrašo matricą kaip matricų sandaugą. Pavidalas $G = KAN$ yra QR skaidinys $g = k(an)$, kur matrica an yra viršutinė trikampė, o jos įstrižainės elementai yra teigiami. Jį duoda Gramo ir Šmito metodas (Uždavinys 20.2). Pavidalas $G = K\exp\mathfrak{p}$ yra skaidinys $g = kP$, kur matrica $P = \exp X$ yra simetrinė ir teigiamai apibrėžta. Tai yra matricos g poliarinis skaidinys, o lygybė $g^Tg = P^2 = \exp 2X$ nusako matricą P. Skyrelyje 20.3 abu pavidalus įrodysime grupei $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir taip pat gausime singuliariųjų reikšmių skaidinį $G = KAK$.

Realioji forma išlaiko algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ baigtinės dimensijos kompleksinius modulius, nes juos susieja apribojimas ir kompleksiškai tiesinis pratęsimas. Jų unitarumo realioji forma neišlaiko. Pavyzdžiui, grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ veikia erdvėje $V_m = \mathrm{Sym}^m\mathbb{C}^2$. Kai $m \geq 1$ ir $t \neq 0$, matrica $\mathrm{diag}(e^t, e^{-t})$ turi tikrinę vertę e^{mt} erdvėje V_m, o $|e^{mt}| \neq 1$. Todėl jokia skaliarinė sandauga nepaverčia erdvės V_m grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitariuoju įvaizdžiu, o grupė $\mathrm{SU}(2)$ tokią sandaugą turi pagal 5-ąją paskaitą. Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitariesiems įvaizdžiams sukonstruoti naudosime begalinės dimensijos erdves: 21-oje paskaitoje remsimės pogrupiu K, o 22-oje paskaitoje – skaidiniu KAN.

Fizikos kalba jungtinis veikimas sutapatina algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ su algebra $\mathfrak{so}(2,1)$. Tada poalgebrą $\mathfrak{k}$ atitinka sukimo generatorius, o poerdvį $\mathfrak{p}$ sudaro bustai. Sąryšis $[\mathfrak{p},\mathfrak{p}] \subset \mathfrak{k}$ sako, kad dviejų bustų komutatorius yra posūkis (24-oji paskaita).

20.3 Pirmojo rango modelis $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$

Tegul $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, o atvaizdavimas apibrėžtas formule $\theta(X) = -X^T$. Pagal Teiginyje 20.5 pateiktą algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ aprašymą gauname $\mathfrak{k} = \mathbb{R}(E-F)$ ir $\mathfrak{p} = \mathrm{span}(H, E+F)$. Imkime poerdvį $\mathfrak{a} = \mathbb{R}H$. Apribotosios šaknys yra $\pm\lambda_1$, kur $\lambda_1(H) = 2$. Be to, $\mathfrak{g}_{\lambda_1} = \mathbb{R}E$ ir $\mathfrak{g}_{-\lambda_1} = \mathbb{R}F$. Todėl realusis rangas lygus vienetui. Kai $H_0 = H$, gauname $\mathfrak{n} = \mathbb{R}E$. Pogrupius K, A ir N sudaro matricos

$$k_\varphi = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \qquad a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad n_x = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

t.y. $K = \mathrm{SO}(2) = \{k_\varphi\}$, $A = \{a_t\}$ ir $N = \{n_x\}$. Dabar Teoremos 20.8 (Kartano ir Ivasavos teoremos) išvadas įrodysime grupei G tiesiogiai, nesinaudodami šia teorema.

Teiginys 20.9 (Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ Ivasavos skaidinys). *Atvaizdavimas $K \times A \times N \to G$, $(k,a,n) \mapsto kan$, yra difeomorfizmas. Tiksliau, jei*

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in G, \qquad r = \sqrt{\alpha^2+\gamma^2},$$

tai $g = k_\varphi a_t n_x$, kur

$$\cos\varphi = \frac{\alpha}{r}, \qquad \sin\varphi = \frac{\gamma}{r}, \qquad e^t = r, \qquad x = \frac{\alpha\beta+\gamma\delta}{r^2}.$$

Įrodymas. Pirmasis matricos g stulpelis yra nenulinis, todėl $r > 0$. Tegul $k = k_\varphi$ su teiginyje nurodytu kampu φ. Tai yra Gramo ir Šmito metodas, pritaikytas matricos g stulpeliams.

Pasinaudoję lygybe $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, gauname

$$k^{-1}g = \frac{1}{r}\begin{pmatrix}\alpha & \gamma\\ -\gamma & \alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & \dfrac{\alpha\beta+\gamma\delta}{r}\\ 0 & \dfrac{1}{r}\end{pmatrix}.$$

Kita vertus,

$$a_t n_x = \begin{pmatrix} e^t & e^t x\\ 0 & e^{-t}\end{pmatrix}.$$

Šios matricos sutampa, kai $e^t = r$ ir $x = (\alpha\beta+\gamma\delta)/r^2$. Tai įrodo egzistavimą.

Vienatinumui įrodyti tarkime, kad $kan = k'a'n'$. Tada matrica $k'^{-1}k = a'n'(an)^{-1}$ yra ortogonalioji ir viršutinė trikampė, o jos įstrižainės elementai yra teigiami. Jos pirmasis stulpelis yra $(p,0)^T$, kur $p>0$, o jo ilgis lygus vienetui, todėl $p=1$. Antrasis stulpelis yra vienetinis vektorius, ortogonalus vektoriui $(1,0)^T$ ir turintis teigiamą antrąją komponentę, todėl jis lygus $(0,1)^T$. Vadinasi, $k=k'$ ir $an = a'n'$. Palyginę įstrižaines, gauname $a=a'$, o tada $n=n'$.

Daugybos atvaizdavimas yra glodus. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas aukščiau pateiktomis formulėmis, kurios glodžiai priklauso nuo matricos g elementų, nes $r>0$. ∎

Vadinasi, grupė G yra jungi ir difeomorfiška apskritimo ir erdvės $\mathbb{R}^2$ sandaugai. Taigi grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ tenkina Teoremos 20.8 (Kartano ir Ivasavos teoremos) prielaidas. Šios grupės centras yra $\{\pm I\}$.

Kartano skaidiniui reikės eksponentės erdvėje $\mathfrak{p}$. Apibrėžkime sveikąsias funkcijas

$$C(u) = \sum_{k\ge 0}\frac{u^k}{(2k)!}, \qquad \mathcal{S}(u) = \sum_{k\ge 0}\frac{u^k}{(2k+1)!}.$$

Kai $u = s^2 \ge 0$, šių funkcijų reikšmės yra $\cosh s$ ir $\sinh s/s$, o antrąją reikšmę laikome lygia 1, kai $s=0$. Naudojame kintamąjį $u=s^2$, o ne $s=\sqrt{-\det Y}$, nes dydis s nėra glodus taške $Y=0$. Simboliu $\mathcal{P}$ žymėsime aibę simetrinių teigiamai apibrėžtų 2×2 matricų, kurių determinantas lygus 1.

Lema 20.10. *Tegul matrica $Y\in\mathfrak{p}$ ir $u = -\det Y \ge 0$. Tada $Y^2 = uI$ ir*

$$\exp Y = C(u)I + \mathcal{S}(u)Y.$$

Atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{p}\to\mathcal{P}$ yra bijekcija. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas formule

$$L(Q) = \frac{Q - cI}{\mathcal{S}(C^{-1}(c))}, \qquad c = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} Q,$$

ir ši atvirkštinio atvaizdavimo formulė apibrėžia glodų atvaizdavimą tam tikroje aibės $\mathcal{P}$ aplinkoje simetrinių matricų erdvėje.

Įrodymas. Užrašykime matricą $Y = \begin{pmatrix} p & q\\ q & -p\end{pmatrix}$. Tada $Y^2 = (p^2+q^2)I = uI$. Išskaidę eksponentės eilutę į lyginius ir nelyginius laipsnius, gauname lemoje nurodytą formulę. Matrica $\exp Y = (\exp\frac{Y}{2})^2$ yra apgręžiamos simetrinės matricos kvadratas. Todėl matrica $\exp Y$ yra teigiamai apibrėžta. Be to, $\det\exp Y = e^{\operatorname{tr} Y} = 1$.

Visi funkcijos C' laipsnių eilutės koeficientai yra teigiami, todėl $C' > 0$ intervale $(0, \infty)$. Be to, $C'(0) = \frac{1}{2}$. Todėl $C' > 0$ kuriame nors intervale $(-\varepsilon, \infty)$. Taigi funkcija C yra griežtai didėjanti bijekcija $[0, \infty) \to [1, \infty)$, kurios atvirkštinė funkcija yra glodi aibės $[1, \infty)$ aplinkoje. Taip pat $\mathcal{S} > 0$ tam tikroje aibės $[0, \infty)$ aplinkoje.

Injektyvumui įrodyti tegul $Q = \exp Y$. Tada $\operatorname{tr} Q = 2C(u)$. Ši lygybė vienareikšmiškai nusako skaičių u, nes funkcija C yra griežtai didėjanti intervale $[0, \infty)$. Iš matricos $\exp Y$ formulės gauname $Y = (Q - C(u)I)/\mathcal{S}(u) = L(Q)$.

Siurjektyvumui įrodyti tegul matrica $Q \in \mathcal{P}$ turi tikrines vertes $\mu, \mu^{-1} > 0$. Tada $c = \frac{1}{2}(\mu + \mu^{-1}) \geq 1$. Tegul $u = C^{-1}(c)$ ir $Y = L(Q)$. Gautoji matrica Y yra simetrinė ir nulinio pėdsako. Pagal Keilio ir Hamiltono teoremą galioja lygybė $Q^2 = 2cQ - I$, todėl $(Q - cI)^2 = (c^2 - 1)I$. Kadangi $u\,\mathcal{S}(u)^2 = C(u)^2 - 1 = c^2 - 1$, gauname $Y^2 = uI$. Todėl

$$\exp Y = C(u)I + \mathcal{S}(u)Y = cI + (Q - cI) = Q. \qquad \blacksquare$$

Teiginys 20.11 (Grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ Kartano skaidinys). *Atvaizdavimas $K \times \mathfrak{p} \to G$, $(k, X) \mapsto k \exp X$, yra difeomorfizmas. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas formule*

$$g \mapsto \bigl(g \exp(-X),\, X\bigr), \qquad X = \tfrac{1}{2} L(g^T g).$$

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad $g = k \exp X$, kur $k \in K$. Kadangi matrica X yra simetrinė, matrica $\exp X$ taip pat yra simetrinė. Be to, matrica k yra ortogonalioji. Todėl

$$g^T g = \exp(X) k^T k \exp(X) = \exp(2X).$$

Pagal eksponentės Lemą 20.10 galioja lygybė $2X = L(g^T g)$, todėl matrica X, o tada ir matrica k yra vienareikšmiškai nusakytos. Atvirkščiai, tegul duotas elementas g. Tada matrica $g^T g$ priklauso aibei $\mathcal{P}$. Apibrėžkime matricas X ir $k = g \exp(-X)$ kaip teiginyje. Tada

$$k^T k = \exp(-X) \exp(2X) \exp(-X) = I, \qquad \det k = 1,$$

todėl $k \in K$. Pagal eksponentės Lemą 20.10 atvaizdavimas ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra glodūs. $\blacksquare$

Išvada 20.12 ($G = KAK$). *Kiekvieną elementą $g \in G$ galima užrašyti pavidalu $g = k_1 a_t k_2$, kur $k_1, k_2 \in K$ ir $t \geq 0$, o skaičius t šiame užraše yra vienatinis. Skaičius e^{2t} yra didesnioji matricos $g^T g$ tikrinė vertė. Todėl skaičius e^t yra didesnioji matricos g singuliarioji reikšmė.*

Įrodymas. Užrašykime $g = k \exp X$. Simetrinė nulinio pėdsako matrica X turi tikrines vertes $\pm t$, kur $t \geq 0$. Paimkime ortonormuotą tikrinių vektorių bazę, surikiuotą tvarka $(+t, -t)$, ir, jei reikia, pakeiskime vieną vektorių priešingu. Taip gauname matricą $k' \in K$, kuriai $X = k'(tH)k'^{-1}$. Tada $\exp X = k' a_t k'^{-1}$ ir $g = (kk') a_t k'^{-1}$. Jei $g = k_1 a_t k_2$, tai $g^T g = k_2^{-1} a_{2t} k_2$. Ši matrica turi tikrines vertes $e^{\pm 2t}$, todėl skaičius t yra vienareikšmiškai nusakytas. $\blacksquare$

Pavyzdys 20.13. Apskaičiuosime Ivasavos, Kartano ir KAK skaidinių duomenis apatinei trikampei unipotentinei matricai

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kartano skaidinio duomenys išreiškiami aukso pjūviu $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Prisiminkime, kad $\tau + \tau^{-1} = \sqrt{5}$ ir $\tau - \tau^{-1} = 1$.

Ivasavos skaidinys. Čia $r = \sqrt{2}$, todėl $k = k_{\pi/4}$, $e^t = \sqrt{2}$ ir $x = \frac{1}{2}$. Patikrinkime:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}.$$

Kartano skaidinys. Čia

$$Q = g^T g = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}.$$

Pusė matricos Q pėdsako yra $c = \frac{3}{2}$. Lygtis $C(u) = \cosh\sqrt{u} = \frac{3}{2}$ duoda $\sqrt{u} = 2\log\tau$, nes $\tau^2 + \tau^{-2} = 3$. Be to, $\sinh\sqrt{u} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Todėl

$$X = \frac{1}{2}L(Q) = \frac{2\log\tau}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 1\\ 1 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix} = \frac{\log\tau}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{pmatrix}.$$

Dabar $-\det X = (\log\tau)^2$, todėl eksponentės Lema 20.10 duoda

$$\exp X = \frac{\sqrt{5}}{2}I + \frac{1}{2\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}.$$

Tada

$$k = g\exp(-X) = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 3\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix} \in \mathrm{SO}(2).$$

Matricos X tikrinės vertės yra $\pm\log\tau$. Todėl, kaip ir *KAK* Išvados 20.12 įrodyme, *KAK* parametras, atitinkantis matricą g, yra $t = \log\tau$.

20.4 Viršutinė pusplokštuma

Tegul viršutinė pusplokštuma yra $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$. Matricai g, kurios elementus žymime raidėmis $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ kaip Ivasavos skaidinyje (Teiginys 20.9), apibrėžkime

$$g \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}.$$

Lema 20.14. *Visiems $z \in \mathbb{H}$ galioja nelygybė $\gamma z + \delta \neq 0$ ir lygybė*

$$\operatorname{Im}(g \cdot z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|\gamma z + \delta|^2}.$$

Taip apibrėžiamas grupės G veikimas aibėje $\mathbb{H}$. Taško i stabilizatorius yra pogrupis K, o elementas $-I$ veikia trivialiai.

Įrodymas. Jei $\gamma \neq 0$, tai tiesinio polinomo $\gamma z + \delta$ šaknis yra reali. Jei $\gamma = 0$, tai $\delta \neq 0$. Toliau

$$g \cdot z = \frac{(\alpha z + \beta)(\gamma \bar{z} + \delta)}{|\gamma z + \delta|^2},$$

ir skaitiklio menamoji dalis yra $(\alpha\delta - \beta\gamma)\operatorname{Im} z = \operatorname{Im} z$.

Veikimo dėsniui įrodyti pažymėkime santykį $[v] = v_1/v_2$ vektoriams $v \in \mathbb{C}^2$, kurių $v_2 \neq 0$. Tada $g \cdot z = [g(z,1)^T]$ ir $[\lambda v] = [v]$ visiems $\lambda \neq 0$. Jei matricos h apatinė eilutė yra (γ', δ'), tai $h(z,1)^T = (\gamma' z + \delta')(h \cdot z, 1)^T$. Todėl

$$(gh) \cdot z = [gh(z,1)^T] = [g(h \cdot z, 1)^T] = g \cdot (h \cdot z).$$

Jei $g \cdot i = i$, tai $\alpha i + \beta = -\gamma + \delta i$. Todėl $\alpha = \delta$ ir $\beta = -\gamma$, o $\alpha^2 + \gamma^2 = 1$. Kitaip tariant, $g = k_\varphi$. Atvirkščiai, $k_\varphi \cdot i = ie^{i\varphi}/e^{i\varphi} = i$. Galiausiai $(-I) \cdot z = z$. ∎

Paėmę abiejų lygybės $g^{-1} = kan$ pusių atvirkštinius elementus, gauname $g = n^{-1}a^{-1}k^{-1}$. Todėl Ivasavos skaidinys (Teiginys 20.9) duoda ir vienatinį skaidinį $G = NAK$.

Teiginys 20.15. *Tegul $g = n_x a_t k$. Tada*

$$g \cdot i = x + ie^{2t}, \qquad x = \frac{\alpha\gamma + \beta\delta}{\gamma^2 + \delta^2}, \qquad e^{2t} = \frac{1}{\gamma^2 + \delta^2}.$$

Atvaizdavimas $n_x a_t \mapsto n_x a_t \cdot i$ yra difeomorfizmas $NA \to \mathbb{H}$. Atvaizdavimas $gK \mapsto g \cdot i$ yra bijekcija $G/K \to \mathbb{H}$.

Šie skaičiai x ir t nėra matricos g Ivasavos skaidinio (Teiginys 20.9) parametrai. Iš lygybės $g = n_x a_t k$ gauname $g^{-1} = k^{-1}a_{-t}n_{-x}$. Todėl jie yra priešingi elemento g^{-1} parametrams skaidinyje $G = KAN$.

Įrodymas. Turime $a_t \cdot z = e^{2t}z$ ir $n_x \cdot z = z + x$. Kadangi $k \cdot i = i$, gauname $n_x a_t k \cdot i = x + ie^{2t}$. Nurodytos skaičių x ir e^{2t} formulės gaunamos palyginus realiąsias ir menamąsias dalis tiesioginiame skaičiavime

$$g \cdot i = \frac{(\alpha i + \beta)(\delta - \gamma i)}{\gamma^2 + \delta^2} = \frac{\alpha\gamma + \beta\delta + i}{\gamma^2 + \delta^2}.$$


Atvaizdavimo $(x,t) \mapsto x + ie^{2t}$ atvirkštinis atvaizdavimas $z \mapsto (\operatorname{Re} z, \frac{1}{2}\log \operatorname{Im} z)$ yra glodus. Galiausiai pagal Lemos 20.14 teiginį apie stabilizatorių lygybė $g \cdot i = g' \cdot i$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{-1}g' \in K$. ∎

Grupės G veikimas pusplokštumoje $\mathbb{H}$ yra glodus ir tranzityvus. Todėl pagal 3-iosios paskaitos vienalyčių erdvių teoremą bijekcija $G/K \to \mathbb{H}$ yra difeomorfizmas.

Taigi Ivasavos koordinatės yra Dekarto koordinatės (x,y), kur $y = e^{2t}$. Čia pogrupis N veikia horizontaliais postūmiais, o pogrupis A – tempimais taško 0 atžvilgiu. Pogrupis NA veikia afiniais atvaizdavimais $z \mapsto e^{2t}z + x$. Uždavinyje 20.6 šis pogrupis sutapatinamas su 16-osios paskaitos afinine grupe. Šiuo sutapatinimu 16-osios paskaitos kairysis Haro matas $dy\,db/y^2$ virsta matu $dx\,dy/y^2$ pusplokštumoje $\mathbb{H}$.

Skaidinys KAK aprašo pusplokštumą $\mathbb{H}$ pogrupio K orbitomis. Jei $g \cdot i = z$ ir $g = k_1 a_t k_2$, tai $z = k_1 \cdot (ie^{2t})$. Skaičius $t \geq 0$ priklauso tik nuo taško z, nes pakeitus elementą g elementu gk, matricos $g^T g$ tikrinės vertės nesikeičia. Taigi pusplokštuma $\mathbb{H}$ yra nesikertančių pogrupio K orbitų, einančių per taškus ie^{2t}, kur $t \geq 0$, sąjunga. Uždavinyje 20.5 parodoma, kad šios orbitos yra Euklido apskritimai.

Abu aprašymus vaizduoja 20.1 pav. Jame pažymėtas taškas $g \cdot i = \frac{1}{2}(1+i)$, atitinkantis Pavyzdžio 20.13 matricą g. Šio taško Ivasavos koordinatės yra $x = \frac{1}{2}$ ir $e^{2t} = \frac{1}{2}$. Jo KAK parametras yra $t = \log \tau$, todėl šis taškas yra pogrupio K orbitoje, einančioje per tašką $i\tau^2$. Atvaizdavimo $z \mapsto k_\varphi \cdot z$ išvestinė taške i yra $e^{-2i\varphi}$, todėl elementas k_φ, kai $\varphi > 0$, suka aplink tašką i pagal laikrodžio rodyklę.



20.1 pav.: Koordinatės pusplokštumoje $\mathbb{H}$ ir apatinės trikampės matricos pavyzdžio taškas $g \cdot i$. Pirmojoje dalyje pavaizduotos pogrupio N orbitos (horizontaliosios tiesės), pogrupio A orbitos (spinduliai iš taško 0, tarp jų menamoji ašis, einanti per tašką i) ir paryškintas kelias, einantis iš taško i pirmiausia pogrupio A, paskui pogrupio N orbita. Antrojoje dalyje pavaizduotos pogrupio K orbitos (apskritimai ir pats taškas i), o rodyklės rodo elemento k_φ, kai $\varphi > 0$, veikimą.

20.5 Savikontrolė

1. Kokie yra algebrų $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ ir $\mathfrak{su}(n)$ realieji rangai? Kokie yra pogrupiai A ir N grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju?
   Atsakymas. Algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ realusis rangas yra $n-1$, o algebros $\mathfrak{su}(n)$ realusis rangas yra 0. Grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju poerdvis $\mathfrak{p} = 0$, todėl $A = N = \{I\}$, o Ivasavos skaidinys tampa lygybe $G = K$.

2. Raskite matricos $g = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ Ivasavos skaidinį.
   Atsakymas. Čia $r = 1$, $\cos\varphi = 0$ ir $\sin\varphi = -1$, todėl $k = k_{-\pi/2}$ ir $a = I$. Be to, $x = (0 \cdot 1 + (-1) \cdot 2)/1 = -2$. Tai patvirtina sandauga
   $$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Kaip elementas $-I$ užrašomas skaidinyje $G = KAN$ ir kaip jis veikia pusplokštumą $\mathbb{H}$?
   Atsakymas. Skaidinyje $G = KAN$ elemento $-I$ veiksniai yra $k = k_\pi$ ir $a = n = I$. Elementas $-I$ pusplokštumą $\mathbb{H}$ veikia trivialiai. Todėl veikimas faktorizuojasi per faktorgrupę $G/\{\pm I\}$.

Santrauka

Kartano involiucija duoda skaidinį $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$. Algebra $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompaktinė forma. Šios kompaktinės formos realusis rangas lygus nuliui. Skeliamosios formos $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ realusis rangas yra $n-1$. Jungioms pusiau paprastosioms grupėms, kurių centras yra baigtinis, cituota Kartano ir Ivasavos teorema duoda skaidinius $G = K \exp \mathfrak{p}$ ir $G = KAN$. Grupei $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ abu skaidinius įrodėme su išreikštiniais atvirkštiniais atvaizdavimais. Pusplokštumoje $\mathbb{H}$, sutapatintoje su gretutinių klasių erdve G/K, pogrupis NA suteikia Dekarto koordinates. Skaidinys KAK aprašo pusplokštumą $\mathbb{H}$ kaip nesikertančių pogrupio K orbitų, einančių per taškus ie^{2t}, kur $t \geq 0$, sąjungą.

Literatūra

- Knapp Beyond, skyrius VI, skyreliai 1–4: kompaktinės realiosios formos, Kartano skaidinys Lie algebros ir grupės lygmenyse bei Ivasavos skaidinys.
- P. Etingof, *Lie Groups and Lie Algebras*, MIT 18.755 paskaitų konspektas, paskaitos 15 ir 18: kitas realiųjų formų ir šių skaidinių dėstymas.
- Skaidinys $G = KAN$ naudojamas 22-oje paskaitoje pagrindinei serijai sukonstruoti.

Paskaita 21

Glodieji vektoriai, K-tipai ir $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai

Tikslai. *Nekompaktinės grupės įvaizdis paprastai veikia begalinės dimensijos Hilberto erdvėje. Naudosime jo išvestines, veikiančias glodžiuosius vektorius. Bendruoju atveju šie operatoriai yra neaprėžti, o glodžiųjų vektorių erdvė neturi patogios bazės. Tegul K yra kompaktinis pogrupis. Jei apribojimas $\Pi|_K$ yra unitarusis, tai pagal 10-ąją paskaitą Hilberto erdvė išsiskaido į blokų Hilberto sumą, po vieną bloką kiekvienam K-tipui. Todėl pereisime prie glodžiųjų vektorių, kurie yra baigtiniai pogrupio K atžvilgiu. Lie algebra $\mathfrak{g}$ ir pogrupis K šiuos vektorius veikia kartu, o šie du veikimai tenkina suderinamumo sąlygas. Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ su pogrupiu $K = \mathrm{SO}(2)$ atveju įvaizdžio tyrimas virsta kėlimo ir leidimo skaičiavimu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti glodžiuosius vektorius, K-baigtinius vektorius, K-tipus ir leistinumą.
- Įrodyti, kad stipriai tolydaus įvaizdžio, veikiančio Hilberto erdvėje, K-baigtiniai glodieji vektoriai sudaro $(\mathfrak{g}, K)$-modulį.
- Taikyti suderinamumo sąlygas ir parodyti, kad elementai E ir F apskritimo K-tipus grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ atveju perstumia per ± 2.
- Nurodyti, kuriuos globaliuosius klausimus $(\mathfrak{g}, K)$-modulis palieka atvirus ir kurios cituojamos teoremos juos sprendžia.

21.1 Glodieji vektoriai ir K-baigtiniai vektoriai

Visoje paskaitoje G yra Lie grupė, o $\mathfrak{g}$ yra jos Lie algebra. Pogrupis $K \subseteq G$ yra kompaktinis, o jo Lie algebra yra $\mathfrak{k} \subseteq \mathfrak{g}$. Įvaizdis Π, kuriuo grupė G veikia Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, yra stipriai tolydus. Čia kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra aprėžtas, tiesinis ir apgręžiamas. Atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)v$ iš grupės G į erdvę $\mathcal{H}$ yra tolydus kiekvienam vektoriui $v \in \mathcal{H}$. Unitarumo prielaidą darome tik ten, kur ji nurodyta.

Apibrėžimas 21.1. Vektorius $v \in \mathcal{H}$ vadinamas *glodžiuoju*, jei orbitos atvaizdavimas $G \to \mathcal{H}$, $g \mapsto \Pi(g)v$, yra glodus. Tai reiškia, kad kiekviename koordinačių žemėlapyje visos pakartotinės dalinės išvestinės egzistuoja kaip ribos pagal normą ir yra tolydžios. Glodžiųjų vektorių aibę žymėsime simboliu $\mathcal{H}^\infty$. Vektoriui $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir elementui $X \in \mathfrak{g}$ apibrėžiame

$$d\Pi(X)v = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Pi(\exp tX)v.$$

Aibė $\mathcal{H}^\infty$ yra erdvės $\mathcal{H}$ poerdvis, nes glodžiųjų orbitos atvaizdavimų tiesinis darinys yra glodus.

Unitariesiems įvaizdžiams toliau pateikti faktai buvo perimti 15-oje paskaitoje. Dabar tirštumo ir invariantiškumo faktus (F1)–(F2) perimame ir stipriai tolydiems įvaizdžiams, kurių operatoriai yra aprėžti. Šią bendresnę glodžiųjų vektorių teoremą galima rasti knygos Knapp RT skyreliuose III.3–4. Čia Knapp RT žymi knygą A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples* (2001).

(F1) *Tirštumas* (Gordingas). Erdvė $\mathcal{H}^\infty$ yra tiršta erdvėje $\mathcal{H}$.

(F2) *Invariantiškumas.* Kiekvienas operatorius $d\Pi(X)$ atvaizduoja erdvę $\mathcal{H}^\infty$ į ją pačią, o atvaizdavimas $X \mapsto d\Pi(X)$ yra Lie algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}^\infty$.

(F3) *Antisimetriškumas.* Jei įvaizdis Π yra unitarusis, tai galioja lygybė $\langle d\Pi(X)u, w\rangle = -\langle u, d\Pi(X)w\rangle$ visiems $X \in \mathfrak{g}$ ir $u, w \in \mathcal{H}^\infty$.

Atvaizdavimą $d\Pi$ kompleksiškai tiesiškai pratęsiame į algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ formule $d\Pi(X + iY) = d\Pi(X) + i\,d\Pi(Y)$, kur $X, Y \in \mathfrak{g}$. Pagal invariantiškumo savybę (F2) šis pratęsinys yra algebros $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}^\infty$.

Čia įrodysime vieną elementarų faktą. Jei $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir $h \in G$, tai $\Pi(h)v \in \mathcal{H}^\infty$. Iš tiesų vektoriaus $\Pi(h)v$ orbitos atvaizdavimas yra $g \mapsto \Pi(gh)v$. Šis atvaizdavimas yra vektoriaus v orbitos atvaizdavimo ir glodaus dešiniojo postūmio $g \mapsto gh$ kompozicija.

Apibrėžimas 21.2. Vektorius $v \in \mathcal{H}$ vadinamas *K-baigtiniu*, jei tiesinis apvalkalas $\operatorname{span}\{\Pi(k)v : k \in K\}$ yra baigtinės dimensijos. Simboliu $\mathcal{H}_K$ žymėsime K-baigtinių vektorių aibę.

Aibė $\mathcal{H}_K$ yra poerdvis, nes, kai $a, b \in \mathbb{C}$, vektorių $\Pi(k)(av + bw)$, kur $k \in K$, tiesinis apvalkalas yra poerdvio $\operatorname{span}\Pi(K)v + \operatorname{span}\Pi(K)w$ poerdvis.

Tegul $\widehat{K}$ yra grupės K neredukuojamų tolydžiųjų įvaizdžių ekvivalentumo klasių aibė. Kiekviena klasė δ turi baigtinės dimensijos atstovo erdvę V_δ (10-oji paskaita). Tegul $\operatorname{Hom}_K(V_\delta, \mathcal{H})$ yra erdvė, kurią sudaro tiesiniai atvaizdavimai $V_\delta \to \mathcal{H}$, komutuojantys su grupe K.

Apibrėžimas 21.3. Klasės $\delta \in \widehat{K}$ *kartotinumas* įvaizdyje Π yra $m_\delta(\Pi) = \dim \operatorname{Hom}_K(V_\delta, \mathcal{H})$. Klasė δ vadinama *K-tipu* įvaizdyje Π, jei $m_\delta(\Pi) \geq 1$. Įvaizdis Π vadinamas *leistinu*, jei nelygybė $m_\delta(\Pi) < \infty$ galioja kiekvienam $\delta \in \widehat{K}$.

Tegul $v \in \mathcal{H}_K$ ir $W_v = \operatorname{span}\Pi(K)v$. Tada poerdvis W_v yra baigtinės dimensijos ir K-invariantinis. Visos poerdvio W_v normos yra ekvivalenčios, todėl dėl stipriojo tolydumo grupė K poerdvyje W_v veikia tolydžiai. Pagal visišką redukuojamumą (5-oji paskaita) poerdvis W_v yra neredukuojamų poerdvių tiesioginė suma. Todėl kiekvienas K-baigtinis vektorius yra baigtinė vektorių, priklausančių K-tipams, suma.

Apskritimo elementus žymėsime simboliais k_θ, kur $\theta \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, taip, kad $k_\theta k_\phi = k_{\theta+\phi}$. Apskritimo neredukuojamieji tolydieji įvaizdžiai yra charakteriai, apibrėžti formule $\chi_n(k_\theta) = e^{in\theta}$, kur $n \in \mathbb{Z}$ (7-oji paskaita). Žymėsime K-tipą χ_n skaičiumi n.

Pavyzdys 21.4. Tegul $G = K = \mathrm{SO}(2)$ ir $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, o skaliarinė sandauga ir įvaizdis

yra apibrėžti formulėmis

$$\langle f, h\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \overline{f(x)}\, h(x)\, dx, \qquad (\Pi(k_\theta)f)(x) = f(x+\theta).$$

Šis įvaizdis yra unitarusis ir stipriai tolydus. Funkcijos, apibrėžtos formule $e_n(x) = e^{inx}$, sudaro ortonormuotą bazę (10-oji paskaita). Apibrėžkime aibę $\mathcal{H}(n) = \{v : \Pi(k_\theta)v = e^{in\theta}v \text{ visiems } \theta\}$. Tada funkcija $e_n \in \mathcal{H}(n)$.

Parodysime, kad aibė $\mathcal{H}(n) = \mathbb{C}e_n$. Apibrėžkime funkcionalus formule $a_m(v) = \langle e_m, v\rangle$. Tolydžiai funkcijai v keitinys $y = x + \theta$ ir periodiškumas duoda

$$a_m(\Pi(k_\theta)v) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-im(y-\theta)}v(y)\, dy = e^{im\theta}a_m(v).$$

Abi tapatybės pusės yra tolydūs tiesiniai vektoriaus v funkcionalai, todėl dėl tirštumo ši tapatybė galioja visiems erdvės L^2 vektoriams. Jei $v \in \mathcal{H}(n)$, tai kairioji pusė taip pat lygi $e^{in\theta}a_m(v)$. Kai $m \neq n$, imkime $\theta = \pi/(m-n)$. Tada $e^{im\theta} = -e^{in\theta}$, todėl $a_m(v) = 0$. Vadinasi, $v = a_n(v)e_n$.

Taigi poerdvis $\mathcal{H}_K$ yra trigonometrinių polinomų $f = \sum_{|n|\le N} c_n e_n$ erdvė. Kiekvienas toks polinomas f yra glodus, nes jo orbitos atvaizdavimas

$$\theta \mapsto \Pi(k_\theta)f = \sum_{|n|\le N} c_n\, e^{in\theta}\, e_n$$

yra baigtinė glodžių skaliarinių funkcijų ir fiksuotų vektorių sandaugų suma. Vadinasi, kiekvienas K-baigtinis vektorius yra glodus. Kiekvienas kartotinumas lygus 1, todėl įvaizdis Π yra leistinas. Poerdvis $\mathcal{H}_K$ yra tirštas, bet nesutampa su visa erdve. Pavyzdžiui, vektorius $\sum_n 2^{-|n|}e_n$ nėra K-baigtinis.

Ne kiekvienas K-baigtinis vektorius yra glodus. Tegul grupė $G = \mathbb{R}$ veikia erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ postūmiais ir tegul $K = \{0\}$. Kiekvienas vektorius yra K-baigtinis. Intervalo $[0,1]$ indikatorinė funkcija nėra glodi (Uždavinys 21.5). Tuos pačius skirtuminius santykius skaičiuoja 15-osios paskaitos apibrėžimo srities pavyzdys. Todėl reikalaujame abiejų sąlygų. Simboliu $\mathcal{H}_K^\infty$ žymėsime glodžiųjų K-baigtinių vektorių erdvę:

$$\mathcal{H}_K^\infty = \mathcal{H}^\infty \cap \mathcal{H}_K.$$

21.2 Suderinamumo sąlygos

Apibrėžimas 21.5. Vadiname $(\mathfrak{g}, K)$-*moduliu* kompleksinę tiesinę erdvę V kartu su Lie algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdžiu erdvėje V, užrašomu $v \mapsto X \cdot v$, ir grupių homomorfizmu $K \to \mathrm{GL}(V)$, užrašomu $v \mapsto k \cdot v$, tokiais, kad:

(a) (*baigtinumo sąlyga*) kiekvienas vektorius $v \in V$ priklauso kokiam nors baigtinės dimensijos K-invariantiniam poerdviui W, kuriame grupė K veikia tolydžiai;

(b) (*išvestinės sąlyga*) visiems $X \in \mathfrak{k}$ ir $v \in V$, imant poerdvį W kaip baigtinumo sąlygoje (a),

$$X \cdot v = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \exp(tX) \cdot v \qquad \text{(išvestinė skaičiuojama poerdvyje } W\text{)};$$

(c) (*kovariantiškumo sąlyga*) visiems $k \in K$, $X \in \mathfrak{g}$ ir $v \in V$,

$$k \cdot (X \cdot v) = (\mathrm{Ad}(k)X) \cdot (k \cdot v).$$

Morfizmu tarp $(\mathfrak{g}, K)$-modulių vadinamas tiesinis atvaizdavimas, kuris komutuoja su abiem veikimais. Sakome, kad $(\mathfrak{g}, K)$-modulis V yra *leistinas*, jei nelygybė $\dim \mathrm{Hom}_K(V_\delta, V) < \infty$ galioja kiekvienam $\delta \in \widehat{K}$.

Išvestinės sąlygoje (b) apibrėžta išvestinė nepriklauso nuo poerdvio W pasirinkimo. Iš tiesų abu galimi pasirinkimai W ir W' yra baigtinės dimensijos erdvės $W + W'$ poerdviai, o visos erdvės $W + W'$ normos yra ekvivalenčios.

Algebros $\mathfrak{g}$ veikimas kompleksiškai tiesiškai pratęsiamas į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Abi kovariantiškumo sąlygos (c) pusės yra kompleksiškai tiesinės pagal kintamąjį X, todėl kovariantiškumo sąlyga galioja ir visiems elementams $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$.

Išvestinės sąlygoje (b) dalyvauja tik elementai $\exp(tX)$, kurie priklauso grupės K neutraliojo elemento komponentei. Todėl, jei grupė K nėra jungi, tai grupės K veikimas turi informacijos, kurios Lie algebra $\mathfrak{k}$ negali aptikti (Uždavinys 21.7).

Kovariantiškumo sąlyga (c) aprašo, kaip grupės K veikimas transformuoja algebros $\mathfrak{g}$ veikimą. Skyrelyje 21.3 ši sąlyga duoda apskritimo K-tipų poslinkius grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ atveju.

Teiginys 21.6. *Tegul Π yra grupės G stipriai tolydus įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$ ir tegul pogrupis $K \subseteq G$ yra kompaktinis. Tada erdvė $\mathcal{H}_K^\infty$ yra invariantinė operatorių $\Pi(k)$ atžvilgiu, kai $k \in K$, ir operatorių $d\Pi(X)$ atžvilgiu, kai $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Su šiais veikimais erdvė $\mathcal{H}_K^\infty$ yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis. Tegul Π' yra grupės G stipriai tolydus įvaizdis Hilberto erdvėje $\mathcal{H}'$. Tegul operatorius $T : \mathcal{H} \to \mathcal{H}'$ yra aprėžtas ir tiesinis, o lygybė $T\Pi(g) = \Pi'(g)T$ galioja visiems $g \in G$. Tada operatorius T atvaizduoja erdvę $\mathcal{H}_K^\infty$ į erdvę $\mathcal{H}_K'^\infty$, o jo apribojimas yra morfizmas.*

Įrodymas. Žingsnis 1: grupės K veikimas. Tegul $v \in \mathcal{H}_K^\infty$ ir $k \in K$. Tada pagal Skyrelyje 21.1 pateiktą argumentą su dešiniuoju postūmiu vektorius $\Pi(k)v$ yra glodus. Kadangi $Kk = K$, tai

$$\mathrm{span}\, \Pi(K)\Pi(k)v = \mathrm{span}\, \Pi(Kk)v = \mathrm{span}\, \Pi(K)v,$$

o šis apvalkalas yra baigtinės dimensijos. Taigi vektorius $\Pi(k)v \in \mathcal{H}_K^\infty$. Vadinasi, visas tiesinis apvalkalas $W_v = \mathrm{span}\, \Pi(K)v$ yra erdvės $\mathcal{H}_K^\infty$ poaibis.

Žingsnis 2: kovariantiškumo tapatybė. Tegul $k \in K$, $X \in \mathfrak{g}$ ir $w \in \mathcal{H}^\infty$. Teigiame, kad

$$\Pi(k)\, d\Pi(X) w = d\Pi(\mathrm{Ad}(k)X)\, \Pi(k) w. \tag{21.1}$$

Pagal eksponentės jungtinimo formulę (2-oji paskaita) galioja lygybė $k \exp(tX) k^{-1} = \exp(t\,\mathrm{Ad}(k)X)$. Todėl, kai $t \neq 0$, galioja lygybė

$$\Pi(k)\left[\frac{\Pi(\exp tX)w - w}{t}\right] = \frac{\Pi(\exp(t\,\mathrm{Ad}(k)X))\,\Pi(k)w - \Pi(k)w}{t}.$$

Tegul $t \to 0$. Kairėje pusėje reiškinys laužtiniuose skliaustuose artėja prie vektoriaus $d\Pi(X)w$, o operatorius $\Pi(k)$ yra aprėžtas. Todėl kairioji pusė artėja prie vektoriaus $\Pi(k)\, d\Pi(X)w$. Dešinėje pusėje vektorius $\Pi(k)w$ yra glodus, todėl santykis artėja prie vektoriaus $d\Pi(\mathrm{Ad}(k)X)\Pi(k)w$.

Žingsnis 3: algebra $\mathfrak{g}$ išsaugo K-baigtinumą. Tai yra pagrindinis žingsnis. Sunkumas yra tas, kad operatorius $d\Pi(X)$ nekomutuoja su operatoriumi $\Pi(k)$. Todėl nėra akivaizdu, kad aibės $\Pi(K)\, d\Pi(X)v$ tiesinis apvalkalas yra baigtinės dimensijos. Kovariantiškumo tapatybė (21.1) atstoja komutavimą. Ši tapatybė perkelia elementą X į elementą $\mathrm{Ad}(k)X$, kuris vis dar priklauso baigtinės dimensijos erdvei $\mathfrak{g}$.

Tegul $v \in \mathcal{H}_K^\infty$ ir $W = W_v$. Pagal žingsnį 1 galioja sąryšis $W \subseteq \mathcal{H}^\infty$, todėl vektorius $d\Pi(X)w$ yra apibrėžtas, kai $w \in W$. Pasirinkime bazes $X_1, \dots, X_d$ algebroje $\mathfrak{g}$ ir $w_1, \dots, w_r$ poerdvyje W. Apibrėžkime poerdvį

$$U = \mathrm{span}\{d\Pi(X_i)w_j : 1 \le i \le d,\ 1 \le j \le r\}.$$

Tada $\dim U \le dr$. Tegul $X \in \mathfrak{g}$, $w \in W$ ir $k \in K$. Išskleiskime

$$\mathrm{Ad}(k)X = \sum_{i=1}^{d} a_i(k) X_i, \qquad \Pi(k)w = \sum_{j=1}^{r} b_j(k) w_j,$$

kur $a_i(k)$ ir $b_j(k)$ yra skaliarai. Antrajame skleidinyje pasinaudojome sąryšiu $\Pi(k)w \in W$. Pagal kovariantiškumo tapatybę (21.1) ir atvaizdavimo $d\Pi$ tiesiškumą pagal abu argumentus gauname

$$\Pi(k)\, d\Pi(X)w = d\Pi(\mathrm{Ad}(k)X)\,\Pi(k)w = \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{r} a_i(k)\, b_j(k)\, d\Pi(X_i) w_j \in U.$$

Atskiru atveju gauname sąryšį $\Pi(K)\, d\Pi(X)v \subseteq U$. Todėl vektorius $d\Pi(X)v$ yra K-baigtinis. Pagal invariantiškumo savybę (F2) šis vektorius yra glodus. Kompleksiniai tiesiniai dariniai lieka poerdvyje $\mathcal{H}_K^\infty$, todėl tas pats galioja ir elementams $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$.

Žingsnis 4: aksiomos. Pagal invariantiškumo savybę (F2) ir žingsnį 3 atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}_K^\infty$. Baigtinumo sąlyga (a) galioja su poerdviu $W = W_v$. Tai išplaukia iš žingsnio 1 ir iš Skyrelyje 21.1 parodyto grupės K veikimo poerdvyje W_v tolydumo. Išvestinės sąlygai (b) patikrinti tegul $X \in \mathfrak{k}$. Kreivė $t \mapsto \Pi(\exp tX)v$ yra poerdvyje W_v. Jos išvestinė erdvėje $\mathcal{H}$ lygi $d\Pi(X)v$. Baigtinės dimensijos poerdvis yra uždaras, o poerdvyje W_v naudojamas apimančiosios Hilberto erdvės normos apribojimas. Todėl skirtuminiai santykiai poerdvyje W_v konverguoja į vektorių $d\Pi(X)v$. Kovariantiškumo sąlyga (c) yra kovariantiškumo tapatybė (21.1).

Žingsnis 5: persipynimo operatoriai. Tegul $v \in \mathcal{H}_K^\infty$. Orbitos atvaizdavimas $g \mapsto \Pi'(g)Tv = T\Pi(g)v$ yra glodus, nes operatorius T yra aprėžtas ir tiesinis. Be to, tiesinis apvalkalas $\operatorname{span}\Pi'(K)Tv = T(\operatorname{span}\Pi(K)v)$ yra baigtinės dimensijos. Diferencijuodami lygybę $T\Pi(\exp tX)v = \Pi'(\exp tX)Tv$ taške $t = 0$, gauname $T\,d\Pi(X)v = d\Pi'(X)Tv$. Komutavimas su grupe K yra teiginio prielaida. ∎

Apibrėžimas 21.7. Vadiname $(\mathfrak{g}, K)$-*moduliu, atitinkančiu įvaizdį* Π, erdvę $\mathcal{H}_K^\infty$ su veikimais, nurodytais $(\mathfrak{g}, K)$-modulio teiginyje (Teiginys 21.6). Du įvaizdžiai vadinami *infinitezimaliai ekvivalenčiais*, jei jų $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai yra izomorfiški.

21.3 Apskritimo K-tipai grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ atveju

Dabar tegul $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir $K = \mathrm{SO}(2)$. Apibrėžkime matricas

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad k_\theta = \exp(\theta W) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Čia apibrėžta matrica k_θ 20-osios paskaitos žymėjimu yra matrica $k_{-\theta}$. Tada $\mathfrak{k} = \mathbb{R}W$, o atvaizdavimas $\theta \mapsto k_\theta$ sutapatina grupę $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ su grupe K. Todėl grupė K yra jungi.

Tegul V yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis. Kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$ apibrėžkime aibę

$$V(n) = \{v \in V : k_\theta \cdot v = e^{in\theta}v \text{ visiems } \theta\}.$$

Pagal baigtinumo sąlygą (a) ir visišką redukuojamumą (5-oji paskaita) kiekvienas vektorius $v \in V$ yra baigtinė vektorių iš erdvių $V(n)$ suma. Ši suma yra tiesioginė, nes funkcijos $e^{in\theta}$ yra tiesiškai nepriklausomos. Taigi $V = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} V(n)$, o skaičius $\dim V(n)$ yra K-tipo n kartotinumas.

Tegul $H = \operatorname{diag}(1,-1)$ ir $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tada matricos H, S, W sudaro algebros $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ bazę. Sudauginę matricas, gauname

$$[H,S] = 2W, \qquad [W,H] = -2S, \qquad [W,S] = 2H.$$

Algebroje $\mathfrak{g}_\mathbb{C} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ apibrėžiame

$$H' = -iW = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \frac{1}{2}(H + iS) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}, \quad F = \frac{1}{2}(H - iS) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & -1 \end{pmatrix}.$$

Iš realiųjų skliaustų gauname

$$\begin{aligned} [H', E] &= -\tfrac{i}{2}\big([W,H] + i[W,S]\big) = -\tfrac{i}{2}(-2S + 2iH) = H + iS = 2E, \\ [H', F] &= -\tfrac{i}{2}\big([W,H] - i[W,S]\big) = -\tfrac{i}{2}(-2S - 2iH) = -(H - iS) = -2F, \\ [E, F] &= \tfrac{1}{4}\big(-i[H,S] + i[S,H]\big) = -\tfrac{i}{2}[H,S] = -iW = H'. \end{aligned}$$

Taigi rinkinys (H', E, F) yra $\mathfrak{sl}_2$-trejetas. Šiam trejetui galima taikyti $\mathfrak{sl}_2$ teoriją iš parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“. Elementas H' apvelka algebrą $\mathfrak{k}_\mathbb{C}$, o elementas $H \notin \mathfrak{k}$. Be to, galioja lygybė $F = \overline{E}$, kur jungtinimas apibrėžiamas formule $\overline{X + iY} = X - iY$, kai $X, Y \in \mathfrak{g}$.

Šie elementai E ir F nėra 20-osios paskaitos realiosios matricos. Tegul $u_\pm = (1, \pm i)^T$, o Q yra matrica, kurios stulpeliai yra u_+ ir u_-. Tada

$$H' = Q\,\mathrm{diag}(1,-1)Q^{-1}, \qquad E = Q\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q^{-1}, \qquad F = Q\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}Q^{-1}.$$

Vektoriai $u_\pm$ yra pogrupio K tikriniai vektoriai, kaip rodo Pavyzdys 21.10. Pogrupio K tikrinių vektorių bazėje (u_+, u_-) trejeto (H', E, F) matricos yra standartinis 20-osios paskaitos trejetas. Skaliarinio daugiklio tikslumu matrica Q^{-1} yra Uždavinio 20.1 matrica c.

Lema 21.8. *Kiekvienam $\theta \in \mathbb{R}$ operatoriaus $\mathrm{Ad}(k_\theta)$ kompleksiškai tiesinis pratęsinys į algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ tenkina lygybes $\mathrm{Ad}(k_\theta)H' = H'$, $\mathrm{Ad}(k_\theta)E = e^{2i\theta}E$ ir $\mathrm{Ad}(k_\theta)F = e^{-2i\theta}F$.*

Įrodymas. Kadangi $W = iH'$, gauname

$$\mathrm{ad}(W)E = i[H', E] = 2iE, \qquad \mathrm{ad}(W)F = i[H', F] = -2iF, \qquad \mathrm{ad}(W)H' = 0.$$

Pagal sąryšį tarp atvaizdavimų Ad ir ad, nustatytą 2-oje paskaitoje, galioja lygybė $\mathrm{Ad}(\exp\theta W) = e^{\theta\,\mathrm{ad}\,W}$, kai abi lygybės pusės yra kompleksiškai tiesiškai pratęstos į algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Operatoriaus $\mathrm{ad}\,W$ tikrinį vektorių su tikrine verte μ ši eksponentė padaugina iš $e^{\theta\mu}$. Tikrinės vertės 0, $2i$ ir $-2i$, atitinkančios operatoriaus $\mathrm{ad}\,W$ tikrinius vektorius H', E ir F, duoda tris lemos formules. ∎

Uždavinyje 21.1 jungtinio įvaizdžio lema patikrinama dauginant matricas.

Teiginys 21.9. *Tegul V yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis grupei $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir pogrupiui $K = \mathrm{SO}(2)$. Jei $v \in V(n)$, tai*

$$H' \cdot v = nv, \qquad E \cdot v \in V(n+2), \qquad F \cdot v \in V(n-2).$$

Įrodymas. Tegul $v \in V(n)$. Kadangi $\exp(\theta W)\cdot v = e^{in\theta}v$, tai išvestinės sąlyga (b), kai $X = W$, duoda

$$W \cdot v = \frac{d}{d\theta}\Big|_{\theta=0} e^{in\theta}v = in\,v, \qquad \text{todėl} \qquad H' \cdot v = -i\,W \cdot v = nv.$$

Pagal kovariantiškumo sąlygą (c), pratęstą elementams $X \in \mathfrak{g}_\mathbb{C}$, ir jungtinio įvaizdžio lemą (Lema 21.8) gauname

$$k_\theta \cdot (E \cdot v) = (\mathrm{Ad}(k_\theta)E) \cdot (k_\theta \cdot v) = e^{2i\theta}E \cdot (e^{in\theta}v) = e^{i(n+2)\theta}\,E \cdot v.$$

Taigi $E \cdot v \in V(n+2)$. Elementui F samprotaujame taip pat, tik su daugikliu $e^{-2i\theta}$, ir gauname $F \cdot v \in V(n-2)$. ∎

Šiame įrodyme poslinkis per 2 išplaukia iš kovariantiškumo sąlygos (c). Šios jungios grupės K atveju poslinkis išplaukia ir iš išvestinės sąlygos (b) bei skliausto $[H', E] = 2E$. Iš tiesų šis skliaustas ir lygybė $H' \cdot v = nv$ rodo, kad elementas H' vektorių $E \cdot v$ daugina iš $n+2$. Operatorius H' kiekviename dėmenyje $V(m)$ iš skaidinio $V = \bigoplus_{m\in\mathbb{Z}} V(m)$ veikia daugyba iš m, todėl $E\cdot v \in V(n+2)$. Lygiai taip pat skliaustas $[H', F] = -2F$ duoda sąryšį $F\cdot v \in V(n-2)$.

Tegul Ω yra elementas

$$\Omega = H'^2 + 2EF + 2FE$$

universaliojoje gaubiančiojoje algebroje $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Tai yra trejeto Kazimiro elementas. Pagal parengiamąjį kursą „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ šis elementas priklauso algebros $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$ centrui. Įstatę $EF = FE + H'$, gauname

$$\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE, \qquad \Omega \cdot v = n(n+2)v + 4F \cdot E \cdot v \quad (v \in V(n)). \tag{21.2}$$

Pagal poslinkio teiginį (Teiginys 21.9) galioja sąryšis $F \cdot E \cdot v \in V(n)$. Todėl elementas Ω išsaugo kiekvieną erdvę $V(n)$.

Pavyzdys 21.10. Grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$ matricų daugyba, todėl ir erdvėje $V_m = \mathrm{Sym}^m \mathbb{C}^2$, kurios dimensija yra $m+1$. Orbitų atvaizdavimai yra polinominiai pagal matricos elementus, todėl kiekvienas vektorius yra glodus. Kadangi erdvė V_m yra baigtinės dimensijos, kiekvienas vektorius yra ir K-baigtinis. Todėl erdvė V_m sutampa su savo $(\mathfrak{g}, K)$-moduliu. Lie algebra veikia sandaugas pagal Leibnico taisyklę. Vektoriams $u_\pm = (1, \pm i)^T$ galioja lygybės

$$k_\theta u_+ = \begin{pmatrix} \cos\theta + i\sin\theta \\ -\sin\theta + i\cos\theta \end{pmatrix} = e^{i\theta} u_+, \qquad k_\theta u_- = e^{-i\theta} u_-.$$

Tiesiogiai sudauginę matricas (Uždavinys 21.2), gauname lygybes $Eu_- = u_+$, $Eu_+ = 0$, $Fu_+ = u_-$ ir $Fu_- = 0$. Tegul $w_j = u_+^j u_-^{m-j}$, kai $0 \le j \le m$. Grupė veikia kiekvieną dauginamąjį, todėl

$$k_\theta w_j = (e^{i\theta} u_+)^j (e^{-i\theta} u_-)^{m-j} = e^{i(2j-m)\theta} w_j.$$

Vadinasi, K-tipai erdvėje V_m yra $-m, -m+2, \ldots, m$. Kiekvieno jų kartotinumas lygus vienetui. Leibnico taisyklė duoda


$$E \cdot w_j = (m-j) w_{j+1} \quad (0 \le j < m), \qquad F \cdot w_j = j w_{j-1} \quad (0 < j \le m).$$

Galiniams vektoriams galioja lygybės $Ew_m = 0$ ir $Fw_0 = 0$. Tai dera su poslinkio teiginiu (Teiginys 21.9). Kadangi $E \cdot w_m = 0$ ir $w_m \in V(m)$, Kazimiro formulė (21.2) duoda $\Omega \cdot w_m = m(m+2) w_m$. Šie K-tipai yra įprasti $\mathfrak{sl}_2$-svoriai, tik nustatomi kompaktinio elemento H', o ne diagonaliojo elemento H atžvilgiu.

Kai $m \ge 1$, jokia skaliarinė sandauga nepaverčia šio modulio unitariuoju. Matrica $\mathrm{diag}(e^t, e^{-t})$ turi tikrinę vertę e^{mt} erdvėje V_m, o unitariojo operatoriaus tikrinių verčių modulis lygus vienetui. Toliau, 23-ioje paskaitoje, įrodysime, kad kiekvienas baigtinės dimensijos tolydus grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitarusis įvaizdis yra trivialusis. Todėl šioje paskaitoje leidžiame neunitariuosius įvaizdžius Π.

Jei įvaizdis Π yra unitarusis, o elementas Ω erdvėje $\mathcal{H}_K^\infty$ veikia daugyba iš skaliaro λ, tai antisimetriškumas (F3) Kazimiro formulę (21.2) paverčia dydžių $\|d\Pi(E)v\|^2$ ir $\|d\Pi(F)v\|^2$ formulėmis. Uždavinyje 21.4 šios formulės išvedamos. Čia galioja lygybė $\langle d\Pi(E)u, w\rangle = -\langle u, d\Pi(F)w\rangle$ glodiesiems vektoriams u ir w, nes $F = \overline{E}$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ unitariajame įvaizdyje tas pats trejetas duoda ženklą +, nes matricoms galioja lygybė $F = E^*$. Fizikų žymėjimu $n = 2j$ reikšmė $n(n+2)$ formulėje (21.2) yra $4j(j+1)$.

Uždavinyje 21.3 iš tos pačios kėlimo ir leidimo schemos konstruojami begalinės dimensijos $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai. To uždavinio modulis V_λ turi bazę v_n, $n \in 2\mathbb{Z}$, kurioje $E \cdot v_n = v_{n+2}$ ir $F \cdot v_n = \frac{1}{4}(\lambda - (n-2)n) v_{n-2}$. Šį modulį su Pavyzdžio 21.10 moduliu V_4 lygina 21.1 pav. Poslinkio teiginys (Teiginys 21.9) sako, kad kiekviena rodyklė jungia gretimus vieno lyginumo taškus. Kur rodyklės nėra, operatorius duoda nulį. Paveiksle bendrosios padėties parametras reiškia, kad skaičius $\lambda + 1$ nėra nelyginio sveikojo skaičiaus kvadratas. Uždavinyje 21.3 parodyta, kad tada modulis V_λ yra neredukuojamas.



21.1 pav.: Trejos K-tipų kopėčios. Kiekvienas taškas yra vienmatė erdvė $V(n)$. Viršutinės rodyklės vaizduoja elementą E, o apatinės – elementą F. Eilutėse pavaizduotas modulis V_4, Uždavinio 21.3 modulis V_λ, kai parametras λ yra bendrosios padėties, ir ta pati šeima taške $\lambda = 0$, kur elementas F anuliuoja vektorius v_0 ir v_2.

21.4 Ko neužfiksuoja $(\mathfrak{g}, K)$-modulis

Savaime $(\mathfrak{g}, K)$-modulis neturi topologijos. Jis neužfiksuoja nei normos, nei grupės G elementų, nepriklausančių pogrupiui K, veikimo. Cituosime teoremas, kurios modulį vėl susieja su įvaizdžiais. Šioje paskaitoje nė viena jų nėra nei įrodoma, nei toliau naudojama.

Leistinumas. *Tiesine jungia reduktyviąja grupe* vadinama uždara jungi realiųjų arba kompleksinių matricų grupė, kuri yra stabili ermitinio jungimo atžvilgiu (Knapp RT, skyrelis I.1). Pavyzdžiai yra grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir $\mathrm{SU}(p,q)$. Ši klasė nėra 20-osios paskaitos klasė, kaip paaiškinta šios paskaitos pabaigos pastaboje.

Grupės *maksimaliuoju kompaktiniu pogrupiu* vadinamas kompaktinis pogrupis, kuris nėra griežtai didesnio kompaktinio pogrupio poaibis. Tiesinės jungios reduktyviosios grupės $G \subseteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ pogrupis $K = G \cap \mathrm{U}(n)$ yra maksimalusis kompaktinis pogrupis (Knapp RT, skyrelis I.1, Teiginys 1.2). Kai $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, šis pogrupis yra $\mathrm{SO}(2)$. Jei grupė G dar yra pusiau paprastoji, tai atvaizdavimas $\theta(X) = -X^*$ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija, o šis pogrupis K yra 20-osios paskaitos Kartano ir Ivasavos teoremos pogrupis K.

Tegul G yra tiesinė jungi reduktyvioji grupė ir $K = G \cap \mathrm{U}(n)$. Toliau pateikti du teiginiai yra knygos Knapp RT skyriuje VIII, o jų numeriai nurodyti šios paskaitos pabaigos pastaboje.

(i) Jei stipriai tolydus Hilberto įvaizdis Π yra leistinas, o apribojimas $\Pi|_K$ yra unitarusis, tai kiekvienas K-baigtinis vektorius yra glodus, todėl $\mathcal{H}_K^\infty = \mathcal{H}_K$.

(ii) (Harišas Čandra) Kiekvienas neredukuojamas unitarusis grupės G įvaizdis yra leistinas.

Apskritimo pavyzdys (Pavyzdys 21.4) tiesiogiai parodo glodumo teiginio (i) išvadą, kai $G = K$.

Globalizacija. Perėjimas nuo $(\mathfrak{g}, K)$-modulio prie tolydaus grupės įvaizdžio vadinamas globalizacija. Harišo Čandros modulis yra leistinas $(\mathfrak{g}, K)$-modulis, kuris yra baigtinai generuotas virš algebros $U(\mathfrak{g}_\mathbb{C})$. Teigiamai apibrėžta ermitinė forma Harišo Čandros modulyje yra invariantinė, jei grupės K veikimas yra unitarusis, o algebros $\mathfrak{g}$ veikimas yra antisimetrinis visiems realiesiems $X \in \mathfrak{g}$.

Kai grupė G yra tiesinė jungi reduktyvioji ir $K = G \cap \mathrm{U}(n)$, neredukuojamas Harišo Čandros modulis, turintis invariantinę teigiamai apibrėžtą ermitinę formą, turi neredukuojamą

unitariąją globalizaciją. Ši globalizacija yra vienintelė unitariojo ekvivalentumo tikslumu. Šią teoremą cituojame iš konspekto P. Etingof, MIT 18.757 (Teorema 7.5 ir Teiginys 7.1). Teorema pateikia grupės G veikimą Hilberto erdvėje, kuri yra modulio papildinys, kartu su šio veikimo stipriuoju tolydumu. Vien tiesinės erdvės papildinys nepateikia nei šio veikimo, nei jo stipriojo tolydumo.

Vienas ir tas pats $(\mathfrak{g}, K)$-modulis gali kilti iš skirtingų rūšių papildinių. Imkime $G = K = \mathrm{SO}(2)$, kaip apskritimo pavyzdyje (Pavyzdys 21.4). Postūmiai taip pat tolydžiai veikia Banacho erdvėje $C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ su supremumo norma, o ši Banacho erdvė nėra Hilberto erdvė. Su tais pačiais apibrėžimais glodieji K-baigtiniai erdvės $C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ vektoriai vėl yra trigonometriniai polinomai. Taigi erdvės $L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ ir $C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ turi tą patį $(\mathfrak{g}, K)$-modulį. Todėl modulis neužfiksuoja normos.

Šis bendras modulis turi be galo daug skirtingų apskritimo tipų ir nėra baigtinai generuotas virš algebros $U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$. Todėl šis pavyzdys nepatenka į teoremos apie neredukuojamuosius Harišo Čandros modulius taikymo sritį. Bendresnė Kaselmano–Volako globalizacijos teorema paliekama tolesnėms studijoms.

Integravimas. Tapatybės tarp operatorių $d\Pi(E)$, $d\Pi(F)$ ir $d\Pi(H')$ galiojo todėl, kad įvaizdis Π buvo duotas. Formalūs komutavimo sąryšiai tarp neaprėžtų operatorių patys savaime neduoda grupės įvaizdžio. Klausimas, kurie Uždavinio 21.3 moduliai kyla iš unitariųjų įvaizdžių, nagrinėjamas 22-oje ir 23-ioje paskaitose.

21.5 Savikontrolė

Klausimas 1. Kodėl $(\mathfrak{g}, K)$-modulio teiginio (Teiginys 21.6) įrodymo žingsnyje 3 visas poerdvis W_ν turi būti sudarytas iš glodžiųjų vektorių?

Atsakymas. Erdvę U apvelka vektoriai $d\Pi(X_i)w_j$, kur $w_j \in W_\nu$. Šie vektoriai yra apibrėžti tik tada, kai vektoriai w_j yra glodūs. Žingsnis 1 rodo, kad kiekvienas vektorius $\Pi(k)v$ yra glodus.

Klausimas 2. Kokie K-tipai yra įvaizdyje Ad, veikiančiame algebroje $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$? Kuri erdvė V_m turi tuos pačius K-tipus?

Atsakymas. Pagal jungtinio įvaizdžio lemą (Lema 21.8) elementai E, H' ir F turi atitinkamai K-tipus 2, 0 ir -2. Kiekvieno jų kartotinumas lygus vienetui. Modulis V_2 turi tuos pačius K-tipus.

Klausimas 3. Ar elemento $H = \mathrm{diag}(1, -1)$ tikrinės vertės galėtų būti K-tipų žymės?

Atsakymas. Ne. Išvestinės sąlyga (b) susieja grupės K veikimą tik su algebros $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}H'$ elementais. Kadangi $H \notin \mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$, elemento H veikimas nėra nusakomas grupės K veikimu. Erdvės V_m pavyzdyje (Pavyzdys 21.10) elementas $H = E + F$ vektorių $w_j \in V(n)$, kur $n = 2j - m$, perkelia į tiesioginę sumą $V(n+2) \oplus V(n-2)$.

Santrauka

Tegul K yra grupės G kompaktinis pogrupis. Kai grupės G stipriai tolydus įvaizdis veikia Hilberto erdvėje, jo glodžiuosius K-baigtinius vektorius veikia algebra $\mathfrak{g}$ ir grupė K. Išvestinės sąlyga (b) susieja šiuos du veikimus algebroje $\mathfrak{k}$. Kovariantiškumo sąlyga (c) aprašo, kaip grupės K veikimas transformuoja algebros $\mathfrak{g}$ veikimą. Įrodymas, kad algebra $\mathfrak{g}$ išsaugo K-baigtinumą, remiasi kovariantiškumo sąlyga.

Apskritimo atveju K-baigtiniai vektoriai yra trigonometriniai polinomai. Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ su pogrupiu $K = \mathrm{SO}(2)$ atveju kovariantiškumo sąlyga (c) rodo, kad elementai E ir F perstumia apskritimo K-tipus atitinkamai per 2 ir -2. Išvestinės sąlyga (b) rodo, kad elementas H' veikia K-tipą n daugyba iš n. Šios jungios grupės K atveju tuos pačius poslinkius tada duoda skliaustai $[H', E] = 2E$ bei $[H', F] = -2F$.

Tiesinei jungiai reduktyviajai grupei G, kai $K = G \cap \mathrm{U}(n)$, cituojami trys rezultatai. Neredukuojamieji unitarieji įvaizdžiai yra leistini. Leistiname stipriai tolydžiame Hilberto įvaizdyje Π, kurio apribojimas $\Pi|_K$ yra unitarusis, K-baigtiniai vektoriai yra glodūs. Neredukuojamas Harišo Čandros modulis, turintis invariantinę teigiamai apibrėžtą ermitinę formą, turi neredukuojamą unitariąją globalizaciją, kuri yra vienintelė unitariojo ekvivalentumo tikslumu.

Šaltiniai ir prielaidos

Grupių klasė. Knygos Knapp RT skyrelyje I.1 apibrėžiamos tiesinės jungios reduktyviosios grupės, o tokia grupė su baigtiniu centru vadinama tiesine jungia pusiau paprastąja. Šio skyrelio Teiginyje 1.2 teigiama, kad pogrupis K yra kompaktinis, jungus ir maksimalusis kompaktinis, o atvaizdavimas $K \times \mathfrak{p} \to G$ yra difeomorfizmas. Ši klasė skiriasi nuo 20-osios paskaitos klasės, kurią sudaro jungios pusiau paprastosios Lie grupės su baigtiniu centru. Pavyzdžiui, neutraliojo elemento komponentė $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})_0$ priklauso šiai klasei ir nėra pusiau paprastoji, o netiesinė baigtinalapė grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ dengiančioji grupė priklauso tik 20-osios paskaitos klasei. Grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ priklauso abiem klasėms.

Leistinumas. Glodumo teiginys (i) yra knygos Knapp RT Teiginys 8.5. Apibrėžimas, einantis iškart po Teoremos 8.1 įrodymo, apima apribojimo $\Pi|_K$ unitarumą ir baigtinius kartotinumus, o tai yra glodumo teiginio prielaidos. Leistinumo teiginys (ii) yra knygos Knapp RT Teorema 8.1.

Globalizacija. Etingof konspekte unitarioji globalizacija yra Teorema 7.5 (p. 38 pagal spausdintą numeraciją), o jos vienatinumas yra Teiginys 7.1 (p. 37 pagal spausdintą numeraciją).

Literatūra

- Knapp RT, skyrelis I.1: tiesinės jungios reduktyviosios grupės.
- Knapp RT, skyreliai III.3–4: glodieji vektoriai ir faktai (F1)–(F3).
- Knapp RT, skyrius VIII: leistinieji įvaizdžiai ir Harišo Čandros leistinumo teorema.

- P. Etingof, MIT 18.757 *Representations of Lie Groups*, paskaitų konspektas, paskaitos 2 ir 5–7: kitas šios medžiagos išdėstymas.
- Etingof, Paskaita 7, Teorema 7.5 (p. 38 pagal spausdintą numeraciją) ir Teiginys 7.1 (p. 37 pagal spausdintą numeraciją): čia suformuluotas unitariosios globalizacijos rezultatas ir jo vienatinumas. Tolesnėms studijoms Kaselmano–Volako globalizacija plėtojama knygoje Wallach, *Real Reductive Groups II*.

Paskaita 22

Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pagrindinė serija

Tikslai. *Šioje paskaitoje sukonstruosime grupės $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pagrindinę seriją. Pagrindinė serija yra indukuojama iš viršutinių trikampių matricų pogrupio charakterių. Ją realizuosime apskritime apibrėžtų funkcijų erdvėje. Įrodysime jos unitarumą, kai parametras yra grynai menamas. Paskui apskaičiuosime, kaip Lie algebra perkelia vektorius tarp K-tipų. Galiausiai šiomis kopėčiomis nustatysime, kurie iš šių įvaizdžių yra neredukuojami.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti indukavimo duomenis (ε, ν) ir modulinės funkcijos vaidmenį.
- Pereiti tarp indukuotųjų funkcijų, homogeninių funkcijų plokštumoje ir apskritimo modelio.
- Įrodyti, kad įvaizdis $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra unitarusis, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.
- Apskaičiuoti K-tipų kopėčias ir įrodyti, kad įvaizdis $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ turi netrivialų uždarąjį invariantinį poerdvį lygiai tuose taškuose, kuriuose kopėčios nutrūksta.

22.1 Indukavimo duomenys

Visoje paskaitoje nagrinėsime grupę $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Naudosime matricas

$$k_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad n_x = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pažymėkime pogrupius $K = \{k_\theta\}$, $A = \{a_t\}$, $N = \{n_x\}$ ir $M = \{\pm I\}$. Grupė M yra grupės G centras.

Apibrėžimas 22.1. Grupės G *minimalusis parabolinis pogrupis* yra grupė $P = MAN$, kurią sudaro grupės G viršutinės trikampės matricos.

Pogrupis P yra tiesės $\mathbb{R}(1,0)^{\mathsf{T}}$ stabilizatorius. Todėl erdvė G/P yra aibė tiesių, einančių per erdvės $\mathbb{R}^2$ koordinačių pradžią. Ši aibė yra apskritimas, ir ji yra kompaktinė. Būtent todėl indukuojame iš pogrupio P: toliau nagrinėjamos funkcijos apibrėžtos apskritime, o jų integralai apskritimu yra baigtiniai.

Kiekviena matrica $p \in P$ yra vienareikšmiškai užrašoma pavidalu $p = ma_t n_x$. Jos įstrižainė nusako elementą m ir skaičių t. Tada jos viršutinis dešinysis elementas nusako skaičių x. Pogrupis N yra normalusis grupėje P, todėl atvaizdavimas $ma_t n_x \mapsto ma_t$ yra homomorfizmas. Pastebėkime, kad $K \cap P = M$.

Grupės P liestinės algebros bazę sudaro matricos $H = \operatorname{diag}(1,-1)$ ir $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tiesiogiai sudauginę matricas, gauname

$$\operatorname{Ad}(a_t)H = H, \qquad \operatorname{Ad}(a_t)E = e^{2t}E, \qquad \operatorname{Ad}(n_x)H = H - 2xE, \qquad \operatorname{Ad}(n_x)E = E,$$

be to, galioja lygybė $\operatorname{Ad}(-I) = \mathrm{id}$. Kadangi atvaizdavimai Ad ir det yra multiplikatyvūs, iš šių formulių išplaukia, kad $|\det \operatorname{Ad}(ma_tn_x)| = e^{2t}$. Naudosime 16-osios paskaitos susitarimą dėl modulinės funkcijos:

$$\int f(xg)\,dx = \Delta(g)^{-1} \int f(x)\,dx.$$

Pagal šį susitarimą galioja lygybė $\Delta(g) = |\det \operatorname{Ad}(g)|^{-1}$. Todėl

$$\Delta_P(ma_tn_x) = e^{-2t}. \tag{22.1}$$

Pagal Uždavinį 22.2 centro tikslumu pogrupis P yra 16-osios ir 17-osios paskaitų grupė $ax + b$, kurioje $a = e^{2t}$. Todėl tai yra jos modulinė funkcija $\Delta = 1/a$.

Pagal 16-ąją paskaitą pati grupė G yra unimodulinė, nes ji yra jungi ir jos Lie algebra yra pusiau paprastoji.

Apibrėžimas 22.2. Tegul $\varepsilon \in \{0,1\}$ ir $\nu \in \mathbb{C}$. *Indukuojantysis charakteris* $\chi_{\varepsilon,\nu} : P \to \mathbb{C}^\times$ yra apibrėžiamas formulėmis

$$\chi_{\varepsilon,\nu}(ma_tn_x) = \sigma_\varepsilon(m)\,e^{\nu t}, \qquad \sigma_\varepsilon(\pm I) = (\pm 1)^\varepsilon.$$

Šis charakteris yra tolydus, nes jis faktorizuojasi per atvaizdavimą $P \to MA$. Šis charakteris yra unitarusis tada ir tik tada, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.

Apibrėžimas 22.3. Erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ sudaro tolydžiosios funkcijos $f : G \to \mathbb{C}$, tenkinančios sąlygą

$$f(gp) = \Delta_P(p)^{1/2}\chi_{\varepsilon,\nu}(p)^{-1}f(g) \qquad (g \in G,\ p \in P).$$

Kiekvienam $g \in G$ operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ erdvėje $I_{\varepsilon,\nu}$ yra apibrėžiamas formule $(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)f)(h) = f(g^{-1}h)$ visiems $h \in G$.

Pagal modulinės funkcijos formulę (22.1) apibrėžiančioji sąlyga yra užrašoma taip:

$$f(g\,ma_tn_x) = \sigma_\varepsilon(m)\,e^{-(\nu+1)t}f(g). \tag{22.2}$$

Kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja, todėl operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ palieka erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ invariantinę. Be to, galioja lygybė $\Pi(g_1g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$. Kai pora (ε,ν) yra fiksuota, indeksų nerašysime.

Pastaba 22.4. Daugiklis $\Delta_P^{1/2}$ duoda kitą 17-osios paskaitos normavimo pavidalą. Kvadratinė šaknis 17-oje paskaitoje įeina į veikimo formulę.

Tegul q yra 17-osios paskaitos ro funkcija. Ši funkcija yra teigiama ir tolydi grupėje G ir tenkina lygybę $q(gp) = \Delta_P(p)q(g)$ visiems $g \in G$ ir $p \in P$. Tegul funkcija f tenkina 17-osios paskaitos unitariąją kovariantiškumo sąlygą. Apibrėžkime funkciją formule $F(g) = \sqrt{q(g)}f(g)$. Pagal funkcijos q transformacijos dėsnį kvadratinė šaknis pereina į kovariantiškumo sąlygą. Tada veikimas tampa paprastu kairiuoju postūmiu. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, gauname sąlygą

$$|F(gp)|^2 = \Delta_P(p)|F(g)|^2.$$

Ši sąlyga leidžia integruoti erdvėje G/P. Toliau pateiksime integralą apskritimu ir tiesiogiai įrodysime jo invariantiškumą. Daugiau nieko iš 17-osios paskaitos nenaudosime.

Poslinkis $e^{-t} = \Delta_P(a_t)^{1/2}$ dažnai yra užrašomas kaip $e^{-\rho(tH)}$. Čia ρ yra tiesinis funkcionalas erdvėje $\mathbb{R}H$, kuriam $\rho(H) = 1$. Ši reikšmė lygi pusei tikrinės vertės 2, kurią atitinka operatoriaus $\operatorname{ad} H$ tikrinis vektorius E. Tai yra 9-osios paskaitos funkcionalo ρ analogas.

22.2 Plokštumos modelis ir apskritimo modelis

Pažymėkime vektorius $\mathbf{e}_1 = (1,0)^{\mathsf{T}}$ ir $u_\theta = (\cos\theta, \sin\theta)^{\mathsf{T}} = k_\theta \mathbf{e}_1$. Padauginus matricą g iš dešinės iš matricos n_x, pirmasis matricos g stulpelis nesikeičia, o prie antrojo stulpelio pridedamas pirmojo kartotinis. Todėl funkcija, tenkinanti sąlygą $f(gn_x) = f(g)$, priklauso tik nuo pirmojo stulpelio $g\mathbf{e}_1$, kuris gali būti bet koks nenulinis vektorius.

Lema 22.5. *Atvaizdavimas $g \mapsto g\mathbf{e}_1$ indukuoja homeomorfizmą $G/N \to \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.*

Įrodymas. Jei $g\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$, tai pirmasis matricos g stulpelis yra vektorius $\mathbf{e}_1$, o iš lygybės $\det g = 1$ išplaukia, kad $g \in N$. Todėl atvaizdavimo $g \mapsto g\mathbf{e}_1$ sluoksniai yra gretutinės klasės gN. Šis atvaizdavimas yra siurjektyvus ir turi tolydų pjūvį

$$s(v) = \begin{pmatrix} v_1 & -v_2/|v|^2 \\ v_2 & v_1/|v|^2 \end{pmatrix}, \qquad s(v)\mathbf{e}_1 = v, \qquad \det s(v) = 1.$$

Taigi atvaizdavimas $v \mapsto s(v)N$ yra tolydus atvirkštinis atvaizdavimas. ∎

Teiginys 22.6. *Taisyklė $F(g\mathbf{e}_1) = f(g)$ apibrėžia bijekciją iš erdvės $I_{\varepsilon,\nu}$ į erdvę, kurią sudaro visos tolydžiosios funkcijos F aibėje $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, tenkinančios sąlygą*

$$F(cv) = \operatorname{sgn}(c)^\varepsilon |c|^{-(\nu+1)} F(v) \qquad (c \in \mathbb{R}^\times). \tag{22.3}$$

Per šią bijekciją operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ virsta atvaizdavimu $F \mapsto F(g^{-1}\cdot)$.

Įrodymas. Įstatę $p = n_x$ į kovariantiškumo dėsnį (22.2), gauname lygybę $f(gn_x) = f(g)$. Pagal plokštumos sutapatinimą (Lema 22.5) funkcija F yra gerai apibrėžta, o funkcija $F = f \circ s$ yra tolydi. Kai $c = \pm e^t$, galioja lygybė $g(\pm a_t)\mathbf{e}_1 = c\, g\mathbf{e}_1$. Todėl iš kovariantiškumo dėsnio, kai $p = \pm a_t$, išplaukia homogeniškumo taisyklė (22.3).

Atvirkščiai, tegul yra duota funkcija F. Apibrėžkime funkciją formule $f(g) = F(g\mathbf{e}_1)$. Kadangi lygybė $g\, m a_t n_x \mathbf{e}_1 = \pm e^t g\mathbf{e}_1$ galioja, kai $m = \pm I$, iš homogeniškumo taisyklės išplaukia kovariantiškumo dėsnis. Galiausiai galioja lygybės $(\Pi(g)f)(h) = f(g^{-1}h) = F(g^{-1}h\mathbf{e}_1)$ visiems $h \in G$. Taigi operatorius $\Pi(g)$ virsta atvaizdavimu $F \mapsto F(g^{-1}\cdot)$. ∎

Homogeninę funkciją F nusako jos reikšmės vienetiniame apskritime. Apibrėžkime funkciją formule $\varphi(\theta) = F(u_\theta) = f(k_\theta)$. Tada

$$F(ru_\theta) = r^{-(\nu+1)}\varphi(\theta) \quad (r > 0), \qquad \varphi(\theta + \pi) = (-1)^\varepsilon \varphi(\theta).$$

Antroji taisyklė yra homogeniškumo taisyklė (22.3), kai $c = -1$. Tegul C_ε yra tolydžiųjų 2π-periodinių funkcijų, turinčių šį lyginumą, erdvė. Kiekvienam parametrui ν apribojimas

pogrupyje K sutapatina erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ su erdve C_ε. Šis sutapatinimas yra vadinamas *kompaktine realizacija*. Kompaktinėje realizacijoje erdvė C_ε nepriklauso nuo parametro ν.

Apribojimas pogrupyje K nepraranda duomenų dėl 20-osios paskaitos Ivasavos skaidinio. Jis duoda lygybę $G = KAN$, todėl $G = KP$. Kiekvienas elementas $g \in G$ užrašomas pavidalu kp, o apibrėžiančioji sąlyga duoda lygybę $f(kp) = \Delta_P(p)^{1/2}\chi_{\varepsilon,\nu}(p)^{-1}f(k)$. Todėl funkciją f nusako jos reikšmės pogrupyje K.


Apibrėžimas 22.7. Kiekvienam $h \in G$ atvaizdavimas τ_h erdvėje $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ yra apibrėžiamas lygybe $hu_\theta = |hu_\theta|\, u_{\tau_h(\theta)}$.

Pritaikykime plokštumos modelį (Teiginys 22.6) ir lygybę $g^{-1}u_\theta = |g^{-1}u_\theta|\, u_{\tau_{g^{-1}}(\theta)}$. Taip gauname apskritimo modelį:

$$(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\varphi)(\theta) = |g^{-1}u_\theta|^{-(\nu+1)}\, \varphi\big(\tau_{g^{-1}}(\theta)\big). \tag{22.4}$$

Parametras ν įeina tik į skaliarinį daugiklį.

Atvaizdavimą τ_h, kai $h = a_{1/2}$, vaizduoja 22.1 pav. Matrica h vienetinį apskritimą paverčia elipse, o kiekvienas elipsės taškas savo spinduliu projektuojamas atgal į apskritimą. Kryptys susitelkia prie horizontaliosios ašies.



22.1 pav.: Atvaizdavimas τ_h, kai $h = a_{1/2}$. Juodi taškai yra taškai u_θ, kurių kampai yra skaičiaus $\pi/4$ kartotiniai, o rodyklės veda į jų vaizdus elipsėje. Brūkšninis spindulys tašką $hu_{\pi/4}$ projektuoja atgal į apskritimo tašką, kurio kampas yra $\tau_h(\pi/4)$. Plona disko išpjova ir jos vaizdas elipsėje turi vienodus plotus.

Pavyzdys 22.8. Posūkiams galioja lygybė $k_\alpha^{-1}u_\theta = u_{\theta-\alpha}$, todėl

$$(\Pi(k_\alpha)\varphi)(\theta) = \varphi(\theta - \alpha), \qquad \Pi(-I)\varphi = (-1)^\varepsilon\varphi.$$

Antrojoje formulėje pasinaudojome lygybe $-I = k_\pi$. Taigi centras M veikia charakteriu σ_ε, kad ir koks būtų parametras ν. Skaičių ε vadinsime centriniu lyginumu.

Įstrižainių matricų pogrupiui galioja lygybė $a_s^{-1}u_\theta = (e^{-s}\cos\theta,\ e^s\sin\theta)^\mathsf{T}$. Todėl, apibrėžę funkciją pirmąja iš toliau pateiktų lygybių, gauname

$$r_s(\theta)^2 := |a_s^{-1}u_\theta|^2 = e^{-2s}\cos^2\theta + e^{2s}\sin^2\theta, \qquad \tan\tau_{a_s^{-1}}(\theta) = e^{2s}\tan\theta.$$

Kai $\varepsilon = 0$, pastovioji funkcija $e_0 = 1$ priklauso erdvei C_0. Be to, galioja lygybė $\Pi_{0,\nu}(a_s)e_0 = r_s^{-(\nu+1)}$.

22.3 Unitarumas menamojoje ašyje

Tegul $\mathcal{H}_\varepsilon$ yra erdvės C_ε uždarinys erdvėje $L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ su skaliarine sandauga

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{\varphi(\theta)}\, \psi(\theta)\, d\theta.$$

Pagal Furjė analizę apskritime (10-oji paskaita) erdvė $\mathcal{H}_\varepsilon$ yra uždarasis tiesinis apvalkalas funkcijų, apibrėžtų formule $e_n(\theta) = e^{in\theta}$, kur $n \equiv \varepsilon \pmod 2$. Pagrindinis žingsnis įrodant unitarumą yra kintamųjų keitimas apskritime.

Lema 22.9. *Kiekvienas atvaizdavimas τ_h yra orientaciją išlaikantis difeomorfizmas. Be to, galioja lygybės $\tau_{h_1 h_2} = \tau_{h_1} \circ \tau_{h_2}$ ir*

$$\tau_h'(\theta) = |hu_\theta|^{-2}.$$

Įrodymas. Tiesiniai atvaizdavimai komutuoja su daugyba iš teigiamų skaliarų, todėl vektorius $h_1 h_2 u_\theta$ yra teigiamas vektoriaus $h_1 u_{\tau_{h_2}(\theta)}$ kartotinis. Iš čia išplaukia kompozicijos dėsnis. Be to, atvaizdavimas $\tau_{h^{-1}}$ yra atvirkštinis atvaizdavimui τ_h. Lokaliai dydis $\tau_h(\theta)$ yra glodi nenykstančios glodžios kreivės hu_θ argumento šaka. Todėl atvaizdavimas τ_h yra glodus.

Raskime išvestinę. Tam pažymėkime ilgį $r = |hu_\theta|$ ir kampą $\tau = \tau_h(\theta)$. Išdiferencijuokime lygybę $hu_\theta = r\, u_\tau$ pagal kintamąjį θ:

$$hu_\theta' = r' u_\tau + r\tau' u_\tau', \qquad u_\theta' = (-\sin\theta, \cos\theta)^{\mathsf{T}}.$$

Dabar apskaičiuokime vektorių poros (hu_θ, hu_θ') determinantą dviem būdais. Pagal determinanto multiplikatyvumą šis determinantas lygus $\det h \cdot \det(u_\theta, u_\theta') = 1$. Pagal pirmąją atskiroje eilutėje užrašytą formulę šis determinantas taip pat lygus

$$\det(ru_\tau,\ r' u_\tau + r\tau' u_\tau') = r^2 \tau' \det(u_\tau, u_\tau') = r^2 \tau'.$$

Todėl $\tau' = r^{-2} > 0$. Tuo pačiu samprotavimu atvirkštinis atvaizdavimas $\tau_{h^{-1}}$ yra glodus. ∎

Šios lygybės priežastį rodo 22.1 pav. Plonos vienetinio disko išpjovos, kurios kampas yra $d\theta$, plotas lygus $\frac{1}{2} d\theta$. Pirmuoju artiniu jos vaizdas, gautas matrica h, yra išpjova, kurios spindulys yra r, kampas yra $d\tau$, o plotas yra $\frac{1}{2} r^2 d\tau$. Kadangi $\det h = 1$, matrica h išsaugo plotą, todėl $d\theta = r^2 d\tau$.

Patikrinimui imkime elementą $h = a_s^{-1}$ ir išdiferencijuokime lygybę $\tan\tau = e^{2s} \tan\theta$ iš įstrižainių matricų pavyzdžio (Pavyzdys 22.8):

$$\tau' = \frac{e^{2s} \sec^2\theta}{1 + e^{4s} \tan^2\theta} = \frac{e^{2s}}{\cos^2\theta + e^{4s} \sin^2\theta} = \frac{1}{e^{-2s}\cos^2\theta + e^{2s}\sin^2\theta} = \frac{1}{r_s(\theta)^2}.$$

Teiginys 22.10. *Visiems $\nu \in \mathbb{C}$, $\varphi, \psi \in C_\varepsilon$ ir $g \in G$ galioja lygybė*

$$\langle \Pi_{\varepsilon,-\bar\nu}(g)\varphi,\ \Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\psi \rangle = \langle \varphi, \psi \rangle.$$

Įrodymas. Pažymėkime elementą $h = g^{-1}$. Apibrėžkime funkciją formule $r(\theta) = |hu_\theta|$ ir pažymėkime kampą $\theta' = \tau_h(\theta)$. Kadangi $r > 0$, galioja lygybė $\overline{r^{-(-\bar\nu+1)}} = r^{\nu-1}$. Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) pointegralinė funkcija yra užrašoma taip:

$$\overline{(\Pi_{\varepsilon,-\bar\nu}(g)\varphi)(\theta)}\,(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\psi)(\theta) = r^{\nu-1}r^{-\nu-1}\,\overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta') = \overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta')\,r(\theta)^{-2}.$$

Pagal jakobiano lemą (Lema 22.9) galioja lygybė $r(\theta)^{-2}\,d\theta = d\theta'$. Kai kampas θ vieną kartą apeina apskritimą, kampas θ' taip pat vieną kartą apeina apskritimą ta pačia kryptimi. Todėl integralas lygus $\int_0^{2\pi}\overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta')\,d\theta'$. Padaliję iš 2π, gauname skaliarinę sandaugą $\langle\varphi,\psi\rangle$. ∎

Jakobiano lema leidžia perrašyti apskritimo formulę. Kai $\tau = \tau_{g^{-1}}$, turime $|g^{-1}u_\theta|^{-2} = \tau'(\theta)$, todėl

$$(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\varphi)(\theta) = \tau'(\theta)^{(\nu+1)/2}\,\varphi(\tau(\theta)).$$

Kai $\nu = 0$, daugiklis yra jakobiano kvadratinė šaknis, ir jis nekeičia dydžio $|\varphi|^2 d\theta$, kai apskritimas ištempiamas. Tai yra 17-osios paskaitos kvadratinė šaknis. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, prie daugiklio prisideda fazė, kurios modulis lygus vienetui. Kai $\nu = -1$, daugiklis lygus 1, todėl dydis φ transformuojasi kaip funkcija. Kai $\nu = 1$, daugiklis yra jakobianas, todėl dydis φ transformuojasi kaip tankis, o jo integralas yra invariantinis. Be daugiklio $\Delta_P^{1/2}$ abu aukščiau pateikto įrodymo dydžio r laipsniai sudauginti duotų 1, ir liktų jakobianas.

Teorema 22.11. *Tegul $\nu \in i\mathbb{R}$. Kiekvieną operatorių $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iš erdvės C_ε iki unitariojo operatoriaus erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Atvaizdavimas $g \mapsto \Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis.*

Įrodymas. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, galioja lygybė $-\bar\nu = \nu$. Todėl porinimo tapatybė (Teiginys 22.10) reiškia, kad operatorius $\Pi(g)$ išlaiko normas erdvėje C_ε. Kadangi erdvė C_ε yra tiršta, operatorių $\Pi(g)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iki erdvės $\mathcal{H}_\varepsilon$ izometrijos.

Pagal plokštumos modelį (Teiginys 22.6) lygybė $\Pi(g_1g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$ galioja erdvėje C_ε. Dėl tolydumo ši lygybė galioja ir erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Todėl operatorius $\Pi(g^{-1})$ yra atvirkštinis operatoriui $\Pi(g)$. Apgręžiama izometrija yra unitarusis operatorius.

Įrodykime stiprųjį tolydumą. Tam fiksuokime funkciją $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementą $g_0 \in G$. Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) funkcija $(g,\theta) \mapsto (\Pi(g)\varphi)(\theta)$ yra tolydi. Ši funkcija yra tolygiai tolydi aibėje $U \times [0,2\pi]$, kur U yra kuri nors kompaktinė elemento g_0 aplinka. Todėl $\sup_\theta |(\Pi(g)\varphi - \Pi(g_0)\varphi)(\theta)| \to 0$, kai $g \to g_0$. Norma erdvėje L^2 neviršija šio supremumo.

Dabar imkime bet kurį vektorių $\psi \in \mathcal{H}_\varepsilon$ ir skaičių $\delta > 0$. Pasirinkime funkciją $\varphi \in C_\varepsilon$, kuriai $\|\psi - \varphi\| < \delta$. Kadangi kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra unitarusis, galioja nelygybė

$$\|\Pi(g)\psi - \Pi(g_0)\psi\| \le 2\delta + \|\Pi(g)\varphi - \Pi(g_0)\varphi\|,$$

o dešinioji pusė yra mažesnė už 3δ, kai elementas g yra pakankamai arti elemento g_0. ∎

Pavyzdys 22.12. Už menamosios ašies ribų unitarumas gali nebegalioti. Pavyzdžiui, imkime $\varepsilon = 0$ ir $\nu \in \mathbb{R}$. Pagal įstrižainių matricų pavyzdį (Pavyzdys 22.8) galioja lygybė

$$\|\Pi_{0,\nu}(a_s)e_0\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(A\cos^2\theta + B\sin^2\theta)^{\nu+1}}, \qquad A = e^{-2s},\ B = e^{2s}.$$

Kai $A, B > 0$, keitinys $u = \tan\theta$ kiekviename periodo ketvirtyje duoda

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A\cos^2\theta + B\sin^2\theta} = 4\int_0^{\infty} \frac{du}{A + Bu^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{AB}}.$$

Pritaikę šiai tapatybei operatorių $-\partial_A - \partial_B$, gauname

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(A\cos^2\theta + B\sin^2\theta)^2} = \frac{\pi(A+B)}{(AB)^{3/2}}.$$

Šiuo atveju $AB = 1$. Kai $\nu = 0$, norma lygi 1, kaip ir teigia unitarumo teorema (Teorema 22.11). Kai $\nu = 1$, normos kvadratas lygus $\frac{1}{2}(e^{2s} + e^{-2s}) = \cosh 2s$. Šis dydis yra didesnis už 1, kai $s \neq 0$. Bendrasis antisimetriškumo patikrinimas yra pateiktas Uždavinyje 22.6.

Tai rodo tik tai, kad L^2 norma neišsaugoma. Kai $\varepsilon = 0$ ir $0 < |\nu| < 1$, 23-ioje paskaitoje naudojama kita skaliarinė sandauga, kuri išsaugoma.

Bendru atveju, kai $\nu \in \mathbb{C}$, porinimo tapatybės (Teiginys 22.10) įrodyme naudotas keitinys vis tiek duoda nelygybę

$$\|\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\varphi\|^2 \leq \max_{\theta} |g^{-1}u_\theta|^{-2\operatorname{Re}\nu}\, \|\varphi\|^2.$$

Taigi kiekvienas operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ yra aprėžtas. Šis aprėžtumas yra lokaliai tolygus pagal elementą g. Tada unitarumo teoremos (Teorema 22.11) įrodymas duoda stipriai tolydų įvaizdį erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Šio įrodymo tirštumo žingsnyje dydis 2δ yra pakeičiamas dydžiu $2C\delta$, kur C yra normos $\|\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\|$ viršutinis rėžis kompaktinėje elemento g_0 aplinkoje. Pagal porinimo tapatybę (Teiginys 22.10) jungtinis operatorius yra išreiškiamas formule $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)^* = \Pi_{\varepsilon,-\bar\nu}(g^{-1})$.

22.4 K-tipai ir Lie algebros veikimas

Pagal posūkių pavyzdį (Pavyzdys 22.8) galioja lygybė $\Pi(k_\alpha)e_n = e^{-in\alpha}e_n$. Todėl charakteris $k_\alpha \mapsto e^{-in\alpha}$, apibrėžtas grupėje K, įeina lygiai vieną kartą, kai $n \equiv \varepsilon \pmod 2$, o kitais atvejais visai neįeina. Tai dera su centro veikimu: elementas $k_\pi = -I$ veikia vektorių e_n kaip daugyba iš skaičiaus $(-1)^n = (-1)^\varepsilon$. Apibrėžkime erdvę

$$V_{\varepsilon,\nu} = \operatorname{span}\{e_n : n \equiv \varepsilon \pmod 2\} \qquad \text{(baigtinės sumos)}.$$

Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, ši erdvė yra 21-osios paskaitos K-baigtinių vektorių erdvė.

Glodžiai funkcijai $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementui $X \in \mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ apibrėžkime vektorių

$$d\Pi(X)\varphi = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \Pi_{\varepsilon,\nu}(\exp sX)\varphi.$$

Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) funkcija $(s,\theta) \mapsto (\Pi(\exp sX)\varphi)(\theta)$ yra glodi. Todėl skirtuminiai santykiai konverguoja tolygiai pagal kintamąjį θ. Vadinasi, jie konverguoja erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$.

Bendriau, funkcija $(g,\theta) \mapsto (\Pi(g)\varphi)(\theta)$ yra glodi pagal abu kintamuosius kartu. Kompaktinėse aibėse grupės koordinačių žemėlapyje šios funkcijos išvestinių skirtuminiai santykiai

konverguoja tolygiai pagal kintamąjį θ. Todėl funkcija φ yra glodusis Hilberto įvaizdžio vektorius 21-osios paskaitos prasme.

Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, ši išvestinė sutampa su 15-osios paskaitos išvestine, apibrėžta glodiesiems vektoriams. Pratęskime atvaizdavimą $d\Pi$ kompleksiškai tiesiškai iki algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$.

Lema 22.13. *Visoms glodžiosioms funkcijoms $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementams $X \in \mathfrak{g}$, naudojant erdvės $\mathbb{R}^2$ skaliarinę sandaugą, galioja lygybė*

$$(d\Pi(X)\varphi)(\theta) = (\nu+1)\,(u_\theta \cdot Xu_\theta)\,\varphi(\theta) - \det(u_\theta, Xu_\theta)\,\varphi'(\theta).$$

Įrodymas. Apibrėžkime kreivę formule $v(s) = \exp(-sX)u_\theta = r(s)u_{\tau(s)}$. Tada galioja lygybės $r(0)=1$, $\tau(0)=\theta$ ir $v'(0) = -Xu_\theta$. Kaip ir jakobiano lemos (Lema 22.9) įrodyme, galioja lygybė $\det(v,v') = r^2\tau'$, todėl $\tau'(0) = -\det(u_\theta, Xu_\theta)$. Be to, galioja lygybė $(r^2)' = 2\,v\cdot v'$, todėl $r'(0) = -u_\theta \cdot Xu_\theta$. Dabar išdiferencijuokime reiškinį $r(s)^{-(\nu+1)}\varphi(\tau(s))$ taške $s=0$. Sandaugos diferencijavimo taisyklė su šiomis dydžių $r'(0)$ ir $\tau'(0)$ reikšmėmis duoda lemoje nurodytą formulę. ∎

Naudosime bazę

$$W = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

be to, galioja lygybė $\exp(\alpha W) = k_\alpha$. Taip pat turime lygybes $Wu_\theta = u'_\theta$, $Hu_\theta = (\cos\theta, -\sin\theta)^{\mathsf{T}}$ ir $Qu_\theta = (\sin\theta, \cos\theta)^{\mathsf{T}}$. Išvestinės formulė (Lema 22.13) duoda tokią lentelę:

X	$u_\theta \cdot Xu_\theta$	$\det(u_\theta, Xu_\theta)$	$d\Pi(X)\varphi$
W	0	1	$-\varphi'$
H	$\cos 2\theta$	$-\sin 2\theta$	$(\nu+1)\cos 2\theta\,\varphi + \sin 2\theta\,\varphi'$
Q	$\sin 2\theta$	$\cos 2\theta$	$(\nu+1)\sin 2\theta\,\varphi - \cos 2\theta\,\varphi'$

Pažymėkime elementus $X_\pm = H \pm iQ \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Kadangi $\sin 2\theta \mp i\cos 2\theta = \mp i e^{\pm 2i\theta}$, galioja lygybė

$$d\Pi(X_\pm)\varphi = e^{\pm 2i\theta}\big((\nu+1)\varphi \mp i\varphi'\big).$$

Čia naudojamas elementas W yra priešingas 21-osios paskaitos elementui W, todėl šios paskaitos matrica k_α ten yra užrašoma kaip $k_{-\alpha}$. Pagal 21-osios paskaitos žymėjimus galioja lygybės $E = X_+/2$, $F = X_-/2$ ir $H' = iW$. Taigi Furjė vektorius e_n tos paskaitos parametrizacijoje turi tipą n, nors čia jo charakteris įgyja reikšmes $e^{-in\alpha}$. Šie elementai E ir F nėra realiosios matricos iš Skyrelio 22.1, kuriame matrica E yra viršutinė trikampė.

Teiginys 22.14. *Kai $n \equiv \varepsilon \pmod 2$, galioja lygybės*

$$d\Pi(W)e_n = -in\,e_n, \qquad d\Pi(X_+)e_n = (\nu+1+n)\,e_{n+2}, \qquad d\Pi(X_-)e_n = (\nu+1-n)\,e_{n-2}.$$

Pagal 21-osios paskaitos žymėjimus galioja lygybės $d\Pi(E)e_n = \frac{1}{2}(\nu+1+n)e_{n+2}$ ir $d\Pi(F)e_n = \frac{1}{2}(\nu+1-n)e_{n-2}$.

Įrodymas. Įrašykime $e'_n = in\,e_n$ į lentelės eilutę, atitinkančią elementą W, ir į atskiroje eilutėje užrašytą operatorių $d\Pi(X_\pm)$ formulę. Pavyzdžiui, $(\nu+1) - i(in) = \nu+1+n$. ∎

Kopėčių formulės taip pat rodo, kad atvaizdavimas $d\Pi$ išlaiko skliaustus visiems $\nu \in \mathbb{C}$. Kadangi vektorius e_n yra operatoriaus $d\Pi(W)$ tikrinis vektorius, gauname

$$[d\Pi(W), d\Pi(X_\pm)]e_n = \big(-i(n \pm 2) + in\big)(\nu + 1 \pm n)\, e_{n\pm 2} = \mp 2i\, d\Pi(X_\pm)e_n.$$

Abiejų kopėčių operatorių sandaugos veikia taip:

$$d\Pi(X_\mp)d\Pi(X_\pm)e_n = (\nu + 1 \pm n)(\nu - 1 \mp n)\, e_n = \big(\nu^2 - (1 \pm n)^2\big)e_n.$$

Atėmę vieną atvejį iš kito, gauname

$$[d\Pi(X_+), d\Pi(X_-)]e_n = \big((1+n)^2 - (1-n)^2\big)e_n = 4n\, e_n = 4i\, d\Pi(W)e_n.$$

Algebroje $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ iš skliaustų $[W,H] = 2Q$, $[W,Q] = -2H$ ir $[H,Q] = -2W$ išplaukia lygybės $[W, X_\pm] = \mp 2iX_\pm$ ir $[X_+, X_-] = 4iW$ (Uždavinys 22.4). Elementai W, X_+ ir X_- apvelka algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Atvaizdavimas $d\Pi$ yra kompleksiškai tiesinis. Todėl lygybė $d\Pi([Y,Z]) = [d\Pi(Y), d\Pi(Z)]$ galioja visiems $Y, Z \in \mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Taigi atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ įvaizdis erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$ visiems $\nu \in \mathbb{C}$.

Teiginys 22.15. *Poerdvis $U \subseteq V_{\varepsilon,\nu}$ yra stabilus operatorių $\Pi(K)$ ir $d\Pi(\mathfrak{g})$ atžvilgiu tada ir tik tada, kai $U = \operatorname{span}\{e_n : n \in S\}$ su kuria nors aibe S, tenkinančia šias dvi sąlygas. Jei $n \in S$ ir $\nu + 1 + n \neq 0$, tai $n + 2 \in S$. Jei $n \in S$ ir $\nu + 1 - n \neq 0$, tai $n - 2 \in S$. Todėl $(\mathfrak{g}, K)$-modulis $V_{\varepsilon,\nu}$ yra neredukuojamas tada ir tik tada, kai parametras ν nėra sveikasis skaičius, tenkinantis sąlygą $\nu \equiv \varepsilon + 1 \pmod 2$.*

Įrodymas. Tegul poerdvis U yra K-stabilus. Tegul vektorius $u = \sum c_n e_n \in U$ yra baigtinė suma. Vektoriai e_n, kuriems $c_n \neq 0$, apvelka baigtinės dimensijos K-stabilią erdvę F. Tolydžioji kreivė $\alpha \mapsto e^{in\alpha}\Pi(k_\alpha)u$ yra poerdvyje $U \cap F$, kuris yra uždaras erdvėje F. Todėl vektorius

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{in\alpha}\,\Pi(k_\alpha)u\, d\alpha = c_n e_n$$


priklauso poerdviui U. Taigi poerdvį U apvelka jam priklausantys vektoriai e_n. Kadangi elementai H ir Q yra elementų $X_\pm$ tiesiniai dariniai, o operatorius $d\Pi(W)$ palieka invariantinį kiekvieną poerdvį, kurį apvelka kurie nors vektoriai e_n, stabilumas operatorių $d\Pi(\mathfrak{g})$ atžvilgiu reiškia stabilumą operatorių $d\Pi(X_\pm)$ atžvilgiu. Pagal kopėčių formules (Teiginys 22.14) šis stabilumas yra lygiavertis teiginyje nurodytai aibės S savybei.

Jei nė vienas koeficientas $\nu + 1 \pm n$ nelygus nuliui, tai kiekviena netuščia leistina aibė S apima visus skaičius $n \equiv \varepsilon$. Jei $\nu + 1 + n_0 = 0$, tai aibė $S = \{n \le n_0\}$ yra leistina ir neapima visų tokių skaičių. Jei $\nu + 1 - n_0 = 0$, imkime aibę $S = \{n \ge n_0\}$. Galiausiai lygybė $\nu = -(n_0 + 1)$ arba lygybė $\nu = n_0 - 1$ su kuriuo nors skaičiumi $n_0 \equiv \varepsilon$ reiškia būtent tai, kad $\nu \in \mathbb{Z}$ ir $\nu \equiv \varepsilon + 1 \pmod 2$. ∎

Kriterijų, taikomą keturiems parametrams, vaizduoja 22.2 pav.

22.5 Uždarieji invariantiniai poerdviai

Dabar nuo modulio $V_{\varepsilon,\nu}$ pereisime prie Hilberto įvaizdžio erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Kiekvienas $(\mathfrak{g}, K)$-pomodulis yra algebrinis objektas, o uždarasis invariantinis poerdvis yra analizinis objektas,



22.2 pav.: Modulio $V_{\varepsilon,\nu}$ kopėčios, kurių eilutės pažymėtos poromis (ε, ν). Kiekvienas taškas yra vienmatė erdvė $\mathbb{C}e_n$, o eilutės tęsiasi į abi puses. Viršutinės rodyklės vaizduoja operatorių $d\Pi(X_+)$, o apatinės – operatorių $d\Pi(X_-)$. Rodyklės nėra ten, kur jos koeficientas lygus nuliui. Taškų aibė yra invariantinė, jei jos nepalieka nė viena rodyklė, o rėmeliai žymi tokias aibes.

todėl vien pomodulių kriterijus šio klausimo neišsprendžia. Bendruoju atveju perėjimas tarp jų yra Harišo Čandros atitiktis leistiniesiems įvaizdžiams. Šiai šeimai tai, ko mums reikia, įrodysime tiesiogiai. Pirmiausia parodysime, kad uždarajame invariantiniame poerdvyje yra Furjė vektorių. Toliau parodysime, kad pusinių kopėčių uždarasis tiesinis apvalkalas yra invariantinis.

Lema 22.16. *Tegul $Y \neq 0$ yra erdvės $\mathcal{H}_\varepsilon$ uždarasis poerdvis, invariantinis operatorių $\Pi_{\varepsilon,\nu}(G)$ atžvilgiu. Jei $v \in Y$ ir $\langle e_k, v\rangle \neq 0$, tai $e_k \in Y$. Jei $e_k \in Y$, tai $d\Pi(X_\pm)e_k \in Y$.*

Įrodymas. Pagal posūkių pavyzdį (Pavyzdys 22.8) vektoriaus $\Pi(k_\alpha)v$ Furjė koeficientas, atitinkantis indeksą m, lygus $e^{-im\alpha}\langle e_m, v\rangle$. Todėl integralas

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{ik\alpha}\,\Pi(k_\alpha)v\,d\alpha = \langle e_k, v\rangle e_k$$

turi Furjė koeficientą $\langle e_k, v\rangle$, atitinkantį indeksą k, o kiti jo koeficientai lygūs 0. Šis integralas yra poerdvio Y vektorių Rymano sumų riba pagal normą, nes pointegralinė funkcija yra tolydi. Kadangi poerdvis Y yra uždaras, $e_k \in Y$.

Vektorius e_k yra glodus, kaip parodyta prieš išvestinės formulę (Lema 22.13). Kai $X \in \mathfrak{g}$, santykis $t^{-1}(\Pi(\exp tX)e_k - e_k)$ priklauso poerdviui Y ir pagal normą konverguoja į vektorių $d\Pi(X)e_k$. Todėl $d\Pi(X)e_k \in Y$. Kompleksiniai tiesiniai dariniai duoda $d\Pi(X_\pm)e_k \in Y$. ∎

Tegul $n \geq 1$ yra sveikasis skaičius ir $\varepsilon \equiv n \pmod 2$. Kai $\nu = n - 1$, kopėčios rodo pusines kopėčias $k \geq n$. Apibrėžkime uždarąjį tiesinį apvalkalą

$$H_n^+ = \overline{\operatorname{span}}\{e_{n+2m} : m \geq 0\} \subset \mathcal{H}_\varepsilon,$$

ir panašiai $H_n^- = \overline{\operatorname{span}}\{e_{-n-2m} : m \geq 0\}$. Vien kopėčios neparodo, kad poerdvis H_n^+ yra invariantinis grupės atžvilgiu, nes operatorius $\Pi(g)$ nėra operatorių $d\Pi$ polinomas. Naudosime laipsnines eilutes pagal kintamąjį $z = e^{2i\theta}$. Polinomui f apibrėžkime

$$(U_n f)(\theta) = e^{in\theta} f(e^{2i\theta}), \qquad \text{todėl} \qquad U_n z^m = e_{n+2m}.$$

Imame polinomus, nes bendras poerdvio H_n^+ vektorius nebūtinai pratęsiamas iki funkcijos, holomorfinės uždarojo vienetinio disko aplinkoje.

Be to, fiksuokime kompleksinę matricą $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}$. Kai $g \in G$ ir $g^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, sudauginę matricas, gauname

$$\gamma g^{-1}\gamma^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar\beta & \bar\alpha \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \tfrac{1}{2}\big(a+d+i(c-b)\big), \qquad \beta = \tfrac{1}{2}\big(a-d+i(b+c)\big). \tag{22.5}$$

Determinantas duoda lygybę $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = ad - bc = 1$. Todėl $|\beta| < |\alpha|$.

Teiginys 22.17. *Tegul $n \geq 1$, $\varepsilon \equiv n \pmod 2$, $g \in G$, o f yra polinomas. Kai $z = e^{2i\theta}$, o skaičiai α, β yra tokie kaip formulėje (22.5), galioja lygybė*

$$(\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)U_n f)(\theta) = e^{in\theta}\,(\bar\beta z + \bar\alpha)^{-n}\, f\Big(\frac{\alpha z + \beta}{\bar\beta z + \bar\alpha}\Big). \tag{22.6}$$

Įrodymas. Realiajam vektoriui v turime $\gamma v = (v_1 + iv_2,\ v_1 - iv_2)^{\mathsf T}$. Todėl $\gamma u_\theta = e^{-i\theta}(z,1)^{\mathsf T}$. Užrašykime $g^{-1}u_\theta = r u_\tau$, kur $r = |g^{-1}u_\theta|$ ir $\tau = \tau_{g^{-1}}(\theta)$. Pritaikykime matricą γ abiem pusėms. Kadangi $\gamma g^{-1} = (\gamma g^{-1}\gamma^{-1})\gamma$, gauname

$$r e^{-i\tau}\begin{pmatrix} e^{2i\tau} \\ 1 \end{pmatrix} = e^{-i\theta}\begin{pmatrix} \alpha z + \beta \\ \bar\beta z + \bar\alpha \end{pmatrix}.$$

Antrieji elementai duoda lygybę $\bar\beta z + \bar\alpha = r e^{i(\theta-\tau)}$. Padaliję pirmuosius elementus iš antrųjų, gauname $e^{2i\tau} = (\alpha z + \beta)/(\bar\beta z + \bar\alpha)$. Dabar apskritimo modelio formulė (22.4), kai $\nu + 1 = n$, duoda

$$(\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)U_n f)(\theta) = r^{-n}e^{in\tau} f(e^{2i\tau}) = e^{in\theta}\big(re^{i(\theta-\tau)}\big)^{-n} f(e^{2i\tau}),$$

o tai yra teiginyje nurodyta formulė. ∎

Teiginys 22.18. *Tegul $n \geq 1$ ir $\varepsilon \equiv n \pmod 2$. Poerdviai H_n^+ ir H_n^- yra invariantiniai įvaizdžio $\Pi_{\varepsilon,n-1}$ atžvilgiu. Jų ortogonalieji papildiniai erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$ yra invariantiniai įvaizdžio $\Pi_{\varepsilon,-(n-1)}$ atžvilgiu.*

Įrodymas. Poerdvis H_n^+. Tegul $g \in G$, o f yra polinomas. Kadangi $|\beta/\alpha| < 1$, geometrinė eilutė

$$(\bar\beta w + \bar\alpha)^{-1} = \bar\alpha^{-1}\sum_{l\geq 0}(-\bar\beta w/\bar\alpha)^l$$

absoliučiai ir tolygiai konverguoja aibėje $|w| \leq 1$, ir tas pats galioja jos laipsniams. Todėl kintamojo w funkcija, gauta iš formulės (22.6) dešiniosios pusės, turi laipsninę eilutę $\sum_{l\geq 0} b_l w^l$, kuri tolygiai konverguoja aibėje $|w| = 1$. Įstatę $w = e^{2i\theta}$, matome, kad funkcija $\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)U_n f$ yra tolygioji riba, taigi ir riba erdvėje L^2, vektorių e_{n+2l} baigtinių tiesinių darinių. Todėl ši funkcija priklauso poerdviui H_n^+. Vektorių $U_n f$ tiesinis apvalkalas yra tirštas poerdvyje H_n^+, o operatorius $\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)$ yra aprėžtas. Todėl $\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)H_n^+ \subset H_n^+$ kiekvienam g.

Poerdvis H_n^-. Realiajam parametrui ν daugiklis formulėje (22.4) yra realusis, todėl kompleksinis jungtinimas komutuoja su operatoriumi $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$. Jungtinimas poerdvį H_n^+ atvaizduoja į visą poerdvį H_n^-. Todėl poerdvis H_n^- yra invariantinis, kai $\nu = n - 1$.

Papildiniai. Pagal jungtinio operatoriaus formulę po porinimo tapatybės (Teiginys 22.10) galioja lygybė $\Pi_{\varepsilon,-(n-1)}(g)^* = \Pi_{\varepsilon,n-1}(g^{-1})$. Tegul $v \perp H_n^\pm$ ir $u \in H_n^\pm$. Tada

$$\langle u, \Pi_{\varepsilon,-(n-1)}(g)v\rangle = \langle \Pi_{\varepsilon,n-1}(g^{-1})u, v\rangle = 0.$$ ∎

Teorema 22.19 (Neredukuojamumas; abu ekvivalentumai cituojami). *Tegul $\nu \in \mathbb{C}$. Įvaizdis $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$ neturi uždarųjų invariantinių poerdvių, išskyrus poerdvius 0 ir $\mathcal{H}_\varepsilon$, tada ir tik tada, kai $\nu \notin \varepsilon+1+2\mathbb{Z}$. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, visi įvaizdžiai $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra neredukuojami, išskyrus įvaizdį $\Pi_{1,0}$. Erdvė $\mathcal{H}_1$, kurioje veikia įvaizdis $\Pi_{1,0}$, yra aibių $\{e_n : n > 0\}$ ir $\{e_n : n < 0\}$ uždarųjų tiesinių apvalkalų ortogonalioji suma. Kiekvienas šios sumos dėmuo yra neredukuojamas. Be to, kai $\nu \notin \varepsilon + 1 + 2\mathbb{Z}$, galioja izomorfizmas $V_{\varepsilon,\nu} \cong V_{\varepsilon,-\nu}$, suprantamas kaip $(\mathfrak{g}, K)$-modulių izomorfizmas. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, įvaizdžiai $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ ir $\Pi_{\varepsilon,-\nu}$ yra unitariai ekvivalentūs. Šie du ekvivalentumai cituojami iš knygos Knapp,* Representation Theory of Semisimple Groups*, §II.5, ir iš Etingof kurso 18.757 konspekto, paskaitos 19.*

Įrodymas. Įrodysime pirmąją pastraipą.

Neredukuojamumas. Tegul $\nu \notin \varepsilon + 1 + 2\mathbb{Z}$, o $W \neq 0$ yra uždarasis invariantinis poerdvis. Nenulinis poerdvio W vektorius turi nenulinį Furjė koeficientą, todėl pagal Lemą 22.16 galioja sąryšis $e_k \in W$ su kuriuo nors k. Nė vienas koeficientas $\nu + 1 \pm n$, kai $n \equiv \varepsilon$, nelygus nuliui. Todėl kopėčių formulės (Teiginys 22.14) ir Lema 22.16 rodo, kad kiekvienas vektorius e_n, kur $n \equiv \varepsilon$, priklauso poerdviui W. Vadinasi, $W = \mathcal{H}_\varepsilon$.

Redukuojamumas. Tegul $\nu \in \varepsilon + 1 + 2\mathbb{Z}$. Tada $\nu = n - 1$ arba $\nu = -(n-1)$ su kuriuo nors sveikuoju skaičiumi $n \geq 1$, kuriam $n \equiv \varepsilon \pmod 2$. Pagal Teiginį 22.18 šiais dviem atvejais uždarasis invariantinis poerdvis yra atitinkamai poerdvis H_n^+ arba jo ortogonalusis papildinys. Kiekvienas iš jų yra nenulinis ir nesutampa su visa erdve.

Menamoji ašis. Skaičius $\nu \in i\mathbb{R}$ priklauso aibei $\varepsilon + 1 + 2\mathbb{Z}$ tik tada, kai $\nu = 0$ ir $\varepsilon = 1$. Todėl išimtis yra įvaizdis $\Pi_{1,0}$.

Taškas $(1,0)$. Imkime $n = 1$. Tada poerdviai H_1^+ ir H_1^- yra invariantiniai, tarpusavyje ortogonalūs ir kartu apvelka erdvę $\mathcal{H}_1$. Tegul $W \neq 0$ yra poerdvio H_1^+ uždarasis invariantinis poerdvis. Nenulinis poerdvio W vektorius turi nenulinį koeficientą, atitinkantį kurį nors nelyginį skaičių $k \geq 1$, todėl $e_k \in W$. Nelyginiams skaičiams $n \geq 1$ turime $1 + n \neq 0$, o nelyginiams skaičiams $n \geq 3$ turime $1 - n \neq 0$. Todėl pagal kopėčių formules kiekvienas vektorius e_n, kur skaičius $n \geq 1$ yra nelyginis, priklauso poerdviui W. Vadinasi, $W = H_1^+$. Kompleksinis jungtinimas duoda tą patį rezultatą poerdviui H_1^-. ∎

Prie redukuojamumo taškuose atsirandančių dalių grįšime 23-ioje paskaitoje.

Redukuojamas modulis taške $(\varepsilon, \nu) = (1, 0)$

Paprasčiausias redukuojamumo taškas yra $(\varepsilon, \nu) = (1, 0)$. Furjė žymės yra nelyginiai sveikieji skaičiai. Kopėčių formulės įgyja pavidalą

$$d\Pi(X_+)e_n = (1+n)e_{n+2}, \qquad d\Pi(X_-)e_n = (1-n)e_{n-2}.$$

Kai $n=-1$, aukštyn keliančio kopėčių operatoriaus koeficientas lygus nuliui. Kai $n=1$, žemyn nuleidžiančio kopėčių operatoriaus koeficientas lygus nuliui. Taigi erdvė $V_{1,0}$ yra tiesioginė suma

$$V_{1,0} = \operatorname{span}\{e_1, e_3, e_5, \ldots\} \oplus \operatorname{span}\{e_{-1}, e_{-3}, e_{-5}, \ldots\}.$$

Abu kopėčių operatoriai ir grupė K palieka kiekvieną dėmenį invariantinį. Kiekvienoje grandinėje likę jungiantieji koeficientai yra nenuliniai. Pomodulių kriterijaus (Teiginys 22.15) įrodyme naudotas svorių projekcijos samprotavimas rodo, kad kiekviena grandinė yra algebriškai neredukuojama.

Neredukuojamumo teorema (Teorema 22.19) duoda du uždaruosius neredukuojamus dėmenis. Jų invariantiškumas grupės atžvilgiu yra Teiginys 22.18, ir jis išeina už aukščiau atlikto algebrinio skaičiavimo ribų. Kaip diskrečiųjų serijų ribas juos atpažinsime 23-ioje paskaitoje ir ten paaiškinsime jų normas. Visos nelyginės kopėčios nutrūksta tarp žymių -1 ir 1.

Palyginimui, taške $(\varepsilon,\nu)=(0,0)$ žymės yra tik lyginės. Nei lygtis $1+n=0$, nei lygtis $1-n=0$ neturi lyginio sprendinio. Todėl šio taško algebrinis modulis yra neredukuojamas.

Šiuos du modulius palyginsime naudodami Kazimiro elementą $\Omega = H^2+Q^2-W^2$, priklausantį algebrai $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Uždavinyje 22.4 yra parodyta, kad lygybė $\Omega = X_+X_- - 2iW - W^2$ galioja algebroje $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Kadangi atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ įvaizdis, jį galima pratęsti iki algebros $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Todėl ši lygybė galioja ir operatoriams. Pagal kopėčių formules (Teiginys 22.14) trys šios lygybės dešiniosios pusės nariai veikia vektorių e_n kaip daugyba iš skaičių $\nu^2-(1-n)^2$, $-2n$ ir n^2. Todėl elementas Ω erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$ veikia kaip daugyba iš skaliaro

$$\nu^2-(1-n)^2-2n+n^2 = \nu^2-1.$$

Pagal aukščiau nurodytus 21-osios paskaitos žymėjimų atitikmenis galioja lygybės $2EF+2FE=H^2+Q^2$ ir $H'^2=-W^2$. Todėl šis elementas Ω yra 21-osios paskaitos Kazimiro elementas $H'^2+2EF+2FE$.

Kaip radome 21-oje paskaitoje, $\Omega = m(m+2)$ erdvėje V_m. Ši reikšmė lygi ν^2-1, kai $\nu=\pm(m+1)$. Imkime $\nu=-(m+1)$, o parametro ε lyginumas tegul sutampa su skaičiaus m lyginumu. Tada plokštumos funkcijai F homogeniškumo taisyklė (22.3) įgyja pavidalą $F(cv)=c^mF(v)$. Homogeniniai m laipsnio polinomai erdvėje $\mathbb{R}^2$ sudaro baigtinės dimensijos invariantinę erdvę. Apskritime jie apvelka vektorius e_n, kur $|n|\le m$ ir $n\equiv m \pmod 2$.

Taškuose $(\varepsilon,\nu)=(1,0)$ ir $(0,0)$ šis skaliaras lygus -1. Vis dėlto šie du moduliai turi skirtingus centrinius lyginumus ir skiriasi redukuojamumu. Vien Kazimiro elemento reikšmė nėra klasifikacijos žymė.

22.6 Savikontrolė

1. Koks yra operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(-I)$?
   Atsakymas. Vektorius $(-I)^{-1}u_\theta = u_{\theta+\pi}$ turi ilgį 1. Todėl galioja lygybės $(\Pi(-I)\varphi)(\theta) = \varphi(\theta+\pi) = (-1)^\varepsilon\varphi(\theta)$. Centras veikia charakteriu σ_ε, kad ir koks būtų parametras ν.
2. Su kuriomis poromis (ε,ν) vektorius e_0 yra invariantinis grupės G atžvilgiu?
   Atsakymas. Reikia, kad $e_0\in C_\varepsilon$, todėl $\varepsilon=0$. Taip pat reikia, kad $d\Pi(X_+)e_0=(\nu+1)e_2=0$, todėl $\nu=-1$. Atvirkščiai, kai $\nu=-1$, daugiklis apskritimo modelio formulėje (22.4) lygus 1, todėl $\Pi(g)e_0=e_0$.

3. Kodėl modulis $V_{1,0}$ yra redukuojamas?
   Atsakymas. Šiuo atveju lygybė $\nu + 1 + n = 0$ galioja, kai $n = -1$, o lygybė $\nu + 1 - n = 0$ galioja, kai $n = 1$. Todėl $d\Pi(X_+)e_{-1} = 0$ ir $d\Pi(X_-)e_1 = 0$. Aibės $\{n \geq 1\}$ ir $\{n \leq -1\}$ yra leistinos. Modulis $V_{1,0}$ yra jų tiesinių apvalkalų tiesioginė suma.

22.7 Santrauka

Pagrindinė serija $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra indukuojama iš charakterio $\sigma_\varepsilon \otimes e^{\nu t}$, apibrėžto grupėje $P = MAN$, su poslinkiu $\Delta_P^{1/2}$. Apribojimas pogrupyje K sutapatina kiekvieną erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ su erdve, kurią sudaro tolydžiosios funkcijos apskritime, turinčios lyginumą ε. Grupė šias funkcijas veikia pagal apskritimo modelio formulę (22.4). Dėl tapatybės $\tau'_h = |hu_\theta|^{-2}$ įvaizdžių su parametrais ν ir $-\bar{\nu}$ porinimas yra invariantinis. Todėl, kai $\nu \in i\mathbb{R}$, operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ galima pratęsti iki stipriai tolydaus unitariojo įvaizdžio erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$.

Kiekvienas K-tipas, įeinantis į modulį $V_{\varepsilon,\nu}$, įeina lygiai vieną kartą. Šio tipo poerdvį apvelka vienas vektorius e_n, kur $n \equiv \varepsilon \pmod 2$. Elementai $X_\pm$ keičia žymę n dydžiu ± 2 su koeficientais $\nu + 1 \pm n$. Įrodėme, kad $(\mathfrak{g}, K)$-modulis $V_{\varepsilon,\nu}$ yra redukuojamas tada ir tik tada, kai parametras ν yra sveikasis skaičius, kurio lyginumas yra priešingas skaičiaus ε lyginumui. Taip pat įrodėme tą patį kriterijų erdvės $\mathcal{H}_\varepsilon$ uždariesiems invariantiniams poerdviams. Furjė projekcija ir kopėčios duoda neredukuojamumą už šių taškų ribų. Kai $\nu = n - 1$, formulės (22.6) laipsninės eilutės rodo, kad pusinių kopėčių $k \geq n$ uždarasis tiesinis apvalkalas yra invariantinis, o kai $\nu = -(n-1)$, invariantinis yra jo ortogonalusis papildinys. Taške $(\varepsilon, \nu) = (1, 0)$ abejos pusinės kopėčios išskaido erdvę $\mathcal{H}_1$ į neredukuojamus dėmenis. Parametrų $\pm\nu$ modulių ekvivalentumas ir jo unitarioji versija lieka cituojami.

22.8 Literatūra

- A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples* (Princeton, 2001), §II.5 apie grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir §§VII.1–2 apie indukciją iš parabolinių pogrupių bendruoju atveju.
- P. Etingof, MIT kurso 18.757 paskaitų konspektas *Representations of Lie Groups*, paskaitos 9 ir 19.

Paskaita 23

Diskrečiosios serijos ir pirmojo rango unitariųjų įvaizdžių visuma

Tikslai. *Grupės* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ *holomorfinę diskrečiąją seriją realizuosime svertinėse erdvėse, kurias sudaro holomorfinės funkcijos diske. Paskui ją palyginsime su baigtinės dimensijos moduliais ir pagrindinės serijos moduliais, o atvaizdavimu* U_n *jos polinomus sutapatinsime su pagrindinės serijos pusinėmis kopėčiomis. Galiausiai pateiksime visą neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių sąrašą ir įrodysime, kad baigtinės dimensijos unitarusis įvaizdis yra trivialusis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad Π_n yra neredukuojamas unitarusis įvaizdis svertinėje disko erdvėje $\mathcal{A}_n$ su kiekvienu sveikuoju skaičiumi $n \geq 2$.
- Apskaičiuoti šio įvaizdžio K-tipus $n, n+2, \ldots$ ir elementų H', E, F veikimą, o atvaizdavimu U_n sutapatinti jo polinomus su pagrindinės serijos pusinėmis kopėčiomis.
- Nustatyti, kurie žemiausieji svoriai λ pasitaiko grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ neredukuojamuose unitariuosiuose įvaizdžiuose ir kada toks įvaizdis faktorizuojasi per grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$.
- Suformuluoti Bargmano klasifikaciją, išvesti teigiamumo įverčius, kuriais ji remiasi, ir įrodyti, kad kiekvienas baigtinės dimensijos tolydus grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitarusis įvaizdis yra trivialusis.

23.1 Disko modelis

Ankstesnėje, 22-oje paskaitoje radome pusines kopėčias, kai $\nu = n-1$. Kai $n \geq 2$, 22-osios paskaitos L^2 norma ten nėra invariantinė, todėl pusinėms kopėčioms reikia naujos normos. Pusinių kopėčių K-tipai yra vieno ženklo. Laipsninės eilutės pagal kintamąjį z turi tokį patį pavidalą, nes posūkis monomą z^m padaugina iš skaičiaus $e^{2i\theta}$ laipsnio. Todėl ieškosime holomorfinių funkcijų diske.

Tegul $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Laikysimės 21-osios paskaitos susitarimų:

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad k_\theta = \exp(\theta W) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad K = \{k_\theta\}.$$

Taigi $k_{2\pi} = I$ ir $k_\pi = -I$. Paimkime matricas $H_0 = \mathrm{diag}(1,-1)$ ir $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Apibrėžkime elementus

$$H' = -iW, \qquad E = \tfrac{1}{2}(H_0 + iS), \qquad F = \tfrac{1}{2}(H_0 - iS) = \overline{E}.$$

Tada galioja sąryšiai $[H', E] = 2E$, $[H', F] = -2F$ ir $[E, F] = H'$. Įvaizdžio Π vektorius v turi *K-tipą* k, jei lygybė $\Pi(k_\theta)v = e^{ik\theta}v$ galioja su visais skaičiais θ. Jei toks vektorius v yra glodus, tai $d\Pi(H')v = kv$.

Diske veikia grupė

$$\mathrm{SU}(1,1) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} : |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1 \right\}.$$

Paimkime Keilio matricą $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}$ ir apibrėžkime atvaizdavimą formule $\varphi(g) = \gamma g \gamma^{-1}$.

Kai $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$, sudauginę matricas, gauname

$$\varphi(g) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \tfrac{1}{2}\big(a + d + i(c - b)\big), \qquad \beta = \tfrac{1}{2}\big(a - d + i(b + c)\big). \tag{23.1}$$

Tada galioja lygybė $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = ad - bc = 1$. Išsprendę sistemą (23.1) kintamųjų a, b, c, d atžvilgiu, matome, kad φ yra Lie grupių izomorfizmas iš grupės G į visą grupę $\mathrm{SU}(1,1)$. Be to,

$$\varphi(k_\theta) = \mathrm{diag}(e^{-i\theta}, e^{i\theta}), \qquad \varphi(-I) = -I. \tag{23.2}$$

Jungtinimas matrica γ yra kompleksiškai tiesinis visų 2×2 matricų erdvėje. Tiesiogiai sudauginę matricas, gauname

$$\gamma H' \gamma^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \gamma E \gamma^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma F \gamma^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{23.3}$$

Matrica $\bar{\gamma}$, kuri yra Uždavinio 20.1 matrica c, duoda trejetą 21-osios paskaitos tvarka. Mūsų matrica γ šią tvarką apverčia, kad toliau apibrėžiamo įvaizdžio Π_n visi K-tipai būtų teigiami.

Funkcija, apibrėžta atvirajame kompleksinės plokštumos poaibyje, yra vadinama *holomorfine*, jei ji yra kompleksiškai diferencijuojama kiekviename taške.

Iš elementariosios kompleksinės analizės perimsime tris rezultatus. Pirmasis rezultatas yra lokalioji laipsninių eilučių teorema. Diske holomorfinė funkcija turi Teiloro eilutę, kuri tolygiai konverguoja kiekviename mažesniame uždarajame diske. Antrasis rezultatas yra susijęs su laipsninėmis eilutėmis. Laipsninė eilutė, kurios centras yra disko centras ir kuri konverguoja kiekviename disko taške, tame diske apibrėžia holomorfinę funkciją. Trečiasis rezultatas išplaukia iš Koši–Rymano lygčių. Holomorfinio atvaizdavimo realusis jakobianas yra lygus jo kompleksinės išvestinės modulio kvadratui. Šiuos analizės rezultatus naudosime toliau. Žr. MIT 18.112 paskaitas apie Koši formulę, laipsnines eilutes ir Koši–Rymano lygtis.

Tegul diskas yra $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$. Šio disko uždarinį žymėsime simboliu $\overline{D}$. Matricai $h \in \mathrm{SU}(1,1)$, užrašytai kaip aukščiau, ir taškui $z \in \overline{D}$ apibrėžkime veikimą ir funkciją formulėmis

$$h \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\bar{\beta} z + \bar{\alpha}}, \qquad j(h, z) = \bar{\beta} z + \bar{\alpha}.$$

Lema 23.1. *Tegul $h, h_1, h_2 \in \mathrm{SU}(1,1)$ ir $z \in \overline{D}$.*

(a) Galioja nelygybė $|j(h,z)| \geq |\alpha| - |\beta| > 0$ ir lygybė $|j(h,z)|^2 - |\alpha z + \beta|^2 = 1 - |z|^2$.

(b) Elementas h atvaizduoja aibę D į aibę D ir aibę $\overline{D}$ į aibę $\overline{D}$. Be to, galioja lygybės $(h_1 h_2) \cdot z = h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$ ir $j(h_1 h_2, z) = j(h_1, h_2 \cdot z)\, j(h_2, z)$.

(c) Galioja lygybė $d(h \cdot z)/dz = j(h,z)^{-2}$.

Įrodymas. (a) Pasinaudokime nelygybe $|z| \leq 1$ ir lygybe $|\alpha|^2 = 1 + |\beta|^2$. Išskleidę abu kvadratus, matome, kad mišrieji nariai susiprastina. Lieka reiškinys $(|\alpha|^2 - |\beta|^2)(1 - |z|^2)$.

(b) Padaliję (a) dalies lygybę iš dydžio $|j(h,z)|^2$, gauname

$$1 - |h \cdot z|^2 = \frac{1 - |z|^2}{|j(h,z)|^2}. \tag{23.4}$$

Todėl nelygybė $|h \cdot z| < 1$ galioja visada, kai $|z| < 1$. Taigi elementas h atvaizduoja aibę D į aibę D. Be to, nelygybė $1 - |h \cdot z|^2 \geq 0$ galioja, kai $|z| \leq 1$, o lygybė pasiekiama tada ir tik tada, kai $|z| = 1$. Todėl elementas h atvaizduoja aibę $\overline{D}$ į aibę $\overline{D}$.

Toliau pastebėkime, kad

$$j(h_1, h_2 \cdot z)\, j(h_2, z) = \bar{\beta}_1(\alpha_2 z + \beta_2) + \bar{\alpha}_1(\bar{\beta}_2 z + \bar{\alpha}_2).$$

Šios lygybės dešinioji pusė yra matricos $h_1 h_2$ apatinės eilutės sandauga su stulpeliu $(z,1)^T$, todėl ji lygi dydžiui $j(h_1 h_2, z)$. Lygiai taip pat matricos $h_1 h_2$ viršutinės eilutės sandauga su stulpeliu $(z,1)^T$ yra reiškinio $(h_1 h_2) \cdot z$ skaitiklis. Šis skaitiklis lygus dydžio $j(h_2, z)$ ir reiškinio $h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$ skaitiklio sandaugai. Padaliję viršutinės eilutės sandaugą iš apatinės eilutės sandaugos, suprastiname daugiklį $j(h_2, z)$ ir gauname lygybę $(h_1 h_2) \cdot z = h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$.

(c) Pagal dalmens diferencijavimo taisyklę išvestinės skaitiklis yra $\alpha(\bar{\beta} z + \bar{\alpha}) - \bar{\beta}(\alpha z + \beta) = 1$. ∎


Prieš pasirinkdami normą, ieškosime invariantinio ploto. Pagal tapatybę (23.4) ir Lemos 23.1(c) dalį ploto forma $dA/(1-|z|^2)^2$ diske D yra invariantinė grupės $\mathrm{SU}(1,1)$ atžvilgiu. Tai yra *hiperbolinis plotas*. Matrica $\bar{\gamma}$ perkelia 20-osios paskaitos viršutinę pusplokštumą $\mathbb{H}$ į diską D, taškas i pereina į tašką 0, o ši forma tampa forma $\frac{1}{4} y^{-2} dx\, dy$. Todėl ji yra 20-osios paskaitos invariantinio mato, t.y. 16-osios paskaitos kairiojo Haro mato, pastovus kartotinis. Šį žemėlapį vaizduoja 23.1 pav. Mūsų matrica γ vietoje viršutinės pusplokštumos naudoja apatinę, o taškas $-i$ pereina į tašką 0, kad K-tipai įvaizdyje Π_n būtų teigiami.

Dabar imkime funkcijas f ir $\Pi_n(h)f$, kaip toliau pateiktoje formulėje (23.5). Taške $z = h \cdot w$ reikšmė $|\Pi_n(h)f|^2$ įgyja daugiklį $|j(h,w)|^{2n}$, o reiškinys $(1 - |z|^2)^n$ pagal tapatybę (23.4) įgyja daugiklį $|j(h,w)|^{-2n}$. Šie daugikliai susiprastina. Todėl natūrali norma integruoja reiškinį $|f|^2(1 - |z|^2)^n$ pagal hiperbolinį plotą. Dėl to toliau esantis laipsnis yra $n - 2$.

Apibrėžimas 23.2. Tegul $n \geq 2$ yra sveikasis skaičius, o ploto elementas yra $dA = dx\, dy$. Funkcijai f, holomorfinei diske D, apibrėžkime dydį

$$\|f\|_n^2 = \frac{n-1}{\pi} \lim_{r \to 1} \int_{|z| \leq r} |f(z)|^2 (1 - |z|^2)^{n-2}\, dA(z) \in [0, \infty].$$

Svertinę disko erdvę $\mathcal{A}_n$ sudaro visos holomorfinės funkcijos f diske D, tenkinančios sąlygą $\|f\|_n < \infty$.



23.1 pav.: Žemėlapis $z \mapsto \bar{\gamma} \cdot z$. Realiosios tiesės taškai -1, 0 ir 1 pereina į krašto apskritimo taškus i, -1 ir $-i$, o begalybės taškas pereina į tašką 1. Taškas i pereina į tašką 0, o pogrupio K orbita, einanti per tašką ie, pereina į apskritimą, kurio centras yra disko centras. Rodyklės vaizduoja elementą k_θ, kai $\theta > 0$, šios paskaitos parametrizacijoje.

Riba egzistuoja, nes pointegralinė funkcija yra neneigiama. Dėl tos pačios priežasties ši riba lygi supremumui integralų per kompaktines sritis diske D, turinčias glodų kraštą.

Lema 23.3. *Jei funkcija, išreiškiama laipsnine eilute $f(z) = \sum_{m\geq 0} a_m z^m$, yra holomorfinė diske D, tai*

$$\|f\|_n^2 = \sum_{m\geq 0} c_m |a_m|^2, \qquad c_m = \|z^m\|_n^2 = \frac{m!\,(n-1)!}{(n+m-1)!} = \binom{n+m-1}{m}^{-1}.$$

Todėl erdvė $\mathcal{A}_n$ yra Hilberto erdvė, turinti ortonormuotą bazę, sudarytą iš vektorių $e_m = c_m^{-1/2} z^m$. Be to, nelygybė $\|g\|_n \leq \sup_D |g|$ galioja kiekvienai aprėžtai holomorfinei funkcijai g.

Įrodymas. Apskritime $|z| = s < 1$ eilutė konverguoja tolygiai. Iš funkcijų $e^{im\theta}$ ortogonalumo gauname

$$\int_0^{2\pi} |f(se^{i\theta})|^2 d\theta = 2\pi \sum_m |a_m|^2 s^{2m}.$$

Tada, integruodami polinėse koordinatėse, gauname

$$\frac{n-1}{\pi} \int_{|z|\leq r} |f|^2 (1-|z|^2)^{n-2} dA = \sum_m |a_m|^2 (n-1) \int_0^r 2s^{2m+1} (1-s^2)^{n-2} ds.$$

Eilutės nariai yra neneigiami ir didėja, kai spindulys r didėja, todėl ribą $r \to 1$ galime imti panariui. Pakeitę kintamąjį $t = s^2$ ir kelis kartus integravę dalimis, gauname

$$(n-1) \int_0^1 t^m (1-t)^{n-2} dt = (n-1) \frac{m!\,(n-2)!}{(n+m-1)!} = c_m.$$

Atvirkščiai, tegul $(a_m)_{m\geq 0}$ yra kompleksinių skaičių seka, tenkinanti sąlygą $C = \sum_m c_m |a_m|^2 < \infty$. Tada galioja nelygybės $|a_m|^2 \leq C\binom{n+m-1}{m} \leq C(m+1)^{n-1}$, todėl eilutė $\sum a_m z^m$ konverguoja diske D. Pagal perimtą laipsninių eilučių rezultatą šios eilutės suma f yra holomorfinė diske D. Tada aukščiau gauta formulė duoda lygybę $\|f\|_n^2 = C$. Todėl atvaizdavimas $f \mapsto (c_m^{1/2} a_m)_m$ yra erdvės $\mathcal{A}_n$ izometrija į visą erdvę ℓ^2. Iš čia išplaukia erdvės pilnumas, poliarizacijos būdu gaunama skaliarinė sandauga ir nurodytoji bazė. Galiausiai galioja nelygybė $\|g\|_n^2 \leq \sup |g|^2 \, \|1\|_n^2 = \sup |g|^2$, nes $c_0 = 1$. ∎

Teorema 23.4. *Elementui $h \in \mathrm{SU}(1,1)$ ir funkcijai $f \in \mathcal{A}_n$ apibrėžkime operatorių formule*

$$(\Pi_n(h)f)(z) = j(h^{-1}, z)^{-n} f(h^{-1} \cdot z). \tag{23.5}$$

Tada atvaizdavimas $g \mapsto \Pi_n(\varphi(g))$ yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{A}_n$. Vartosime žymėjimą $\Pi_n(g)$, kuris reiškia operatorių $\Pi_n(\varphi(g))$.

Įrodymas. Homomorfizmas. Pritaikykime Lemos 23.1(b) dalies kociklo tapatybę elementams h_2^{-1} ir h_1^{-1}:

$$(\Pi_n(h_1)\Pi_n(h_2)f)(z) = j(h_1^{-1}, z)^{-n}\, j(h_2^{-1}, h_1^{-1} \cdot z)^{-n} f(h_2^{-1}h_1^{-1} \cdot z) = (\Pi_n(h_1h_2)f)(z).$$

Izometrija. Atlikime keitinį $z = h \cdot w$. Iš kociklo tapatybės, pritaikytos atvejui $h^{-1}h = I$, gauname lygybę $j(h^{-1}, h \cdot w) = j(h, w)^{-1}$. Pasinaudoję tapatybe (23.4) reiškiniui $1 - |h \cdot w|^2$ ir Lemos 23.1(c) dalies išvestinės formule, gauname

$$\begin{aligned} &|(\Pi_n(h)f)(h \cdot w)|^2 (1 - |h \cdot w|^2)^{n-2} \left|\frac{d(h \cdot w)}{dw}\right|^2 \\ &\quad = |j(h, w)|^{2n} |f(w)|^2 \frac{(1 - |w|^2)^{n-2}}{|j(h, w)|^{2n-4}} \frac{1}{|j(h, w)|^4}. \end{aligned}$$

Dydžio $|j(h, w)|$ laipsniai susiprastina. Lieka reiškinys $|f(w)|^2(1 - |w|^2)^{n-2}$.

Pagal Koši–Rymano lygtis holomorfinio atvaizdavimo realusis Jakobio determinantas yra $|d(h \cdot w)/dw|^2$. Todėl kiekvienai kompaktinei sričiai $R \subset D$ kintamųjų keitimo formulė rodo, kad funkcijos $|\Pi_n(h)f|^2$ svertinis integralas per sritį $h \cdot R$ yra lygus funkcijos $|f|^2$ svertiniam integralui per sritį R.

Atvaizdavimas $w \mapsto h \cdot w$ yra disko D bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas yra $w \mapsto h^{-1} \cdot w$. Todėl sritys $h \cdot R$ taip pat perbėga visas kompaktines sritis. Paėmę supremumus, gauname lygybę $\|\Pi_n(h)f\|_n = \|f\|_n$. Taigi operatorius $\Pi_n(h)$ yra izometrija, kurios atvirkštinis operatorius yra $\Pi_n(h^{-1})$. Todėl šis operatorius yra unitarusis.

Tolydumas. Tegul f, g yra polinomai. Pagal Lemos 23.1(a) dalyje gautą dydžio $|j(h, z)|$ apatinį įvertį reiškinys $\overline{g(z)}(\Pi_n(h)f)(z)(1 - |z|^2)^{n-2}$ apibrėžia tolydžią funkciją aibėje $\mathrm{SU}(1,1) \times \overline{D}$. Sąlygą $n \geq 2$ čia naudojame disko krašte. Ši funkcija yra tolygiai tolydi aibėje $U \times \overline{D}$, kur U yra kuri nors kompaktinė elemento I aplinka. Todėl funkcija $h \mapsto \langle g, \Pi_n(h)f\rangle_n$ yra tolydi. Polinomai yra tiršti. Be to, operatorių normos tenkina lygybę $\|\Pi_n(h)\| = 1$. Todėl $\varepsilon/3$ samprotavimas šį tolydumą išplečia visoms funkcijoms f, g. Tada

$$\|\Pi_n(h)f - f\|_n^2 = 2\|f\|_n^2 - 2\,\mathrm{Re}\langle f, \Pi_n(h)f\rangle_n \to 0 \qquad (h \to I).$$

Dėl unitarumo šis tolydumas yra perkeliamas į kiekvieną kitą tašką. ∎

Pastaba 23.5. Paimkime matricą $\delta = \mathrm{diag}(1, -1)$. Kadangi $\bar\gamma = \gamma\delta$, matricą $\bar\gamma$ paėmus vietoje matricos γ, gaunamas įvaizdis, apibrėžtas formule $\Pi_n^-(g) = \Pi_n(\delta g \delta^{-1})$. Jungtinimas matrica δ išsaugo grupę G, nors $\delta \notin G$. Kadangi $\delta k_\theta \delta^{-1} = k_{-\theta}$, tai K-tipai įvaizdyje Π_n^- yra priešingi atitinkamiems įvaizdžio Π_n tipams. Tai, kuris iš jų vadinamas holomorfiniu, priklauso nuo Keilio matricos ir K-kampo ženklo. Šiuos įvaizdžius žymime pagal jų K-tipus.

23.2 K-tipai ir Lie algebros operatoriai

Teiginys 23.6. *Su visais skaičiais θ ir $m \geq 0$ galioja lygybė*

$$\Pi_n(k_\theta)z^m = e^{i(n+2m)\theta}z^m.$$

Todėl K-tipai įvaizdyje Π_n yra $n, n+2, n+4, \ldots$. Kiekvieno iš šių tipų kartotinumas lygus vienetui. Be to, K-baigtiniai vektoriai yra būtent polinomai.

Įrodymas. Pagal formulę (23.2) elementas $h = \varphi(k_\theta)$ tenkina lygybę $h^{-1} = \operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$. Todėl galioja lygybės $h^{-1} \cdot z = e^{2i\theta}z$ ir $j(h^{-1}, z) = e^{-i\theta}$. Dabar formulė (23.5) duoda reiškinį $e^{in\theta}(e^{2i\theta}z)^m$.

Sveikajam skaičiui k apibrėžkime operatorių formule

$$P_k f = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-ik\theta}\,\Pi_n(k_\theta)f\,d\theta,$$

kur integralas yra tolydžios funkcijos, įgyjančios reikšmes erdvėje $\mathcal{A}_n$, Rymano integralas. Tada lygybė $P_k e_m = e_m$ galioja, jei $k = n + 2m$, o kitais atvejais galioja lygybė $P_k e_m = 0$. Kadangi operatorius P_k yra aprėžtas, jis yra ortogonalioji projekcija į poerdvį $\mathbb{C}e_m$ arba nulinis operatorius. Šio operatoriaus vaizdas yra visų K-tipo k vektorių erdvė.

Jei vektorius v yra K-baigtinis, tai jo orbita apvelka baigtinės dimensijos erdvę U. Kiekvienas vektorius $P_k v$ priklauso erdvei U, nes yra šioje erdvėje esančių Rymano sumų riba. Nenuliniai vektoriai $P_k v$ yra tarpusavyje ortogonalūs, todėl jų yra tik baigtinis skaičius. Taigi vektoriaus v skleidinys bazėje yra polinomas. Atvirkščiai, kiekvienas polinomas yra baigtinė K-tipų vektorių suma. ∎

Lema 23.7. *Polinomai yra įvaizdžio Π_n glodieji vektoriai. Elementui $Y = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in \mathfrak{su}(1,1)$ ir polinomui f galioja lygybė*

$$d\Pi_n(Y)f = n(rz+s)f + \bigl(rz^2 + (s-p)z - q\bigr)f'. \tag{23.6}$$

Įrodymas. Pagal Lemos 23.1(a) dalyje gautą dydžio $|j(h,z)|$ apatinį įvertį atvaizdavimas $(h,z) \mapsto (\Pi_n(h)f)(z)$ yra glodus aibėje $\mathrm{SU}(1,1) \times \overline{D}$. Pagal Teiloro teoremą, taikomą kompaktinėse aibėse, visų eilių skirtuminiai santykiai kintamojo h atžvilgiu tolygiai konverguoja aibėje $\overline{D}$. Pagal Lemos 23.3 supremumo įvertį jie konverguoja erdvėje $\mathcal{A}_n$. Taigi polinomas f yra glodusis vektorius 21-osios paskaitos prasme. Be to, vektorius $d\Pi_n(Y)f$ yra gaunamas taškas po taško diferencijuojant pagal kintamąjį t taške 0 reiškinį $(\Pi_n(h_t)f)(z)$, kur $h_t = \exp(tY)$. Kadangi $h_t^{-1} = I - tY + O(t^2)$, tai tolygiai visų taškų $z \in \overline{D}$ atžvilgiu galioja lygybės

$$j(h_t^{-1}, z) = 1 - t(rz+s) + O(t^2), \qquad h_t^{-1}\cdot z = \frac{(1-tp)z - tq}{1 - t(rz+s)} = z + t\bigl(rz^2 + (s-p)z - q\bigr) + O(t^2).$$

Todėl galioja lygybė $j(h_t^{-1}, z)^{-n} = 1 + nt(rz+s) + O(t^2)$. Pritaikę sandaugos ir grandininę diferencijavimo taisykles, gauname formulę (23.6). ∎

Teiginys 23.8. *Tegul atvaizdavimas $d\Pi_n$ yra kompleksiškai tiesiškai pratęstas į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Tada*

$$d\Pi_n(H')z^m = (n+2m)z^m,$$
$$d\Pi_n(E)z^m = (n+m)z^{m+1},$$
$$d\Pi_n(F)z^m = -m\,z^{m-1} \quad (m \geq 1), \qquad d\Pi_n(F)1 = 0.$$

Kazimiro elementas $\Omega = H'^2 + 2EF + 2FE$ veikia kiekvieną polinomą kaip daugyba iš skaičiaus $n(n-2)$.

Įrodymas. Formulės (23.6) dešinioji pusė yra kompleksiškai tiesinė kintamųjų (p,q,r,s) atžvilgiu. Todėl ji leidžia apskaičiuoti ir atvaizdavimo $d\Pi_n$ reikšmes matricoms, pateiktoms formulėse (23.3). Elemento H' atveju turime $p=-1$ ir $s=1$, todėl gauname $nf+2zf'$. Elemento E atveju turime $r=1$, todėl gauname $nzf+z^2f'$. Elemento F atveju turime $q=1$, todėl gauname $-f'$. Pritaikykime šias formules monomui z^m. Kadangi $[E,F]=H'$, galioja lygybė $\Omega = H'^2+2H'+4FE$. Kazimiro elemento tikrinė vertė, atitinkanti vektorių z^m, yra

$$(n+2m)^2 + 2(n+2m) - 4(n+m)(m+1) = n^2 - 2n. \qquad \blacksquare$$

Unitariajam įvaizdžiui Π ir elementui $X \in \mathfrak{g}$ operatorius $d\Pi(X)$ yra antisimetrinis glodžiųjų vektorių poerdvyje. Pratęskime atvaizdavimą $d\Pi$ kompleksiškai tiesiškai į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Matricos H_0, S ir W yra realiosios, o skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Todėl, perkeliant operatorių $d\Pi(E)$ į antrąjį argumentą, realieji generatoriai H_0 ir S pakeičia ženklą. Be to, koeficientas i prie generatoriaus S pavirsta koeficientu $-i$. Dėl to gaunamas operatorius $-d\Pi(F)$. Elemento $H' = -iW$ atveju abu ženklo pakeitimai vienas kitą panaikina. Todėl glodieji vektoriai u ir v tenkina lygybes

$$\langle d\Pi(E)u, v\rangle = -\langle u, d\Pi(F)v\rangle, \qquad \langle d\Pi(H')u, v\rangle = \langle u, d\Pi(H')v\rangle. \tag{23.7}$$

Modelyje vektoriai $u=z^m$ ir $v=z^{m+1}$ kairėje pusėje duoda $(n+m)c_{m+1}$, o dešinėje – $(m+1)c_m$. Pagal Lemos 23.3 koeficientų c_m formulę šie dydžiai sutampa. Atvirkščiai, skirtingų K-tipų vektoriai yra ortogonalūs, todėl iš lygybių (23.7) išplaukia sąryšis $c_{m+1}/c_m = (m+1)/(n+m)$. Iki skaliarinio daugiklio vienintelė tokia skaliarinė sandauga polinomų erdvėje yra svertinės normos skaliarinė sandauga.

Teorema 23.9. *Įvaizdis Π_n yra neredukuojamas su kiekvienu sveikuoju skaičiumi $n \geq 2$.*

Įrodymas. Tegul $V \neq 0$ yra uždarasis invariantinis poerdvis ir vektorius $0 \neq v \in V$. Kiekvienas operatorius P_k atvaizduoja poerdvį V į poerdvį V, nes tą patį daro šio operatoriaus Rymano sumos, o poerdvis V yra uždaras. Kadangi $P_{n+2m}v = \langle e_m, v\rangle e_m$, kuris nors vektorius e_m priklauso poerdviui V. Elementui $X \in \mathfrak{g}$ vektorius $d\Pi_n(X)e_m$ yra vektorių $t^{-1}(\Pi_n(\exp tX)e_m - e_m) \in V$ riba pagal normą, todėl šis vektorius priklauso poerdviui V. Taigi vektoriai $d\Pi_n(E)e_m$ ir $d\Pi_n(F)e_m$ priklauso poerdviui V. Pagal Teiginio 23.8 operatorių formules elementas E monomą z^m atvaizduoja į vektorių $(n+m)z^{m+1}$, kur $n+m \neq 0$. Kai $m \geq 1$, elementas F monomą z^m atvaizduoja į vektorių $-mz^{m-1}$, kur $m \neq 0$. Todėl kiekvienas monomas z^k priklauso poerdviui V. Polinomai yra tiršti, todėl $V = \mathcal{A}_n$. $\blacksquare$

Neredukuojamas unitarusis įvaizdis priklauso *diskrečiajai serijai*, jei jo matriciniai koeficientai yra kvadratiškai integruojami grupėje G. Įvaizdžių šeima Π_n, kai $n \geq 2$, mūsų žymėjimu

yra holomorfinė diskrečioji serija. Tai, kad šios šeimos matriciniai koeficientai yra kvadratiškai integruojami, yra cituojama pagal Knapp knygos skyrelį §VI.1. Uždavinyje 23.6 yra tikrinamas vektoriaus e_0 koeficientas. Žodį „diskrečioji“ paaiškina Skyrelio 23.4 pabaiga.

23.3 Nusileidimo sąlygos

Teiginys 23.10. *Tegul Π yra stipriai tolydus grupės G įvaizdis Hilberto erdvėje. Tegul vektorius $v \neq 0$ turi K-tipą k.*

(a) Šis tipas tenkina sąlygą $k \in \mathbb{Z}$. Atskiru atveju, kai $\lambda \notin \mathbb{Z}$, joks toks įvaizdis Π neturi žemiausiojo svorio modulio, kurio svoriai yra $\lambda, \lambda+2, \dots$, kaip savo K-baigtinės dalies.

(b) Galioja lygybė $\Pi(-I)v = (-1)^k v$.

(c) Galioja lygybė $\Pi_n(-I) = (-1)^n \mathrm{id}$. Todėl įvaizdis Π_n faktorizuojasi per grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) = G/\{\pm I\}$ tada ir tik tada, kai skaičius n yra lyginis.

Įrodymas. (a) Kadangi $k_{2\pi} = I$, turime $v = \Pi(k_{2\pi})v = e^{2\pi i k}v$. Iš sąlygos $v \neq 0$ išplaukia lygybė $e^{2\pi i k} = 1$, taigi $k \in \mathbb{Z}$. Žemiausiojo svorio K-baigtinė dalis, kurios svoriai yra $\lambda, \lambda+2, \dots$, turi K-tipo λ vektorių, todėl būtina, kad galiotų sąlyga $\lambda \in \mathbb{Z}$.

(b) Kadangi $k_\pi = -I$, iš K-tipo apibrėžimo, taikomo atvejui $\theta = \pi$, gauname lygybę $\Pi(-I)v = e^{i\pi k}v$. Dešinioji pusė lygi vektoriui $(-1)^k v$, nes $k \in \mathbb{Z}$.

(c) Pagal formulę (23.2), nusakančią elementą $\varphi(-I)$, galioja lygybės $(-I)\cdot z = z$ ir $j(-I,z) = -1$, todėl $\Pi_n(-I)f = (-1)^{-n}f$. Faktorinis atvaizdavimas $G \to \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ yra siurjektyvus, o jo branduolys yra $\{\pm I\}$. Todėl įvaizdis Π_n faktorizuojasi tada ir tik tada, kai galioja lygybė $\Pi_n(-I) = \mathrm{id}$. ∎

Teiginio 23.10(c) dalyje gauta operatoriaus $\Pi_n(-I)$ išraiška dera su Teiginio 23.10(b) dalies ženklo taisykle. Taip yra todėl, kad kiekvienas K-tipas $n+2m$ įvaizdyje Π_n yra tokio pat lyginumo kaip skaičius n. Teiginio 23.10(a) dalies sveikumo samprotavimas remiasi periodu 2π, kurį pogrupis K turi grupėje G. Universaliojoje dengiančiojoje grupėje pogrupio K pakėlimas yra grupės $\mathbb{R}$ kopija, todėl (a) dalis ten jokios sąlygos neduoda. Šios grupės nenagrinėsime.

Pastaba 23.11. Lygybių (23.7) nulemtas santykis turi prasmę ir tada, kai $n = 1$. Iš jo gauname $c_m = 1$, todėl norma yra $\sum |a_m|^2$. Joks teigiamas matas μ diske D neduoda šios normos integruojant pagal plotą. Toks matas tenkintų lygybes $\int_D 1\,d\mu = \int_D |z|^2 d\mu = 1$, nors reiškinys $1 - |z|^2$ diske D yra griežtai teigiamas. Tai yra neįmanoma. Todėl žemiausiasis svoris 1 nepatenka į erdvių $\mathcal{A}_n$ šeimą. Toliau jis pasirodys kaip diskrečiųjų serijų riba.

23.4 Palyginimas ir unitariųjų įvaizdžių visuma

Tegul V yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis, atitinkantis grupę G (žr. 21-ąją paskaitą), kuriame elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaliaro c. Simboliu v_k žymėsime K-tipo k vektorių. Kadangi

$\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE = H'^2 - 2H' + 4EF$, tai

$$4FEv_k = \big(c - k(k+2)\big)v_k, \qquad 4EFv_k = \big(c - k(k-2)\big)v_k. \tag{23.8}$$

Pavyzdys 23.12. Pasirinkime skaičių $n \geq 2$ ir tegul $c = n(n-2) = (n-1)^2 - 1$. Pagal formules (23.8) lygybė $FEv_k = 0$ galioja tada ir tik tada, kai $k \in \{-n, n-2\}$.

(i) Įvaizdyje Π_n esantys K-tipai yra $n, n+2, \dots$. Elementas F anuliuoja monomą z^0, o elementas E veikia injektyviai.

(ii) Tegul skaičius $d = n-2$. Pakeiskime formulėje (23.5) skaičių n skaičiumi $-d$. Gautą operatorių žymėkime simboliu $\Pi_{-d}(h)$. Šis operatorius funkcijai f priskiria funkciją, kurios reikšmės yra $j(h^{-1}, z)^d f(h^{-1} \cdot z)$, ir išsaugo ne aukštesnio kaip d laipsnio polinomus. Tokiu pat skaičiavimu kaip formulės (23.6) išvedime gauname lygybę $d\Pi(E)z^m = (m-d)z^{m+1}$. Iš jos matyti, kad monomas z^d yra anuliuojamas. Gauto modulio K-tipai yra $-d, \dots, d$. Žemiausiajam vektoriui $v_{-d} = z^0$ galioja lygybė $Fv_{-d} = 0$. Taigi iš lygybių (23.8) gauname $c = (-d)(-d-2) = d(d+2) = n(n-2)$. Uždavinyje 23.3 yra pateikiamos atitinkamos matricos polinomų erdvėje.

(iii) Pagrindinėje serijoje iš 22-osios paskaitos kiekvienas vieno lyginumo sveikasis skaičius yra K-tipas ir pasitaiko po vieną kartą. Paimkime 22-osios paskaitos pagrindinės serijos modulį $V_{\varepsilon,\nu}$, kai $\nu = n-1$, o parametras ε yra parinktas taip, kad šio modulio K-tipų lyginumas sutaptų su skaičiaus n lyginumu. Pagal 22-osios paskaitos uždavinių lapo Uždavinį 22.4 elementas Ω šiame modulyje veikia kaip daugyba iš skaičiaus $\nu^2 - 1 = n(n-2)$. Kai $k = n-2$, iš lygybių (23.8) matyti, kad atvaizdavimo $E\colon v_{n-2} \mapsto v_n$ koeficiento ir atvaizdavimo $F\colon v_n \mapsto v_{n-2}$ koeficiento sandauga lygi nuliui. Tas pats galioja tarp tipų $-n$ ir $2-n$.
Kuri rodyklė išnyksta, nurodo 22-osios paskaitos kopėčios. Kai $\nu = n-1$, išnyksta rodyklė E iš taško $-n$ ir rodyklė F iš taško n. Todėl pusinės kopėčios $k \geq n$ ir $k \leq -n$ yra pomoduliai, o baigtinė atkarpa $2-n \leq k \leq n-2$ yra tai, kas lieka jas abi pašalinus. Kai $\nu = -(n-1)$, išnyksta rodyklė E iš taško $n-2$ ir rodyklė F iš taško $2-n$, todėl baigtinė atkarpa yra pomodulis. Abiem atvejais šios trys dalys turi tuos pačius K-tipus ir tą pačią Kazimiro reikšmę kaip atitinkamai įvaizdis Π_n^-, baigtinės dimensijos modulis Π_{-d}, kai $d = n-2$, ir įvaizdis Π_n.

Dabar dalį $k \geq n$ sutapatinsime su įvaizdžiu Π_n. Šioje paskaitoje e_m žymi erdvės $\mathcal{A}_n$ bazę, todėl 22-osios paskaitos Furjė vektorius žymėsime $\mathsf{e}_k(\theta) = e^{ik\theta}$. Kai $n \geq 1$, o funkcija f yra holomorfinė aibės $\overline{D}$ aplinkoje, apibrėžkime

$$(U_n f)(\theta) = e^{in\theta} f(e^{2i\theta}), \qquad \text{todėl} \qquad U_n z^m = \mathsf{e}_{n+2m}.$$

Tai yra 22-osios paskaitos atvaizdavimas U_n, apibrėžtas ta pačia formule. Tokioms funkcijoms formulė (23.5) turi prasmę ir tada, kai $n = 1$.

Teiginys 23.13. *Tegul $n \geq 1$ ir $\varepsilon \equiv n \pmod 2$. Polinomui f ir elementui $g \in G$ funkcija $\Pi_n(g)f$ yra holomorfinė aibės $\overline{D}$ aplinkoje, ir galioja lygybė*

$$U_n \Pi_n(g) f = \Pi_{\varepsilon,n-1}(g) U_n f.$$

Įrodymas. Pažymėkime $h = \varphi(g)^{-1} = \gamma g^{-1} \gamma^{-1}$. Pagal formulę (23.5) galioja lygybė $(\Pi_n(g)f)(z) = j(h,z)^{-n} f(h \cdot z)$. Pagal Lemos 23.1(a) dalį funkcija $j(h, \cdot)$ neturi nulių aibėje $\overline{D}$,

o jos vienintelis galimas nulis yra už šios aibės ribų. Todėl funkcija $\Pi_n(g)f$ yra holomorfinė aibės $\overline{D}$ aplinkoje.

Tegul $z = e^{2i\theta}$ ir $g^{-1}u_\theta = ru_\tau$, kur $u_\theta = (\cos\theta, \sin\theta)^T$, kaip 22-oje paskaitoje. Tada $\gamma u_\theta = e^{-i\theta}(z,1)^T$. Pritaikę lygybę $\gamma g^{-1} = h\gamma$ vektoriui u_θ, gauname $h\cdot z = e^{2i\tau}$ ir $j(h,z) = re^{i(\theta-\tau)}$, kaip 22-osios paskaitos pusinių kopečių formulėje. Todėl

$$e^{in\theta}j(h,z)^{-n}f(h\cdot z) = r^{-n}e^{in\tau}f(e^{2i\tau}) = (\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)U_n f)(\theta). \qquad \blacksquare$$

Šioje tapatybėje dalyvauja tik matricos, todėl priešingas elemento k_θ ženklas šioje paskaitoje jai įtakos neturi. Ji sako, kad įvaizdžio Π_n polinomai yra dalis $k \geq n$ modulyje $V_{\varepsilon,n-1}$. Kopečios taip pat sutampa: kai $\nu = n-1$ ir $k = n+2m$, turime $\frac{1}{2}(\nu+1+k) = n+m$ ir $\frac{1}{2}(\nu+1-k) = -m$, o tai yra Teiginio 23.8 koeficientai. Krašto taškas $z = e^{2i\theta}$ yra 22-osios paskaitos tiesė $\mathbb{R}u_\theta$.

Skiriasi tik norma. Monomo z^m disko normos kvadratas yra c_m, o vektoriaus $\mathtt{e}_{n+2m}$ apskritimo normos kvadratas yra 1. Todėl, kai $n \geq 2$, atvaizdavimas U_n nėra izometrija. Be to, bendras erdvės $\mathcal{A}_n$ vektorius nebūtinai turi kraštines reikšmes, todėl atvaizdavimo U_n visoje erdvėje $\mathcal{A}_n$ neapibrėžiame. Kai $n = 1$, turime $c_m = 1$, ir abi normos sutampa.

Išvada 23.14. *Tegul $\mathcal{A}_1$ yra polinomų erdvės papildinys normos $\|\sum a_m z^m\|^2 = \sum |a_m|^2$ atžvilgiu. Tada atvaizdavimas U_1 pratęsiamas iki unitariojo atvaizdavimo iš erdvės $\mathcal{A}_1$ į visą poerdvį H_1^+, t.y. vektorių $\mathtt{e}_1, \mathtt{e}_3, \ldots$ uždarąjį tiesinį apvalkalą. Operatoriai $\Pi_1(g) = U_1^{-1}\Pi_{1,0}(g)U_1$ sudaro neredukuojamą stipriai tolydų grupės G unitarųjį įvaizdį erdvėje $\mathcal{A}_1$, o polinomų erdvėje jie išreiškiami formule (23.5), kai $n = 1$. Apibrėžkime $\Pi_1^-(g) = \Pi_1(\delta g \delta^{-1})$. Tada įvaizdis $\Pi_{1,0}$ yra įvaizdžio Π_1 kopijos poerdvyje H_1^+ ir įvaizdžio Π_1^- kopijos vektorių $\mathtt{e}_{-1}, \mathtt{e}_{-3}, \ldots$ uždarajame tiesiniame apvalkale ortogonalioji suma.*

Įrodymas. Pagal Parsevalio tapatybę $\|U_1 f\|^2 = \sum |a_m|^2$, o vektoriai $\mathtt{e}_{1+2m}$ sudaro poerdvio H_1^+ ortonormuotą bazę. Todėl atvaizdavimas U_1 pratęsiamas iki unitariojo atvaizdavimo į visą poerdvį H_1^+. Įvaizdis $\Pi_{1,0}$ yra unitarusis ir stipriai tolydus, nes skaičius $\nu = 0$ yra menamas. Pagal 22-osios paskaitos neredukuojamumo teoremą poerdvis H_1^+ yra invariantinis ir neredukuojamas. Šios savybės pereina įvaizdžiui Π_1 per atvaizdavimą U_1. Funkcija, holomorfinė aibės $\overline{D}$ aplinkoje, turi Teiloro eilutę, kuri konverguoja erdvėje $\mathcal{A}_1$, todėl pratęstas atvaizdavimas U_1 šiai funkcijai sutampa su aukščiau pateikta formule. Taigi polinomų erdvėje Teiginys 23.13 duoda nurodytą operatoriaus $\Pi_1(g)$ formulę.

Antrajai daliai apibrėžkime operatorių formule $(R\varphi)(\theta) = \varphi(-\theta)$. Šis operatorius yra unitarusis ir poerdvį H_1^+ atvaizduoja į visą neigiamąją pusę. Kadangi $\delta u_\theta = u_{-\theta}$, 22-osios paskaitos apskritimo formulė duoda lygybę $\Pi_{1,0}(\delta g\delta^{-1}) = R\,\Pi_{1,0}(g)R$. Todėl $RU_1\Pi_1^-(g) = \Pi_{1,0}(g)RU_1$. $\blacksquare$

Dabar palyginsime ženklą dviejose algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ realiosiose formose. Grupės SU(2) unitariajame įvaizdyje tą patį trejetą fizikų žymėjimu sudaro $H' = 2J_3$, $E = J_+$ ir $F = J_-$, o dabar $\langle Eu, v\rangle = \langle u, Fv\rangle$. Tada šis ženklas ir lygybės (23.8) duoda $\|Ev_k\|^2 = \frac{1}{4}\big(c - k(k+2)\big)\|v_k\|^2$. Kai $c = 4j(j+1)$ ir $k = 2m$, šis dydis lygus skaičiui $j(j+1) - m(m+1)$, padaugintam iš $\|v_k\|^2$. Kai skaičius k didelis, dešinioji pusė yra neigiama, todėl kopečios turi nutrūkti. Grupei $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ sąryšis (23.7) turi minuso ženklą, o normos formulės ženklas yra priešingas. Todėl kopečios neprivalo nutrūkti.

Teiginys 23.15. *Tegul V yra neredukuojamas $(\mathfrak{g}, K)$-modulis, atitinkantis grupę G. Tarkime, kad kiekvieno K-tipo kartotinumas yra ne didesnis už vienetą, o elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaičiaus c. Be to, tarkime, kad modulis V turi teigiamai apibrėžtą skaliarinę sandaugą, kuri modulio veikimo atžvilgiu tenkina lygybes (23.7). Jei skaičiai k ir $k+2$ yra K-tipai, tai*

$$\|Ev_k\|^2 = \tfrac{1}{4}\big(k(k+2) - c\big)\|v_k\|^2 > 0. \tag{23.9}$$

Todėl:

(i) jei K-tipai yra $\lambda, \lambda+2, \lambda+4, \ldots$, tai $\lambda \geq 1$ yra sveikasis skaičius ir galioja lygybė $c = \lambda(\lambda-2)$;

(ii) jei K-tipų aibė yra $2\mathbb{Z}$, tai $c < 0$;

(iii) jei K-tipų aibė yra $2\mathbb{Z}+1$, tai $c < -1$.


Įrodymas. Pagal sąryšius (23.7) ir (23.8) gauname $\|Ev_k\|^2 = -\langle v_k, FEv_k\rangle = \frac{1}{4}(k(k+2) - c)\|v_k\|^2$. Kadangi dydžiai $\|Ev_k\|^2$ ir $\|v_k\|^2$ yra realieji, o $v_k \neq 0$, ši tapatybė rodo, kad skaičius c yra realusis.

Toliau prieštaros būdu parodysime, kad $Ev_k \neq 0$. Tarkime, kad $Ev_k = 0$. Kiekvienam lyginumui to lyginumo K-tipų poerdvių suma yra pomodulis. Dėl neredukuojamumo visų K-tipų lyginumas sutampa su skaičiaus k lyginumu. Kadangi elementas E didina, o elementas F mažina K-tipus dydžiu 2, vektorių v_j, kuriems $j \leq k$, tiesinis apvalkalas yra invariantinis. Šis apvalkalas yra nenulinis ir neapima vektoriaus v_{k+2}. Tai prieštarauja neredukuojamumui. Todėl nelygybė (23.9) yra griežta.

Žemiausiojo svorio rinkiniui (i) galioja lygybė $Fv_\lambda = 0$, todėl iš lygybių (23.8) gauname $c = \lambda(\lambda-2)$. Tada, įstatę reikšmę $k = \lambda$ į formulę (23.9), gauname $\|Ev_\lambda\|^2 = \lambda\|v_\lambda\|^2$, taigi $\lambda > 0$. Apskritimo veikimas $(\mathfrak{g}, K)$-modulyje tenkina sąlygą $k_{2\pi} = I$. Todėl galioja lygybė $v_\lambda = e^{2\pi i\lambda}v_\lambda$, taigi skaičius λ yra sveikasis. Dvipusiams rinkiniams (ii) ir (iii) pasinaudokime lygybe $k(k+2) = (k+1)^2 - 1$. Šio reiškinio minimumas yra 0, kai skaičius k yra lyginis, ir -1, kai skaičius k yra nelyginis. ∎

Formulę (23.9) vaizduoja 23.2 pav. Kai $c = 8$, ant tiesės esantys taškai yra $k = 2$ ir $k = -4$, kuriuose žingsnis lygus nuliui. Tarp jų esantys lyginiai taškai $k = -2$ ir $k = 0$ yra baigtinės dimensijos modulio, kurio K-tipai yra $-2, 0, 2$, žingsniai. Grupei $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ šių žingsnių normos kvadratas yra neigiamas. Grupei $\mathrm{SU}(2)$ jie yra būtent tie žingsniai, kurių normos kvadratas yra teigiamas.

Susukimas matrica δ iš Pastabos 23.5 sukeičia elementus E, F, elementą H' pakeičia elementu $-H'$ ir išsaugo lygybes (23.7). Todėl iš žemiausiojo svorio atvejo (i) gauname lygybę $c = \lambda(\lambda-2)$, kur $\lambda \geq 1$ yra sveikasis skaičius, taip pat ir aukščiausiojo svorio rinkiniams $-\lambda, -\lambda-2, \ldots$.



23.2 pav.: Formulė (23.9) grupei $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pirmojoje dalyje ir jos analogas grupei $\mathrm{SU}(2)$ antrojoje dalyje. Užpildyti taškai atitinka lyginius skaičius k, o tušti taškai – nelyginius skaičius k. Pirmojoje dalyje nenuliniam žingsniui iš k į $k+2$ reikia, kad jo taškas būtų griežtai virš tiesės $y = c$, o taškas ant tiesės yra nulinis žingsnis. Antrojoje dalyje žingsnio taškas turi būti griežtai žemiau tiesės, o spalvoti taškai yra modulio, kurio K-tipai yra $-2, 0, 2$, žingsniai.

Teorema 23.16 (Bargmanas; cituojama)**.** *Kiekvienas grupės G neredukuojamas unitarusis įvaizdis yra ekvivalentus lygiai vienam toliau pateikto sąrašo įvaizdžiui. Kiekvienas sąrašo įvaizdis yra neredukuojamas ir unitarusis. Jį vienareikšmiškai nusako jo K-tipai ir Kazimiro reikšmė c. Čia Π_1 ir Π_1^- yra Išvados 23.14 įvaizdžiai, kurių unitarumas ir neredukuojamumas ten įrodyti.*

Šeima	*K-tipai*	c	ν
trivialusis įvaizdis	$\{0\}$	0	± 1
lyginė pagrindinė serija	$2\mathbb{Z}$	$c \le -1$	$i\mathbb{R}$
nelyginė pagrindinė serija	$2\mathbb{Z}+1$	$c < -1$	$i\mathbb{R} \setminus \{0\}$
papildomoji serija	$2\mathbb{Z}$	$-1 < c < 0$	$(-1,1) \setminus \{0\}$
Π_n, $n \ge 1$	$n, n+2, \dots$	$n(n-2)$	$\pm(n-1)$
Π_n^-, $n \ge 1$	$-n, -n-2, \dots$	$n(n-2)$	$\pm(n-1)$


Kai $n \ge 2$, paskutinių dviejų eilučių įvaizdžiai sudaro diskrečiąsias serijas. Kai $n = 1$, šių eilučių įvaizdžiai yra diskrečiųjų serijų ribos, realizuojamos naudojant Pastabos 23.11 normą. Jų suma yra nelyginė pagrindinė serija, kai $c = -1$.

Paskutiniame stulpelyje nurodyti 22-osios paskaitos parametrai, kur $c = \nu^2 - 1$. Pagrindinės ir papildomosios serijos eilutėse įvaizdis turi modulį $V_{\varepsilon,\nu}$, kur $\varepsilon = 0$ lyginėse eilutėse ir $\varepsilon = 1$ nelyginėje eilutėje, o parametrai ν ir $-\nu$ duoda tą patį modulį. Kitose eilutėse įvaizdis yra tik viena redukuojamo modulio $V_{\varepsilon,\nu}$ dalis. Todėl vieną parametro ν reikšmę gali atitikti keli sąrašo įvaizdžiai.

Teiginys 23.15 įrodo, kad skaičiaus c reikšmių intervalai yra būtini šiems K-tipų rinkiniams. *Lyginiu* vadinsime $(\mathfrak{g}, K)$-modulį, kurio K-tipų aibė yra $2\mathbb{Z}$, o *nelyginiu* – modulį, kurio tipų aibė yra $2\mathbb{Z}+1$. Neredukuojamam lyginiam moduliui, turinčiam teigiamai apibrėžtą skaliarinę sandaugą, kuri tenkina lygybes (23.7), sąlyga $c < 0$ yra būtina. Atvejis $c \le -1$

atitinka 22-osios paskaitos unitariąją pagrindinę seriją. Intervalą $-1 < c < 0$ atitinka papildomoji serija. Papildomosios serijos skaliarinę sandaugą nusako formulė (23.9), o ne 22-osios paskaitos L^2 norma (žr. Uždavinį 23.5). Neredukuojamam nelyginiam moduliui, turinčiam tokią skaliarinę sandaugą, sąlyga $c < -1$ yra būtina, todėl nelyginės papildomosios serijos nėra. Kai $c = -1$, nelyginės pagrindinės serijos modulis tenkina lygybę $FE v_{-1} = 0$ ir skyla.

Sąrašą pagal reikšmę c išdėsto 23.3 pav. Naudojame reikšmę c, o ne parametrą ν dėl paskutinės pastabos apie lentelę. Kai $c = -1$, nelyginė pagrindinė serija skyla į įvaizdžius Π_1 ir Π_1^-. Kai $c = 0$, įvaizdžiai Π_2, Π_2^- ir trivialusis įvaizdis yra skirtingi.



23.3 pav.: Bargmano sąrašas pagal Kazimiro reikšmę c, kiekvienam K-tipų rinkiniui skiriant po vieną eilutę. Viršutinėje eilutėje ilgoji atkarpa $c \le -1$ yra lyginė pagrindinė serija, o trumpoji atkarpa $-1 < c < 0$ yra papildomoji serija. Antroji eilutė yra nelyginė pagrindinė serija, trečioji eilutė yra trivialusis įvaizdis, o paskutinės dvi eilutės rodo kelis pirmuosius įvaizdžius Π_n ir Π_n^-.

Cituojamos dalys yra atvirkštinis teiginys ir sąrašo išsamumas. Jos remiasi dviem Harišo Čandros rezultatais (plg. 21-ąją paskaitą). Pirma, kiekvienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis yra leistinas. Jo K-baigtiniai vektoriai sudaro neredukuojamą $(\mathfrak{g}, K)$-modulį, kurio K-tipų kartotinumai lygūs vienetui ir kuriame elementas Ω veikia kaip skaliaras. Antra, kiekvienas aukščiau išvardytas modulis, turintis invariantinę teigiamai apibrėžtą ermitinę formą, integruojasi į grupės G neredukuojamą unitarųjį įvaizdį. MIT 18.757 konspekte (Etingof) leistinumas yra nagrinėjamas 5-oje paskaitoje, o unitarioji globalizacija yra nagrinėjama Teoremoje 7.5.

Dabar galime paaiškinti žodį „diskrečioji“. Kompaktinei grupei 11-osios paskaitos Planšerelio teorema funkcijos normos kvadratą užrašo kaip sumą pagal neredukuojamuosius įvaizdžius. Grupei G atitinkama formulė turi sumą ir integralus. Tegul h yra glodi funkcija su kompaktine atrama grupėje G, ir tegul $\Pi(h) = \int_G h(g)\Pi(g)\,dg$. Tinkamai normavus Haro matą,

$$h(I) = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{tr} \Pi_{0,iv}(h)\, v \tanh \frac{\pi v}{2}\, dv + \int_{\mathbb{R}} \operatorname{tr} \Pi_{1,iv}(h)\, v \coth \frac{\pi v}{2}\, dv + \sum_{n \ge 2} 4(n-1) \operatorname{tr}\bigl(\Pi_n(h) + \Pi_n^-(h)\bigr).$$

Šią inversijos formulę cituojame iš Knapp knygos skyrelio §II.7 (formulė (2.25)) ir jos nenaudojame. Knapp knygoje ji įrodyta kaip Teorema 11.6 skyrelyje §XI.3 ir priskirta Harišui Čandrai (1952). Iš jos išplaukia grupės G Planšerelio formulė. Diskrečioji serija įeina per diskrečiąją sumą, o unitarioji pagrindinė serija įeina per integralus tiesėje $\nu = iv$. Nei papildomoji serija, nei įvaizdžiai $\Pi_1^\pm$ neįeina. Skaičius $n-1$ yra tas pats kaip Uždavinyje 23.6, kur vektoriaus e_0 koeficiento normos kvadratas yra $C/(n-1)$.

Galiausiai grįžtame prie baigtinės dimensijos. Kitas teiginys nesiremia Bargmano teorema, ir jam nereikia neredukuojamumo prielaidos.

> **Išvada 23.17.** *Kiekvienas baigtinės dimensijos tolydus unitarusis įvaizdis Π, kuriuo veikia grupė G, yra trivialusis.*

Įrodymas. Pagal 3-iosios paskaitos teoremą apie tolydžiuosius homomorfizmus įvaizdis Π yra glodus. Kompleksiškai tiesinis atvaizdavimo $d\Pi$ pratęsinys erdvę V paverčia baigtinės dimensijos algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ moduliu. Realusis elementas $H_0 = \operatorname{diag}(1,-1)$ yra 20-osios paskaitos trejeto diagonalusis elementas. Todėl pagal parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ visišką redukuojamumą ir aukščiausiojo svorio skaičiavimą operatorius $d\Pi(H_0)$ yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės yra sveikosios. Dėl unitarumo tas pats operatorius yra antiermitinis, o jo tikrinės vertės yra menamos. Todėl $d\Pi(H_0) = 0$.

Kompleksifikuoto diferencialo branduolys yra algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ idealas, kuriame yra nenulinis elementas H_0. Kadangi algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ yra paprastoji, šis branduolys yra visa algebra, todėl $d\Pi = 0$. Kadangi grupė G yra jungi, ją generuoja eksponentės (2-oji paskaita), o $\Pi(\exp X) = \exp d\Pi(X) = I$. Todėl įvaizdis Π yra trivialusis. ∎

Taigi netrivialus grupės G unitarusis įvaizdis yra begalinės dimensijos. Uždavinyje 23.3 šis teiginys yra tiesiogiai patikrinamas Pavyzdžio 23.12(ii) dalies baigtinės dimensijos moduliams Π_{-d}.

23.5 Savikontrolė

1. Kai $n = 3$, apskaičiuokite koeficientus c_1 ir c_2. Patikrinkite lygybes (23.7), kai $u = z$ ir $v = z^2$.

   Atsakymas. Turime $c_1 = 1!\,2!/3! = 1/3$ ir $c_2 = 2!\,2!/4! = 1/6$. Kairioji pusė lygi $(3+1)c_2 = 2/3$. Dešinioji pusė lygi $-\langle z, -2z\rangle = 2c_1 = 2/3$.

2. Ar įvaizdis Π_5 faktorizuojasi per grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$? Apskaičiuokite vektorių $\Pi_5(k_{\pi/2})z^m$.

   Atsakymas. Ne, nes $\Pi_5(-I) = -\mathrm{id}$. Pagal Teiginio 23.6 K-tipų formulę galioja lygybė $\Pi_5(k_{\pi/2})z^m = i^{5+2m}z^m = (-1)^m\, i\, z^m$.

3. Ar egzistuoja neredukuojamas unitarusis įvaizdis, kurio K-tipai yra $1, 3, 5, \ldots$ ir kurio Kazimiro reikšmė yra $c = -\frac{1}{2}$?

   Atsakymas. Ne. Pagal Harišo Čandros faktus, cituojamus po Teoremos 23.16, tokio įvaizdžio K-baigtiniai vektoriai tenkina Teiginio 23.15 prielaidas. Šio teiginio žemiausiojo svorio atvejis (i) rodo, kad žemiausiasis K-tipas 1 lemia lygybę $c = 1\cdot(1-2) = -1$.

23.6 Santrauka

Su kiekvienu sveikuoju skaičiumi $n \geq 2$ formulė (23.5) apibrėžia neredukuojamą unitarųjį įvaizdį Π_n erdvėje $\mathcal{A}_n$. Šio įvaizdžio K-tipai yra $n, n+2, \ldots$, kiekvienas po vieną kartą. Operatorius E padidina K-tipą dydžiu 2, o operatorius F jį sumažina dydžiu 2. Kazimiro elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaičiaus $n(n-2)$. Sąryšis $k_{2\pi} = I$ lemia, kad K-tipai yra sveikieji skaičiai. Įvaizdis Π_n nusileidžia į grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ tada ir tik tada, kai skaičius

n yra lyginis. Neredukuojamame unitariajame modulyje, kurio K-tipai yra $\lambda, \lambda+2, \dots$, žemiausiasis svoris yra sveikasis skaičius $\lambda \geq 1$, o elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaičiaus $\lambda(\lambda-2)$. Dydžio $\|Ev_k\|^2$ teigiamumas paaiškina cituojamo Bargmano sąrašo pavidalą, įskaitant papildomąją seriją.

Atvaizdavimas U_n įvaizdžio Π_n polinomus atvaizduoja į visas pagrindinės serijos pusines kopėčias $k \geq n$, kai $\nu = n-1$, ir skiriasi tik norma. Kai $n = 1$, normos sutampa, ir taip įvaizdis Π_1 sukonstruojamas kaip nelyginės pagrindinės serijos dėmuo, kai $\nu = 0$. Kiekvienas baigtinės dimensijos tolydus grupės G unitarusis įvaizdis yra trivialusis. Taip pat citavome grupės G inversijos formulę, kurios diskrečioji suma eina per diskrečiąją seriją.

23.7 Literatūra

- A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples*, Princeton University Press, 2001 m. leidimas. Skyrelyje §VI.1 yra nagrinėjama grupės $\mathrm{SU}(1,1)$ holomorfinė diskrečioji serija. Skyreliuose §§II.5–II.6 yra nagrinėjami grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitarieji įvaizdžiai. Skyrelyje §II.7 suformuluota aukščiau cituota inversijos formulė, o skyrelyje §XI.3 ji įrodoma.
- MIT 18.112, *Functions of a Complex Variable*, 2008 m. rudens semestras: Koši formulė, laipsninės eilutės ir Koši–Rymano lygtys.
- P. Etingof, *Representations of Lie Groups*, MIT 18.757 paskaitų konspektas, 2023 m. rudens semestras. Leistinumas yra nagrinėjamas 5-oje paskaitoje, o Teorema 7.5 yra unitariosios globalizacijos teorema.
- Harish-Chandra, Plancherel formula for the 2×2 real unimodular group, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* 38 (1952), 337–342.
- V. Bargmann, Irreducible unitary representations of the Lorentz group, *Ann. of Math.* 48 (1947), 568–640; čia pateikta originalioji klasifikacija.

Paskaita 24

Lorenco grupės ir baigtinės dimensijos įvaizdžiai

Tikslai. *Sukonstruosime dvigubą padengimą* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$ *iš ermitinių* 2×2 *matricų. Paskui klasifikuosime abiejų grupių baigtinės dimensijos neredukuojamus tolydžiuosius kompleksinius įvaizdžius, kompleksifikuodami realiąją Lie algebrą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad atvaizdavimas $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$ yra siurjektyvus padengimo homomorfizmas, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$, ir atpažinti jame grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ kaip grupės $\mathrm{SO}^+(1,2)$ dvigubą padengimą.
- Sutapatinti algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ su algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$.
- Sužymėti grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ neredukuojamus baigtinės dimensijos tolydžiuosius kompleksinius įvaizdžius poromis (j_L, j_R) ir nuspręsti, kada jie nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$.
- Atpažinti šiame sąraše Veilio spinorius ir keturmačius vektorius.

Specialiojoje reliatyvumo teorijoje įvykis turi koordinates $x = (x_0, \vec{x})$, kur laikas yra x_0, o padėtis yra $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$. Naudojame vienetus, kuriuose šviesos greitis yra lygus 1. Inercinius stebėtojus sieja tiesiniai atvaizdavimai, kurie išsaugo toliau apibrėžtą Minkovskio formą. Reliatyvistiniai laukai įgyja reikšmes Lorenco grupės arba jos dvigubo padengimo $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ baigtinės dimensijos įvaizdžiuose.

24.1 Minkovskio erdvė ir Lorenco grupė

Tegul $e_0, \dots, e_3$ yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^4$ bazė. *Minkovskio forma* yra apibrėžiama formule

$$\langle x, y\rangle = x_0 y_0 - \vec{x}\cdot\vec{y} = x^T \eta y, \qquad \eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1).$$

Apibrėžimas 24.1. *Lorenco grupė* yra grupė $\mathrm{O}(1,3) = \{\Lambda \in \mathrm{GL}(4,\mathbb{R}) : \Lambda^T \eta \Lambda = \eta\}$. *Ateities kūgis* yra aibė $T^+ = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_0 > |\vec{x}|\}$.

Tegul $\Lambda \in \mathrm{O}(1,3)$. Tada $\det\Lambda = \pm 1$ ir $\Lambda^{-1} = \eta\Lambda^T\eta$, todėl $(\Lambda^{-1})_{00} = \Lambda_{00}$. Kadangi $\langle \Lambda e_0, \Lambda e_0\rangle = 1$, turime

$$\Lambda_{00}^2 = 1 + \Lambda_{10}^2 + \Lambda_{20}^2 + \Lambda_{30}^2 \geq 1.$$

Taigi arba $\Lambda_{00} \geq 1$, arba $\Lambda_{00} \leq -1$.

Lema 24.2. *Tegul $\Lambda \in \mathrm{O}(1,3)$. Tada nelygybė $\Lambda_{00} \geq 1$ galioja tada ir tik tada, kai $\Lambda T^+ \subseteq T^+$. Vadinasi, elementai, kuriems galioja nelygybė $\Lambda_{00} \geq 1$, sudaro pogrupį $\mathrm{O}^+(1,3)$.*

Įrodymas. Tarkime, kad $\Lambda_{00} \geq 1$, ir tegul $x \in T^+$. Apibrėžkime vektorių $w = \Lambda^{-1} e_0$. Tada $\langle w, w\rangle = 1$ ir $w_0 = (\Lambda^{-1})_{00} = \Lambda_{00} \geq 1$, todėl $w_0 > |\vec{w}|$. Kadangi matrica Λ išsaugo formą, turime

$$(\Lambda x)_0 = \langle e_0, \Lambda x\rangle = \langle w, x\rangle = w_0 x_0 - \vec{w}\cdot\vec{x} \geq w_0 x_0 - |\vec{w}|\,|\vec{x}| > 0.$$

Paskutiniame žingsnyje naudojame nelygybes $w_0 > |\vec{w}|$ ir $x_0 > |\vec{x}|$. Be to, $\langle \Lambda x, \Lambda x\rangle = \langle x, x\rangle > 0$. Šie du faktai rodo, kad $\Lambda x \in T^+$. Atvirkščiai, jei $\Lambda T^+ \subseteq T^+$, tai $\Lambda e_0 \in T^+$. Todėl $\Lambda_{00} > 0$, taigi $\Lambda_{00} \geq 1$. Kūgio sąlygą tenkinančių elementų sandauga taip pat ją tenkina. Be to, $(\Lambda^{-1})_{00} = \Lambda_{00}$. Todėl šie elementai sudaro pogrupį. ∎

Apibrėžimas 24.3. *Tikroji ortochroninė Lorenco grupė* yra

$$\mathrm{SO}^+(1,3) = \{\Lambda \in \mathrm{O}(1,3) : \det\Lambda = 1,\ \Lambda_{00} \geq 1\}.$$

Pagal kūgio lemą (Lemą 24.2) ši aibė yra grupė. Ši grupė yra uždara grupėje $\mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$, todėl pagal uždarojo pogrupio teoremą (3-ioji paskaita) ji yra Lie grupė. Pagal dvi aukščiau aptartas determinanto $\det\Lambda$ ir elemento Λ_{00} dichotomijas ši grupė taip pat yra atvira grupėje $\mathrm{O}(1,3)$. Todėl ši grupė turi tą pačią Lie algebrą kaip grupė $\mathrm{O}(1,3)$:

$$\mathfrak{so}(1,3) = \{Y \in \mathfrak{gl}(4,\mathbb{R}) : Y^T\eta + \eta Y = 0\}.$$

Atvaizdavimas $Y \mapsto \eta Y$ yra bijekcija, kurios vaizdas yra visa antisimetrinių matricų aibė, todėl $\dim\mathfrak{so}(1,3) = 6$.

Bazę sudaro *sukimų generatoriai* J_k ir *bustų generatoriai* K_k, kur $k = 1,2,3$. Čia $J_k e_0 = 0$. Matrica J_k atvaizduoja vektorių $\vec{x}$ į vektorių $e_k \times \vec{x}$. Be to, $K_k e_0 = e_k$ ir $K_k e_k = e_0$. Matrica K_k kitus du bazės vektorius atvaizduoja į nulį. Pavyzdžiui,


$$J_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tada posūkis $R_3(\theta) = \exp(\theta J_3)$ pasuka koordinačių (x_1, x_2) plokštumą teigiamu kampu θ. *Bustas* $B_3(t) = \exp(tK_3)$ nekeičia koordinačių x_1, x_2 ir veikia taip:

$$x_0 \pm x_3 \mapsto e^{\pm t}(x_0 \pm x_3).$$

Dydis $x_0^2 - x_3^2 = (x_0+x_3)(x_0-x_3)$ nekinta, todėl taškas juda hiperbole. Šį judėjimą plokštumoje $x_1 = x_2 = 0$ vaizduoja 24.1 pav.

Lyginumo transformacija $\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$ ir laiko apgręžimas $\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ priklauso grupei $\mathrm{O}(1,3)$, bet nepriklauso atvirajam pogrupiui $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Lie algebra $\mathfrak{so}(1,3)$ nesuteikia jokios informacijos apie šiuos elementus. Nagrinėsime tik grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$.



24.1 pav.: Bustas $B_3(t)$ plokštumoje $x_1 = x_2 = 0$. Punktyrinės įstrižainės yra nulinės tiesės $x_0 = \pm x_3$, o užtušuotas kampas yra kūgio T^+ pjūvis. Ištisinės kreivės yra hiperbolės $x_0^2 - x_3^2 = \pm 1$. Spalvotos rodyklės rodo, kad bustas $B_3(t)$ ištempia įstrižainę $x_0 = x_3$ daugikliu e^t, o įstrižainę $x_0 = -x_3$ suspaudžia daugikliu e^{-t}. Storieji lankai rodo dviejų taškų judėjimą, kai $t > 0$ yra fiksuotas. Vienas taškas yra e_0, žemiausias viršutinės šakos taškas. Kitas taškas tenkina lygybę $x_0^2 - x_3^2 = -1$. Punktyrinė apatinė šaka yra pjūvis to lapo, kuriame yra vektorius Λe_0, kai $\Lambda_{00} \le -1$.

24.2 Dvigubas padengimas

Padengimą $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ sukonstravome 4-ojoje paskaitoje kaip jungtinį veikimą algebroje $\mathfrak{su}(2)$. Ten jį taip pat sutapatinome su veikimu $\xi \mapsto U\xi U^*$ nulinio pėdsako ermitinių matricų erdvėje. Dabar leisime visas ermitines matricas ir visą grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, o veikimas bus $X \mapsto AXA^*$. Ta pati konstrukcija duoda Lorenco grupę.

Pažymėkime matricas $\sigma_0 = I$ ir

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Šios matricos sudaro realiąją erdvės $\mathcal{H}$ bazę. Šią erdvę sudaro visos ermitinės 2×2 matricos. Apibrėžkime kiekvienam vektoriui $x \in \mathbb{R}^4$ matricą

$$X(x) = \sum_{\mu=0}^{3} x_\mu \sigma_\mu = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai apskaičiavę, gauname

$$\det X(x) = \langle x, x \rangle, \qquad x_0 = \tfrac{1}{2} \operatorname{tr} X(x).$$

Kai $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, matrica $AX(x)A^*$ vėl yra ermitinė. Apibrėžkime matricą $\varphi(A) \in \mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$ lygybe

$$X(\varphi(A)x) = A\,X(x)\,A^*. \tag{24.1}$$

Matricos $\varphi(A)$ elementai yra matricos A elementų realiųjų ir menamųjų dalių realieji polinomai. Todėl atvaizdavimas φ yra glodus.

Pavyzdys 24.4 (Diagonalieji elementai). Tegul $A = \operatorname{diag}(a, a^{-1})$, kur $a \in \mathbb{C}^\times$. Tada

$$AX(x)A^* = \begin{pmatrix} |a|^2(x_0+x_3) & (a/\bar{a})(x_1-ix_2) \\ (\bar{a}/a)(x_1+ix_2) & |a|^{-2}(x_0-x_3) \end{pmatrix}.$$

Kai $a = e^{-i\theta/2}$, koordinatės x_0, x_3 nekinta, o kompleksinė koordinatė keičiasi pagal taisyklę $x_1 + ix_2 \mapsto e^{i\theta}(x_1+ix_2)$. Kai $a = e^{t/2}$, gauname $x_0 \pm x_3 \mapsto e^{\pm t}(x_0 \pm x_3)$, o koordinatės x_1, x_2 nekinta. Pažymėkime matricas $X_k = -\frac{i}{2}\sigma_k$. Tada

$$\varphi(\exp \theta X_3) = R_3(\theta), \qquad \varphi(\exp tiX_3) = B_3(t).$$

Išdiferencijavę taške 0, gauname $d\varphi(X_3) = J_3$ ir $d\varphi(iX_3) = K_3$. Be to, matrica $\operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta}) = \exp(-2\theta X_3)$ yra atvaizduojama į posūkį $R_3(-2\theta)$, kaip ir 4-osios paskaitos susitarime dėl atvaizdavimo $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$. Galiausiai matrica $\exp(2\pi X_3) = -I$ yra atvaizduojama į posūkį $R_3(2\pi) = I$.

Simboliu $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_\mathbb{R}$ žymėsime algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, laikomą šešių dimensijų realiąja Lie algebra.

Teorema 24.5. *Atvaizdavimas φ yra siurjektyvus homomorfizmas $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$. Jo diferencialas $d\varphi : \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_\mathbb{R} \to \mathfrak{so}(1,3)$ yra realiųjų Lie algebrų izomorfizmas. Be to, atvaizdavimas φ yra dvilapis padengimo atvaizdavimas.*

Įrodymas. Žingsnis 1: homomorfizmas į grupę $\mathrm{O}^+(1,3)$. Kadangi $(AB)X(AB)^* = A(BXB^*)A^*$, turime $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$. Kadangi $\det A = 1$, tai $\det(AXA^*) = \det X$. Todėl matrica $\varphi(A)$ išsaugo dydį $\langle x, x\rangle$. Pagal poliarizacijos tapatybę ši matrica išsaugo ir formą $\langle x, y\rangle$, todėl $\varphi(A) \in \mathrm{O}(1,3)$. Šios matricos elementas su indeksais 00 yra matricos AIA^* laiko komponentė:

$$\varphi(A)_{00} = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(AA^*) = \tfrac{1}{2}\textstyle\sum_{i,j}|A_{ij}|^2 > 0.$$

Pagal aukščiau aptartą dichotomiją galioja nelygybė $\varphi(A)_{00} \geq 1$.

Žingsnis 2: vienetinis determinantas. Parodysime, kad grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra jungi keliais. Tegul $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Tegul matrica $P = (A^*A)^{1/2}$ yra teigiamai apibrėžta kvadratinė šaknis. Apibrėžkime matricą $U = AP^{-1}$. Tada $U^*U = I$ ir $\det P = |\det A| = 1$, todėl $U \in \mathrm{SU}(2)$. Diagonalizuokime matricas U ir P pagal spektrinę teoremą. Kadangi abiejų matricų determinantas yra lygus 1, galime užrašyti $U = \exp Y_1$ ir $P = \exp Y_2$, kur matrica Y_1 yra antiermitinė, matrica Y_2 yra ermitinė, o abiejų matricų pėdsakas yra lygus nuliui. Tada atvaizdavimas $t \mapsto \exp(tY_1)\exp(tY_2)$, kur $t \in [0,1]$, yra kelias grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ nuo matricos I iki matricos A. Išilgai šio kelio funkcija $\det\varphi$ yra tolydi ir įgyja reikšmes aibėje $\{\pm 1\}$. Kelio pradžioje šios funkcijos reikšmė yra lygi 1. Todėl $\det\varphi(A) = 1$.

Žingsnis 3: branduolys. Tarkime, kad $\varphi(A) = I$. Tada $AXA^* = X$ visoms matricoms $X \in \mathcal{H}$. Įstatę matricą $X = I$, gauname $AA^* = I$, todėl $AXA^{-1} = X$ visoms matricoms $X \in \mathcal{H}$. Kiekviena kompleksinė matrica yra pavidalo $X_1 + iX_2$, kur $X_1, X_2 \in \mathcal{H}$. Todėl matrica A komutuoja su visomis algebros $M_2(\mathbb{C})$ matricomis, taigi $A = cI$. Tada iš lygybės $\det A = 1$ gauname $c = \pm 1$. Atvirkščiai, matricos $\pm I$ priklauso branduoliui.

Žingsnis 4: siurjektyvumas. Tai yra pagrindinis žingsnis. Tegul $\Lambda \in \mathrm{SO}^+(1,3)$. Pažymėkime vektorių $v = \Lambda e_0$. Pirmiausia pašalinsime busto dalį. Matrica $V = X(v)$ tenkina sąlygas

$$\det V = \langle v, v\rangle = 1, \qquad \operatorname{tr} V = 2\Lambda_{00} > 0.$$

Šios matricos realiosios tikrinės vertės turi sandaugą 1 ir teigiamą sumą, todėl abi tikrinės vertės yra teigiamos. Taigi $V = W\operatorname{diag}(\lambda, \lambda^{-1})W^*$, kur matrica W yra unitarioji ir $\lambda > 0$. Apibrėžkime matricą $P = W\operatorname{diag}(\lambda^{1/2}, \lambda^{-1/2})W^*$. Tada $P \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, $P^* = P$ ir $P^2 = V$. Vadinasi, $X(\varphi(P)e_0) = PIP^* = V$, t.y. $\varphi(P)e_0 = v$.

Toliau nagrinėsime posūkio dalį. Apibrėžkime elementą

$$\Lambda' = \varphi(P)^{-1}\Lambda.$$

Šis elementas priklauso grupei $\mathrm{SO}^+(1,3)$ ir nekeičia vektoriaus e_0. Todėl šis elementas išsaugo poerdvį $e_0^\perp = \operatorname{span}(e_1, e_2, e_3)$, kuriame forma $-\langle\cdot,\cdot\rangle$ yra Euklido skaliarinė sandauga. Vadinasi, $\Lambda' = \operatorname{diag}(1, R)$, kur $R \in \mathrm{SO}(3)$. Vektorius $n = Re_3$ yra vienetinis. Apibrėžkime matricą $N = \sum_k n_k\sigma_k$. Ši ermitinė matrica tenkina sąlygas

$$\operatorname{tr} N = 0, \qquad \det N = -|n|^2 = -1,$$

todėl matricos N tikrinės vertės yra ±1. Pagal spektrinę teoremą galime užrašyti $N = W'\sigma_3 W'^*$, kur matrica W' yra unitarioji. Pataisykime matricos W' determinantą, pakeisdami matricą W' matrica

$$W'\operatorname{diag}(1, \overline{\det W'}).$$

Diagonaliosios matricos komutuoja su matrica σ_3, todėl šis pakeitimas išsaugo matricos N diagonalizavimą. Pataisyta matrica W' priklauso grupei $\mathrm{SU}(2)$.

Tada $\varphi(W')e_0 = e_0$, nes $W'W'^* = I$. Be to, $\varphi(W')e_3 = n$, nes $W'\sigma_3 W'^* = N$. Todėl elementas $\varphi(W')^{-1}\Lambda'$ nekeičia vektorių e_0 ir e_3. Šis elementas poerdvį $\operatorname{span}(e_1, e_2)$ veikia kaip grupės $\mathrm{SO}(2)$ elementas, todėl šis elementas yra lygus posūkiui $R_3(\theta)$ su tam tikru kampu θ. Pagal Pavyzdžio 24.4 posūkio formulę gauname

$$\Lambda = \varphi(P)\,\varphi(W')\,R_3(\theta) = \varphi\big(PW'\exp(\theta X_3)\big).$$

Atskiruoju atveju atvaizdavimas φ atvaizduoja grupę $\mathrm{SU}(2)$ siurjektyviai į posūkių $\operatorname{diag}(1, R)$ aibę.

Žingsnis 5: diferencialas ir padengimas. Išdiferencijuokime lygybę (24.1) išilgai kreivės $\exp(tY)$, naudodamiesi lygybe $\exp(tY)^* = \exp(tY^*)$:

$$X(d\varphi(Y)x) = YX(x) + X(x)Y^*, \qquad Y \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}). \tag{24.2}$$

Tarkime, kad $d\varphi(Y) = 0$. Įstatę matricą $X = I$, gauname $Y^* = -Y$. Tada $YX - XY = 0$ visoms matricoms $X \in \mathcal{H}$, todėl matrica Y yra skaliarinė, kaip ir 3 žingsnyje. Kadangi $\operatorname{tr} Y = 0$, gauname $Y = 0$. Taigi diferencialas $d\varphi$ yra injektyvus. Abiejų algebrų realioji dimensija yra lygi 6, todėl diferencialas $d\varphi$ yra tiesinė bijekcija. Lie grupių homomorfizmo diferencialas išsaugo skliaustus, todėl diferencialas $d\varphi$ yra realiųjų Lie algebrų izomorfizmas.

Pagal 2 ir 4 žingsnius grupė $\mathrm{SO}^+(1,3) = \varphi(\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}))$ yra jungi. Tolydus siurjektyvus jungių Lie grupių homomorfizmas, kurio diferencialas yra bijektyvus, yra padengimo atvaizdavimas (4-oji paskaita). Šio padengimo sluoksniai yra branduolio $\ker\varphi = \{\pm I\}$ gretutinės klasės, todėl padengimas yra dvilapis. ∎

Formulė (24.2) duoda $d\varphi(X_k) = J_k$ ir $d\varphi(iX_k) = K_k$ kiekvienam indeksui k. Atvejis $k = 3$ yra Pavyzdžio 24.4 diagonaliųjų matricų skaičiavimas. Atvejį $k = 1$ nagrinėja Uždavinys 24.1.

Atvejis $k = 2$ yra nagrinėjamas lygiai taip pat. Tada skliaustų sąryšiai $[X_i, X_j] = \epsilon_{ijk} X_k$ per diferencialą $d\varphi$ yra perkeliami į sąryšius

$$[J_i, J_j] = \epsilon_{ijk} J_k, \qquad [J_i, K_j] = \epsilon_{ijk} K_k, \qquad [K_i, K_j] = -\epsilon_{ijk} J_k.$$

Įrodymo 2 ir 4 žingsniai yra 20-osios paskaitos Kartano skaidinys realiajai algebrai $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})_{\mathbb{R}}$, kai $\mathfrak{k} = \mathfrak{su}(2)$ ir $\mathfrak{p} = i\,\mathfrak{su}(2)$. Žingsnyje 2 užrašome $A = UP$, kur $U \in \mathrm{SU}(2)$ ir $P = \exp Y_2$, o matrica Y_2 yra ermitinė ir jos pėdsakas lygus nuliui. Todėl $\varphi(A) = \varphi(U)\varphi(P)$, t.y. pirma atliekamas bustas, o po jo posūkis. Žingsnyje 4 to paties pavidalo elementą užrašome atvirkštine tvarka: pirma atliekamas posūkis, o po jo bustas.

Ta pati konstrukcija viena dimensija mažesnėje erdvėje

Ši konstrukcija tinka ir grupei $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$, kuri yra realusis grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ pogrupis. Tada ji sieja grupę $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ su Lorenco grupe, turinčia dvi erdvines koordinates. Tegul $\mathbb{R}^{1,2}$ yra poerdvis $\{x \in \mathbb{R}^4 : x_2 = 0\}$ su forma $x_0^2 - x_1^2 - x_3^2$. Tegul $\mathrm{SO}^+(1, 2)$ yra grupė, kurią sudaro erdvės $\mathbb{R}^{1,2}$ tiesiniai atvaizdavimai, kurie išsaugo šią formą, turi vienetinį determinantą ir tenkina nelygybę $\Lambda_{00} \geq 1$.

Teiginys 24.6. *Kiekviena matrica $\varphi(A)$, kur $A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$, nekeičia vektoriaus e_2 ir išsaugo poerdvį $\mathbb{R}^{1,2}$. Apribojimas poerdvyje $\mathbb{R}^{1,2}$ duoda siurjektyvų homomorfizmą $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \to \mathrm{SO}^+(1, 2)$, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$.*

Įrodymas. Tegul matrica A yra realioji, taigi $A^* = A^T$. Jei $x_2 = 0$, tai matrica $X(x)$ yra realioji simetrinė. Tokia pati yra ir matrica $AX(x)A^T$. Todėl matrica $\varphi(A)$ išsaugo poerdvį $\mathbb{R}^{1,2}$. Toliau, $X(e_2) = \sigma_2$ ir $A\sigma_2 A^T = (\det A)\sigma_2 = \sigma_2$, todėl matrica $\varphi(A)$ nekeičia vektoriaus e_2. Taigi matrica $\varphi(A)$ tiesėje $\mathbb{R}e_2$ veikia kaip tapatusis atvaizdavimas, o poerdvyje $\mathbb{R}^{1,2}$ – kaip savo apribojimas. Pagal Teoremą 24.5 šis apribojimas išsaugo formą, jo determinantas lygus vienetui ir galioja nelygybė $\Lambda_{00} \geq 1$. Jei apribojimas yra tapatusis atvaizdavimas, tai $\varphi(A) = I$, todėl $A = \pm I$.

Siurjektyvumui įrodyti pakartosime 4 žingsnį su realiosiomis matricomis. Tegul $\Lambda \in \mathrm{SO}^+(1, 2)$ ir $v = \Lambda e_0$. Matrica $V = X(v)$ yra realioji simetrinė, jos tikrinės vertės yra teigiamos, o determinantas lygus vienetui. Realusis ortogonalusis diagonalizavimas duoda realiąją teigiamai apibrėžtą matricą P, kuriai $\det P = 1$ ir $P^2 = V$, todėl $\varphi(P)e_0 = v$. Tada elementas $\varphi(P)^{-1}\Lambda$ nekeičia vektoriaus e_0, todėl koordinačių (x_3, x_1) plokštumą jis veikia kaip grupės $\mathrm{SO}(2)$ elementas. Tiesiogiai sudauginę matricas, matome, kad posūkio matrica, kurios pirmasis stulpelis yra $(\cos\theta, \sin\theta)^T$, nekeičia vektoriaus e_0 ir koordinačių (x_3, x_1) plokštumą pasuka kampu 2θ. Todėl šis elementas yra $\varphi(k)$, kur k yra posūkio matrica, ir lygybė $\Lambda = \varphi(Pk)$ galioja poerdvyje $\mathbb{R}^{1,2}$. ∎

Taigi 21-ojoje, 22-ojoje ir 23-iojoje paskaitose nagrinėjome dvigubą padengimą Lorenco grupės, turinčios dvi erdvines ir vieną laiko koordinatę. Todėl Bargmano straipsnio, cituoto 23-iojoje paskaitoje, pavadinimas yra *Irreducible unitary representations of the Lorentz group*.

Čia vėl pasirodo ir ankstesni tų paskaitų modeliai. Realiosios matricos $\frac{1}{2}\sigma_3$ ir $\frac{1}{2}\sigma_1$ atvaizduojamos į busto generatorius K_3 ir K_1. Vektoriaus e_0 stabilizatorius grupėje $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ yra $\{A : AA^T = I\}$, t.y. posūkio matricų pogrupis K. Aukščiau pateiktas įrodymas rodo, kad grupė

tranzityviai veikia viršutinį lapą $x_0^2 - x_1^2 - x_3^2 = 1$, kur $x_0 > 0$. Todėl šis lapas yra gretutinių klasių erdvė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/K$. Kaip vienalytė erdvė jis yra 20-osios paskaitos pusplokštuma ir 23-iosios paskaitos diskas. Galiausiai realiąją tiesę $\mathbb{R}v$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ atitinka matrica vv^T. Šios matricos determinantas lygus nuliui, o pėdsakas yra $|v|^2 > 0$, todėl ši matrica yra šviesinis ateities vektorius. Be to, $A(vv^T)A^T = (Av)(Av)^T$. Taigi 22-osios paskaitos realiųjų tiesių apskritimas yra šviesos spindulių apskritimas erdvėje $\mathbb{R}^{1,2}$.

24.3 Lorenco algebros kompleksifikacija

Šis skyrelis remiasi vienu bazės pakeitimu. Kompleksifikuotoje Lorenco algebroje $\mathfrak{so}(1,3) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ elementai $\frac{1}{2}(J_k - iK_k)$ tenkina algebros $\mathfrak{su}(2)$ skliaustų sąryšius. Tokius pat sąryšius tenkina ir elementai $\frac{1}{2}(J_k + iK_k)$, o šie du rinkiniai tarpusavyje komutuoja. Dabar tai išvesime.

Pagal dvigubo padengimo teoremą (Teoremą 24.5) galioja izomorfizmas $\mathfrak{so}(1,3) \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}}$. Šios realiosios algebros kompleksinis įvaizdis nebūtinai yra kompleksiškai tiesinis. Pavyzdžiui, atvaizdavimas $Y \mapsto \bar{Y}$ yra realiosios Lie algebros automorfizmas, kuris nėra kompleksiškai tiesinis. Kompleksifikacija leidžia nagrinėti abi rūšis kartu.

Tegul $\mathfrak{g}$ yra realioji Lie algebra ir V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė. Realiųjų Lie algebrų atvaizdavimą $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iki kompleksiškai tiesinio Lie algebrų atvaizdavimo, apibrėžto formule $\rho_{\mathbb{C}}(Y \otimes z) = z\rho(Y)$ algebroje $\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. Kompleksinis poerdvis yra ρ-invariantinis tada ir tik tada, kai jis yra $\rho_{\mathbb{C}}$-invariantinis. Tiesinis atvaizdavimas yra dviejų tokių atvaizdavimų ρ persipynimo operatorius tada ir tik tada, kai jis yra jų pratęsinių persipynimo operatorius.

Realioji algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}}$ turi savo operatorių M, apibrėžtą formule $M(Y) = iY$. Jis tenkina lygybes $M^2 = -1$ ir $[MY, Z] = M[Y, Z]$. Po kompleksifikacijos operatoriaus $M \otimes 1$ tikrinės vertės yra i ir $-i$. Jo tikriniai poerdviai yra idealai, nes $[(M \otimes 1)u, v] = (M \otimes 1)[u, v]$. Šie idealai tarpusavyje komutuoja: jei elementų u ir v tikrinės vertės yra i ir $-i$, tai $i[u, v] = (M \otimes 1)[u, v] = -i[u, v]$. Kitas teiginys šiuos idealus sutapatina su dviem algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ kopijomis. Per šį sutapatinimą operatorius $M \otimes 1$ tampa daugyba iš i pirmojoje kopijoje ir daugyba iš $-i$ antrojoje.

Teiginys 24.7. *Kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas, apibrėžtas formule*

$$\iota : \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \to \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}), \qquad Y \otimes z \mapsto (zY,\, z\bar{Y}),$$

yra kompleksinių Lie algebrų izomorfizmas.

Įrodymas. Pora $(zY, z\bar{Y})$ realiai bitiesiškai priklauso nuo kintamųjų (Y, z), todėl atvaizdavimas ι yra gerai apibrėžtas ir kompleksiškai tiesinis. Kompleksinis matricų jungtinimas išsaugo skliaustus, todėl

$$\iota([Y \otimes z, Y' \otimes z']) = \big(zz'[Y, Y'],\, zz'[\bar{Y}, \bar{Y}']\big) = [\iota(Y \otimes z), \iota(Y' \otimes z')].$$

Abiejų Lie algebrų kompleksinė dimensija yra lygi 6, todėl pakanka įrodyti, kad atvaizdavimas ι yra injektyvus. Bendrojo elemento $Y \otimes 1 + Y' \otimes i$ vaizdas yra $(Y + iY',\, \bar{Y} + i\bar{Y}')$. Jei šis vaizdas yra lygus nuliui, tai $Y = -iY'$ ir $\bar{Y} = -i\bar{Y}'$. Taikydami jungtinimą pirmajai lygybei, gauname $\bar{Y} = i\bar{Y}'$. Vadinasi, $\bar{Y}' = 0$, todėl $Y' = 0$ ir $Y = 0$. ∎

Kadangi $\overline{iX_k} = -i\bar{X}_k$, turime $\iota(X_k \otimes 1) = (X_k, \bar{X}_k)$ ir $\iota(iX_k \otimes i) = (-X_k, \bar{X}_k)$. Todėl elementai

$$X_k^L = \tfrac{1}{2}(X_k \otimes 1 - iX_k \otimes i), \qquad X_k^R = \tfrac{1}{2}(X_k \otimes 1 + iX_k \otimes i)$$

tenkina lygybes $\iota(X_k^L) = (X_k, 0)$ ir $\iota(X_k^R) = (0, \bar{X}_k)$. Kitaip tariant, elementai X_k^L ir X_k^R yra elemento $X_k \otimes 1$ vaizdai, gauti projekcijomis $\frac{1}{2}(1 - iM \otimes 1)$ ir $\frac{1}{2}(1 + iM \otimes 1)$ į du idealus. Sutapatinkime algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ su algebra $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{so}(1,3) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, naudodami kompleksiškai tiesinį diferencialo $d\varphi$ pratęsinį. Tada $X_k^L = \frac{1}{2}(J_k - iK_k)$ ir $X_k^R = \frac{1}{2}(J_k + iK_k)$. Šie elementai tenkina sąryšius

$$[X_i^L, X_j^L] = \epsilon_{ijk} X_k^L, \qquad [X_i^R, X_j^R] = \epsilon_{ijk} X_k^R, \qquad [X_i^L, X_j^R] = 0.$$

Be to, $J_k = X_k^L + X_k^R$ ir $K_k = i(X_k^L - X_k^R)$.

24.4 Baigtinės dimensijos įvaizdžių klasifikacija

Kai $m \geq 0$, pažymėkime erdvę $V_m = \mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$. Žymėkime simboliu $S^m(A)$ operatoriaus $A^{\otimes m}$ apribojimą poerdvyje V_m. Matricos $S^m(A)$ elementai yra matricos A elementų polinomai, todėl diferencialas dS^m yra kompleksiškai tiesinis algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Iš Lie algebrų parengiamosios medžiagos žinome, kad diferencialas dS^m apibrėžia neredukuojamą modulį, kurio aukščiausiasis svoris yra m. Elemento $H = \mathrm{diag}(1,-1)$ veikimo tikrinės vertės yra $m, m-2, \ldots, -m$. Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ erdvė V_m yra sukinio $m/2$ įvaizdis.

Apibrėžimas 24.8. Kai $j_L, j_R \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots\}$, įvaizdžiu (j_L, j_R) yra vadinamas grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis, apibrėžtas formule

$$D^{(j_L,j_R)}(A) = S^{2j_L}(A) \otimes S^{2j_R}(\bar{A}) \quad \text{erdvėje} \quad V_{2j_L} \otimes V_{2j_R}.$$

Kadangi atvaizdavimas $A \mapsto \bar{A}$ yra tolydus grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ automorfizmas, šis įvaizdis yra tolydus. Šio įvaizdžio dimensija yra lygi $(2j_L + 1)(2j_R + 1)$.

Tegul Π yra grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis. Sakome, kad jis *nusileidžia* į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$, jei egzistuoja tolydusis įvaizdis Π', apibrėžtas grupėje $\mathrm{SO}^+(1,3)$, kuriam galioja lygybė

$$\Pi = \Pi' \circ \varphi.$$

Tai yra 4-ojoje paskaitoje aptartas nusileidimas, šįkart per padengimą φ.

Teorema 24.9. *(a) Kiekvienas įvaizdis (j_L, j_R) yra neredukuojamas. Skirtingos poros duoda neekvivalenčius įvaizdžius. Kiekvienas neredukuojamas baigtinės dimensijos tolydusis kompleksinis grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis yra ekvivalentus kuriam nors įvaizdžiui (j_L, j_R).*

(b) Galioja lygybė $D^{(j_L,j_R)}(-I) = (-1)^{2j_L+2j_R}$. Todėl įvaizdis (j_L, j_R) nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ tada ir tik tada, kai skaičius $2j_L + 2j_R$ yra lyginis. Ekvivalentumo tikslumu šie nusileidę įvaizdžiai yra visi neredukuojami baigtinės dimensijos tolydieji kompleksiniai grupės $\mathrm{SO}^+(1,3)$ įvaizdžiai.

(c) Įvaizdžio (j_L, j_R) apribojimas grupėje $\mathrm{SU}(2)$ yra ekvivalentus įvaizdžiui $\bigoplus_j V_{2j}$, kur $j = |j_L - j_R|, |j_L - j_R| + 1, \ldots, j_L + j_R$.

Įrodymas. (a) Pažymėkime įvaizdį $D = D^{(j_L,j_R)}$, skaičių $m = 2j_L$ ir skaičių $n = 2j_R$. Kadangi $\overline{\exp tY} = \exp t\bar{Y}$, išdiferencijavę gauname

$$dD(Y) = dS^m(Y) \otimes 1 + 1 \otimes dS^n(\bar{Y}), \qquad Y \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}}.$$

Taigi kompleksiškai tiesinis pratęsinys yra

$$dD_{\mathbb{C}}(Y \otimes z) = dS^m(zY) \otimes 1 + 1 \otimes dS^n(z\bar{Y}) = (dS^m \boxtimes dS^n)\big(\iota(Y \otimes z)\big).$$

Vadinasi, per izomorfizmą ι įvaizdis $dD_{\mathbb{C}}$ yra modulis $V_m \boxtimes V_n$, kurį veikia algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Čia elementas $(Y_1, Y_2) \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ modulį $V_m \boxtimes V_n = V_m \otimes V_n$ veikia operatoriumi $dS^m(Y_1) \otimes 1 + 1 \otimes dS^n(Y_2)$. Perimame iš parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ (13 ir 26 paskaitos): šie moduliai yra neredukuojami ir poromis neizomorfiški, nes jų aukščiausieji svoriai (m, n) skiriasi. Kiekvienas baigtinės dimensijos neredukuojamas algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ modulis yra vienas iš jų.

Dabar pereisime nuo algebros prie grupės. Kiekvienas tolydusis baigtinės dimensijos įvaizdis Π yra glodus (3-ioji paskaita) ir tenkina lygybę $\Pi(\exp Y) = \exp d\Pi(Y)$ (2-oji paskaita). Pagal Teoremos 24.5 įrodymo 2 žingsnį grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra jungi, todėl ją generuoja aibė $\exp \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ (2-oji paskaita). Vadinasi, poerdvis yra Π-invariantinis tada ir tik tada, kai jis yra $d\Pi$-invariantinis. Tiesinis atvaizdavimas yra dviejų grupės įvaizdžių persipynimo operatorius tada ir tik tada, kai jis yra jų diferencialų persipynimo operatorius. Pagal Skyrelyje 24.3 aptartas pratęsinio savybes abu teiginiai galioja ir pratęsiniui $d\Pi_{\mathbb{C}}$. Todėl įvaizdis D yra neredukuojamas. Skirtingas poras atitinkantys įvaizdžiai yra neekvivalentūs.

Galiausiai tegul Π yra neredukuojamas baigtinės dimensijos tolydusis kompleksinis įvaizdis. Tada $d\Pi_{\mathbb{C}} \circ \iota^{-1} \cong V_m \boxtimes V_n$ kuriai nors porai (m, n). Tai yra įvaizdžio $D^{(m/2,n/2)}$ kompleksifikuotas diferencialas, todėl $\Pi \cong D^{(m/2,n/2)}$.

(b) Turime $S^m(-I) = (-1)^m$ ir $\overline{-I} = -I$, todėl $D(-I) = (-1)^{m+n}$. Padengimo atvaizdavimai yra atviri. Todėl pagal dvigubo padengimo teoremą (Teoremą 24.5) atvaizdavimas φ sutapatina grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ su grupe $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})/\{\pm I\}$ kaip topologines grupes. Pagal 4-ąją paskaitą grupės $\mathrm{SO}^+(1,3)$ tolydieji įvaizdžiai atitinka tuos grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ tolydžiuosius įvaizdžius, kurie yra trivialūs elemente $-I$. Ši atitiktis išsaugo neredukuojamumą ir ekvivalentumą. Sujunkime dabar tai su (a) dalimi.

(c) Pažymėkime matricą $\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Kai $U \in \mathrm{SU}(2)$, galioja lygybė $\bar{U} = \varepsilon U \varepsilon^{-1}$ (Uždavinys 24.3). Todėl $S^n(\bar{U}) = S^n(\varepsilon) S^n(U) S^n(\varepsilon)^{-1}$. Vadinasi, apribojimas yra ekvivalentus įvaizdžiui $V_m \otimes V_n$. Skaidinį duoda parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ Klebšo–Gordano taisyklė (6 ir 27 paskaitos). ∎

Kiekvienas baigtinės dimensijos tolydusis kompleksinis grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis yra įvaizdžių (j_L, j_R) tiesioginė suma. Tai išplaukia iš Veilio visiško redukuojamumo teoremos pusiau paprastajai algebrai $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, perkeltos taip pat, kaip įrodyme.

Įvaizdžiai $(j, 0)$ yra 14-osios paskaitos holomorfiniai pratęsiniai iš grupės $\mathrm{SU}(2)$, nes matricos $S^{2j}(A)$ elementai yra matricos A elementų polinomai.

Tik įvaizdis $(0, 0)$ turi invariantinę skaliarinę sandaugą. Taip yra todėl, kad busto generatorius turi nenulinę realiąją tikrinę vertę $j_L + j_R$ kiekviename įvaizdyje $(j_L, j_R) \neq (0, 0)$. Įrodymą pateikia Uždavinys 24.6. Todėl kiekvienas netrivialus tolydusis šios grupės unitarusis įvaizdis yra begalinės dimensijos. Tokie įvaizdžiai egzistuoja. Jie yra indukuoti

iš viršutinių trikampių matricų pogrupio, kaip 22-ojoje paskaitoje, o jų modeliai naudoja šviesos spindulių sferą. Jų nenagrinėsime; žr. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups*, II skyriaus 4 skyrelį.

Tegul fizikoje nagrinėjamas laukas ψ įgyja reikšmes įvaizdžio erdvėje V, kurioje grupė veikia matricomis $D(A)$. Lauko transformacija yra

$$\psi'(x) = D(A)\psi(\varphi(A)^{-1}x).$$

Žymė (j_L, j_R) klasifikuoja lauko ψ komponentes. Ši žymė neaprašo unitariosios dalelių būsenų Hilberto erdvės. Šią erdvę nagrinėsime 25-ojoje paskaitoje.

24.5 Veilio spinoriai ir keturmačiai vektoriai

Pavyzdys 24.10 (Veilio spinoriai)**.** Įvaizdis $(\frac{1}{2}, 0)$ yra erdvė $\mathbb{C}^2$ su atvaizdavimu $A \mapsto A$. Įvaizdis $(0, \frac{1}{2})$ yra erdvė $\mathbb{C}^2$ su atvaizdavimu $A \mapsto \bar{A}$. Fizikai šių įvaizdžių vektorius vadina kairiarankiais ir dešiniarankiais Veilio spinoriais. Rankų priskyrimas yra susitarimas. Pagal klasifikacijos teoremą (Teoremą 24.9) šie du įvaizdžiai yra neekvivalentūs. Tiesiogiai tai galima patikrinti pėdsakais. Kai $A = \operatorname{diag}(2i, -\frac{i}{2}) \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, turime

$$\operatorname{tr} A = \tfrac{3i}{2}, \qquad \operatorname{tr} \bar{A} = -\tfrac{3i}{2}.$$

Ekvivalentūs įvaizdžiai turi vienodus pėdsakus. Šie pėdsakai skiriasi, todėl pėdsakų patikrinimas patvirtina, kad šie du įvaizdžiai yra neekvivalentūs. Abiejų įvaizdžių apribojimas yra įvaizdis V_1 grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Abu įvaizdžiai atvaizduoja elementą $-I$ į operatorių -1, todėl nė vienas jų nenusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Dirako įvaizdis $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ taip pat atvaizduoja elementą $-I$ į operatorių -1, todėl ir jis nenusileidžia.

Pavyzdys 24.11 (Keturmačiai vektoriai)**.** Tegul $\Psi : \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \to M_2(\mathbb{C})$ yra tiesinis izomorfizmas, apibrėžtas formule $\Psi(\xi \otimes \zeta) = \xi\zeta^T$. Atvaizdavimas Ψ atvaizduoja vektorių $e_i \otimes e_j$ į matricinį vienetą E_{ij}. Kai $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, turime

$$\Psi(A\xi \otimes \bar{A}\zeta) = A\xi(\bar{A}\zeta)^T = A\xi\zeta^T\bar{A}^T = A\,\Psi(\xi \otimes \zeta)\,A^*.$$

Todėl operatorius $D^{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}(A)$ tampa atvaizdavimu $Z \mapsto AZA^*$ erdvėje $M_2(\mathbb{C}) = \mathcal{H} \oplus i\mathcal{H}$. Šis veikimas išsaugo erdvę $\mathcal{H}$ ir joje veikia kaip matrica $\varphi(A)$. Vadinasi, įvaizdis $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ yra ekvivalentus įvaizdžiui erdvėje $\mathbb{C}^4 = \mathbb{R}^4 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, kurioje veikia kompleksiškai tiesiškai pratęsta matrica $\varphi(A)$. Kadangi skaičius $2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = 2$ yra lyginis, pagal Teoremos 24.9 nusileidimo kriterijų įvaizdis $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ nusileidžia. Nusileidęs įvaizdis yra grupės $\mathrm{SO}^+(1,3)$ apibrėžiantysis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^4$.

Su šiuo sutapatinimu dera du patikrinimai. Pirma, Teoremos 24.9(c) dalies apribojimo taisyklė prognozuoja įvaizdį $V_0 \oplus V_2$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Patikrinkime tai. Elementas $U \in \mathrm{SU}(2)$ veikia pagal taisyklę $Z \mapsto UZU^{-1}$. Šis elementas nekeičia matricos I, kuri apvelka laiko kryptį. Be to, šis elementas išsaugo nulinio pėdsako matricas, kurios yra erdviniai vektoriai ir turi sukinį 1. Antra, palyginkime bustų tikrines vertes. Įvaizdyje $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ elementas $iX_3 = \frac{1}{2}\sigma_3$ veikia kaip $\frac{1}{2}(H \otimes 1 + 1 \otimes H)$. Šio operatoriaus tikrinės vertės yra $\frac{1}{2}(q + q')$, kur $q, q' \in \{\pm 1\}$:

$$1, \quad 0, \quad 0, \quad -1.$$

Erdvėje $\mathbb{R}^4$ matricos $d\varphi(iX_3) = K_3$ tikriniai vektoriai $e_0 + e_3$, e_1, e_2, $e_0 - e_3$ turi atitinkamai tikrines vertes $1, 0, 0, -1$. Sąrašai sutampa.

Lentelėje yra pateikti maži atvejai. Uždavinyje 24.4 įvaizdis $(1,0)\oplus(0,1)$ yra sutapatinamas su erdve $\Lambda^2\mathbb{C}^4$, t.y. su kompleksifikuotų antisimetrinių tenzorių erdve.

(j_L, j_R)	dimensija	grupėje SU(2)	nusileidžia	pavadinimas
$(0,0)$	1	V_0	taip	skaliaras
$(\frac{1}{2},0)$, $(0,\frac{1}{2})$	2	V_1	ne	Veilio spinoriai
$(1,0)$, $(0,1)$	3	V_2	taip	erdvės $\Lambda^2\mathbb{C}^4$ dėmenys
$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	4	$V_0\oplus V_2$	taip	keturmatis vektorius
$(1,\frac{1}{2})$	6	$V_1\oplus V_3$	ne	–

Fizikoje erdvės $\Lambda^2\mathbb{C}^4$ du dėmenis apvelka elektrinio ir magnetinio lauko kompleksiniai dariniai $\vec{E}+i\vec{B}$ ir $\vec{E}-i\vec{B}$. Kuris iš jų vadinamas $(1,0)$, priklauso nuo rankų priskyrimo susitarimo.

24.6 Savikontrolė

(1) Apskaičiuokite matricą $\varphi(\operatorname{diag}(2,\frac{1}{2}))$.

(2) Raskite visas matricas $A\in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kurioms galioja lygybė $\varphi(A)=R_3(\pi)$.

(3) Ar įvaizdis $(\frac{3}{2},\frac{1}{2})$ nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$? Nurodykite jo dimensiją ir apribojimą grupėje SU(2).

Atsakymas. (1) Pagal Pavyzdžio 24.4 diagonaliųjų matricų formulę, kai $a=2$, gauname $x_0\pm x_3\mapsto 4^{\pm1}(x_0\pm x_3)$. Kadangi $a/\bar a=1$, koordinatės x_1 ir x_2 nekinta. Tai yra bustas $B_3(t)$, kur $e^t=4$, todėl $\cosh t=\frac{17}{8}$ ir $\sinh t=\frac{15}{8}$. Taigi

$$\varphi\big(\operatorname{diag}(2,\tfrac{1}{2})\big)=\begin{pmatrix}\frac{17}{8}&0&0&\frac{15}{8}\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\\frac{15}{8}&0&0&\frac{17}{8}\end{pmatrix}.$$

Patikrinimas: $17^2-15^2=64$.

(2) Elementas $\exp(\pi X_3)=\operatorname{diag}(-i,i)$ yra atvaizduojamas į posūkį $R_3(\pi)$. Sluoksnis yra pogrupio $\{\pm I\}$ gretutinė klasė, todėl atsakymas yra $A=\pm\operatorname{diag}(-i,i)$.

(3) Šiuo atveju skaičius $2j_L+2j_R=4$ yra lyginis, todėl įvaizdis nusileidžia. Jo dimensija yra $4\cdot 2=8$. Apribojimas yra įvaizdis $V_2\oplus V_4$, kurio dimensija yra $3+5=8$.

24.7 Santrauka

Ermitinių matricų erdvėje veikimas $X\mapsto AXA^*$ išsaugo determinantą, kuriam galioja lygybė $\det X=\langle x,x\rangle$. Šis veikimas apibrėžia dvilapį padengimą $\varphi:\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})\to\mathrm{SO}^+(1,3)$, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$. Jo apribojimas realiųjų matricų pogrupyje yra dvigubas padengimas $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})\to\mathrm{SO}^+(1,2)$. Atvaizdavimas ι sutapatina kompleksifikuotą Lorenco algebrą su algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\oplus\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Ekvivalentumo tikslumu grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ neredukuojami baigtinės

dimensijos tolydieji įvaizdžiai yra įvaizdžiai (j_L, j_R), apibrėžti formule $S^{2j_L}(A) \otimes S^{2j_R}(\bar{A})$. Tie įvaizdžiai, kuriems skaičius $2j_L + 2j_R$ yra lyginis, ir tik jie nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Veilio spinorius atitinka įvaizdžiai $(\frac{1}{2}, 0)$ ir $(0, \frac{1}{2})$. Keturmačius vektorius atitinka įvaizdis $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

24.8 Literatūra

- A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples*, Princeton University Press, 2001, II skyrius, 3 skyrelis; jame yra nagrinėjami grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ baigtinės dimensijos įvaizdžiai.

Paskaita 25

Puankarė grupės įvaizdžiai ir mažosios grupės

Tikslai. *Šioje paskaitoje Puankarė grupės teigiamos energijos neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių klasifikaciją suvesime į mažąsias grupes. Masyvųjį ir baigtinio spiralingumo sektorius aprašysime išreikštiniu pavidalu. Postūmiai yra diagonalizuojami impulsais. Lorenco transformacijos perkelia impulsus jų orbitose. Orbita ir vieno jos taško stabilizatoriaus neredukuojamas unitarusis įvaizdis nusako įvaizdį unitariojo ekvivalentumo tikslumu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti grupę $\mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ ir jos veikimą impulsų erdvėje.
- Klasifikuoti impulsų orbitas ir apskaičiuoti masyviojo ir bemasio atvejų mažąsias grupes.
- Suformuluoti Makio klasifikaciją su jos prielaidomis, pritaikyti ją grupei $ax+b$ ir atskirti baigtinio spiralingumo, tolydžiojo sukinio ir nulinio impulso sektorius.
- Patikrinti masyvųjį sukinio modelį ir įvardyti žingsnius, kuriuos jis praleidžia.

25.1 Puankarė grupė kaip pusiau tiesioginė sandauga

Erdvėlaikis yra erdvė $\mathbb{R}^4$, kurios taškai yra $x = (x_0, x_1, x_2, x_3)$. Čia koordinatė x_0 yra laikas. *Minkovskio porinimas* yra apibrėžiamas formule

$$x \cdot y = x_0 y_0 - x_1 y_1 - x_2 y_2 - x_3 y_3 .$$

Lorenco transformacijos yra tiesiniai atvaizdavimai, išsaugantys šį porinimą. Tikrosios ortochroninės transformacijos sudaro grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Pridėję postūmius, gauname Puankarė grupę. Kvantinės simetrijos veikia projektyviai. Kodėl tada pereinama prie dengiančiosios grupės, paaiškinome 13-ojoje paskaitoje. Kėlimo teoremos čia neįrodinėsime. Nagrinėsime toliau sukonstruojamos dengiančiosios grupės unitariuosius įvaizdžius.

Sutapatinkime erdvę $\mathbb{R}^4$ su ermitinėmis 2×2 matricomis atvaizdavimu, apibrėžtu formule

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - i x_2 \\ x_1 + i x_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}, \qquad \det \Phi(x) = x \cdot x, \qquad \operatorname{tr} \Phi(x) = 2x_0 . \tag{25.1}$$

Apibrėžkime kiekvienam elementui $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ atvaizdavimą $\Lambda(g)\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ formule

$$\Phi(\Lambda(g)x) = g\,\Phi(x)\,g^{*}.$$

Tai yra 24-osios paskaitos konstrukcija, kurioje atvaizdavimas Φ pakeičia atvaizdavimą X, atvaizdavimas Λ pakeičia atvaizdavimą φ, o porinimas $x \cdot y$ pakeičia formą $\langle x, y\rangle$.

Lema 25.1. *Atvaizdavimas $\Lambda(g)$ yra tiesinis. Jo matricos elementai yra matricos g elementų realiųjų ir menamųjų dalių realieji polinomai. Be to, galioja lygybės $\Lambda(gg') = \Lambda(g)\Lambda(g')$ ir $\Lambda(g)x \cdot \Lambda(g)y = x \cdot y$.*

Įrodymas. Matrica $g\Phi(x)g^*$ yra ermitinė ir tiesiškai priklauso nuo vektoriaus x. Ermitinės matricos $h = (h_{ij})$ atveju vektorius $\Phi^{-1}(h)$ tiesiškai priklauso nuo matricos h. Pavyzdžiui, šio vektoriaus laiko koordinatė yra $x_0 = \frac{1}{2}(h_{11} + h_{22})$. Todėl atvaizdavimas $\Lambda(g)$ yra tiesinis. Kiekvienas matricos $g\Phi(x)g^*$ elementas yra sandaugų suma. Kiekvieną sandaugą sudaro matricos g elementas, matricos $\Phi(x)$ elementas ir kompleksiškai jungtinis matricos g elementas. Taigi atvaizdavimo $\Lambda(g)$ matricos elementai yra matricos g elementų realiųjų ir menamųjų dalių realieji polinomai.

Antrasis teiginys išplaukia iš lygybės $gg'\Phi(x)(gg')^* = g\big(g'\Phi(x)g'^*\big)g^*$. Trečiajam teiginiui įrodyti naudojame lygybę $\det(g\Phi(x)g^*) = |\det g|^2 \det\Phi(x) = x \cdot x$. Poliarizacija, t.y. tapatybė $2x \cdot y = (x+y)\cdot(x+y) - x\cdot x - y\cdot y$, duoda porinimo invariantiškumą. ∎

Pagal 24-ąją paskaitą atvaizdavimas Λ atvaizduoja grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ į visą grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ ir turi branduolį $\{\pm I\}$. Šiuo faktu remiasi paskutinis Teiginio 25.3 tvirtinimas ir teiginiai apie nusileidimą. Pati klasifikacija nuo šio fakto nepriklauso.

Apibrėžimas 25.2. Grupė $G = \mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra aibė $\mathbb{R}^4 \times \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kurioje sandauga yra apibrėžta formule

$$(a, g)(a', g') = (a + \Lambda(g)a',\ gg'). \tag{25.2}$$

Teiginys 25.3. *Grupė G yra Lie grupė, kurios dimensija yra 10. Jos neutralusis elementas yra $(0, I)$. Atvirkštiniams elementams galioja formulė $(a,g)^{-1} = (-\Lambda(g)^{-1}a,\ g^{-1})$. Postūmiai $A = \{(a, I)\} \cong \mathbb{R}^4$ sudaro uždarąjį normalųjį pogrupį. Be to, galioja lygybė*

$$(0, g)(a, I)(0, g)^{-1} = (\Lambda(g)a,\ I). \tag{25.3}$$

Atvaizdavimas $(a, g) \mapsto (a, \Lambda(g))$ yra homomorfizmas, kurio vaizdas yra visa grupė $\mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SO}^+(1,3)$ ir kurio branduolys yra $\{(0, \pm I)\}$.

Įrodymas. Svarbiausia yra patikrinti asociatyvumą. Abiejų trigubos sandaugos skliaustų išdėstymų antroji komponentė yra $gg'g''$. Jų pirmosios komponentės yra

$$a + \Lambda(g)a' + \Lambda(gg')a'' \qquad \text{ir} \qquad a + \Lambda(g)\big(a' + \Lambda(g')a''\big).$$

Jos sutampa, nes pagal Lemą 25.1 atvaizdavimas $\Lambda(g)$ yra tiesinis ir atvaizdavimas Λ yra multiplikatyvus. Nurodytas atvirkštinis elementas yra atvirkštinis iš abiejų pusių, nes

$$(a, g)(-\Lambda(g)^{-1}a, g^{-1}) = (a - a,\ I), \qquad (-\Lambda(g)^{-1}a, g^{-1})(a, g) = (-\Lambda(g)^{-1}a + \Lambda(g)^{-1}a,\ I).$$

Daugdaros $\mathbb{R}^4 \times \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ dimensija yra $4 + 6$. Pagal Lemą 25.1 daugyba yra polinominė realiosiose koordinatėse. Inversija taip pat yra polinominė, nes matrica g^{-1} yra matricos g prijungtinė matrica. Todėl grupė G yra Lie grupė. Projekcija $(a, g) \mapsto g$ yra tolydusis homomorfizmas, kurio branduolys yra A. Todėl pogrupis A yra uždaras ir normalus. Toliau

galioja lygybė $(0,g)(a,I) = (\Lambda(g)a, g)$. Padauginę ją iš dešinės iš elemento $(0,g^{-1})$, gauname lygybę (25.3). Paskutinis atvaizdavimas yra suderintas su daugybos formule (25.2), nes postūmius veikia tik transformacija $\Lambda(g)$. Jo vaizdas ir branduolys yra gaunami iš atvaizdavimo Λ vaizdo ir branduolio. ∎

Nuo šiol Puankarė grupe vadinsime grupę G. Centrinis elementas $z = (0, -I)$ yra atvaizduojamas į neutralųjį elementą.

25.2 Impulsų charakteriai ir masės paviršiai

Tegul U yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje. Pogrupio A elementams šis įvaizdis priskiria komutuojančius unitariuosius operatorius. Šie operatoriai yra sudaryti iš charakterių. Toliau pateiktą lemą įrodo Uždavinys 25.2.

> **Lema 25.4.** *Kiekvienas tolydusis homomorfizmas $\mathbb{R}^4 \to \mathrm{U}(1)$ yra lygus charakteriui, apibrėžtam formule $\chi_p(a) = e^{-ip\cdot a}$, su vienineliu vektoriumi $p \in \mathbb{R}^4$.*

Ženklas atitinka 15-osios paskaitos generatorių susitarimą. Vienmačio įvaizdžio χ_p ir postūmių generatoriaus $X = e_0$ atveju galioja lygybė $\chi_p(te_0) = e^{-itp_0}$. Taigi pagal šį susitarimą galioja lygybė $A_X = p_0$. Dydis p_0 yra energija.

Visiems šiems operatoriams kartu aprašyti naudosime projektorinį matą. Šį objektą prisimename iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 14-osios paskaitos. Ten spektrinė teorema savijungiam operatoriui priskiria projektorių $P(\Omega)$ kiekvienam jo spektro Borelio poaibiui Ω. Borelio aibės gaunamos iš atvirųjų aibių skaičiomis sąjungomis, sankirtomis ir papildiniais. Daugybos iš funkcijos x operatoriui erdvėje $L^2[0,1]$ projektorius $P(\Omega)$ yra daugyba iš aibės Ω indikatorinės funkcijos, o kiekvienam vienam taškui galioja lygybė $P(\{\lambda\}) = 0$.

Tas pats apibrėžimas tinka erdvėje $\mathbb{R}^4$. *Projektorinis matas* E erdvėje $\mathbb{R}^4$ priskiria ortogonalųjį projektorių $E(S)$ kiekvienai Borelio aibei $S \subseteq \mathbb{R}^4$. Reikalaujama, kad galiotų lygybė $E(\mathbb{R}^4) = I$ ir kad matas būtų skaičiai adityvus nesikertančioms aibėms stipriojoje operatorių topologijoje. Sakysime, kad matas E yra *sutelktas* Borelio aibėje S, kai galioja lygybė $E(S) = I$.

Cituosime vektorinių grupių *Stouno–Naimarko–Ambrouzo–Godmano (SNAG) teoremą*; žr. Berndt, *Representations of Linear Groups* (2007), skyrelį 5.2, teoremą 5.2. Stipriai tolydžiam grupės $\mathbb{R}^4$ unitariajam įvaizdžiui ši teorema duoda vienintelį projektorinį matą E erdvėje $\mathbb{R}^4$, kuriam galioja lygybė

$$U(a,I) = \int_{\mathbb{R}^4} \chi_p(a)\, dE(p).$$

Čia projektorius $E(S)$ projektuoja į tą erdvės dalį, kurioje impulsas priklauso aibei S. Vektoriui v atvaizdavimas $S \mapsto \langle v, E(S)v\rangle$ yra teigiamas Borelio matas, kurio visa masė yra $\|v\|^2$. Kai vektorius v yra vienetinis, šis matas yra impulso tikimybinis skirstinys būsenoje v, kaip to kurso 14-osios paskaitos Borno taisyklėje. Skirtingai nuo 17-osios paskaitos matų, jis gali būti lygus nuliui atvirosiose aibėse. Operatorinio integralo prasmė yra tokia: kiekvienam vektoriui v

$$\langle v, U(a,I)v\rangle = \int_{\mathbb{R}^4} \chi_p(a)\, d\langle v, E(p)v\rangle.$$

Pagal poliarizaciją šios skaliarinės tapatybės vienareikšmiškai nusako aprėžtą operatorių $U(a,I)$.

Pavyzdys 25.5 (Daugybos modelis). Tegul erdvėje $L^2(\mathbb{R}^4, d^4p)$ galioja lygybė $(U(a)\psi)(p) = e^{-ip\cdot a}\psi(p)$, o operatorius $E(S)$ funkciją ψ daugina iš aibės S indikatorinės funkcijos. Tada

$$\langle \psi, E(S)\psi\rangle = \int_S |\psi(p)|^2\, d^4p, \qquad \langle \psi, U(a)\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^4} e^{-ip\cdot a}|\psi(p)|^2\, d^4p.$$

Taigi šis matas E yra tas matas, kurį SNAG teorema priskiria įvaizdžiui U. Vieno taško Lebego matas lygus nuliui, todėl lygybė $E(\{p\}) = 0$ galioja kiekvienam taškui p. Vadinasi, šis įvaizdis Hilberto erdvėje neturi impulso tikrinio vektoriaus, nors kiekvienas vektorius turi impulso skirstinį.

Mato E *atrama* yra visų atviruųjų aibių O, kurioms galioja lygybė $E(O) = 0$, sąjungos papildinys. Kadangi erdvė $\mathbb{R}^4$ turi skaičiąją topologijos bazę, ši sąjunga yra skaiti tokių nulinių aibių sąjunga. Taigi atrama yra mažiausia uždaroji aibė F, kuriai galioja lygybė $E(F) = I$. Atramą vadinsime *postūmių spektru*.

Projektorinių matų spektrinį skaičiavimą naudosime kaip cituojamą analizės priemonę (Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, §10.1). Šis skaičiavimas apibrėžia savijungį operatorių

$$P_0 = \int_{\mathbb{R}^4} p_0\, dE(p), \qquad \mathrm{Dom}(P_0) = \left\{ v : \int_{\mathbb{R}^4} p_0^2\, d\langle v, E(p)v\rangle < \infty \right\}.$$

Pagal Stouno teoremą ir 15-osios paskaitos susitarimą šis operatorius yra atvaizdavimo $t \mapsto U(te_0, I)$ generatorius. Teigiama energija reiškia, kad galioja nelygybė $P_0 \geq 0$. Pagal spektrinį skaičiavimą ši sąlyga yra lygiavertė tam, kad matas E būtų sutelktas aibėje $\{p_0 \geq 0\}$. Impulso tikriniai vektoriai Hilberto erdvėje gali ir neegzistuoti.

Vis dėlto mechanizmą parodo formalus skaičiavimas. Jei lygybė $U(a, I)\psi = \chi_p(a)\psi$ galioja visiems vektoriams a, tai iš lygybės (25.3) gauname

$$U(a, I)U(0, g)\psi = U(0, g)\, U(\Lambda(g)^{-1}a, I)\psi = \chi_{\Lambda(g)p}(a)\, U(0, g)\psi. \tag{25.4}$$

Čia lygybė $p \cdot \Lambda(g)^{-1}a = \Lambda(g)p \cdot a$ galioja pagal Lemos 25.1 porinimo invariantiškumą. Atskiruoju atveju, jei elementas g nekeičia impulso p, tai vektorius $U(0, g)\psi$ vėl turi impulsą p. Taigi impulso p stabilizatorius veikia formalius tikrinius vektorius, kurių impulsas yra p. Perkeldami šį veikimą impulso p orbitoje, gauname visą erdvę. Tai yra indukcijos idėja. Todėl toliau pateikiamoje klasifikacijoje atsiranda stabilizatoriai.

Tas pats skaičiavimas su matu E kartu su mato E vienatinumu SNAG teoremoje duoda lygybę

$$U(0, g)E(S)U(0, g)^{-1} = E(\Lambda(g)S).$$

Todėl postūmių spektras yra invariantinis toliau apibrėžiamo veikimo atžvilgiu.

Apibrėžimas 25.6. *Masės paviršių veikimu* vadinsime grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ veikimą impulsų erdvėje $\mathbb{R}^4$, apibrėžtą formule $g \cdot p = \Lambda(g)p$. Apibrėžkime skaičiams $m, \kappa > 0$ aibes

$$X_m^{\pm} = \{p \cdot p = m^2,\ \pm p_0 > 0\}, \qquad C^{\pm} = \{p \cdot p = 0,\ \pm p_0 > 0\}, \qquad Y_\kappa = \{p \cdot p = -\kappa^2\}.$$

Teorema 25.7. *Masės paviršių veikimo orbitos yra būtent aibės $X_m^{\pm}$, $C^{\pm}$, Y_κ ir $\{0\}$.*

Įrodymas. Invariantai. Skaičius $p \cdot p$ yra invariantinis, nes pagal Lemą 25.1 transformacija $\Lambda(g)$ išsaugo porinimą. Apibrėžkime vektorių $\vec{p} = (p_1, p_2, p_3)$ ir pažymėkime jo euklidinę normą simboliu $|\vec{p}|$. Tarkime, kad galioja sąlygos $p \cdot p \geq 0$ ir $p \neq 0$. Tada galioja nelygybė $p_0^2 \geq |\vec{p}|^2$, iš kurios išplaukia sąlyga $p_0 \neq 0$. Tikrinės vertės $\mu_1 \geq \mu_2$, kurias turi matrica $\Phi(p)$, tenkina sąryšius

$$\mu_1\mu_2 = p \cdot p \geq 0, \qquad \mu_1 + \mu_2 = 2p_0.$$

Todėl nelygybė $p_0 > 0$ galioja tada ir tik tada, kai matrica $\Phi(p)$ yra teigiamai pusiau apibrėžta ir nenulinė. Atvaizdavimas $\Phi \mapsto g\Phi g^*$ išsaugo abi šias savybes, nes galioja lygybė $v^* g\Phi g^* v = (g^* v)^* \Phi(g^* v)$ ir matrica g yra apgręžiama. Todėl kiekviena išvardyta aibė yra orbitų sąjunga. Išvardytos aibės sudaro erdvės $\mathbb{R}^4$ skaidinį.

Tranzityvumas. Užrašykime matricą pavidalu $\Phi(p) = u\ \mathrm{diag}(\mu_1, \mu_2)\, u^*$, kur $u \in \mathrm{U}(2)$. Skaliarinis daugiklis $e^{i\phi}$, kuriam galioja lygybė $e^{2i\phi} \det u = 1$, perkelia matricą u į grupę $\mathrm{SU}(2)$ ir nieko nekeičia. Pasirinkime bazinius taškus

$$k_m = (m, 0, 0, 0), \qquad k = (1, 0, 0, 1), \qquad \ell_\kappa = (0, 0, 0, \kappa).$$

Jų Φ-vaizdai yra matricos $\mathrm{diag}(m, m)$, $\mathrm{diag}(2, 0)$ ir $\mathrm{diag}(\kappa, -\kappa)$. Apibrėžkime kiekvienam skaičiui $s > 0$ matricą $d_s = \mathrm{diag}(s, s^{-1})$. Tada galioja lygybė

$$d_s\ \mathrm{diag}(\alpha, \beta)\, d_s^* = \mathrm{diag}(s^2\alpha,\ s^{-2}\beta). \tag{25.5}$$

Aibėje X_m^+ galioja sąlygos $\mu_1, \mu_2 > 0$ ir $\mu_1\mu_2 = m^2$. Pasirinkime parametrą taip, kad galiotų lygybė $s^2 = \mu_1/m$. Tada galioja lygybė $s^{-2}m = \mu_2$, todėl galioja ir lygybė $p = \Lambda(ud_s)k_m$. Aibėje C^+ galioja lygybės $\mu_1 = 2p_0$ ir $\mu_2 = 0$. Pasirinkime parametrą taip, kad galiotų lygybė $s^2 = \mu_1/2$. Aibėje Y_κ galioja sąlygos $\mu_1 > 0 > \mu_2$ ir $\mu_1\mu_2 = -\kappa^2$. Pasirinkime parametrą taip, kad galiotų lygybė $s^2 = \mu_1/\kappa$. Kadangi transformacija $\Lambda(g)$ yra tiesinė, aibės X_m^- ir C^- yra taškų $-k_m$ ir $-k$ orbitos. Galiausiai taškas 0 yra fiksuotasis. ∎


Šias orbitas, praleidus vieną erdvinę koordinatę, vaizduoja 25.1 pav. Baziniai taškai k_m, k ir ℓ_κ visi tenkina lygybę $p_1 = p_2 = 0$, o jų stabilizatorius apskaičiuosime kitame skyrelyje.

Pagal formulę (25.5) transformacija $\Lambda(d_s)$ padaugina dydį $p_0 + p_3$ iš daugiklio s^2 ir dydį $p_0 - p_3$ iš daugiklio s^{-2}. Ši transformacija yra bustas (angl. *boost*) išilgai ašies x_3.

Erdvės $\mathbb{R}^4$ poaibis vadinamas *lokaliai uždaru*, kai jis yra uždarosios ir atvirosios aibių sankirta. Kiekviena orbita yra lokaliai uždara. Pavyzdžiui, aibė C^+ yra uždarosios aibės $\{p \cdot p = 0\}$ ir atvirosios aibės $\{p_0 > 0\}$ sankirta.

Invariantinės Borelio aibės $\{p \cdot p < r\}$, kur skaičius r yra racionalusis, kartu su aibėmis $\{p \cdot p \geq 0,\ p_0 > 0\}$, $\{p \cdot p \geq 0,\ p_0 < 0\}$ ir $\{0\}$ atskiria orbitas. Lokalusis uždarumas ir ši atskyrimo savybė sudaro toliau naudojamą reguliarumą.

Šios orbitos yra postūmių pogrupio dualiojoje erdvėje. Jos nėra 19-osios paskaitos kojungtinės orbitos, kurios yra visos Lie algebros dualiojoje erdvėje. Šios dvi orbitų rūšys yra susijusios. Funkcionalo apribojimas postūmiuose siurjektyviai atvaizduoja kojungtinę orbitą į vieną orbitą postūmių dualiojoje erdvėje, nes postūmiai šią dualiąją erdvę veikia trivialiai. Kadangi 19-ojoje paskaitoje $\chi_\ell = e^{i\ell}$, o čia $\chi_p = e^{-ip}$, funkcionalo ℓ apribojimas yra funkcionalas $-p$. Grupės $ax + b$ atveju šis apribojimas siurjektyviai atvaizduoja Uždavinio 19.1 pusplokštumas į 17-osios paskaitos dažnių pustieses.



25.1 pav.: Teoremos 25.7 orbitos pjūvyje $p_2 = 0$. Kiekvienas nubraižytas paviršius yra trimatės orbitos pjūvis, nes koordinatė p_2 yra praleista. Paveikslo dalyje su dviem dubenimis šie dubenys yra aibės $X_m^\pm$, o punktyrinis kūgis yra aibė $C^\pm$ be viršūnės 0. Kitoje paveikslo dalyje jungus susiaurėjantis paviršius yra aibė Y_κ aplink tą patį kūgį. Prie kiekvieno pažymėto bazinio taško parašytas jo stabilizatoriaus pavadinimas. Teigiama energija palieka viršutinį dubenį, viršutinį kūgį ir koordinačių pradžią. Ji atmeta visą aibę Y_κ, įskaitant aibės Y_κ taškus, kuriuose $p_0 > 0$.

25.3 Mažosios grupės ir Makio klasifikacija

Apibrėžimas 25.8. Taško $p \in \mathbb{R}^4$ *mažoji grupė* yra jo stabilizatorius $H_p = \{g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) : \Lambda(g)p = p\}$.

Apibrėžkime matricas, kai skaičiai tenkina sąlygas $b \in \mathbb{C}$ ir $|\lambda| = 1$:

$$n(b) = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \bar\lambda \end{pmatrix}.$$

Teiginys 25.9. *(a) Galioja lygybė $H_{k_m} = \mathrm{SU}(2)$.*

(b) Galioja lygybės $H_k = \{n(b)r(\lambda) : b \in \mathbb{C},\ |\lambda| = 1\}$ ir $r(\lambda)n(b)r(\lambda)^{-1} = n(\lambda^2 b)$.

(c) Transformacija $\Lambda(r(e^{-i\theta/2}))$ pasuka plokštumą (x_1, x_2) kampu $+\theta$ ir nekeičia koordinačių x_0 ir x_3.

(d) Galioja lygybė $H_{\ell_\kappa} = \{g : g\sigma_3 g^* = \sigma_3\} = \mathrm{SU}(1,1)$, kur žymime $\sigma_3 = \mathrm{diag}(1,-1)$. Be to, galioja lygybė $H_0 = \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$.

Įrodymas. (a) Stabilizatoriaus sąlyga yra lygybė $g(mI)g^* = mI$, t.y. $gg^* = I$.

(b) Kadangi galioja lygybė $\Phi(k) = 2e_1e_1^*$, stabilizatoriaus sąlyga yra lygybė $vv^* = e_1e_1^*$ vektoriui $v = ge_1$. Užrašykime ją matricų elementais:

$$\begin{pmatrix} |v_1|^2 & v_1\bar v_2 \\ v_2\bar v_1 & |v_2|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Todėl galioja lygybės $v_2 = 0$ ir $v_1 = \lambda$ su sąlyga $|\lambda| = 1$. Kadangi galioja lygybė $\det g = 1$, gauname

$$g = \begin{pmatrix} \lambda & w \\ 0 & \bar\lambda \end{pmatrix} = n(\lambda w)\, r(\lambda).$$

Kiekviena tokia matrica g nekeičia taško k. Jungtinimo formulę gauname, sudauginę tris matricas:

$$\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \bar\lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & b\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\bar\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & \lambda^2 b\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

(c) Jungtinimas matrica $r(\lambda)$ nekeičia matricos $\Phi(p)$ įstrižainės. Šis jungtinimas elementą p_1+ip_2 padaugina iš daugiklio $\bar\lambda^2$, kuris yra lygus $e^{i\theta}$, kai $\lambda=e^{-i\theta/2}$.

(d) Tai yra apibrėžimo performulavimas, nes galioja lygybė $\Phi(\ell_\kappa)=\kappa\sigma_3$. ∎

Teiginio (d) dalies grupė yra 23-iosios paskaitos grupė $\mathrm{SU}(1,1)$. Ji taip pat yra 24-osios paskaitos realiojo pogrupio kopija. Kiekvienas elementas $g\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ tenkina lygybę $g\sigma_2 g^T=\sigma_2$, todėl lygybė $g\sigma_2 g^*=\sigma_2$ galioja tada ir tik tada, kai matrica g yra realioji. Taigi grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra erdvinio tipo vektoriaus e_2 stabilizatorius. Keilio matrica γ iš 23-iosios paskaitos tenkina lygybę $\gamma\gamma^*=2I$, todėl matrica u, proporcinga matricai γ, priklauso grupei $\mathrm{SU}(2)$. Be to, ši matrica tenkina lygybę $\gamma\sigma_2\gamma^{-1}=-\sigma_3$, todėl $\Lambda(u)e_2=-e_3$. Vadinasi, atvaizdavimas $g\mapsto\gamma g\gamma^{-1}$ perkelia grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ į visą vektoriaus e_3 stabilizatorių, kuris yra H_{ℓ_κ}. Tai nereiškia, kad erdvinio tipo orbita yra svarbi teigiamai energijai. Tai tik sutapatina orbitos Y_κ mažosios grupės duomenis su 23-iosios paskaitos klasifikacija.

Apibrėžkime pogrupius $N=\{n(b)\}\cong\mathbb{C}$ ir $T=\{r(\lambda)\}\cong\mathrm{U}(1)$. Pagal Teiginio 25.9(b) dalies faktorizaciją galioja lygybė $H_k=N\rtimes T$. Atvaizdavimo $n(b)r(\lambda)\mapsto(b,\lambda^2)$ vaizdas yra visa plokštumos orientaciją išsaugančių euklidinių judesių grupė. Kiekvienas šios grupės elementas turi lygiai du pirmavaizdžius. Todėl pogrupį N vadinsime *mažosios grupės postūmiais*. Atvaizdavimai $\Lambda(n(b))$ yra Lorenco transformacijos, nekeičiančios taško k, o ne erdvėlaikio postūmiai. Kai $b=1$, šis atvaizdavimas yra Uždavinio 24.2 nulinis posūkis.

Galioja lygybė $r(e^{-i\theta/2})=\exp(\theta X_3)$ su matrica $X_3=-i\sigma_3/2$. Pagal Teiginio 25.9(c) dalies posūkio formulę ši matrica generuoja posūkius teigiamais kampais apie ašį x_3, kaip ir 24-ojoje paskaitoje.

Toliau pateikta teorema remiasi 17-osios paskaitos unitariąja indukcija.

Teorema 25.10 (Makis, cituojama)**.** *Tegul $G=\mathbb{R}^n\rtimes H$, kur H yra Lie grupė, kurios topologija turi skaičiąją bazę ir kuri tiesiškai bei tolydžiai veikia erdvę $\mathbb{R}^n$. Apibrėžkime kiekvienam funkcionalui $p\in(\mathbb{R}^n)^*$ charakterį formule $\chi_p(a)=e^{-ip(a)}$. Tegul grupė H veikia šiuos impulsus taip, kad galiotų lygybė $\chi_{h\cdot p}(a)=\chi_p(h^{-1}\cdot a)$. Tarkime, kad šis veikimas yra* reguliarus*: jo orbitos yra lokaliai uždaros ir jas atskiria skaitus invariantinių Borelio aibių rinkinys. Tegul H_p yra impulso p stabilizatorius. Tegul U yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis. Tegul E yra projektorinis matas erdvėje $(\mathbb{R}^n)^*$, kurį SNAG teorema priskiria postūmių atvaizdavimui $a\mapsto U(a,e)$.*

(a) Jei įvaizdis U yra neredukuojamas, tai matas E yra sutelktas vienoje orbitoje Ω.

(b) Tegul $p\in\Omega$. Tegul σ yra stipriai tolydus neredukuojamas grupės H_p unitarusis įvaizdis. Apibrėžkime įvaizdį formule $(\chi_p\otimes\sigma)(a,h)=\chi_p(a)\sigma(h)$. Tada įvaizdis $\mathrm{Ind}^G_{\mathbb{R}^n\rtimes H_p}(\chi_p\otimes\sigma)$ yra neredukuojamas. Jo matas E yra sutelktas orbitoje Ω.

(c) Kiekvienas stipriai tolydus neredukuojamas unitarusis įvaizdis, kurio matas E yra sutelktas orbitoje Ω, yra unitariai ekvivalentus vienam iš (b) dalies indukuotųjų įvaizdžių. Pasirinkus ir užfiksavus tašką $p\in\Omega$, du tokie indukuotieji įvaizdžiai yra unitariai ekvivalentūs tada ir tik tada, kai jų įvaizdžiai σ yra unitariai ekvivalentūs.

Tai yra Makio pusiau tiesioginių sandaugų metodas, išdėstytas knygoje A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations* (1976), §13. Mūsų grupės G atveju tai yra 1939 metų Vignerio klasifikacija. Mūsų erdvėlaikio grupės atveju Minkovskio porinimas sutapatina teoremos funkcionalus $p \in (\mathbb{R}^4)^*$ su anksčiau naudotais vektoriais p. Reguliarumą patikrina pastabos, pateiktos po orbitų teoremos (Teorema 25.7). Pagal formulę (25.4) dualusis veikimas išreiškiamas formule $g \cdot p = \Lambda(g)p$.

Prieš nagrinėdami dešimties dimensijų grupę, šią teoremą pritaikysime dviem mažoms grupėms iš ankstesnių paskaitų.

Pavyzdys 25.11 (Grupė $ax + b$ ir Heizenbergo grupė)**.** Grupė $ax + b$ iš 17-osios paskaitos yra $\mathbb{R} \rtimes \mathbb{R}_{>0}$, kur elementas $a > 0$ postūmius n_c veikia mastelio keitimu. Paliekame 17-osios paskaitos dažnį ξ, kuriam $\chi_\xi(n_c) = e^{i\xi c}$, todėl teoremos impulsas yra $p = -\xi$. Elementas a dažnį ξ perkelia į dažnį ξ/a. Orbitos yra $\xi > 0$, $\xi < 0$ ir $\{0\}$. Šios trys aibės yra lokaliai uždaros ir atskiria orbitas, todėl veikimas yra reguliarus.

Orbitų $\xi > 0$ ir $\xi < 0$ stabilizatorius yra trivialus. Pagal (b) dalį kiekviena iš šių orbitų duoda vieną neredukuojamą įvaizdį, indukuotą iš charakterio χ_ξ pogrupyje N. Tai yra 17-osios paskaitos įvaizdžiai Π_+ ir Π_-, todėl abu jie yra neredukuojami. Orbitos $\{0\}$ stabilizatorius yra grupė $\mathbb{R}_{>0}$. Grupės $\mathbb{R}_{>0}$ neredukuojami unitarieji įvaizdžiai yra charakteriai $a \mapsto a^{is}$, kur $s \in \mathbb{R}$. Jie duoda vienmačius įvaizdžius $(a, b) \mapsto a^{is}$. Pagal (a) ir (c) dalis tai yra visas neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių sąrašas. Atskiruoju atveju 17-osios paskaitos įvaizdis Π_0 nėra neredukuojamas. Jame postūmiai veikia trivialiai, todėl jo matas yra sutelktas aibėje $\{0\}$, o pats įvaizdis yra begalinės dimensijos.

Heizenbergo grupė iš 18-osios paskaitos taip pat yra pusiau tiesioginė sandauga. Pogrupis $A = \{(0, b, c)\}$ yra uždaroji normalioji vektorinė grupė, pogrupis $\{(a, 0, 0)\}$ yra grupės $\mathbb{R}$ kopija, ir galioja lygybė

$$(a, 0, 0)(0, b, c)(-a, 0, 0) = (0, b, c + ab).$$

Užrašykime pogrupio A charakterį pavidalu $e^{i(\mu b + \lambda c)}$. Elementas $(a, 0, 0)$ porą (μ, λ) perkelia į porą $(\mu - \lambda a, \lambda)$. Kai $\lambda \neq 0$, tiesė su šia parametro λ verte yra viena orbita, kurios stabilizatorius yra trivialus. Taigi egzistuoja lygiai vienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis, kurio centrinis charakteris yra λ. Pagal Uždavinį 18.5 tai yra Šrėdingerio įvaizdis Π_λ. Tai yra Stouno–fon Noimano teorema neredukuojamiems įvaizdžiams. Kai $\lambda = 0$, orbitos yra pavieniai taškai $(\mu, 0)$, kurių stabilizatorius yra grupė $\mathbb{R}$. Šio stabilizatoriaus charakteriai duoda 18-osios paskaitos charakterius $\chi_{\alpha,\beta}$. Visos šios orbitos yra uždaros. Jas atskiria racionalūs dydžio λ lygiai, o dydžio μ racionalūs lygiai atskiria jas tiesėje $\lambda = 0$. Taigi ir šis veikimas yra reguliarus.

Išvada 25.12. *(a) Kai $m > 0$, grupės G stipriai tolydūs neredukuojami unitarieji įvaizdžiai, kurių matas E yra sutelktas aibėje X_m^+, unitariojo ekvivalentumo tikslumu yra žymimi skaičiais $n \geq 0$. Žymė yra grupės* SU(2) *įvaizdis V_n, kurio dimensija yra $n + 1$ ir sukinys yra $n/2$.*

(b) Unitariojo ekvivalentumo tikslumu tokie įvaizdžiai, kurių matas E yra sutelktas aibėje C^+, yra žymimi grupės $H_k = N \rtimes T$ stipriai tolydžių neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių ekvivalentumo klasėmis.

Įrodymas. Sujunkime Makio teoremą (Teorema 25.10) su Teiginyje 25.9 apskaičiuotomis mažosiomis grupėmis. Masyviuoju atveju kompaktinės grupės SU(2) stipriai tolydūs neredukuojami unitarieji įvaizdžiai pagal 10-ąją paskaitą yra baigtinės dimensijos. Todėl jie yra 8-osios paskaitos įvaizdžiai V_n. ∎

25.4 Bemasiai sektoriai: spiralingumas ir tolydusis sukinys

Teiginys 25.13. *Tegul σ yra grupės H_k baigtinės dimensijos tolydus unitarusis įvaizdis erdvėje V. Tada lygybė $\sigma(n(b)) = I$ galioja visiems skaičiams b. Jei įvaizdis σ yra neredukuojamas, tai galioja lygybė $\sigma(n(b)r(\lambda)) = \lambda^\nu$ su vieninteliu skaičiumi $\nu \in \mathbb{Z}$ ir lygybė*

$$\sigma(\exp \theta X_3) = e^{-i\theta\nu/2}.$$

Įrodymas. Operatoriai $\sigma(n(b))$ yra unitarieji ir komutuoja. Todėl erdvė V yra jų bendrųjų tikrinių poerdvių tiesioginė suma. Kiekviename iš jų atvaizdavimas $b \mapsto \sigma(n(b))$ yra tolydusis grupės $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ charakteris. Kaip ir charakterių lemoje (Lema 25.4), šis charakteris turi pavidalą $b \mapsto e^{-i\,\mathrm{Re}(\bar\zeta b)}$ su vieninteliu skaičiumi $\zeta \in \mathbb{C}$. Tegul V_ζ yra skaičių ζ atitinkantis bendrasis tikrinis poerdvis. Tegul S yra baigtinė aibė skaičių ζ, kuriems galioja sąlyga $V_\zeta \neq 0$.

Tai yra pagrindinis žingsnis. Pagal Teiginio 25.9(b) dalies jungtinimo formulę galioja lygybė $n(b)r(\lambda) = r(\lambda)n(\bar\lambda^2 b)$. Paimkime vektorių $v \in V_\zeta$. Tada gauname

$$\sigma(n(b))\sigma(r(\lambda))v = \sigma(r(\lambda))\sigma(n(\bar\lambda^2 b))v = e^{-i\,\mathrm{Re}(\overline{\lambda^2\zeta}\,b)}\,\sigma(r(\lambda))v.$$

Todėl galioja lygybė $\sigma(r(\lambda))V_\zeta = V_{\lambda^2\zeta}$. Kiekvienas vienetinio modulio kompleksinis skaičius yra pavidalo λ^2. Jei koks nors skaičius $\zeta \neq 0$ priklausytų aibei S, tai visas apskritimas $|\zeta'| = |\zeta|$ būtų aibės S poaibis. Tai prieštarauja aibės baigtinumui. Todėl galioja lygybė $S = \{0\}$. Vadinasi, pogrupis N veikia trivialiai.

Tada įvaizdis σ faktorizuojasi per atvaizdavimą $n(b)r(\lambda) \mapsto \lambda$. Šis atvaizdavimas yra homomorfizmas, kurio vaizdas yra visa grupė U(1), nes galioja lygybė $n(b)r(\lambda)n(b')r(\lambda') = n(b + \lambda^2 b')r(\lambda\lambda')$. Operatoriai $\sigma(r(\lambda))$ komutuoja. Jei įvaizdis σ yra neredukuojamas, tai šių operatorių bendroji tikrinė tiesė yra invariantinė, todėl galioja lygybė $\dim V = 1$. Pagal Uždavinio 25.2(a) dalies vieno kintamojo charakterių samprotavimą atvaizdavimo $\theta \mapsto \sigma(r(e^{i\theta}))$ reikšmės yra pavidalo $e^{i\nu\theta}$ su kuriuo nors realiuoju skaičiumi ν. Iš periodiškumo kintamojo θ atžvilgiu išplaukia sąlyga $\nu \in \mathbb{Z}$. Galiausiai, kadangi galioja lygybė $\exp \theta X_3 = r(e^{-i\theta/2})$, šis elementas yra atvaizduojamas į skaičių $e^{-i\nu\theta/2}$. ∎

Palyginkime su 15-osios paskaitos generatorių susitarimu $\Pi(\exp \theta X) = \exp(-i\theta A_X)$. Posūkių apie impulso kryptį savijungiam generatoriui galioja lygybė $A_{X_3} = \nu/2$. Šis skaičius yra *spiralingumas*.

Baigtinio spiralingumo bemasiai įvaizdžiai yra įvaizdžiai, indukuoti iš įvaizdžio $\chi_k \otimes \sigma$, kur σ yra grupės H_k baigtinės dimensijos tolydus neredukuojamas unitarusis įvaizdis. Pagal Teiginį 25.13 tai yra įvaizdžiai $\mathrm{Ind}(\chi_k \otimes \sigma_\nu)$, kur $\nu \in \mathbb{Z}$ ir charakteris yra apibrėžtas formule $\sigma_\nu(n(b)r(\lambda)) = \lambda^\nu$. Kiekvienas iš jų turi tik vieną spiralingumą $\nu/2$. Šiuose įvaizdžiuose mažosios grupės postūmiai veikia trivialiai.

Pastaba 25.14. Makio teoremą (Teorema 25.10) galima taikyti ir grupei $H_k = N \rtimes T$. Grupės T orbitos pogrupio N charakterių aibėje yra aibė $\{0\}$ ir apskritimai $|\zeta| = \rho > 0$. Šios orbitos yra uždaros. Aibės $\{|\zeta| < r\}$, kur $r \in \mathbb{Q}$, kartu su aibe $\{0\}$ atskiria šias orbitas. Todėl šis veikimas yra reguliarus.

Orbita $\{0\}$ duoda įvaizdžius σ_ν. Apskritimo stabilizatorius yra grupė $\{r(\pm 1)\}$, turinti du charakterius. Šie charakteriai duoda grupės H_k begalinės dimensijos neredukuojamus įvaizdžius, kurie pogrupyje N yra netrivialūs (Uždavinys 25.7). Indukavę juos į grupę G, gauname *tolydžiojo sukinio* įvaizdžius. Jų spektrinis matas yra sutelktas aibėje C^+, todėl jų energija yra teigiama. Vien teigiamos energijos sąlyga jų neatmeta. Jie sudaro sektorių, atskirą nuo baigtinio spiralingumo sektoriaus.

Dabar tarkime, kad nenulinio įvaizdžio matas E yra sutelktas aibėje C^+. Šio mato uždaroji atrama kertasi su aibe C^+ ir dėl mato E kovariantiškumo yra invariantinė Lorenco transformacijų atžvilgiu. Tada dėl tranzityvumo visa aibė C^+ yra atramos poaibis. Iš atramos uždarumo išplaukia, kad atramai priklauso ir šios aibės ribinis taškas 0. Taigi sutelktumas orbitoje nėra tas pats, kas uždarųjų atramų lygybė.

Orbita $\{0\}$ taip pat yra atskira. Joje postūmiai veikia trivialiai. Kiekvienas stipriai tolydus neredukuojamas grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ unitarusis įvaizdis, sukomponuotas su projekcija $G \to \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, duoda šio nulinio impulso sektoriaus įvaizdį. Trivialusis įvaizdis yra įprastas vakuumo pasirinkimas. Vien teigiamos energijos sąlyga jo neišskiria.

Teigiamos energijos sąlyga atmeta aibes X_m^- ir C^-, kuriose galioja nelygybė $p_0 < 0$. Ši sąlyga atmeta ir aibę Y_κ, nes šioje orbitoje yra taškų, kuriuose $p_0 < 0$, o grupė kiekvieną jos tašką perkelia į tokius taškus. Tiksliau sakant, aibė $S = Y_\kappa \cap \{p_0 < 0\}$ yra netuščia ir santykinai atvira. Dėl tranzityvumo aibės S Lorenco transformacijų vaizdai dengia aibę Y_κ. Kadangi topologija turi skaičiąją bazę, jau skaitus šių vaizdų rinkinys dengia aibę Y_κ. Teigiamos energijos sąlyga duoda lygybę $E(S) = 0$, nes galioja sąryšis $S \subset \{p_0 < 0\}$. Tada dėl mato E kovariantiškumo kiekvienas aibės S vaizdas yra mato E nulinė aibė. Pakeitę šį skaitų denginį nesikertančių aibių denginiu ir pritaikę skaitų adityvumą, gautume lygybę $E(Y_\kappa) = 0$. Tai prieštarauja nenulinio įvaizdžio mato E sutelktumui toje orbitoje.

Lentelėje surinkti visi sektoriai. Čia skaičius $\rho > 0$ yra grupės T orbitos spindulys pogrupio N charakterių aibėje, o ženklas yra reikšmė taške $r(-1)$ charakterio, apibrėžto šios orbitos stabilizatoriuje $\{r(\pm 1)\}$.

Orbita	Bazinis taškas	Stabilizatorius	Žymės	Energija ≥ 0
X_m^+	k_m	$\mathrm{SU}(2)$	V_n, $n \geq 0$	taip
C^+, N trivialus	k	$N \rtimes T$	σ_ν, $\nu \in \mathbb{Z}$	taip
C^+, N netrivialus	k	$N \rtimes T$	$\rho > 0$ ir ženklas	taip
$\{0\}$	0	$\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$	čia neapskaičiuotos	taip
Y_κ	ℓ_κ	$\mathrm{SU}(1,1)$	žr. 23-iąją paskaitą	ne
X_m^-, C^-	$-k_m$, $-k$	kaip X_m^+, C^+	kaip X_m^+, C^+	ne

Fizikoje aibė X_m^+, kai $n = 0, 1, 2$, aprašo masyviąsias daleles, tokias kaip pionas, elektronas ir W bozonas. Aibė C^+, kai $\nu = \pm 2$, aprašo fotoną, o kai $\nu = \pm 4$, aprašo gravitoną. Nė viena žinoma dalelė neturi tolydžiojo sukinio.

25.5 Masyvusis indukuotasis modelis

Fiksuokime skaičius $m > 0$ ir $n \geq 0$. Tegul D_n yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ neredukuojamas unitarusis įvaizdis erdvėje V_n. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $\omega(\vec{p}) = \sqrt{m^2 + |\vec{p}|^2}$. Apibrėžkime matą μ_m aibėje X_m^+ formule


$$\int_{X_m^+} f \, d\mu_m = \int_{\mathbb{R}^3} f(\omega(\vec{p}), \vec{p}) \, \frac{d^3\vec{p}}{2\,\omega(\vec{p})}.$$

Daugiklis $1/\omega$ daro šį matą invariantiniu. Busto išilgai ašies x_3 atveju tai matyti iš karto. Pažymėkime $p_\perp = (p_1, p_2)$ ir užrašykime $p_3 = \sqrt{m^2 + |p_\perp|^2}\,\sinh\eta$. Tada $\omega = \sqrt{m^2 + |p_\perp|^2}\,\cosh\eta$ ir $dp_3/\omega = d\eta$. Bustas išilgai ašies x_3 nekeičia vektoriaus $p_\perp$ ir perstumia spartą η. Invariantiškumą visos grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ atžvilgiu įrodo Uždavinys 25.4.

Kiekvienam taškui $p \in X_m^+$ matrica $\Phi(p)$ yra teigiamai apibrėžta. Tegul matrica $h_p = (\Phi(p)/m)^{1/2}$ yra teigiamoji kvadratinė šaknis iš skliaustuose esančios matricos. Tada galioja lygybės $\det h_p = 1$ ir $h_p(mI)h_p^* = \Phi(p)$, todėl galioja lygybė $\Lambda(h_p)k_m = p$. *Vignerio posūkis* yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule

$$W(g,p) = h_p^{-1}\, g\, h_{\Lambda(g)^{-1}p}.$$

Pažymėkime $q = \Lambda(g)^{-1}p$. Skaitant iš dešinės, trys dauginamieji perkelia bazinį tašką k_m į tašką q, tada tašką q į tašką p, tada tašką p atgal į tašką k_m. Šią kilpą Uždavinio 25.5(e) tiksliems duomenims vaizduoja 25.2 pav.



25.2 pav.: Vignerio posūkio kilpa, kai $m = 1$ ir $g = \mathrm{diag}(2, \frac{1}{2})$. Pjūvis $p_2 = 0$ aibėje X_1^+ nubraižytas kaip grafikas virš koordinačių (p_3, p_1) plokštumos, kur $q = (\frac{713}{128}, \frac{87}{16}, 0, \frac{87}{128})$ ir $p = (\frac{6713}{512}, \frac{87}{16}, 0, \frac{6087}{512})$. Bustas h_q perkelia tašką k_1 į tašką q, bustas g perkelia tašką q į tašką p, o bustas h_p^{-1} perkelia tašką p atgal į tašką k_1. Sandauga nekeičia taško k_1, todėl ji priklauso grupei $\mathrm{SU}(2)$. Ji veikia sukinio sluoksnį V_n, kurio bazės brėžinyje nematyti.

Modelio erdvė yra $\mathcal{H}_{m,n} = L^2(X_m^+, \mu_m; V_n)$. Modelio operatoriai yra apibrėžti formule

$$(U(a,g)\psi)(p) = e^{-ip\cdot a}\, D_n\big(W(g,p)\big)\, \psi(\Lambda(g)^{-1}p). \tag{25.6}$$

Teiginys 25.15. *(a) Vignerio posūkis tenkina sąlygą $W(g,p) \in \mathrm{SU}(2)$.*

(b) Galioja lygybė $W(gg',p) = W(g,p)\,W(g',\Lambda(g)^{-1}p)$.

(c) Galioja lygybė $U((a,g)(a',g')) = U(a,g)\,U(a',g')$.

(d) Jei matas μ_m yra invariantinis transformacijų Λ atžvilgiu, tai kiekvienas operatorius $U(a,g)$ yra unitarusis.

(e) Jei $g \in \mathrm{SU}(2)$, tai galioja lygybė $W(g,p) = g$.

Įrodymas. (a) Apibrėžkime tašką $q = \Lambda(g)^{-1}p$. Tada matrica h_q perkelia tašką k_m į tašką q, matrica g perkelia tašką q į tašką p ir matrica h_p^{-1} perkelia tašką p į tašką k_m. Todėl Vignerio posūkis tenkina sąlygą $W(g,p) \in H_{k_m} = \mathrm{SU}(2)$.

(b) Su tuo pačiu tašku q galioja lygybė $W(g,p)W(g',q) = h_p^{-1} g h_q\, h_q^{-1} g' h_{\Lambda(g')^{-1}q}$. Viduriniai dauginamieji susiprastina. Be to, galioja lygybė $\Lambda(g')^{-1}q = \Lambda(gg')^{-1}p$.

(c) Pritaikykime formulę (25.6) du kartus:

$$U(a,g)U(a',g')\psi(p) = e^{-ip\cdot a}\, e^{-iq\cdot a'}\, D_n(W(g,p))\, D_n(W(g',q))\, \psi(\Lambda(g')^{-1}q).$$

Pagal Lemos 25.1 porinimo invariantiškumą galioja lygybė $q\cdot a' = p\cdot\Lambda(g)a'$, todėl fazė yra $e^{-ip\cdot(a+\Lambda(g)a')}$. Pagal (b) dalies kociklo tapatybę operatorius yra $D_n(W(gg',p))$. Argumentas yra $\Lambda(gg')^{-1}p$. Pagal formulę (25.2) ši išraiška yra lygi $U(a+\Lambda(g)a', gg')\psi(p)$.

(d) Fazės modulis yra lygus vienetui ir įvaizdis D_n yra unitarusis. Todėl

$$\|U(a,g)\psi\|^2 = \int \|\psi(\Lambda(g)^{-1}p)\|^2\, d\mu_m(p) = \|\psi\|^2.$$

Pagal (c) dalies homomorfizmo savybę operatoriaus $U(a,g)$ atvirkštinis operatorius yra $U((a,g)^{-1})$.

(e) Kai matrica g yra unitarioji, matrica gh_qg^{-1} yra teigiamai apibrėžta. Šios teigiamai apibrėžtos matricos kvadratas yra lygus $g\Phi(q)g^*/m = \Phi(p)/m$. Pagal teigiamosios kvadratinės šaknies vienatinumą galioja lygybė $gh_qg^{-1} = h_p$. Todėl galioja lygybė $W(g,p) = g$. ∎

Postūmių atveju $W(I,p) = I$, todėl operatorius $U(a,I)$ yra daugyba iš funkcijos $e^{-ip\cdot a}$. Vadinasi, kaip Pavyzdyje 25.5, šio modelio matui E operatorius $E(S)$ yra daugyba iš aibės $S\cap X_m^+$ indikatorinės funkcijos. Taigi $E(X_m^+) = I$ ir lygybė $E(\{p\}) = 0$ galioja kiekvienam taškui p. Be to, formulėje (25.6) nėra kvadratinės šaknies iš jakobiano, skirtingai nuo 17-osios paskaitos indukuotųjų įvaizdžių, nes matas μ_m yra invariantinis.

Pagal Vignerio posūkio formulę posūkių atveju (Teiginio 25.15(e) dalis) posūkių veikimas išreiškiamas formule $(U(0,u)\psi)(p) = D_n(u)\psi(\Lambda(u)^{-1}p)$. Rimties impulso k_m atveju mažoji grupė veikia per įvaizdį D_n, kuris atitinka sukinį $n/2$. Centrinis elementas veikia taip:

$$U(z) = D_n(-I) = (-1)^n I.$$

Todėl pusiau sveikasis sukinys nenusileidžia į grupę $\mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SO}^+(1,3)$. Laiko postūmis dydžiu t veikia kaip daugyba iš funkcijos e^{-itp_0}. Jo savijungis generatorius P_0 yra daugybos iš funkcijos p_0 operatorius su apibrėžimo sritimi

$$\mathrm{Dom}(P_0) = \{\psi \in \mathcal{H}_{m,n} : p_0\psi \in \mathcal{H}_{m,n}\}.$$

Kadangi nelygybė $p_0 \geq m$ galioja aibėje X_m^+, gauname nelygybę $P_0 \geq m$. Energija yra teigiama.

Sutapatinimą su unitariuoju indukuotuoju įvaizdžiu užbaigia trys žingsniai. Mato ir persipynimo skaičiavimus paliekame uždavinių lapui. Tolydumą paaiškinsime čia.

1. *Mato μ_m invariantiškumas.* Uždavinys 25.4 elementą užrašo pavidalu $g = u\, d_s\, v$, kur $u, v \in \mathrm{SU}(2)$. Posūkiai nekeičia koordinatės p_0 ir ortogonaliai veikia vektorių $\vec{p}$. Bustui d_s reikia apskaičiuoti jakobianą.

2. *Stiprusis tolydumas.* Kai funkcija ψ yra tolydi ir turi kompaktinę atramą, formulė yra tolydi kaip kintamųjų (a, g, p) funkcija. Pagal matricų funkcinį skaičiavimą teigiamoji kvadratinė šaknis h_p yra tolydi. Kai pora (a, g) priklauso kompaktinei aplinkai, transformuotos atramos yra vienos kompaktinės aibės poaibiai. Toje aibėje pointegralinės funkcijos yra tolygiai aprėžtos. Mažoruojamojo konvergavimo teorema duoda tolydumą pagal normą. Tokių funkcijų tirštumas ir operatorių unitarumas šį tolydumą išplečia visoms funkcijoms ψ.
3. *Sutapatinimas su indukcija.* Pjūvių atvaizdavimas yra apibrėžiamas formulėmis

$$f \longmapsto \psi_f, \qquad \psi_f(p) = f(0, h_p).$$

Šis atvaizdavimas perkelia įvaizdį, indukuotą iš grupės $A \rtimes \mathrm{SU}(2)$ su indukavimo duomenimis $\chi_{k_m} \otimes D_n$, į visą modelį (25.6). Persipynimą patikrina Uždavinys 25.5. Tada indukuotųjų įvaizdžių neredukuojamumas, nurodytas Makio teoremoje (Teoremos 25.10(b) dalis), rodo, kad modelis yra neredukuojamas.

Pastaba 25.16. Kaip įrodėme 24-ojoje paskaitoje, grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ netrivialūs baigtinės dimensijos įvaizdžiai neturi invariantinės skaliarinės sandaugos. Fizikoje jie žymi laukų komponentes. Apribotos grupėje SU(2), lauko, priklausančio įvaizdžiui (j_L, j_R), komponentės turi 24-osios paskaitos sukinius $|j_L - j_R|, \ldots, j_L + j_R$. Dalelės Hilberto erdvės jie neklasifikuoja. Masyviajai dalelei, kurios sukinys yra $n/2$, ši erdvė yra $\mathcal{H}_{m,n}$ ir yra sukonstruota iš grupės SU(2) unitariųjų duomenų orbitoje.

Savikontrolė

1. Ar taškas $(-1, 0, 0, 0)$ priklauso taško k_1 orbitai?
   Atsakymas. Ne. Matrica $\Phi(k_1) = I$ yra teigiamai apibrėžta, bet matrica $\Phi(-1, 0, 0, 0) = -I$ tokia nėra. Jungtinimas $\Phi \mapsto g\Phi g^*$ išsaugo teigiamumą.
2. Ar grupės H_k apibrėžiančiosios matricos erdvėje $\mathbb{C}^2$ išsaugo kurią nors skaliarinę sandaugą?
   Atsakymas. Ne. Pagal Teiginį 25.13 kiekvienas grupės H_k baigtinės dimensijos tolydus unitarusis įvaizdis pogrupyje N yra trivialus. Jei egzistuotų invariantinė skaliarinė sandauga, apibrėžiantysis įvaizdis būtų būtent toks įvaizdis. Tačiau galioja nelygybė $n(1) \neq I$.
3. Kam modelyje su parametru $n = 2$ lygūs operatorius $U(z)$ ir posūkis $W(u, p)$, kai $u \in \mathrm{SU}(2)$?
   Atsakymas. Galioja lygybė $U(z) = D_2(-I) = 1$. Lygybė $W(u, p) = u$ išplaukia iš Vignerio posūkio formulės posūkių atveju (Teiginio 25.15(e) dalis).

Santrauka

Puankarė grupės dengiančioji grupė yra $G = \mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$. Postūmiai veikia per impulsų charakterius $e^{-ip\cdot a}$. Grupė $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ perkelia impulsus atvaizdavimu Λ. Orbitos yra masės paviršiai, šviesos kūgiai, erdvinio tipo hiperboloidai ir aibė $\{0\}$. Projektorius $E(S)$ išskiria tą erdvės dalį, kurioje impulsas priklauso aibei S, o masyviajame modelyje jis yra daugyba iš indikatorinės funkcijos. Makio teorema klasifikaciją suveda į mažąsias grupes. Ji jau duoda

grupės $ax+b$ ir Heizenbergo grupės neredukuojamus unitariuosius įvaizdžius. Unitariojo ekvivalentumo tikslumu neredukuojamus unitariuosius įvaizdžius, kurių matas E yra sutelktas aibėje X_m^+, žymi grupės SU(2) sukinys $n/2$, kur $n \geq 0$. Baigtinio spiralingumo bemasiuose įvaizdžiuose mažosios grupės postūmiai veikia trivialiai. Tolydžiojo sukinio sektoriai taip pat turi teigiamą energiją ir yra atskiri. Nulinio impulso orbita $\{0\}$ duoda dar vieną atskirą sektorių.

Literatūra

- R. Berndt, *Representations of Linear Groups* (2007), skyrelis 5.2, teorema 5.2: vektorinių grupių spektrinio mato teorema.
- E. P. Wigner, *On Unitary Representations of the Inhomogeneous Lorentz Group*, Annals of Mathematics 40 (1939), 149–204. Skaitykite impulsų orbitų ir mažųjų grupių klasifikaciją.
- A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations* (1976), §13. Skaitykite indukuotųjų įvaizdžių ir Makio pusiau tiesioginių sandaugų metodo išdėstymą.

Paskaita 26

Ekvivariantinės tiesinės sluoksniuotės ir Borelio–Veilio teorema

Tikslai. *Indukuodami iš toro charakterio, 12-ojoje paskaitoje gavome be galo daug neredukuojamų įvaizdžių. Šioje paskaitoje kompleksinė struktūra iš jų išrenka vieną. Indukuotieji įvaizdžiai veikia ekvivariantines funkcijas, o tas pačias funkcijas galima laikyti vektorinės sluoksniuotės pjūviais. Projekcinės tiesės atveju holomorfinius pjūvius apskaičiuosime iki galo. Tada suformuluosime bendrąją Borelio–Veilio teoremą, tiesiogiai išnagrinėsime atvejį* SU(3) *ir įrodysime teoremą remdamiesi Peterio–Veilio teorema.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti visus sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ holomorfinius pjūvius virš tiesės $\mathbb{CP}^1$.
- Atpažinti gautąjį grupės SU(2) įvaizdį ir jo centro veikimą.
- Suformuluoti Borelio–Veilio teoremą su nurodytu sluoksniuotės charakteriu ir dualumo susitarimu ir užrašyti išreikštinius grupės SU(3) pjūvius.
- Įrodyti Borelio–Veilio teoremą remiantis Peterio–Veilio teorema ir įvardyti cituojamas prielaidas: $G = KB$, erdvės G/B kompleksinę struktūrą, charakterį χ_λ ir aukščiausiojo svorio teoremą.

26.1 Nuo ekvivariantinių funkcijų prie pjūvių

Tegul G yra Lie grupė, H yra uždarasis pogrupis ir $\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ yra tolydus baigtinės dimensijos kompleksinis įvaizdis. Pagal 3-iąją paskaitą faktorinė projekcija $G \to G/H$ yra submersija. Todėl lokaliojo pjūvio teorema (Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teorema 4.26) duoda glodų lokalųjį pjūvį šalia kiekvieno erdvės G/H taško. Dabar virš kiekvienos gretutinės klasės pritvirtinsime erdvės V kopiją.

Apibrėžimas 26.1. *Asocijuotoji vektorinė sluoksniuotė* yra

$$E = G \times_H V = (G \times V)/\!\sim, \qquad (gh, v) \sim (g, \sigma(h)v).$$

Jos projekcija yra atvaizdavimas $[g, v] \mapsto gH$. *Pjūvis* yra atvaizdavimas $s : G/H \to E$, kurio reikšmė taške x priklauso sluoksniui virš taško x. Jei $\dim V = 1$, ši sluoksniuotė vadinama *tiesine sluoksniuote*.

Kiekvienas sluoksnis yra tiesinė erdvė: pasirinkime tos gretutinės klasės elementą g ir naudokime atvaizdavimą $v \mapsto [g, v]$. Pakeitus elementą g, šis sutapatinimas sukomponuojamas su apgręžiamu tiesiniu atvaizdavimu.

Pasirinkime glodžius lokaliuosius pjūvius $s_i : U_i \to G$, kurių apibrėžimo sritys dengia erdvę G/H. Atvaizdavimas

$$U_i \times V \longrightarrow E|_{U_i}, \qquad (x, v) \longmapsto [s_i(x), v]$$

yra bijekcija, nes kiekvienas elementas g virš taško x užrašomas pavidalu $s_i(x)h$ su elementu $h \in H$. Šis atvaizdavimas kiekviename sluoksnyje yra tiesinis. Užrašykime sankirtoje $U_i \cap U_j$ lygybę $s_j(x) = s_i(x)h_{ij}(x)$. Tada to paties sluoksniuotės vektoriaus koordinatės yra susietos lygybe

$$v_i = \sigma(h_{ij})v_j.$$

Tapatybė $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$ užtikrina suderinamumą trigubose sankirtose.

Rango k *glodžioji kompleksinė vektorinė sluoksniuotė* virš daugdaros M yra glodžioji daugdara E su glodžiąja siurjekcija į daugdarą M ir kompleksinės tiesinės erdvės struktūra kiekviename sluoksnyje E_x, kuris yra taško x pirmavaizdis. Reikalaujama, kad ši sluoksniuotė lokaliai būtų sandauga. Kiekvienas daugdaros M taškas turi atvirąją aplinką U ir difeomorfizmą $E|_U \to U \times \mathbb{C}^k$, kuris kiekvieną sluoksnį E_x kompleksiškai tiesiškai atvaizduoja į visą aibę $\{x\} \times \mathbb{C}^k$. Šie difeomorfizmai yra *glodžiosios lokaliosios trivializacijos*.

Šios perėjimo funkcijos paverčia sluoksniuotę $E = G \times_H V$ glodžiąja kompleksine vektorine sluoksniuote, ir ši struktūra nepriklauso nuo pasirinktos lokaliųjų pjūvių šeimos. Priemonė yra vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lema (Lee, Lema 10.6). Jos prielaidas patikrina šios paskaitos pabaigoje esantis skyrelis „Šaltiniai ir prielaidos“.

Pjūvį lygiavertiškai galima laikyti funkcija $f : G \to V$, tenkinančia sąlygą

$$f(gh) = \sigma(h)^{-1} f(g). \tag{26.1}$$

Šią atitiktį nusako formulė $s(gH) = [g, f(g)]$. Ši atitiktis yra gerai apibrėžta, nes

$$[gh, f(gh)] = [g, \sigma(h)f(gh)] = [g, f(g)].$$

Atvirkščiai, pjūvis nusako vienintelę reikšmę $f(g)$ koordinatėse, kurias suteikia elementas g. Virš aibės U_i pjūvis yra atvaizdavimas $x \mapsto [s_i(x), f(s_i(x))]$. Lokalioji trivializacija yra difeomorfizmas, todėl pjūvis s virš aibės U_i yra glodus tada ir tik tada, kai koeficientas $f \circ s_i$ yra glodus. Be to, pjūvis s yra glodus tada ir tik tada, kai funkcija f yra glodi, o pjūvis s yra tolydus tada ir tik tada, kai funkcija f yra tolydi. Įrodymą pateikia šaltinių skyrelis.

Daugyba iš kairės apibrėžia veikimą $a[g, v] = [ag, v]$. Pjūvių erdvėje šį veikimą nusako formulė

$$(\Pi(a)s)(x) = a\, s(a^{-1}x).$$

Funkciniame aprašyme ši formulė įgauna pavidalą $(\Pi(a)f)(g) = f(a^{-1}g)$. Tai yra būtent 12-osios paskaitos kompaktinės indukcijos susitarimas.

26.2 Projekcinė tiesė ir jos du žemėlapiai

Pirmiausia viską apskaičiuosime viename pavyzdyje, o pradėsime nuo jam reikalingos holomorfinės kalbos. Funkcija, apibrėžta atvirajame erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibyje, vadinama *holomorfine*, jei ji realiąja prasme priklauso klasei C^∞ ir jos diferencialas kiekviename taške yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Polinomai yra holomorfiniai. Polinomų santykiai ten, kur vardiklis nelygus nuliui, taip pat

yra holomorfiniai. Holomorfinių atvaizdavimų kompozicija pagal grandininę taisyklę yra holomorfinė.

Kompleksinė daugdara yra Hausdorfo topologinė erdvė, kuri turi skaičiąją topologijos bazę ir yra padengta žemėlapiais. Šie žemėlapiai yra homeomorfizmai, kurių apibrėžimo sritys yra atvirosios aibės, o vaizdai yra atvirieji erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibiai. Perėjimo atvaizdavimai tarp šių žemėlapių turi holomorfines komponentes. Atvaizdavimas tarp kompleksinių daugdarų vadinamas *holomorfiniu*, jei jis yra tolydus ir jo išraiškos žemėlapiuose turi holomorfines komponentes.

Apibrėžimas 26.2. *Kompleksinė projekcinė tiesė* $\mathbb{CP}^1$ yra erdvės $\mathbb{C}^2$ vienmačių kompleksinių poerdvių aibė. Nenulinis vektorius (v_0, v_1) nusako tašką $[v_0 : v_1]$. Lygybė $[cv_0 : cv_1] = [v_0 : v_1]$ galioja visiems skaičiams $c \neq 0$.

Yra du žemėlapiai. Apibrėžkime aibėje $U_0 = \{v_0 \neq 0\}$ koordinatę $z = v_1/v_0$. Apibrėžkime aibėje $U_1 = \{v_1 \neq 0\}$ koordinatę $w = v_0/v_1$. Žemėlapių sankirtoje perėjimą tarp jų nusako lygybė $w = 1/z$.

Žemėlapiai suteikia tiesei $\mathbb{CP}^1$ topologiją. Taškai $[1 : 0]$ ir $[0 : 1]$ turi nesikertančias aplinkas $\{|z| < 1\}$ ir $\{|w| < 1\}$. Kiekviena kita taškų pora yra vieno žemėlapio srityje, todėl ši erdvė yra Hausdorfo. Šie du žemėlapiai duoda skaičiąją topologijos bazę. Kiekvienas žemėlapis yra plokštumos $\mathbb{C}$ kopija. Perėjimas $w = 1/z$ žemėlapių sankirtoje yra holomorfinis. Todėl abu žemėlapiai paverčia tiesę $\mathbb{CP}^1$ kompleksine daugdara aukščiau apibrėžta prasme.

Grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia tieses matricų daugyba. Žemėlapyje su koordinate z elemento $g = \left(\begin{smallmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{smallmatrix}\right)$ veikimą nusako formulė

$$z \longmapsto \frac{b + \bar{a}z}{a - \bar{b}z}$$

taškuose, kuriuose vardiklis nelygus nuliui. Kitų žemėlapių išraiškos yra panašios. Šios racionaliosios išraiškos rodo, kad veikimas yra glodus. Grupė veikia tranzityviai. Tai matyti iš to, kad vienetinis vektorius $v = (a, b)$ yra pirmasis stulpelis matricos

$$g_v = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2).$$

Tiesės $\mathbb{C}(1, 0)$ stabilizatorius yra

$$T = \{t_\theta = \mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})\}.$$

Pagal 3-iosios paskaitos vienalytės erdvės teoremą galioja glodžiųjų daugdarų izomorfizmas $\mathbb{CP}^1 \cong \mathrm{SU}(2)/T$. Ši tiesė yra kompaktinė, nes ji yra kompaktinės grupės vaizdas.

Tautologinės tiesinės sluoksniuotės sluoksnis yra pati tiesė:

$$\mathcal{O}(-1) = \{(\ell, v) : \ell \in \mathbb{CP}^1,\ v \in \ell\}.$$

Tautologinės sluoksniuotės dualioji sluoksniuotė yra $\mathcal{O}(1)$. Kai $m \geq 0$, tegul $\mathcal{O}(m) = \mathcal{O}(1)^{\otimes m}$. Tegul $\mathcal{O}(0)$ yra trivialioji tiesinė sluoksniuotė. Kai $m < 0$, naudokime $(-m)$-ąjį sluoksniuotės $\mathcal{O}(-1)$ tenzorinį laipsnį.


Sluoksniuotės $\mathcal{O}(-1)$ lokaliuosius reperius apibrėžia formulės $e_0(z) = (1, z)$ ir $e_1(w) = (w, 1)$. Sankirtoje galioja lygybė $e_1 = z^{-1}e_0$. Dualieji reperiai tenkina lygybę $e_1^* = ze_0^*$. Kai $m < 0$, užrašas $(e_i^*)^m$ reiškia tenzorinį laipsnį $e_i^{\otimes(-m)}$. Kadangi galioja lygybė $e_1^{\otimes(-m)} = z^m e_0^{\otimes(-m)}$, ta

pati perėjimo taisyklė galioja ir kai $m < 0$. Todėl sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ pjūvis yra funkcijų pora f_0, f_1, tenkinanti sąlygas

$$f_0(z) = z^m f_1(1/z), \qquad f_1(w) = w^m f_0(1/w). \tag{26.2}$$

Reperiai $(e_0^*)^m$ ir $(e_1^*)^m$ duoda bijekcijas $\mathcal{O}(m)|_{U_i} \to U_i \times \mathbb{C}$, tiesines kiekviename sluoksnyje. Jų perėjimas yra daugyba iš daugiklio z^m, kuris aibėje $U_0 \cap U_1$ yra glodus ir holomorfinis. Todėl pagal vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lemą (Lee, Lema 10.6) sluoksniuotė $\mathcal{O}(m)$ yra glodžioji tiesinė sluoksniuotė su šiomis trivializacijomis. Taigi pjūvį vadinsime *holomorfiniu*, kai abi funkcijos yra *sveikosios*, t.y. holomorfinės visoje plokštumoje $\mathbb{C}$. Toliau pateiktas Borelio–Veilio teoremos aptarimas rodo, kad šis apibrėžimas sutampa su asocijuotosioms sluoksniuotėms apibrėžta sąvoka. Holomorfinių pjūvių erdvę žymėsime simboliu $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(m))$. Viršutinis indeksas 0 reiškia įprastus globaliuosius pjūvius.

Kadangi $w = 1/z$, koordinatės z plokštuma, papildyta vienu tašku begalybėje, yra visa tiesė $\mathbb{CP}^1$, todėl tiesė $\mathbb{CP}^1$ yra sfera. Tegul $E_0 = (e_0^*)^m$ ir $E_1 = (e_1^*)^m$ yra du sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ reperiai. Sankirtoje jie tenkina lygybę $E_1 = z^m E_0$. Pjūvio reikšmė taške turi po vieną koeficientą kiekviename repere. Jei reperis padidėja daugikliu z^m, tai koeficientas sumažėja daugikliu z^{-m}. Tai viename taške vaizduoja 26.1 pav.



26.1 pav.: Sfera $\mathbb{CP}^1$ su tašku x, kuriame $z = 2$ ir $w = \frac{1}{2}$, ir sluoksniuotės $\mathcal{O}(1)$ sluoksnis virš taško x, nubraižytas kaip realioji tiesė. Šioje sferoje žemėlapis z neapima pietų poliaus $[0 : 1]$, o žemėlapis w neapima šiaurės poliaus $[1 : 0]$. Čia $E_1 = 2E_0$, o pjūvio reikšmė $3E_0$ turi koeficientą $f_0 = 3$ repere E_0 ir koeficientą $f_1 = \frac{3}{2}$ repere E_1.

26.3 Holomorfinių pjūvių apskaičiavimas

Iš kompleksinės analizės perimsime du rezultatus: laipsninės eilutės teoremą ir Koši įvertį. Jei funkcija f yra sveikoji, tai

$$f(z) = \sum_{k \geq 0} a_k z^k, \qquad |a_k| \leq R^{-k} \max_{|z|=R} |f(z)| \quad (R > 0).$$

Abu rezultatai yra perimti iš knygos Stein and Shakarchi, *Complex Analysis* (2003), 2 skyriaus 4 skyrelio. Tikslias jų formuluotes pateikia šaltinių skyrelis. Šiuos rezultatus galima taikyti mūsų sveikosioms funkcijoms, nes funkcija, kurios diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis, yra kompleksiškai diferencijuojama.

Teorema 26.3. *Kai $m \geq 0$, sluoksniuotės $O(m)$ holomorfiniai pjūviai natūraliai yra laipsnio m homogeniniai polinomai erdvėje $\mathbb{C}^2$. Visų pirma galioja lygybė*

$$\dim H^0(\mathbb{CP}^1, O(m)) = m + 1.$$

Kai $m < 0$, holomorfinių pjūvių erdvė yra nulinė.

Įrodymas. Tegul pora (f_0, f_1) tenkina perėjimo taisyklę (26.2). Kadangi funkcija f_1 yra aprėžta skritulyje $|w| \leq 1$, egzistuoja konstanta C, kuriai galioja nelygybė

$$|f_0(z)| \leq C|z|^m \qquad (|z| \geq 1).$$

Jei galioja skleidinys $f_0(z) = \sum a_k z^k$, tai Koši įvertis apskritime, kurio spindulys yra $R \geq 1$, duoda nelygybę $|a_k| \leq CR^{m-k}$. Tegul $R \to \infty$. Kai $k > m$, iš to išplaukia lygybė $a_k = 0$.

Jei $m \geq 0$, iš to išplaukia, kad funkcija f_0 yra ne aukštesnio kaip m laipsnio polinomas. Atvirkščiai, tinka kiekvienas toks polinomas, nes tada galioja implikacija

$$f_0(z) = \sum_{k=0}^{m} a_k z^k \quad \Longrightarrow \quad f_1(w) = \sum_{k=0}^{m} a_k w^{m-k}$$

ir gautoji funkcija yra sveikoji bei tenkina perėjimo taisyklę. Atitinkamas homogeninis polinomas yra

$$F(v_0, v_1) = \sum_{k=0}^{m} a_k v_0^{m-k} v_1^k.$$

Jo koeficientai žemėlapiuose yra $F(1, z) = f_0(z)$ ir $F(w, 1) = f_1(w)$. Šis polinomas tenkina lygybę $F(cv) = c^m F(v)$ su kiekvienu skaičiumi $c \in \mathbb{C}$, todėl jo apribojimas kiekvienoje tiesėje yra tos tiesės m-ojo dualiojo tenzorinio laipsnio elementas. Vadinasi, polinomas F yra nuo koordinačių nepriklausantis pjūvio aprašymas.

Jei $m < 0$, kiekvienas skaičius $k \geq 0$ tenkina nelygybę $k > m$, todėl visi koeficientai a_k lygūs nuliui. Tada perėjimo taisyklė duoda ir lygybę $f_1 = 0$. ∎

Kai $m = 2$, imkime funkciją, apibrėžtą formule $f_0(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$. Tada galioja lygybė $f_1(w) = a_0 w^2 + a_1 w + a_2$. Taigi homogeninis polinomas yra $F = a_0 v_0^2 + a_1 v_0 v_1 + a_2 v_1^2$.

26.4 Grupės veikimas ir jo dualusis įvaizdis

Matrica $g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ tiesiškai atvaizduoja tautologinį sluoksnį ℓ į sluoksnį $g\ell$. Šio tiesinio atvaizdavimo atvirkštinis transponuotasis atvaizdavimas atvaizduoja dualiąją tiesę ℓ^* į tiesę $(g\ell)^*$. Todėl matrica g veikia sluoksniuotę $O(1)$ ir visus jos tenzorinius laipsnius. Polinominiame aprašyme pjūvių veikimą nusako formulė

$$(\Pi_m(g)F)(v) = F(g^{-1}v). \tag{26.3}$$

Paaiškinkime šią formulę. Tiesėje ℓ transformuotasis funkcionalas įvertina vektorių $v \in \ell$, pirmiausia atitraukdamas jį į vektorių $g^{-1}v \in g^{-1}\ell$. Iš čia formulėje atsiranda atvirkštinė matrica.

Gautasis įvaizdis yra $\mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)^*$ – simetrinio tenzorinio įvaizdžio dualusis įvaizdis. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju jis pagal parengiamojo kurso aukščiausiojo svorio teoriją yra izomorfiškas įvaizdžiui V_m. Pateiksime ir tiesioginį svorių patikrinimą. Bazės elementams $F_k = v_0^{m-k}v_1^k$ galioja lygybės

$$\Pi_m(t_\theta)F_k = e^{i(2k-m)\theta}F_k, \qquad 0 \le k \le m.$$

Svoriai yra $-m, -m+2, \dots, m$. Jie sutampa su įvaizdžio V_m svoriais. Šio įvaizdžio aukščiausiasis svoris yra m ir dimensija yra $m+1$. Neredukuojamumą užtikrina kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ rezultatas apie simetrinius laipsnius.

Konkrečiam matricų skaičiavimui tegul

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad g^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Kai $m = 2$, surikiuotoje bazėje (v_0^2, v_0v_1, v_1^2) išskleidimas duoda matricą

$$D^{(2)}(g) = \begin{pmatrix} \bar{a}^2 & -\bar{a}b & b^2 \\ 2\bar{a}\bar{b} & |a|^2 - |b|^2 & -2ab \\ \bar{b}^2 & a\bar{b} & a^2 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdžiui, vidurinis stulpelis gaunamas iš sandaugos

$$(\bar{a}v_0 + \bar{b}v_1)(-bv_0 + av_1) = -\bar{a}b\,v_0^2 + (|a|^2 - |b|^2)v_0v_1 + a\bar{b}\,v_1^2.$$

Centro veikimą nusako lygybė $\Pi_m(-I) = (-1)^m I$. Taigi pjūvių veikimas nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$ tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis.

Tie patys pjūviai kompaktinėje indukcijoje

Homogeniniam polinomui F, kurio laipsnis yra $m \ge 0$, atitinkama ekvivariantinė funkcija $f_F : \mathrm{SU}(2) \to \mathbb{C}$ apibrėžiama formule $f_F(g) = F(g(1,0)^T)$. Teoremos 26.3 įrodyme polinomo F apibrėžtas pjūvis kiekvienai tiesei priskiria polinomo F apribojimą toje tiesėje. Taigi reikšmė $f_F(g)$ yra šio apribojimo reikšmė tiesę apvelkančiame vektoriuje $g(1,0)^T$. Kadangi galioja lygybė $gt_\theta(1,0)^T = e^{i\theta}g(1,0)^T$, homogeniškumas duoda lygybę

$$f_F(gt_\theta) = e^{im\theta}f_F(g).$$

Tai yra kovariantiškumo sąlyga (26.1), kai $H = T$ ir $\sigma(t_\theta) = e^{-im\theta}$. Be to, galioja lygybė

$$f_{\Pi_m(a)F}(g) = F(a^{-1}g(1,0)^T) = f_F(a^{-1}g),$$

todėl atvaizdavimas $F \mapsto f_F$ yra persipynimo operatorius tarp įvaizdžio Π_m ir pirmojo skyrelio kairiųjų postūmių veikimo, apibrėžto formule $(\Pi(a)f)(g) = f(a^{-1}g)$.

Toliau sutapatinsime visą sluoksniuotę. Tegul m yra bet koks sveikasis skaičius. Tiesėje $\mathbb{C}(1,0)$ elementas t_θ tautologinį sluoksnį veikia daugikliu $e^{i\theta}$. To sluoksnio m-ąjį dualųjį laipsnį jis veikia daugikliu $\chi_{-m}(t_\theta) = e^{-im\theta}$. Žymėkime simboliu $\mathbb{C}_{-m}$ erdvę $\mathbb{C}$, kurią pogrupis T veikia charakteriu χ_{-m}.

Tegul ε yra taške $z = 0$ paimta reperio $(e_0^*)^m$ reikšmė. Kai $m < 0$, šis reperis reiškia tenzorinį laipsnį $e_0^{\otimes(-m)}$, suderintai su lygybėmis $e_1^* = ze_0^*$ ir $e_1 = z^{-1}e_0$. Atvaizdavimas $[g,u] \mapsto g\cdot(u\varepsilon)$

iš sluoksniuotės $\mathrm{SU}(2) \times_T \mathbb{C}_{-m}$ į sluoksniuotę $O(m)$ yra gerai apibrėžtas, nes elementas t_θ vektorių ε padaugina iš daugiklio $\chi_{-m}(t_\theta)$. Šis atvaizdavimas yra $\mathrm{SU}(2)$-ekvivariantinis ir tiesinis kiekviename sluoksnyje. Kadangi grupė $\mathrm{SU}(2)$ tiesę $\mathbb{CP}^1$ veikia tranzityviai ir stabilizatorius yra T, šis atvaizdavimas yra bijektyvus. Dabar parodysime, kad jo koeficientai lokaliosiose trivializacijose yra glodūs ir niekur nelygūs nuliui.

Virš aibės U_0 naudokime glodų lokalųjį pjūvį $s(z) = g_v$, apibrėžtą projekcijai $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SU}(2)/T$, kur $v = (1, z)/\sqrt{1 + |z|^2}$. Kadangi $g_v(1, 0)^T = v$, turime

$$s(z)^{-1}(1, z)^T = \sqrt{1 + |z|^2}\,(1, 0)^T.$$

Elementas $s(z)$ funkcionalą ϕ tiesėje $\mathbb{C}(1, 0)$ atvaizduoja į funkcionalą $\phi \circ s(z)^{-1}$ tiesėje, einančioje per tašką $(1, z)$. Įvertinę taške $e_0(z) = (1, z)$, gauname $s(z) \cdot e_0^*(0) = \sqrt{1 + |z|^2}\, e_0^*(z)$. Vektoriams ta pati formulė duoda $s(z)e_0(0) = (1 + |z|^2)^{-1/2} e_0(z)$. Imdami m-uosius arba $(-m)$-uosius tenzorinius laipsnius, kiekvienam sveikajam skaičiui m gauname

$$s(z) \cdot (u\varepsilon) = u\,(1 + |z|^2)^{m/2}\,(e_0^*)^m(z).$$


Virš aibės U_1 pjūvis g_v, kur $v = (w, 1)/\sqrt{1 + |w|^2}$, tuo pačiu skaičiavimu duoda koeficientą $u(1 + |w|^2)^{m/2}$ reperio $(e_1^*)^m$ atžvilgiu.

Taigi abiejose lokaliosiose trivializacijose šis atvaizdavimas yra $u \mapsto u(1 + |x|^2)^{m/2}$, kur x yra žemėlapio koordinatė. Šis koeficientas yra glodus. Jo daugiklis $(1 + |x|^2)^{m/2}$ niekur nelygus nuliui, todėl atvirkštinis atvaizdavimas $c \mapsto c(1 + |x|^2)^{-m/2}$ taip pat yra glodus. Vadinasi, šis atvaizdavimas yra glodžiųjų tiesinių sluoksniuočių izomorfizmas

$$O(m) \cong \mathrm{SU}(2) \times_T \mathbb{C}_{-m}.$$

Todėl ekvivariantinių funkcijų aprašyme pjūvis tenkina lygybę $f(gt_\theta) = e^{im\theta} f(g)$. Teigiamas rodiklis priklauso funkcijos kovariantiškumo sąlygai. Pats sluoksnis turi neigiamą charakterį. Kai $m \geq 0$ ir F yra laipsnio m homogeninis polinomas, vektorius $g \cdot (u\varepsilon)$ įgyja reikšmę u taške $g(1, 0)^T$, kaip išplaukia iš vektoriaus ε apibrėžimo. Kai $u = f_F(g) = F(g(1, 0)^T)$, šiame vektoriuje jis sutampa su polinomu F, todėl abu pjūvio aprašymai sutampa.

Dabar galime pasakyti, ką daro holomorfiškumas. Tolydžiojo indukuotojo įvaizdžio iš 12-osios paskaitos Hilberto papildinys yra visų L^2 pjūvių erdvė sluoksniuotėje $O(m)$. Tegul $m \geq 0$. Pagal Frobenijaus abipusiškumą įvaizdis V_d šioje erdvėje pasirodo vieną kartą, kai $e^{-im\theta}$ yra įvaizdžio V_d svoris, t.y. kai $d = m, m + 2, m + 4, \ldots$. Šį sąrašą vaizduoja 26.2 pav. Pagal Teoremą 26.3 holomorfiniai pjūviai sudaro būtent pirmąjį narį V_m. Kai $m < 0$, tas pats abipusiškumas duoda įvaizdžius $V_{|m|}, V_{|m|+2}, \ldots$, o holomorfiškumas nepalieka nieko.



26.2 pav.: Grupės $\mathrm{SU}(2)$ neredukuojami įvaizdžiai L^2 pjūvių erdvėje sluoksniuotėje $O(m)$, kai $m \geq 0$. Kiekvienas taškas pasirodo vieną kartą. Apskritimu apjuostas taškas V_m yra holomorfinių pjūvių erdvė.

Fizikoje sluoksniuotė $O(m)$ yra įelektrintos dalelės sferoje aplink magnetinį monopolį sluoksniuotė. Jos du žemėlapiai yra dvi kalibruotės sritys, o holomorfiniai pjūviai yra žemiausias Landau lygmuo.

26.5 Bendroji Borelio–Veilio teorema

Dabar grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ ir jos viršutinių trikampių matricų pogrupį pakeisime kompleksine grupe G ir Borelio pogrupiu B. Šio skyrelio pabaigoje išnagrinėtas atvejis $\mathrm{SU}(2)$ rodo, kad aukščiau atliktas skaičiavimas yra pirmasis šios teoremos atvejis.

Kompleksinės daugdaros M *kompleksinis podaugdaris* yra poaibis N, turintis tokią savybę. Kiekvienas poaibio N taškas yra kurio nors daugdaros M žemėlapio srityje, kurioje poaibį N nusako kai kurių koordinačių lygybė nuliui. Likusios koordinatės duoda poaibio N žemėlapius. Todėl holomorfinis atvaizdavimas į daugdarą M, kurio reikšmės priklauso poaibiui N, yra holomorfinis ir kaip atvaizdavimas į poaibį N. Šią savybę vadinsime *riekės žemėlapio savybe* (angl. *slice-chart property*).

Kompleksinė Lie grupė yra grupė su kompleksinės daugdaros struktūra, kurios atžvilgiu daugyba ir atvirkštinio elemento ėmimas yra holomorfiniai. Tokių grupių pavyzdžiai yra 14-osios paskaitos grupės $K_{\mathbb{C}}$. Kompleksinės Lie grupės G *uždarasis kompleksinis pogrupis* yra uždarasis pogrupis, kuris kartu yra ir kompleksinis podaugdaris.

Holomorfinės sluoksniuotės. Tarkime, kad G yra kompleksinė Lie grupė, H yra uždarasis kompleksinis pogrupis ir G/H yra kompleksinė daugdara. Tarkime taip pat, kad projekcija $\pi : G \to G/H$ yra holomorfinė, įvaizdis σ yra holomorfinis ir projekcija π turi holomorfinius lokaliuosius pjūvius s_i, kurių apibrėžimo sritys U_i dengia erdvę G/H. Tada atvaizdavimas $h_{ij} = s_i^{-1}s_j$ yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į grupę G, nes grupės G operacijos yra holomorfinės. Pagal riekės žemėlapio savybę atvaizdavimas h_{ij} yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į pogrupį H. Tada atvaizdavimas $\sigma(h_{ij})$ yra holomorfinis kaip holomorfinių atvaizdavimų kompozicija. Todėl lokaliosios trivializacijos, kurias duoda pjūviai s_i, paverčia sluoksniuotę E kompleksine daugdara. Šiuo atveju sluoksniuotė E yra *holomorfinė* vektorinė sluoksniuotė. Šios trivializacijos yra jos *holomorfiniai žemėlapiai*, o sluoksniuotės E kompleksinė struktūra nepriklauso nuo šeimos (s_i). Šiuos teiginius patikrina šaltinių skyrelis. Pjūvis vadinamas *holomorfiniu*, kai kiekvienas koeficientas $f \circ s_i$ yra holomorfinis.

Pjūvis yra holomorfinis tada ir tik tada, kai jo funkcija $f : G \to V$ yra holomorfinė. Jei funkcija f yra holomorfinė, tai holomorfinė yra ir kompozicija $f \circ s_i$. Atvirkščiai, atvaizdavimas $q(g) = s_i(\pi(g))^{-1}g$ aibėje $\pi^{-1}(U_i)$ pagal riekės žemėlapio savybę yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į pogrupį H. Kovariantiškumo sąlyga (26.1) duoda lygybę

$$f(g) = \sigma\big(q(g)\big)^{-1} f\big(s_i(\pi(g))\big),$$

ir abu dauginamieji yra holomorfiniai. Todėl funkcija f yra holomorfinė kiekvienoje aibėje $\pi^{-1}(U_i)$, taigi ir visoje grupėje G.

Grupės. Tegul K yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji grupė. Jos kompleksifikacija $G = K_{\mathbb{C}}$ buvo įvesta 14-oje paskaitoje, ir ji yra jungi, nes jungi yra grupė K. Užfiksuokime maksimalųjį torą T grupėje K ir teigiamąsias šaknis. *Teigiamoji Borelio poalgebra* $\mathfrak{b}$ yra kompleksinės Kartano poalgebros ir teigiamųjų šakninių poerdvių suma. Tegul B yra grupės G jungusis Lie pogrupis, kurio Lie algebra yra ši poalgebra.

Cituosime du faktus apie šias grupes. Pirma, pogrupis B yra uždarasis, o grupės K įterpimas į grupę G indukuoja difeomorfizmą tarp erdvės K/T ir *vėliavų daugdaros* G/B (Sepanski, *Compact Lie Groups*, Lema 7.49 ir Teorema 7.50). Atskiruoju atveju

$$G = KB.$$

Antra, pogrupis B yra uždarasis kompleksinis pogrupis, o erdvė G/B yra kompleksinė daugdara su holomorfine projekcija $\pi : G \to G/B$ ir holomorfiniais lokaliaisiais pjūviais (Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, Teorema 2.11 ir jos įrodymas). Taigi pastraipą apie holomorfines sluoksniuotes galima taikyti grupei G, pogrupiui B ir erdvei G/B. Šaltinių skyrelis Sepanskio knygos matricinį grupės G modelį sutapatina su 14-osios paskaitos grupe ir įrodo, kad B yra kompleksinis pogrupis.

Charakteris. Tegul λ yra sveikasis svoris. Kadangi grupė K yra vienajungė, galioja lygybė $X^*(T) = P$ (7-oji paskaita). Tegul N_+ yra grupės G jungusis pogrupis, kurio Lie algebra yra teigiamųjų šakninių poerdvių suma. Kiekvienas elementas $b \in B$ yra vieninteliu būdu užrašomas sandauga $t\exp(iH)n$ su elementais $t \in T$, $H \in \mathfrak{t}$ ir $n \in N_+$, ir šie dauginamieji glodžiai priklauso nuo elemento b (Sepanski, Lema 7.49(d)). Mūsų svorio λ charakteris tore T yra atvaizdavimas $\exp H \mapsto e^{i\lambda(H)}$. Apibrėžkime charakterį $\chi_\lambda : B \to \mathbb{C}^\times$ formule

$$\chi_\lambda\big(\exp(H')\exp(iH)n\big) = e^{i\lambda(H')-\lambda(H)} \qquad (H, H' \in \mathfrak{t},\ n \in N_+).$$

Iš Sepanskio knygos Apibrėžimo 7.52 perimame faktą, kad ši formulė apibrėžia homomorfizmą. Formulė yra gerai apibrėžta tore $T = \exp\mathfrak{t}$, nes galioja sąryšis $\lambda \in P = X^*(T)$. Kadangi dauginamieji glodžiai priklauso nuo elemento b, homomorfizmas χ_λ yra glodus. Šis homomorfizmas yra trivialus pogrupyje N_+. Jo diferencialas taške e yra funkcionalo $i\lambda$ kompleksiškai tiesinis pratęsinys algebroje $\mathfrak{t}_\mathbb{C}$ ir nulis teigiamuosiuose šakniniuose poerdviuose, todėl šis diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Pogrupio B kairieji postūmiai yra holomorfiniai. Homomorfizmas χ_λ yra multiplikatyvus. Todėl jo diferencialas kiekviename taške yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Vadinasi, homomorfizmas χ_λ yra holomorfinis.

Sluoksniuotė. Apibrėžkime sluoksniuotę

$$L_\lambda = G \times_B \mathbb{C}_{-\lambda}, \qquad (gb, u) \sim (g, \chi_\lambda(b)^{-1}u).$$

Pjūviai atitinka funkcijas, tenkinančias sąlygą

$$f(gb) = \chi_\lambda(b)f(g). \tag{26.4}$$

Pjūvis yra holomorfinis tada ir tik tada, kai jo funkcija $f : G \to \mathbb{C}$ yra holomorfinė. Kairieji postūmiai veikia kaip anksčiau. Žymėkime simboliu $H^0(G/B, L_\lambda)$ sluoksniuotės L_λ holomorfinių pjūvių erdvę.

Teorema 26.4 (Borelio–Veilio teorema)**.** *Taikant ankstesnius teigiamojo Borelio pogrupio ir sluoksniuotės susitarimus, jei λ yra dominantinis sveikasis svoris, tai galioja izomorfizmas*

$$H^0(G/B, L_\lambda) \cong V_\lambda^*$$


tarp K-įvaizdžių. Šis įvaizdis yra baigtinės dimensijos ir neredukuojamas. Jei sveikasis svoris λ nėra dominantinis, tai galioja lygybė $H^0(G/B, L_\lambda) = 0$.

Toliau pateiktas įrodymas remiasi aukščiau cituotais faktais apie pogrupį B, charakterį χ_λ ir erdvę G/B, visų pirma lygybe $G = KB$. Jis taip pat remiasi 14-osios paskaitos holomorfiniu pratęsiniu ir parengiamojo kurso aukščiausiojo svorio teorema. Visa kita išplaukia iš Peterio–Veilio teoremos.

Dualusis įvaizdis V_λ^* turi aukščiausiąjį svorį $-w_0\lambda$. Čia w_0 yra ilgiausias Veilio grupės elementas, t.y. elementas, kuris teigiamąsias šaknis atvaizduoja į neigiamąsias. Grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju elementas $-w_0$ apverčia Dynkino žymių tvarką. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju $-w_0\lambda = \lambda$, todėl ten dualumo nematyti.

Atvejis $\mathrm{SU}(3)$: tiesioginis skaičiavimas

Čia $G = \mathrm{SL}(3,\mathbb{C})$, o pogrupį B sudaro viršutinės trikampės matricos. *Vėliava* yra tiesė ℓ, esanti plokštumoje P erdvėje $\mathbb{C}^3$. Vieną vėliavą vaizduoja 26.3 pav. Grupė G perkelia vėliavas, o pogrupis B yra standartinės vėliavos $\mathbb{C}e_1 \subset \mathbb{C}e_1 \oplus \mathbb{C}e_2$ stabilizatorius. Grupė $K = \mathrm{SU}(3)$ jau veikia vėliavas tranzityviai, o stabilizatorius yra diagonalusis toras T. Taigi $K/T = G/B$ yra vėliavų erdvė.



26.3 pav.: Vėliava $\ell \subset P$ erdvėje $\mathbb{C}^3$, nubraižyta schematiškai: kompleksinė tiesė ℓ ir kompleksinė plokštuma P pavaizduotos kaip realioji tiesė realiojoje plokštumoje.

Pavyzdys 26.5 (Grupės SU(3) pjūviai)**.** Tegul $\lambda = a\omega_1 + b\omega_2$, kur $a, b \geq 0$ yra sveikieji skaičiai, ir tegul β žymi viršutinę trikampę grupės G matricą. Charakteris yra trivialus unipotentinėms matricoms. Tore funkcionalas ω_1 yra pirmasis įstrižainės elementas, o funkcionalas ω_2 yra pirmųjų dviejų elementų sandauga. Todėl

$$\chi_\lambda(\beta) = \beta_{11}^{a+b}\beta_{22}^{b}.$$

Imkime tiesinį funkcionalą Φ erdvėje $\mathbb{C}^3$ ir apibrėžkime $f(g) = \Phi(ge_1)$. Kadangi $(g\beta)e_1 = \beta_{11}ge_1$, gauname $f(g\beta) = \beta_{11}f(g)$. Taigi funkcija f yra pjūvis porai $(a,b) = (1,0)$. Šie pjūviai sudaro erdvę $(\mathbb{C}^3)^*$, t.y. įvaizdžio $V_{(1,0)} = \mathbb{C}^3$ dualųjį įvaizdį, kaip teigia teorema.

Toliau imkime tiesinį funkcionalą Ψ erdvėje $\Lambda^2\mathbb{C}^3$ ir apibrėžkime $f(g) = \Psi(ge_1 \wedge ge_2)$. Kadangi $(g\beta)e_1 \wedge (g\beta)e_2 = \beta_{11}\beta_{22}\, ge_1 \wedge ge_2$, ši funkcija f yra pjūvis porai $(0,1)$. Šie pjūviai sudaro įvaizdžio $V_{(0,1)} = \Lambda^2\mathbb{C}^3$ dualųjį įvaizdį.

Sandauga a pjūvių porai $(1,0)$ ir b pjūvių porai $(0,1)$ yra pjūvis porai (a,b). Šios sandaugos nebūtinai yra tiesiškai nepriklausomos. Porai $(1,1)$ devynios vektoriaus ge_1 koordinačių ir vektoriaus $ge_1 \wedge ge_2$ koordinačių sandaugos tenkina vieną sąryšį, nes $ge_1 \wedge (ge_1 \wedge ge_2) = 0$. Jos apvelka aštuonmatį jungtinio modulio dualųjį modulį.

Borelio–Veilio teoremos įrodymas

Įrodymas. Pjūvius sukonstruosime iš modulio V_λ, o paskui parodysime, kad kitų pjūvių nėra. Visame įrodyme R_X žymi funkcijos φ grupėje K išvestinę išilgai dešiniojo postūmio elementu

$\exp tX$:

$$(R_X\varphi)(k) = \left.\frac{d}{dt}\right|_0 \varphi(k\exp tX), \qquad X \in \mathfrak{k}.$$

Ją kompleksiškai tiesiškai pratęsiame elementams $Z \in \mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g}$, imdami $R_{X+iY} = R_X + iR_Y$.

Žingsnis 1: pjūviai iš modulio V_λ. Tegul svoris λ yra dominantinis. Modulis V_λ, kurio aukščiausiasis svoris yra λ, egzistuoja pagal parengiamojo kurso aukščiausiojo svorio teoremą ir 4-osios paskaitos integravimo teoremą. Pagal 14-ąją paskaitą jis pratęsiamas iki holomorfinio grupės G įvaizdžio. Tegul v_λ yra aukščiausiojo svorio vektorius. Žymėkime šį įvaizdį simboliu Π_λ. Poalgebroje $\mathfrak{b}$ operatorius $d\Pi_\lambda(Z)$ vektorių v_λ veikia skaliaru $d\chi_\lambda(Z)$: šis skaliaras yra $i\lambda(H)$, kai $H \in \mathfrak{t}$, ir nulis teigiamuosiuose šakniniuose poerdviuose. Todėl atvaizdavimai $b \mapsto \Pi_\lambda(b)v_\lambda$ ir $b \mapsto \chi_\lambda(b)v_\lambda$ sutampa aibėje $\exp\mathfrak{b}$, taigi ir jungiojoje grupėje B:

$$\Pi_\lambda(b)v_\lambda = \chi_\lambda(b)v_\lambda.$$

Kai $\xi \in V_\lambda^*$, apibrėžkime $f_\xi(g) = \xi(\Pi_\lambda(g)v_\lambda)$. Ši funkcija yra holomorfinė ir

$$f_\xi(gb) = \xi(\Pi_\lambda(g)\Pi_\lambda(b)v_\lambda) = \chi_\lambda(b)f_\xi(g).$$

Taigi funkcija f_ξ yra sluoksniuotės L_λ holomorfinis pjūvis.

Žingsnis 2: dualusis įvaizdis. Kairysis postūmis elementu a duoda

$$f_\xi(a^{-1}g) = \xi(\Pi_\lambda(a)^{-1}\Pi_\lambda(g)v_\lambda) = f_{\xi\circ\Pi_\lambda(a)^{-1}}(g).$$

Taigi atvaizdavimas $\xi \mapsto f_\xi$ yra dualiojo įvaizdžio ir pjūvių veikimo persipynimo operatorius. Dėl šios priežasties atsiranda dualusis įvaizdis: pjūvis tiesiškai priklauso nuo funkcionalo ξ, o kairysis postūmis veikia funkcionalą ξ. Šis atvaizdavimas yra injektyvus. Jei $f_\xi = 0$, tai funkcionalas ξ lygus nuliui visuose vektoriuose $\Pi_\lambda(g)v_\lambda$. Šie vektoriai apvelka modulį V_λ, nes jis yra neredukuojamas, todėl $\xi = 0$.

Žingsnis 3: lygtys grupėje K. Dabar tegul λ yra bet koks sveikasis svoris, o f yra holomorfinė grupėje G funkcija, tenkinanti kovariantiškumo sąlygą (26.4). Tegul $\varphi = f|_K$ yra jos apribojimas, glodi funkcija grupėje K. Kai $Z \in \mathfrak{g}$,

$$(R_Z\varphi)(k) = \left.\frac{d}{dt}\right|_0 f(k\exp tZ),$$

nes holomorfinės funkcijos f diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Šioje vietoje naudojamas holomorfiškumas. Glodi funkcija grupėje K, kuri yra kovariantinė tik pogrupio T atžvilgiu, netenkintų antrosios toliau pateiktos lygties. Kai $Z \in \mathfrak{b}$, kovariantiškumo sąlyga duoda $f(k\exp tZ) = e^{t\,d\chi_\lambda(Z)}f(k)$. Todėl

$$R_H\varphi = i\lambda(H)\varphi \quad (H \in \mathfrak{t}), \qquad R_E\varphi = 0 \quad (E \text{ teigiamajame šakniniame poerdvyje}). \tag{26.5}$$

Žingsnis 4: po vieną bloką. Tegul Π yra neredukuojamas unitarusis grupės K įvaizdis, o P_Π yra 11-osios paskaitos izotipinis projektorius. Jis yra kairiųjų postūmių integralas:

$$(P_\Pi\varphi)(x) = d_\Pi \int_K \chi_\Pi(y)\,\varphi(y^{-1}x)\,dy.$$

Čia χ_Π yra įvaizdžio Π charakteris. Išvestinė $R_X\varphi$ yra tolydi kompaktinėje grupėje K, todėl galime diferencijuoti po integralo ženklu, ir $R_ZP_\Pi\varphi = P_\Pi R_Z\varphi$, kai $Z \in \mathfrak{g}$. Taigi funkcija $P_\Pi\varphi$ taip pat tenkina lygtis (26.5).

Funkcija $P_\Pi\varphi$ priklauso koeficientų blokui M_Π. Tegul (ξ_i) yra erdvės V_Π^* bazė. Tada

$$(P_\Pi\varphi)(k) = \sum_i \xi_i(\Pi(k)v_i), \qquad v_i \in V_\Pi,$$

ir išdiferencijavę gauname $(R_Z P_\Pi\varphi)(k) = \sum_i \xi_i(\Pi(k)d\Pi(Z)v_i)$. Pagal Šūro ortogonalumą (5-oji paskaita) matriciniai koeficientai yra tiesiškai nepriklausomi: suma $\sum_i \xi_i(\Pi(k)w_i)$ visiems k lygi nuliui tik tada, kai visi vektoriai $w_i = 0$. Todėl iš lygčių (26.5) gauname

$$d\Pi(H)v_i = i\lambda(H)v_i, \qquad d\Pi(E)v_i = 0.$$

Taigi kiekvienas nenulinis vektorius v_i yra svorio λ aukščiausiojo svorio vektorius neredukuojamame modulyje V_Π. Pagal parengiamojo kurso aukščiausiojo svorio teoremą, jei kuris nors vektorius $v_i \neq 0$, tai svoris λ yra dominantinis ir $\Pi \cong V_\lambda$. Jo aukščiausiojo svorio tiesė yra vienmatė, todėl $v_i = c_i v_\lambda$ ir

$$(P_\Pi\varphi)(k) = \xi(\Pi(k)v_\lambda), \qquad \xi = \sum_i c_i\xi_i.$$

Kiekvienam kitam įvaizdžiui Π gauname $P_\Pi\varphi = 0$.

Žingsnis 5: pilnumas. Nepadarėme prielaidos, kad funkcija φ yra baigtinė koeficientų suma. Peterio–Veilio teorema, 11-osios paskaitos Planšerelio teoremos pavidalu, teigia, kad funkcijų $P_\Pi\varphi$ sumos konverguoja į funkciją φ erdvėje $L^2(K)$. Pagal 4 žingsnį ne daugiau kaip vienas narys yra nenulinis. Taigi funkcija φ lygi tam nariui erdvėje $L^2(K)$, o abi funkcijos yra tolydžios, todėl jos sutampa grupėje K. Jei svoris λ nėra dominantinis, tai $\varphi = 0$. Jei svoris λ yra dominantinis, tai $\varphi = f_\xi|_K$ su kuriuo nors funkcionalu ξ.

Galiausiai $G = KB$, o kovariantiškumo sąlyga funkciją grupėje G nusako pagal jos apribojimą grupėje K. Todėl $f = 0$, kai svoris λ nėra dominantinis, ir $f = f_\xi$, kai svoris λ yra dominantinis. Kartu su 2 žingsniu tai duoda $H^0(G/B, L_\lambda) \cong V_\lambda^*$. Neredukuojamo modulio dualusis modulis yra neredukuojamas. ∎

Atvejis SU(2)

Kai $K = \mathrm{SU}(2)$, grupė G yra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ (14-oji paskaita). Pogrupis B yra grupės G viršutinių trikampių matricų pogrupis. Charakterį nusako formulė

$$\chi_m(b) = c^m, \qquad b = \begin{pmatrix} c & \beta \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix} \in B.$$

Šis charakteris yra trivialus unipotentinėms matricoms, kurioms galioja lygybė $c = 1$. Įstrižainėms matricoms jis yra atvaizdavimas $\mathrm{diag}(c, c^{-1}) \mapsto c^m$, t.y. svorio m charakteris. Sluoksnis virš tiesės $\mathbb{C}(1,0)$ transformuojasi daugyba iš daugiklio c^{-m}. Atvaizdavimas $gB \mapsto [g(1,0)^T]$ sutapatina erdvę G/B su tiese $\mathbb{CP}^1$. Pagrįskime tai. Grupė G tranzityviai veikia tieses, nes jas tranzityviai veikia jau grupė $\mathrm{SU}(2)$. Be to, pogrupis B yra tiesės $\mathbb{C}(1,0)$ stabilizatorius.

Dabar abi pjūvių erdves palyginsime tiesiogiai. Tegul funkcija f yra holomorfinė grupėje G ir tenkina lygybę $f(gb) = \chi_m(b)f(g)$. Charakteris yra trivialus unipotentiniams elementams

b, todėl funkcija f priklauso tik nuo pirmojo stulpelio $v = g(1,0)^T$. Apibrėžkime $F(v) = f(g)$. Aibėse $\{v_0 \neq 0\}$ ir $\{v_1 \neq 0\}$ lokalieji pjūviai

$$v \longmapsto \begin{pmatrix} v_0 & 0 \\ v_1 & 1/v_0 \end{pmatrix}, \qquad v \longmapsto \begin{pmatrix} v_0 & -1/v_1 \\ v_1 & 0 \end{pmatrix}$$

turi vienetinį determinantą ir holomorfinius elementus. Todėl funkcija F yra holomorfinė aibėje $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$. Be to, lygybė $F(cv) = c^m F(v)$, kai $c \neq 0$, išplaukia iš charakterio reikšmės elementui $\operatorname{diag}(c, c^{-1})$. Vadinasi, funkcijos $f_0(z) = F(1,z)$ ir $f_1(w) = F(w,1)$ yra sveikosios ir tenkina perėjimo taisyklę (26.2). Pagal Teoremą 26.3, kai $m \geq 0$, egzistuoja homogeninis polinomas, vėl žymimas F, kurio laipsnis yra m ir kuris turi šiuos du koeficientus, todėl $f = f_F$. Kai $m < 0$, ta pati teorema duoda $f_0 = f_1 = 0$, todėl $f = 0$. Atvirkščiai, kiekviena funkcija $f_F(g) = F(g(1,0)^T)$ yra holomorfinė ir kovariantinė.

Taigi atvaizdavimas $F \mapsto f_F$ yra izomorfizmas $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(m)) \cong H^0(G/B, L_m)$ tarp $\mathrm{SU}(2)$-įvaizdžių, kai $m \geq 0$. Kai $m < 0$, abi erdvės yra nulinės. Vadinasi, mūsų išreikštinis skaičiavimas yra būtent Borelio–Veilio teoremos atvejis, kai grupė yra $\mathrm{SU}(2)$. Įrodymo 1 žingsnyje modulis $V_m = \operatorname{Sym}^m \mathbb{C}^2$ turi aukščiausiojo svorio vektorių $e_1^{\otimes m}$, kur $e_1 = (1,0)^T$. Todėl $f_\xi(g) = \xi((ge_1)^{\otimes m})$, o tai yra funkcija f_F polinomui $F(v) = \xi(v^{\otimes m})$.

Savikontrolė

1. Kas negerai, jei bet kurią sveikąją funkciją f_0 pasirenkame kaip sluoksniuotės $\mathcal{O}(1)$ pjūvį?

Atsakymas. Koeficientas, išreiškiamas formule $f_1(w) = w f_0(1/w)$, taip pat turi būti holomorfiškai pratęsiamas į tašką $w = 0$. Dėl to funkcijos f_0 laipsnis turi būti ne didesnis kaip vienetas.

2. Koks įvaizdis gaunamas erdvėje $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(3))$?

Atsakymas. Tai yra įvaizdis $\operatorname{Sym}^3(\mathbb{C}^2)^* \cong V_3$, kurio dimensija yra keturi ir sukinys yra $3/2$. Centrinis elementas $-I$ veikia daugyba iš skaliaro $(-1)^3 = -1$, todėl šis įvaizdis nenusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$.

3. Ar sluoksniuotė L_λ pagal mūsų bendrąjį susitarimą visada duoda aukščiausiąjį svorį λ?

Atsakymas. Ne. Jos pjūvių erdvė yra įvaizdis V_λ^*, kurio aukščiausiasis svoris yra $-w_0\lambda$, kur w_0 yra ilgiausias Veilio grupės elementas. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju šie svoriai sutampa. Grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju elementas $-w_0$ apverčia Dynkino žymių tvarką, todėl grupei $\mathrm{SU}(3)$ sluoksniuotė $L_{(1,0)}$ duoda aukščiausiąjį svorį $(0,1)$.

Santrauka

Ekvivariantinės funkcijos atitinka asocijuotųjų sluoksniuočių pjūvius. Virš tiesės $\mathbb{CP}^1$, kai $m \geq 0$, sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ perėjimo taisyklė sutapatina holomorfinius pjūvius su laipsnio m homogeniniais polinomais. Kompaktinė indukcija turi įvaizdžius $V_m, V_{m+2}, \ldots$, o holomorfiškumas palieka tik įvaizdį V_m. Kai grupė K yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau

paprastoji, Borelio–Veilio teorema duoda $H^0(G/B, L_\lambda) \cong V_\lambda^*$ dominantiniam sveikajam svoriui λ, o kitais atvejais duoda nulį. Šią teoremą įrodėme remdamiesi Peterio–Veilio teorema. Kovariantiškumas ir holomorfiškumas kiekvieno koeficientų bloko vektorius paverčia svorio λ aukščiausiojo svorio vektoriais, todėl lieka tik vienas blokas. Faktai $G = KB$, erdvės G/B kompleksinė struktūra, charakteris χ_λ ir aukščiausiojo svorio teorema lieka cituojami. Grupės SU(3) atveju pirmojo stulpelio ir išorinės sandaugos koordinatės duoda išreikštinius pjūvius.

Šaltiniai ir prielaidos

Šiame skyrelyje surinkta tai, ką cituoja pagrindinis dėstymas, kartu su prielaidų patikrinimais ir susitarimų suderinimu. Tolesnis dėstymas nepriklauso nuo tvarkos, kuria šis skyrelis skaitomas.

Asocijuotųjų sluoksniuočių glodžioji struktūra. Parodysime, kad sluoksniuotė $E = G \times_H V$ yra glodžioji kompleksinė vektorinė sluoksniuotė. Lokalieji pjūviai s_i yra glodūs, todėl atvaizdavimai $h_{ij} = s_i^{-1} s_j$ yra glodūs kaip atvaizdavimai į grupę G. Jų reikšmės priklauso įdėtajam pogrupiui H, todėl šie atvaizdavimai yra glodūs kaip atvaizdavimai į pogrupį H pagal reikšmių srities apribojimo rezultatą įdėtiesiems podaugdariams [C: Lee, Išvada 5.30]. Įvaizdis σ yra glodus pagal 3-iosios paskaitos automatinio glodumo teoremą. Todėl perėjimo funkcijos $\sigma(h_{ij})$ yra glodžios. Tegul $k = \dim V$. Pasirinkime erdvės V bazę ir laikykime erdvę $\mathbb{C}^k$ erdve $\mathbb{R}^{2k}$. Tada kiekvienas sluoksniuotės E sluoksnis yra realioji tiesinė erdvė, kurios dimensija yra $2k$. Operatorių $\sigma(h_{ij})$ realiosios matricos yra glodūs atvaizdavimai į grupę $\mathrm{GL}(2k, \mathbb{R})$. Šiems realiesiems duomenims galima taikyti vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lemą [C: Lee, Lema 10.6]. Ši lema suteikia sluoksniuotei E vienintelę topologiją ir glodžiąją struktūrą, kurių atžvilgiu aukščiau aprašytų atvaizdavimų atvirkštiniai atvaizdavimai yra glodžiosios lokaliosios trivializacijos. Šie atvaizdavimai sluoksniuose yra kompleksiškai tiesiniai, todėl sluoksniuotė E yra glodžioji kompleksinė vektorinė sluoksniuotė.

Ši struktūra nepriklauso nuo pasirinktos lokaliųjų pjūvių šeimos. Antrajai šeimai (s'_j) atvaizdavimai $s_i^{-1} s'_j$ yra glodūs kaip atvaizdavimai į pogrupį H pagal tą patį reikšmių srities apribojimo argumentą. Todėl mišriosios perėjimo funkcijos $\sigma(s_i^{-1} s'_j)$ yra glodžios. Vadinasi, žemėlapių lemą galima taikyti abiejų šeimų sąjungai. Pagal šios lemos vienatinumo dalį sąjunga duoda tą pačią struktūrą kaip ir kiekviena šeima atskirai.

Kovariantinių funkcijų reguliarumas. Jei funkcija f yra glodi, tai kiekviena kompozicija $f \circ s_i$ yra glodi. Atvirkščiai, tarkime, kad kiekviena kompozicija $f \circ s_i$ yra glodi. Žymėkime projekciją simboliu $\pi : G \to G/H$ ir apibrėžkime atvaizdavimą formule

$$q(g) = s_i(\pi(g))^{-1} g \qquad (g \in \pi^{-1}(U_i)).$$

Šis atvaizdavimas yra glodus kaip atvaizdavimas į grupę G ir jo reikšmės priklauso pogrupiui H, todėl pagal tą patį reikšmių srities apribojimo rezultatą jis yra glodus kaip atvaizdavimas į įdėtąjį pogrupį H. Kadangi galioja lygybė $g = s_i(\pi(g)) q(g)$, kovariantiškumo sąlyga (26.1) duoda lygybę

$$f(g) = \sigma\big(q(g)\big)^{-1} f\big(s_i(\pi(g))\big).$$

Todėl funkcija f yra glodi kiekvienoje atvirojoje aibėje $\pi^{-1}(U_i)$, taigi ir visoje grupėje G. Tas pats argumentas, kuriame glodumą pakeičia tolydumas, rodo, kad pjūvis s yra tolydus tada ir tik tada, kai funkcija f yra tolydi.

Holomorfinės atvirkštinės funkcijos. Tegul Φ yra atvaizdavimas tarp atviųjų erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibių, kurio komponentės yra holomorfinės ir kurio diferencialas viename taške yra apgręžiamas. Realioji atvirkštinės funkcijos teorema duoda glodų lokalųjį atvirkštinį atvaizdavimą. Jo diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinio atvaizdavimo atvirkštinis atvaizdavimas, todėl šis diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Taigi lokalusis atvirkštinis atvaizdavimas yra holomorfinis. Tai yra *holomorfinė atvirkštinės funkcijos teorema*.

Holomorfinės sluoksniuotės. Dirbame pagrindinio dėstymo pastraipos apie holomorfines sluoksniuotes sąlygomis. Jei $g = s_i(x)h$, tai kompozicija $R_h \circ s_i$ yra holomorfinis, taigi ir glodus, lokalusis pjūvis, einantis per elementą g, nes galioja lygybė $\pi \circ R_h = \pi$. Pagal lokaliojo pjūvio teoremą (Lee, Teorema 4.26) projekcija π yra glodžioji submersija.

Erdvės G/H topologija yra faktorinė topologija. Pagrįskime tai. Projekcija π yra tolydi, nes ji yra holomorfinė. Atvirkščiai, tegul $U \subset G/H$ yra tokia aibė, kad aibė $\pi^{-1}(U)$ yra atviroji. Tada aibė $U \cap U_i = s_i^{-1}(\pi^{-1}(U))$ yra atviroji su kiekvienu indeksu i, nes galioja lygybė $\pi \circ s_i = \mathrm{id}$. Aibės U_i dengia erdvę G/H, todėl aibė U yra atviroji. Pagal 3-iosios paskaitos faktorinės struktūros vienatinumą kompleksinės daugdaros G/H pagrindinė glodžioji struktūra yra faktorinė glodžioji struktūra.

Tegul φ yra holomorfinis erdvės G/H žemėlapis, kurio apibrėžimo sritis yra aibės U_i poaibis. Virš šios srities atvaizdavimas $[s_i(x), v] \mapsto (\varphi(x), v)$ yra sluoksniuotės E žemėlapis. Čia erdvė V yra sutapatinta su erdve $\mathbb{C}^k$, pasirinkus bazę. Perėjimas tarp dviejų tokių žemėlapių yra pavidalo $(y, u) \mapsto (\psi(y), A(y)u)$. Čia ψ yra erdvės G/H perėjimo atvaizdavimas. Matrica $A(y)$ yra operatoriaus $\sigma(h_{ij})$ matrica taške, kurio koordinatė yra y. Matricos A elementai yra holomorfiniai, todėl šis perėjimas yra holomorfinis. Vadinasi, šie žemėlapiai paverčia sluoksniuotę E kompleksine daugdara. Antrajai šeimai (s'_j), sudarytai iš holomorfinių lokaliųjų pjūvių, mišrieji žemėlapių pakeitimai turi tokį patį pavidalą su operatoriais $\sigma(s_i^{-1}s'_j)$, kurie pagal riekės žemėlapio savybę yra holomorfiniai. Vadinasi, abi šeimos duoda vieną holomorfinį atlasą. Taigi sluoksniuotės E kompleksinė struktūra nepriklauso nuo šeimos.

Kompleksinė analizė. [C: Stein and Shakarchi, *Complex Analysis*, 2003, 2 skyrius, 4 skyrelis]. Teorema 4.4 ir po jos einanti pastraipa teigia, kad sveikąją funkciją galima išskleisti laipsnine eilute su centru taške 0, kuri konverguoja visoje plokštumoje $\mathbb{C}$ ir kurios koeficientus nusako formulė $a_k = f^{(k)}(0)/k!$. Koši nelygybės (Išvada 4.3) teigia, kad

$$|f^{(k)}(0)| \le k! R^{-k} \max_{|z|=R} |f(z)|.$$

Padaliję iš faktorialo $k!$, gauname koeficiento a_k įvertį.

Grupės $K_{\mathbb{C}}$ matricinis modelis. Sepanskio knygoje *Compact Lie Groups* Borelio–Veilio teorema yra suformuluota grupės G matriciniam modeliui. Sutapatinsime šias dvi grupes. Egzistuoja ištikimas įvaizdis ρ, apibrėžtas grupėje K (10-oji paskaita; taip pat [C: Bröcker and tom Dieck (BD), Skyrelis III.4, Teorema 4.1]). Vidurkinimas paverčia įvaizdį ρ unitariuoju (5-oji paskaita). Įvaizdžio $r = \rho \oplus \overline{\rho} : K \to \mathrm{U}(N)$ matricos elementai generuoja algebrą $\mathscr{R}(K)$ [C: BD, Skyrelis III.4, Teiginys 4.3].

Prisiminkime iš 14-osios paskaitos, kad kiekvienas elementas $\psi \in K_{\mathbb{C}} = \mathcal{X}(K)$ yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas iš algebros $\mathscr{R}(K)$ į skaičių lauką $\mathbb{C}$. *Koeficientų atvaizdavimas* $r_{\mathbb{C}}$ įvertina elementą ψ matricos elementuose r_{ij}, kuriuos turi įvaizdis r:

$$r_{\mathbb{C}}(\psi) = \big(\psi(r_{ij})\big)_{i,j=1}^{N}.$$

Pagal [C: BD, Skyrelį III.8, Teiginį 8.2 ir po jo einančią pastraipą] atvaizdavimas $r_{\mathbb{C}}$ yra biholomorfizmas tarp grupės $K_{\mathbb{C}}$ ir grupės $\mathrm{GL}(N, \mathbb{C})$ uždarojo pogrupio, kuris kartu yra analizinis podaugdaris.

Gautoji kompleksinė struktūra grupėje $K_{\mathbb{C}}$ nepriklauso nuo įvaizdžio r. Tegul r' yra antrasis ištikimas grupės K unitarusis įvaizdis, kurio matricos elementai taip pat generuoja algebrą $\mathscr{R}(K)$. Tegul $r'_{\mathbb{C}}$ yra jo koeficientų atvaizdavimas, apibrėžtas ta pačia konstrukcija. Kiekvienas įvaizdžio r' matricos elementas yra įvaizdžio r matricos elementų polinomas. Galioja ir atvirkštinis teiginys. Kiekvienas elementas $\psi \in K_{\mathbb{C}}$ yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas, todėl jis išsaugo šiuos polinominius sąryšius. Vadinasi, atvaizdavimas $r'_{\mathbb{C}} \circ r_{\mathbb{C}}^{-1}$ ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra polinominių atvaizdavimų apribojimai. Pagal riekės žemėlapio savybę jie yra holomorfiniai atvaizdavimai tarp dviejų analizinių podaugdarių. Ši bendra struktūra yra 14-osios paskaitos kompleksinė struktūra.

Lie algebrą $\mathfrak{g}$, kurią turi grupė $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$, kompleksiškai apvelka grupės $r(K)$ Lie algebra [C: BD, Teiginys 8.4 ir prieš jį einanti pastraipa].

Kadangi grupė K yra jungi, grupė $K_{\mathbb{C}}$ taip pat yra jungi (14-oji paskaita). Jungųjį Lie pogrupį grupėje $\mathrm{GL}(N, \mathbb{C})$ vienareikšmiškai nusako jo Lie algebra [C: Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, Teorema 3.40]. Todėl grupė $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$ yra grupės $r(K)$ kompleksifikacija Sepanskio knygos Apibrėžimo 7.48 prasme. Sutapatinsime grupę G su grupe $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$ ir grupę K su grupe $r(K)$, nes galioja lygybė $r_{\mathbb{C}}(\mathrm{ev}_g) = r(g)$.

Sepanskio knygos konstrukciją galima taikyti kiekvienam ištikimam unitariajam įvaizdžiui r.

Borelio pogrupis ir faktorerdvė. Pagal Sepanskio knygos Apibrėžimą 7.48 pogrupis B yra grupės G jungusis Lie pogrupis, kurio Lie algebra yra poalgebra $\mathfrak{b}$. Pagal Sepanskio knygos Lemą 7.49 pogrupis B yra uždarasis. Pagal Sepanskio knygos Teoremą 7.50 įterpimas indukuoja difeomorfizmą tarp erdvės K/T ir erdvės G/B.

Kadangi pogrupis B yra uždarasis, pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą jis yra įdėtasis grupės G Lie pogrupis. Pogrupio B įterpimas, kai pogrupiui yra suteikta Sepanskio knygos Lie pogrupio struktūra, pagal Išvadą 5.30 (Lee) yra glodus kaip atvaizdavimas į šį įdėtąjį podaugdarį. Šis įterpimas yra bijektyvus Lie grupių homomorfizmas, todėl pagal Išvadą 7.6 (Lee) jis yra Lie grupių izomorfizmas. Vadinasi, įdėtosios grupės B Lie algebra yra poalgebra $\mathfrak{b}$. Be to, eksponentė exp yra difeomorfizmas tarp tam tikros aplinkos O, kuri yra taško 0 aplinka poalgebroje $\mathfrak{b}$, ir atvirojo grupės B poaibio.

Pasirinkime kompleksinį papildinį $\mathfrak{m}$ poalgebrai $\mathfrak{b}$ algebroje $\mathfrak{g}$. Apibrėžkime kiekvienam elementui $b \in B$ atvaizdavimą $\Phi : \mathfrak{b} \times \mathfrak{m} \to G$ formule

$$\Phi(X, Y) = b \exp X \exp Y.$$

Matricinė eksponentė yra holomorfinė ir atvaizduoja algebrą $\mathfrak{g}$ į grupę G, todėl pagal riekės žemėlapio savybę atvaizdavimas Φ yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į grupę G. Jo diferencialas taške $(0, 0)$ yra kompleksiškai tiesinis izomorfizmas $(X, Y) \mapsto b(X + Y)$. Pagal holomorfinę atvirkštinės funkcijos teoremą, sumažinus aplinką O, egzistuoja tokia aplinka O', kuri yra taško 0 aplinka poerdvyje $\mathfrak{m}$, kad atvaizdavimas Φ yra biholomorfizmas tarp aibės $O \times O'$ ir atvirosios aibės $W' \subset G$. Aibė $\Phi(O \times \{0\}) = b \exp O$ yra atviroji grupėje B. Kadangi pogrupis B turi poerdvio topologiją, ši aibė lygi aibei $B \cap W''$ su kuria nors atvirąja aibe W''. Aibėje $W = W' \cap W''$ aibė B sutampa su rieke $Y = 0$. Vadinasi, pogrupis B yra uždarasis kompleksinis pogrupis.

Kompleksinės faktorerdvės teorema [C: Kirillov Jr., Teorema 2.11 ir jos įrodymas] paverčia erdvę G/B kompleksine daugdara su holomorfine projekcija $\pi : G \to G/B$ ir holomorfiniais lokaliaisiais pjūviais. Taigi pirmojo skyrelio konstrukciją galima taikyti grupei G, pogrupiui B ir erdvei G/B.

Svoriai ir teoremos šaltinis. Pagal mūsų susitarimą svorio λ charakteris yra atvaizdavimas $\exp H \mapsto e^{i\lambda(H)}$, todėl Sepanskio knygos svoris yra mūsų funkcionalas $i\lambda$ algebroje $\mathfrak{t}$ (Sepanski, Apibrėžimai 6.23 ir 6.26, Teorema 6.27 ir formulė (6.28)). Mūsų žymėjimais Sepanskio knygos Apibrėžimas 7.52 apibrėžia pagrindinio dėstymo charakterį χ_λ. Sepanskio knygos Teorema 7.58 formuluoja Borelio–Veilio teoremą aukščiau nurodytoms grupėms G ir B. Sepanskio knygos Apibrėžimas 7.54 vadina pjūvį holomorfiniu, kai jo funkcija grupėje G yra holomorfinė. Pagal pagrindiniame dėstyme aptartą lygiavertiškumą Sepanskio holomorfiniai pjūviai sutampa su mūsiškiais. Mūsų sluoksniuotė L_λ yra Sepanskio tiesinė sluoksniuotė, kurios indeksas yra $-\lambda$, todėl jo teorema duoda tą patį įvaizdį V_λ^*. Mūsų įrodymas šia teorema nesiremia.

Grupė $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ kaip $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju imkime standartinį įvaizdį r. Keturi jo matricos elementai generuoja reprezentatyviąsias funkcijas, be to, $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}}) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ (14-oji paskaita). Grupei $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ suteikiame kompleksinę struktūrą kaip poaibiui $\{\det = 1\}$ erdvėje $\mathbb{C}^4$. Šis poaibis yra kompleksinis podaugdaris su išreikštiniais riekės žemėlapiais. Atvirojoje aibėje $\{g_{11} \neq 0\} \subset \mathbb{C}^4$ apibrėžkime

$$\varphi(g_{11}, g_{12}, g_{21}, g_{22}) = (g_{11}, g_{12}, g_{21},\ g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21} - 1).$$

Atvaizdavimas φ yra holomorfinis, jo vaizdas yra visa atviroji aibė $\{(a, b, c, t) : a \neq 0\}$, o jo holomorfinis atvirkštinis atvaizdavimas yra

$$(a, b, c, t) \longmapsto \big(a, b, c, (t + 1 + bc)/a\big).$$

Šiame žemėlapyje grupė $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ yra aibė $t = 0$. Aibėse $\{g_{12} \neq 0\}$, $\{g_{21} \neq 0\}$ ir $\{g_{22} \neq 0\}$ lygtį $\det g = 1 + t$ taip pat išspręskime elemento, kuris determinante $\det g$ dauginamas iš nenulinio elemento, atžvilgiu. Šios keturios atviros aibės dengia grupę $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, nes iš lygybės $\det g = 1$ išplaukia, kad kuris nors matricos g elementas yra nenulinis.

Pagal riekės žemėlapio savybę atvaizdavimas į grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kurio elementai yra holomorfiniai, yra holomorfinis. Grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ atvirkštinė matrica yra

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{pmatrix}.$$

Todėl daugybos ir atvirkštinio elemento ėmimo elementai yra polinomai, taigi $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra kompleksinė Lie grupė.

Dabar šią struktūrą palyginsime su 14-osios paskaitos grupės $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}} = \mathcal{X}(\mathrm{SU}(2))$ kompleksine struktūra. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ pavyzdys 14-ojoje paskaitoje rodo, kad keturi standartinio įvaizdžio matricos elementai D_{ij} generuoja grupės $\mathrm{SU}(2)$ reprezentatyviąsias funkcijas. Jis taip pat duoda bijekciją

$$P : \mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}), \qquad P(\psi) = \big(\psi(D_{ij})\big)_{i,j=1,2}.$$

Formulė $\Delta D_{ij} = \sum_k D_{ik} \otimes D_{kj}$ duoda lygybę $P(\psi_1\psi_2) = P(\psi_1)P(\psi_2)$, todėl atvaizdavimas P yra grupių izomorfizmas. Be to, $P(\mathrm{ev}_g) = g$, kai $g \in \mathrm{SU}(2)$. Brėkerio ir tom Dyko žymėjimais atvaizdavimas P yra atvaizdavimas $r_{\mathbb{C}}$ standartiniam įvaizdžiui r grupės $\mathrm{SU}(2)$.

Cituojamas rezultatas. Taikome [C: Bröcker and tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, Skyrelis III.8, Teiginys 8.2 ir po jo einanti pastraipa] standartiniam įvaizdžiui r, kurio matricos elementai generuoja reprezentatyviąsias funkcijas. Teiginys 8.2 teigia, kad atvaizdavimas $r_{\mathbb{C}} = P$ bijektyviai atvaizduoja grupę $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$ į afiniąją atmainą erdvėje $\mathbb{C}^4$. Ši atmaina yra vaizdas $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kurį duoda atvaizdavimas P. Po jo einanti pastraipa teigia, kad grupės $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$ topologija yra poerdvio topologija, indukuota atvaizdavimo P. Ji taip pat teigia, kad ši atmaina yra analizinis erdvės $\mathbb{C}^4$ podaugdaris, kuriame daugyba ir atvirkštinio elemento ėmimas yra holomorfiniai. Su šia struktūra atvaizdavimas P yra biholomorfinis grupių izomorfizmas iš grupės $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$ į visą grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kuris pogrupyje $\mathrm{SU}(2)$ yra tapatusis atvaizdavimas.

Ši analizinio podaugdario struktūra grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ sutampa su aukščiau aprašyta riekės žemėlapių struktūra. Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įterpimas į erdvę $\mathbb{C}^4$ yra holomorfinis kiekvienos struktūros atžvilgiu. Pagal kitos struktūros riekės žemėlapio savybę grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ tapatusis atvaizdavimas yra holomorfinis abiem kryptimis.

Čia naudojame standartinį įvaizdį r. Grupę $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$ sutapatiname su grupe $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ per atvaizdavimą P, kuris pogrupyje $\mathrm{SU}(2)$ yra tapatusis. Pagal aukščiau pateiktą polinominį argumentą 14-osios paskaitos kompleksinė struktūra nepriklauso nuo generuojančio įvaizdžio. Taigi tai yra struktūra, perkelta atvaizdavimu P, kuris yra atvaizdavimas $r_{\mathbb{C}}$ standartiniam įvaizdžiui. Pagal cituojamą rezultatą ir ankstesnę pastraipą ši struktūra sutampa su podaugdario struktūra grupėje G.

Nagrinėkime atvaizdavimus

$$s_0(z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ z & 1 \end{pmatrix}, \qquad s_1(w) = \begin{pmatrix} w & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Abiejų matricų determinantas lygus vienetui. Jų pirmieji stulpeliai yra tautologiniai reperiai $e_0(z) = (1, z)$ ir $e_1(w) = (w, 1)$. Sutapatinkime erdvę G/B su tiese $\mathbb{CP}^1$ atvaizdavimu $gB \mapsto [g(1,0)^T]$, kaip pagrindiniame dėstyme. Tada atvaizdavimai s_0 ir s_1 yra projekcijos $G \to G/B$ lokalieji pjūviai virš aibių U_0 ir U_1. Jų elementai yra polinomai, todėl jie yra holomorfiniai atvaizdavimai į grupę G.

Sankirtos taške $w = 1/z$ ir

$$h_{01} = s_0(z)^{-1} s_1(1/z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z^{-1} & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z^{-1} & -1 \\ 0 & z \end{pmatrix} \in B.$$

Todėl $\chi_m(h_{01}) = z^{-m}$.

Tegul funkcija $f : G \to \mathbb{C}$ tenkina lygybę $f(gb) = \chi_m(b) f(g)$, ir apibrėžkime $f_0 = f \circ s_0$ bei $f_1 = f \circ s_1$. Kadangi $s_1(1/z) = s_0(z) h_{01}$, kovariantiškumo sąlyga duoda

$$f_1(1/z) = f\big(s_0(z) h_{01}\big) = z^{-m} f_0(z) \qquad (z \neq 0).$$

Kai $w = 1/z$, tai yra perėjimo taisyklė $f_1(w) = w^m f_0(1/w)$ sluoksniuotei $\mathcal{O}(m)$.

Toliau palyginsime dvi kompleksines struktūras erdvėje G/B. Žymėkime projekciją simboliu $\pi : G \to G/B$ ir sutapatinkime erdvę G/B su tiese $\mathbb{CP}^1$ atvaizdavimu $gB \mapsto [g(1,0)^T]$. Vektorius $g(1,0)^T$ yra pirmasis stulpelis $(g_{11}, g_{21})^T$ matricos g. Todėl aibės $\pi^{-1}(U_0) = \{g_{11} \neq 0\}$ ir $\pi^{-1}(U_1) = \{g_{21} \neq 0\}$ yra atviros grupėje G. Žemėlapiuose

$$z \circ \pi(g) = \frac{g_{21}}{g_{11}} \quad \text{aibėje } \pi^{-1}(U_0), \qquad w \circ \pi(g) = \frac{g_{11}}{g_{21}} \quad \text{aibėje } \pi^{-1}(U_1).$$

Tai yra holomorfinių funkcijų santykiai su nenykstančiais vardikliais. Todėl projekcija π yra holomorfinė žemėlapių struktūros atžvilgiu. Pjūviai s_0 ir s_1 yra holomorfiniai žemėlapių struktūros atžvilgiu, nes jų elementai yra polinomai. Pagal aukščiau atliktą dviejų grupės struktūrų palyginimą cituojama struktūra erdvėje G/B taip pat daro projekciją π holomorfine podaugdario struktūros grupėje G atžvilgiu ir turi holomorfinius lokaliuosius pjūvius.

Tegul s yra holomorfinis lokalusis pjūvis vienos iš dviejų struktūrų atžvilgiu. Tada kompozicija $\pi \circ s$ yra tapatusis atvaizdavimas pjūvio s apibrėžimo srityje. Ši kompozicija yra holomorfinė kaip atvaizdavimas į kitą struktūrą, nes projekcija π yra holomorfinė tos struktūros atžvilgiu. Pritaikę tai abiem kryptimis, matome, kad erdvės G/B tapatusis atvaizdavimas yra holomorfinis, o jo atvirkštinis atvaizdavimas taip pat yra holomorfinis. Todėl abi kompleksinės struktūros sutampa.

Tegul s' yra kitas holomorfinis lokalusis pjūvis virš atvirojo aibės U_0 poaibio. Tada atvaizdavimas $q = s_0^{-1} s'$ įgyja reikšmes pogrupyje B ir pagal riekės žemėlapio savybę yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į pogrupį B. Kovariantiškumo sąlyga duoda $f \circ s' = \chi_m(q) f_0$. Daugiklis $\chi_m(q)$ yra holomorfinis ir niekur nelygus nuliui, todėl jis holomorfiškumo nekeičia. Tas pat galioja virš aibės U_1. Vadinasi, sluoksniuotės L_m pjūvis yra holomorfinis tada ir tik tada, kai funkcijos f_0 ir f_1 yra sveikosios.

Tai yra dviejų holomorfinio pjūvio sąvokų sutapimas, kuriuo remiasi projekcinės tiesės skaičiavimas.

Literatūra

- M. R. Sepanski, *Compact Lie Groups* (2007), 7.4 skyrelis: Borelio–Veilio teorema ir grupės G bei B.
- J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas (2013), 4, 5 ir 10 skyriai: lokalieji pjūviai, įdėtieji podaugdariai ir vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lema.
- T. Bröcker ir T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (1985), III.4 ir III.8 skyreliai: ištikimi įvaizdžiai ir kompleksifikacija.

Paskaita 27

Kompaktinės orbitos ir geometrinis kvantavimas

Tikslai. *Kompaktinė kojungtinė orbita turi simplektinę formą. Ne kiekviena tokia orbita duoda pasirinktos globaliosios grupės įvaizdį. Šią kliūtį apskaičiuosime sferoje. Sferos simplektinis plotas, padalytas iš dydžio $2\pi\hbar$, turi būti sveikasis skaičius. Grupės $\mathrm{SO}(3)$ atveju ekvivariantinis pakėlimas kelia papildomą sąlygą. Tada holomorfiniai pjūviai susieja orbitą su praėjusios paskaitos įvaizdžiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti grupės $\mathrm{SU}(2)$ kojungtinės orbitos formą kartu su formos normavimu pagal spindulį.
- Lokaliai apibrėžti unitariąją sietį ir įrodyti sferos sveikumo sąlygą.
- Atskirti įprastinę prekvantinę sluoksniuotę nuo ekvivariantinės.
- Gauti sukinį $m/2$ iš holomorfinių pjūvių ir atskirti šią konstrukciją nuo charakterių formulių su poslinkiu.

27.1 Sferinė orbita ir jos plotas

Naudokime 4-osios paskaitos bazę

$$X_j = -\frac{i}{2}\sigma_j, \qquad [X_1, X_2] = X_3$$

kartu su cikliškai perstatytais skliaustų sąryšiais. Paulio matricos tenkina sąryšius

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij} I + i\sum_k \epsilon_{ijk}\sigma_k.$$

Sutapatinkime erdvę $\mathfrak{su}(2)^*$ su erdve $\mathbb{R}^3$ pagal taisyklę $x_j = \ell(X_j)$. Priskirkime kiekvienam vektoriui $u = (u_1, u_2, u_3)$ matricą $X_u = \sum_j u_j X_j$. Tada galioja lygybė $[X_u, X_v] = X_{u\times v}$.

Jungtinis veikimas yra 4-osios paskaitos posūkių padengimas. Šiose ortonormuotose koordinatėse dualusis veikimas yra tas pats posūkių veikimas. Todėl dualiojo veikimo orbitos yra sferos

$$S^2_r = \{x : |x| = r\} \quad (r > 0)$$

ir koordinačių pradžios taškas. Infinitezimalųjį veikimą išreiškia formulė $\xi_u(x) = u \times x$. Tai patvirtina porinimas su vektoriumi v: gauname $(u\times x)\cdot v = -x\cdot(u\times v)$, t.y. būtent 19-osios paskaitos dualiąją išvestinę.

Teiginys 27.1. *Tegul $r > 0$. Taške $x \in S^2_r$ orbitos forma yra išreiškiama formule*

$$\omega_x(v, w) = \frac{x \cdot (v \times w)}{r^2}, \qquad v, w \in T_x S^2_r.$$

Jei Ω yra sferos ploto forma, orientuota išorine normale, tai galioja lygybė $\omega = \Omega/r$. Sferinėse koordinatėse galioja lygybės

$$\omega = r \sin\theta \, d\theta \wedge d\phi, \qquad \int_{S^2_r} \omega = 4\pi r. \tag{27.1}$$

Įrodymas. Pagal 19-osios paskaitos KKS formulę turi galioti lygybė

$$\omega_x(u \times x, v \times x) = x \cdot (u \times v).$$

Taške $x = re_3$ šie du liestiniai vektoriai yra $r(u_2, -u_1, 0)$ ir $r(v_2, -v_1, 0)$. Įstatę juos į teiginio formulę, gauname reikiamą reikšmę $r(u_1v_2 - u_2v_1)$. Pagal invariantiškumą posūkių atžvilgiu formulė galioja kiekviename taške x.

Išorine normale orientuotą ploto formą nusako formulė $\Omega_x(v, w) = x \cdot (v \times w)/r$. Todėl galioja lygybė $\omega = \Omega/r$. Įprastoje sferos parametrizacijoje ploto forma yra $r^2 \sin\theta \, d\theta \wedge d\phi$. Iš šios ploto formos gauname sferinę formulę (27.1). Integruodami srityje, apibrėžtoje nelygybėmis $0 \le \theta \le \pi$ ir $0 \le \phi \le 2\pi$, gauname reikšmę $4\pi r$. ∎

Įveskime vektorinių laukų žymėjimą $\xi_j = \xi_{e_j}$. Čia e_j yra standartinės bazės vektoriai. Šiaurės poliuje galioja lygybės $\xi_1 = -r\partial_{x_2}$, $\xi_2 = r\partial_{x_1}$ ir $\omega(\xi_1, \xi_2) = r$. Pagal jas patogu patikrinti ženklus. Koordinačių pradžią reikia nagrinėti atskirai, nes ji yra vieno taško orbita. Šiame taške negalioja nė viena formulė, kurioje dalijame iš spindulio r.

Užfiksuokime teigiamą konstantą $\hbar$. Ši konstanta nustato mastelį, kuriuo simplektinį plotą lyginame su fazėmis. Kadangi ją rašysime išreikštinai, sveikumo sąlygą bus lengviau sekti.

27.2 Sietys, aprašytos lokaliaisiais reperiais

Ermitinė tiesinė sluoksniuotė yra kompleksinė tiesinė sluoksniuotė, kurios sluoksniuose yra glodžiai kintanti teigiama skaliarinė sandauga. Lokalusis *unitarusis reperis* yra niekur nenykstantis pjūvis, kurio norma lygi vienetui. Tokiame repere pjūvį nusako kompleksinė koeficiento funkcija u.

Apibrėžimas 27.2. *Unitarioji sietis* lokaliuosius koeficientus diferencijuoja pagal taisyklę

$$\nabla u = du + Au,$$

kur A yra menamų reikšmių 1-forma. Tegul unitarieji reperiai e_i aibėje U_i ir e_j aibėje U_j turi sieties formas A_i ir A_j. Jei reperius sieja lygybė $e_j = g_{ij}e_i$ su funkcija $g_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{U}(1)$, tai sieties formos turi tenkinti sąlygą

$$A_j = A_i + g_{ij}^{-1} dg_{ij}.$$

Kreivumas F_∇ yra menamų reikšmių 2-forma, aibėje U_i apibrėžta formule $F_\nabla = dA_i$.

Čia du yra įprastasis diferencialas, kurį taikome liestiniams vektoriams. Pjūvio s koeficientai šiuose dviejuose reperiuose yra u_i ir u_j. Kadangi galioja lygybė $e_j = g_{ij}e_i$, šie koeficientai tenkina lygybę $u_i = g_{ij}u_j$ arba jai lygiavertę lygybę $u_j = g_{ij}^{-1}u_i$. Diferencijuodami lygybę $u_i = g_{ij}u_j$, gauname

$$du_i + A_i u_i = g_{ij}\big(du_j + (A_i + g_{ij}^{-1}dg_{ij})u_j\big).$$

Kairioji pusė yra išraiškos ∇s koeficientas repere e_i. Repere e_j šis koeficientas yra $du_j + A_j u_j$. Skirtinguose reperiuose koeficientai skiriasi daugikliu g_{ij}. Todėl reikalavimas, kad išraiška ∇s kiekvienam pjūviui nepriklausytų nuo reperio, yra būtent apibrėžime nurodyta formos A_j taisyklė.

Kadangi funkcija g_{ij} yra skaliarinė, lokaliai galioja lygybė $d(g_{ij}^{-1}dg_{ij}) = 0$. Tai matyti, užrašius $g_{ij} = e^{i\alpha}$ su realiąja funkcija α. Tada forma, kurią diferencijuojame, yra $i\,d\alpha$. Todėl galioja lygybė $dA_i = dA_j$. Vadinasi, kreivumas yra apibrėžtas globaliai.

Tą pačią sietį galima užrašyti bet kuriame nenykstančiame repere. Reperio pakeitimo formulės lieka teisingos ir tada, kai $g_{ij} \in \mathbb{C}^\times$ ir formos A_i yra kompleksinių reikšmių. Menamų reikšmių formų reikia tik unitariesiems reperiams.

Lygiagrečiosios pernašos keliu lygtis yra $du + Au = 0$. Pasirinkus vieną reperį, šios lygties sprendinys koeficientą u padaugina iš daugiklio $\exp(-\int A)$. Šis daugiklis yra fazė, nes forma A yra menamų reikšmių. Kreivumas matuoja fazę, kuri atsiranda apėjus mažas kilpas. Fizikoje forma A yra kalibruotinis potencialas, o operatorius ∇ yra kovariantinė išvestinė.

Apibrėžimas 27.3. Poros (M, ω) *prekvantinė tiesinė sluoksniuotė*, esant masteliui $\hbar$, yra ermitinė tiesinė sluoksniuotė su unitariąja sietimi, tenkinančia sąlygą

$$F_\nabla = -\frac{i}{\hbar}\omega. \tag{27.2}$$

Ženklas yra mūsų susitarimo dalis. Prekvantinė sluoksniuotė yra pradinis geometrinis objektas. Jos visų glodžiųjų pjūvių erdvė paprastai yra daug didesnė už norimą įvaizdį. Poliarizacija, pavyzdžiui, holomorfiškumas, leidžia papildomai atrinkti pjūvius.

Pacituosime bendrąją prekvantavimo teoremą. Uždara realioji glodžiosios daugdaros 2-forma ω turi prekvantinę tiesinę sluoksniuotę, esant masteliui $\hbar$, tada ir tik tada, kai šios formos periodai, padalyti iš dydžio $2\pi\hbar$, yra sveikieji skaičiai. Formos ω *periodas* yra formos ω integralas uždaruoju orientuotu paviršiumi, glodžiai atvaizduotu į daugdarą, arba tokių paviršių tiesiniu dariniu su sveikaisiais koeficientais. Lygiavertiškai, klasė $[\omega/(2\pi\hbar)]$ yra sveikoji kohomologijų klasė. Žr. Kirillov, 1 skyriaus 2.4 skyrelį.

Sferos atvejį įrodysime tiesiogiai.

27.3 Sferos sluoksniuotė sveikuoju atveju

Apibrėžkime skaičių

$$m = \frac{2r}{\hbar}.$$

Imkime šiaurinį žemėlapį be pietų poliaus ir pietinį žemėlapį be šiaurės poliaus. Apibrėžkime formas

$$A_N = -\frac{im}{2}(1 - \cos\theta)d\phi, \qquad A_S = \frac{im}{2}(1 + \cos\theta)d\phi. \tag{27.3}$$

Nors forma $d\phi$ abiejuose poliuose yra singuliari, forma A_N yra glodi šiaurės poliuje, o forma A_S – pietų poliuje. Tam parodyti naudosime kompleksinę koordinatę ir prisiminsime jos taisykles. Kai $z = x + iy$, apibrėžkime

$$dz = dx + i\,dy, \qquad d\bar{z} = dx - i\,dy, \qquad \partial_z = \tfrac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y), \qquad \partial_{\bar{z}} = \tfrac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y).$$

Tada lygybė $df = \partial_z f\,dz + \partial_{\bar{z}} f\,d\bar{z}$ galioja kiekvienai funkcijai f, be to, $dz \wedge d\bar{z} = -2i\,dx \wedge dy$. Užrašę 1-formą $a\,dz + b\,d\bar{z}$ diferencialais dx ir dy ir pritaikę 19-osios paskaitos taisyklę, gauname

$$d(a\,dz + b\,d\bar{z}) = (\partial_z b - \partial_{\bar{z}} a)\,dz \wedge d\bar{z}.$$

Pasirinkę šiaurinę kompleksinę koordinatę $z = \tan(\theta/2)e^{i\phi}$, gauname

$$A_N = \frac{m}{2}\frac{z\,d\bar{z} - \bar{z}\,dz}{1 + |z|^2}.$$

Ši išraiška yra glodi taške $z = 0$. Pietinė formulė savo koordinatėje turi tą pačią savybę. Fizikoje tai yra magnetinio monopolio potencialai dviejuose žemėlapiuose.

Diferencijuodami gauname

$$dA_N = dA_S = -\frac{im}{2}\sin\theta\,d\theta \wedge d\phi = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Žemėlapių sankirtoje galioja lygybė $A_S - A_N = im\,d\phi$. Todėl formos A_N ir A_S tenkina reperio pakeitimo formulę, jei reperius sieja perėjimo lygybė

$$e_S = e^{im\phi}e_N.$$

Šis perėjimo daugiklis yra vienareikšmė funkcija sankirtoje tada ir tik tada, kai $m \in \mathbb{Z}$. Kai spindulys yra teigiamas, tai reiškia, kad m yra teigiamas sveikasis skaičius. Fizikoje sąlyga $m \in \mathbb{Z}$ yra Dirako kvantavimo sąlyga.

Toliau pateikiamo būtinumo įrodymo idėja yra viena kilpa, kuri riboja du sferos skritulius. Pernaša kilpa sluoksnį padaugina iš fazės. Repere skritulyje D, kurį riboja ši kilpa, pagal Stokso teoremą ši fazė yra $\exp(-\int_D F_\nabla)$. Plokštumoje iš 19-osios paskaitos kilpa riboja vieną skritulį, o 18-osios paskaitos Veilio sąryšis turi tokios pat rūšies fazę: konstantą, padaugintą iš ploto. Ten jokios sąlygos neatsiranda. Sferoje kilpa riboja du skritulius su priešingomis orientacijomis, kaip rodo 27.1 pav. Abu skrituliai turi duoti tą pačią fazę. Todėl $\exp(-\int_{S^2} F_\nabla) = 1$, t.y. $\int_{S^2}\omega \in 2\pi\hbar\mathbb{Z}$. Dabar tai užrašysime reperiais. Fizikoje Uždavinio 27.2 platumos fazė yra sukinio Berio fazė.

Teiginys 27.4. *Sfera S^2_r, kur $r > 0$, turi prekvantinę tiesinę sluoksniuotę tada ir tik tada, kai $2r/\hbar \in \mathbb{Z}$. Kai $m = 2r/\hbar$, tokią sluoksniuotę duoda ankstesnė konstrukcija.*

Įrodymas. Pakankamumą įrodo išreikštinė konstrukcija. Įrodydami būtinumą, tarkime, kad sfera S^2_r turi prekvantinę tiesinę sluoksniuotę.

Žingsnis 1 (unitarieji reperiai dviejuose skrituliuose). Naudokime du atviruųjų skritulių žemėlapius, gautus pašalinus priešingus polius. Perneškime lygiagrečiai kiekviename žemėlapyje vienetinį vektorių iš žemėlapio koordinačių pradžios spindulinėmis atkarpomis. Padenkime kiekvieną spindulinę atkarpą baigtiniu skaičiumi lokaliųjų unitariųjų reperių. Dėl reperio pakeitimo dėsnio pernašos rezultatai persidengimuose sutampa. Gauta baigtinė



27.1 pav.: Viena platumos kilpa, orientuota didėjančio kampo ϕ kryptimi, dviejose sferos kopijose. Jos rodyklė abiejose kopijose rodo ta pačia kryptimi. Pirmojoje kopijoje užtušuotas šiaurinis skritulys D_N turi šią kilpą kaip savo orientuotą kraštą. Antrojoje kopijoje užtušuotas pietinis skritulys D_S turi priešingos krypties kilpą kaip savo orientuotą kraštą, todėl jo fazės eksponentėje ženklas yra priešingas.

paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių kompozicija glodžiai priklauso nuo galinio taško ir apibrėžia glodų unitarųjį reperį. Kiekvienas žemėlapis apima savo uždarojo pusrutulio aplinką, todėl šie reperiai yra apibrėžti iki pusiaujo ir už jo. Pažymėkime juos simboliais e_N ir e_S, o jų sieties formas – simboliais A_N ir A_S.

Žingsnis 2 (perėjimo funkcija ir jos pakėlimas). Užrašykime pusiaujo aplinkoje lygybę $e_S = ge_N$ su funkcija $g : S^1 \to \mathrm{U}(1)$. Orientuokime pusiaujį didėjančio kampo ϕ kryptimi, t.y. kaip šiaurinio skritulio kraštą.

Pakelkime reikšmes $g(e^{i\phi})$ iki realiųjų fazių $\alpha(\phi)$, kai $0 \le \phi \le 2\pi$, naudodami 4-osios paskaitos apskritimo padengimą. Kadangi galiniai taškai duoda tą pačią reikšmę, galioja lygybė $\alpha(2\pi) - \alpha(0) = 2\pi k$ su kuriuo nors sveikuoju skaičiumi k.

Žingsnis 3 (Stokso formulė). Pagal reperio pakeitimo dėsnį galioja lygybė $A_S = A_N + g^{-1}dg$. Be to, galioja lygybė $g^{-1}dg = i\,d\alpha$, nes pusiaujyje galioja lygybė $g = e^{i\alpha}$. Tegul D_N ir D_S yra uždarieji šiaurinis ir pietinis pusrutuliai. Kiekvienam orientuotam skrituliui taikysime matematinės analizės Stokso formulę 1-formai. Pietinis skritulys pusiaujyje indukuoja priešingą orientaciją. Todėl gauname

$$\int_{S^2} F_\nabla = \int_{D_N} dA_N + \int_{D_S} dA_S = \int_{S^1} (A_N - A_S) = -\int_{S^1} g^{-1}dg = -2\pi i k.$$

Pagal prekvantinę sąlygą (27.2) ir sferinę formulę (27.1) gauname

$$k = \frac{i}{2\pi}\int F_\nabla = \frac{1}{2\pi\hbar}\int \omega = \frac{2r}{\hbar}.$$

Vadinasi, galioja sąlyga $2r/\hbar \in \mathbb{Z}$. ∎

Kadangi galioja nelygybė $m > 0$, kreivumas sferoje neturi globaliosios pirmykštės formos. Jei lygybė $F = dA$ galiotų globaliai, pagal Stokso teoremą gautume lygybę $\int_{S^2} F = 0$. Periodas yra nenulinis, nes $m \neq 0$. Todėl abu lokalieji potencialai yra būtini.

27.4 Holomorfiniai pjūviai ir ekvivariantiškumas

Pirmiausia parodysime, kad sluoksniuotė $O(m)$ su viena metrika turi prekvantinę sietį. Tada jos holomorfiniai pjūviai yra kvantavimas. Galiausiai parodysime, kad natūralusis grupės $\mathrm{SU}(2)$ veikimas yra ekvivariantinis pakėlimas, o grupei $\mathrm{SO}(3)$ reikia lyginio skaičiaus m.

Metrika ir sietis

Sutapatinkime sferą su projekcine tiese $\mathbb{CP}^1$ pagal atvaizdavimą

$$z \longmapsto \frac{r}{1+|z|^2}\bigl(2\operatorname{Re} z, 2\operatorname{Im} z, 1-|z|^2\bigr).$$

Šiaurės polius yra taškas $z=0$. Koordinatė $z=\tan(\theta/2)e^{i\phi}$ yra ta pati šiaurinė koordinatė, kurią naudojome anksčiau. Prisiminkime iš 26-osios paskaitos, kad grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia tieses pagal taisyklę $g\cdot[v]=[gv]$. Sutapatinimo atvaizdavimas yra ekvivariantinis šio veikimo ir kojungtinio veikimo atžvilgiu. Tai matyti iš to, kad vektoriaus $v=(1,z)$ tiesę atitinka bepėdsakė ermitinė matrica, proporcinga matricai

$$vv^*/\|v\|^2 - I/2.$$

Jungtinimas elementu g šią matricą atvaizduoja į vektoriaus gv tiesės matricą. Šis jungtinimas taip pat pasuka matricos Paulio koordinates. Kai $|z|=\tan(\theta/2)$, galioja lygybės $d|z| = \frac{1}{2}(1+|z|^2)\,d\theta$ ir $r\sin\theta = 2r|z|/(1+|z|^2)$. Įstatę jas į sferinę formulę (27.1), gauname sferos formą

$$\omega = \frac{2ir\,dz\wedge d\bar z}{(1+|z|^2)^2}.$$

Kadangi galioja lygybė $i\,dz\wedge d\bar z = 2\,d(\operatorname{Re} z)\wedge d(\operatorname{Im} z)$, ši forma apibrėžia tą pačią teigiamą orientaciją kaip ir sferinė formulė (27.1).

Sluoksniuotės $O(m)$ holomorfinius reperius 26-ojoje paskaitoje sieja perėjimo lygybė $e_S^{\mathrm{hol}} = z^m e_N^{\mathrm{hol}}$. Ermitinė metrika su sąlyga

$$\|e_N^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|z|^2)^{-m}$$

duoda unitariuosius reperius $e_N = (1+|z|^2)^{m/2}e_N^{\mathrm{hol}}$ ir e_S, kurių perėjimo daugiklis yra $(z/|z|)^m = e^{im\phi}$. Toks pats yra sveikuoju atveju sukonstruotos sferos sluoksniuotės perėjimas, todėl potencialai (27.3) apibrėžia sluoksniuotės $O(m)$ unitariąją sietį.

Ši metrika yra $\mathrm{SU}(2)$-invariantinė. Norėdami tai parodyti, aprašysime metriką kiekviename sluoksnyje atskirai. Taškas f, priklausantis sluoksniui virš tiesės $[v]$, yra toje tiesėje apibrėžta funkcija, tenkinanti sąlygą $f(\lambda v)=\lambda^m f(v)$ visiems $\lambda\in\mathbb{C}^\times$. Šiame modelyje 26-osios paskaitos holomorfiniai pjūviai yra laipsnio m homogeniniai polinomai, apriboti kiekvienoje tiesėje. Apibrėžkime sluoksnyje virš tiesės $[v]$ normą

$$\|f\|^2 = \frac{|f(v)|^2}{\|v\|^{2m}}.$$

Pakeitus vektorių v vektoriumi λv, skaitiklis ir vardiklis yra padauginami iš daugiklio $|\lambda|^{2m}$. Todėl norma nepriklauso nuo pasirinkto vektoriaus v. Elementas $g\in\mathrm{SU}(2)$ tašką f atvaizduoja į tašką gf virš tiesės $[gv]$, apibrėžtą lygybe $(gf)(gv)=f(v)$. Kadangi matrica

g yra unitarioji, galioja lygybė $\|gv\| = \|v\|$, todėl galioja ir lygybė $\|gf\| = \|f\|$. Šiaurinis reperis e_N^{hol} įgyja reikšmę 1, kai $v = (1, z)$, kaip ir polinomas v_0^m. Kadangi galioja lygybė $\|(1,z)\|^2 = 1 + |z|^2$, ši norma sutampa su aukščiau užrašyta metrika.

Sietis yra vadinama *suderinta* su holomorfine struktūra, kai sieties forma holomorfiniame repere neturi nario, proporcingo diferencialui $d\bar{z}$. Pritaikykime reperio pakeitimo dėsnį sąryšiui $e_N^{\mathrm{hol}} = (1 + |z|^2)^{-m/2} e_N$ ir pasinaudokime anksčiau užrašyta formos A_N koordinatine išraiška. Tada šios sieties formą repere e_N^{hol} išreiškia lygybės

$$A_N^{\mathrm{hol}} = A_N - \frac{m}{2}\, d\log(1 + |z|^2) = -m\frac{\bar{z}\, dz}{1 + |z|^2}.$$

Šis reperio pakeitimas koordinatėmis yra atliekamas Uždavinyje 27.4. Forma A_N^{hol} turi tik narį, proporcingą diferencialui dz. Šios formos kreivumą išreiškia lygybės

$$dA_N^{\mathrm{hol}} = m\frac{dz \wedge d\bar{z}}{(1 + |z|^2)^2} = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Taigi prekvantine sluoksniuote galima imti sluoksniuotę $O(m)$ su įprastąja holomorfine struktūra.

Duotai metrikai unitarioji sietis, suderinta su holomorfine struktūra, yra vienintelė. Tegul e yra holomorfinis reperis. Apibrėžkime funkciją $h = \|e\|^2$. Tegul A yra sieties forma repere e. Unitariojo reperio $h^{-1/2}e$ sieties forma A_u yra menamų reikšmių. Reperis e yra šis unitarusis reperis, padaugintas iš daugiklio $h^{1/2}$, todėl pagal reperio pakeitimo dėsnį galioja lygybė $A = A_u + \frac{1}{2} d\log h$. Be to, galioja lygybė $\bar{A}_u = -A_u$. Funkcija $\log h$ yra realioji. Todėl gauname

$$A + \bar{A} = d\log h.$$

Apibrėžkime funkcijai f formas $\partial f = (\partial f/\partial z)\, dz$ ir $\bar{\partial} f = (\partial f/\partial \bar{z})\, d\bar{z}$. Tada galioja lygybė $df = \partial f + \bar{\partial} f$. Tarkime, kad forma A neturi nario, proporcingo diferencialui $d\bar{z}$. Tada forma $\bar{A}$ neturi nario, proporcingo diferencialui dz. Palyginę abiejų pusių narius, proporcingus diferencialui dz, gauname

$$A = \partial \log h.$$

Taigi suderintą unitariąją sietį nusako metrika. Kai $h = (1 + |z|^2)^{-m}$, ši formulė duoda formą $-m\bar{z}\, dz/(1 + |z|^2)$, t.y. vėl formą A_N^{hol}.

Kvantavimas

Kai skaičius $m = 2r/\hbar$ yra teigiamas sveikasis skaičius, sferos S_r^2 *holomorfiniu kvantavimu* yra vadinama pjūvių erdvė

$$Q(S_r^2) = H^0(\mathbb{CP}^1, O(m)) \cong V_m.$$

Pagal 26-osios paskaitos pjūvių skaičiavimą ši erdvė turi dimensiją $m + 1$ ir sukinį $j = m/2 = r/\hbar$. Invariantinę teigiamą skaliarinę sandaugą duoda vidurkinimas kompaktinėje grupėje. Jos norma išreikštinai užrašoma formule

$$\|s\|^2 = \frac{1}{4\pi r}\int_{S_r^2} \|s\|^2_{\text{sluoksnio}}\, \omega$$

Tai yra Uždavinio 26.4 norma. Tai matyti taip: koordinatėje z pjūvio z^k sluoksniuotėje $O(m)$ sluoksnio normos kvadratas yra $|z|^{2k}(1+|z|^2)^{-m}$, o pažymėjus $u = |z|^2$, šis integralas yra

$$\int_0^\infty u^k (1+u)^{-m-2}\, du = \frac{k!(m-k)!}{(m+1)!}.$$

Vieno taško orbita naudoja trivialiąją tiesę ir duoda trivialųjį įvaizdį. Šiuo atveju nėra vardiklio, kuriame būtų spindulys.

Ekvivariantinis pakėlimas

Apibrėžimas 27.5. Tegul K yra Lie grupė su Lie algebra $\mathfrak{k}$. Tegul $M \subset \mathfrak{k}^*$ yra kojungtinė orbita su savo KKS forma ω. Grupės K *ekvivariantinė prekvantinė sluoksniuotė* yra simplektinės daugdaros (M,ω) prekvantinė tiesinė sluoksniuotė, esant masteliui $\hbar$, su glodžiu grupės K veikimu sluoksniuotės visuminėje erdvėje. Šis veikimas turi dengti kojungtinį veikimą daugdaroje M, būti tiesinis ir unitarusis sluoksniuose, išsaugoti sietį ir tenkinti *orbitos normavimo* sąlygą. Šis normavimas reikalauja, kad kiekviename taške $\ell \in M$ stabilizatorius K_ℓ veiktų sluoksnį virš taško ℓ ir šio veikimo diferencialas būtų atvaizdavimas

$$X \mapsto i\ell(X)/\hbar, \qquad X \in \mathrm{Lie}(K_\ell).$$

Orbitos normavimas užfiksuoja infinitezimalųjį pakėlimą. Be šio normavimo vien reikalavimas, kad sluoksniuotėje būtų veikimas, nenustatytų šio veikimo sąryšio su orbitos funkcionalu.

Šiaurės poliuje grupės SU(2) stabilizatorių generuoja vienparametris pogrupis $\exp(tX_3)$, kurio periodas yra 4π. Ekvivariantinėje prekvantinėje sluoksniuotėje šis stabilizatorius veikia sluoksnį charakteriu


$$\exp(tX_3) \longmapsto e^{irt/\hbar} = e^{imt/2}.$$

Ši formulė apibrėžia charakterį tada ir tik tada, kai $m \in \mathbb{Z}$. Tai yra sluoksniuotės $O(m)$ sluoksnio veikimas, nagrinėtas 26-ojoje paskaitoje: ten elementas $t_\theta = \exp(-2\theta X_3)$ veikia daugikliu $e^{-im\theta}$. Natūralusis grupės SU(2) veikimas yra tiesinis sluoksniuose ir išsaugo invariantinę metriką. Kiekvienas elementas $g \in \mathrm{SU}(2)$ veikia holomorfiniu sluoksniuotės atvaizdavimu. Šis atvaizdavimas holomorfinius reperius atvaizduoja į holomorfinius reperius. Atitinkamas holomorfinis koordinačių keitimas formas, turinčias tik narį, proporcingą diferencialui dz, atvaizduoja į tokias pat formas. Todėl elementas g perneša sietį į unitariąją sietį, suderintą su holomorfine struktūra. Pagal vienatinumą pernešta sietis sutampa su pradine. Vadinasi, natūralusis veikimas duoda reikiamą pakėlimą.

Grupėje SO(3) tas pats stabilizatoriaus posūkis turi periodą 2π. Reikalaujamas charakteris yra vienareikšmis tik tada, kai $e^{2\pi ir/\hbar} = 1$, t.y. kai skaičius m yra lyginis. Atvirkščiai, kai skaičius m yra lyginis, centro elementas $-I$ kiekvieną sluoksniuotės $O(m)$ sluoksnį veikia trivialiai, todėl veikimas nusileidžia. Taigi teigiamo spindulio sferai galioja lentelė

įprastinė prekvantinė sluoksniuotė	$m \in \mathbb{Z}$
SU(2)-ekvivariantinė prekvantinė sluoksniuotė	$m \in \mathbb{Z}$
SO(3)-ekvivariantinė prekvantinė sluoksniuotė	$m \in 2\mathbb{Z}$

su sąlyga $m > 0$. Su nelyginiu skaičiumi m sfera, tenkinanti įprastinę sveikumo sąlygą, egzistuoja. Ši sfera nėra kvantuojama ekvivariantiškai globaliosios posūkių grupės SO(3) atžvilgiu. Pirmąsias sferas, tenkinančias sveikumo sąlygą, vaizduoja 27.2 pav.



27.2 pav.: Sferų, tenkinančių sveikumo sąlygą, pjūviai, sužymėti skaičiais $m = 2r/\hbar$, kai spindulys yra $r = \hbar m/2$, ir vieno taško orbita koordinačių pradžioje. Storieji apskritimai atitinka lyginius skaičius m, ir šios sferos turi SO(3)-ekvivariantinį pakėlimą. Žymės ašyje rodo keturis aukščius $x_3 = \frac{\hbar}{2}k$, kur $k = 3, 1, -1, -3$, susietus su įvaizdžio V_3 svoriais. Šis įvaizdis yra sferos $m = 3$ kvantavimas. Tik dvi kraštinės žymės yra tos sferos taškai ašyje.

Fazių keitimai ir nelyginio laipsnio kliūtis

Galima bandyti pakeisti grupės SU(2) pakėlimą fazėmis taip, kad elementas $-I$ veiktų trivialiai. Parodysime, kad šiai sferai su užfiksuota jos sietimi kiekvienas toks fazių pakeitimas yra trivialus.

Šiame skyrelyje veikimas sluoksniuotėje $O(m)$ reiškia glodų veikimą, kuris yra tiesinis ir unitarusis sluoksniuose, kaip ekvivariantinės prekvantinės sluoksniuotės apibrėžime. Tarkime, kad du tokie grupės SU(2) veikimai dengia tą patį sferos veikimą ir išsaugo sietį. Užfiksuokime elementą g ir palyginkime abiejų veikimų sluoksnių atvaizdavimus. Šių atvaizdavimų santykis yra sluoksniuotės automorfizmas, dengiantis tapatųjį atvaizdavimą. Šis automorfizmas yra tiesinis ir unitarusis kiekviename sluoksnyje. Kiekvienas sluoksnis yra kompleksinė tiesė. Todėl santykis yra daugyba iš glodžiosios funkcijos $a_g : S^2 \to \mathrm{U}(1)$. Kadangi abu veikimai išsaugo sietį, galioja lygybė

$$a_g^{-1} da_g = 0.$$

Sfera yra jungi, todėl funkcija a_g yra pastovi. Pažymėkime šią konstantą simboliu $\chi(g)$. Tada iš grupės veikimo dėsnio išplaukia lygybė

$$\chi(gh) = \chi(g)\chi(h).$$

Vadinasi, pakėlimą, išsaugant sietį, galima pakeisti tik susukant jį tolydžiuoju grupės SU(2) charakteriu.

Kiekvienas toks charakteris yra trivialus. Jo diferencialas yra realiųjų Lie algebrų atvaizdavimas iš algebros $\mathfrak{su}(2)$ į Abelio algebrą $i\mathbb{R}$, todėl šis diferencialas anuliuoja skliaustus. Kadangi galioja lygybė

$$[\mathfrak{su}(2), \mathfrak{su}(2)] = \mathfrak{su}(2),$$

šis diferencialas yra lygus nuliui. Kadangi jungiąją grupę SU(2) generuoja eksponentės reikšmės (žr. 2-ąją paskaitą), charakteris yra tapačiai lygus vienetui. Vadinasi, toks fazių pakeitimas negali pakeisti centro veikimo. Todėl natūralusis 26-osios paskaitos veikimas yra vienintelis toks grupės SU(2) veikimas sluoksniuotėje $O(m)$, kuris dengia sferos veikimą ir išsaugo sietį.

Dabar tarkime, kad grupė SO(3) tokiu būdu veiktų sluoksniuotėje $O(m)$. Šio veikimo kompozicija su padengimu $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ duotų tokį grupės SU(2) veikimą, kuriame elementas $-I$ veikia trivialiai. Pagal vienatinumą šis veikimas būtų natūralusis veikimas, kuriame elementas $-I$ kiekvieną sluoksnį veikia daugikliu $(-1)^m$. Todėl, kai skaičius m yra nelyginis, nėra tokio grupės SO(3) veikimo sluoksniuotėje $O(m)$, kuris būtų tiesinis ir unitarusis sluoksniuose, dengtų posūkių veikimą ir išsaugotų sietį. Ši išvada nesiremia orbitos normavimu.

Tai yra 13-osios paskaitos ženklas sluoksnyje. Pakėlimas į grupę SU(2) posūkio kampu 2π apie šiaurės polių yra elementas $-I$, kuris sluoksnį veikia daugikliu $(-1)^m$. Kai skaičius m yra nelyginis, aukščiau pateiktas skaičiavimas rodo, kad joks fazių pakeitimas šio ženklo nepašalina. Todėl nelyginio laipsnio pjūvius grupė SO(3) veikia tik projektyviai, o jos dengiančioji grupė SU(2) veikia kaip įvaizdis.

Vienetinis sukinys: palyginimas su funkcijomis sferoje

Pagal 12-ąją paskaitą funkcijos sferoje turi visus sveikuosius sukinius, o vienetinis sukinys yra jų tiesinė dalis. Sluoksniuotės $O(2)$ holomorfiniai pjūviai turi tik vienetinį sukinį. Palyginsime šias dvi kopijas. Kai $r = \hbar$, sveikasis skaičius yra $m = 2$. Kvantavimas yra trimatė erdvė, kurią sudaro kintamųjų (v_0, v_1) homogeniniai kvadratiniai polinomai

$$F(v_0, v_1) = Av_0^2 + Bv_0v_1 + Cv_1^2.$$

Kitas vienetinio sukinio modelis yra pateiktas 12-ojoje paskaitoje: tai yra tiesinės koordinatinės funkcijos sferoje. Abu modeliai yra izomorfiniai kaip įvaizdžiai, nors sluoksniuotės pjūvis ir skaliarinė funkcija yra skirtingi geometriniai objektai.

Dabar abu modelius sutapatinsime išreikštinai. Užrašykime polinomą pavidalu $F(v) = v^T Qv$ ir apibrėžkime

$$Q = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}, \qquad \epsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T(Q) = \epsilon^{-1}Q = \begin{pmatrix} -B/2 & -C \\ A & B/2 \end{pmatrix}.$$

Taip apibrėžtas atvaizdavimas yra apgręžiamas tiesinis atvaizdavimas iš simetrinių matricų erdvės į bepėdsakių matricų erdvę. Polinomų veikimas matricą Q atvaizduoja į matricą $g^{-T}Qg^{-1}$. Kadangi lygybė $g^T\epsilon g = \epsilon$ galioja visiems $g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, gauname lygybę

$$T(g^{-T}Qg^{-1}) = gT(Q)g^{-1}.$$

Taigi atvaizdavimas T yra kvadratinių pjūvių įvaizdžio ir kompleksifikuoto jungtinio įvaizdžio persipynimo operatorius.

Tegul $Y \in \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$. Tegul ℓ_x yra funkcionalas, kurio koordinatės yra $x_j = \ell_x(X_j)$. Apibrėžkime sferoje tiesinę funkciją formule $f_Y(x) = \ell_x(Y)$. Čia funkcionalas ℓ_x yra pratęstas kompleksiškai tiesiškai. Atitraukę funkciją elementu g^{-1}, gauname

$$f_Y(g^{-1} \cdot x) = \ell_x(\mathrm{Ad}(g)Y) = f_{\mathrm{Ad}(g)Y}(x).$$

Todėl atvaizdavimas, priskiriantis elementui Y funkciją f_Y, yra dar vienas persipynimo operatorius. Trys bazės elementai X_j duoda nepriklausomas funkcijas x_j, todėl šis atvaizdavimas yra izomorfizmas, kurio vaizdas yra visas poerdvis, kurį apvelka šios funkcijos. Kadangi galioja lygybė $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, atvaizdavimas $Q \mapsto f_{T(Q)}$ išreikštinai sutapatina abu vienetinio sukinio modelius. Normuotasis periodas tebėra $m = 2$. Erdvės dimensija yra trys. Veikimas nusileidžia į grupę SO(3).

27.5 Kompaktinė konstrukcija ir poslinkis

Šiame skyrelyje konstrukciją palyginsime su 19-osios paskaitos receptu. Ten poalgebra $\mathfrak{m}$, kuriai $\ell([\mathfrak{m},\mathfrak{m}]) = 0$, davė charakterį χ_ℓ grupės, atitinkančios poalgebrą $\mathfrak{m}$, ir iš šio charakterio indukavome. Algebroje $\mathfrak{su}(2)$, kai funkcionalas ℓ yra nenulinis, šis būdas netinka. Realioji poliarizacija turėtų dimensiją du, o algebra $\mathfrak{su}(2)$ neturi dvimatės poalgebros, nes dviejų nepriklausomų vektorių skliaustai yra statmeni jų plokštumai. Todėl pereiname prie kompleksifikuotos algebros ir imame teigiamąją Borelio poalgebrą.

Sfera iliustruoja bendrą kompaktinį atvejį. Tegul grupė K yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji. Tegul λ yra dominantinis sveikasis svoris pagal realųjį susitarimą $d\chi = i\lambda$. Prisiminkime 26-ojoje paskaitoje pasirinktą teigiamąją Borelio poalgebrą. Mūsų ženklų susitarimai remiasi šiuo pasirinkimu. Pratęskime svorį λ nuliu šakninėmis kryptimis ir imkime orbitą, einančią per tašką $\ell = -\hbar\lambda$. Pagal orbitos normavimą taško ℓ stabilizatorius sluoksnį virš taško ℓ veikia charakteriu, kurio diferencialas yra $-i\lambda$. Pratęstas nuliu šakninėmis kryptimis, funkcionalas ℓ lygus nuliui poalgebroje $[\mathfrak{b},\mathfrak{b}]$, kuri yra teigiamųjų šakninių poerdvių suma. Todėl grupės B charakteris, kurio diferencialas yra $i\ell/\hbar$, yra χ_λ^{-1}. Taigi 19-osios paskaitos taisyklė $f(gm) = \chi_\ell(m)^{-1} f(g)$ tampa taisykle $f(gb) = \chi_\lambda(b) f(g)$, kuri yra 26-osios paskaitos sluoksniuotės L_λ pjūvių taisyklė.

Kai svoris λ yra griežtai dominantinis, stabilizatorius yra maksimalusis toras T. Orbita yra K/T. Sluoksniuotė yra L_λ, apibrėžta 26-ojoje paskaitoje. Pasirinkime orbitos invariantinę kompleksinę struktūrą pagal teigiamąją Borelio poalgebrą. Tada 26-osios paskaitos Borelio–Veilio teorema duoda įvaizdį V_λ^*. Ženklas lygybėje $\ell = -\hbar\lambda$ ir dualumas vienas kitą panaikina. Tegul w_0 yra ilgiausias Veilio grupės elementas, ir pažymėkime $\mu = -w_0\lambda$, t.y. įvaizdžio V_λ^* aukščiausiąjį svorį. Kadangi elementas w_0 turi atstovą grupėje K, orbita, einanti per tašką $-\hbar\lambda$, turi tašką $\hbar\mu$. Taigi neredukuojamas įvaizdis, kurio aukščiausiasis svoris yra μ, priklauso orbitai, einančiai per tašką $\hbar\mu$, o dominantiniai sveikieji svoriai žymi sveikąsias kojungtines orbitas. Grupės SU(2) atveju svoriui m galioja lygybė $\lambda(X_3) = -m/2$, todėl taškas $-\hbar\lambda$ yra spindulio $\hbar m/2$ sferos šiaurės polius. Kai svoris yra kameros sienelėje, stabilizatorius K_ℓ yra didesnis. Tada orbita yra dalinių vėliavų daugdara K/K_ℓ. Analogišką tiesinę sluoksniuotę ir holomorfinių pjūvių rezultatą cituojame pagal Kirillov, 5 skyriaus 2–3 skyrelius. Šios bendrosios geometrinės konstrukcijos čia neįrodinėsime.

Kai imame kitą grupės K globaliąją formą, stabilizatoriaus charakteris turi egzistuoti tos formos stabilizatoriaus grupei. Tai yra ekvivariantinio sveikumo patikra. Ji atkartoja 8-osios paskaitos charakterių gardelės apribojimą. Vien įprastinė periodų sveikumo sąlyga globaliosios formos nenusako.

Kirilovo charakterio formulė, kurios neįrodinėsime, integruoja orbita, einančia per tašką $\lambda + \rho$ (Kirillov, 5 skyrius). Sferoje $r^2 = j^2\hbar^2$, o Kazimiro operatoriaus reikšmė yra $j(j+1)\hbar^2 = \big((j+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}\big)\hbar^2$. Taigi poslinkis atsiranda kvantinėse formulėse, o ne orbitoje.

Šioje konstrukcijoje nenaudojome poslinkio svoriu ρ. Sferoje orbitos žymė yra m. Nepataisytos pjūvių erdvės dimensija yra $m+1$. Vis dėlto charakteryje atsiranda dydis $m+1$:

$$\chi_m(t_\theta) = \sum_{k=0}^{m} e^{i(m-2k)\theta} = \frac{\sin((m+1)\theta)}{\sin\theta} \qquad (\sin\theta \neq 0).$$

Tai yra Veilio charakterio formulė su žinomu skaitikliu, kuriame yra svoris $\lambda+\rho$. Ji nerodo, kad anksčiau nagrinėtos prekvantinės orbitos žymė buvo $m+1$. Pusformių pataisos yra kita konstrukcija, kuriai taip pat reikia susitarimo. Neprivalomas Uždavinys 27.6 parodo vieną tokį pasirinkimą sferoje. Niekas šioje paskaitoje nuo šio uždavinio nepriklauso.

Savikontrolė

1. Raskite normuotąjį periodą ir kvantuotąjį įvaizdį, kai $r = 3\hbar/2$.

Atsakymas. Periodas, padalytas iš dydžio $2\pi\hbar$, yra lygus $2r/\hbar = 3$. Sluoksniuotė yra $\mathcal{O}(3)$. Jos pjūviai duoda įvaizdį V_3, kurio dimensija yra keturi ir sukinys yra $3/2$.

2. Ar toji sfera turi $\mathrm{SO}(3)$-ekvivariantinį prekvantinį pakėlimą su orbitos normavimu?

Atsakymas. Ne. Jos stabilizatoriaus charakterio reikšmės būtų $e^{3it/2}$ posūkiui, kurio periodas yra 2π. Šis charakteris įgyja reikšmę -1, kai $t = 2\pi$.

3. Kodėl sietis gali turėti lokaliuosius potencialus, nors globaliojo potencialo nėra?

Atsakymas. Dviejų lokaliųjų potencialų skirtumas yra perėjimo funkcijos logaritminis diferencialas. Nenulinis kreivumo periodas neleidžia egzistuoti vienai globaliajai pirmykštei formai, tačiau yra suderinamas su šiais lokaliaisiais potencialais.

Santrauka

Grupės $\mathrm{SU}(2)$ spindulio $r > 0$ orbitos simplektinis plotas yra $4\pi r$. Prekvantavimui reikia, kad skaičius $m = 2r/\hbar$ būtų sveikasis. Sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ holomorfiniai pjūviai duoda sukinį $m/2$. Ekvivariantiškumui grupės $\mathrm{SO}(3)$ atžvilgiu papildomai reikia, kad skaičius m būtų lyginis. Įprastinis periodas, globalusis ekvivariantinis pakėlimas ir holomorfinė atranka yra atskiri žingsniai. Orbita, einanti per tašką $-\hbar\lambda$, ir Borelio–Veilio dualusis įvaizdis V_λ^* kartu priskiria įvaizdį V_μ orbitai, einančiai per tašką $\hbar\mu$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju taip įvaizdis V_m priskiriamas spindulio $\hbar m/2$ sferai.

Literatūra

Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*: 1 skyriaus 2.4 skyrelis yra skirtas sveikumui, o 5 skyriaus 2–3 skyreliai – kompaktinėms orbitoms, holomorfinėms konstrukcijoms ir charakterių formulėms. Sepanski, *Compact Lie Groups*, 7.4 skyrelis: jame suformuluota Borelio–Veilio teorema, įrodyta 26-ojoje paskaitoje.

Paskaita 28

Rekonstrukcija ir kvantinių grupių riba

Tikslai. *Grupė, jos koeficientų algebra ir jos tenzoriniai įvaizdžiai skirtingais pavidalais užkoduoja tą pačią globaliąją informaciją. Diferencijavimas susieja šiuos aprašymus su gaubiančiąja algebra. Tačiau diferencijavimas praranda informaciją, jei leistinieji grupės įvaizdžiai nėra išsaugomi. Šį ryšį užrašysime išreikštiniu pavidalu ir nurodysime struktūras, kurias deformuos vėlesnis kvantinių grupių kursas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti porinimą tarp algebros $U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$ ir reprezentatyviųjų funkcijų, laikantis teisingos daugybos tvarkos.
- Paaiškinti, kodėl jungios grupės K reprezentatyviosios funkcijos sudaro tik tam tikrą algebrinės dualiosios erdvės dalį, ir parodyti, kad vienajungės grupės K atveju jos užpildo visą baigtinę dualiąją erdvę.
- Atkurti kompaktines ir kompleksines grupes iš atitinkamų tenzorinių automorfizmų.
- Nustatyti, kokie globalieji duomenys išlieka po diferencijavimo, remiantis apskritimu ir grupių pora $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{SO}(3)$.

28.1 Dvi algebros

Tegul K yra kompaktinė Lie grupė ir $\mathfrak{k}$ yra jos realioji Lie algebra. Kaip ir 14-oje paskaitoje, erdvę $\mathcal{R}(K)$ apvelka koeficientai

$$c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda(\Pi_V(g)v), \qquad \lambda \in V^*,\ v \in V,$$

apibrėžti baigtinės dimensijos tolydiesiems kompleksiniams įvaizdžiams. Kiekviena koeficientų suma yra vienas tiesioginės sumos koeficientas. Šios erdvės Hopfo struktūra yra

$$\Delta_{\mathcal{R}} f(g,h) = f(gh), \qquad \varepsilon_{\mathcal{R}} f = f(e), \qquad S_{\mathcal{R}} f(g) = f(g^{-1}), \qquad f^*(g) = \overline{f(g)}.$$

Šios formulės ir jomis apibrėžtų atvaizdavimų reikšmių sritys buvo įrodytos 14-oje paskaitoje. Naudojame įprastą algebrinę tenzorinę sandaugą. Taigi elementas $\Delta_{\mathcal{R}} f$ yra baigtinė tenzorių suma, o ne begalinis skleidinys.

Antrąją pusę sudaro universalioji gaubiančioji algebra iš kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“. Įveskime jos žymėjimą $U = U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$. Šią algebrą generuoja Lie algebra $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ su sąryšiais $XY - YX = [X,Y]$. Standartinius jos Hopfo atvaizdavimus nusako lygybės

$$\Delta_U X = X \otimes 1 + 1 \otimes X, \qquad \varepsilon_U X = 0, \qquad S_U X = -X. \tag{28.1}$$

Fizikoje pirmoji taisyklė yra sukinių sudėties taisyklė. Čia atvaizdavimus Δ_U ir ε_U pratęsiame kaip algebrų homomorfizmus. Antipodą S_U pratęsiame taip, kad jis sandaugose apverstų dauginamųjų tvarką. Šis pratęsimas yra gerai apibrėžtas, nes, apvertus apibrėžiantįjį sąryšį, reiškinys $XY - YX - [X,Y]$ pereina į reiškinį $YX - XY + [X,Y]$, kuris algebroje U taip pat lygus nuliui. Patikrinkime, kad atvaizdavimas Δ_U yra suderintas su apibrėžiančiuoju sąryšiu:

$$[\Delta_U X, \Delta_U Y] = [X,Y] \otimes 1 + 1 \otimes [X,Y] = \Delta_U [X,Y].$$

Elementai, esantys skirtinguose tenzoriniuose dauginamuosiuose, komutuoja, todėl mišrieji nariai išnyksta. Koasociatyvumą ir kovieneto tapatybes pakanka patikrinti generatoriams, nes šie atvaizdavimai yra algebrų homomorfizmai.

Antipodo tapatybės elementui X galioja, nes $-X + X = 0$. Jas galima pratęsti sandaugoms. Tarkime, kad jos galioja elementams u ir v. Tada

$$\begin{aligned}\sum S_U(u_{(1)}v_{(1)})u_{(2)}v_{(2)} &= \sum S_U(v_{(1)})S_U(u_{(1)})u_{(2)}v_{(2)} \\ &= \varepsilon_U(u)\sum S_U(v_{(1)})v_{(2)} = \varepsilon_U(u)\varepsilon_U(v)1.\end{aligned}$$

Pirmoji lygybė remiasi tuo, kad antipodas S_U sandaugose apverčia dauginamųjų tvarką. Antroji lygybė remiasi tapatybe elementui u. Trečioji remiasi tapatybe elementui v. Kitą antipodo tapatybę įrodome taip pat.

Šios dvi algebros pasižymi priešingų rūšių komutatyvumu. Koeficientų algebra yra komutatyvi. Ji yra kokomutatyvi tada ir tik tada, kai grupė K yra Abelio, nes koeficientai atskiria taškus. Gaubiančioji algebra yra kokomutatyvi, kaip rodo generatorių formulės (28.1). Tačiau bendruoju atveju ji yra nekomutatyvi.

Kompaktinė realioji forma taip pat apibrėžia algebros U involiuciją formule $X^* = -X$ realiesiems elementams $X \in \mathfrak{k}$. Šią involiuciją pratęsiame antitiesiškai pagal taisyklę $(uv)^* = v^*u^*$. Kai elementai X, Y yra realieji, pritaikę operaciją $*$ apibrėžiančiajam sąryšiui, gauname reiškinį $YX - XY + [X,Y]$, kuris taip pat lygus nuliui. Taigi operacija $*$ yra gerai apibrėžta. Pritaikyta du kartus, ši operacija nekeičia generatorių, todėl ji yra involiucija.

Kiekviename baigtinės dimensijos unitariajame įvaizdyje galioja lygybė

$$d\Pi(u^*) = d\Pi(u)^*.$$

Pirmiausia ši lygybė išplaukia realiesiems generatoriams, kurių operatoriai yra antisavijungiai. Paskui ji išplaukia sumoms ir sandaugoms. Involiucija išsaugo informaciją apie kompaktinę realiąją formą jos kompleksifikacijoje.

28.2 Koeficientų diferencijavimas

Apibrėžkime kiekvienam elementui $X \in \mathfrak{k}$ operatorių

$$(R_X f)(g) = \left.\frac{d}{dt}\right|_0 f(g\exp(tX)).$$

Tai yra 1-osios paskaitos kairiai invariantinis vektorinis laukas X^L, veikiantis funkcijas. Raidė R nurodo daugybą iš dešinės funkcijos argumente. Šis operatorius skiriasi nuo dešiniojo reguliariojo grupės veikimo, nors, išdiferencijavę tą veikimą, gauname būtent šį operatorių.

Pagal 1-ąją paskaitą galioja lygybė $[R_X, R_Y] = R_{[X,Y]}$. Todėl pagal algebros U universaliąją savybę šiuos operatorius galima pratęsti iki operatorių R_u, kur $u \in U$.

Apibrėžimas 28.1. *Koeficientų porinimas* yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule

$$\langle u, f\rangle = (R_u f)(e), \qquad u \in U,\ f \in \mathcal{R}(K).$$

Koeficientų porinimas yra kompleksiškai bitiesinis. Jo kampiniai skliaustai žymi porinimą, o ne ermitinę skaliarinę sandaugą. Kai elementas X yra realusis, reikšmė $\langle X^k, f\rangle$ yra k-oji išvestinė taške 0 funkcijos $t \mapsto f(\exp tX)$. Šie porinimai užrašo funkcijos f Teiloro išvestines taške e. Bendrajam elementui u porinimas yra baigtinis tokių išvestinių tiesinis darinys. Tiesiogiai išdiferencijavę koeficientą, gauname

$$R_X c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda(\Pi_V(g) d\Pi_V(X) v), \qquad \langle u, c^V_{\lambda,v}\rangle = \lambda(d\Pi_V(u) v). \tag{28.2}$$

Antrąją tapatybę pirmiausia gauname generatorių sandaugoms. Bendrasis atvejis išplaukia iš tiesiškumo. Kadangi porinimas buvo apibrėžtas funkcijoms diferencialiniais operatoriais, jis nepriklauso nuo pasirinktos koeficiento išraiškos.

Dauginamųjų tvarka yra svarbi. Dviem realiesiems generatoriams $X, Y \in \mathfrak{k}$ galioja lygybė

$$\langle XY, f\rangle = \partial_t \partial_s|_0 f(\exp(tX)\exp(sY)).$$

Patikrinkime tai koeficientui: kai $f = c^V_{\lambda,v}$, turime $R_X R_Y f(g) = \lambda(\Pi_V(g) d\Pi_V(X) d\Pi_V(Y) v)$. Sukeitus elementus X ir Y vietomis, matricų sandaugos tvarka pasikeistų į priešingą. Atėmę elemento YX ir funkcijos f porinimą iš elemento XY ir funkcijos f porinimo, gauname $\langle [X,Y], f\rangle$.

Teiginys 28.2 (Hopfo porinimo tapatybės)**.** *Užrašykime baigtines kosandaugas pavidalu* $\Delta_U u = \sum u_{(1)} \otimes u_{(2)}$ *ir* $\Delta_{\mathcal{R}} f = \sum f_{(1)} \otimes f_{(2)}$. *Tada galioja tapatybės*

$$\begin{aligned}
\langle ab, f\rangle &= \sum \langle a, f_{(1)}\rangle\langle b, f_{(2)}\rangle,\\
\langle u, fh\rangle &= \sum \langle u_{(1)}, f\rangle\langle u_{(2)}, h\rangle,\\
\langle 1, f\rangle &= \varepsilon_{\mathcal{R}} f, \qquad \langle u, 1\rangle = \varepsilon_U u,\\
\langle S_U u, f\rangle &= \langle u, S_{\mathcal{R}} f\rangle.
\end{aligned}$$

Įrodymas. Pasirinkime bazę (e_j) erdvėje V ir dualiąją bazę (e^j). Kai $f = c^V_{\lambda,v}$, turime

$$\Delta_{\mathcal{R}} f = \sum_j c^V_{\lambda,e_j} \otimes c^V_{e^j,v}.$$

Įstatę šią išraišką į pirmosios tapatybės dešiniąją pusę, gauname

$$\sum_j \lambda(d\Pi(a) e_j)\, e^j(d\Pi(b) v) = \lambda(d\Pi(a) d\Pi(b) v).$$

Pagal koeficientų formulę (28.2) ši reikšmė lygi $\langle ab, f\rangle$.

Antrosios tapatybės įrodymui reikalinga lygybė $R_X(fh) = (R_X f)h + f(R_X h)$ yra įprasta Leibnico taisyklė. Pakartotinai taikydami šią taisyklę, gauname būtent kosandaugą (28.1). Pavyzdžiui,

$$\Delta_U(XY) = XY \otimes 1 + X \otimes Y + Y \otimes X + 1 \otimes XY.$$

Taigi įvertinimas taške e įrodo teiginį kiekvienai sandaugai, todėl ir kiekvienam elementui u. Tapatybė $\langle 1, f\rangle = \varepsilon_{\mathcal{R}} f$ išplaukia iš to, kad operatorius R_1 yra tapatusis. Diferencijuodami konstantas, gauname tapatybę $\langle u, 1\rangle = \varepsilon_U u$.

Galiausiai pažymėkime simboliu $\Pi^\vee$ dualųjį įvaizdį erdvėje V^*, apibrėžtą formule $\Pi^\vee(g)\mu = \mu \circ \Pi_V(g)^{-1}$. Funkcija, išreiškiama formule $S_{\mathcal{R}} c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda(\Pi_V(g)^{-1}v)$, yra įvaizdžio $\Pi^\vee$ koeficientas su vektoriumi λ ir su funkcionalu, kuris yra įvertinimas taške v. Erdvėje V^* realusis generatorius veikia pagal formulę $d\Pi^\vee(X)\mu = -\mu \circ d\Pi(X)$. Kiekvienam elementui $u \in U$ galioja lygybė

$$d\Pi^\vee(u)\mu = \mu \circ d\Pi(S_U u).$$

Ši lygybė galioja generatoriams. Ją galima multiplikatyviai pratęsti, nes antipodas S_U sandaugose apverčia dauginamųjų tvarką. Pritaikykime koeficientų formulę (28.2) pirmiausia šiam įvaizdžio $\Pi^\vee$ koeficientui ir tada koeficientui $c^V_{\lambda,v}$. Abi paskutinės teiginio tapatybės pusės yra lygios $\lambda(d\Pi(S_U u)v)$. Tai įrodo antipodo tapatybę. ∎

Taigi dėl porinimo kiekvienos algebros sandauga tampa dualia kitos algebros kosandaugai. Šiuo algebriniu pavidalu porinimas susieja infinitezimalųjį veikimą su grupės daugyba. Teiginys netvirtina, kad viena iš šių algebrų yra visa kitos algebros tiesinė dualioji erdvė.

Nekomutatyvus skaičiavimas

Imkime grupę $K = \mathrm{SU}(2)$. Šiuo atveju galioja lygybė $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. Tvarkos tapatybę patikrinsime šios grupės apibrėžiančiajame įvaizdyje. Apibrėžkime matricas

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Tai yra kompleksifikuotieji generatoriai. Išvestinę pratęsiame kompleksiškai tiesiškai. Netvirtiname, kad matrica $\exp(tE)$ priklauso grupei $\mathrm{SU}(2)$, kai skaičius t yra realusis. Tegul funkcijos, apibrėžtos formule $D_{ij}(g) = g_{ij}$, yra šios grupės apibrėžiančiojo įvaizdžio koeficientai. Tada

$$EF = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad FE = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Iš to išplaukia, kad $\langle EF, D_{11}\rangle = 1$, o $\langle FE, D_{11}\rangle = 0$. Šių reikšmių skirtumas yra $\langle H, D_{11}\rangle = 1$. Todėl porinimas atskiria elementą EF nuo elemento FE algebroje U, nors kitas porinimo argumentas priklauso komutatyviajai funkcijų algebrai.

Koeficientų kosandauga duoda tą patį atsakymą:

$$\Delta_{\mathcal{R}} D_{11} = D_{11} \otimes D_{11} + D_{12} \otimes D_{21}.$$

Suporavę pirmąjį tenzorinį dauginamąjį su matrica E, o antrąjį su matrica F, gauname

$$E_{11}F_{11} + E_{12}F_{21} = 0 + 1 = 1.$$

Suporavę pirmąjį dauginamąjį su matrica F, o antrąjį su matrica E, gauname nulį. Taigi komutatyvi algebra gali turėti kosandaugą, kuri užkoduoja nekomutatyvią grupės operaciją. Pats sandaugos komutatyvumas dar nenulemia kosandaugos kokomutatyvumo.

Reguliarieji veikimai koeficientams

Apibrėžkime operatorius formulėmis $L_g f(x) = f(g^{-1}x)$ ir $R_g f(x) = f(xg)$, kaip ir paskaitose apie harmoninę analizę kompaktinėse grupėse. Čia simbolis R_g žymi grupės veikimą. Simboliai R_X ir R_u žymi diferencialinius operatorius. Pastumtųjų koeficientų porinimus išreiškia formulės

$$\langle u, L_g c_{\lambda,v}\rangle = \lambda\big(\Pi(g^{-1})d\Pi(u)v\big),$$
$$\langle u, R_g c_{\lambda,v}\rangle = \lambda\big(d\Pi(u)\Pi(g)v\big).$$

Pirmojoje formulėje funkcija $L_g c$ yra koeficientas su funkcionalu $\lambda \circ \Pi(g^{-1})$. Antrojoje formulėje koeficiento $R_g c$ vektorius yra $\Pi(g)v$. Įstatę šiuos duomenis į koeficientų formulę (28.2), įrodome abi tapatybes, nekeldami jokio klausimo apie operatorių apibrėžimo sritis.

Atkreipkime dėmesį į grupės matricos ir išvestinės matricos padėtis. Kairysis postūmis keičia dualųjį kintamąjį. Dešinysis postūmis keičia vektorinį kintamąjį. Tai yra ta pati tenzorinė tvarka $V^* \otimes V$, kurią matėme Peterio–Veilio teoremoje. Porinimas su gaubiančiąja algebra tęsia šį susitarimą ir neįveda antrojo.

28.3 Ką apima dualioji erdvė

Bet kurios algebros A su vienetu *baigtinė dualioji erdvė* A° susideda iš funkcionalų, kurie išnyksta kuriame nors baigtinės kodimensijos dvipusiame ideale. Lygiavertiškai, šie funkcionalai yra baigtinės dimensijos A-modulių matriciniai koeficientai. Pateikiame elementarų šio lygiavertiškumo pagrindimą.

Baigtinės dimensijos modulis apibrėžia homomorfizmą $A \to \mathrm{End}(V)$, kurio branduolio kodimensija yra baigtinė. Kiekvienas koeficientas tame branduolyje išnyksta. Atvirkščiai, jei funkcionalas φ išnyksta tokiame ideale I, imkime baigtinės dimensijos reguliarųjį modulį A/I, vektorių $1 + I$ ir funkcionalą $\bar{\varphi}$. Tada galioja lygybė $\varphi(a) = \bar{\varphi}(a(1 + I))$.

Todėl pagal koeficientų formulę (28.2) porinimas atvaizduoja erdvę $\mathcal{R}(K)$ į erdvę U°. Šiame vaizde dalyvauja tik tie moduliai, kuriuos galima integruoti iki pasirinktos kompaktinės grupės įvaizdžių. Algebros $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ baigtinės dimensijos įvaizdis neprivalo paisyti grupės K periodų ar centrinės faktorgrupės nustatomų apribojimų.

> **Teiginys 28.3** (Injektyvumas jungioms grupėms)**.** *Jei grupė K yra jungi, tai porinimo apibrėžtas atvaizdavimas $\mathcal{R}(K) \to U^\circ$ yra injektyvus.*

Įrodymas. Tarkime, kad lygybė $\langle u, f\rangle = 0$ galioja kiekvienam elementui u. Kadangi kiekviena koeficientų suma yra vienas tiesioginės sumos koeficientas, galime laikyti, kad $f = c^V_{\lambda,v}$. Paimkime bet kokį baigtinį elementų sąrašą $X_1, \dots, X_s \in \mathfrak{k}$ ir išskleiskime baigtinės dimensijos matricų eksponentes reiškinyje

$$f(\exp(t_1X_1)\cdots\exp(t_sX_s)) = \lambda\big(e^{t_1 d\Pi(X_1)}\cdots e^{t_s d\Pi(X_s)}v\big).$$

Šios laipsninės eilutės absoliučiai konverguoja su kiekvienu realiuoju ar kompleksiniu rinkiniu $(t_1, \dots, t_s)$. Monomo $t_1^{a_1}\cdots t_s^{a_s}$ Teiloro koeficientas yra

$$\frac{\langle X_1^{a_1}\cdots X_s^{a_s}, f\rangle}{a_1!\cdots a_s!} = 0.$$

Taigi aukščiau išrašyta funkcija lygi nuliui su visais realiaisiais rinkiniais. Jungią Lie grupę generuoja jos eksponentės (2-oji paskaita), todėl $f = 0$ grupėje K. ∎

Kai grupė K yra nejungi, tas pats samprotavimas duoda informaciją tik apie neutraliojo elemento komponentę. Koeficientas gali būti lygus nuliui šioje komponentėje ir nelygus nuliui kitur. Taigi jungumo prielaidos negalima tiesiog atsisakyti.


Pavyzdys 28.4 (Apskritimas)**.** Tegul $K = \mathrm{U}(1)$. Pasirinkime elementą X, kuriam galioja lygybė $\exp(tX) = e^{it}$. Tada

$$U = \mathbb{C}[X], \qquad \mathcal{R}(K) = \mathbb{C}[z, z^{-1}], \qquad \langle X^k, z^n \rangle = (in)^k.$$

Vaizdą sudaro įvertinimo funkcionalų $p(X) \mapsto p(in)$, kur $n \in \mathbb{Z}$, baigtiniai tiesiniai dariniai. Baigtinė dualioji erdvė yra didesnė. Įvertinimas taške $X = 1$ priklauso erdvei U°, tačiau nepriklauso šiam vaizdui. Jei šis įvertinimas būtų tiesinis darinys, kurio atramą sudaro skaičiai $n_1, \ldots, n_s$, tai šis tiesinis darinys polinomui, apibrėžtam formule $p(X) = \prod_j (X - in_j)$, suteiktų nulinę reikšmę, nors $p(1) \neq 0$.

Visa tiesinė dualioji erdvė yra dar didesnė. Jai priklauso funkcionalas L, apibrėžtas formule $L(X^k) = k!$. Pagal aukščiau įrodytą lygiavertiškumą kiekvienas erdvės U° elementas yra kurio nors baigtinės dimensijos modulio matricinis koeficientas. Tarkime, kad elementas X tame modulyje veikia operatoriumi A ir kad koeficientas naudoja vektorių v ir funkcionalą λ. Tada šio koeficiento reikšmė yra $\lambda(A^k v)$, kai jį taikome elementui X^k. Pasirinkime modulyje normą ir ją atitinkančias operatorių bei dualiąją normas. Tada šios reikšmės modulis neviršija dydžio $C\|A\|^k$, kur $C = \|\lambda\|\|v\|$. Seka $k!$ tokio eksponentinio įverčio neturi. Taigi funkcionalas L nepriklauso net erdvei U°.

Šiuos funkcionalus erdvėje $U = \mathbb{C}[X]$ kintamojo X plokštumoje vaizduoja 28.1 pav. Taškas vietoje X_0 reiškia įvertinimą $p(X) \mapsto p(X_0)$.



28.1 pav.: Funkcionalai erdvėje $\mathbb{C}[X]$. Užpildyti taškai $X_0 = in$, kur $n \in \mathbb{Z}$, apvelka erdvės $\mathcal{R}(\mathrm{U}(1))$ vaizdą. Apskritimais apjuosti taškai $X_0 = 2in$ apvelka apskritimo faktorgrupės pagal pogrupį μ_2 vaizdą. Ši faktorgrupė nagrinėjama vėliau šioje paskaitoje. Kryželis taške $X_0 = 1$ priklauso erdvei U°, bet nepriklauso vaizdui. Rodyklė taške i žymi funkcionalą $p \mapsto p'(i)$, kurį duoda Uždavinio 28.3 Žordano blokas. Šis funkcionalas priklauso erdvei U° ir skiriasi nuo įvertinimo taške i.

28.4 Globaliosios formos ir tenzorinė rekonstrukcija

Grupių SU(2) ir SO(3) realiosios Lie algebros yra izomorfinės. Todėl, sutapatinus šias algebras, abiejų grupių kompleksinė gaubiančioji algebra yra ta pati. Šių grupių koeficientų algebros išsaugo skirtingus įvaizdžius. Atitraukimas per atvaizdavimą $p : \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ duoda lygybę

$$p^*\mathcal{R}(\mathrm{SO}(3)) = \{f \in \mathcal{R}(\mathrm{SU}(2)) : f(-g) = f(g)\}. \tag{28.3}$$

Taip yra todėl, kad įvaizdis nusileidžia tada ir tik tada, kai elementas $-I$ veikia trivialiai. Erdvėje V_m šis elementas veikia daugyba iš skaičiaus $(-1)^m$. Todėl algebrinis Peterio–Veilio skaidinys sutapatina dešiniąją pusę būtent su koeficientų blokais, atitinkančiais lyginius indeksus m. Nelyginiai blokai yra pašalinti, o ne anuliuoti diferencijuojant. Abi koeficientų algebros yra injektyviai atvaizduojamos į tą pačią baigtinę dualiąją erdvę, tačiau jų vaizdai yra skirtingi.

Grupės SU(2) atveju vaizdas užpildo visą baigtinę dualiąją erdvę. Bendriau, tegul grupė K yra kompaktinė, jungi ir vienajungė. Baigtinės dimensijos algebros U modulis apribojamas iki Lie algebrų atvaizdavimo iš algebros $\mathfrak{k}$ į algebrą $\mathfrak{gl}(V)$. Pagal 4-osios paskaitos integravimo teoremą šis atvaizdavimas yra grupės K įvaizdžio diferencialas. Taigi kiekvienas erdvės U° elementas yra grupės K įvaizdžio koeficientas. Kartu su Teiginiu 28.3 tai rodo, kad porinimas sutapatina erdvę $\mathcal{R}(K)$ su erdve U°. Taigi erdvė U° duoda grupę $K_{\mathbb{C}}$, kurios taškai pagal 14-ąją paskaitą yra algebros $\mathcal{R}(K)$ charakteriai, o pirmojo skyrelio involiucija išrenka grupę K. Involiucija yra būtina: algebra $U(\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}))$ yra ir algebros $\mathfrak{su}(1,1)$ kompleksifikacijos gaubiančioji algebra. Koeficientų algebra duoda papildomos informacijos torų ir centrinių faktorgrupių atvejais. Apskritimo pavyzdys rodo torą, o lygybė (28.3) rodo faktorgrupę.

Išsaugokime grupės K baigtinės dimensijos tolydžiųjų kompleksinių įvaizdžių kategoriją, visus šios kategorijos persipynimo operatorius ir jos užmiršimo funktorių ω, kad galėtume atkurti grupę. Šis funktorius kiekvienam įvaizdžiui priskiria jo pagrindinę tiesinę erdvę, o kiekvienam persipynimo operatoriui – jo tiesinį atvaizdavimą.

Šios kategorijos morfizmai yra persipynimo operatoriai. Funktoriaus ω *tenzorinis automorfizmas* yra atvaizdavimų $\theta_V \in \mathrm{GL}(V)$ šeima, po vieną kiekvienam įvaizdžiui V, tokia, kad

$$\theta_W T = T\theta_V \quad \text{su kiekvienu morfizmu } T : V \to W, \qquad \theta_{V\otimes W} = \theta_V \otimes \theta_W, \qquad \theta_{\mathbb{C}} = 1.$$

Čia simbolis $\mathbb{C}$ žymi trivialųjį įvaizdį. Tenzorinis automorfizmas vadinamas *unitariuoju*, jei kiekvienas atvaizdavimas θ_V yra unitarusis kiekvienos invariantinės skaliarinės sandaugos erdvėje V atžvilgiu. Pažymėkime simboliu $\mathrm{Aut}_\otimes(\omega)$ tenzorinių automorfizmų grupę, o simboliu $\mathrm{Aut}^u_\otimes(\omega)$ – jos pogrupį, sudarytą iš unitariųjų tenzorinių automorfizmų.

Kiekvienas elementas $g \in K$ duoda unitarųjį tenzorinį automorfizmą, apibrėžtą formule $\theta_V = \Pi_V(g)$. Tenzorinį automorfizmą θ atitinka algebrų homomorfizmas $\mathcal{R}(K) \to \mathbb{C}$, apibrėžtas taisykle $c^V_{\lambda,v} \mapsto \lambda(\theta_V v)$. Unitariuosius tenzorinius automorfizmus atitinka $*$-homomorfizmai. Šią atitiktį įrodo Uždaviniai 14.4–14.5.

Tegul $K_{\mathbb{C}}$ yra grupės K kompleksifikacija, įvesta 14-oje paskaitoje. Ši kompleksifikacija yra kompleksinė Lie grupė. Jos neutraliojo elemento komponentė yra reduktyvi. Rekonstrukcijos

teorema yra cituojama iš Brėkerio ir tom Dyko knygos (Bröcker–tom Dieck, skyreliai III.7–8). Ši teorema nustato izomorfizmus

$$K \cong \mathrm{Aut}^u_\otimes(\omega), \qquad K_\mathbb{C} \cong \mathrm{Aut}_\otimes(\omega).$$

Kompaktinė grupė turi taškinio konvergavimo topologiją įvaizdžių erdvėse. Žodžiais tariant, kiekvienas unitarusis tenzorinis automorfizmas yra pavidalo $\Pi_V(g)$ su vieninteliu elementu $g \in K$. Kiekvienas tenzorinis automorfizmas yra nusakomas vieninteliu grupės $K_\mathbb{C}$ elementu, kuris veikia per įvaizdžių Π_V holomorfinius pratęsinius į grupę $K_\mathbb{C}$. Unitarumo sąlyga atskiria kompaktinę atkuriamąją grupę nuo jos kompleksifikacijos.

Nagrinėkime apskritimą. Pažymėkime simboliu $\mathbb{C}_n$ vienmatį įvaizdį $z \mapsto z^n$, apibrėžtą grupėje $\mathrm{U}(1)$, kur $n \in \mathbb{Z}$. Kiekvienas grupės $\mathrm{U}(1)$ baigtinės dimensijos įvaizdis yra šių įvaizdžių kopijų tiesioginė suma. Dėl natūralumo automorfizmas θ kiekvieną įvaizdžio $\mathbb{C}_n$ kopiją veikia daugyba iš to paties skaliaro $a_n \in \mathbb{C}^\times$. Tenzorinė taisyklė, izomorfizmas $\mathbb{C}_m \otimes \mathbb{C}_n \cong \mathbb{C}_{m+n}$ ir vieneto taisyklė duoda lygybes $a_{m+n} = a_m a_n$ ir $a_0 = 1$. Todėl galioja lygybė $a_n = a^n$, kur $a = a_1 \in \mathbb{C}^\times$. Kiekvienas toks skaičiaus a pasirinkimas apibrėžia tenzorinį automorfizmą. Šis tenzorinis automorfizmas yra unitarusis tada ir tik tada, kai $|a| = 1$. Taip atkuriame atitinkamai grupes $\mathbb{C}^\times$ ir $\mathrm{U}(1)$.

Nagrinėkime grupę $\mathrm{SU}(2)$. Tegul $V = \mathbb{C}^2$ yra jos apibrėžiantysis įvaizdis. Alternuojantysis tenzorius $e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$ yra invariantinis. Kadangi galioja lygybės $\theta_{V\otimes V} = \theta_V \otimes \theta_V$ ir $\theta_\mathbb{C} = 1$, natūralumo sąlyga persipynimo operatoriui, kuris yra apibrėžtas šiuo tenzoriumi ir veikia iš įvaizdžio $\mathbb{C}$, reikalauja, kad operatorius $\theta_V \otimes \theta_V$ išsaugotų šį tenzorių. Operatorius $\theta_V \otimes \theta_V$ šį tenzorių daugina iš skaičiaus $\det \theta_V$, todėl gauname $\det \theta_V = 1$. Kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis yra įvaizdžio V simetrinis laipsnis. Likusią tenzorinio automorfizmo dalį nulemia tiesioginės sumos ir persipynimo operatoriai.

Atvirkščiai, pasinaudojus 14-osios paskaitos kompleksifikacija, kiekviena matrica $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ veikia šias tenzorines konstrukcijas ir apibrėžia tenzorinį automorfizmą. Todėl kompleksinė atkuriamoji grupė yra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Pareikalavę unitarumo erdvėje V, gauname grupę $\mathrm{SU}(2)$. Lyginių svorių kategorijoje centrinis elementas $-I$ veikia kaip tapatusis tenzorinis automorfizmas, todėl rekonstrukcija duoda ne pačią grupę, o globaliąją faktorgrupę.

Apskritimo faktorgrupė ir jos įvaizdžių gardelė

Yra ir mažesnis globaliosios informacijos koeficientų poalgebroje pavyzdys. Tegul $\mu_N \subset \mathrm{U}(1)$ yra N-tojo laipsnio vieneto šaknų pogrupis. Faktorgrupė vėl yra apskritimas. Tačiau laikykime faktorinį atvaizdavimą ir Lie algebrų sutapatinimą fiksuotais. Charakteris z^n nusileidžia per šį atvaizdavimą tada ir tik tada, kai

$$\zeta^n = 1 \quad \text{su kiekvienu } \zeta \in \mu_N, \qquad \text{arba lygiavertiškai } N \mid n.$$

Taigi atitrauktoji koeficientų algebra yra

$$\mathbb{C}[z^N, z^{-N}] \subset \mathbb{C}[z, z^{-1}].$$

Su tuo pačiu infinitezimaliuoju porinimu jos įvertinimo taškai sudaro aibę $iN\mathbb{Z}$, o ne aibę $i\mathbb{Z}$. Šių dviejų apskritimų realiosios Lie algebros yra izomorfinės. Tačiau faktorinis atvaizdavimas pakeitė, kurių periodų turi paisyti įvaizdis. Abstraktaus Lie algebrų izomorfizmo mastelio keitimas nepanaikina nurodyto faktorinio atvaizdavimo.

Ši poalgebra lieka uždara Hopfo operacijų atžvilgiu. Jos generatoriui $w = z^N$ galioja lygybės

$$\Delta w = w \otimes w, \qquad \varepsilon w = 1, \qquad Sw = w^{-1}, \qquad w^* = w^{-1}.$$

Rekonstrukcija iš šios algebros ir jos unitariosios struktūros atkuria faktorgrupę, kuri yra apskritimas, kartu su šios faktorgrupės įvaizdžių gardele. Tas pats skaičiavimas su lyginiais aukščiausiaisiais svoriais duoda skirtumą tarp grupių $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$. Abiem atvejais, išlaikant tą pačią Lie algebrą, bet keičiant leistinąją koeficientų poalgebrą, pasikeičia globalusis įvaizdžių uždavinys.

28.5 Ką keičia kvantinių grupių kursas

Aukščiau aprašytos struktūros yra konkretus deformacijos atspirties taškas. Koeficientų algebra savo kosandaugoje užkoduoja grupės elementų daugybą. Gaubiančioji algebra savo asociatyviojoje sandaugoje užkoduoja infinitezimaliuosius Lie skliaustus. Porinimas tarp šių algebrų susieja šias dvi operacijas. Deformacija gali pakeisti šias operacijas, išlaikydama Hopfo tapatybes.

Klasikinis objektas	Sandauga	Kosandauga
$\mathcal{R}(K)$	komutatyvi	paprastai nekokomutatyvi
$U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$	paprastai nekomutatyvi	kokomutatyvi

Nekomutatyvi koeficientų algebra jau nėra įprastos grupės skaliarinių reikšmių funkcijų algebra. Nekokomutatyvi kosandauga pakeičia būdą, kuriuo įvaizdžių tenzorinės sandaugos įgyja veikimą. Tada tenzorinių dauginamųjų tvarka gali būti svarbi. Įvaizdžių tenzorinės sandaugos asociatyvumas vis tiek išplaukia iš koasociatyvumo.

Pateiksime vieną tokią deformaciją, tik kaip algebrinį skaičiavimą.

Pavyzdys 28.5 (Kvantinė grupė SL_2)**.** Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ apibrėžiančiojo įvaizdžio koeficientai yra $a = D_{11}$, $b = D_{12}$, $c = D_{21}$ ir $d = D_{22}$. Paliekame kosandaugą $\Delta D_{ij} = \sum_k D_{ik} \otimes D_{kj}$. Pakeičiame sandaugą. Kai q yra nenulinis kompleksinis skaičius, tegul a, b, c, d generuoja asociatyviąją algebrą su sąryšiais

$$ab = qba, \quad ac = qca, \quad bd = qdb, \quad cd = qdc, \quad bc = cb,$$
$$ad - da = (q - q^{-1})bc, \quad ad - qbc = 1.$$

Kai $q = 1$, šie sąryšiai reiškia, kad generatoriai komutuoja, o determinantas lygus vienetui. Kitiems skaičiams q ši algebra nėra komutatyvi, todėl ji nėra grupės funkcijų algebra. Kosandaugos formulė vis tiek yra suderinta su sąryšiais. Pavyzdžiui, naudodami lygybes $ab = qba$, $cd = qdc$ ir $ba = q^{-1}ab$, gauname

$$\Delta(a)\Delta(b) - q\Delta(b)\Delta(a) = ab \otimes \big(ad - da - (q - q^{-1})bc\big) = 0.$$

Kiti sąryšiai išplaukia taip pat, o elementas $ad - qbc$ atvaizduojamas į elementą $(ad - qbc) \otimes (ad - qbc)$. Šie sąryšiai neduoda kompaktinės kvantinės grupės su kiekvienu skaičiumi q. Klasikinio atvejo involiucija nepersikelia nepakeista.

Pynimas yra papildoma struktūra, o ne automatinė Hopfo algebros savybė. Tinkamuose kvazitrikampiuose pavyzdžiuose gaubiančiosios algebros pusėje R-matrica apibrėžia persipynimo operatorių tarp abiejų tenzorinių tvarkų. Būsimasis kursas apibrėš šias sąvokas ir įrodys jų suderinamumo tapatybes. Nė vienai šios paskaitos teoremai jų nereikia.

Esminė išlieka ir $*$-struktūra. Laisvai pasirinkta Hopfo $*$-algebra nebūtinai yra kompaktinė kvantinė grupė. Teigiamumui ir analiziniam papildiniui reikia papildomų prielaidų.

Todėl naudingas pasirengimas yra šiame kurse išplėtotas klasikinių duomenų tvarkymas: reikia skirti algebrinę koeficientų erdvę nuo papildinio, sekti kosandaugos tvarką, išlaikyti realiąją ar unitariąją struktūrą ir išsaugoti globaliąją įvaizdžių gardelę. Tai yra duomenys, kuriuos deformacija turi pakeisti arba išsaugoti. Deformacijos parametrų, algebrų $U_q(\mathfrak{g})$ ir vieneto šaknų teorija prasideda vėlesniame kurse.

Žvilgsnis atgal

Klausėme, ką grupė nulemia, ko nenulemia jos Lie algebra. Vienas atsakymas eina per visą kursą. Jungioji Lie grupė yra savo vienajungės dengiančiosios grupės faktorgrupė pagal diskretųjį centrinį pogrupį. Dengiančiosios grupės neredukuojamame įvaizdyje, kuris yra baigtinės dimensijos arba unitarusis, centrinis elementas veikia skaliaru. Taigi globalioji forma nusprendžia, kurie centriniai charakteriai yra leistini. Tuo naudojomės grupėms $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$ 4-ojoje paskaitoje ir gardelėms 7-ojoje ir 8-ojoje paskaitose. Tai atskiria sveikąjį ir pusiau sveikąjį sukinį 13-ojoje paskaitoje, 24-osios paskaitos Lorenco moduliuose, 25-osios paskaitos masyviosiose būsenose ir 27-osios paskaitos sferoje. Šios paskaitos koeficientų algebros užrašo tą patį pasirinkimą.

I dalyje nagrinėjome kompaktines grupes. Jungiosios kompaktinės grupės neredukuojamus įvaizdžius žymi dominantiniai charakteriai. Kiekvienai kompaktinei Lie grupei invariantinis integralas veda prie erdvės $L^2(K)$ skaidinio į baigtinių blokų Hilberto sumą.

II dalyje atsisakėme kompaktiškumo. Generatoriai, modulinė funkcija ir indukcija kartu su invariantiniu integralu tapo darbo priemonėmis. Tada aprašėme Heizenbergo grupės, grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir Puankarė grupės unitariuosius įvaizdžius. Kiekvieno aprašymo centre yra cituojama teorema. Heizenbergo grupei įrodėme, kad Šrėdingerio įvaizdis yra neredukuojamas, o Stouno–fon Noimano teorema teigia, kad kiekvienam nenuliniam centriniam charakteriui jis yra vienintelis. Grupei $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ sukonstravome pagrindinę ir diskrečiąją serijas ir išvedėme teigiamumo ribas, o visas sąrašas yra cituojamas iš Bargmano ir Harišo Čandros darbų. Puankarė grupei Makio teorema uždavinį suveda į mažąsias grupes. Apskaičiavome masyvųjį ir baigtinio spiralingumo sektorius, o kitus tik įvardijome.

Orbitos tvarko didelę šios medžiagos dalį. Antai 19-ojoje paskaitoje Heizenbergo grupės kojungtinė orbita yra plokštuma arba taškas, ir ji duoda vieną įvaizdį. Toliau, 27-ojoje paskaitoje grupės $\mathrm{SU}(2)$ nenulinės kojungtinės orbitos yra sferos. Kai $m \geq 1$, sfera, kurios plotas yra $2\pi\hbar m$, duoda įvaizdį V_m tiesinės sluoksniuotės virš sferos holomorfiniuose pjūviuose. Vieno taško orbita duoda įvaizdį V_0. Tačiau 17-ojoje ir 25-ojoje paskaitose orbitos yra postūmių dualiojoje erdvėje.

Nenagrinėjome erdvės $L^2(G)$ skaidinio nekompaktinėms grupėms G, išskyrus 23-iojoje paskaitoje cituotą teiginį, ir nenagrinėjome bendrųjų pusiau paprastųjų grupių. Tai yra

kiti Lie grupių įvaizdžių teorijos dalykai. Antroji kryptis deformuoja šios paskaitos Hopfo struktūras, ir nuo čia prasideda vėlesnis kvantinių grupių kursas.

Savikontrolė

1. Apskaičiuokite apskritimo atveju porinimą $\langle X^2, z^{-3}\rangle$.

Atsakymas. Šis porinimas lygus $(-3i)^2 = -9$. Porinimas yra bitiesinis, todėl šiame skaičiavime nėra kompleksinio jungtinimo.

2. Ar vien algebra $U(\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}))$ nulemia, ar įvaizdis V_1 (sukinys $1/2$) yra leistinas?

Atsakymas. Ne. Šis įvaizdis yra leistinas grupei $\mathrm{SU}(2)$, bet neleistinas grupei $\mathrm{SO}(3)$. Šį skirtumą užfiksuoja pasirinkta koeficientų poalgebra arba, lygiavertiškai, leistinieji globalieji įvaizdžiai.

3. Nagrinėkime apskritimo tenzorinį automorfizmą, kai $a = 2$. Kam lygūs operatoriai $\theta_{\mathbb{C}_2}$ ir $\theta_{\mathbb{C}_{-1}}$? Ar šis automorfizmas yra unitarusis?

Atsakymas. Jie atitinkamai lygūs 4 ir $1/2$. Tai yra kompleksinis tenzorinis automorfizmas, tačiau jis nėra unitarusis ir neatitinka jokio kompaktinio apskritimo elemento.

Santrauka

Diferencijavimas suporuoja reprezentatyviąsias funkcijas su gaubiančiąja algebra. Kai grupė K yra jungi, porinimas įdeda šias funkcijas į baigtinę dualiąją erdvę. Joje globalioji grupė išskiria konkrečią poalgebrą, kuri yra visa baigtinė dualioji erdvė, kai grupė K yra vienajungė. Tenzorinė rekonstrukcija atkuria grupę K, kai unitarioji struktūra yra išlaikoma, ir grupę $K_{\mathbb{C}}$, kai ši struktūra yra užmirštama. Koeficientų algebros ir gaubiančiosios algebros Hopfo struktūros yra klasikinis kvantinių grupių atspirties taškas.

Literatūra

Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, skyreliai III.1 ir III.7–8: koeficientų algebros, rekonstrukcija ir kompleksifikacija. Gaubiančiosios algebros ir tenzorinės sandaugos rezultatai yra perimti iš parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“. Čia naudojamos koeficientų Hopfo tapatybės yra pateiktos 14-oje paskaitoje. Kvantinių grupių pastraipa yra perspektyvos apžvalga, o ne papildoma klasifikacijos teorema. Apie kvantinę grupę SL_2 žr. Klimyk ir Schmüdgen, *Quantum Groups and Their Representations* (1997), skyrelį 4.1. Naudojame šios knygos susitarimus.