

1. Siguin

$$F_1 = \langle (1, -1, 1, -1), (2, -2, 1, 1), (-3, 3, 0, 1), (0, 0, 5, 6) \rangle$$

$$F_2 = \langle (1, 2, 3, 4), (-1, 4, 2, 3) \rangle$$

subespais vectorials de  $\mathbb{Q}^4$ .

- (a) Calculeu la dimensió i una base dels subespais vectorials  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_1 \cap F_2$  i  $F_1 + F_2$ .
  - (b) Amplieu la base de  $F_1 \cap F_2$  que heu trobat a una base de  $F_1$  i a una base de  $F_2$ .
  - (c) Trobeu un sistema d'equacions lineal homogeni tal que  $F_1$  sigui el conjunt de les solucions d'aquest sistema.
2. En aquest exercici estudiem  $\mathbb{R}$  com a  $\mathbb{Q}$ -espai vectorial.

- (a) Siguin  $m_1, \dots, m_k$  enters lliures de quadrats (si un primer  $p$  divideix a  $m_i$  aleshores  $p^2$  no el divideix) i coprimers dos a dos (els primers que divideixen  $m_i$  no divideixen  $m_j$ , per a tot  $i, j$ ). Demostreu per inducció que el conjunt  $\{\sqrt{m_1}, \dots, \sqrt{m_k}\}$  és un conjunt d'elements  $\mathbb{Q}$ -linealment independents.
- (b) Demostreu que, per a tot  $k \geq 0$ , el conjunt  $\{2, \sqrt{2}, \sqrt[4]{2}, \dots, \sqrt[2^k]{2}\}$  és un conjunt  $\mathbb{Q}$ -linealment independent. Per fer-ho, podeu seguir els següents passos:
  - i. Demostreu que per a tot  $m \geq 1$  el polinomi  $x^m - 2$  és irreductible a  $\mathbb{Q}[x]$ , és a dir que no es pot escriure com a producte de dos polinomis a  $\mathbb{Q}[x]$  de grau  $< m$ . En particular, per qualsevol  $k \geq 0$  el polinomi  $x^{2^k} - 2$  és irreductible. (Indicació: trobeu primer les arrels complexes de  $x^m - 2$ , després escriviu  $x^m - 2 = g(x)h(x)$ , i raoneu per què els termes constant de  $g(x)$  i  $h(x)$  no poden ser enters).
  - ii. Demostreu que una combinació lineal no trivial dels elements fins a  $\sqrt[2^k]{2}$  dona lloc a un polinomi de grau dividint  $2^{k-1}$  que té  $\sqrt[2^k]{2}$  com a arrel.
  - iii. Deduïu una contradicció fent servir els dos apartats anteriors (recordeu la divisió de polinomis: donats polinomis  $a(x)$  i  $b(x)$ , existeixen polinomis  $q(x)$  i  $r(x)$  amb  $\text{grau}(r(x)) < \text{grau}(b(x))$  tals que  $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$ .)