

## SEMINARI 4. TEORIA GLOBAL DE CORBES PLANES.

Víctor Ballester Ribó  
NIU: 1570866

Geometria diferencial  
Grau en Matemàtiques  
Universitat Autònoma de Barcelona  
Març de 2022

**Teorema (Umlaufsatz).** El nombre de rotació d'una corba tancada simple és  $\pm 1$ .

**Exercici 6.** Demostrem l'Umlaufsatz per deformació. Sigui  $\mathbf{x} = (x, y) : [0, \ell] \rightarrow \mathbb{R}^2$  tancada i simple parametritzada per l'arc. Prenent els eixos convenientment, podem suposar que  $y(t)$  és mínim per  $t = 0$ . Suposem a més que  $\mathbf{x}(0) = (0, 0)$  i  $\mathbf{x}'(0) = (1, 0)$ .

a) Considereu el triangle  $\Delta = \{(s, t) : 0 \leq s \leq t \leq \ell\}$  i l'aplicació  $\Psi : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$  definida per:

$$\Psi(s, t) = \begin{cases} \frac{\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(s)}{\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(s)\|} & \text{si } s \neq t, (s, t) \neq (0, \ell) \\ \mathbf{x}'(s) & \text{si } s = t \\ -\mathbf{x}'(0) & \text{si } (s, t) = (0, \ell) \end{cases}$$

Interpreteu-la geomètricament i proveu que és contínua.

*Resolució.* Primer de tot vegem que la funció és contínua  $\Psi(s, t)$ . Com que  $\mathbf{x}$  és almenys de classe  $\mathcal{C}^1$  i l'aplicació norma és contínua, deduïm que les funcions components de  $\Psi(s, t)$  són totes contínues. Cal veure ara la continuïtat en els punts de la forma  $s = t$  i  $(s, t) = (0, \ell)$ . Sigui  $s \in [0, \ell]$  i  $t = s + \varepsilon$  amb  $\varepsilon \neq 0$  tal que  $(s, s + \varepsilon) \in \Delta$ . Per tant, hem de tenir  $\varepsilon > 0$ . Aleshores tenim que:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow s} \Psi(s, t) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(s + \varepsilon) - \mathbf{x}(s)}{\|\mathbf{x}(s + \varepsilon) - \mathbf{x}(s)\|} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(s + \varepsilon) - \mathbf{x}(s)}{\varepsilon} \cdot \frac{\varepsilon}{\|\mathbf{x}(s + \varepsilon) - \mathbf{x}(s)\|} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(s + \varepsilon) - \mathbf{x}(s)}{\varepsilon} \cdot \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\left\| \frac{\mathbf{x}(s + \varepsilon) - \mathbf{x}(s)}{\varepsilon} \right\|} \\ &= \mathbf{x}'(s) \cdot \frac{1}{\left\| \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(s + \varepsilon) - \mathbf{x}(s)}{\varepsilon} \right\|} \\ &= \frac{\mathbf{x}'(s)}{\|\mathbf{x}'(s)\|} \\ &= \mathbf{x}'(s) \end{aligned}$$

on en l'última igualtat hem aplicat que la corba està parametritzada per l'arc. Per a l'altre cas, si fem  $s = \ell$  i  $t = \ell - \varepsilon$  amb  $\varepsilon, \epsilon > 0$  perquè es compleixi  $(s, t) \in \Delta$ , tenim que:

$$\begin{aligned}
\lim_{\substack{t \rightarrow \ell \\ s \rightarrow 0}} \Psi(s, t) &= \lim_{\epsilon, \varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(\ell - \varepsilon) - \mathbf{x}(\epsilon)}{\|\mathbf{x}(\ell - \varepsilon) - \mathbf{x}(\epsilon)\|} \\
&= \lim_{\epsilon, \varepsilon \rightarrow 0} \left[ (-\varepsilon) \frac{\mathbf{x}(\ell - \varepsilon) - \mathbf{x}(\ell)}{-\varepsilon} + \epsilon \frac{\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}(\epsilon)}{\epsilon} \right] \cdot \frac{1}{\|\mathbf{x}(\ell - \varepsilon) - \mathbf{x}(\epsilon)\|} \\
&= \lim_{\epsilon, \varepsilon \rightarrow 0} [-\varepsilon \mathbf{x}'(\ell) - \epsilon \mathbf{x}'(0)] \cdot \frac{1}{\|\mathbf{x}(\ell - \varepsilon) - \mathbf{x}(\epsilon)\|} \\
&= -\mathbf{x}'(0) \lim_{\epsilon, \varepsilon \rightarrow 0} \frac{\varepsilon + \epsilon}{\|\mathbf{x}(\ell - \varepsilon) - \mathbf{x}(\epsilon)\|} \\
&= -\mathbf{x}'(0) \cdot \frac{1}{\left\| \lim_{\epsilon, \varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(\ell - \varepsilon) - \mathbf{x}(\epsilon)}{\varepsilon + \epsilon} \right\|} \\
&= -\mathbf{x}'(0) \cdot \frac{1}{\left\| \lim_{\epsilon, \varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon + \epsilon} \left[ (-\varepsilon) \frac{\mathbf{x}(\ell - \varepsilon) - \mathbf{x}(\ell)}{-\varepsilon} + \epsilon \frac{\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}(\epsilon)}{\epsilon} \right] \right\|} \\
&= -\mathbf{x}'(0) \cdot \frac{1}{\left\| \lim_{\epsilon, \varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon + \epsilon} [-\varepsilon \mathbf{x}'(\ell) - \epsilon \mathbf{x}'(0)] \right\|} \\
&= -\frac{\mathbf{x}'(0)}{\|\mathbf{x}'(0)\|} \\
&= -\mathbf{x}'(0)
\end{aligned}$$

on hem aplicat que la corba és tancada per deduir que  $\mathbf{x}(\ell) = \mathbf{x}(0)$  i  $\mathbf{x}'(\ell) = \mathbf{x}'(0)$ .

L'interpretació geomètrica d'aquesta funció és la següent:  $\Psi(s, t)$  dona el vector director unitari que va des de la posició  $\mathbf{x}(s)$  a  $\mathbf{x}(t)$  per a valors  $(s, t) \in \text{Int } \Delta$  i l'exten de manera contínua a tot  $(s, t) \in \Delta$ .

b) Donat  $u \in [0, 1]$  considereu una corba  $c_u : [0, \ell] \rightarrow \Delta$  definida a trossos com segueix.

- Per  $0 \leq t \leq \ell/2$  fem que  $c_u(t)$  recorri amb velocitat constant el segment des de  $(0, 0)$  fins a  $\frac{\ell}{2}(1-u, 1+u)$ .
- Per  $\ell/2 \leq t \leq \ell$  fem que  $c_u(t)$  recorri amb velocitat constant el segment des de  $\frac{\ell}{2}(1-u, 1+u)$  fins a  $(\ell, \ell)$ .

Proveu que existeix una aplicació contínua  $\Theta : [0, 1] \times [0, \ell] \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $\Psi(c_u(t)) = (\cos(\Theta(u, t)), \sin(\Theta(u, t)))$ .

*Resolució.* Denotem per  $(e_1, e_2)$  la base canònica. Primer de tot observem que  $\|\Psi(s, t)\| = 1 \ \forall (s, t) \in \Delta$ . Definim  $\Theta(u, t)$  com l'angle (no restringit a cap interval<sup>1</sup>) que formen els vectors unitaris  $\Psi(c_u(t))$  i  $e_1$ . Per tant, es compleix que:

$$\cos(\Theta(u, t)) = \langle \Psi(c_u(t)), e_1 \rangle$$

Observem que  $\Theta(u, t)$  és contínua perquè  $\Psi$ ,  $c_u(t)$  i  $\langle \cdot, e_1 \rangle$  són funcions contínues. Vegem ara que necessàriament hem de tenir  $\Psi(c_u(t)) = (\cos(\Theta(u, t)), \sin(\Theta(u, t)))$ . Per això, expressem  $\Psi(c_u(t))$  en termes de la base canònica de la forma següent:

$$\Psi(c_u(t)) = \lambda(u, t)e_1 + \mu(u, t)e_2$$

Sabem que  $\lambda(u, t) = \langle \Psi(c_u(t)), e_1 \rangle = \cos(\Theta(u, t))$  i  $\mu(u, t) = \langle \Psi(c_u(t)), e_2 \rangle$ . Com que s'ha de complir que  $\lambda(u, t)^2 + \mu(u, t)^2 = 1$ , necessàriament hem de tenir  $\mu(u, t) = \pm \sin(\Theta(u, t))$ . Per decidir quina de les dues opcions és, fixem-nos que per  $u = 1$  i  $0 < t < \frac{\ell}{2}$  tenim que  $\Psi(c_u(t)) = \frac{\mathbf{x}(t)}{\|\mathbf{x}(t)\|}$ , que té component  $y$  major a zero per el supòsit inicial que  $y(t)$  és mínim per  $t = 0$ . Per tant, l'angle  $\Theta(1, t)$ , ha d'estar entre  $2\pi k + 0$  i  $2\pi k + \pi$  per algun  $k \in \mathbb{Z}$  (que compleix  $\Theta(1, 0) = 2\pi k$ ), el que implica que  $\mu(u, t) = \sin(\Theta(u, t))$ . Per tant,  $\Psi(c_u(t)) = (\cos(\Theta(u, t)), \sin(\Theta(u, t)))$ .

Observem que per a tot  $u \in [0, 1]$ , sense pèrdua de generalitat podem suposar  $\Theta(u, 0) = 0$ . Si no fos així, aleshores  $\Theta(u, 0) = 2\pi k$  amb  $k \in \mathbb{Z}$ , però llavors podríem definir una nova funció  $\tilde{\Theta}(u, t) = \Theta(u, t) - 2\pi k$  que compleix els mateixos requisits que  $\Theta$  i tal que  $\tilde{\Theta}(u, 0) = 0$ . Per tant, d'ara en endavant suposarem  $\Theta(u, 0) = 0$ .

c) Proveu que  $\Theta(u, \ell) - \Theta(u, 0) \in 2\pi\mathbb{Z}$  i deduiu que el valor és independent de  $u$ .

<sup>1</sup>És a dir,  $\Theta(u, t) \in \mathbb{R}$  i no només únicament a l'interval  $[0, 2\pi)$ .

*Resolució.* Observem que  $c_u(\ell) = (\ell, \ell) \forall u \in [0, 1]$  i  $c_u(0) = (0, 0) \forall u \in [0, 1]$ . Per tant, d'una banda tenim que:

$$\Psi(c_u(\ell)) - \Psi(c_u(0)) = \mathbf{x}'(\ell) - \mathbf{x}'(0) = 0 \quad (1)$$

ja que la corba  $\mathbf{x}$  és tancada. D'altra banda, per l'apartat anterior tenim que:

$$\begin{aligned} 0 &= \Psi(c_u(\ell)) - \Psi(c_u(0)) = (\cos(\Theta(u, \ell)), \sin(\Theta(u, \ell))) - (\cos(\Theta(u, 0)), \sin(\Theta(u, 0))) \\ &= (\cos(\Theta(u, \ell)) - \cos(\Theta(u, 0)), \sin(\Theta(u, \ell)) - \sin(\Theta(u, 0))) \end{aligned}$$

Ara bé, sabem que si tenim  $x, y \in \mathbb{R}$  tals que

$$\begin{cases} \cos x = \cos y \\ \sin x = \sin y \end{cases}$$

aleshores és  $x = y + 2\pi k$  per a algun  $k \in \mathbb{Z}$ . Per tant, de l'equació anterior es desprèn que  $\Theta(u, \ell) = \Theta(u, 0) + 2\pi k$  per algun  $k \in \mathbb{Z}$ , o equivalentment,  $\Theta(u, \ell) - \Theta(u, 0) \in 2\pi\mathbb{Z}$ . Vegem ara que la diferència  $\Theta(u, \ell) - \Theta(u, 0)$  no depèn de  $u$ . Suposem que tenim  $u_1, u_2 \in [0, 1]$  tals que  $\Theta(u_1, \ell) - \Theta(u_1, 0) = 2\pi k_1$  i  $\Theta(u_2, \ell) - \Theta(u_2, 0) = 2\pi k_2$  amb  $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$  i  $k_1 \neq k_2$ . Per l'observació que hem fet en fórmula (1), deduïm que  $\Psi(c_{u_1}(\ell)) = \Psi(c_{u_2}(\ell)) = \mathbf{x}'(\ell)$  i  $\Psi(c_{u_1}(0)) = \Psi(c_{u_2}(0)) = \mathbf{x}'(0)$ . Per tant, per ser en el temps  $t = 0$ , tenim  $\Theta(u_1, 0) = \Theta(u_2, 0)$ . D'altra banda,  $\Theta(u_1, \ell)$  i  $\Theta(u_2, \ell)$  difereixen d'un múltiple enter de  $2\pi$ . Ara bé,  $\Theta(\cdot, \ell)$  és una funció contínua (perquè  $\Theta$  ho és) que pren valors a  $2\pi\mathbb{Z}$ . D'altra banda, recordem que una funció contínua prenen valors a  $\mathbb{Z}$  ha de ser necessàriament constant. Per tant, una funció contínua prenen valors a  $2\pi\mathbb{Z}$  ha de ser també necessàriament constant. D'aquí deduïm que  $\Theta(u_1, \ell) = \Theta(u_2, \ell)$ . Per tant, tenim que:

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + 0 = [\Theta(u_1, \ell) - \Theta(u_2, \ell)] - [\Theta(u_1, 0) - \Theta(u_2, 0)] \\ &= [\Theta(u_1, \ell) - \Theta(u_1, 0)] - [\Theta(u_2, \ell) - \Theta(u_2, 0)] \\ &= 2\pi k_1 - 2\pi k_2 \neq 0 \end{aligned}$$

que és una contradicció. Per tant, la diferència  $\Theta(u, \ell) - \Theta(u, 0)$  no depèn de  $u$ .

d) *Proveu que  $\Theta(1, \ell) - \Theta(1, 0) = 2\pi$ .*

*Resolució.* Ja sabem que  $\Theta(1, 0) = 0$  pel que hem comentat al final de l'apartat b). D'altra banda,  $c_1(\ell) = (0, 0)$  i llavors  $\Psi(c_1(\ell)) = \mathbf{x}'(\ell) = \mathbf{x}'(0) = (1, 0)$ . Però en aquest cas  $\Theta(1, \ell) = 2\pi$ , degut a la continuïtat de  $\Theta$ . En efecte, fixem-nos que  $c_1(t)$ ,  $0 < t < \ell/2$ , té la primera component fixada a l'origen i l'altre és positiva. Per tant, el vector  $\Psi(c_1(t))$ ,  $0 < t < \ell/2$ , anirà dirigit sempre des de l'origen fins un punt per sobre l'eix  $x$ . Per tant,  $\Psi(c_1(t))$  formarà sempre un angle  $\Theta(1, t) \in (0, \pi)$  amb l'eix  $x$ . Per continuïtat i tenint en compte que

$$\cos(\Theta(1, \ell/2)) = \langle \Psi(c_1(\ell/2)), e_1 \rangle = \langle \Psi(0, \ell), e_1 \rangle = \langle -\mathbf{x}'(0), e_1 \rangle = -1 \implies \Theta(1, \ell/2) \in \pi + 2\pi\mathbb{Z}$$

deduïm que  $\Theta(1, \ell/2) = \pi$ . A partir de llavors, és a dir, per  $\ell/2 < t < \ell$ ,  $c_1(t)$  té la primera component variant i la segona fixada. Per tant, el vector  $\Psi(c_1(t))$  anirà dirigit sempre des d'un punt per sobre l'eix  $x$  fins l'origen, i en conseqüència  $\Theta(1, t) \in (\pi, 2\pi)$ . Per tant, per continuïtat i tenint en compte que

$$\cos(\Theta(1, \ell)) = \langle \Psi(c_1(\ell)), e_1 \rangle = \langle \Psi((\ell, \ell)), e_1 \rangle = \langle \mathbf{x}'(\ell), e_1 \rangle = 1 \implies \Theta(1, \ell) \in 2\pi\mathbb{Z}$$

tindrem  $\Theta(1, \ell) = 2\pi$ . Per tant,  $\Theta(1, \ell) - \Theta(1, 0) = 2\pi$ .

e) *Deduïu l'Umlaufsatz.*

*Resolució.* Fixem-nos que si  $\mathbf{T}(t) = (x'(t), y'(t))$  és el vector tangent a  $\mathbf{x}$  en el punt  $\mathbf{x}(t)$ , tenim que  $\mathbf{T}(t) = \Psi(c_0(t)) = (\cos(\Theta(0, t)), \sin(\Theta(0, t)))$ . D'altra banda (pel vist a l'exercici 1 del seminari),  $\mathbf{T}(t) = (\cos(\theta(t)), \sin(\theta(t)))$  on  $\theta(t) = \int_0^t [x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)]ds$ . D'aquí, juntament amb el fet que  $\theta(0) = \Theta(0, 0) = 0$ , deduïm que  $\theta(t) = \Theta(0, t) \forall t \in [0, \ell]$ . Per tant, la curvatura total de  $\mathbf{x}$  és:

$$\int_0^\ell k(t) dt = \theta(\ell) - \theta(0) = \Theta(0, \ell) - \Theta(0, 0)$$

Ara bé, combinant els dos últims apartats, deduïm que  $\Theta(0, \ell) - \Theta(0, 0) = 2\pi$  i, per tant, el nombre de rotació és 1.

A l'enunciat hem suposat que el sentit "global" de gir de la corba era l'antihorari. Si suposem ara que  $\mathbf{x}'(0) = (-1, 0)$ , aleshores fent uns raonaments completament anàlegs als ja fets en apartats anteriors obtindrem que  $\Theta(1, \ell) - \Theta(1, 0) = -2\pi$ ,  $\Theta(0, \ell) - \Theta(0, 0) = -2\pi$  i, per tant, el nombre de rotació serà  $-1$ .