8.1 Fonction logarithme népérien

8.1.1 Fonction réciproque de la fonction exponentielle

Définition 1.8.

La fonction exponentielle est :


- _____ sur R.
- _____ sur R.
- $a > 0 \in$ donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires dans le cas des fonctions strictement croissantes, pour tout réel a > 0, il existe un unique réel x tel que $e^x = a$.

Définition 2.8.

La fonction qui, à tout réel x > 0, associe le réel $\ln(x)$ s'appelle fonction logarithme népérien que l'on note \ln : cette fonction est définie sur]0; $+\infty[$ et c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle.

Propriété 1.8.

Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives des fonctions exponentielle et logarithme népérien sont symétriques par rapport à la droite d'équation y=x.



Propriétés 1.8.

- Pour tout b > 0 et pour tout réel $a, e^a = b \iff$
- ln(1) = et ln(e) = .
- Pour tout réel a > 0, $e^{\ln(a)} =$.
- Pour tout réel a, $\ln(e^a) =$.
- **⇒** Application 1.8. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

1.
$$f(x) = \ln(5x - 2)$$

2.
$$g(x) = \ln(-x^2 - 5x + 6)$$

ightharpoonup Application 2.8. Résoudre dans $\mathbb R$ les équations suivantes :

1.
$$e^x = 3$$

3.
$$ln(x) = -3$$

2.
$$e^{-5x+1} = 4$$

4.
$$\ln(-3x+4) = 0$$

Relation fonctionnelle et propriétés algébriques 8.1.2

Propriété 2.8. Relation fonctionnelle

Pour tous x et y réels strictement positifs,

$$ln(xy) = ln(x) + ln(y).$$

$D\'{e}monstration.$	
D C110010001 000010.	

Propriété 3.8. Conséquences

Pour tous réels x et y strictement positifs :

•
$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) =$$

•
$$\forall n \in \mathbb{Z}, \ln(x^n) =$$

•
$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) =$$

•
$$\ln(\sqrt{x}) =$$
 .

•
$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) =$$

Démonstration. Prouvons la première égalité.

Application 3.8. Démontrer que $\ln(8) - \ln(2) + \ln(4) - \ln(16) = 0$.

8.2 Étude de la fonction ln

8.2.1 Dérivée et variations

Propriétés 2.8. Dérivées

• La fonction logarithme népérien est continue et dérivable sur]0; $+\infty[$ et pour tout réel x>0,

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

• Soit u une fonction $d\acute{e}rivable$ sur un intervalle I telle que, pour tout $x \in I$, u(x) > 0. La fonction $\ln \circ u : x \to \ln(u(x))$ est dérivable sur I et :

$$(\ln \circ u)' = \frac{u'}{u}$$

$D\'{e}monstration.$			

Application 4.8. Calculer la dérivée de la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \ln(5x^2 + x + 3)$.

Propriété 4.8. Sens de variation

La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur]0; $+\infty$ [.

Conséquences :

Propriétés 3.8.

Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

- $\ln(a) = \ln(b) \iff$
- $\ln(a) \leqslant \ln(b) \iff$

En particulier, on a:

- $\ln(a) \leqslant 0 \iff$
- $\ln(a) \geqslant 0 \iff$

Application 5.8. On considère la suite (u_n) définie sur \mathbb{N} par $u_n = 85 \times 0, 2^n + 15$. Résoudre dans l'ensemble des entiers naturels : $a_n < 15,004$.

8.2.2 Limites


Propriété 5.8.

•
$$\lim_{x \to +\infty} \ln(x) = +\infty$$


$$\bullet \lim_{x \to 0} \ln(x) = -\infty$$

Conséquences.

On peut dresser le tableau de variation de la fonction ln :



Courbe représentative de la fonction ln :



Propriété 6.8. Croissances comparées

- $\bullet \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$
- $\bullet \lim_{x \to 0} x \ln(x) = 0.$

Pour tout entier naturel $n \ge 2$,

• $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ et $\lim_{x \to 0} x^n \ln(x) = 0$.

Propriété 7.8. Concavité

La fonction logarithme népérien est concave sur]0; $+\infty[$: sa courbe représentative est donc toujours située en dessous de ses tangentes sur]0; $+\infty[$.

