

Κεφάλαιο 1

Στατιστική - Πιθανότητες

1.1 Αριθμητικές Μέθοδοι Σύνοψης Δεδομένων

Μη Ομαλοποιημένα Δεδομένα

Ομαλοποιημένα Δεδομένα

Μέτρα θέσης - Κεντρικής Τάσης

Αριθμητικός Μέσος

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

$$\bar{X} \cong \frac{\sum_{i=1}^k f_i m_i}{n}, \quad n = \sum_{i=1}^k f_i$$

Σταθμικός Αριθμητικός Μέσος

$$\bar{X}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i X_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Διάμεσος

- Αν n περιττός: M η τιμή της παρατήρησης στη θέση $\frac{n}{2} + \frac{1}{2}$

$$M \cong L_M + \frac{\delta}{f_M} \left(\frac{n}{2} - F_{M-1} \right)$$

$$M = X_{(\frac{n}{2} + \frac{1}{2})}$$

- Αν n άρτιος:

$$M = \frac{1}{2} \left(X_{(\frac{n}{2} + 1)} + X_{(\frac{n}{2})} \right)$$

Επικρατούσα Τιμή

T_0 : Η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης

$$T_0 = L_{T_0} + \delta \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

i -Τεταρτημόριο

Το $i = 1, 2, 3$ τεταρτημόριο (Q_i) βρίσκεται στην $[\frac{i(n+1)}{4}]$ θέση. Η τιμή του $i = 1, 2, 3$ τεταρτημορίου (Q_i) είναι

$$Q_i = X_{(A_Q)} + \Delta_Q [X_{(A_Q+1)} - X_{(A_Q)}]$$

όπου A_Q είναι το ακέραιο μέρος του ηλίγκου $[\frac{i(n+1)}{4}]$ και Δ_Q είναι το δεκαδικό μέρος του ηλίγκου $[\frac{i(n+1)}{4}]$.

Μέτρα Διασποράς

Εύρος

$$R = X_{max} - X_{min}$$

Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος

$$IR = Q_3 - Q_1$$

$$IR = Q_3 - Q_1$$

Τεταρτημοριακή Απόκλιση

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Διακύμανση

$$S_{op}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

$$S^2 \cong \frac{\sum_{i=1}^k f_i (m_i - \bar{X})^2}{n-1}, \quad n = \sum_{i=1}^k f_i$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n-1} - \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)^2}{n(n-1)}$$

$$S^2 \cong \frac{\sum_{i=1}^k f_i m_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i m_i^2}{n-1} - \frac{(\sum_{i=1}^k f_i m_i)^2}{(n-1)n}$$

Τυπική Απόκλιση

$$S_{op} = +\sqrt{S_{op}^2} \quad \text{ή} \quad S = +\sqrt{S^2}$$

$$S = +\sqrt{S^2}$$

Μέτρα Σχετικής Μεταβλητότητας

Συντελεστής Μεταβλητότητας

$$CV = \frac{S}{\bar{X}}$$

$$CV = \frac{S}{\bar{X}}$$

Μέτρα Ασυμμετρίας
Συντελεστές Ασυμμετρίας

$$S_P = \frac{\bar{X} - T_0}{S}$$

$$\beta_3 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{S^3}$$

$$S_P = \frac{\bar{X} - T_0}{S}$$

$$\beta_3 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i (m_i - \bar{X})^3}{S^3}$$

Μέτρα Κύρτωσης

Συντελεστής Κύρτωσης

$$\beta_4 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^4}{S^4}$$

$$\beta_4 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i (m_i - \bar{X})^4}{S^4}$$

1.2 Πιθανότητες

Αξιώματα του Kolmogorov

Έστω S ένας δειγματικός χώρος και έστω \mathbf{B} το σύνολο όλων των ενδεχομένων του S . Ορίζουμε ως συνάρτηση πιθανότητας μια συνάρτηση $P: \mathbf{B} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία σε κάθε ενδεχόμενο A αντιστοιχεί έναν πραγματικό αριθμό $P(A)$ έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα παρακάτω αξιώματα:

- i) $P(A) \geq 0$
- ii) $P(S) = 1$
- iii) $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$

Βασικά Θεωρήματα Πιθανοτήτων

Θεώρημα 1.2.1. Για κάθε ενδεχόμενο A ισχύει $P(A') = 1 - P(A)$

Θεώρημα 1.2.2. Ισχύει ότι $P(\emptyset) = 0$

Θεώρημα 1.2.3. Για κάθε ενδεχόμενο A ισχύει $P(A) \leq 1$

Θεώρημα 1.2.4. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα A_1 και A_2 ισχύει:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

Παρατηρήσεις 1.2.1.

- Το θεώρημα 1.2.4 γενικεύεται για την περίπτωση n ενδεχομένων. Στην περίπτωση όπου $n = 3$ γίνεται:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

- Για δύο ενδεχόμενα τα οποία είναι ασυμβίβαστα το θεώρημα 1.2.4 οδηγεί στο συμπέρασμα:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2), \quad A_1 \cap A_2 = \emptyset$$

το οποίο είναι ειδική περίπτωση του 3ου αξιώματος.

Δεσμευμένη Πιθανότητα

$$P(A_1 | A_2) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_2)}, \quad P(A_2) \geq 0$$

$$P(A_2 | A_1) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)}, \quad P(A_1) \geq 0$$

Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα

- 2 ενδεχόμενα A_1, A_2 είναι *ανεξάρτητα* αν $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$.
- 3 ενδεχόμενα A_1, A_2, A_3 είναι *ανεξάρτητα* αν

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3).$$

- n ενδεχόμενα A_1, A_2, \dots, A_n είναι *ανεξάρτητα* αν για κάθε συνδυασμό δύο ή περισσότερων από αυτά ισχύει

$$P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) = P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}),$$

$$\text{με } 1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq n.$$

Ενδεχόμενα Ανεξάρτητα κατά Ζεύγη

Τα ενδεχόμενα A_1, A_2, \dots, A_n λέγονται *ανεξάρτητα κατά ζεύγη* αν

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2), \quad \text{για κάθε } i, j = 1, 2, \dots, n, \quad i \neq j.$$

Προφανώς, n ενδεχόμενα μπορεί να είναι ανεξάρτητα κατά ζεύγη χωρίς να είναι ανεξάρτητα.

Κανόνας Πολλαπλασιασμού Πιθανοτήτων

- Για 2 ενδεχόμενα

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) = P(A_2) \cdot P(A_1 | A_2)$$

- Για 3 ενδεχόμενα

$$P[A_1 \cap A_2 \cap A_3] = P[A_1] \cdot P[A_2 | A_1] \cdot P[A_3 | A_1 \cap A_2]$$

- Για n ενδεχόμενα

$$P[A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n] = P[A_1] \cdot P[A_2 | A_1] \cdot P[A_3 | A_1 \cap A_2] \cdots P\left[A_n \left| \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i \right.\right]$$

Θεώρημα της Ολικής Πιθανότητας

Έστω ότι A_1, A_2, \dots, A_n είναι μια διαμέριση του δειγματικού χώρου S τέτοια ώστε $P(A_i) \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. Τότε για κάθε ενδεχόμενο E έχουμε ότι

$$P(E) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(E | A_i)$$

Θεώρημα του Bayes

Έστω ότι A_1, A_2, \dots, A_n είναι μια διαμέριση του δειγματικού χώρου S τέτοια ώστε $P(A_i) \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. Τότε για κάθε ενδεχόμενο E με $P(E) > 0$ έχουμε ότι

$$P(A_k | E) = \frac{P(A_k) \cdot P(E | A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(E | A_i)} = \frac{P(A_k) \cdot P(E | A_k)}{P(E)}$$

1.3 Αρχές Απαρίθμησης

Μεταθέσεις

$$P_n = n!$$

Επαναληπτικές Μεταθέσεις

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!}$$

Διατάξεις

$$P(n, x) = \frac{n!}{(n-x)!}$$

Επαναληπτικές Διατάξεις

$$n^x$$

Συνδυασμοί

$$C(n, x) = \binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

1.4 Κατανομές Πιθανότητας

Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή

Η **συνάρτηση πιθανότητας** $P(X = x)$ μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής X ικανοποιεί τις συνθήκες:

i) $P(X = x) \geq 0, \forall x$ στο Πεδίο Ορισμού

ii) $\sum_x P(X = x) = 1$

Η **αθροιστική συνάρτηση κατανομής** $F(a)$ μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής X υπολογίζεται με βάση τη σχέση:

$$F(a) = P(X \leq a) = \sum_{x \leq a} (P(X = x)), \forall a \in \mathbb{R}$$

Η **μέση (αναμενόμενη) τιμή** $\mu = E(X)$ μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής X υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

$$E(X) = \sum_x xP(X = x) < +\infty$$

Αν X διακριτή τυχαία μεταβλητή και $g(\cdot)$ μια πραγματική συνάρτηση, τότε η μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής $g(X)$ δίνεται από τη σχέση:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)P(X = x) < +\infty$$

Συνεχής Τυχαία Μεταβλητή

Η **συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας** $f(x)$ μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής X ικανοποιεί τις συνθήκες:

i) $f(x) \geq 0, -\infty < x < +\infty$

ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

Η **αθροιστική συνάρτηση κατανομής** $F(a)$ μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής X υπολογίζεται με βάση τη σχέση:

$$F(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt, \forall a \in \mathbb{R}$$

Η **μέση (αναμενόμενη) τιμή** $E(X)$ μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής X υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx < +\infty$$

Αν X συνεχής τυχαία μεταβλητή και $g(\cdot)$ μια πραγματική συνάρτηση, τότε η μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής $g(X)$ δίνεται από τη σχέση:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x) dx < +\infty$$

Ιδιότητες της Μέσης Τιμής

1. $E[ag(X) + b] = aE[g(X)] + b$, όπου a, b σταθερές.
2. $E[a_1g_1(x) + a_2g_2(x)] = a_1E[g_1(x)] + a_2E[g_2(x)]$, όπου a_1, a_2 σταθερές.

Διακύμανση

Έστω X τυχαία μεταβλητή (διακριτή ή συνεχής) με μέση τιμή $\mu = E(X)$. Η **διακύμανση** της X συμβολίζεται με $V(X)$ ή σ^2 και δίνεται από τη σχέση:

$$V(X) = \sigma^2 E[X - E(X)]^2 = E(X - \mu)^2 = E(X^2) - \mu^2$$

Ιδιότητα της Διακύμανσης

1. $V(aX + b) = a^2V(X)$, όπου a, b σταθερές

Ειδικές Κατανομές

Διακριτές Κατανομές

Όνομα Κατανομής	Παράμετροι	Συνάρτηση πιθανότητας	Σύνολο τιμών	Μέση τιμή	Διασπορά
Διωνυμική $B(n, p)$	$n \in \mathbb{Z}_+$ $0 < p < 1$	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	$x = 0, 1, \dots, n$	np	$np(1-p)$
Poisson $P(\lambda)$	$\lambda > 0$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$	$x = 0, 1, \dots$	λ	λ
Γεωμετρική $G(p)$	$0 < p < 1$	$p(1-p)^{x-1}$	$x = 0, 1, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Υπεργεωμετρική $H(n, a, b)$	$a, b \in \mathbb{Z}_+$ $n \leq a+b$	$\frac{\binom{a}{x} \binom{b}{n-x}}{\binom{a+b}{n}}$	$x = 0, 1, \dots, n$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{nab}{(a+b)^2}$

Συνεχείς Κατανομές

Όνομα Κατανομής	Παράμετροι	Συνάρτηση πιθανότητας	Σύνολο τιμών	Μέση τιμή	Διασπορά
Κανονική $N(\mu, \sigma^2)$	$-\infty < \mu < +\infty$ $\sigma > 0$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$	$-\infty < x < +\infty$	μ	σ^2
Εκθετική $E(\lambda)$	$\lambda > 0$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$0 < x < +\infty$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Ομοιόμορφη $U(a, b)$	$-\infty < a, b < +\infty$	$\frac{1}{b-a}$	$a < x < b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Τυποποιημένη Κανονική $N(0, 1)$	$-\infty < Z = \frac{X-\mu}{\sigma} < +\infty$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$	$-\infty < z < +\infty$	0	1

1.5 Συντελεστές Ευθείας Παλινδρόμησης

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum[(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})]}{\sum[(X_i - \bar{X})^2]} = \frac{\sum X_i Y_i - \frac{\sum X_i \sum Y_i}{n}}{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}}$$

$$\hat{\beta}_0 = \frac{\sum Y_i}{n} - \hat{\beta}_1 \frac{\sum X_i}{n} = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

1.6 Συντελεστής Συσχέτισης

$$r = \frac{\sum[(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})]}{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 \sum(X_i - \bar{X})^2}} = \frac{\sum X_i Y_i - \frac{\sum X_i \sum Y_i}{n}}{\sqrt{[\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}][\sum Y_i^2 - \frac{(\sum Y_i)^2}{n}]}}, r \in [-1, 1]$$

1.7 Συντελεστής Προσδιορισμού

$$R^2 = \frac{(\sum[(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})])^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 \sum(X_i - \bar{X})^2} = \frac{(\sum X_i Y_i - \frac{\sum X_i \sum Y_i}{n})^2}{[\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}][\sum Y_i^2 - \frac{(\sum Y_i)^2}{n}]}, R^2 \in [0, 1]$$

Κεφάλαιο 2

Μιγαδικοί Αριθμοί

2.1 Μιγαδικοί Αριθμοί

Ορισμός

Έστω $a, b \in \mathbb{R}$ και $i = \sqrt{-1}$ η φανταστική μονάδα. Κάθε παράσταση της μορφής $a + bi$ παριστάνει έναν μιγαδικό αριθμό. Με $\operatorname{Re} z$ και $\operatorname{Im} z$ συμβολίζουμε το πραγματικό και το φανταστικό μέρος αντίστοιχα, του μιγαδικού αριθμού $z = a + bi$. Ισχύει, $\operatorname{Re} z = a$ και $\operatorname{Im} z = b$. Το σύνολο των μιγαδικών αριθμών το συμβολίζουμε με \mathbb{C} .

Ισότητα

Έστω $z_1 = a + bi$ και $z_2 = c + di$ μιγαδικοί αριθμοί.

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow a = c \quad \text{και} \quad b = d$$

Γεωμετρική Αναπαράσταση των Μιγαδικών Αριθμών

Έστω xOy καρτεσιανό σύστημα αξόνων και $z = a + bi$ μιγαδικός αριθμός. Στον μιγαδικό αριθμό z αντιστοιχίζουμε το ζεύγος (a, b) και επομένως το σημείο $M(a, b)$ με συντεταγμένες a, b το οποίο ονομάζουμε γεωμετρική εικόνα του μιγαδικού z .

Επίσης στο σημείο $M(a, b)$ και άρα και στον μιγαδικό αριθμό z αντιστοιχίζουμε το διάνυσμα θέσης \vec{OM} .

Μέτρο

Το μέτρο του μιγαδικού αριθμού $z = a + bi$ το συμβολίζουμε με $|z|$ και ισχύει

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

- $OM = \sqrt{(a^2 + b^2)} = |z|$
- $|a| = |\operatorname{Re} z| \leq |z|$
- $|b| = |\operatorname{Im} z| \leq |z|$

Πράξεις

Έστω $z_1 = a + bi$ και $z_2 = c + di$ μιγαδικοί αριθμοί.

Πρόσθεση

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

Πολλαπλασιασμός

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= ac + adi + bci + bdi^2 \\ &= ac - bd + (ad + bc)i \end{aligned}$$

Αφαίρεση

$$z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$$

Διαίρεση

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(a + bi)}{(c + di)} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} \\ &= \frac{ac + bd + (-ad + bc)}{b^2 + d^2} \\ &= \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i \end{aligned}$$

Συνοπτικά

- $z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$
- $z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$
- $z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i$

Ιδιότητες των Πράξεων

Έστω z_1, z_2, z_3 και z μιγαδικοί αριθμοί.

Πρόσθεση	Πολλαπλασιασμός
$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$	$z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$
$z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$	$z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) = (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3$
$z + 0 = 0 + z = z$	$z \cdot 1 = 1 \cdot z = z$
$z + (-z) = (-z) + z = 0$	$z \cdot z^{-1} = z^{-1} \cdot z = 1$
$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$	

$$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$$

Δυνάμεις

Έστω $z \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{Z}$.

- $z^n = \underbrace{z \cdot z \cdots z}_{n \text{ φορές}}, n > 0$
- $z^0 = 1$
- $z^n = (z^{-1})^{-n}, n < 0$

Ιδιότητες των Δυνάμεων

Έστω $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{Z}$.

- $z^m \cdot z^n = z^{m+n}$

- $\frac{z^m}{z^n} = z^{m-n}$
- $(z^m)^n = z^{m \cdot n}$
- $(z_1 \cdot z_2)^n = z_1^n \cdot z_2^n$
- $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n = \frac{z_1^n}{z_2^n}$
- $z = 0 \Rightarrow 0^n = 0, n > 0$

Δυνάμεις της Φανταστικής Μονάδας

- $i^0 = 1$
- $i^1 = i$
- $i^2 = -1$
- $i^3 = i^2 \cdot i = -i$
- $i^4 = i^3 \cdot i = 1$
- $i^5 = i^4 \cdot i = i$
- $i^6 = i^5 \cdot i = -1$
- $i^7 = i^6 \cdot i = -i$

Αποδεικνύεται με επαγωγή ότι για κάθε $n > 0$

- $i^{4n} = 1$
- $i^{4n+1} = i$
- $i^{4n+2} = -1$
- $i^{4n+3} = -i$
- $i^n = (i^{-1})^{-n} = \left(\frac{1}{i}\right)^{-n} = (-i)^{-n}, n < 0$

Συζυγής

Έστω $z = a + bi$ μιγαδικός αριθμός. Με \bar{z} συμβολίζουμε τον **συζυγή** μιγαδικό αριθμό του z και ισχύει $\bar{\bar{z}} = z$.

Ιδιότητες Συζυγών

- $\bar{\bar{z}} = z$
- $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ και
- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$ και
- $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, z_2 \neq 0$
- $\overline{z^n} = \bar{z}^n$
- $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$
- $z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$
- $\overline{\left(\sum_{k=1}^n z_k\right)} = \sum_{k=1}^n \bar{z}_k \Leftrightarrow \overline{z_1 + z_2 + \dots + z_n} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \dots + \bar{z}_n$
- $\overline{\left(\prod_{k=1}^n z_k\right)} = \prod_{k=1}^n \bar{z}_k \Leftrightarrow \overline{z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_n} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \cdot \dots \cdot \bar{z}_n$

- $\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}$
- $\operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$

Ιδιότητες Μέτρου

- $|z| \geq 0$ και $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$
- $-|z| \leq \operatorname{Re} z \leq |z|$
- $-\bar{z} \leq \operatorname{Re} z \leq |\operatorname{Re} z| \leq \bar{z}$
- $-\bar{z} \leq \operatorname{Im} z \leq |\operatorname{Im} z| \leq \bar{z}$
- $|z| = |-z| = |\bar{z}| = |-\bar{z}|$
- $z \cdot \bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$
- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
- $|z_1 - z_2| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$
- $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, z_2 \neq 0$
- $\left| \prod_{k=1}^n z_k \right| = \prod_{k=1}^n |z_k|$
- $\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$
- $|z^k| = |z|^k, k \in \mathbb{Z}$, άρα $|z^{-1}| = |z|^{-1}, z \neq 0$
- $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$
- $|z + 1| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ και $|z^2 + 1| \geq 1$
- $|z_1 + z_2|^2 + |z_2 + z_3|^2 + |z_3 + z_1|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^2 + |z_1 + z_2 + z_3|^2$
- $|1 + z_1 \bar{z}_2|^2 \pm |z_1 - z_2|^2 = (1 \pm |z_1|^2)(1 \pm |z_2|^2)$
- $|z_1 + z_2 + z_3|^2 + |-z_1 + z_2 + z_3|^2 + |z_1 - z_2 + z_3|^2 + |z_1 + z_2 - z_3|^2 = 4(|z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^2)$

Πολική μορφή Μιγαδικού αριθμού

Έστω $z = a + bi$ μιγαδικός αριθμός. Έστω $r = |z|$ και θ η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα θέσης του z με τον θετικό ημιάξονα x και η οποία μετρείται σε ακτίνια. Τότε $x = r \cos \theta$ και $y = r \sin \theta$ και επομένως ο μιγαδικός z μπορεί να γραφεί σε **τριγωνομετρική** ή **πολική** μορφή ως:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

και χρησιμοποιώντας την ταυτότητα Euler $e^{ix} = \cos x + i \sin x, x \in \mathbb{R}$ σε **εκθετική** μορφή ως:

$$z = re^{i\theta}$$

Οι τιμές των r, θ λέγονται **πολικές συντεταγμένες** του z . Κάθε τιμή του θ λέγεται **όρισμα** του z , και με $\arg z$ συμβολίζουμε το σύνολο των ορισμάτων του z , που είναι άπειρα και διαφέρουν μεταξύ τους κατά 2π . Αν $z = 0$ τότε δεν ορίζεται το όρισμα του. Ισχύει:

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

Το **Πρωτεύον όρισμα** του $\arg z$ το συμβολίζουμε με $\text{Arg } z$ και είναι η μοναδική εκείνη τιμή του $\theta \in \arg z$ ώστε $0 \leq \theta < 2\pi$. Ισχύει:

$$\arg z = \text{Arg } z + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Από τον ορισμό του $\text{Arg } z$ προκύπτει ότι αν $z = a + bi$, τότε:

1. Αν $a \neq 0$ τότε από τη σχέση $\tan \theta = \frac{y}{x}$ έχουμε:

$$\text{Arg } z = \arctan \frac{b}{a} + k\pi, \quad \text{όπου } k = \begin{cases} 0, & \text{για } a > 0, b \geq 0 \\ 1, & \text{για } a < 0 \\ 2, & \text{για } a > 0, b < 0 \end{cases}$$

2. Αν $a = 0$ και $b \neq 0$ τότε

$$\text{Arg } z = \begin{cases} \pi/2, & \text{για } b > 0 \\ 3\pi/2, & \text{για } b < 0 \end{cases}$$

Έστω $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$, $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ και $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

Ισότητα σε Πολική μορφή

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow r_1 = r_2 \quad \text{και} \quad \text{Arg } z_1 = \text{Arg } z_2 \quad \text{ή} \quad \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Πράξεις σε Πολική μορφή

Τριγωνομετρική μορφή	Εκθετική μορφή
$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i(\sin \theta_1 + \theta_2)]$	$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$
$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [(\cos(\theta_1 - \theta_2) + i(\sin \theta_1 - \theta_2))]$	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$
$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{r}(\cos \theta - i \sin \theta)$	$z^{-1} = \frac{1}{r} e^{-i\theta}$
$\bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta)$	$\bar{z} = r e^{-i\theta}$

Θεώρημα De Moivre

Αν $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ και $n \in \mathbb{N}$ τότε

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

Ρίζες Μιγαδικού αριθμού

Κάθε μιγαδικός αριθμός της μορφής $a = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, $a \neq 0$ έχει n ακριβώς διαφορετικές n -οστές ρίζες, που δίνονται από τον τύπο:

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Κεφάλαιο 3

Αλγεβρικές Ταυτότητες

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

$$(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

$$(x - y)^4 = x^4 - 4x^3y + 6x^2y^2 - 4xy^3 + y^4$$

$$(x + y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$$

$$(x - y)^5 = x^5 - 5x^4y + 10x^3y^2 - 10x^2y^3 + 5xy^4 - y^5$$

$$(x + y)^6 = x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6$$

$$(x - y)^6 = x^6 - 6x^5y + 15x^4y^2 - 20x^3y^3 + 15x^2y^4 - 6xy^5 + y^6$$

$$\begin{aligned}
x^2 - y^2 &= (x - y)(x + y) \\
x^3 - y^3 &= (x - y)(x^2 + xy + y^2) \\
x^3 + y^3 &= (x + y)(x^2 - xy + y^2) \\
x^4 - y^4 &= (x - y)(x^3 + x^2y + xy^2 + y^3) \\
&= (x^2 - y^2)(x^2 + y^2) = (x - y)(x + y)(x^2 + y^2) \\
x^4 + y^4 &= (x^2 - \sqrt{2}xy + y^2)(x^2 + \sqrt{2}xy + y^2) \\
x^5 - y^5 &= (x - y)(x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4) \\
x^5 + y^5 &= (x + y)(x^4 - x^3y + x^2y^2 - xy^3 + y^4) \\
x^6 - x^6 &= (x^2 - y^2)(x^4 + x^2y^2 + y^4) = (x - y)(x + y)(x^4 + x^2y^2 + y^4) \\
&= (x - y)(x + y)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2) \\
x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 &= (x + y)(x^2 + y^2) \\
x^4 + x^2y^2 + y^4 &= (x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2) \\
x^5 + x^4y + x^3y^2 + x^2y^3 + xy^4 + y^5 &= (x + y)(x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2) \\
(x + y + z)^2 &= x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx \\
(x + y + z)^3 &= x^3 + y^3 + z^3 + 3x^2y + 3xy^2 + 3y^2z + 3yz^2 + 3z^2x + 3zx^2 + 6xyz \\
(x + y + z + w)^2 &= x^2 + y^2 + z^2 + w^2 + 2xy + 2xz + 2xw + 2yz + 2yw + 2zw
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x^{2n+1} - y^{2n+1} &= (x - y)(x^{2n} + x^{2n-1}y + x^{2n-2}y^2 + \dots + y^{2n}) \\
&= (x - y) \left(x^2 - 2xy \cos \frac{2\pi}{2n+1} + y^2 \right) \left(x^2 - 2xy \cos \frac{4\pi}{2n+1} + y^2 \right) \dots \left(x^2 - 2xy \cos \frac{2n\pi}{2n+1} + y^2 \right) \\
&= (x - y) \prod_{k=1}^n \left(x^2 - 2xy \cos \frac{2k\pi}{2n+1} + y^2 \right) \\
x^{2n+1} + y^{2n+1} &= (x + y)(x^{2n} - x^{2n-1}y + x^{2n-2}y^2 - \dots + y^{2n}) \\
&= (x + y) \left(x^2 + 2xy \cos \frac{2\pi}{2n+1} + y^2 \right) \left(x^2 + 2xy \cos \frac{4\pi}{2n+1} + y^2 \right) \dots \left(x^2 + 2xy \cos \frac{2n\pi}{2n+1} + y^2 \right) \\
&= (x + y) \prod_{k=1}^n \left(x^2 + 2xy \cos \frac{2k\pi}{2n+1} + y^2 \right) \\
x^{2n} - y^{2n} &= (x - y)(x + y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots) \\
&= (x - y)(x + y) \left(x^2 - 2xy \cos \frac{\pi}{n} + y^2 \right) \left(x^2 - 2xy \cos \frac{2\pi}{n} + y^2 \right) \dots \left(x^2 - 2xy \cos \frac{(n-1)\pi}{n} + y^2 \right) \\
&= (x - y)(x + y) \prod_{k=1}^{n-1} \left(x^2 - 2xy \cos \frac{k\pi}{n} + y^2 \right) \\
x^{2n} + y^{2n} &= \left(x^2 + 2xy \cos \frac{\pi}{2n} + y^2 \right) \left(x^2 + 2xy \cos \frac{3\pi}{2n} + y^2 \right) \dots \left(x^2 + 2xy \cos \frac{(2n-1)\pi}{2n} + y^2 \right) \\
&= \prod_{k=0}^{n-1} \left(x^2 + 2xy \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n} + y^2 \right)
\end{aligned}$$

3.1 Παραγοντικό

Αν $n = 1, 2, 3, \dots$ τότε το n παραγοντικό ορίζεται ως:

$$n = n(n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Ορίζουμε επίσης:

$$0! = 1$$

3.2 Διωνυμικό Ανάπτυγμα

3.2.1 Τύπος του Διωνύμου

Αν $n = 1, 2, 3, \dots$ τότε:

$$(x+y)^n = x^n + nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}y^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^{n-3}y^3 + \dots + y^n$$

3.2.2 Διωνυμικοί Συντελεστές

Αν $0 \leq k \leq n$ με $n = 1, 2, 3, \dots$ τότε ο παραπάνω τύπος μπορεί να ξαναγραφεί ως:

$$(x+y)^n = x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \binom{n}{3}x^{n-3}y^3 + \dots + \binom{n}{n}y^n$$

όπου οι συντελεστές λέγονται **διωνυμικοί συντελεστές** και δίνονται από τη σχέση:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$$

3.2.3 Ιδιότητες Διωνυμικών Συντελεστών

1. Οι διωνυμικοί συντελεστές δίνονται και από το **τρίγωνο του Pascal**, το οποίο έχεις τις εξής 2 ιδιότητες:

- i) Ο πρώτος και ο τελευταίος αριθμός κάθε γραμμής είναι 1.
- ii) Οποιοσδήποτε άλλος αριθμός σε κάθε γραμμή, είναι το άθροισμα των 2 αριθμών που βρίσκονται ακριβώς από πάνω του στην αμέσως προηγούμενη γραμμή.

Η ιδιότητα 1ii αποτελεί την παρακάτω ιδιότητα των διωνυμικών συντελεστών:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

$$(a+b)^0 = 1$$

$$(a+b)^1 = 1a + b1$$

$$(a+b)^2 = 1a^2 + 2ab + b^21$$

$$(a+b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^31$$

$$(a+b)^4 = 1a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^41$$

$$(a+b)^5 = 1a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^51$$

$$(a+b)^6 = 1a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^61$$

2. $\binom{n}{n} = 1$
3. $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
4. $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$
5. $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$
6. $\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \binom{n+2}{n} + \cdots + \binom{n+m}{n} = \binom{n+m+1}{n+1}$
7. $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = 2^{n-1}$
8. $\binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots = 2^{n-1}$
9. $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$
10. $\binom{m}{0} \binom{n}{p} + \binom{m}{1} \binom{n}{p-1} + \cdots + \binom{m}{p} \binom{n}{0} = \binom{m+n}{p}$
11. $1 \cdot \binom{n}{1} + 2 \cdot \binom{n}{2} + 3 \cdot \binom{n}{3} + \cdots + n \cdot \binom{n}{n} = n2^{n-1}$
12. $1 \cdot \binom{n}{1} - 2 \cdot \binom{n}{2} + 3 \cdot \binom{n}{3} - \cdots + (-1)^n n \cdot \binom{n}{n} = 0$

3.3 Πολυωνυμικό Ανάπτυγμα

Αν n_1, n_2, \dots, n_r είναι μη-αρνητικοί ακέραιοι τέτοιοι ώστε $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$, τότε η παράσταση

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!}$$

λέγεται **πολυωνυμικός συντελεστής** και προκύπτει από τον τύπο του πολυωνυμικού αναπτύγματος

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_r)^n = \sum \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_r^{n_r}$$

όπου το άθροισμα υπολογίζεται πάνω σε όλους τους δυνατούς πολυωνυμικούς συντελεστές.

3.4 Εκθετικές και Λογαριθμικές Συναρτήσεις

3.4.1 Ιδιότητες των Δυνάμεων

Αν p, q είναι πραγματικοί αριθμοί, a, b θετικοί πραγματικοί αριθμοί και m, n θετικοί ακέραιοι, τότε:

$$\begin{array}{ll}
a^0 = 1 & a^1 = a \\
a^p \cdot a^q = a^{p+q} & \frac{a^p}{a^q} = a^{p-q} \\
(a^p)^q = a^{p \cdot q} & a^{-p} = \frac{1}{a^p} \\
(a \cdot b)^p = a^p \cdot b^p & \left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p} \\
\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} & \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}} \\
\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} & \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}
\end{array}$$

Η συνάρτηση $y = a^x$, λέγεται **εκθετική** συνάρτηση.

3.4.2 Λογάριθμοι

Αν $a^p = b$ με $a > 0$, $a \neq 1$ και $b > 0$ τότε με $p = \log_a b$ συμβολίζουμε τον **λογάριθμο** του b με βάση το a .

Η συνάρτηση $y = \log_a x$, λέγεται **λογαριθμική** συνάρτηση και είναι η αντίστροφη της εκθετικής. Δηλαδή ισχύει:

$$y = a^x \Leftrightarrow x = \log_a y$$

$$\begin{array}{ll}
\log_a 1 = 0 & \log_a a = 1 \\
\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y & \log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y \\
\log_a x^k = k \cdot \log_a x & (\log_a b) \cdot (\log_b a) = 1
\end{array}$$

3.4.3 Αλλαγή Βάσης

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \log_a c \cdot \log_c b$$

Πιο συγκεκριμένα, ισχύει:

$$\begin{aligned}
\log_e b = \ln b &= \frac{\log_{10} b}{\log_{10} e} = \ln 10 \cdot \log_{10} b = 2.30258509294 \dots \cdot \log_{10} b \\
\log_{10} b = \log b &= \frac{\log_e b}{\log_{10} e} = \log_{10} e \cdot \ln b = 0.434294 \dots \cdot \ln b
\end{aligned}$$

Κεφάλαιο 4

Υπερβολικές Συναρτήσεις

4.0.1 Ορισμοί

Υπερβολικό Ημίτονο:	$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
Υπερβολικό Συνημίτονο:	$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
Υπερβολική Εφαπτομένη:	$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
Υπερβολική Συνεφαπτομένη:	$\coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$
Υπερβολική Τέμνουσα:	$\operatorname{sech} x = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$
Υπερβολική Συντέμνουσα:	$\operatorname{csch} x = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$

4.0.2 Ταυτότητες μεταξύ Υπερβολικών συναρτήσεων

$$\begin{aligned}\cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1 & \sinh x + \cosh x &= \frac{1}{\cosh x - \sinh x} \\ \tanh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x} & \coth x &= \frac{1}{\tanh x} = \frac{\cosh x}{\sinh x} \\ \operatorname{sech} x &= \frac{1}{\cosh x} & \operatorname{csch} x &= \frac{1}{\sinh x} \\ \coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x &= 1 & \operatorname{sech}^2 x + \tanh^2 x &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sinh(-x) &= -\sinh x \\ \cosh(-x) &= \cosh x \\ \tanh(-x) &= -\tanh x \\ \coth(-x) &= -\coth x \\ \operatorname{sech}(-x) &= \operatorname{sech} x \\ \operatorname{csch}(-x) &= -\operatorname{csch} x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sinh(x \pm y) &= \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y \\
\cosh(x \pm y) &= \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y \\
\tanh(x \pm y) &= \frac{\tanh x \pm \tanh y}{1 \pm \tanh x \tanh y} \\
\coth(x \pm y) &= \frac{\coth x \coth y \pm 1}{\coth y \pm \coth x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sinh 2x &= 2 \sinh x \cosh x \\
\cosh 2x &= \cosh^2 x + \sinh^2 x \\
&= 2 \cosh^2 x - 1 \\
&= 1 + 2 \sinh^2 x \\
\tanh 2x &= \frac{2 \tanh x}{1 + \tanh^2 x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sinh \frac{x}{2} &= \sqrt{\frac{\cosh x - 1}{2}}, \quad x > 0 & \sinh \frac{x}{2} &= -\sqrt{\frac{\cosh x - 1}{2}}, \quad x < 0 \\
\cosh \frac{x}{2} &= \sqrt{\frac{\cosh x + 1}{2}} \\
\tanh \frac{x}{2} &= \sqrt{\frac{\cosh x - 1}{\cosh x + 1}}, \quad x > 0 & \tanh \frac{x}{2} &= -\sqrt{\frac{\cosh x - 1}{\cosh x + 1}}, \quad x < 0 \\
&= \frac{\sinh x}{\cosh x + 1} \\
&= \frac{\cosh x - 1}{\sinh x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sinh 3x &= 3 \sinh x + 4 \sinh^3 x \\
\cosh 3x &= 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x \\
\tanh 3x &= \frac{3 \tanh x + \tanh^3 x}{1 + 3 \tanh^2 x} \\
\sinh 4x &= 8 \sinh^3 x \cosh x + 4 \sinh x \cosh^3 x \\
\cosh 4x &= 8 \cosh^4 x - 8 \cosh^2 x + 1 \\
\tanh 4x &= \frac{4 \tanh x + 4 \tanh^3 x}{1 + 6 \tanh^2 x + \tanh^4 x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sinh^2 x &= \frac{1}{2} \cosh 2x - \frac{1}{2} \\
\cosh^2 x &= \frac{1}{2} \cosh 2x + \frac{1}{2} \\
\sinh^3 x &= \frac{1}{4} \sinh 3x - \frac{3}{4} \sinh x \\
\cosh^3 x &= \frac{1}{4} \cosh 3x + \frac{3}{4} \cosh x \\
\sinh^4 x &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cosh 2x + \frac{1}{8} \cosh 4x \\
\cosh^4 x &= \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cosh 2x + \frac{1}{8} \cosh 4x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sinh x + \sinh y &= 2 \sinh \frac{1}{2}(x+y) \cosh \frac{1}{2}(x-y) \\
\sinh x - \sinh y &= 2 \cosh \frac{1}{2}(x+y) \sinh \frac{1}{2}(x-y) \\
\cosh x + \cosh y &= 2 \cosh \frac{1}{2}(x+y) \cosh \frac{1}{2}(x-y) \\
\cosh x - \cosh y &= 2 \sinh \frac{1}{2}(x+y) \sinh \frac{1}{2}(x-y) \\
\sinh x \sinh y &= \frac{1}{2} \{ \cosh(x+y) - \cosh(x-y) \} \\
\cosh x \cosh y &= \frac{1}{2} \{ \cosh(x+y) + \cosh(x-y) \} \\
\sinh x \cosh y &= \frac{1}{2} \{ \sinh(x+y) + \sinh(x-y) \}
\end{aligned}$$

Αν θεωρήσουμε $x > 0$ τότε ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις μεταξύ των υπερβολικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων

	$\sinh x = u$	$\cosh x = u$	$\tanh x = u$	$\coth x = u$	$\operatorname{sech} x = u$	$\operatorname{csch} x = u$
$\sinh x$	u	$\sqrt{u^2 - 1}$	$u/\sqrt{1 - u^2}$	$1/\sqrt{u^2 - 1}$	$\sqrt{1 - u^2}/u$	$1/u$
$\cosh x$	$\sqrt{1 + u^2}$	u	$1/\sqrt{1 - u^2}$	$u/\sqrt{u^2 - 1}$	$1/u$	$\sqrt{1 + u^2}/u$
$\tanh x$	$u/\sqrt{1 + u^2}$	$\sqrt{u^2 - 1}/u$	u	$1/u$	$\sqrt{1 - u^2}$	$1/\sqrt{1 + u^2}$
$\coth x$	$\sqrt{u^2 + 1}/u$	$u/\sqrt{u^2 - 1}$	$1/u$	u	$1/\sqrt{1 - u^2}$	$\sqrt{1 + u^2}$
$\operatorname{sech} x$	$1/\sqrt{1 + u^2}$	$1/u$	$\sqrt{1 - u^2}$	$\sqrt{u^2 - 1}/u$	u	$u/\sqrt{1 + u^2}$
$\operatorname{csch} x$	$1/u$	$1/\sqrt{u^2 - 1}$	$\sqrt{1 - u^2}/u$	$\sqrt{u^2 - 1}$	$u/\sqrt{1 - u^2}$	u

4.0.3 Γραφικές παραστάσεις

4.0.4 Αντίστροφες Υπερβολικές Συναρτήσεις

$$\begin{aligned}\sinh^{-1} x &= \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) & -\infty < x < +\infty \\ \cosh^{-1} x &= \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) & x \geq 1 \\ \tanh^{-1} x &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) & -1 < x < 1 \\ \coth^{-1} x &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) & x > 1 \quad \text{ή} \quad x < -1 \\ \operatorname{sech}^{-1} x &= \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1}\right) & 0 < x \leq 1 \\ \operatorname{csch}^{-1} x &= \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}\right) & x \neq 0\end{aligned}$$

4.0.5 Σχέσεις μεταξύ Υπερβολικών Συναρτήσεων

$$\begin{aligned}\operatorname{csch}^{-1} x &= \sinh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \\ \operatorname{sech}^{-1} x &= \cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \\ \coth^{-1} x &= \tanh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \\ \sinh^{-1}(-x) &= -\sinh^{-1} x \\ \tanh^{-1}(-x) &= -\tanh^{-1} x \\ \coth^{-1}(-x) &= -\coth^{-1} x \\ \operatorname{csch}^{-1}(-x) &= -\operatorname{csch}^{-1} x\end{aligned}$$

4.0.6 Γραφικές Παραστάσεις Αντίστροφων Υπερβολικών Συναρτήσεων

4.0.7 Σχέσεις μεταξύ Υπερβολικών Τριγωνομετρικών και Τριγωνομετρικών Συναρτήσεων

$$\begin{aligned}\sin(ix) &= i \sinh x & \sinh(ix) &= i \sin x \\ \cos(ix) &= \cosh x & \cosh(ix) &= \cos x \\ \tan(ix) &= i \tanh x & \tanh(ix) &= i \tan x \\ \cot(ix) &= -i \coth x & \coth(ix) &= -i \cot x \\ \sec(ix) &= \operatorname{sech} x & \operatorname{sech}(ix) &= \sec x \\ \csc(ix) &= -i \operatorname{csch} x & \operatorname{csch}(ix) &= -i \csc x\end{aligned}$$

4.0.8 Περιοδικότητα Υπερβολικών Συναρτήσεων

$$\begin{aligned}\sinh(x + 2k\pi i) &= \sinh x \\ \cosh(x + 2k\pi i) &= \cosh x \\ \tanh(x + 2k\pi i) &= \tanh x \\ \coth(x + 2k\pi i) &= \coth x \\ \operatorname{sech}(x + 2k\pi i) &= \operatorname{sech} x \\ \operatorname{csch}(x + 2k\pi i) &= \operatorname{csch} x\end{aligned}$$

4.0.9 Σχέσεις μεταξύ αντίστροφων υπερβολικών και αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων

$$\begin{array}{ll} \sin^{-1}(ix) = i \sin^{-1} x & \sinh^{-1}(ix) = i \sin^{-1} x \\ \cos^{-1} x = \pm i \cosh^{-1} x & \cosh^{-1} x = \pm i \cos^{-1} x \\ \tan^{-1}(ix) = i \tanh^{-1} x & \tanh^{-1}(ix) = i \tan^{-1} x \\ \cot^{-1}(ix) = i \coth^{-1} x & \coth^{-1}(ix) = -i \cot^{-1} x \\ \sec^{-1} x = \pm i \operatorname{sech}^{-1} x & \operatorname{sech}^{-1} x = \pm i \sec^{-1} x \\ \csc^{-1}(ix) = -i \operatorname{csch}^{-1} x & \operatorname{csch}^{-1}(ix) = -i \csc^{-1} x \end{array}$$

Κεφάλαιο 5

Διαφορικός Λογισμός

5.1 Παράγωγοι

5.1.1 Ορισμός

Η **παράγωγος** της συνάρτησης $y = f(x)$ ως προς x ορίζεται να είναι το όριο

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

όταν αυτό υπάρχει για κάθε σημείο στο πεδίο ορισμού της, όπου $h = \Delta x$. Η παράγωγος συνάρτηση συμβολίζεται με $\frac{df}{dx} = f'(x) = y'$.

5.1.2 Παράγωγοι Βασικών Συναρτήσεων

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(x^a) = ax^{a-1}, \quad a \in \mathbb{R}$$

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a, \quad a > 0$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \cdot \log_a e, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$$

5.1.3 Παραγωγοί Τριγωνομετρικών και Αντίστροφων Τριγωνομετρικών Συναρτήσεων

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(\sin x) &= \cos x & \frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & -\frac{\pi}{2} < \sin^{-1} x < \frac{\pi}{2} \\
 \frac{d}{dx}(\cos x) &= -\sin x & \frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) &= \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, & 0 < \cos^{-1} x < \pi \\
 \frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{1}{\cos^2 x} & \frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) &= \frac{1}{1+x^2}, & -\frac{\pi}{2} < \tan^{-1} x < \frac{\pi}{2} \\
 \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\frac{1}{\sin^2 x} & \frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) &= \frac{-1}{1+x^2}, & 0 < \cot^{-1} x < \pi \\
 \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \cdot \tan x & \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) &= \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, & \text{αν } 0 < \sec^{-1} x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}, & \text{αν } \frac{\pi}{2} < \sec^{-1} x < \pi \end{cases} \\
 \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cdot \cot x & \frac{d}{dx}(\csc^{-1} x) &= \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, & \text{αν } 0 < \csc^{-1} x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}, & \text{αν } -\frac{\pi}{2} < \csc^{-1} x < 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

5.1.4 Παραγωγοί Υπερβολικών και Αντίστροφων Υπερβολικών Συναρτήσεων

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(\sinh x) &= \cosh x & \frac{d}{dx}(\sinh^{-1} x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \\
 \frac{d}{dx}(\cosh x) &= \sinh x & \frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, & \text{αν } \cosh^{-1} x > 0, x > 1 \\ \frac{-1}{\sqrt{x^2-1}}, & \text{αν } \cosh^{-1} x < 0, x > 1 \end{cases} \\
 \frac{d}{dx}(\tanh x) &= \operatorname{sech}^2 x & \frac{d}{dx}(\tanh^{-1} x) &= \frac{1}{1-x^2}, & \text{αν } -1 < x < 1 \\
 \frac{d}{dx}(\coth x) &= -\operatorname{csch}^2 x & \frac{d}{dx}(\coth^{-1} x) &= \frac{1}{1-x^2}, & \text{αν } x > 1 \text{ ή } x < -1 \\
 \frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) &= -\operatorname{sech} x \cdot \tanh x & \frac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1} x) &= \begin{cases} \frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}, & \text{αν } \operatorname{sech}^{-1} x > 0, 0 < x < 1 \\ \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}, & \text{αν } \operatorname{sech}^{-1} x < 0, 0 < x < 1 \end{cases} \\
 \frac{d}{dx}(\operatorname{csch} x) &= -\operatorname{csch} x \cdot \coth x & \frac{d}{dx}(\operatorname{csch}^{-1} x) &= \begin{cases} \frac{-1}{x\sqrt{1+x^2}}, & \text{αν } x > 0 \\ \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, & \text{αν } x < 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

5.1.5 Κανόνες Παραγωγίσης

Εστω $f = f(x)$, $g = g(x)$ και $h = h(x)$, a , b , c και n σταθερές.

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(cf) &= c \frac{df}{dx} \\
 \frac{d}{dx}(f \pm g) &= \frac{df}{dx} \pm \frac{dg}{dx} \\
 \frac{d}{dx}(fg) &= f \frac{dg}{dx} + g \frac{df}{dx} \\
 \frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) &= \frac{f \frac{dg}{dx} - g \frac{df}{dx}}{g^2} \\
 \frac{d}{dx}(fgh) &= fg \frac{dh}{dx} + fh \frac{dg}{dx} + gh \frac{df}{dx}
 \end{aligned}$$

5.1.6 Σύνθετη Παραγωγή

Έστω $y = f(u)$ και $u = g(x)$. Τότε

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad (\text{Κανόνας Αλυσίδας})$$

Ο παραπάνω τύπος γενικεύεται και για συναρτήσεις που είναι σύνθεση περισσότερων των δύο συναρτήσεων, όπως για παράδειγμα, αν $y = f(u)$, $u = g(v)$ και $v = h(x)$, τότε

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}$$

5.1.7 Παράγωγος Αντίστροφης Συνάρτησης

Έστω $y = f(x)$, συνεχής και γνησίως μονότονη συνάρτηση. Τότε ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση $x = f^{-1}(y)$ και ισχύει:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

5.1.8 Παράγωγοι Ανώτερης Τάξης

$$\text{Δεύτερη Παράγωγος} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2} = f''(x) = y''$$

$$\text{Τρίτη Παράγωγος} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right) = \frac{d^3 y}{dx^3} = f'''(x) = y'''$$

$$\text{Παράγωγος τάξης } n \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} \right) = \frac{d^n y}{dx^n} = f^{(n)}(x) = y^{(n)}$$

5.1.9 Τύπος Leibniz

Έστω f, g συναρτήσεις. Τότε

$$\begin{aligned} \frac{d^n f}{dx^n} &= f \frac{d^n}{dx^n} (g) + \binom{n}{1} \frac{d}{dx} (f) \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (g) + \binom{n}{2} \frac{d^2}{dx^2} (f) \frac{d^{n-2}}{dx^{n-2}} (g) + \cdots + g \frac{d^n}{dx^n} (f) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)} \end{aligned}$$

όπου $\binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots$ είναι οι δυωνυμικοί συντελεστές.

Ειδικές Περιπτώσεις:

- $\frac{d^2}{dx^2} (fg) = f \frac{d^2 g}{dx^2} + 2 \frac{df}{dx} \frac{dg}{dx} + g \frac{d^2 f}{dx^2}$
- $\frac{d^3}{dx^3} (fg) = f \frac{d^3 g}{dx^3} + 3 \frac{df}{dx} \frac{d^2 g}{dx^2} + 3 \frac{d^2 f}{dx^2} \frac{dg}{dx} + g \frac{d^3 f}{dx^3}$

5.1.10 Διαφορικό

Έστω $y = f(x)$ και $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$. Τότε

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x) + \epsilon = \frac{dy}{dx} + \epsilon$$

όπου $\epsilon \rightarrow 0$ καθώς $\Delta x \rightarrow 0$. Άρα

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + \epsilon\Delta x$$

Αν θέσουμε $\Delta x = dx$ το διαφορικό του x , τότε ορίζουμε το διαφορικό του y να είναι

$$dy = f'(x) dx$$

5.1.11 Ιδιότητες Διαφορικών

Οι ιδιότητες των διαφορικών είναι εντελώς ανάλογες με αυτές των παραγώγων.

- $d(f \pm g \pm h \pm \dots) = df \pm dg \pm dh \pm \dots$
- $d(fg) = f dg + g df$
- $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g df - f dg}{g^2}$
- $d(f^n) = n f^{n-1} df$

5.2 Μερικές Παράγωγοι

Έστω $z = f(x, y)$ μια συνάρτηση δύο μεταβλητών x και y . Τότε ορίζουμε ως μερική παράγωγο της z ή $f(x, y)$ ως προς x , θεωρώντας ότι η μεταβλητή y είναι σταθερή,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

Αυτή η παράγωγος συμβολίζεται επίσης και με $\partial z / \partial x$, f_x και z_x .

Ομοίως η μερική παράγωγος της z ή $f(x, y)$ ως προς y , θεωρώντας ότι η μεταβλητή x είναι σταθερή, ορίζεται ως

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

Αυτή η παράγωγος συμβολίζεται επίσης και με $\partial z / \partial y$, f_y και z_y .

Οι μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης ορίζονται ως εξής:

- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$

5.2.1 Διαφορικά Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών

Το διαφορικό της συνάρτησης $z = f(x, y)$ ορίζεται ως

$$dz = df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

όπου $dx = \Delta x$ και $dy = \Delta y$. Το διαφορικό df είναι συνάρτηση τεσσάρων μεταβλητών, των x , y , Δx και Δy .

Κεφάλαιο 6

Ολοκληρώματα

6.1 Ολοκληρώματα

6.1.1 Ορισμός Αόριστου Ολοκληρώματος

$$\int f(x) dx = F(x) + c \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

6.1.2 Ολοκληρώματα Βασικών Συναρτήσεων

$$\int 0 \, dx = c$$

$$\int 1 \, dx = \int dx = x$$

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x|$$

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a}, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\int e^x \, dx = e^x$$

$$\int \sqrt[n]{x^m} \, dx = \int x^{\frac{m}{n}} \, dx = \frac{x^{\frac{m}{n}+1}}{\frac{m}{n}+1}$$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x$$

$$\int \tan x \, dx = \ln \sec x = -\ln \cos x$$

$$\int \cot x \, dx = \ln \sin x$$

$$\int \sec x \, dx = \ln(\sec x + \tan x) = \ln \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\int \csc x \, dx = \ln(\csc x - \cot x) = \ln \tan \frac{x}{2}$$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x$$

$$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x$$

$$\int \tan^2 x \, dx = \tan x - x$$

$$\int \cot^2 x \, dx = -\cot x - x$$

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$$

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x$$

$$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x$$

$$\int \sinh x \, dx = \cosh x$$

$$\int \cosh x \, dx = \sinh x$$

$$\int \tanh x \, dx = \ln \cosh x$$

$$\int \coth x \, dx = \ln \sinh x$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x)$$

$$\int \operatorname{csch} x \, dx = \ln \tanh \frac{x}{2}$$

$$\int \operatorname{sech}^2 x \, dx = \tanh x$$

$$\int \operatorname{csch}^2 x \, dx = -\coth x$$

$$\int \tanh^2 x \, dx = x - \tanh x$$

$$\int \coth^2 x \, dx = x - \coth x$$

$$\int \sinh^2 x \, dx = \frac{\sinh 2x}{4} - \frac{x}{2}$$

$$\int \cosh^2 x \, dx = \frac{\sinh 2x}{4} + \frac{x}{2}$$

$$\int \operatorname{sech} x \tanh x \, dx = -\operatorname{sech} x$$

$$\int \operatorname{csch} x \coth x \, dx = -\operatorname{csch} x$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx &= \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{x-a}{x+a} \right) = -\frac{1}{a} \cot^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx &= \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{a+x}{a-x} \right) = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \sin^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) = \sin^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \ln \left(x + \sqrt{x^2 - a^2} \right) \\
\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| \\
\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= -\frac{1}{a} \ln \left(\frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x} \right) \\
\int \frac{1}{x\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= -\frac{1}{a} \ln \left(\frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right)
\end{aligned}$$

6.1.3 $ax + b$

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{ax + b} &= \frac{1}{a} \ln(ax + b) \\
\int \frac{x}{ax + b} dx &= \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln(ax + b) \\
\int \frac{dx}{x(ax + b)} &= \frac{1}{b} \ln \left(\frac{x}{ax + b} \right) \\
\int \frac{1}{(ax + b)^2} dx &= \frac{-1}{a(ax + b)} \\
\int \frac{x}{(ax + b)^2} dx &= \frac{b}{a^2(ax + b)} + \frac{1}{a^2} \ln(ax + b) \\
\int \frac{1}{x(ax + b)^2} dx &= \frac{1}{b^2} \ln \left(\frac{x}{ax + b} \right) \\
\int (ax + b)^n dx &= \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)}, n \neq -1 \\
\int x(ax + b)^n dx &= \frac{(ax + b)^{n+2}}{a^2(n+2)} - \frac{b(ax + b)^{n+1}}{a^2(n+1)}, n \neq -1, -2 \\
\int x^m(ax + b)^n dx &= \begin{cases} \frac{x^{m+1}(ax + b)^n}{m+n+1} + \frac{nb}{m+n+1} \int x^m(ax + b)^{n-1} dx \\ \frac{x^m(ax + b)^{n+1}}{a(m+n+1)} - \frac{mb}{a(m+n+1)} \int x^{m-1}(ax + b)^n dx \\ \frac{-x^{m+1}(ax + b)^{n+1}}{b(n+1)} + \frac{m+n+2}{b(n+1)} \int x^m(ax + b)^{n+1} dx \end{cases}
\end{aligned}$$

6.1.4 $\sqrt{ax+b}$

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{ax+b}} &= \frac{2\sqrt{ax+b}}{a} \\
\int \frac{x dx}{\sqrt{ax+b}} &= \frac{2(ax-2b)}{3a^2} \sqrt{ax+b} \\
\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left(\frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right) \\ \frac{2}{\sqrt{-b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax+b}{-b}} \end{cases} \\
\int \sqrt{ax+b} dx &= \frac{2\sqrt{(ax+b)^3}}{3a} \\
\int x\sqrt{ax+b} dx &= \frac{2(3ax-2b)}{15a^2} \sqrt{(ax+b)^3} \\
\int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx &= 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} \\
\int \frac{x^m}{\sqrt{ax+b}} dx &= \frac{2x^m\sqrt{ax+b}}{a(2m+1)} - \frac{2mb}{a(2m+1)} \int \frac{x^{m-1}}{\sqrt{ax+b}} dx \\
\int \frac{dx}{x^m\sqrt{ax+b}} &= -\frac{\sqrt{ax+b}}{b(m-1)x^{m-1}} - \frac{a(2m-3)}{b(2m-2)} \int \frac{dx}{x^{m-1}\sqrt{ax+b}} \\
\int \frac{x^m}{x^m\sqrt{ax+b}} dx &= \frac{2x^m}{a(2m+3)} (ax+b)^{\frac{3}{2}} - \frac{2mb}{a(2m+3)} \int x^{m-1}\sqrt{ax+b} dx \\
\int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^m} dx &= -\frac{\sqrt{ax+b}}{(m-1)x^{m-1}} + \frac{a}{2(m-1)} \int \frac{dx}{x^{m-1}\sqrt{ax+b}} \\
\int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^m} dx &= -\frac{(ax+b)^{\frac{3}{2}}}{b(m-1)x^{m-1}} - \frac{a(2m-5)}{b(2m-2)} \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^{m-1}} dx \\
\int (ax+b)^{\frac{3}{2}} dx &= \frac{2(ax+b)^{\frac{m+2}{2}}}{a^2(m+2)} dx \\
\int x(ax+b)^{\frac{m}{2}} dx &= \frac{2(ax+b)^{\frac{m+4}{2}}}{a^2(m+4)} - \frac{2b(ax+b)^{\frac{m+2}{2}}}{a^2(m+2)} \\
\int \frac{(ax+b)^{\frac{m}{2}}}{x} dx &= \frac{2(ax+b)^{\frac{m}{2}}}{m} + b \int \frac{(ax+b)^{\frac{m-2}{2}}}{x} dx \\
\int \frac{dx}{x(ax+b)^{\frac{m}{2}}} &= \frac{2}{b(m-2)(ax+b)^{\frac{m-2}{2}}} + \frac{1}{b} \int \frac{dx}{x(ax+b)^{\frac{m-2}{2}}} dx
\end{aligned}$$

6.1.5 $(ax + b), (px + q)$

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{(ax + b)(px + q)} &= \frac{1}{bp - aq} \ln \left(\frac{px + q}{ax + b} \right) \\
\int \frac{x}{(ax + b)(px + q)} dx &= \frac{1}{bp - aq} \left\{ \frac{b}{a} \ln(ax + b) - \frac{q}{p} \ln(px + q) \right\} \\
\int \frac{1}{(ax + b)^2(px + q)} dx &= \frac{1}{bp - aq} \left\{ \frac{1}{ax + b} + \frac{p}{bp - aq} \ln \left(\frac{px + q}{ax + b} \right) \right\} \\
\int \frac{x}{(ax + b)^2(px + q)} dx &= \frac{1}{bp - aq} \left\{ \frac{q}{bp - aq} \ln \left(\frac{ax + b}{px + q} \right) - \frac{b}{a(ax + b)} \right\} \\
\int \frac{1}{(ax + b)^m(px + q)^n} dx &= \frac{-1}{(n - 1)(bp - aq)} \left\{ \frac{1}{(ax + b)^{m-1}(px + q)^{n-1}} + a(m + n - 2) \int \frac{(ax + b)^m}{(px + q)^{n-1}} dx \right\} \\
\int \frac{ax + b}{px + q} dx &= \frac{ax}{p} + \frac{bp - aq}{p^2} \ln(px + q) \\
\int \frac{(ax + b)^m}{(px + q)^n} dx &= \begin{cases} \frac{-1}{(n - 1)(bp - aq)} \left\{ \frac{(ax + b)^{m+1}}{(px + q)^{n-1}} + a(n - m - 2) \int \frac{(ax + b)^m}{(px + q)^{n-1}} dx \right\} \\ \frac{-1}{p(n - m - 1)} \left\{ \frac{(ax + b)^m}{(px + q)^{n-1}} + m(bp - aq) \int \frac{(ax + b)^{m-1}}{(px + q)^n} dx \right\} \\ \frac{-1}{p(n - 1)} \left\{ \frac{(ax + b)^m}{(px + q)^{n-1}} - ma \int \frac{(ax + b)^{m-1}}{(px + q)^{n-1}} dx \right\} \end{cases}
\end{aligned}$$

6.1.6 $\sqrt{ax + b}, px + q$

$$\begin{aligned}
\int \frac{px + q}{\sqrt{ax + b}} dx &= \frac{2(apx + 3aq - 2bp)}{3a^2} \sqrt{ax + b} \\
\int \frac{1}{(px + q)\sqrt{ax + b}} &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{bp - aq}\sqrt{p}} \ln \left(\frac{\sqrt{p(ax + b)} - \sqrt{bp - aq}}{\sqrt{p(ax + b)} + \sqrt{bp - aq}} \right) \\ \frac{2}{\sqrt{bp - aq}\sqrt{p}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{p(ax + b)}{aq - bp}} \end{cases} \\
\int \frac{\sqrt{ax + b}}{px + q} dx &= \begin{cases} \frac{2\sqrt{ax + b}}{p} + \frac{\sqrt{bp - aq}}{p\sqrt{p}} \ln \left(\frac{\sqrt{p(ax + b)} - \sqrt{bp - aq}}{\sqrt{p(ax + b)} + \sqrt{bp - aq}} \right) \\ \frac{2\sqrt{ax + b}}{p} - \frac{2\sqrt{bp - aq}}{p\sqrt{p}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{p(ax + b)}{aq - bp}} \end{cases} \\
\int (px + q)^n \sqrt{ax + b} dx &= \frac{2(px + q)^{n+1} \sqrt{ax + b}}{p(2n + 3)} + \frac{bp - aq}{p(2n + 3)} \int \frac{dx}{(px + q)\sqrt{ax + b}} \\
\int \frac{(px + q)^n}{\sqrt{ax + b}} dx &= \frac{2(px + q)^n \sqrt{ax + b}}{a(2n + 1)} + \frac{2n(aq - bp)}{a(2n + 1)} \int \frac{(px + q)^{n-1}}{\sqrt{ax + b}} dx \\
\int \frac{\sqrt{ax + b}}{(px + q)^n} dx &= \frac{-\sqrt{ax + b}}{p(n - 1)(px + q)^{n-1}} + \frac{a}{2p(n - 1)} \int \frac{1}{(px + q)^{n-1} \sqrt{ax + b}} dx
\end{aligned}$$

6.1.7 $\sqrt{ax+b}, \sqrt{px+q}$

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{(ax+b)(px+q)}} dx &= \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{ap}} \ln\left(\sqrt{a(px+q)} + \sqrt{p(ax+b)}\right) \\ \frac{2}{\sqrt{-ap}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{-p(ax+b)}{a(px+q)}} \end{cases} \\
\int \frac{x}{\sqrt{(ax+b)(px+q)}} dx &= \frac{\sqrt{(ax+b)(px+q)}}{ap} - \frac{bp+aq}{2ap} \int \frac{dx}{\sqrt{(ax+b)(px+q)}} \\
\int \sqrt{(ax+b)(px+q)} dx &= \frac{2apx+bp+aq}{4ap} \sqrt{(ax+b)(px+q)} - \frac{(bp-aq)^2}{8ap} \int \frac{dx}{\sqrt{(ax+b)(px+q)}} \\
\int \sqrt{\frac{px+q}{ax+b}} dx &= \frac{\sqrt{(ax+b)(px+q)}}{a} + \frac{aq-bp}{2a} \int \frac{dx}{\sqrt{(ax+b)(px+q)}} \\
\int \frac{dx}{(px+q)\sqrt{(ax+b)(px+q)}} &= \frac{2\sqrt{ax+b}}{(aq-bp)\sqrt{px+q}}
\end{aligned}$$

6.1.8 $x^2 + a^2$

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{x^2+a^2} &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{x}{x^2+a^2} dx &= \frac{1}{2} \ln(x^2+a^2) \\
\int \frac{dx}{x(x^2+a^2)} &= \frac{1}{2a^2} \ln\left(\frac{x^2}{x^2+a^2}\right) \\
\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2} &= \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} + \frac{1}{2a^3} \tan^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{x}{(x^2+a^2)^2} dx &= \frac{-1}{2(x^2+a^2)^2} \\
\int \frac{1}{x(x^2+a^2)^2} dx &= \frac{1}{2a^2(x^2+a^2)} + \frac{1}{2a^4} \ln\left(\frac{x^2}{x^2+a^2}\right) \\
\int \frac{1}{(x^2+a^2)^n} &= \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{a^2(2n-2)} \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{n-1}} \\
\int \frac{x}{(x^2+a^2)^n} dx &= \frac{-1}{2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} \\
\int \frac{dx}{x(x^2+a^2)^n} &= \frac{1}{2(n-1)a^2(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{x(x^2+a^2)^{n-1}} \\
\int x^m(x^2+a^2)^n &= \int \frac{x^{m-2}}{(x^2+a^2)^{n-1}} - a^2 \int \frac{x^{m-2}}{(x^2+a^2)^n} \\
\int \frac{1}{x^m(x^2+a^2)^n} dx &= \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{x^m(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{x^{m-2}(x^2+a^2)^n}
\end{aligned}$$

6.1.9 $x^2 - a^2$

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{x-a}{x+a} \right) = -\frac{1}{a} \coth^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{x}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2} \ln(x^2 - a^2) \\
\int \frac{1}{x(x^2 - a^2)} dx &= \frac{1}{2a^2} \ln \left(\frac{x^2 - a^2}{x^2} \right) \\
\int \frac{dx}{(x^2 - a^2)^2} &= \frac{-x}{2a^2(x^2 - a^2)} - \frac{1}{4a^3} \ln \left(\frac{x-a}{x+a} \right) \\
\int \frac{x}{(x^2 - a^2)^2} dx &= \frac{-1}{2(x^2 - a^2)} \\
\int \frac{1}{x(x^2 - a^2)^2} dx &= \frac{-1}{2a^2(x^2 - a^2)} + \frac{1}{2a^4} \ln \left(\frac{x^2}{x^2 - a^2} \right) \\
\int \frac{dx}{(x^2 - a^2)^n} &= \frac{-x}{2a^2(n-1)(x^2 - a^2)^{n-1}} - \frac{2n-3}{a^2(2n-2)} \int \frac{dx}{(x^2 - a^2)^{n-1}} \\
\int \frac{x}{(x^2 - a^2)^n} dx &= \frac{-1}{2(n-1)(x^2 - a^2)^{n-1}} \\
\int \frac{1}{x(x^2 - a^2)^n} dx &= \frac{-1}{2a^2(n-1)(x^2 - a^2)^{n-1}} - \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{x(x^2 - a^2)^{n-1}} \\
\int \frac{x^m}{(x^2 - a^2)^n} dx &= \frac{x^{m-2}}{(x^2 - a^2)^{n-1}} dx + a^2 \int \frac{x^{m-2}}{(x^2 - a^2)^n} dx \\
\int \frac{dx}{x^m(x^2 - a^2)^n} &= \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{x^{m-2}(x^2 - a^2)^n} - \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{x^m(x^2 - a^2)^{n-1}}
\end{aligned}$$

6.1.10 $a^2 - x^2$

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{a^2 - x^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{a+x}{a-x} \right) = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{x}{a^2 - x^2} dx &= -\frac{1}{2} \ln(a^2 - x^2) \\
\int \frac{dx}{x(a^2 - x^2)} &= \frac{1}{2a^2} \ln \left(\frac{x^2}{a^2 - x^2} \right) \\
\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^2} &= \frac{x}{2a^2(a^2 - x^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left(\frac{a+x}{a-x} \right) \\
\int \frac{x}{(a^2 - x^2)^2} dx &= \frac{1}{2(a^2 - x^2)} \\
\int \frac{1}{x(a^2 - x^2)^2} dx &= \frac{1}{2a^2(a^2 - x^2)} + \frac{1}{2a^4} \ln \left(\frac{x^2}{a^2 - x^2} \right) \\
\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^n} &= \frac{x}{2a^2(n-1)(a^2 - x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{a^2(2n-2)} \int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{n-1}} \\
\int \frac{x}{(a^2 - x^2)^n} dx &= \frac{1}{2(n-1)(a^2 - x^2)^{n-1}} \\
\int \frac{dx}{x(a^2 - x^2)^n} &= \frac{1}{2a^2(n-1)(a^2 - x^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{x(a^2 - x^2)^{n-1}} \\
\int \frac{x^m}{(a^2 - x^2)^n} dx &= a^2 \int \frac{x^{m-2}}{(a^2 - x^2)^n} dx - \int \frac{x^{m-2}}{(a^2 - x^2)^{n-1}} \\
\int \frac{dx}{x^m(a^2 - x^2)^n} &= \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{x^m(a^2 - x^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{x^{m-2}(a^2 - x^2)^n}
\end{aligned}$$

6.1.11 $\sqrt{x^2 + a^2}$

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= \ln\left(x + \sqrt{x^2 + a^2}\right) = \sin^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= \sqrt{x^2 + a^2} \\
\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= -\frac{1}{a} \ln\left(\frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x}\right) \\
\int \sqrt{x^2 + a^2} dx &= \frac{x\sqrt{x^2 + a^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{x^2 + a^2}\right) \\
\int x\sqrt{x^2 + a^2} dx &= \frac{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \\
\int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x} dx &= \sqrt{x^2 + a^2} - a \ln\left(\frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x}\right)
\end{aligned}$$

6.1.12 $\sqrt{x^2 - a^2}$

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \ln\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right) \\
\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right) \\
\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| \\
\int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= \frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right) \\
\int x\sqrt{x^2 - a^2} dx &= \frac{(x^2 - a^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \\
\int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx &= \sqrt{x^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right|
\end{aligned}$$

6.1.13 $\sqrt{a^2 - x^2}$

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \sin^{-1} \frac{x}{a} \\
\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= -\sqrt{a^2 - x^2} \\
\int \frac{1}{x\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= -\frac{1}{a} \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x}\right) \\
\int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} \\
\int x\sqrt{a^2 - x^2} dx &= -\frac{x(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \\
\int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx &= \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x}\right)
\end{aligned}$$

6.1.14 $ax^2 + bx + c$

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx &= \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \tan^{-1} \frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}} \\ \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \ln \left(\frac{2ax + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2ax + b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right) \end{cases} \\
\int \frac{x}{ax^2 + bx + c} dx &= \frac{1}{2a} \ln(ax^2 + bx + c) - \frac{b}{2a} \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx \\
\int \frac{x^m}{ax^2 + bx + c} dx &= \frac{1}{a(m-1)} - \frac{c}{a} \int \frac{x^{m-2}}{ax^2 + bx + c} dx - \frac{b}{a} \int \frac{x^{m-1}}{ax^2 + bx + c} dx \\
\int \frac{1}{x(ax^2 + bx + c)} dx &= \frac{1}{2c} \ln \left(\frac{x^2}{ax^2 + bx + c} \right) - \frac{b}{2c} \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx \\
\int \frac{x^n}{x^n(ax^2 + bx + c)} dx &= -\frac{1}{c(n-1)x^{n-1}} - \frac{b}{c} \int \frac{1}{x^{n-1}(ax^2 + bx + c)} dx - \frac{a}{c} \int 1x^{n-2}(ax^2 + bx + c) dx \\
\int \frac{1}{(ax^2 + bx + c)^n} dx &= -\frac{1}{a(2n-m-1)(ax^2 + bx + c)^{n-1}} + \frac{a(2n-m-1)}{a(m+2n-3)} \int \frac{x^{m-2}}{(ax^2 + bx + c)^n} - \frac{b(n-m)}{a(2n-m-1)} \int \frac{1}{(ax^2 + bx + c)^n} dx \\
\int \frac{1}{x^m(ax^2 + bx + c)^n} dx &= -\frac{1}{c(m-1)x^{m-1}(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \frac{a(m-1)}{c(m-1)} \int \frac{1}{x^{m-2}(ax^2 + bx + c)^n} dx - \frac{b(m+n-2)}{c(m-1)} \int \frac{1}{x^{m-2}(ax^2 + bx + c)^n} dx
\end{aligned}$$

6.1.15 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left(2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c} + 2ax + b \right) \\ -\frac{1}{\sqrt{-a}} \sin^{-1} \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \right) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sinh^{-1} \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}} \right) \end{cases} \\
\int \frac{x}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx &= \frac{1}{a} \sqrt{ax^2 + bx + c} - \frac{b}{2a} \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx \\
\int \frac{1}{x\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx &= \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{c}} \ln \left(\frac{2\sqrt{c}\sqrt{ax^2 + bx + c} + bx + 2c}{x} \right) \\ \frac{1}{\sqrt{-c}} \sin^{-1} \left(\frac{bx + 2c}{|x|\sqrt{b^2 - 4ac}} \right) = -\frac{1}{\sqrt{c}} \sinh^{-1} \left(\frac{bx + 2c}{|x|\sqrt{4ac - b^2}} \right) \end{cases} \\
\int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx &= \frac{(2ax + b)\sqrt{ax^2 + bx + c}}{4a} + \frac{4ac - b^2}{8a} \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx \\
\int x\sqrt{ax^2 + bx + c} dx &= \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}^{\frac{3}{2}}}{3a} - \frac{b(2ax + b)}{8a^2} \sqrt{ax^2 + bx + c} - \frac{b(4ac - b^2)}{16a^2} \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx \\
\int \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{x} dx &= \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{b}{2} \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx + c \int \frac{1}{x\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx \\
\int (ax^2 + bx + c)^{n+\frac{1}{2}} dx &= \frac{(2ax + b)(ax^2 + bx + c)^{n+\frac{1}{2}}}{4a(n+1)} + \frac{(2n+1)(4ac - b^2)}{8a(n+1)} \int (ax^2 + bx + c)^{n-\frac{1}{2}} dx \\
\int x(ax^2 + bx + c)^{n+\frac{1}{2}} dx &= \frac{(ax^2 + bx + c)^{n+\frac{3}{2}}}{a(2n+3)} - \frac{b}{2a} \int (ax^2 + bx + c)^{n+\frac{1}{2}} dx \\
\int \frac{1}{(ax^2 + bx + c)^{n+\frac{1}{2}}} dx &= \frac{2(2ax + b)}{(2n-1)(4ac - b^2)(ax^2 + bx + c)^{n-\frac{1}{2}}} + \frac{8a(n-1)}{(2n-1)(4ac - b^2)} \int \frac{1}{(ax^2 + bx + c)^{n-\frac{1}{2}}} dx \\
\int \frac{1}{x(ax^2 + bx + c)^{n+\frac{1}{2}}} dx &= \frac{1}{c(2n-1)(ax^2 + bx + c)^{n-\frac{1}{2}}} + \frac{1}{c} \int \frac{1}{x(ax^2 + bx + c)^{n-\frac{1}{2}}} dx - \frac{b}{2c} \int \frac{1}{(ax^2 + bx + c)^{n+\frac{1}{2}}} dx
\end{aligned}$$

6.1.16 e^{ax}

$$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} (x - \frac{1}{a})$$

$$\int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} (x^n - \frac{nx^{n-1}}{a} + \frac{n(n-1)x^{n-2}}{a^2} - \dots - \frac{(-1)^n n!}{a^n})$$

$$\int \frac{e^{ax}}{x} dx = \ln x + \frac{ax}{1 \cdot 1!} + \frac{(ax)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(ax)^3}{3 \cdot 3!} + \dots$$