

Errata

(Mathematische Einführung in Data Science von Sven-Ake Wegner)

23. Februar 2024

- Seite 17, Zeile 11: r_{xy}
- Seite 24, Zeile -11: $f = \langle (a_1, \dots, a_d), \cdot \rangle + a_0$
- Seite 26, Zeile 18: $f(\underline{z}) = \text{sig}(\langle w, \cdot \rangle)$
- Seite 31, Zeile 12: \dots und $\langle w, \widehat{w}_k \rangle < 0$ gelten.
- Seite 38, Zeile 13: \dots und $x_1, \dots, x_k \in D_1 := \{x \mid (x, y) \in D\}$ gelten.
- Seite 38, Zeile 14: $x_1 \in \underset{z \in D_1}{\text{argmin}} \rho(x, z)$ sowie $x_j \in \underset{z \in D_1 \setminus \{x_1, \dots, x_{j-1}\}}{\text{argmin}} \rho(x, z)$ für $j \geq 2$
- Seite 39, Zeile 4: $z^* \leftarrow \underset{z \in D'_1}{\text{argmin}} \rho(x, z)$
- Seite 39, Zeile 5: $D'_1 \leftarrow D'_1 \setminus \{(z^*, y^*)\}$
- Seite 39, Zeile 10–11: Hierbei bezeichnet $\pi_2(x, y) = x$ die Projektion auf den zweiten Eintrag von $(x, y) \in D$ und y^* das Label von z^* .
- Seite 55, Zeile 21–23: \dots bevor der minimale Abstand zwischen den Clustern in der nächsten Runde erstmalig über einen einzugebenden Wert $\delta > 0$ wachsen würde.
- Seite 55, Zeile -15: D
- Zeile -12: **while** $\min_{i \neq j} \rho(C_i, C_j) \leq \delta$ **do**
- Seite 56, Zeile 4: \dots , wie in Definition 4.2, \dots
- Seite 56, Zeile 8: Aufgabe 4.2
- Seite 102, Zeile 17: $r = \text{rk}(A)$
- Seite 129, Zeile -1: $0 < \varepsilon < 1$
- Seite 139, Zeile -1: $\|X^{(i)}\| \approx 1$
- Seite 146, Zeile 5: $P[|\|X\| - \sqrt{d}| \geq \varepsilon]$
- Seite 167, Zeile 5–7: ~~Im Fall der Varianz sind diese eher technisch, und wir formulieren daher im Satz für die Varianz nur die sich ergebende qualitative asymptotische Aussage.~~
- Seite 183, Zeile -1: Wenn D linear trennbar ist, \dots
- Seite 189, Zeile -5: $(x, y) \in D$
- Seite 190, Zeile 14–15: \dots die Worte „Bonus“, „Vertrag“, „das“ und „Mensa“ \dots
- Seite 194, Zeilen -2 und -1: $\mathcal{R}(D), \mathcal{K}(D)$
- Seite 194, Zeile -1: $h: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$
- Seite 195, Zeilen 2, 4, 5, 9, 10, 12, 15 und 20: $\mathcal{R}(D), \mathcal{K}(D)$
- Seite 196, Zeilen 6–8, 12 und 13: $\mathcal{R}(D), \mathcal{K}(D)$
- Seite 198, Zeile 6: $(w^*, b^*) \in M$
- Seite 198, Zeile 11–16: Es folgt also nach Proposition 17.14, dass $w_1^* = w_2^* =: w^*$ ist. Gelte ohne Einschränkung $b_1^* < b_2^*$. Dann wählen wir für ~~(w^*, b_1^*) und (w^*, b_2^*) jeweils i_1 und einen Index i wie in Teil ② und erhalten~~

$$y_i(\langle w^*, x_i \rangle + b_1^*) = \langle w^*, x_i \rangle + b_1^* < \langle w^*, x_i \rangle + b_2^* = 1$$

im Widerspruch dazu, dass (w^*, b_1^*) in M liegt. ~~Ist $b_1^* > b_2^*$, so vertauschen wir die Rollen von i_1 und i_2 .~~

- Seite 198, Zeilen -11, -8 und -4: $\mathcal{R}(D), \mathcal{K}(D)$
- Seite 216, Zeile -14: \dots , sodass $y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1$ für \dots
- Seite 220, Zeile 16: \dots mit $\lambda_{i_0}^* \neq 0$ ist \dots
- Seite 220, Zeile 18: \dots Wahl von λ^* und \dots
- Seite 224, Zeile -10 \dots positive Semidefinitheit der Gram-Matrix \dots

- Seite 230, Zeile 15 ~~die~~ *Rectified Linear Unit*
- Seite 231, Zeile -4: ... Neuronen aus Proposition 16.2 zusammensetzen
- Seite 239, Zeile 15: $\mathcal{F}(f_1 * f_2) = \mathcal{F}f_1 \cdot \mathcal{F}f_2$
- Seite 271, Zeile 14: **Folgerung 17.10.** Sei $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar ~~und~~ *konvex*.
- Seite 275, Zeile -2: Dann gilt ~~wegen~~
- Seite 283, Zeile -9: 4: $x^{(k+1)} \leftarrow x^{(k)} - \gamma_k \nabla f(x^{(k)})$.
- Seite 296, Zeile -14: S. Shalev-Shwartz and S. Ben-David, *Understanding*