Ortodontia · 10–17 anos · 18+

Aparelho fixo no dia a dia

convencional e autoligado

Os primeiros dias, o que comer, como escovar de verdade, bráquete solto, manutenções e o que muda entre convencional e autoligado.

Leitura de 7 min · Clínica LCR, Irecê-BA · Revisado pela Dra. Lara Camila, CRO-BA 15.247

Os primeiros dias

Nos primeiros 3 a 5 dias os dentes ficam doloridos ao morder e a parte de dentro da boca pode ficar irritada com os bráquetes. É normal e passa. O que ajuda:

- **Cera ortodôntica** em cima do bráquete que está raspando. Seque a peça, aperte uma bolinha de cera e pronto. Pode engolir sem querer, não tem problema.
- **Comida macia**: purê, sopa, iogurte, ovo, banana, massa. Nada que precise morder com força.
- **Analgésico comum**, se o dentista liberar, só nos primeiros dias.
- Água gelada e sorvete sem pedaços aliviam na hora.

A cada manutenção a dor pode voltar por um ou dois dias, bem mais leve. Depois do primeiro mês, você esquece que está usando.

O que comer e o que evitar

A regra é: nada que seja **duro**, **pegajoso** ou que precise ser **mordido de frente**. Isso solta bráquete e entorta fio, e cada peça solta é uma visita a mais e um mês a mais de tratamento.

- **Corte antes:** maçã, cenoura, milho na espiga, sanduíche grande, pizza na borda.
- **Evite:** bala puxa-puxa, chiclete, pipoca, amendoim, torresmo, gelo, osso, tampa de caneta.
- **Refrigerante e doce** o tempo todo deixam manchas brancas em volta do bráquete que não saem quando o aparelho é retirado. Guarde pra depois das refeições e escove em seguida.

Como escovar de verdade

Com aparelho, a placa se acumula em volta de cada peça. A escovação precisa ser mais caprichada, não necessariamente mais demorada:

1. **Escova normal** macia, pasta com flúor: escove em cima e embaixo de cada bráquete, inclinando a escova, e depois a face de dentro e a de mastigar.
2. **Escova interdental** (aquela pequenininha): passe entre o fio e o dente, em cada espaço. É ela que tira o que a escova comum não alcança.
3. **Fio dental com passa-fio** (ou fio especial pra aparelho) pelo menos uma vez ao dia, à noite.
4. **Enxaguante com flúor**, se o dentista indicar.

Três vezes ao dia, depois das refeições. Leve uma escova na mochila: na escola ou no trabalho, escovar depois do almoço faz mais diferença do que parece.

Bráquete soltou ou fio machucando

- **Bráquete solto, mas preso no fio:** cubra com cera e mande uma mensagem. Não tente colar.
- **Bráquete saiu totalmente:** guarde e leve na consulta.
- **Fio espetando no fundo:** cera em cima. Em último caso, um cotonete empurra o fio pra dentro. Se estiver machucando muito, a gente encaixa um horário pra cortar.
- **Borrachinha caiu:** não é urgência, avise na manutenção.

Nada disso é emergência médica. Mas não espere a próxima manutenção pra avisar: peça solta é tempo de tratamento parado.

As manutenções

São as consultas em que o dentista ajusta o fio, troca as borrachinhas e confere como os dentes estão andando. No aparelho convencional costumam ser mensais; no autoligado o intervalo pode ser um pouco maior, conforme a orientação da sua dentista. Faltar manutenção é o jeito mais certo de esticar o tratamento.

Convencional ou autoligado?

No convencional, o fio é preso ao bráquete pelas borrachinhas (que podem ser coloridas ou transparentes). No autoligado, o próprio bráquete tem uma "portinha" que segura o fio, sem borrachinha, o que gera menos atrito, costuma deixar a higiene um pouco mais fácil e pode espaçar as manutenções. Os dois corrigem a posição dos dentes; a escolha depende do caso, da avaliação e do orçamento, e é conversada na consulta.

Esporte, foto e autoestima

Esporte de contato pede protetor bucal, inclusive com aparelho; existem modelos feitos pra isso. Nas fotos, a dica é sorrir normalmente: aparelho em adolescente é tão comum que ninguém repara, e quem repara acha bonito. Se preferir discrição, borrachinhas transparentes ou cinza quase somem. Se preferir estilo, cada manutenção é uma cor nova.

Quanto tempo dura

Depende do caso: a maioria dos tratamentos fica entre 18 e 36 meses. O que encurta: ir a todas as manutenções, não soltar peça e escovar bem (gengiva inflamada atrasa o movimento). Depois que o aparelho sai, vem a **contenção**, uma placa ou um fio fino por trás dos dentes, pra eles não voltarem pro lugar antigo. Ela faz parte do tratamento.

Dúvidas frequentes

Conteúdo informativo da Clínica LCR. Não substitui avaliação e orientação profissional. Em caso de dor, sangramento que não para ou trauma, procure atendimento.

Guia completo e atualizado em https://www.clinicalcr.com/guias/aparelho-fixo/