Adultos · 6–9 anos · 10–17 anos · 18+

Depois da extração

as primeiras 24 horas

O que fazer nas primeiras horas, o que comer, dor e inchaço esperados, o caso do dente de leite e do siso, e os sinais de alerta.

Leitura de 5 min · Clínica LCR, Irecê-BA · Revisado pela Dra. Lara Camila, CRO-BA 15.247

As primeiras 2 horas

Depois da extração, o corpo forma um coágulo no lugar do dente. Esse coágulo é a "casquinha" que protege o osso e começa a cicatrização. Toda a regra das primeiras horas serve pra não tirá-lo de lá.

- Morda a gaze com firmeza por 30 a 60 minutos. Troque só se ficar encharcada.
- Não cuspa, não bocheche, não fique "sentindo" o buraco com a língua.
- Nada de canudo: a sucção puxa o coágulo.
- Enquanto a anestesia durar, cuidado pra não morder a bochecha ou o lábio sem sentir. Com crianças, fique de olho.

O primeiro dia

- **Comida:** fria ou morna, macia, do outro lado da boca. Sorvete sem pedaços, iogurte, purê, sopa fria, vitamina (de colher, não de canudo). Nada quente, nada duro, nada apimentado.
- **Gelo por fora**, enrolado num pano, 20 minutos sim, 20 não, nas primeiras horas.
- **Descanso:** sem esforço físico, academia ou abaixar a cabeça por 24 a 48 horas.
- **Dormir** com a cabeça mais alta, com um travesseiro extra.
- **Não fume** por pelo menos 72 horas. Cigarro é a principal causa de alveolite, a complicação mais dolorosa da extração.
- Álcool fica fora enquanto estiver tomando medicação.

Dor e inchaço: o que é esperado

Dor leve a moderada nos primeiros 2 ou 3 dias é normal, e o analgésico receitado dá conta. Inchaço costuma ser maior no segundo dia e começar a diminuir a partir do terceiro. Um pouco de sangue

misturado com saliva, deixando a saliva rosada, também é esperado nas primeiras 24 horas. Tome a medicação nos horários certos, mesmo sem dor, nos dias combinados.

Higiene

Escove os dentes normalmente a partir do mesmo dia, desviando da área da extração. No dia seguinte, se o dentista indicou, comece bochechos suaves, sem força, com o enxaguante receitado ou água morna com sal. Boca limpa cicatriza mais rápido.

Quando é dente de leite

A extração de dente de leite é rápida e a recuperação é mais simples. O que muda com criança:

- Explique antes que o "dente que já estava indo embora" saiu e que a gengiva vai fechar.
- Morder a gaze por 30 minutos é o desafio: fique junto e distraia.
- Comida macia e fria no primeiro dia. Picolé ajuda.
- Vigie a mordida na bochecha enquanto a anestesia não passa.
- Rotina do dente debaixo do travesseiro liberada.

Quando é o siso

A extração do siso costuma ser maior, e a recuperação também: inchaço de 3 a 5 dias, dificuldade pra abrir a boca totalmente por uns dias e, às vezes, roxo na pele. Se levou pontos, eles são retirados em cerca de 7 dias ou caem sozinhos, conforme o tipo. Siga à risca os dias de repouso que a dentista indicou.

Sinais de alerta: chame a gente

- Sangramento vivo que não para com a gaze depois de 1 hora.
- Dor forte que **piora** a partir do terceiro dia, em vez de melhorar, às vezes com gosto ruim na boca. Pode ser alveolite, que tem tratamento simples no consultório.
- Febre, pus ou inchaço que aumenta depois do terceiro dia.
- Dormência que não passa depois de 24 horas.

Dúvidas frequentes

Conteúdo informativo da Clínica LCR. Não substitui avaliação e orientação profissional. Em caso de dor, sangramento que não para ou trauma, procure atendimento.

Guia completo e atualizado em https://www.clinicalcr.com/guias/pos-extracao/