Emergência · 0–2 anos · 3–5 anos · 6–9 anos · 10–17 anos

Bateu a boca

o que fazer nos primeiros minutos

Passo a passo dos primeiros minutos: estancar o sangue, o que fazer se o dente caiu ou quebrou e quando correr pro dentista.

Leitura de 5 min · Clínica LCR, Irecê-BA · Revisado pela Dra. Lara Camila, CRO-BA 15.247

Aconteceu agora? Respire, siga os passos abaixo e chame a gente no WhatsApp com uma foto do dente. Se a criança desmaiou, vomitou, está confusa ou sonolenta, vá primeiro ao pronto-socorro.

Os primeiros minutos

1. **Acalme a criança e se acalme.** Boca sangra muito e assusta, mas quase sempre é menos grave do que parece.
2. **Estanque o sangue.** Pressione o local com gaze ou pano limpo por 5 a 10 minutos, sem ficar olhando a cada instante.
3. **Olhe a boca.** Lábio cortado? Dente quebrado, mole, afundado ou fora do lugar? Algum dente faltando? Se faltou, procure o dente no chão.
4. **Gelo por fora**, enrolado num pano, pra reduzir o inchaço.
5. **Chame o dentista** e mande uma foto. Mesmo que pareça tudo bem, trauma na boca precisa de avaliação.

Dente permanente caiu inteiro: cada minuto conta

Se um dente permanente saiu inteiro (com a raiz), existe chance de recolocá-lo, e ela é maior nos **primeiros 30 a 60 minutos**.

- Pegue o dente **pela coroa** (a parte branca), nunca pela raiz.
- Se estiver sujo, lave rapidamente com soro fisiológico, leite ou água filtrada. **Não esfregue** e não use sabão.
- Se a criança colaborar, **recoloque o dente no lugar**, na posição certa, e peça pra ela morder uma gaze de leve pra segurar.

- Se não der pra recolocar, **guarde em leite** (ou soro, ou na própria saliva, dentro da bochecha de um adulto). Nunca em água e nunca seco num papel.
- Vá ao dentista imediatamente.

E se for dente de leite?

Dente de leite não se recoloca. Tentar reimplantar pode machucar o dente permanente que está se formando logo acima. Guarde o dente só pra mostrar ao dentista, controle o sangramento e marque a avaliação. O dentista vai verificar se saiu inteiro, se a gengiva precisa de cuidado e como acompanhar o permanente.

O dente quebrou

Guarde o pedaço em leite ou água filtrada: em muitos casos ele pode ser colado de volta. Se o dente ficou com uma ponta afiada, uma cera ortodôntica ou um chiclete sem açúcar sobre ela protege a língua e o lábio até a consulta. Sensibilidade a frio é esperada nos primeiros dias.

O dente afundou, entortou ou está mole

Não tente colocar no lugar com a mão. Evite que a criança morda com esse dente, ofereça comida macia e vá ao dentista no mesmo dia, se possível. Dente de leite que afundou merece atenção especial pelo risco ao permanente.

Quando ir primeiro ao pronto-socorro

- Desmaio, vômito, sonolência, confusão ou dor de cabeça forte depois da batida.
- Corte grande no lábio, na língua ou no rosto que não para de sangrar.
- Dificuldade de abrir a boca, de engolir ou de respirar.
- Suspeita de fratura no rosto ou no queixo.

Depois de liberada no pronto-socorro, a criança ainda precisa do dentista pra avaliar os dentes.

O que acontece no consultório

O dentista examina os dentes, a gengiva e os lábios, geralmente faz uma radiografia pra ver a raiz e o osso, e decide entre acompanhar, colar o pedaço, reposicionar, conter com uma pequena "tala" ou, em alguns casos, tratar o canal. Tudo é explicado antes, no ritmo da criança.

Depois do atendimento, em casa

- Comida macia e fria ou morna por alguns dias. Nada de morder com os dentes da frente.
- Escovação suave na região com escova macia; higiene é parte da cura.
- Analgésico só conforme orientação.
- Observe por semanas: dente que escurece, gengiva que incha ou "bolinha" na gengiva são sinais pra voltar.

Fique de olho: o trauma não acaba no dia

Um dente que bateu pode mudar de cor ou dar problema meses depois, mesmo sem dor. Por isso o dentista marca retornos de acompanhamento. Não pule.

Prevenir é proteger

- Protetor bucal em esportes de contato, bicicleta, patins e skate.
- Cadeirinha no carro e capacete sempre.
- Em casa: atenção a quinas de mesa, banheira e chão molhado. A maior parte dos traumas em crianças pequenas acontece em casa.

Dúvidas frequentes

Conteúdo informativo da Clínica LCR. Não substitui avaliação e orientação profissional. Em caso de dor, sangramento que não para ou trauma, procure atendimento.

Guia completo e atualizado em https://www.clinicalcr.com/guias/trauma-dentario/