

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - CCT
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - DMAT

Professora: Graciela Moro

Assuntos: Espaços vetoriais, subespaços vetoriais, combinação linear, independência linear, subespaço gerado, base e dimensão, mudança de base

Segunda Lista de Exercícios

1. Verifique se \mathbb{R}^2 com as operações definidas por:
 - i. $(x, y) + (s, t) = (s, y + t)$, onde $\mathbf{u} = (x, y)$ e $\mathbf{v} = (s, t)$ pertencem a \mathbb{R}^2
 - ii. $\alpha(x, y) = (\alpha x, y)$, onde $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{u} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$.é um espaço vetorial.
2. Mostre que \mathbb{R}^2 com as operações definidas por:
 - i. $(x, y) + (s, t) = (x + s, y + t)$, onde $\mathbf{u} = (x, y)$ e $\mathbf{v} = (s, t)$ pertencem a \mathbb{R}^2
 - ii. $\alpha(x, y) = (\alpha x, \alpha y)$, onde $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{u} = (x, y)$ e $\mathbf{v} = (s, t)$ pertencem a \mathbb{R}^2 .é um espaço vetorial .
3. Verifique se em cada um dos itens abaixo o subconjunto W é um subespaço do espaço vetorial V . Para os casos em que W é subespaço de V , exiba uma base para W .
 - (a) $V = \mathbb{R}^3$ e $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y - z = 0\}$
 - (b) $V = \mathbb{R}^3$ e $W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 = 1\}$
 - (c) $V = P_n$ e $W = \{p \in P_n : p(0) = p(1)\}$
 - (d) $V = M(2, 2)$ e $S = \{X \in M_2 \mid \det(X) = 0\}$ (S é o conjunto das matrizes singulares)
 - (e) $V = M(2, 2)$ e $F = \{X \in M_2 \mid AX = XA\}$ (F é o conjunto das matrizes que comutam com a matriz A)
 - (f) $V = P_1$ e $W = \left\{p(x) \in P_1 : \int_0^1 p(x)dx = 0\right\}$
 - (g) $V = \mathbb{R}^3$ e $W = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \det \begin{bmatrix} x & y & z \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 0\right\}$
 - (h) $V = M_{2 \times 2}$ e $W = \{A \in M_{2 \times 2} : A^2 = A\}$
4. **a)** Verifique se o conjunto $S = \{A \in M(3, 3); A \text{ é uma matriz anti-simétrica}\}$ é um subespaço vetorial de $M(3, 3)$.
b) Considere o subconjunto de M_2 , dado por
$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2 \mid b = a \text{ e } d = -a \right\}.$$
Verifique se o subconjunto W é um espaço vetorial.
5. Sejam $U = \{a + bx + cx^2 + dx^3 \in P_3 \mid a + b - c + 3d = 0\}$ e $W = \{p(x) \in P_3 \mid p'(-1) = 0\}$ dois subespaços vetoriais de P_3 . Determine $U \cap W$.
6. Verifique se o conjunto $W = \{(1, 2, 3), (1, 3, 1), (0, 3, 1), (1, 4, 5)\} \subset \mathbb{R}^3$ é L.I ou L.D.
7. Dado o conjunto $W = \{(1, 1, 3), (1, 2, 1), (0, 1, 3), (1, 4, 5)\} \subset \mathbb{R}^3$, extrair um subconjunto de vetores L.I.
8. Seja $\{u, v, w\}$ um conjunto L.I. de vetores de um espaço vetorial V . Verifique se o conjunto $\{u + v - 3w, u + 3v - w, v + w\}$ é um conjunto L.I ou L.D.
9. **a)** Se o conjunto $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é um conjunto Linearmente Independente então o o conjunto $\alpha = \{v_1, \vec{0}, v_2, \dots, v_n\}$ é LI ou LD? Justifique sua resposta.

- b) Considere o subespaço $N = \{\vec{0}\}$. Qual é a base e a dimensão de N .
10. Qual o subespaço gerado pelas matrizes $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$?
11. Sejam $U = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} / a + b + c = 0 \right\}$ e $W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} / b + 2d = 0 \right\}$ dois subespaços vetoriais de M_2 . Determine os geradores de $U \cap W$.
12. Considere o espaço vetorial P_3 e o conjunto $W = \{p(x) \in P_3; p''(1) = 0\}$.
- (a) Verifique se W é um subespaço vetorial de P_3 .
- (b) Obtenha os geradores de W .
13. a) Encontre as coordenadas do vetor $p = 1 + t + t^2 + t^3$ em relação base $\alpha = \{2, 1 + t, t + t^2, t^2 + t^3\}$ de P_3
- b) O conjunto $\beta = \{2, t^2, t + t^2\}$ é LI ou LD? Justifique sua resposta
14. Mostre com um exemplo que a união de dois subespaços vetoriais de um mesmo espaço vetorial não precisa ser um subespaço vetorial desse espaço.
15. Considere o subespaço S de \mathbb{R}^4 gerado pelos vetores $\mathbf{v}_1 = (1, -1, 0, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (-2, 2, 1, 1)$ e $\mathbf{v}_4 = (1, 0, 0, 0)$.
- (a) O vetor $(2, -3, 2, 2) \in S = \text{ger}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$? Justifique.
- (b) Exiba uma base para $S = \text{ger}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$. Qual é a dimensão deste espaço?
- (c) $S = \text{ger}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \mathbb{R}^4$? Por quê?
16. Responda se os subconjuntos abaixo são subespaços de $M(2, 2)$.
- (a) $V = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ com } a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ e } b = c \text{ e } a = -b \right\}$
- (b) $V = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ com } a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ e } b = d \right\}$
- Em caso afirmativo, determine:
- i) uma base para $W_1 \cap W_2$
- ii) $W_1 + W_2$ é soma direta?
- iii) $W_1 + W_2 = M(2, 2)$?
17. Considere os subespaços de \mathbb{R}^5 , $W_1 = \{(x, y, z, t, w) / x + z + w = 0, x + w = 0\}$, $W_2 = \{(x, y, z, t, w) / y + z + t = 0\}$ e $W_3 = \{(x, y, z, t, w) / 2x + t + 2w = 0\}$.
- (a) Determine uma base para o subespaço $W_1 \cap W_2 \cap W_3$.
- (b) Determine uma base e a dimensão de $W_1 + W_3$.
- (c) $W_1 + W_2$ é soma direta? Justifique.
- (d) $W_1 + W_2 = \mathbb{R}^5$?
18. Seja $B \in M(n, n)$ uma matriz fixada e considere $W = \{A \in M(n, n) / A^T + AB = 0\}$
- (a) Mostre que W é subespaço de $M(n, n)$
- (b) Considerando $n = 2$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ determine uma base e a dimensão de W .
19. Para que valores de k os vetores $\{(1, 2, 0, k), (0, -1, k, 1), (0, 2, 1, 0), (1, 0, 2, 3k)\}$ geram um subespaço de dimensão 3?
20. Considere os seguintes subespaços de P_3 :

$$U = \{p \in P_3 : p''(1) = 0\}$$

$$\text{e } W = \{p \in P_3 : p'(1) = 0\}$$

Determine $\dim(U + W)$ e $\dim(U \cap W)$.

21. Considere o subespaço W de P_3 que é gerado pelos polinômios $p_1(x) = 1 + 2x + x^2$, $p_2(x) = -1 + 2x^2 + 3x^3$ e $p_3(x) = -1 + 4x + 8x^2 + 9x^3$ e o subespaço de P_3 , $U = \{p \in P_3 : p(0) = 0\}$
- Determine uma base e a dimensão de W .
 - Determine uma base para $U \cap W$.
 - Determine uma base para $U + W$.
22. Sejam $U = \text{ger}\{(1, 0, 0), (1, 1, 1)\}$ e $V = \text{ger}\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ subespaços gerados do \mathbb{R}^3 . Determine:
- uma base e a dimensão de $U \cap W$.
 - $U + W = \mathbb{R}^3$?
23. Considere o seguinte subespaço de $M(2, 2)$

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M(2, 2) : a + b = c + d = 0 \right\}$$

- Determine uma base e indique a dimensão de S .
 - Construa uma base de $M(2, 2)$ que contenha a base de S obtida no item **a**).
24. Determine a dimensão e encontre uma base do espaço-solução do sistema
- $$\begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ 2x - 6y + 2z = 0 \\ 3x - 9y + 3z = 0 \end{cases}$$
25. Dê exemplos de dois subespaços do \mathbb{R}^3 tais que $V_1 + V_2 = \mathbb{R}^3$. A soma é direta? Justifique sua resposta.
26. Sejam U e W subespaços de \mathbb{R}^4 de dimensão 2 e 3, respectivamente. Mostre que a dimensão de $U \cap W$ é pelo menos 1. O que ocorre se a dimensão de $U \cap W$ for 2 ? Pode ser 3 ? Justifique sua resposta.
27. O conjunto $A = \{(1, 0, 2), (a^2, a, 0), (1, 0, a)\}$ é uma base para um subespaço do \mathbb{R}^3 de dimensão 2 se e somente se $a = 2$?

28. Seja $S = \{X \in M_{3 \times 1} : AX = 0\}$ o espaço solução do sistema $\begin{cases} x + y + az = 0 \\ x + ay + z = 0 \\ ax + y + z = 0 \end{cases}$. Determine os

valores de a para os quais S seja: a própria origem; uma reta que passa pela origem; e, um plano que passa pela origem.

29. Considere os conjuntos $U = \{A \in M(2, 2) / \text{tr}(A) = 0\}$ e $W = \text{ger} \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ subespaços do espaço vetorial V . Determine uma base e a dimensão de $U + W$ e $U \cap W$
30. Sejam $\beta = \{(1, 0), (0, 1)\}$, $\beta_1 = \{(-1, 1), (1, 1)\}$, $\beta_2 = \{(\sqrt{3}, 1), (\sqrt{3}, -1)\}$ e $\beta_3 = \{(2, 0), (0, 2)\}$ bases ordenadas de \mathbb{R}^2 .

(a) Encontre a matrizes mudança de base:

i. $[I]_{\beta}^{\beta_1}$ ii. $[I]_{\beta_1}^{\beta}$ iii. $[I]_{\beta_2}^{\beta}$ iv. $[I]_{\beta_3}^{\beta}$.

(b) Quais são as coordenadas do vetor $v = (3, -2)$ em relação à base

i. β ii. β_1 iii. β_2 iv. β_3 .

(c) As coordenadas de um vetor \mathbf{u} em relação à base β_1 são dadas por $[\mathbf{u}]_{\beta_1} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$

Quais as coordenadas do vetor \mathbf{u} em relação à base: i. β ii. β_2 iii. β_3

31. Sejam $P_4 = \{p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \mid a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}\}$, $\alpha = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ e $\beta = \{2, 2x, 4x^2, 8x^3, 16x^4\}$.
- Determine $[I]_{\beta}^{\alpha}$.

(b) Se $[p]_\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$, determinar $[p]_\beta$

(c) Determine o polinômio p cujas coordenadas são dadas no item b) acima.

32. Considere o seguinte subespaço de M_2 : $W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \middle| d=0 \right\}$. Sejam

$$\begin{aligned}\alpha &= \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -11 & 0 \end{bmatrix} \right\} \\ \beta &= \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}\end{aligned}$$

(a) Determine $[I]_\beta^\alpha$

(b) Se $[v]_\beta = \begin{bmatrix} \pi \\ e \\ 0 \end{bmatrix}$, determine $[v]_\alpha$.

33. Sejam α e β bases de \mathbb{R}^3 . Determine a base β sabendo que $\alpha = \{(1, -1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, -1)\}$ e a matriz mudança de base de α para β é

$$[I]_\beta^\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

34. Seja $\alpha = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ uma base para um subespaço de $M_{2 \times 2}$ e $[I]_\beta^\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

onde β é também uma base para um subespaço de $M_{2 \times 2}$

(a) Determine a base β .

(b) Se $[v]_\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, determine $[v]_\alpha$.

35. Seja E um espaço vetorial qualquer e $\alpha = \{u_1, u_2, u_3\}$ uma base de E . Considere ainda os vetores $v_1 = u_1 + u_2$, $v_2 = 2u_1 + u_2 - u_3$ e $v_3 = -u_2$.

(a) Determine a matriz S de mudança da base $\beta = \{v_1, v_2, v_3\}$ para a base $\alpha = \{u_1, u_2, u_3\}$.

(b) Calcule as coordenadas do vetor $w = v_1 + v_2 - v_3$ na base $\{u_1, u_2, u_3\}$.

36. Sejam α e β bases de um espaço vetorial V

(a) Mostre que $\det([I]_\beta^\alpha [I]_\alpha^\beta) = 1$

(b) Determine $[I]_\alpha^\alpha$

37. Verifique se as afirmações abaixo são **VERDADEIRAS** ou **FALSAS**. Se forem verdadeiras, demonstre. Se forem falsas, dê um contra-exemplo.

(a) A interseção de dois subespaços vetoriais nunca é vazia.

(b) A matriz $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ pertence ao subespaço $W = \text{ger} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$.

(c) Se os vetores \vec{u} , \vec{v} e \vec{w} são LI então os vetores $\vec{u} - \vec{v}$, $\vec{v} - \vec{w}$ e $\vec{u} - \vec{w}$ são LI's.

(d) $W = \text{ger}\{(1, 2, 0), (2, 4, 0)\}$ é um plano no \mathbb{R}^3 que passa pela origem.

(e) Se $\beta = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ é uma base de um espaço vetorial V , então o conjunto $A = \{\vec{v}_1 + \vec{v}_3, \vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3\}$ é linearmente independente.

- (f) O subespaço $W = \{p \in P_3 : p'(1) = 0 \text{ e } p''(-1) = 0\}$ é gerado pelos polinômios $p_1 = 1$ e $p_2 = -9x + 3x^2 + x^3$.
- (g) O conjunto $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ é sempre uma base para o subespaço $\text{ger}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$.

ALGUMAS RESPOSTAS:

- Não é espaço vetorial.
- É espaço vetorial
- (a) Sim. Uma das bases é: $\beta = \{(1, 0, 2), (0, 1, 3)\}$
 (b) Não
 (c) Sim. Uma das bases é: $\beta = \{1, x - x^n, x^2 - x^n, \dots, x^{n-1} - x^n\}$
 (d) Não
 (e) Sim. Aqui, para encontrar a base, tome um exemplo para uma matriz fixa A .
 (f) Sim. Uma das bases é: $\beta = \{1 - 2x\}$
 (g) Sim. Uma das bases é: $\beta = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$
 (h) Não.
- a) Sim b) Sim
- Uma possibilidade de expressar $U \cap W$ é $U \cap W = \{a + bx + cx^2 + dx^3 \in P_3 / c = -a \text{ e } b = 2c - 3d\}$ ou $U \cap W = \{p(x) = a + (-2a - 3d)x - ax^2 + dx^3; a, d \in \mathbb{R}\}$.
- É LD.
- Um exemplo é $W_1 = \{(1, 1, 3), (1, 2, 1), (0, 1, 3)\}$
- É L.D.
-
- $W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2 : a + b - 2c + 2d = 0 \right\}$
- Uma das possibilidades é: $U \cap W = \left[\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right]$
- a) Sim b) $W = \text{ger}\{1, x, x^3 - 3x^2\}$
- a) $[p]_\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ b) Linearmente independente.
-
- b) $\beta = \{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 0)\}$ e $\dim W = 3$
- i) $\alpha = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ ii) Não iii) Sim
- a) Uma das bases é: $\beta = \{(1, 0, 0, 0, -1)\}$
 b) Uma das bases é: $\beta = \{(1, 0, 0, 0, -1), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1, 0), (1, 0, 0, -2, 0), (0, 0, 1, 0, 0)\}$
- $\alpha = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$
- $k = 1$ ou $k = -\frac{3}{2}$
- $\dim(U + W) = 4$ e $\dim(U \cap W) = 2$
- a) Uma das bases é: $\beta = \{1 + 2x + x^2, -1 + 2x^2 + 3x^3\}$, $\dim W = 2$

- b) Uma das bases é: $\beta = \left\{ \frac{2}{3}x + x^2 + x^3 \right\}$
c) Uma das bases é: $\beta = \{1 + 2x + x^2, -1 + 2x^2 + 3x^3, x, x^2\}$
22. a) Uma das bases é: $\beta = \{(0, 1, 1)\}$, $\dim(U \cap W) = 1$
23. a) Uma base é $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ e $\dim S = 2$.
b) Um exemplo é: $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$
24. Uma base é $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ e $\dim W = 2$.
- 25.
- 26.
27. Falso. $a = 0$ ou $a = 2$
28. i) $a \neq 1, a \neq -2$ b) $a \neq 1, a = -2$ c) $a = 1$
29. Uma possibilidade é: $\beta_{U \cap W} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ e $\beta_{U+W} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$
30. a) i) $[I]_{\beta}^{\beta_1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ii. $[I]_{\beta_1}^{\beta} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ iii. $[I]_{\beta_2}^{\beta} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ iv. $[I]_{\beta_3}^{\beta} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
b) i) $[v]_{\beta} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ ii. $[v]_{\beta_1} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ iii. $[v]_{\beta_2} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \end{pmatrix}$ iv. $[v]_{\beta_3} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$
c) i) $[u]_{\beta} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$ ii. $[u]_{\beta_2} = \begin{pmatrix} -\frac{2\sqrt{3}}{3} + 2 \\ -\frac{2\sqrt{3}}{3} - 2 \end{pmatrix}$ iii) $[u]_{\beta_3} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$
31. a) $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$ b) $[p]_{\beta} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{5}{16} \end{bmatrix}$ c) $p(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4$
32. a) $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 11 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -11 \end{bmatrix}$ b) $[v]_{\alpha} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\pi + \frac{11}{12}e \\ \frac{1}{2}\pi \\ \frac{e}{12} \end{bmatrix}$
33. $\beta = \{(1, -2, -2), (0, 1, 1), (0, -1, -2)\}$
34. a) $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{5}{4} & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \right\}$
b) $[v]_{\alpha} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}$
35. a) $[I]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ b) $[w]_{\alpha} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$
36. b) $[I]_{\alpha}^{\alpha} = I_n$
37. a) V b) V c) F d) F e) V f) V g) F