NỘI DUNG CUỘC HỌP CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN KHỐI 7

I. Mục tiêu cuộc họp:

1. **Nắm vững mạch kiến thức**
2. **Thống nhất phương pháp, trình bày chuẩn**
3. **Phòng ngừa lỗi sai cho học sinh**
4. **Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy**

II. Cuộc họp trao đổi các nội dung:

1. **Khung chương trình tháng 10-11-12** (Chi tiết phân phối chương trình, nội dung giảng dạy dự kiến theo từng tuần cho các phân khúc lớp)
2. **Kiến thức trọng tâm, các dạng bài điển hình, lỗi sai thường gặp** (Phân tích các dạng toán trọng tâm, cách nhận xét chi tiết và lưu ý lỗi sai phổ biến của học sinh)
3. **Một vài tồn đọng trong thời gian vừa qua**
4. **Thảo luận, góp ý từ thầy cô**

III. Nội dung chi tiết.

1. Khung chương trình tháng 10-11-12 (Chi tiết phân phối chương trình, nội dung giảng dạy dự kiến theo từng tuần cho các phân khúc lớp)

Lớp 7					
Tháng		Buổi học	Phiếu 1 (Định hướng chuyên- Chốt sửa ngày 12/08)	Phiếu 2 (Nâng cao - Chốt sửa ngày 12/08)	Phiếu số 3 + 4 (Mở rộng- Chốt sửa ngày 12/08)
áng 10 năm 20	15/10/2026 - 21/10/2026	15	Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông	Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông	Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
	22/10/2026 - 28/10/2026	16	Tam giác cân, tam giác đều	Tam giác cân, tam giác đều	Tỉ lệ thức - TC dãy tỉ số bằng nhau
	29/10/2026 - 04/11/2026	17	Ôn tập và kiểm tra tháng	Ôn tập và kiểm tra tháng	Ôn tập ba trường hợp bằng nhau của tam giác
áng 11 năm 20	05/11/2026 - 11/11/2026	18	Tỉ lệ thức - TC dãy tỉ số bằng nhau (buổi 1)	Tỉ lệ thức - TC dãy tỉ số bằng nhau (buổi 1)	Luyện tập về dãy tỉ số bằng nhau
	12/11/2026 - 18/11/2026	19	Tỉ lệ thức - TC dãy tỉ số bằng nhau (buổi 2)	Tỉ lệ thức - TC dãy tỉ số bằng nhau (buổi 2)	Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
	19/11/2026 - 23/11/2026	19-thêm	Ôn tập tổng hợp	Ôn tập tổng hợp	Ôn tập tổng hợp
	25/11/2026 - 01/12/2026	20	Cạnh và góc đối diện trong tam giác	Cạnh và góc đối diện trong tam giác	Tam giác cân, Tam giác đều
áng 12 năm 20	02/12/2026 - 08/12/2026	21	Ôn tập số học (các bài toán về chia hết, SNT)	Bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch	Ôn tập cuối kì 1
	09/12/2026 - 15/12/2026	22	Biến đổi biểu thức hữu tỉ	Biến đổi biểu thức hữu tỉ	Đại lượng tỉ lệ thuận
	16/12/2026 - 22/12/2026	23	Kiểm tra quý 2	Kiểm tra quý 2	Kiểm tra quý 2
	23/12/2026 - 29/12/2026	24	Biểu thức đại số	Biểu thức đại số	Đại lượng tỉ lệ nghịch
	30/12/2026 - 31/12/2026	24-thêm	Ôn tập tổng hợp	Ôn tập tổng hợp	Ôn tập tổng hợp

Kiến thức trọng tâm trong thời gian tới: Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.

2. Kiến thức trọng tâm, các dạng bài điển hình, lỗi sai thường gặp

A. Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

***Kiến thức cốt lõi:**

- **Tính chất cơ bản:** Tỉ lệ thức: $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{a+c}{b+d}=\frac{a-c}{b-d}\ \left(b\neq d;b\neq -d\right)$

- **Tính chất có hệ số nhân:** $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{ma}{mb}=\frac{nc}{nd}=\frac{ma+nc}{mb+nd}=\frac{ma-nc}{mb-nd}$
- **Phương pháp đặt ẩn phụ k:** Nếu $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=k\Rightarrow x=ak;\ y=bk$ (tối ưu cho bài toán chứa tích xy hoặc chứa lũy thừa của $x;y$

***Các dạng bài điển hình, quy chuẩn chung trình bày và lỗi sai của học sinh:**

Dạng 1: Chứng minh tỉ lệ thức (dùng các tỉ lệ thức đơn giản chứng minh các tỉ lệ thức phức tạp)

Ví dụ: Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$. Chứng minh rằng ta có các tỉ lệ thức:

a) $\frac{a+b}{b}=\frac{c+d}{d}$; b) $\frac{a^2}{b^2}=\frac{c^2}{d^2}=\frac{ac}{bd}$.

Lỗi sai của học sinh

✗ Học sinh giữ nguyên $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ rồi viết bằng $\frac{a+c}{b+d}$ (đúng) nhưng ở câu a) cần chứng minh liên quan tới mẫu số là b và d, các con lúng túng không biết khi nào nên giữ nguyên, khi nào nên hoán đổi.

✗ Lỗi ngộ nhận trong phép bình phương ở câu b): học sinh hay nhầm lẫn $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ từ đó bình phương lên cho ta điều phải chứng minh.

Lời giải chuẩn:

a)Ta có $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\ hay\ \frac{a}{c}=\frac{b}{d}$

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a+b}{c+d}$

Suy ra $\frac{a+b}{b}=\frac{c+d}{d}$

(Đpcm)

b) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\ nên\ \left(\frac{a}{b}\right)^2=\left(\frac{c}{d}\right)^2=\frac{c}{d}.\frac{c}{d}=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}$

Suy ra $\frac{a^2}{b^2}=\frac{c^2}{d^2}=\frac{ac}{bd}$ (Đpcm)

Dạng 2: Tìm số x,y,z khi biết dãy tỉ số và tổng, hiệu, tích, bình phương, ...

Ví dụ 2: Tìm các số x, y, z biết:

a) $4x = 3y$ và $x - y = 11$; b) $\frac{x}{4} = \frac{y}{7}$ và $x^2 - y^2 = -33$ c) $\frac{x}{4} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2}$ và $xyz = -648$.

Lỗi sai thường gặp của học sinh

✗ Câu a) học sinh biến đổi sai $4x = 3y$ suy ra $\frac{x}{4} = \frac{y}{3}$

✗ Câu b) học sinh biến đổi $\frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{x^2 - y^2}{4 - 7}$ (quên bình phương mẫu số) và kết luận giá trị $x; y$ sai (có 2 trường hợp và $x; y$ cùng dấu)

✗ Câu c) học sinh vận dụng sai $\frac{x}{4} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2} = \frac{x.y.z}{4.3.2}$ và lỗi thiếu ngoặc khi sử dụng các phép nhân khi dùng phương pháp đặt k

Lời giải chuẩn:

a) Ta có $4x = 3y$ *suy ra* $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{x - y}{3 - 4} = \frac{11}{-1} = -11$

Suy ra $\begin{cases} x = -11.3 = -33 \\ y = -11.4 = -44 \end{cases}$

Vậy $(x; y) = (-33; -44)$.

b) Ta có $\frac{x}{4} = \frac{y}{7}$ *suy ra* $\frac{x^2}{16} = \frac{y^2}{49}$ và x, y cùng dấu

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$\frac{x^2}{16} = \frac{y^2}{49} = \frac{x^2 - y^2}{16 - 49} = \frac{-33}{-33} = 1$

Suy ra $\begin{cases} x^2 = 16 \\ y^2 = 49 \end{cases}$ *hay* $\begin{cases} x = \pm 4 \\ y = \pm 7 \end{cases}$

Vậy $(x; y) \in \{(4; 7); (-4; -7)\}$.

(Giáo viên có thể hướng dẫn thêm phương pháp đặt k)

c) Đặt $\frac{x}{4} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2} = k$ *suy ra* $\begin{cases} x = 4k \\ y = 3k \\ z = 2k \end{cases}$

Mà $xyz = -648$

Suy ra $4k.3k.2k = -648$

$24.k^3 = -648$

$k^3 = -27$

$k = -3$

Khi đó $\begin{cases} x = 4.(-3) = -12 \\ y = 3.(-3) = -9 \\ z = 2.(-3) = -6 \end{cases}$

Vậy $(x;y;z) = (-12;-9;-6)$.

Dạng 3: Tìm số, tính giá trị biểu thức, .. ở các tỉ lệ thức có dạng phức tạp

Ví dụ 3: Cho dãy tỉ số bằng nhau : $\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_2}{a_3} = ... = \frac{a_{2019}}{a_{2020}} = \frac{a_{2020}}{a_1}$

Tính giá trị biểu thức $B = \frac{(a_1 + a_2 + ... + a_{2020})^2}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + ... + a_{2020}^2}$

Lỗi sai thường gặp của học sinh

✗ Học sinh xét thiếu trường hợp sau khi vận dụng tính chất dãy tỉ số tạo ra mẫu số mới phải khác 0.

Lời giải chuẩn:

TH1: $a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_{2020} \neq 0$

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_2}{a_3} = ... = \frac{a_{2019}}{a_{2020}} = \frac{a_{2020}}{a_1} = \frac{a_1 + a_2 + ... + a_{2019} + a_{2020}}{a_2 + a_3 + ... + a_{2020} + a_1} = 1$$

Suy ra $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = ... = a_{2020}$

Ta có:

$$B = \frac{(2020a_1)^2}{2020.a_1^2} = 2020$$

TH2: $a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_{2020} = 0$

$B = 0$

Vậy $B = 1$ nếu $a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_{2020} \neq 0$

$B = 0$ nếu $a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_{2020} = 0$

B. Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch

*** Kiến thức cốt lõi:**

	Tỉ lệ thuận	Tỉ lệ nghịch
Định nghĩa	y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k $y=k.x$ $(k\neq 0)$ **hoặc** $\frac{y}{x}=k$ **(tỉ số không đổi)**	y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số k $y=\frac{k}{x}$ hay $xy=k(k\neq 0)$ **hoặc** $xy=k$ **(tích không đổi)**
Tính chất	$\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_3}{x_3}=\cdots=k$; $\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}$	$x_1.y_1=x_2.y_2=x_3.y_3=...=k$; $\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_2}{y_1}$
Áp dụng vào BT	$x;y;z$ tỉ lệ thuận với $a;b;c$ $\Rightarrow \frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$	$x;y;z$ tỉ lệ nghịch với $a;b;c$ $\Rightarrow a.x=b.y=c.z$

***Các dạng bài điển hình, quy chuẩn chung trình bày và lỗi sai của học sinh:**

Dạng 1: Tìm hệ số tỉ lệ, tìm giá trị các đại lượng

Ví dụ 1: Cho x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Gọi x_1,x_2 là 2 giá trị của x và y_1,y_2 là hai giá trị tương ứng của y.

a) Biết $x_1=8;y_1=3;y_2=9$. Tìm x_2

b) Biết $3x_1+2x_2=46$; $3y_1+2y_2=-11,5$. Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x.

Lỗi sai thường gặp của học sinh

✗ Nhầm lẫn tính chất tỉ lệ thuận sang tỉ lệ nghịch:

Lập sai tỉ số: $\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_2}{y_1}$ (đây là tính chất của tỉ lệ nghịch)

✗ Chưa biết cách tạo hệ số 3 và 2 ở câu b.

Lời giải chuẩn:

a) Vì với $x_1=8$ thì $y_1=3$ nên suy ra: $k=\frac{y_1}{x_1}=\frac{3}{8}$ hay $y=\frac{3}{8}x$

Suy ra: $y_2=\frac{3}{8}x_2$ hay $x_2=\frac{8}{3}y_2=\frac{8}{3}.9=24$

Vậy $x_2=24$

b) Vì x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: $y=kx$ hay $k=\frac{y}{x}=\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$

Nên suy ra: $k=\frac{3y_1}{3x_1}=\frac{2y_2}{2x_2}$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

$k=\frac{3y_1}{3x_1}=\frac{2y_2}{2x_2}=\frac{3y_1+2y_2}{3x_1+2x_2}=\frac{-11,5}{46}=\frac{-1}{4}$ (Vì $3x_1+2x_2=46$; $3y_1+2y_2=-11,5$)

Suy ra: $k=\frac{y}{x}=\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{-1}{4}$

Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là $\frac{-1}{4}$

Dạng 2: Bài toán thực tế

Ví dụ 2: Hai xe lửa đi từ A đến B lần lượt mất 2 giờ 48 phút và 4 giờ 40 phút. Biết rằng vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai là 26 km/h. Tính quãng đường AB.

Lỗi sai thường gặp của học sinh

✗ Không biết đổi đơn vị

✗ Sai bản chất: nhầm đại lượng tỉ lệ nghịch và tỉ lệ thuận

Học sinh lập công thức: $\frac{v_1}{t_1}=\frac{v_2}{t_2}$

Lời giải chuẩn:

Đổi 2 giờ 48 phút $=\frac{14}{5}$ (giờ); 4 giờ 40 phút $=\frac{14}{3}$ (giờ).

Gọi vận tốc của xe lửa thứ nhất và xe lửa thứ hai lần lượt là v_1; v_2 (km/h) ($v_1;v_2>0$).

Vì trên cùng quãng đường AB nên vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Ta có:

$$v_1\cdot\frac{14}{5}=v_2\cdot\frac{14}{3} \text{ nên } \frac{v_1}{5}=\frac{v_2}{3}$$

Theo đề bài, vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai là 26 km/h nên: $v_1-v_2=26$.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: $\frac{v_1}{5}=\frac{v_2}{3}=\frac{v_1-v_2}{5-3}=\frac{26}{2}=13$.

Do đó $v_1=5\cdot13=65$ (km/h); $v_2=3\cdot13=39$ (km/h).

Quãng đường AB là: $S=v_1\cdot t_1=65\cdot\frac{14}{5}=182$ (km).

Vậy quãng đường AB dài 182 km.

Thầy cô lưu ý nhắc nhở học sinh cần ghi dòng lập luận để đưa ra mối quan hệ giữa hai đại lượng là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch.

C. Tam giác bằng nhau


***Kiến thức cốt lõi: Các trường hợp bằng nhau của tam giác (c-c-c; c-g-c; g-c-g)**

***Các dạng bài điển hình, quy chuẩn chung trình bày và lỗi sai của học sinh:**

Dạng 1: Chứng minh tam giác bằng nhau, chứng minh cạnh, góc bằng nhau

Phương pháp: Liệt kê yếu tố về cạnh, góc bằng nhau có sẵn dựa vào giải thiết, tìm thêm điều kiện nếu còn thiếu.

Ví dụ: Cho hình bên.



a) Chứng minh $\Delta HDB = \Delta HEC$;

b) Chứng minh $\widehat{DBH} = \widehat{ECH}$.

❌**Lỗi sai của học sinh:** Sử dụng trường hợp c-g-c, g-c-g nhưng sai yếu tố xen giữa, viết sai thứ tự đỉnh, cạnh tương ứng khi làm bài.

Lời giải: a) Xét ΔHDB và ΔHEC có:

$\widehat{HDB} = \widehat{HEC} = 90^o$

$HD = HE$

$\widehat{BHD} = \widehat{CHE}$ (2 góc đối đỉnh)

Vậy $\Delta HDB = \Delta HEC \left(g.c.g\right)$ (đpcm)

b) Vì $\Delta HDB = \Delta HEC$ (cmt)

Nên $\widehat{DBH} = \widehat{ECH}$ (2 góc tương ứng) (đpcm).

Lưu ý: Nhấn mạnh yếu tố "xen giữa" trong 2 trường hợp c-g-c và g-c-g
Nhấn mạnh cách chứng minh 2 góc, 2 cạnh bằng nhau ta có thể sử dụng hai tam giác bằng nhau chứa nó.
Nhắc nhở học sinh viết đầy đủ bước giải: Xét hai tam giác/ các điều kiện bằng nhau/ kết luận hai tam giác bằng nhau/ suy ra các cạnh, góc bằng nhau tương ứng.
- Phương pháp "Phân tích ngược": giáo viên cách hướng dẫn học sinh tư duy ngược: Để chứng minh $A = B$, ta cần tam giác nào bằng nhau? Trong hai tam giác đó có gì rồi? Còn thiếu gì?

Dạng 2: Chứng minh các yếu tố hình học khác (chứng minh song song, vuông góc, 3 điểm thẳng hàng,...)


Phương pháp: chứng minh tam giác bằng nhau, suy ra góc tương ứng bằng nhau, chỉ ra chúng ở vị trí soletrong hoặc đồng vị suy ra song song, vuông góc, để chứng minh thẳng hàng có thể sử dụng Tiên đề Euclid hoặc chứng minh tổng các góc bằng 180° *thông qua tam giác bằng nhau*

Ví dụ: Cho ΔABC $(AB < AC)$. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $AE = AB$. Tia AB và ED cắt nhau tại M.

a) Chứng minh $\Delta ABD = \Delta AED$;

b) Chứng minh $\Delta BDM = \Delta EDC$;

c) Gọi d_1 là đường thẳng đi qua C và song song với ED, d_2 là đường thẳng đi qua M và song song với BC. Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại F. Chứng minh 3 điểm A, D, F thẳng hàng.



❌ **Lỗi sai câu c:** Giáo viên hướng dẫn học sinh theo hướng:

Chứng minh: $\widehat{ADM} = \widehat{ADC}$ rồi suy ra $\widehat{MDF} = \widehat{CDF}$ (kề bù với $\widehat{ADM}$ và $\widehat{ADC}$)

Suy ra $\Delta MDF = \Delta CDF$ (c-g-c) nên $MF = CF$, chứng minh được $AM = AC$ từ đó chứng minh $\Delta AMF = \Delta ACF$ (c-g-c) nên AF là tia phân giác $\widehat{MAC}$ mà AD là tia phân giác $\widehat{MAC}$ suy ra A, D, F thẳng hàng.

Lời giải đúng: Chứng minh $\Delta DFM = \Delta FDC$ $(g-c-g)$ nên từ đó chứng minh được $MF = FC(= DC = MD)$ sau đó chứng minh $\Delta AMF = \Delta ACF$ (c-g-c) nên AF là tia phân giác $\widehat{MAC}$ mà AD là tia phân giác $\widehat{MAC}$ suy ra A, D, F thẳng hàng.

D. Tam giác cân – tam giác đều

***Kiến thức cốt lõi: Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết Tam giác cân, tam giác đều.**

***Các dạng bài điển hình, quy chuẩn chung trình bày và lỗi sai của học sinh:**


Ví dụ 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc B và góc C cắt cạnh AC, AB lần lượt ở D và E. Chứng minh rằng:

a) Tam giác AED cân; b) DE song song với BC; c) $BE = ED = DC$

❌ **Lỗi sai của học sinh: ngộ nhận trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh**

Ngộ nhận $AE = AD$ để chứng minh $\Delta AEC = \Delta ADB$ (c-g-c)

Lời giải đúng:



a) Ta có ΔABC cân tại A

Suy ra: $\begin{cases} AB = AC \\ \widehat{ABC} = \widehat{ACB} \end{cases}$ (tính chất)

Lại có BD, CE lần lượt là phân giác $\widehat{ABC}, \widehat{ACB}$

Suy ra $\widehat{ABD} = \widehat{DBC} = \dfrac{\widehat{ABC}}{2}$,

$\widehat{ACE} = \widehat{ECB} = \dfrac{\widehat{ACB}}{2}$

Mà $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$ (cmt)

nên $\widehat{ABD} = \widehat{DBC} = \widehat{ACE} = \widehat{ECB}$

Xét ΔAEC và ΔADB có:

$\widehat{BAC}$ *chung*

$AC = AB$ (cmt)

$\widehat{ACE} = \widehat{ABD}$ (cmt)

Suy ra $\Delta AEC = \Delta ADB$ $(g.c.g)$

Suy ra $AE = AD$

Vậy ΔAED cân tại A.

b) Có ΔABC cân tại A (gt) nên

$\widehat{ACB} = \dfrac{180^o - \widehat{A}}{2}$

Lại có ΔAED cân tại $\widehat{A}$ (cmt) nên

$\widehat{ADE} = \dfrac{180^o - \widehat{A}}{2}$

Suy ra $\widehat{ADE} = \widehat{ACB}$. Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên DE // BC $(dhnb)$.

c) +) Ta có $\widehat{ABD} = \widehat{DBC}$ (cmt) hay

$\widehat{EBD} = \widehat{DBC}$

Lại có $DE // BC$ (cmt) nên

$\widehat{EDB} = \widehat{DBC}$ (so le trong)

Suy ra $\widehat{EBD} = \widehat{EDB} \left(= \widehat{DBC}\right)$

Suy ra ΔEBD cân tại E.

Suy ra $BE = ED$ (tính chất)

+) Chứng minh tương tự $ED = DC$

Suy ra $BE = ED = DC$.

Ví dụ 2:

3. Một vài tồn đọng trong thời gian vừa qua:

*Giảng dạy và tác phong:
Giáo viên tới lớp muộn: 7D2 MĐ ; 7B3 HĐ; 7A1 LĐ; 7.3D LH; …
Giáo viên không đeo thẻ tên: 7.1B LH; 7A3 MĐ; 7A4 MĐ; 7B2 CG; 7C2 CG; 7A3 CG; 7.3C LH; 7A1 MĐ; 7A1 CG; 7A2 HBT; 7B3 HBT; 7D2 HBT; 7B3 HBT; 7B2 HĐ; …
Yêu cầu thầy cô thực hiện đúng tác phong giảng dạy, có mặt tại lớp trước 5 phút theo đúng quy định của CLB.

* Khảo sát Quý:
+ Lớp 7A4 HBT; 7A2 XL; – Giáo viên nhập điểm danh sai.
+ Lớp 7T3B, 7.3C LH, 7A3 CG; 7.1B; 7.3D LH – Giáo viên chưa nhập điểm và nhận xét đúng thời hạn
+ Lớp 7B3 HBT, 7B1 CG; 7A1 LB; 7A1 XL – giáo viên nhận xét sơ sài
* Quy tắc chấm thi: đối chiếu kĩ từng câu, kiểm tra kĩ phép tính của học sinh, không để xảy ra hiện tượng chấm sai cho học sinh, nhập điểm, nhận xét bài kiểm tra đúng thời hạn.
Yêu cầu thầy cô thực hiện đúng tác phong giảng dạy

4.Thảo luận, góp ý.