

## Scanner abdominopelvien

### **Indication :**

### **Technique :**

Acquisition volumique sans (abdomen) puis après injection intraveineuse de produit de contraste iodé aux temps artériel (abdomen) et portal (abdomen et pelvis).

### **Résultat :**

Absence de comparatif disponible.

Pancréas de trophicité normale pour l'âge.

Rehaussement homogène du parenchyme.

Absence de lésion focale significative.

Absence de dilatation du canal pancréatique principal.

Absence d'anomalie de la graisse péripancréatique.

Foie de taille et de morphologie normales, sans lésion focale suspecte.

Perméabilité mésentérique-porte et hépatite-cave.

Absence de dilatation des voies biliaires. Vésicule biliaire sans lithiasse dense.

Absence d'anomalie significative de la rate, des surrénales, des reins, des voies urinaires ou de la vessie. Absence d'anomalie de calibre ou de paroi du tube digestif, sous réserve de la non préparation du tube digestif. Absence d'épanchement péritonéal ou de collection intra-abdominale. Absence de pneumopéritoine.

Pas d'adénomégalie sous-diaphragmatique.

Absence d'anomalie significative de l'aorte et de ses principaux troncs, sous réserve d'un examen non dédié.

Absence d'effet de masse pelvien.

Absence d'anomalie des bases thoraciques.

Absence de lésion osseuse suspecte.

### **Conclusion :**