

高三二部数学错题重组 (12.9)

姓名: _____ 班级: _____ 考号: _____

一、单选题

1. (5分) 若 $\{a, b, c\}$ 构成空间的一个基底, 则下列向量不共面的是()

A. $b+c, b, b-c$

B. $a, a+b, a-b$

C. $a+b, a-b, c$

D. $a+b, a+b+c, c$

【答案】 C

【解析】 因为 $\{a, b, c\}$ 构成空间的一个基底, 所以向量 a, b, c 不共面.

对于A, 因为 $b = \frac{1}{2}(b+c) + \frac{1}{2}(b-c)$, 所以 $b+c, b, b-c$ 三个向量共面;

对于B, 同理可得, 向量 $a, a+b, a-b$ 共面;

对于C, 若 $a+b, a-b, c$ 共面, 则


$$c = x(a+b) + y(a-b) = (x+y)a + (x-y)b,$$

则 a, b, c 共面, 与向量 a, b, c 不共面矛盾, 所以 $a+b, a-b, c$ 不共面, 所以C正确;

对于D, 因为 $a+b+c = (a+b) + c$, 所以 $a+b, a+b+c, c$ 三个向量共面.

故选: C.

2. (5分) 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $AB = \sqrt{2}BB_1$, 则 AB_1 与 BC_1 所成角的大小为()



A. 60°

B. 90°

C. 105°

D. 75°

【答案】 B

【解析】 设 $BB_1 = 1$, 则

$$AB = \sqrt{2}, \quad \overrightarrow{AB_1} = \overrightarrow{BB_1} - \overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{BC_1} = \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{BC},$$

$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC_1} &= (\overrightarrow{BB_1} - \overrightarrow{BA}) \cdot (\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{BC}) = \overrightarrow{BB_1}^2 + \overrightarrow{BB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BB_1} \cdot \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= 1 - \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \cos 60^\circ = 0, \end{aligned}$$

$$\therefore \overrightarrow{AB_1} \perp \overrightarrow{BC_1}, \therefore AB_1 \perp BC_1.$$

$\therefore AB^1$ 与 BC^1 所成角的大小为 90° .

故选: B.

3. (5分) 已知点 $A(2, -3)$, $B(-2, 1)$, 若过点 $P(1, 2)$ 的直线 l 与线段 AB 相交, 求直线 l 的斜率 k 的取值范围为 ()

A. $k \geq \frac{1}{3}$ 或 $k \leq -5$


B. $k \geq \frac{1}{3}$ 或 $k \leq -\frac{1}{5}$

C. $-5 \leq k \leq \frac{1}{3}$

D. $-\frac{1}{5} \leq k \leq \frac{1}{3}$

【答案】 A

【解析】 直线 l 方程为 $kx - y - k + 2 = 0$ 转化为 $k(x - 1) - (y - 2) = 0$,
所以直线 l 过定点 $P(1, 2)$, 且与线段 AB 相交, 如图所示,



则直线 PA 的斜率是 $k_{PA} = \frac{-3-2}{2-1} = -5$, 直线 PB 的斜率是 $k_{PB} = \frac{1-2}{-2-1} = \frac{1}{3}$,

则直线 l 与线段 AB 相交时, 它的斜率 k 的取值范围是 $k \geq \frac{1}{3}$ 或 $k \leq -5$.

故选: A.

二、多选题

4. (6分) 若 l_1 与 l_2 为两条直线, 它们的倾斜角分别为 α_1, α_2 , 斜率分别为 k_1, k_2 , 则下列说法正确的是 ()

A. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则斜率 $k_1 = k_2$

B. 若斜率 $k_1 = k_2$, 则 $l_1 \parallel l_2$

C. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则倾斜角 $\alpha_1 = \alpha_2$

D. 若倾斜角 $\alpha_1 = \alpha_2$, 则 $l_1 \parallel l_2$

【答案】 AC

【解析】 需考虑两条直线重合的情况, B, D都可能是两条直线重合, 所以A, C正确.

5. (6分) 已知直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 和直线 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$, 则下列说法正确的是 ()

A. 若 $A = 0$, 则 l 表示与 x 轴平行或重合的直线

当 $A_2 = 0$ 时, 直线 l_2 方程为 $B_2y + C_2 = 0$, 可变形为 $y = -\frac{C_2}{B_2}$ ($B_2 \neq 0$) ,

B. 直线 l_1 可以表示任意一条直线

C. 若 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$, 则 $l_1 \parallel l_2$

D. 若 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$, 则 $l_1 \perp l_2$

【答案】 ABD

【解析】 选项A: 当 $A_2 = 0$ 时, 直线 l_2 方程为 $B_2y + C_2 = 0$, 可变形为 $y = -\frac{C_2}{B_2}$ ($B_2 \neq 0$) ,

其斜率为0, 此时 l_2 是与 x 轴平行或重合的直线, A正确.

选项B: 对于直线 $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$, 当 $B_1 = 0$ 时, 直线方程为 $x = -\frac{C_1}{A_1}$ ($A_1 \neq 0$) ,

表示垂直于 x 轴的直线;

当 $B_1 \neq 0$ 时, 可化为斜截式 $y = -\frac{A_1}{B_1}x - \frac{C_1}{B_1}$, 表示有斜率的直线,

所以直线 l_1 可以表示任意一条直线, B正确.

选项C: 若 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$, 当 $A_1C_2 - A_2C_1 = 0$ 且 $B_1C_2 - B_2C_1 = 0$ 时, 两直线重合;

只有当 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$ 或 $B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0$ 时, $l_1 \parallel l_2$, C错误.

选项D: 当 $B_1B_2 \neq 0$ 时, 直线 l_1 斜率 $k_1 = -\frac{A_1}{B_1}$, 直线 l_2 斜率 $k_2 = -\frac{A_2}{B_2}$,

由 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 可得 $k_1k_2 = -1$, 则 $l_1 \perp l_2$;


当 $B_1 = 0$ (此时 $B_2 = 0$ 不成立) 时, $A_1 \neq 0$, l_1 垂直于 x 轴,

由 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 得 $A_2 = 0$, l_2 平行于 x 轴, 两直线垂直, D正确.


综上, 答案选ABD.

三、解答题

6. (10分) 如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为1, E 为 CD 的中点, 求点 D_1 到平面 AEC_1 的距离.



【答案】 解: 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 以 D 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系,



设 $n = (x, y, z)$ 为平面 AEC_1 的法向量,

$$\text{所以} \begin{cases} n \cdot \overrightarrow{AE} = -x + \frac{1}{2}y = 0, \\ n \cdot \overrightarrow{AC_1} = -x + y + z = 0, \end{cases}$$

所以 D_1 到平面 AEC 的距离为 $\frac{|\overrightarrow{D_1A} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{|(1,0,-1) \cdot (1,2,-1)|}{\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

- (1)求 BN 的长;
(2)求 $\cos\left\langle\overrightarrow{BA_1},\overrightarrow{CB_1}\right\rangle$ 的值;
(3)求证: $A_1B\perp C_1M$.

(1)由题意得 $B(0, 1, 0)$, $N(1, 0, 1)$

$$\therefore \left| \overrightarrow{BN} \right| = \sqrt{(1-0)^2 + (0-1)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{3}.$$

(2)由题意得 $A_1(1, 0, 2)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 0)$, $B_1(0, 1, 2)$,

$$\therefore \overrightarrow{A_1B} = (-1, 1, -2), \quad \overrightarrow{C_1M} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right),$$

$$\therefore \overrightarrow{A_1B} \perp \overrightarrow{C_1M}, \text{ 即 } A_1B \perp C_1M.$$