2.5 Слабая сходимость. ЗБЧ. ЦПТ.

Пререквизиты

Сходимость. Слабая. По распределению.

$$\int_{\Omega} \phi(\xi_n(\omega)) \mathbb{P}(d\omega) \to \int_{\Omega} \phi(\xi(\omega)) \mathbb{P}(d\omega)$$

или

$$\int_{\mathbb{R}} \phi(x) F_n(dx) \to \int_{\mathbb{R}} \phi(x) F_n(dx)$$

Очень полезная лемма

Если
$$\xi_n \xrightarrow{d} const$$
, то $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} const$

Сходимость. В среднем.

$$\mathbb{E}|\xi_n - \xi|^p \to 0$$

Характеристические функции

$$\phi_{\xi}(t) = \mathbb{E}(e^{it\xi})$$

Закон больших чисел.

Для (необязательно независимых и необязательно одинаковораспределенных) $\{\xi_i\}_{i=1}^{\infty}$ с конечными первыми моментами

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} \xi_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}\xi_i}{n} \stackrel{\mathbb{P}}{\to} 0$$

Закон больших чисел Чебышева

Для попарно независимых и одинаковораспределенных $\{\xi_i\}_{i=1}^\infty$ с конечными вторыми моментами

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} \xi_i}{n} \stackrel{\mathbb{P}}{\to} \mathbb{E}\xi_1$$

Закон больших чисел Хинчина

Для в совокупности независимых и одинаковораспределенных $\{\xi_i\}_{i=1}^\infty$ с конечными первыми моментами

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} \xi_i}{n} \stackrel{\mathbb{P}}{\to} \mathbb{E}\xi_1$$

Усиленный Закон больших чисел Колмогорова

Для независимых в совокупности и необязательно одинаковораспределенных $\{\xi_i\}_{i=1}^\infty,$ если $\sum_{i=1}^n \frac{\mathbb{D}\xi_i}{n^2} < \infty,$ то

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} \xi_i}{n} \stackrel{\text{\tiny II.H.}}{\to} \mathbb{E}\xi_1$$

Классическая ЦПТ

Для в совокупности независимых и одинаковораспределенных $\{\xi_i\}_{i=1}^\infty$ с конечными вторыми моментами удовлетворяет

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^{n} \xi_i\right) - n\mathbb{E}(\xi_1)}{\sqrt{n\mathbb{D}(\xi_1)}} \to N(0,1)$$

ЦПТ Линдеберга

Для независимых $\{\xi_i\}_{i=1}^\infty$ с конечными **вторыми** моментами и условия Линдерберга

$$\forall \varepsilon > 0 \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E} \left[\frac{(\xi_i - \mu_i)^2}{s_n^2} \mathbf{1}_{\{|X_i - \mu_i| > \varepsilon s_n\}} \right]$$
$$\frac{(\sum_{i=1}^{n} \xi_i) - n\mathbb{E}(\xi_1)}{\sqrt{n\mathbb{D}(\xi_1)}} \to N(0, 1)$$

2.5 Слабая сходимость. ЗБЧ. ЦПТ. Х-ские функции

Практика

- 1. Пусть $\xi_n \stackrel{d}{\to} \xi$ и g(x) непрерывная функция. Докажите, что $g(\xi_n) \stackrel{d}{\to} g(\xi)$
- 2. Пусть $E|\xi_n| \to E|\xi|$. Сходится ли $E|\xi_n + k| \to E|\xi + k|$?
- 3. Найти характеристические функции для кубика и экспоненциального распределения.
- 4. Пусть $\xi_1 \sim N(0,1)$. Положим $\chi_n^2 = \sum_{i=1}^n \xi_i^2$ и $\tau_n = \frac{\xi_{n+1}}{\sqrt{\frac{\chi_n^2}{n}}}$ Найти предельное распределение величины τ

Домашка

- 1. (1) Пусть $\xi_n \stackrel{d}{\to} \xi$ и $\mu_n \stackrel{d}{\to} \mu$. Для любой непрерывной функции f. $f(\xi_n, \mu_n) \stackrel{d}{\to} f(\xi, \mu)$
- 2. (2)Пусть $\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$ последовательность независимых одинаково распределенных (н.о.р) случайных величин с конечной дисперсией. Доказать:

$$\frac{\max\left(\xi_1,\ldots,\xi_n\right)}{\sqrt{n}} \stackrel{\mathrm{d}}{\to} 0$$

- 3. (2)Пусть $\alpha>0$ и $E|\xi_n|^\alpha<\infty$ при всех п. Доказать, что следующие утверждения эквивалентны: 1) $\xi_n\to \xi$ по вероятности и $E|\xi_n|^\alpha\to E|\xi|^\alpha<\infty$ при $n\to\infty$; 2) $E|\xi_n-\xi|^\alpha\to 0$ при $n\to\infty$.
- 4. (1)Вычислить характеристическую функцию распределения Лапласа.
- 5. (2)Пусть $\{\xi_i\}_{i=1}^{\infty}$ с конечными матожиданием μ и дисперсией σ^2 . Положим $\eta_n = \frac{\xi_1 + \ldots + \xi_n}{\xi_1^2 + \ldots + \xi_n^2}$. Доказать, что η_n сходится по вероятности и найти этот предел.