TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 6 — Calculer des probabilités

Rappel : en cas d'équiprobabilité, $P(A) = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$.

1 On lance un dé équilibré à 6 faces. Calculer :


$P(\text{obtenir 5}) = \ldots$ $P(\text{obtenir un nombre pair}) = \ldots\ldots$

$P(\text{obtenir au moins 5}) = \ldots\ldots$ $P(\text{obtenir 8}) = \ldots$

2 Un sac contient les boules ci-contre (4 rouges, 6 bleues, 2 vertes). On tire une boule au hasard.

$P(\text{rouge}) = \ldots\ldots\ldots$ $P(\text{bleue}) = \ldots\ldots$

$P(\text{verte}) = \ldots\ldots\ldots$ $P(\text{jaune}) = \ldots$



3 **Le jeu de 32 cartes.** (4 couleurs : pique, cœur, carreau, trèfle ; 8 cartes par couleur : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as.) On tire une carte au hasard.

P(un cœur) = ... P(un as) = ...

P(une figure : valet, dame, roi) = ... P(le roi de pique) = ...

4 On choisit au hasard un nombre entier entre 1 et 20 (inclus).

a. P(multiple de 3) = ... **b.** P(nombre premier) = ...

c. Donner les résultats sous forme de pourcentages : .....

Sur le cahier

5 Une urne contient 3 boules rouges et des boules noires. La probabilité de tirer une rouge est $\frac{1}{5}$. Combien y a-t-il de boules noires ?