
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 6 — Situations sans équiprobabilité

Rappel : la somme des probabilités de toutes les issues vaut 1. Sur une roue, la probabilité d'un secteur est proportionnelle à son angle.

1 On fait tourner la roue ci-contre.



a. $P(\text{rouge}) = \ldots\ldots\ldots$
b. $P(\text{bleu}) = \ldots\ldots\ldots$
c. $P(\text{vert}) = \ldots\ldots\ldots$
d. Vérifier que la somme vaut 1 : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

2 Un dé truqué à six faces donne les probabilités suivantes :

Face	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,1	0,1	0,15	0,15	0,2	...

a. Compléter le tableau.
b. $P(\text{pair}) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

3 Dans une urne, il y a des boules jaunes, rouges et vertes. On sait que $P(\text{jaune}) = \frac{1}{4}$ et $P(\text{rouge}) = \frac{1}{3}$.

a. Calculer $P(\text{verte})$: .....

b. Quel est le plus petit nombre de boules possible dans l'urne ? .....

4 Pour chaque situation, dire s'il y a équiprobabilité.

a. Lancer une pièce équilibrée. ...

b. Lancer une punaise (pointe en haut ou en bas). ...

c. Noter la somme de deux dés. ...

d. Tirer au sort un élève de la classe. ...

Sur le cahier

5 Construire une roue à trois couleurs telle que $P(\text{rouge}) = \frac{1}{2}$, $P(\text{bleu}) = \frac{1}{3}$ et $P(\text{vert}) = \frac{1}{6}$. Indiquer les angles.