TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 4 — Chercher des antécédents

Rappel : chercher un antécédent de b, c'est trouver x tel que $f(x) = b$: je résous une équation.

1 $f(x) = 2x - 5$. Trouver l'antécédent de :

a. 7 : ..... **b.** -1 : .....

c. 0 : ..... **d.** -12 : .....

2 $g(x) = 4 - 3x$. Quel nombre a pour image 16 par g ?

.....

3 $k(x) = x^2$. Trouver tous les antécédents de :

25 : ..... 0 : ..... -9 : ..... 7 : .....

4 Voici un tableau de valeurs d'une fonction m.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$m(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

a. Image de -1 : ...

b. Antécédents de 0 : .....

c. Antécédents de 5 : .....

d. Antécédent(s) de -4 : ...

5 **Le forfait.** Un forfait téléphonique coûte $C(n) = 0{,}05n + 15$ euros pour n SMS envoyés au-delà du forfait. Combien de SMS a-t-on envoyés si on paie 22 € ?

.....

.....

Sur le cahier

6 $f(x) = (x - 1)(x + 4)$. Trouver les antécédents de 0 par f.