



□ 역행렬과 연립일차방정식

(1) 연립일차방정식의 행렬 표현

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+by=p \\ cx+dy=q \end{cases}$ 를 행렬로 표현하면 ($AX=B$) 이다.

$$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad X=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 다음 연립일차방정식을 행렬을 활용하여 $AX=B$ 꼴로 나타내시오.

$$(1) \begin{cases} 5x+7y=32 \\ 4x-3y=1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{cases} 6x-11y=-8 \\ 9x+2y=41 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -11 \\ 9 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 41 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{cases} 8x+3y=50 \\ -5x+12y=7 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 8 & 3 \\ -5 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 7 \end{pmatrix}$$

(2) 역행렬을 활용한 연립일차방정식의 풀이

연립일차방정식 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 에 대해 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\det(A) \neq 0$ 이면 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 이다.

■ 개념 확인 문제

[문제] 다음 연립일차방정식을 행렬로 나타낸 뒤, 역행렬을 활용하여 해를 구하시오.

$$(1) \begin{cases} 2x-3y=-2 \\ x-y=1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x-2y=5 \\ -x+3y=-6 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x+3y=-5 \\ -x+2y=-8 \end{cases}$$

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -8 \end{pmatrix}, \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 \\ -8 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 14 \\ -21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

□ 연립일차방정식의 해의 존재성

연립일차방정식 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 에 대해 다음이 성립한다. (단, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$)

- ① $\det(A) \neq 0$ 이면, (해가 유일하게 존재한다)
 ② $\det(A) = 0$ 이면, (해가 무수히 많다) 또는 (해가 없다)

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 연립일차방정식 $\begin{cases} 3x + ky = 7 \\ 6x + 4y = 11 \end{cases}$ 에 대해 다음 물음에 답하시오.

(1) 연립일차방정식의 해가 오직 하나만 존재하도록 하는 실수 k 의 값의 조건을 구하시오.

$\det A = 12 - 6k \neq 0$, $k \neq 2$ 이면 해가 유일하게 존재한다.

(2) 연립일차방정식의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

$\det A = 12 - 6k = 0$, $k = 2$ 이면 해가 존재하지 않는다.

[문제 2] 연립일차방정식 $\begin{cases} 2x - y = k \\ -6x + 3y = 9 \end{cases}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 연립일차방정식의 해를 갖지 않도록 하는 k 의 값의 조건을 구하시오.

$\det A = 0$ 이므로 해가 무수히 많거나 존재하지 않는다. 이때 $k \neq -3$ 이면 해가 존재하지 않는다.

(2) 연립일차방정식의 해가 무수히 많도록 하는 k 의 값을 구하시오.

$k = -3$ 이면 해가 무수히 많다.

■ 생각해 보기: 행렬만으로 해의 개수를 판단할 수 있을까?

연립일차방정식을 $AX = B$ 로 나타내었을 때, $\det(A) = 0$ 이면, 해가 무수히 많거나 존재하지 않는다. 예를 들어보자. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대해 다음 두 연립일차방정식을 보자.

$$AX = \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \end{pmatrix} \quad AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \end{pmatrix}$$

두 경우의 계수행렬 A 는 동일하다. 그런데 해의 개수도 같을까? 계수행렬 A 의 두 행 사이의 관계와 상수항 행렬의 두 성분 사이의 관계를 비교하여, 연립일차방정식을 직접 풀지 않고 해가 무수히 많은지, 해가 없는지를 구분할 수 있다. 우변의 행렬을 B 라 하면, 행렬 A 와 B 를 이어 붙인 행렬을 확대 행렬이라 하는데, 이는 다음과 같다.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -3 \\ -6 & 3 & 9 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 0 \\ -6 & 3 & 9 \end{array} \right)$$

전자의 경우는 첫 번째 행에 -3 을 곱하면 두 번째 행이 되므로, 이 경우에는 해가 무수히 많다고 판단할 수 있다. 후자의 경우는 첫 번째 행에 어떤 수를 곱해도 두 번째 행을 만들 수 없으므로 해가 없다고 판단할 수 있다. 이처럼 해가 무수히 많은지, 해가 없는지는 계수와 상수항의 관계가 일치하는지 여부를 파악해야만 판단할 수 있다.

※ 대학 수학 중에 선형대수학이라는 분야에서 rank(행렬의 계수), 일차독립과 종속이라는 개념과 연관이 있다.

□ 25차시 실전 문제

01

연립일차방정식

$$\begin{cases} 3x+2y=7 \\ y=2x-5 \end{cases}, X=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

을 $AX=B$ 꼴로 나타낼 때, 행렬 A 로 옳은 것은?

- ① $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$

02

행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$AX=\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

을 만족시킬 때, x^2+y^2 의 값은?

- ① 5 ② 9 ③ 10
 ④ 13 ⑤ 17

$$X=A^{-1}\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

따라서 $x=2$, $y=3$ 이므로 $x^2+y^2=13$ 이다.

03

행렬 $A=\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$AX-2X=\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

일 때, $2x+y$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

$$AX-2X=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

따라서 $x=2$, $y=-1$ 이므로 $2x+y=1$ 이다.

04

두 연립일차방정식

$$\begin{cases} 2x+y=7 \\ x+2y=8 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+y=9 \\ x+2y=6 \end{cases}$$

의 해를 각각 (a, b) , (c, d) 라고 할 때, $ad+bc$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18
 ④ 20 ⑤ 22

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 8 & 6 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 $ad+bc=14$ 이다.

05

실수 a , k 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{cases} 2x+y=3 \\ kx+2y=a \end{cases}$$

에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $k \neq 4$ 이면 a 의 값에 관계없이 해가 오직 한 쌍 존재한다.
 ㄴ. $k=4$, $a=6$ 이면 해가 존재하지 않는다.
 ㄷ. $k=4$, $a \neq 6$ 이면 해가 존재하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ k & 2 \end{pmatrix}, \det A=4-k$$

ㄱ. $k \neq 4$ 이면, 역행렬이 존재하므로, a 의 값에 관계없이 해가 오직 한 쌍이 존재한다.

ㄴ. $k=4$, $a=6$ 이면 해가 무수히 많다.

ㄷ. $k=4$, $a \neq 6$ 이면 해가 존재하지 않는다.