

Apuntes de Calculo

Matias Leiva Zapata

February 8, 2023

1 Introduccion

el Calculo es una rama de las matematicas que estudia las variaciones de las cantidades y sus relaciones con otras, de esta curiosa rama de las matematicas se derivan muchas otras ramas como la Geometria, la Fisica, la Estadistica, en este recopilatorio de apuntes se intentara abarcar distintos problemas de estas diversas areas.

2 Problemas:

Problem 2.1 – Demuestre que:

$$\int_0^1 (1 - x^2)^n dx = \frac{2^n n!}{(2n + 1)!!}$$

Solucion:

Para poder solucionar esta integral, se debe realizar una sustitucion de variables para esto se debe realizar la siguiente sustitucion: $u = x^2$, de esta forma se obtiene la siguiente integral:

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-u)^n u^{-1/2} du$$

Luego de esto podemos integrar por partes usando las siguientes variables, $u = (1-x)^n$ y $v = x^{1/2}$, de esta forma se obtiene la siguiente integral:

$$\frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^n x^{-1/2} du = n \int_0^1 (1-x)^{n-1} x^{1/2} dx$$

inmediatamente podemos volver a integrar por partes usando variables similares, $u = n(1-x)^{n-1}$ y $v = \frac{2}{3}x^{3/2}$, de esta forma se obtiene la siguiente integral:

$$n \int_0^1 (1-x)^{n-1} x^{1/2} dx = \frac{2}{3} n(n-1) \int_0^1 (1-x)^{n-1} x^{3/2} dx$$

seguidamente notamos que la integral sigue una clase de recurrencia, la cual podemos escribir como:

$$I(n) = 2nI(n-1)$$

iterando nuevamente usando integracion por partes, nos damos cuenta que se obtiene la siguiente integral:

$$I(n) = \frac{4}{3} n(n-1)I(n-2)$$

$$I(n) = \frac{4}{3} \frac{2}{5} n(n-1)(n-2)I(n-3)$$

$$I(n) = \frac{4}{3} \frac{2}{5} \dots \frac{1}{2n+1} n(n-1)(n-2) \dots (1)I(1)$$

$$I(n) = \frac{2^n n!}{(2n+1)!!}$$

Solucion 2:

Para poder solucionar esta integral, se integra por partes, haciendo la siguiente sustitucion: $u = (1 - x^2)$, y $v = x$, de esta forma se obtiene la siguiente integral:

$$\int_0^1 (1 - x^2)^n dx = x(1 - x^2)^{n-1} \Big|_0^1 - n(-2) \int_0^1 x^2(1 - x^2)^{n-1} dx$$

$$\int_0^1 (1 - x^2)^n dx = 2n \int_0^1 x^2(1 - x^2)^{n-1} dx$$

$$\mathcal{I}(n) = 2n \int_0^1 (x^2 - 1 + 1)(1 - x^2)^{n-1} dx$$

$$\mathcal{I}(n) = 2n\mathcal{I}(n) - 2n\mathcal{I}(n-1)$$


$$\mathcal{I}(n) = \frac{2n}{2n+1} \mathcal{I}(n-1)$$

$$\mathcal{I}(n) = \frac{2n}{2n+1} \frac{2(n-1)}{2(n-1)+1} \mathcal{I}(n-2)$$

$$\mathcal{I}(n) = \frac{2^n n!}{(2n+1)!!}$$

Problem 2.2 – Círculos al infinito. Suponga que Círculos de igual diámetro están acomodados apretadamente en n filas dentro de un triángulo equilátero. Si A es el área del triángulo Y A_n es el área total ocupada por las n filas de círculos, demuestre que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{A} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$$



Problem 2.3 – Sumatoria. Determine el intervalo de convergencia de la siguiente sumatoria y calcule la suma.

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^3 x^n$$

Problem 2.4 – Pesadilla del geometra. Deduzca la siguiente formula de John Machin:

$$4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$$