

Математический анализ, 2 семестр

Лекция 5


Приложения определенного интеграла

6. Приложения определенного интеграла

Определенный интеграл применяется для вычисления площадей, длин и объемов различных геометрических фигур.

6.1. Площадь плоской фигуры

1. Площадь области на плоскости xOy , ограниченной графиками функций




$$y = f(x), y = g(x) \quad (g(x) < f(x))$$

и прямыми $x = a$ и $x = b$

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$


2. Площадь криволинейной трапеции, ограниченной кривой, заданной параметрически, т.е. уравнениями $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) , x(t_1) = a, x(t_2) = b \\ t \in [t_1, t_2] \end{cases}$



$$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t)dt$$

3. Площадь сектора, ограниченного линией, заданной в полярных координатах уравнением $r = r(\varphi)$, и двумя лучами $\varphi = \varphi_1$ и $\varphi = \varphi_2$

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} (r(\varphi))^2 d\varphi$$



Пример 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной:

параболой $y = 2 - x^2$ и прямой $y = x$.


Найдем точки пересечения графиков: $2 - x^2 = x$

$$x^2 + x - 2 = 0, x_1 = -2, x_2 = 1.$$

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^1 (2 - x^2 - x) dx = \left(2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-2}^1 = \\ &= 2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \left(-4 + \frac{8}{3} - 2 \right) = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Пример 2. Вычислить площадь области, ограниченной эллипсом

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > 0, b > 0$$




1 способ. Выразим из уравнения эллипса y :

$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$ и воспользуемся симметрией области:

$$\frac{1}{4}S = \int_0^a y(x)dx = b \int_0^a \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx = \left[\begin{array}{l} x = asint, \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \\ \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \cos t \\ dx = acostdt \end{array} \right] =$$

$$= ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = \frac{1}{4} \pi ab$$

$$S = \pi ab.$$



2 способ. Используем параметрическое задание эллипса: $\begin{cases} x = acost \\ y = bsint \\ 0 \leq t \leq 2\pi \end{cases}$.

В его верности можно убедиться, подставив x и y в уравнение эллипса: $\frac{(acost)^2}{a^2} + \frac{(bsint)^2}{b^2} = 1$ — верно.

$0 \leq x \leq a \Leftrightarrow t$ меняется от $\frac{\pi}{2}$ до 0, т.к. $x = 0 \Leftrightarrow acost = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{\pi}{2}$,

$x = a \Leftrightarrow acost = a \Rightarrow t_2 = 0$.


$$\frac{1}{4}S = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t)dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 bsint (acost)'dt = -ab \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^2 t dt =$$

$$= -ab \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^2 t \, dt = \frac{ab}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2t) \, dt = \frac{ab}{2} \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{ab}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi ab}{4}$$


$$S = \pi ab.$$

Пример 3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной полярной осью и первым витком спирали Архимеда: $\rho = a\varphi$, где a – положительное число.



При изменении φ от 0 до 2π полярный радиус описывает кривую, ограничивающую криволинейный сектор $OABC$ (см. рис.). Поэтому по формуле площади криволинейного сектора имеем

$$S_{OABC} = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \varphi^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \frac{\varphi^3}{3} \Big|_0^{2\pi} = \frac{a^2}{2} \frac{8\pi^3}{3} = \frac{4}{3} \pi^3 a^2.$$




Замечание. Расстояние от точки C до полюса равно $\rho = 2\pi a$. Поэтому круг радиуса OC имеет площадь

$$\pi OC^2 = 4\pi^3 a^2 = 3 \cdot \frac{4}{3} \pi^3 a^2 = 3S_{OABCS},$$

т.е. площадь фигуры, ограниченной полярной осью и первым витком спирали Архимеда, равна $\frac{1}{3}$ площади круга с радиусом, равным наибольшему из полярных радиусов витка. К этому выводу пришел еще Архимед.

6.2. Вычисление дуги кривой

1. Длина дуги плоской кривой, заданной на координатной плоскости уравнением $y = f(x)$, $x \in [a, b]$



$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$


2. Длина дуги плоской кривой, заданной на координатной плоскости параметрическими уравнениями $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ t \in [t_1, t_2] \end{cases}$, $x(t_1) = a, x(t_2) = b$.

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

3. Длина дуги пространственной кривой, заданной параметрическими уравнениями $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$, $t \in [t_1, t_2]$


$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

4. Длина дуги плоской кривой, заданной уравнением в полярных координатах $r = r(\varphi)$, $\varphi \in [\varphi_1, \varphi_2]$



$$L = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} d\varphi$$

Пример 4. Вычислить длину дуги плоской кривой $y = \frac{1}{3}(3 - x)\sqrt{x}$, заключенной между точками $O(0; 0)$ и $A(3; 0)$




$$L = \int_0^3 \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

$$y'(x) = \left(\frac{1}{3} (3-x)\sqrt{x} \right)' = \frac{1}{3} \left(-\sqrt{x} + \frac{3-x}{2\sqrt{x}} \right) = \frac{1-2x+3-x}{3 \cdot 2\sqrt{x}} = \frac{1-x}{2\sqrt{x}}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + (y'(x))^2} &= \sqrt{1 + \left(\frac{1-x}{2\sqrt{x}} \right)^2} = \sqrt{\frac{4x + 1 - 2x + x^2}{4x}} = \sqrt{\frac{(x+1)^2}{4x}} = \\ &= \frac{x+1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \int_0^3 \frac{x+1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \int_0^3 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} \right) \Big|_0^3 = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} \right) = 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Пример 5. Вычислить длину кардиоиды $r = a(1 + \cos\varphi)$, $a > 0$ и площадь области, ограниченной кардиоидой.



Для решения задачи воспользуемся симметрией линии относительно оси Ox .

$$r'(\varphi) = -a\sin\varphi,$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} = \\ &= \sqrt{a^2(1 + \cos\varphi)^2 + a^2\sin^2\varphi} = \\ &= a\sqrt{2 + 2\cos\varphi} = a\sqrt{4\cos^2\frac{\varphi}{2}} = \\ &= 2a\cos\frac{\varphi}{2}, \varphi \in [0, \pi]. \end{aligned}$$

$$L = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} d\varphi = 4a \int_0^{\pi} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 8a \sin \frac{\varphi}{2} \Big|_0^{\pi} = 8a.$$

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (r(\varphi))^2 d\varphi = a^2 \int_0^{\pi} (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi =$$


$$= a^2 \int_0^{\pi} \left(1 + 2\cos \varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right) d\varphi = a^2 \int_0^{\pi} \left(\frac{3}{2} + 2\cos \varphi + \frac{1}{2} \cos 2\varphi \right) d\varphi =$$

$$= a^2 \left(\frac{3}{2} \varphi + 2\sin \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{3}{2} \pi a^2.$$


6.3. Вычисление объема тела

1. Объем тела, площадь S сечения которого плоскостью, перпендикулярной оси Ox , известна как функция $S = S(x)$ переменной x .

$$V = \int_a^b S(x) dx$$



2. Объем тела, образованного вращением криволинейной трапеции вокруг оси Ox .




$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

3. Объем тела, образованного вращением вокруг оси Ox дуги кривой, заданной параметрическими уравнениями
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ t \in [t_1, t_2] \end{cases}$$

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} (y(t))^2 x'(t) dt$$

Пример 6. Вычислить объем тела, ограниченного эллипсоидом

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > 0, b > 0, c > 0$$



Сечением эллипсоида плоскостью, перпендикулярной оси Ox , является эллипс, уравнение которого имеет вид:

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2}$$

Поделив обе части уравнения на правую часть, получим:


$$\frac{y^2}{\left(b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\right)^2} + \frac{z^2}{\left(c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\right)^2} = 1$$

а площадь $S(x) = \pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$. Искомый объем можно вычислить как объем тела с известной площадью сечения $S(x)$.

$$V = \int_{-a}^a S(x) dx = \pi bc \int_{-a}^a \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = \pi bc \left(x - \frac{x^3}{3a^2}\right) \Big|_{-a}^a = \frac{4}{3} \pi abc.$$

6.4. Вычисление площади поверхности вращения

1. Площадь поверхности тела, образованного вращением вокруг оси Ox графика функции $y = f(x)$, $x \in [a, b]$




$$S_{\text{вр}} = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

2. Площадь поверхности тела, образованного вращением вокруг оси Ox дуги кривой, заданной параметрическими уравнениями $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [t_1, t_2]$.

$$S_{\text{вр}} = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

Пример 7. Вычислить площадь фигуры, ограниченной одной аркой циклоиды



$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi], a > 0$$

Вычислить длину одной арки циклоиды, а также объем и площадь поверхности тела, образованного вращением одной арки циклоиды вокруг оси Ox .

$$x'(t) = a(1 - \cos t), \quad y'(t) = a \sin t$$

$$S = \int_0^{2\pi} y(t)x'(t)dt = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t)a(1 - \cos t)dt =$$

$$= a^2 \int_0^{2\pi} \left(1 - 2\cos t + \frac{1 + \cos 2t}{2}\right) dt = a^2 \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2\cos t + \frac{1}{2}\cos 2t\right) dt =$$

$$= a^2 \left(\frac{3}{2}t - 2\sin t + \frac{1}{4}\sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = 3\pi a^2.$$

Для вычисления длины дуги предварительно упростим выражение:

$$\begin{aligned} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} &= \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} = a\sqrt{2 - 2\cos t} = \\ &= a\sqrt{4\sin^2 \frac{t}{2}} = 2a\sin \frac{t}{2}, t \in [0, 2\pi]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = -4a \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = \\ &= -4a(-1 - 1) = 8a. \end{aligned}$$

Для вычисления объема и площади поверхности тела вращения применим соответствующие формулы:

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^{2\pi} (y(t))^2 x'(t) dt = \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt = \\
 &= \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt = \\
 &= \pi a^3 \int_0^{2\pi} \left(1 - 3\cos t + \frac{3}{2}(1 + \cos 2t) \right) dt - \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \sin^2 t) d(\sin t) = \\
 &= \pi a^3 \left(\frac{5}{2}t - 3\sin t + \frac{3}{4}\sin 2t - \sin t + \frac{1}{3}\sin^3 t \right) \Big|_0^{2\pi} = \pi a^3 \cdot \frac{5}{2} \cdot 2\pi = 5\pi^2 a^3.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S_{\text{bp}} &= 2\pi \int_0^{2\pi} y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = 2\pi \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) 2a \sin \frac{t}{2} dt = \\
&= 2\pi a^2 \int_0^{2\pi} \left(2\sin \frac{t}{2} - 2\sin \frac{t}{2} \cos t \right) dt = 2\pi a^2 \int_0^{2\pi} \left(2\sin \frac{t}{2} - \sin \frac{3t}{2} + \sin \frac{t}{2} \right) dt = \\
&= \\
&= 2\pi a^2 \int_0^{2\pi} \left(3\sin \frac{t}{2} - \sin \frac{3t}{2} \right) dt = 2\pi a^2 \left(-6\cos \frac{t}{2} + \frac{2}{3}\cos \frac{3t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = \\
&= 2\pi a^2 \cdot 2 \cdot \left(6 - \frac{2}{3} \right) = \frac{64}{3} \pi a^2.
\end{aligned}$$

6.5. Приложения определенного интеграла для решения задач механики

Пусть плоская кривая задана уравнением $y = f(x)$, $x \in [a, b]$ и $\rho(x)$ – линейная плотность кривой. Тогда масса кривой вычисляется по формуле

$$m = \int_a^b \rho(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

а статические моменты относительно координатных осей Ox и Oy вычисляются соответственно по формулам:

$$m_x = \int_a^b \rho(x) f(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx, \quad m_y = \int_a^b \rho(x) x \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

Координаты точки C – центра масс кривой равны:

$$x_c = \frac{m_y}{m}, \quad y_c = \frac{m_x}{m}$$


Моменты инерции плоской кривой относительно координатных осей Ox и Oy также вычисляются с помощью определенного интеграла:

$$I_x = \int_a^b f^2(x) \rho(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

$$I_y = \int_a^b x^2 \rho(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

Если кривая однородна ($\rho(x) = \text{const}$), то формулы упрощаются.

Пример 8. Вычислить координаты центра масс и момент инерции относительно оси Ox однородной полуокружности $x^2 + y^2 = R^2, y \geq 0$, полагая $\rho(x) = 1$.



$$y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad y' = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}},$$

$$\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$

$$m = L = \int_{-R}^R \sqrt{1 + (y')^2} dx =$$

$$= \int_{-R}^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = R \arcsin \frac{x}{R} \Big|_{-R}^R = R \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \pi R.$$

В силу симметрии относительно оси Oy и однородности кривой $x_c = 0$.

$$m_x = \int_{-R}^R y \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx = \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = Rx \Big|_{-R}^R = 2R^2$$

$$y_c = \frac{m_x}{m} = \frac{2R^2}{\pi R} = \frac{2R}{\pi}, \quad C\left(0; \frac{2R}{\pi}\right).$$

$$I_x = \int_{-R}^R y^2 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_{-R}^R (R^2 - x^2) \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = R \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx$$

$$=$$

$$= \left[\begin{array}{l} x = R \sin t, t \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \\ \sqrt{R^2 - x^2} = R \cos t, dx = R \cos t dt \end{array} \right] = R \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} R^2 \cos^2 t dt =$$

$$= R^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{\pi R^3}{2}.$$

Если плоская кривая задана параметрическими уравнениями

$x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [t_1, t_2]$ и $\rho(t)$ – линейная плотность кривой, то справедливы следующие формулы:

$$m = \int_{t_1}^{t_2} \rho(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$


$$m_x = \int_{t_1}^{t_2} y(t)\rho(t)\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

$$m_y = \int_{t_1}^{t_2} x(t)\rho(t)\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} y^2(t)\rho(t)\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

$$I_y = \int_{t_1}^{t_2} x^2(t)\rho(t)\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

Пример 9. Вычислить координаты центра масс и момент инерции относительно оси Ox однородной арки циклоиды



$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t),$$

$$t \in [0; 2\pi], \quad a > 0, \quad \rho = 1$$

$$\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} = 2a \sin \frac{t}{2}$$

$$m = L = 8a \text{ (пример 7).}$$

В силу симметрии относительно прямой $x = \pi a$ и однородности линии

$$x_c = \pi a.$$

$$m_x = \int_0^{2\pi} y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) 2a \sin \frac{t}{2} dt =$$

$$= a^2 \int_0^{2\pi} \left(2\sin \frac{t}{2} - \sin \frac{3t}{2} + \sin \frac{t}{2} \right) dt = a^2 \left(-6\cos \frac{t}{2} + \frac{2}{3}\cos \frac{3t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= a^2 \left(12 - \frac{4}{3} \right) = \frac{32}{3} a^2$$

$$y_c = \frac{m_x}{m} = \frac{4}{3} a, \quad C \left(\pi a; \frac{4}{3} a \right)$$

$$I_x = \int_0^{2\pi} y^2(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 \cdot 2a \sin \frac{t}{2} dt =$$

$$= a^3 \int_0^{2\pi} \left(1 - 2\cos t + \frac{1 + \cos 2t}{2} \right) 2\sin \frac{t}{2} dt =$$

$$\begin{aligned}
&= a^3 \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2\cos t + \frac{\cos 2t}{2} \right) 2\sin \frac{t}{2} dt = \\
&= a^3 \int_0^{2\pi} \left(3\sin \frac{t}{2} - 2\sin \frac{3t}{2} + 2\sin \frac{t}{2} + \frac{1}{2}\sin \frac{5t}{2} - \frac{1}{2}\sin \frac{3t}{2} \right) dt = \\
&= a^3 \int_0^{2\pi} \left(5\sin \frac{t}{2} - \frac{5}{2}\sin \frac{3t}{2} + \frac{1}{2}\sin \frac{5t}{2} \right) dt = \\
&= a^3 \left(-10\cos \frac{t}{2} + \frac{5}{3}\cos \frac{3t}{2} - \frac{1}{5}\cos \frac{5t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = a^3 \left(20 - \frac{10}{3} + \frac{2}{5} \right) = \frac{256}{15} a^3.
\end{aligned}$$