

Hay más esperanza de vida en el mundo, pero las enfermedades prevenibles frenan su aumento

La esperanza de vida promedio



73,48

Brecha de esperanza de vida promedio

	Region	Esperanza de vida promedio (años) ▾
1.	Europa Occidental	77,49
2.	América Latina	69,58

1 - 2 / 2 < >

La esperanza de vida aumentó en ambas regiones durante las últimas décadas



Northstar Metric

Reducción de la brecha de la esperanza de vida promedio entre los países de América Latina vs los de Europa Occidental.

Esperanza de vida en 2021

AMÉRICA LATINA	71,62 AÑOS
EUROPA OCCIDENTAL	80,58 AÑOS



Brecha de Esperanza de Vida

8,96 AÑOS

Objetivo

Aumentar la esperanza de vida en América Latina un 5% en un horizonte de 3 años, con inversión limitada de un máximo de 2% de aumento en gasto sanitario, enfocándose en causas de muerte prevenibles y cobertura de vacunación.

Estrategia

Nuestros datos muestran que la prevención debe darse en dos ámbitos: por un lado en el incremento de la cobertura de vacunación en América Latina y por otro lado en la prevención de muertes prevenibles como lo son los trastornos nutricionales y la diabetes.

Indicadores de prevención: cobertura de vacunación por año, región y país

Region

Entity

Year

Igual a

Introduzca un valor

Cobertura Pol3 (%)

86,22


Cobertura Hib3 (%)

50,58


Cobertura MCV1 (%)

81,88


Cobertura de vacunas



¿Cómo aumentar la esperanza de vida de manera efectiva sin depender exclusivamente del aumento de gastos en salud?




Diabetes mellitus: tendencia creciente en ambas regiones, prevenible con educación alimentaria




Trastornos nutricionales: mayor impacto en América Latina, requiere intervención urgente

Comparación de muertes cada 100 mil habitantes debido a diabetes, deficiencias nutricionales y enfermedades cardiovasculares: Europa Occidental vs América Latina

Muertes por diabetes



Muertes por trastornos nutricionales



Resumen KPIs

% Cobertura vacunación Pol3 (poliomielitis)

al 2021 en AL 77,25% vs EO 94,20%

% Cobertura vacunación Hib3 (Influenza tipo b)

al 2021 en AL 79,04% vs EO 93,88%

Cobertura vacunación MCV1 (Sarampión)

al 2021 en AL 81,08% vs EO 94,2%

Tasa de mortalidad por trastornos nutricionales (cada 100k habitantes)

al 2019 este indicador se sitúa en América Latina en 8,36 muertes cada 100 mil habitantes (vs Europa Occidental 3,05/100K)

Tasa de mortalidad por diabetes (cada 100k habitantes)

al 2019 este indicador se sitúa en América Latina en 34,37 muertes cada 100 mil habitantes (vs Europa Occidental: 22,31/100K)

Acciones

Estudiar acciones tendientes a incrementar la vacunación en zonas no urbanas de América Latina

Estudiar acciones a realizar para mejorar la calidad de los alimentos de los programas de ayudas o asistencias alimentarias en zonas desfavorecidas de América Latina.

Estudiar fomentar y/o implementar acciones tendientes a mejorar los hábitos de vida de las personas con mayor riesgo de contraer diabetes.