

Oscillateur harmonique quantique en 1D

Mécanique Quantique

Hossein Rahimzadeh

8/19/2008

Oscillateur harmonique Quantique en 1D

Équation de Schrödinger :

$$\hat{H}|\Psi\rangle = \hat{E}|\Psi\rangle$$

Où,

- $|\Psi\rangle$: La fonction d'onde d'un système
- $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x)$: L'opérateur Hamiltonien du système
- $\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$: L'opérateur d'énergie

En une dimension :

$$\hat{H}\psi(x,t) = \hat{E}\psi(x,t)$$

$$\left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) \right] \psi(x,t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t)$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi(x,t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x,t) + V(x)\psi(x,t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t)$$

Soit $\psi'(x,t)$ une solution particulière de cette équation, par la méthode de séparation des variables on pose :

$$\psi'(x,t) = u(x)T(t)$$

On dérive :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi'(x, t) = T(t) \frac{d^2}{dx^2} u(x) \\ \frac{\partial}{\partial t} \psi'(x, t) = u(x) \frac{d}{dt} T(t) \end{cases}$$

On substitue dans l'équation de Schrödinger :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} T(t) \frac{d^2}{dx^2} u(x) + V(x) u(x) T(t) = i\hbar u(x) \frac{d}{dt} T(t)$$

On divise par $\psi'(x, t) = u(x)T(t)$:

$$\frac{1}{u(x)} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} u(x) + V(x) u(x) \right] = \frac{i\hbar}{T(t)} \frac{d}{dt} T(t)$$

Les termes de chaque côté de cette équation doivent être constante.

$$\underbrace{\frac{1}{u(x)} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} u(x) + V(x) u(x) \right]}_{cte=E} = \underbrace{\frac{i\hbar}{T(t)} \frac{d}{dt} T(t)}_{cte=E}$$

Le terme à droite :

$$\frac{i\hbar}{T(t)} \frac{d}{dt} T(t) = E \Rightarrow \frac{dT(t)}{T(t)} = -\frac{iE}{\hbar} dt \Rightarrow T(t) = e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

Le terme à gauche :

$$\frac{1}{u(x)} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} u(x) + V(x) u(x) \right] = E$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} u(x) + V(x) u(x) = E u(x)$$

C'est l'équation de Schrödinger indépendante du temps en une dimension.

C'est une équation aux valeurs propres car :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] u(x) = Eu(x), \text{ ou } \hat{H}u(x) = Eu(x)$$

Solution

Le potentiel de l'oscillateur harmonique quantique s'écrit :

$$V(x) = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

Donc,

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \right] u(x) = Eu(x)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} u(x) + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 u(x) = Eu(x)$$

Avec le changement de variable $y = \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{2}} x$,

$$\frac{d}{dx} = \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{d}{dy}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} = \frac{m\omega}{\hbar} \frac{d^2}{dy^2}$$

Donc, équation de Schrödinger s'écrit comme :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{m\omega}{\hbar} \frac{d^2}{dy^2} u(y) + \frac{1}{2} m\omega^2 \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right)^{\frac{1}{2}} y^2 u(y) = Eu(y)$$

$$-\frac{1}{2} \hbar\omega \frac{d^2}{dy^2} u(y) + \frac{1}{2} \hbar\omega y^2 u(y) = Eu(y)$$

$$\frac{d^2}{dy^2} u(y) - y^2 u(y) = -\frac{2E}{\hbar\omega} u(y)$$

$$\frac{d^2}{dy^2}u(y) + \left(\frac{2E}{\hbar\omega} - y^2\right)u(y) = 0$$

Alors, on doit résoudre l'équation suivante :

$$\boxed{\frac{d^2}{dy^2}u(y) + (\varepsilon - y^2)u(y) = 0 \quad \text{où} \quad \varepsilon = \frac{2E}{\hbar\omega}}$$

Solution asymptotique :

Pour les valeurs de y^2 suffisamment grands, cette équation devient :

$$\boxed{\frac{d^2}{dy^2}u_0(y) - y^2u_0(y) = 0}$$

Dont la solution asymptotique est de la forme :

$$u_0(y) \approx e^{-ay^2}$$

On trouve a en substituant dans l'équation :

$$\frac{d^2}{dy^2}e^{-ay^2} - y^2e^{-ay^2} = 0$$

Mais,

$$\frac{d^2}{dy^2}e^{-ay^2} = -2ae^{-ay^2} + 4a^2y^2e^{-ay^2} \underset{\text{Pour } y^2 \rightarrow \infty}{\approx} 4a^2y^2e^{-ay^2}$$

Donc,

$$4a^2y^2e^{-ay^2} - y^2e^{-ay^2} = 0$$

Cette équation est valable pour $a = \frac{1}{2}$.

Alors,

$$u_0(y) \approx e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Posons :

$$u(y) = H(y)e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Où $H(y)$ est un polynôme en y . On substitue dans l'équation Schrödinger :

$$\frac{d^2}{dy^2} H(y)e^{-\frac{y^2}{2}} + (\varepsilon - y^2)H(y)e^{-\frac{y^2}{2}} = 0 \quad \text{où} \quad \varepsilon = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

Mais,

$$\frac{d}{dy} H(y)e^{-\frac{y^2}{2}} = \frac{dH(y)}{dy} e^{-\frac{y^2}{2}} - yH(y)e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Et,

$$\frac{d^2}{dy^2} H(y)e^{-\frac{y^2}{2}} = \frac{d^2 H(y)}{dy^2} e^{-\frac{y^2}{2}} - y \frac{dH(y)}{dy} e^{-\frac{y^2}{2}} - H(y)e^{-\frac{y^2}{2}} - y \frac{dH(y)}{dy} e^{-\frac{y^2}{2}} + y^2 H(y)e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Donc,

$$\frac{d^2 H(y)}{dy^2} e^{-\frac{y^2}{2}} - y \frac{dH(y)}{dy} e^{-\frac{y^2}{2}} - H(y)e^{-\frac{y^2}{2}} - y \frac{dH(y)}{dy} e^{-\frac{y^2}{2}} + y^2 H(y)e^{-\frac{y^2}{2}} + (\varepsilon - y^2)H(y)e^{-\frac{y^2}{2}} = 0 \quad \text{où} \quad \varepsilon = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

$$\frac{d^2 H(y)}{dy^2} - 2y \frac{dH(y)}{dy} + (\varepsilon - 1)H(y) = 0 \quad \text{où} \quad \varepsilon = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

C'est l'équation de Hermite si $\varepsilon - 1 = 2n$, $n = 0, 1, 2, \dots$. Dont, les solutions sont les polynômes de Hermite $H_n(x)$. **On trouve les valeurs propres E_n :**

$$\frac{2E_n}{\hbar\omega} - 1 = 2n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Alors,

$$E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}) , n = 0, 1, 2, \dots$$

C'est le spectre des énergies discrètes de l'oscillateur harmonique quantique.

On trouve les fonctions propres dans l'espace des y :

$$u_n(y) = C_n e^{-\frac{y^2}{2}} H_n(y) , n = 0, 1, 2, \dots$$

On trouve C_n :

Les fonctions propres $u_n(y)$ sont orthonormées :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy u_m^*(y) u_n(y) = \delta_{mn}$$

Pour $m = n$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy u_n^*(y) u_n(y) = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \left[C_n e^{-\frac{y^2}{2}} H_n(y) \right]^* C_n e^{-\frac{y^2}{2}} H_n(y) = 1$$

$$|C_n|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{-y^2} [H_n(y)]^2 = 1$$

$$|C_n|^2 2^n n! \sqrt{\pi} = 1$$

$$C_n = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} , n = 0, 1, 2, \dots$$

Les fonctions propres dans l'espace des y :

$$u_n(y) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} e^{-\frac{y^2}{2}} H_n(y) , \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Les fonctions propres dans l'espace des x :

On rappelle que :

$$y = \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{2}} x \quad \text{et} \quad dy = \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{2}} dx$$

Donc,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{2}} u_m^*(y) u_n(y) = \delta_{mn}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \underbrace{\left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} u_m^*(y)}_{u_m^*(x)} \underbrace{\left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} u_n(y)}_{u_n(x)} = \delta_{mn}$$

Alors,




$$u_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} u_n(y)$$

Donc,

$$u_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} H_n \left[\left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{2}} x \right] , \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\hbar \pi} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} H_n \left[\left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{2}} x \right] , \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Exemples

$n = 0$	$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$	$u_0(x) = \left(\frac{1}{\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}$	
$n = 1$	$E_1 = \frac{3}{2} \hbar \omega$	$u_1(x) = \left(\frac{4}{\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{3}{4}} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} x$	
$n = 2$	$E_2 = \frac{5}{2} \hbar \omega$	$u_2(x) = \left(\frac{1}{4\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} \left(\frac{2m\omega}{\hbar} x^2 - 1 \right)$	
$n = 3$	$E_3 = \frac{7}{2} \hbar \omega$	$u_3(x) = \left(\frac{1}{9\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^{\frac{3}{4}} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} \left(\frac{2m\omega}{\hbar} x^2 - 3 \right) x$	