



Ciąża: badania, torba i kiedy jechać do szpitala

Ściągowka na lodówkę według standardu opieki okołoporodowej (stan na 2026 r.)

Badania według tygodni ciąży

KIEDY	BADANIA
Do 10. tyg.	grupa krwi i Rh, przeciwciała, morfologia i ferrytyna, moczu, cytologia, glukoza na czczo, VDRL, HIV, HCV, toksoplazmoza, TSH, HBs, stomatolog
11. do 14. tyg.	USG 1. trymestru, ocena nastroju
15. do 20. tyg.	morfologia, moczu
18. do 22. tyg.	USG połówkowe
21. do 26. tyg.	moczu, toksoplazmoza (gdy wcześniej ujemna)
24. do 28. tyg.	test obciążenia glukozą 75 g, przeciwciała anty-D przy Rh ujemnym
27. do 32. tyg.	morfologia, moczu, USG 3. trymestru, immunoglobulina anty-D od 28. do 30. tyg., jeśli wskazana
33. do 37. tyg.	morfologia, moczu, HBs, HIV, posiew GBS (35. do 37. tyg.), konsultacja anestezjologiczna
38. do 39. tyg.	morfologia, moczu
Po 40. tyg.	KTG i USG co 7 dni, ustalenie przyjęcia do szpitala

Wizyta u lekarza albo położnej nie rzadziej niż co 4 tygodnie.

Jedź do szpitala albo dzwoń od razu, gdy:

- ❗ odejdą wody, zwłaszcza zielone, brązowe albo o nieprzyjemnym zapachu
- ❗ dziecko rusza się słabiej albo rzadziej niż zwykle
- ❗ masz silny, stały ból brzucha albo gorączkę
- ❗ pojawi się krwawienie z pochwy
- ❗ skurcze zaczną się przed 37. tygodniem
- ❗ masz silny ból głowy, zaburzenia widzenia, nagły obrzęk twarzy i rąk

Skurcze: kiedy jechać

- Często mówi się o regularnych skurczach co około 5 minut przez godzinę.
- Zapytaj położną albo szpital, czego trzymać się u Ciebie.
- Przy kolejnym porodzie ruszaj wcześniej.

Torba (spakuj około 36. tygodnia)

- Dowód osobisty, karta ciąży i wyniki badań
- Koszule do karmienia, kapcie, podpaski poporodowe
- Ładowarka z długim kablem, woda, przekąski
- Dla dziecka: body i pajacyk 56, czapeczka
- Fotelik samochodowy na wyjście

Termin porodu: _____

Położna, tel.: _____

Szpital, porodówka: _____

tel.: _____



Tydzień ciąży, licznik skurczy i po porodzie dziennik niemowlaka. Oboje rodzice widzą te same wpisy.

Spokojny Rodzic, Google Play